This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

May 1904
19800

Fl
45
F51

Digitized by Google

FLORA ANALITICA D'ITALIA

OSSIA

DESCRIZIONE DELLE PIANTE VASCOLARI INDIGENE

INSELVATICHITE E LARGAMENTE COLTIVATE IN ITALIA

DISPOSTE PER QUADRI ANALITICI

DEI DOTTORI

ADRIANO FIORI E GIULIO PAOLETTI

VOLUME IV

APPENDICE ED INDICE GENERALE

PEL

Dott. ADRIANO FIORI

OPERA ENCOMIATA DALLA REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

PADOVA

TIPOGRAFIA DEL SEMINARIO

1907-1908

330

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

DI

AGGIUNTE, OMISSIONI E CORREZIONI

COMPILATA

SULLE PUBBLICAZIONI APPARSE SINO A TUTTO L'ANNO 1904 [1])

(Le entità figuranti solo nella « Appendice », cioè mancanti al testo della Flora Anal. o quivi riportate come semplici sinonimi, sono in carattere **grassetto**, quelle già descritte in *corsivo*. Alle prime furono aggiunte delle brevi, ma sufficienti frasi diagnostiche, tranne che per molte di quelle critiche od il cui studio richiedeva una revisione o riforma dell' intero gruppo o genere. In questi casi ci limitammo ad indicare gli habitat relativi e, sempre che lo ritenemmo necessario, le fonti ove rintracciarne le diagnosi ovvero più copiose notizie).

FILICES

2 *Ceterach officinarum* **b. crenatum Moore.** — Fg. a lobi più larghi e più o meno profondam. lobato-crenati — *Colla spec., ma raro.*

4 (1) *Polypodium vulgare α typ.* **a. commune Milde.** — Lobi bruscam. attenuati in punta, dentati soprattutto verso l' apice. — *È la for. più diffusa.*

b. rotundatum Milde. — Lobi brevi, largam. arrotondati all' apice, quasi interi o dentati solo all' apice. — *Quasi altrettanto comune che la for. a. (Trevis.), Tir. mer. ed Alpi Mar. presso Ceriana (Bicknell ex Christ).*

c. attenuatum Milde. — Più grande che la *for. commune*, a lobi appuntiti, più lunghi, attenuati dalla base all' apice. — *Qua e là.*

d. angustum Hausm. in Milde. — Fg. assai strette (larghe 2 $^1/_2$-3 cm.), lungam. lineari, a lobi assai brevi e stretti. — *Alpi Mar. presso Garessio (Christ), C. Ticino (ex Trevis.) Tir. mer. (ex Trevis. et Asch. et Graeb.).*

e. acutum Wallr. = v. triangulare Hausm. ex Posp. — Fg. gradatam. e largam. ristrette in alto, subtriangolari, verdi-glauche, a lobi debolm. ondulato-dentati. — *Reg. illirica a Sissol (Posp.) e certam. altrove.*

for. auritum Wallr. (1831). — Lobi muniti di orecchiette alla base. — *È un lusus che si può osservare in tutte le for. di P. vulgare.*

β *serratum W.* (1810) *(Christ, 1900).* **b. pumilum Hausm. in Luerss.** — Fg. largam. triangolari, lunghe 1 $^1/_2$-4 cm., a pochi lobi. — *Alpi Mar. tra Pégomas e Mandelieu (Christ), Trentino (Gelmi).*

γ *cambricum* (*L.*, 1753). — *Nizza e Tosc. (ex Trevis.), Isola Montecristo (Bég.).*

1) Furono inoltre aggiunte alcune novità o notizie più salienti comparse nell' anno 1905.

Digitized by Google

for. australe (**Fee**) = v. hibernicum Moore = v. semilacerum Woll. (non Lk.) = v. pinnatifidum Milde (non Wallr.) — *Mentone e Lig. al Castello d'Andora* (*ex Asch. et Graeb.*), *Cors. e Sard.* (*ex Trevis.*).

6 (3) *P. Dryopteris.* — *Nell' Istria raram. sul calcare, come sui M. Nanos e M. Maggiore* (*ex Posp.*), *Cors. nel bosco di Aitone* (*Vallot*).

β *Robertianum* — *Istria* (*ex Posp.*) *e precisam. a Parenzo* (*Calegari!*)

8 *Gymnogramme leptophylla* — *Tir. a Merano* (*Bamberger*, 1853), *C. Ticino al M. Gombarogno* (*Chenev.*, 1903) *e sui muri a Indemini* (*Chenev. ex Christ*), *Val d' Aosta* (*Thomas*, 1832).

(?) **G. spectabilis Zum.** (Fl. pedem. II, p. 422). — *Piem. nei colli di Piverone e Viverone* (*Zum.*) — Quid?

9 *Woodsia glabella* **b. glandulosa Trevis.** (Atti Soc. it. sc. nat. 1874, p. 222) — *Tir. mer. al Seiser-Alp.* (*ex Trevis. l. c.*).

10 *Woodsia ilvensis* α *rufidula Asch.* = Nephrodium Michx. (1803)

β *alpina* (*Gray*) = Acrosticum Bolton (1790) = Acrost. hyperboreum Liljebl. (1793) = W. hyperborea R. Br. (Fl. An. I, 7 [var. β]).

b. intermedia Trevis. (l. c.) (sub W. hyperb.) — *Tir. mer. al Seiser-Alp. ed Oetzthal* (*ex Trevis. l. c.*).

11 (1) *Aspidium Lonchitis.* — Esistono forme intermedie tra questa spec. e l' *A. aculeatum*: l' unico carattere differenziale, cioè la maggiore o minore divisione delle fg., non è che quantitativo, quindi alcuni giustamente pensano che non si tratti che di var. di una stessa spec. (cfr. Guffroy in « Bull. Soc. bot. de France 1905 »). — *Aggiungi all' habitat: Istria.*

12 (2) *A. aculeatum* — *Trovasi anche, benchè raram., nella reg. pad.*

α *angulare* (*Sw.*) **a. commune Christ** (1900) — Fg. a lobi poco dentati.

b. hastulatum (**Ten.**) — Fg. coi lobi infer. dei segmenti inciso-lobulati o pennatifidi. — *Nell' area del tipo, ovunque.*

c. microlobum Warnstorf *in Asch. Syn.* (1896) — Fg. proporzionalm. stretta, a lobi lunghi 4-6 mm. — *C. Ticino a Locarno* (*ex Asch.*).

β *lobatum* **a. normale Christ** — Fg. a lobi grandi, largam. attaccati alla rachide, a denti quasi spinosi, più o meno orecchiuti ed incisi; le fg. giovani spesso a segmenti semplicem. pennatifidi.

b. aristatum Christ — Distinto per la rachide assai più squamosa e con peli giallo-chiari come nel tipo, per la fg. stretta, lanceolata, pei lobi meno rigidi, più numerosi, avvicinati, piccoli (lunghi 7 mm.), a denti profondi e fortem. aristati. — *Nell' area della spec.*

c. Bicknellii (**Christ**, *Foug. Alp. Mar.* 20 [1900]) = A. lobatum × aculeatum Christ (Ibid.) — Differisce dalla for. genuina per le fg. a lobi più manifestam. picciolettati, fortem. orecchiuti, pennatosetti e pei sori numerosi, distanziati e terminali. — *Alpi Mar. sotto M. Ceppo nel Rio Oliveta* (*Bicknell*).

d. umbraticum (**Kunze**) — Lobi basali super. di ciascun segmento angoloso-dentati e quasi il doppio dei vicini (nella for. normale interi e poco più grandi dei vicini) — *Nell' area della spec.*

for. Contarinianum Trevis. (Atti Soc. it. sc. nat. 1874, p. 224) — *Prov. venete* (*Contarini*).

for. intermedium Trevis. (l. c.) — *M. del Vicentino* (*Trevis.*).

for. longilobum Milde — *Ven. nei M. dei Sette Comuni ed Euganei* (*Trevis.*).

for. platylobum Milde — *Euganei, Bolzano e Valli Valdesi* (*ex Trevis.*).

for. Plukenetii Trevis. (l. c.) = Polypodium Lois, 1810 = Polystichum Duby — Stato giovanile della for. genuina — *Vicent. nei Sette Comuni, C. Ticino in V. Leventina ed Appenn. parmig.* (*ex Trevis.*).

for. rotundatum Trevis. (l. c.) = Asp. acul. v. rotund. Doell (1855) — *Vicent. nei Sette Comuni* (*Trevis.*).

Digitized by Google

γ *Braunii* — *Bassanese nei Collalti* (*Montini*).

13 (1) *Nephrodium Thelypteris* — *Istria nella valle infer. del Quieto* (*Calegari*).

15 (3) *Filix-mas* **a. subintegrum Doell,** sub Aspidio — Pianta piccola, a fg. con lobi avvicinati, interi al margine, tranne all'apice ch'è assai troncato — *Nell'area della specie, ma più specialm. al sud.*

b. crenatum Milde, sub Aspidio (Fl. An. I, 8 [for. d.]). — È la for. ordinaria, coi segmenti basali della fg. conformi agli altri, a lobi assai avvicinati, troncati e crenulato-dentati su tutto il margine.

c. deorso-lobatum Moore, sub Lastrea = Aspid. Fil.-mas v. deorso-lob. Milde. — Pianta molto grande, a fg. con lobi fortem. dentati al margine, subauriculati alla base, coi segmenti basali distanziati, larghi, deltoidei, a lobi lunghi e pennatifidi — *Alpi Mar.* (*Christ.*) *e certam. qua e là nell'area della spec.*

d. *affine* (*F. et M.*, sub Aspidio, 1838) = Aspid. caucasicum A. Br. (1841) = Lastrea Fil.-mas v. incisa Moore (1848) (Fl. An. I, 8 [for. e.]). — *Qua e là nell'area della spec.*

e. *glandulosum Milde*, sub Aspidio (Fl. An. I, 8 [for. b.]) — *Alpi Mar. e certam. altrove.*

f. *paleaceum* (*Don.*, sub Aspidio) (Fl. An. I, 8 [for. c.]) — *Form. più mer.*

g. Heleopteris (**Borckh.,** sub Polypodio) = Aspid. Fil.-mas v. Heleopt. Milde. — È un lusus con fg. a lobi triangolari, appuntiti, separati da un seno aperto e fortem. crenellati, prodotto (sec. *Christ*) dalle brinate. — *Alpi Mar.* (*Christ*) *ecc.*

var. distans (**Ces. P. et G.**) = Aspidium Viv. (1825) = Polystichum Trevis. (Atti Soc. it. sc. nat. 1874, 227). — *Cors. nelle selve allo Spedale* (*Viv.*).

for. heterolobum Trevis. (l. c., 227) (sub Polysticho) — *Piem. in Val Perosa* (*Rostan*).

for. Rostani Trevis. (l. c., 226) (sub Polysticho). — *Piem. a Pramollo in Val Perosa* (*Rostan ex Trevis.*).

16 (4) *N. cristatum* — *Triest. in una profonda vallicella tra Sesana e Lippiza, rarissimo* (*ex Marches.*), *Campo V. Maggia nel C. Ticino* (*Franzoni in Lenticchia*).

17 (5) *N. rigidum a typ.* — *Cors. al M. Cinto a 2000-2400 m.* (*Briq.*).

a. germanicum Milde, sub Aspidio — For. alpina, bassa, a segmenti avvicinati, brevi, raddrizzati ed a pinnule poco divise.

b. meridionale Milde, sub Aspidio — For. mer. avvicinantesi alla *var. pallidum* per le fg. più larghe e per le pinnule picciolettate e triangolari alla base. — *Nell'area del tipo.*

β *pallidum* — *Istria sul M. Plaunig.*, *Triest. presso Divaccia nella foveola di Resbeniac ed Alpi Giulie* (*ex Marches.*) e *Laz. al M. Circeo* (*Doria, Bég., Somm.*).

var. Bertolonii Trevis. (l. c.) (sub Polysticho) = Asp. rigidum Bert. — *Alpi Apuane* (*Bert. ex Trevis.*).

var. Hypodematium Trevis. (l. c.) (sub Polysticho) = Asp. nivale Bory = Hypodematium nivale Fée = Lastrea nivalis Moore — *Vicent. sul M. Summano* (*Trevis.*), *Istria al M. Orliak* (*Loser*) *e Basil presso Castelgrande* (*Gasparr.*).

18 (6) *N. spinulosum.* α *typicum* — *Sec. Christ deve essere molto raro e limitato alle Alpi, avendo un'area più nordica.*

for. calabrum N. Terr. (1889) — *Cal. a Castrovillari a S. Angelo* (*N. Terr.*).

for. erosum Lasch, sub Aspidio — È un lusus a lobetti ultimi irregolarm. rosicchiato-dentati od incisi. — *Qua e là.*

for. gracile E. Petit — *Cors. a Sartene* (*E. Petit*).

β *dilatatum* **a.** *deltoideum Milde*, sub Aspidio. **b. oblongum Milde,** sub Aspidio — Fg. ovali-allungate, a segmenti basali ristretti, largam. triangolari e sviluppati più in basso che in alto. Portam. del tipo, ma più grande e colle squame della v. *dilatatum.* — *Alpi Mar. presso la Madonna delle Finestre* (*Christ*).

c. dumetorum Milde, sub Aspidio — Fg. di circa 3 dm., glandulose, lembo alto circa 1 ½ dm., ovato-triangolare; segmenti basali circa egualm. sviluppati sulle due metà, un po' ristretti; pinnule ovali, fortem. dentate. Sori grandi. — *Alpi Mar. al M. Mindino presso Garessio* (*Christ*).

Digitized by Google

20 (2) *Cystopteris fragilis* α *typica* (Fl. An. I, p. 9).

A. Fg. lunghe 2-3 dm., pennatosette, con segmenti brevi, ovati, lobulati o pennatifido-lobulati, brevem. dentati (= var. α *lobulato-dentata Koch*). Qui solo la for.:

a. dentata (Dick., sub Polypodio, 1793) **Hook.** — *Nell'area della spec.*

B. Fg. lunghe sino a 5 dm., 2-3 - pennatosette (= var. β *pinnatipartita Koch*). Qui le for.:

b. anthriscifolia (Hoffm., sub Polypodio, 1795) **Koch.** — Pinnule brevi, bislungo-ovate, profondam. pennatifide, a denti più o meno acuti. — *Nell' area della spec.*

c. cynapiifolia (Hoffm., sub. Polypodio, 1795) **Koch.** — Forma molto grande, a segmenti e pinnule allungate, bislungo-ovate, distanziate, a lobi lanceolati e denti sdraiati ed ottusi. — *Nell'area della specie.*

d. angustata Hoffm. (sub Polyp. frag. v. angustatum, 1790) **Koch.** = Pol. tenue Hoffm. (1795) — Fg. assai tenere, verdi-scure, a pinnule lanceolate, acute, a lobi lanceolato-oblunghi, inciso-dentati ed a denti acuti — *Nell'area della spec.*

e. acutidentata Doell (1857). — Forma grande, a fg. con segmenti acuti, regolarm. pettinato-divisi, a lobi numerosi, con molti denti acuti e paralleli. — *Nell'area della spec.*

f. deltoidea Shuttlew. — Paio infer. di segmenti più lungo di tutti. — *S. Gottardo* (*ex Trevis. l. c., p. 223*).

g. Huteri Milde (1867) (**Hausm. exs.**). — Differisce da tutte le altre for. per avere le fg. glandulose. — *Alpi dolomitiche del Tir. mer. e M. Cenisio* (*Rostan, Bayer*) (cfr. *Asch.*, Syn. I, p. 17).

β *regia* (*Desv.* [1827], *Presl* [1836]) *Bernoulli* = Polypodium L. (1753) (Cfr. Fl. An. I, p. 9 [var. β alpina]).

a. fumariiformis Koch. — Lobi di terzo ordine ovati, brevi, a denti brevi ed avvicinati. — *Nell'area della var.*

b. alpina (Desv., 1827) **Koch** = Polypodium Wulf. in Jacq. (1788). — Lobi di terzo ordine bislunghi, allungati, a denti lunghi ed allontanati. — *Nelle alte Alpi.*

c. deltoidea Asch. (Syn. I, p. 18 [1896]). = C. alp. v. deltoidea Milde (1864) = C. regia × montana? — Differisce da *C. frag. v. regia* soltanto per avere il paio infer. dei segmenti più lungo di tutti gli altri. — *Alpi dolomitiche del Tir. mer. sullo Schlern.*

Oss. — Alla *C. fragilis* sono da aggiungersi ancora le seguenti entità:

for. pinnatisecta Guss. hb. ex N. Terr. (1889) — *Cal. al M. Pollino al Dolcedorme* (*N. Terr.*).

for. pollinensis N. Terr. (1889). — *Cal. alla Traboccata di M. Pollino da 1600 a 2271 m.* (*N. Terr.*).

for. stenoloba A. Br. ex Milde. — *Svizzera cisalp.* (*ex Trevis.* Atti, Soc. it. sc. nat. 1874).

for. tenera Milde — *Reg. mont. dell' It. sett.* (*ex Trevis. l. c.*).

for. tenuis Fl. Wett. ex Milde. — *Nella reg. mont.* (*ex Trevis. l. c.*).

(?) **C. leptophylla Zum.** (Fl. Pedem. II, p. 433). — *Piem. nel Canavese nei colli di Palazzo* (*Zum.*) — Quid?

21 (1) *Asplenium Filix-foemina.* — *Trovasi benchè raram. anche nella reg. pad.*

a. dentatum Doell. — Pinnule semplicem. dentate o crenulato-dentate al margine. — *Nell' area della spec.*

b. fissidens Doell. — Pinnule a lobi con qualche lobulo dentato verso l'apice. — *Nell'area della spec.*

c. multidentatum Doell. — Pinnule bipennatifide, a lobi con 8-10 lobuli più o meno profondam. dentati al margine ed all'apice. — *Nell'area della spec.*

for. corsicum (**Fée,** sub Athyrio). — *Corsica* (*Fée*).

for. molle Heldr. et Sart. exs. (1846) **ex Christ.** — *Cors. al M. Renoso a 2000 m.* (*Briq.*).

for. nebrodense Tod., sub Athyrio. — Distinta soprattutto per le fg. superiorm. pennate e per le pinnule larghe, brevi e rotondate all'apice (ex *Zodda*) — *Sic. nei m. Peloritani al Salto dell' Acero* (*Zodda*) *e Nebrodi.*

Digitized by Google

for. rhaeticum Posp. = Polyp. rhaet. L. p. p. = v. plicatum Bruhin — Fg. lunghe e strette, rigide, a segmenti diretti in alto, a lobi lineari-lanceolati, alte circa 7 dm. (*Posp.*). — *Reg. Giulia ecc.*

22 (2) *A. fontanum* α **typicum.** — *M. Baldo* (*Ball*), *ma non più ritrovato* (*Goiran*), *C. Ticino* (*Franzoni ex Lenticchia*): *è calcicolo.*

a. pedicularifolium (**Hffm.**) **Asch.** = Athyrium Halleri Roth = Aspl. Halleri DC. — È la for. normale.

b. angustatum Asch. = Athyr. font. Roth = A. Halleri β ang. Koch. — Forma poco sviluppata delle stazioni soleggiate, a fg. strette, brevi e segmenti raccorciati, grossam. dentati od appena pennati. — *Alpi Mar.* (*Christ*).

c. pseudo-lanceolatum Christ (Foug. Alp. Mar. p. 14, 1900). — Fg. grandi (20 per 3-4 cm.), bislungo-lanceolate, restringentisi verso lo stipite, ch'è breve e robusto (1 $^1/_2$ mm. diam.) e rosso-vinoso sino al di là della base del lembo, a rachide alata e lobi largam. ovali (larghi 4-5 mm.) e brevem. dentati, a tessuto coriaceo. Sori maturi ricoprenti interam. la faccia infer. dei segmenti — Portam. dell' *A. lanceolatum.* — *Alpi Mar. presso Garessio al Pian Bernardo e Certosa di Pesio nel vallone di Creus* (*Christ*).

β **foresiacum A. Le Grand,** sub A. Halleri (1869) (**Christ**) = A. Hall. v. forisiense A. Le Grand (1873) = A. font. v. macrophyllum S. Lager (1889). — Fg. lunghe 2-3 dm., larghe sino ad 8 cm., ovali-lanceolate, ottuse all' apice, poco ristrette alla base, a segmenti medi più grandi degli altri, a pinnule picciolettate, larghe 5-7 mm., assai poco profonde ed a lobi ovato-arrotondati, ottusi; rachide rosso-vinosa nella metà infer. Sori grossi — Portam. dell' *A. lanceolatum.* — *Da noi solo la for.:*

b. italicum Christ (1902). — Distinguesi per essere più densam. cespuglioso e sdraiato, per la lamina più corta (lunga 5-7 cm.) ed un po' allargata alla base. — *Lig. or.* (*Christ*) *e Colli Euganei al M. Pendice* (*Bizzozzero* sub A. lanceolato, *Béguinot*): *è silicolo.*

23 (3) *A. lanceolatum* α *typicum.* — *Sestri Levante a Riomaggiore* (*Christ*), *Isole Sanguinarie presso la Cors.* (*Boullu*), *Giglio* (*Sommier*), *Montecristo ed Isole Ponziane* (*Béguinot*), *Ischia* (*Guss.* fide *Béguinot*); *gli esempl. di Cal. riferiti al tipo, sec. il Béguinot, appartengono invece alla var. obovatum.*

β *obovatum* **b. longipes Gennari** (1870). — Picciuoli delle fg. assai allungati e glabri affatto. — *Isola Maddalena* (*Genn.*).

24 (4) *A. Adiantum-nigrum* α *nigrum Heufl.* = α typic. (Fl. An. I, p. 11).

a. lancifolium Heufl. — Fg. generalm. triangolari-lanceolate, segmenti brevi, divaricati ad angolo retto o quasi, a lobi divaricati, subovati ed a denti brevi. — *È la for. dell' Eur. media che da noi si ritrova sui monti.*

b. obtusum (**Kit. in W.,** 1810) **Milde** (1865). — Fg. più strette che nelle altre for., segmenti a lobi obovati, con denti brevi, ottusi, spesso nulli. — *Alpi Mar. nella valle del Tanaro tra Garessio e Ponte di Nava* (*Christ*), *Istria* (*ex Trevis.*) *e certam. altrove.*

c. argutum (**Kault,** 1824) **Heufl.** = A. tabulare Schrad. (1818) (ex Trevis.). — Fg. grandi, assai suddivise, a segmenti ovato-allungati, con denti allungati e subaristati. — For. di transizione alla *var. Onopteris.* — *Alpi Mar.* (*Christ*), *isola di Ponza* (*Bolle ex Milde*) *ecc.*

β *cuneifolium* (*Viv.*, 1806) = A. Forsteri Sadl. (1820) = A. Serpentini Tausch (1839) (Fl. An. I, p. 11). — Distinguesi, oltre che per la forma delle fg., anche pel fatto che queste si disseccano nell' inverno, mentre nel tipo si mantengono verdi. — *In Cors. presso Erbalunga* (*Billot*).

γ *Onopteris* (*L.* 1753) *Heufl.* = A. Virgilii Bory (1832).

a. *acutum* (*Bory*, 1810) (Fl. An. l. c., var. γ).

b. davallioides (**Tausch**) **Heufl.** — *Gargano* (*Sieber*), *Napoli* (*Richard*) *ed isola Ponza* (*Bolle*) (*cfr.*, *Milde*, *Fil. p. 88*).

c. anceps Trevis. (Atti Ist. ven. 1869, p. 731) — *Euganei* (*Trevis.*).

Digitized by Google

25 (5) *A. fissum* — *Triest. a Miramare* (*Posp.*).

26 (6) *A. lepidum.* — L'habitat di questa spec. va così completato: *Triest. all'ingresso dell'antro di Ospo presso Muggia* (*Beyer*) *e presso Gorizia al m. S. Gabriele* (*Scholz*), *Tir. mer. in Val di Non presso Tuenno e Pontalto, Trent. nel Buco di Vela, Abr. al m. Vettore, Nap. nei m. di Castellamare, Basil. a Castelgrande, Cal. al m. Pollino e Sic. alle Madonie.*

27 (7) *A. Ruta-muraria.* — Prendiamo dall'Asch. (Syn. I, p. 68-70) la seguente chiave:

A Fg. per lo più lunghe meno di 6 cm., a contorno generalm. breve e triangolare; pinnule 1-1 $^1/_2$ volte più lunghe che larghe.

a. Brunfelsii Heufl. — È la for. più diffusa, a pinnule assai grandi, largam. obovate e dentate.

b. Matthioli (Gasp.) Heufl. = v. rotundifolium Celak. — Pinnule assai larghe, triangolari-cuneiformi, a margine anteriore arrotondato e quasi intero. — *Versante merid. delle Alpi ecc.*

B Fg. per lo più lunghe 10 cm. o più, spesso tripennate, a contorno allungato; pinnule generalm. $^1/_2$ volta più lunghe che larghe.

I Pinnule allontanate.

c. pseudo-germanicum Heufl. = v. cuneatum Moore = A. german. v. polyphyllum Sacc. (ex Asch.). — Fg. lunghe sino a 10 cm., 2-3 pennate, a pinnule strettam. romboidali o cuneiformi, inciso-dentate. — *Trevigiano* (*Sacc.*), *Vicent. nei Sette Comuni* (*Trevis.*), *Tir. mer. e Lago Maggiore a Gordola* (*ex Christ*).

II Pinnule avvicinate.

1 Pinnule colla maggior larghezza circa nel mezzo.

d. leptophyllum Wallr. — Fg. lunghe sino a 12 cm., sottili, affilate, assai divise, a pinnule lanceolate, picciolettate e crenulate. — *Alpi Mar., Lugano e Bolzano* (*ex Christ*).

e. elatum Láug (1824) = A. multicaule Presl (1836) = v. Pseudo-serpentini Milde (1867) = v. cuneifolium Celak. — Fg. lunghe spesso sino a 25 cm., verdi-chiare; pinnule romboidali, inciso-dentate, cuneate, smarginate in alto. — *Nell'area della spec. nei luoghi ombrosi.*

2 Pinnule cuneiformi, colla maggior larghezza in alto (cfr. etiam for. *elatum*).

f. pseudo-nigrum Heufl. (1856). — Fg. lunghe circa 15 cm., 3- pennate; pinnule allungate, cuneiformi, inciso-dentate. - *Comasco* (*Garovaglio*), *S. Gottardo* (*Maly*) *e M. Summano* (*Trevis.*).

g. tenuifolium Nees ex Milde (1858) = v. pseudo-fissum Heufl. (1865). — Fg. lunghe sino a 17 cm., 3-4-pennate; pinnule assai piccole, cuneiformi o lineari-cuneiformi, ottuse od arrotondate in alto, dentato-crenate. — *Tir. mer. a Merano e Salorno* (*ex Asch.*), *Val di Non* (*ex Christ*), *C. Ticino* (*Trevis.*) *ed Istria al lago Cepic* (*Posp.*).

Oss. — Sono da aggiungersi ancora le seguenti for.:

for. angustifolium Hall. f. mss. ex Christ (Hedwigia 1903, p. 159). — *Nell'area della spec.*

for. calabrum N. Terr. (1889). — *Cal al M. Pollino alla Traboccata* (*N. Terr.*).

for. ellipticum Christ (Hedwigia 1903, p. 161) — *Tir. mer., Lugano, Locarno, Val d'Aosta ed Alpi Mar.* (*ex Christ*).

for. marginatum N. Terr. (1889). — *Cal. al M. Pollino da 1600 a 2271 m.* (*N. Terr.*).

for. praemorsum Christ (Hedwigia 1903, p. 163). — *Cortina d'Ampezzo, Lugano e Tosc. a Boscolungo* (*ex Christ*).

for. pseudo-lepidum Trevis. (Atti Soc. it. sc. nat. 1874, p. 235). — *Tir. mer. e Valtellina* (*ex Trevis.*).

for. pseudo-lepidum Christ (Foug. Alp. Mar. p. 9, 1900). — *Alpi Mar. tra Viola e Pamparato a Bric del Monte verso 1100-1200 m. e presso Fontan ed Eze* (*ex Christ l. c.*), *C. Ticino a Locarno, Novaggio e Gandria e Tir. mer. presso Sexten* (*ex Christ in Hedwigia*).

Digitized by Google

for. stenophyllum Christ (Hedwigia 1903, p. 165) — *Cortina d'Ampezzo* (*ex Christ*).
for. Zoliense Kit. mss., Heufl. (Christ. l. c., p. 164). — *Tir. mer. ed Abr. al Sirente* (*ex Christ*).

28 (8) *A. Trichomanes* × *septentrionale* = A. germanicum Weiss. (cfr. Asch. Syn. I., p. 75).
for. Heufleri (*Reichard*) = A. Trichomanes × germanicum Fl. An. I, p. 12 (cfr. Asch. l. c., p. 77).

28 * *A. Trichomanes* × *Adiantum - nigrum* (= A. dolosum Milde) (cfr. Asch. l. c., p. 80).

28 * * *A. Trichomanes* × *Ruta-muraria*. **for. Hauchecornei Asch.** (1896). — *Tir. mer. al castello di Rafenstein presso Bolzano, un solo esemplare* (*Hauchecorne ex Asch.*).

29 (9) *A. marinum* — *M. Cuma nel Nap.* (*Micheletti*), *Malta* (*Caruana-Gatto, Duthie*), *Elba* (*ex Trevis.*).
b. minor Lk. = A. mar. b. trapeziforme Guss. — Fg. a segmenti più piccoli, trapezoidali — *Pantellaria* (*ex Guss.*).

30 (10) *A. viride*. — Aggiungi all'habitat: *Istria*
b. oblongum Christ (Foug. Alp. Mar. p. 7, 1900). — Segmenti poco crenellati, notevolm. picciolettati, ovali-oblunghi e terminanti in punta ottusa. — *Da ricercarsi.*
c. incisi-crenatum Milde. — Segmenti inciso-crenati sino ad $^1/_3$-$^1/_2$ della loro larghezza. — *Da ricercarsi.*
d. sectum Milde. — Segmenti profondam. laciniati sino alla base. — *Tir. mer.* (*ex Asch.*).
e. bipinnatum Clowes. — Segmenti pennato-partiti o -setti almeno nella metà super. delle fg. — *Trent. presso Rovereto in Val Ronchi* (*Bolle ex Asch.*).

31 (11) *A. Trichomanes* **c. umbrosum Milde.** — Fg. prostrate, sottili, gracili, verdi-chiare, generalm. a piccoli lobi confluenti. — *Nei luoghi più ombrosi.*
d. auriculatum Milde. — Segmenti in parte distintam. auriculati. — *Nizzardo* (*Christ*) *ecc.*
e. Harovii Milde. — Segmenti astati alla base, in alto per lo più inciso-crenati. — *Trento* (*ex Asch.*).
f. incisum Moore. — Segmenti pennatofessi o pennatosetti. — *Tir. mer. a Bolzano* (*Sadebeck*).
g. rotundatum Milde. — Fg. lunghe sino a 22 cm., a segmenti rotondati, con 6-7 nervi nel lato super. e 5-6 nell'infer. — *Sard.* (*Staudinger ex Milde*).

33 (13) *A. septentrionale*. — *Elba* (*Sommier*).

34 (14) *A. Seelosii*. — *Comasco sul M. Campo dei Fiori* (*Calegari!*).

35 (1) *Scolopendrium vulgare*. **b. fructuosum Christ** (Foug. Alp. Mar. 17 [1900]). — Fg. con pochi sori nelle orecchiette basali, separati da uno spazio di 6 cm. da quelli del resto della fg. — *Lig. occ. a Finalmarina* (*Biknell ex Christ*).
c. crispum W. — Fg. a lamina più o meno undulata, crenulata od irregolarm. lobata al margine. — *Trevigiano, Lazio* (*Bég.*) *e certam. altrove.*
d. bifidum Fée (sub S. officinarum) **Trevis.** = var. furcatum Goir. — Fg. bifida all'apice — *Qua e là col tipo; Veronese* (*Goir.*), *Lazio* (*Bég.*), *Cors.* (*ex Trevis.*).
e. dædalum W. — Lamina 1 o 2 o più volte fessa — *Tir. mer.* (*ex Asch.*).
f. cornutum Moore — Nervo mediano sotto l'apice con una sporgenza cornea. — *Veron. sul M. Pastello* (*Goir.*).

36 *S. Hemionitis*. — *Malta* (*Caruana-Gatto, Duthie*), *Tosc. al M. Argentaro* (*Somm.*), *Giglio* (*Somm., Bég.*), *Lazio a Roma e dintorni, M. Lepini e M. Ausoni* (*ex Bég.*).

37 *Woodwardia radicans*. — *Messinese al Salto dell'Accro* (*Zodda*) *ed a S. Pier Nicelo* (*Nicotra*).

38 *Blechnum Spicant*. — *Elba* (*Bég.*).

39 *Allosorus crispus*. — *Cors. al M. Cinto* (*Briq.*).

40 *Struthiopteris germanica* **b. serrata Baenitz,** sub Onoclea. — Segmenti a lobi seghettati. — *Tir. mer. a Merano* (*ex Asch.*).

41 (1) *Cheilanthes fragrans*. — *Nel C. Ticino?* (*Ducommun*).

Digitized by Google

α typ. b. *Tinaei* (*Tod.*). — Sec. Trevisan (Atti Soc. it. sc. nat. 1874, p. 232) sarebbe uguale a *Ch. hispanica Metten.* — *Messina* (*Tin.*).

β **maderensis (Lowe)** = Ch. fragrans Webb et Berth. — Distinguesi dal tipo specialm. per l'indusio mai cigliato. — *Sic.*, *Cors. e Sard.* (*ex Trevis. l. c.*).

b. commutata Trevis. (l. c.). — Lacinie delle fg. per lo più con peli glandolosi di sotto; falso indusio bruscam. attenuato, un po' denticolato. — *M. Pisano*, *Vesuvio e Sard. mer.* (*ex Trevis.*).

43 (1) *Pteris aquilina* **b. integerrima Moore.** — Lobetti dei segmenti di secondo ordine tutti bislungo-falcati ed interi. — *Colla forma genuina.*

44 (2) *P. longifolia.* — *A Brienno sul lago di Como* (*Lena Perpenti in hb. Mutin.*); *però non più ritrovata, per cui si affaccia il dubbio che potesse essere colt. od inselv.* (cfr. *De Toni* e *Christ* in Atti R. Ist. Ven. 1902-1903, p. 561).

46 *Adiantum Capillus-Veneris.* — Sulla variabilità dei lobi di questa felce cfr. « *Ross* in Bull. herb. Boiss. 1901, p. 1231 ».

c. Vaccarii Christ. — Fg. con segmenti in parte fertili normali ed in parte sterili divisi in lacinie allungate, dentato-lobulate. — *Aosta sulle rupi umide di Sillaè a 700 m.* (*L. Vaccari!*).

49 (2) *Botrychium matricariæfol.* β *lanceolatum.* — *Nel C. Ticino al S. Bernardino* (*Franzoni*), *M. Bianco* (*Trevis.*) *e precisam. al Col de Balme* (*ex Asch.*).

50* (4*) **B. virginianum Sw.** = Osmunda L. = B. virginicum W. — *C. Ticino al M. Maloja* (*Trevis. in Atti Soc. it. sc. nat. 1874, p. 242*).

51 *Ophioglossum vulgatum* α *typ.* — *Cors. a Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*); *nelle Alpi fruttifica sino all'Agosto* (*Lenticchia*).

52 *Osmunda regalis* — *Giglio* (*Bég.*, *Somm.*); *nelle Alpi fruttifica sino all'Agosto* (*Lenticchia*).

β **Plumierii (Tausch).** — Pinnule bislungo-lanceolate o lanceolate, grossam. ed acutam. seghettate. — *C. Ticino presso Locarno ad Arcegno* (*Milde*) *e Ponte Brolla* (*Jaeggi*), *Sic. a Castelbuono* (*Presl*) *e Sard. ad Ingortusu* (*Asch.*).

b. longifolia Presl. — *Cors. a Portovecchio* (*Sieber ex Milde*).

MARSILIACEAE

53 *Azolla caroliniana.* — *Polesine in molti luoghi*, *Mantov. a Sermide* (*De Bonis*) *e lago di Mantova* (*Adr. Fiori*), *intorno a Pavia diffusasi dal 1883* (*Bozzi*, *Farneti*) *e Piem. a Giarole lungo la ferrovia Alessandria-Casale* (*L. Garetti* in litt.).

55 (1) *Marsilia quadrifolia.* — *Vico di Pantano e Ponte a Mare in T. di Lavoro* (*Pasquale*).

57 (1) *Pilularia globulifera.* — *Presso Aisovica nel Goriziano* (*Posp.*).

EQUISETACEAE

59 (1) *Equisetum arvense.* — *Elba* (*Somm.*).

a. genuinum. — Rami dei fusti sterili lunghi circa 4 cm. ed eretti.

c. nemorosum A. Br. (1844) = E. pratense Roth (non Ehrh). — Rami dei fusti sterili lunghi sino a 15 cm., divaricati o riflessi. — *Luoghi ombrosi umidi del Triest.* (*Posp.*) *ed It. sett.* (*Trevis.*).

for. alpestre Wahlb. — *Nei prati alp.* (*Trevis.*), *Trent. al Tonale* (*Gelmi*).

for. boreale (Bongard) Milde. — *Tir. mer. a Merano* (*Milde*).

for. decumbens F. W. Meyer. — *It. sett. e media* (*Trevis.*).

for. pseudo-silvaticum Milde. — *Tirolo* (*Milde*).

for. varium Milde. — *Tirolo* (*Milde*).

60 (2) *E. maximum* **a. genuinum.** — Fusti sterili ad internodi lunghi 4 cm. circa, alti sino a 10 dm. ed a rami lassi e lunghi sino a 2 dm.

c. breve Milde. — Fusti sterili ad internodi, esclusi i super., lunghi 1 cm. circa e

Digitized by Google

quindi a guaine avvicinate, alti 3 dm. circa ed a rami densi, lunghi 6 cm. circa. — *Reg. illirica* (*Posp.*), *It. sett.* (*Trevis.*).

61 (3) *E. silvaticum* **b. pyramidale Milde.** — *Tir. mer.* (*Trevis.*).

64 (4) *E. pratense* **b. nanum Milde.** — *Tir. mer. al lago di Autholz* (*Hausm. ex Milde*).

63 (5) *E. palustre* **c. ramulosum Milde.** — Fusti cascanti, lungam. ramosi dalla base, con pochi rami portanti una spiga. — *Reg. illirica a Grimalda e Grado* (*Posp.*).

for. nanum Milde. — *Tir. mer. al M. Schlern* (*Milde*).

for. nudum Duby. — *Veneto, Tir. mer. e Lomb.* (*ex Trevis.*).

64 (6) *E. limosum b. fluviatile.* — *Avellinese* (*Casale e Gussone*).

65 (7) *E. hiemale* α *typ.* **b. ramigerum A. Br.** — *Verona a Pestrino* (ex *Asch. Syn. I, p. 142*).

66 (8) *E. ramosissimum* **a. elongatum (W.)** = E. ramos. v. altissimum A. Br. in Milde. — Fusto unico, robusto, eretto o scandente, a 10-20 costole, riccam. ramoso nei nodi mediani. — *Nell' area della spec.*

c. gracile Milde = E. ramosum v. gracile A. Br. — Fusto unico, debole, ginocchiato o sdraiato, a 4-10 costole, ramoso dalla base, a rami, radi e brevi. — *Reg. illirica* (*Posp.*), *It. sett.* (*Trevis.*) *ecc.*

d. simplex Milde = E. elong. v. simplex Doell. — Fusto unico o 2-4 insieme, semplici, lunghi sino ad 1 m., a 10-14 costole. — *Goriz.* (*Posp.*), *Veneto e C. Ticino* (*Trevis.*) *ecc.*

e. fastigiatum F. Hy. (1890). — Fusti poco scabri, a rami brevi ed assai robusti. — *Cors. a Calvi* (*Mand. e Fouc.*) *e certam. altrove.*

for. campanulatum (Poir. p. p., 1804) Trevis. (1874), **Asch.** (1896) = E. multiforme v. campan. Vauch. (1822) = E. ramosiss. v. scabrum Milde (1865). — *Val d' Aosta* (*Thomas ex Milde*).

for. humile Milde. — *Venezia al Lido* (*B. Jena ex Milde*).

for. pannonicum (Kit. ap. W., 1810) = E. tenue Presl (1826) = E. ramosum b. virgatum A. Br. (1839) (cfr. Asch. Syn. I, p. 140). — *Colla specie.*

for. procerum (Pollini) Asch. = E. ramosum a. subverticillatum A. Br. (cfr. Asch. Syn. l. c.). — *Colla specie.*

67 (9) *E. variegatum.* — *Cors. a Fontinone* (*E. Petit*).

for. affine Milde. — *Tir. mer.* (*Milde*).

for. anceps Milde. (Cfr. Asch. Syn I, p. 146). — *Veronese e Vicentino* (*ex Asch.*).

for. meridionale Milde (Cfr. Asch. Syn. I, p. 147). — *Tir. mer. presso Merano* (*Milde*).

for. virgatum Doell. — *Veneto* (*Trevis.*).

LYCOPODIACEAE

68 (1) *Lycopodium complanatum* α *typ.* **b. intermedium Sacc.** — *Trevig. nel Bosco Montello* (*Sacc.*).

69 (2) *L. alpinum.* — *Appenn. pavese al M. Tartago a 1600 m.* (*Farneti*).

70 (3) *L. clavatum.* — *Raram. scende nella reg. pad. come nei « Rivoni tra Cava Manara e Carbonara nel Pavese* (*Traverso*) ».

b. monostachyum Desv. — *Trent. al Tonale* (*Gelmi*).

71 (4) *L. annotinum.* — *A Rigoso nell' Appenn. parmigiano* (*Avetta e Casoni*).

β **pungens Desv.** — Fg. lunghe solo 5 mm., incurvate in alto e terminate da una punta cartilaginea. — *Forma artica trovata nel Tir. mer. a Grann presso Bolzano* (*ex Milde*) *ed al Sempione* (*Wolf ex Christ*).

73 (6) *L. Selago* = Huperzia Selago Trevis. — *Istria sul M. Maggiore* (*Calegari in litt.*).

a. densum (Lam.) = Huperzia Sel. α densa Trevis. = L. Sel. v. appressum Desv. — Fg. brevi, strettam. appressate. — *È la for. comune.*

b. laxum Desv. = Huperzia Sel. β laxa Trevis. — Fg. più lunghe, eretto-incurve. — *Colla for. a.*

Digitized by Google

c. **patens Desv.** = Huperzia Sel. γ patens Trevis. — Fg. inegualm. patenti, più acuminate, piane. — *Alpi Giulie, Carnia e Tir. mer. (ex Trevis.) ecc.*

ISOËTACEAE

77 (1) *Isoëtes lacustris* α *typica*. — Secondo il Nobili (lettera 19 genn. 1897), l'habitat andrebbe così modificato: *nel lago Maggiore, nel C. Ticino (Franzoni) e nel lago d' Orta a Buccione (DNtrs.).*

β *echinospora*. — Secondo il predetto Autore l' habitat deve essere: *nel lago Maggiore e a Buccione e Pella nel lago d' Orta frequentissima.*

a. **curvifolia Pirotta.** — Fg. brevi, divaricate, le esterne talora ricurve. — *Comune.*

b. **elatius Fliche** = v. rectifolia Pirotta. — Fg. allungate, ingrossate alla base ed erette. — *Più raro.*

78 (2) *I. Malinverniana*. — *Torino: Vauda di Leynì nel Rio dietro la Fornace Miglietti (Vallino, Ferrari!)*

79 (3) *I. velata* α *typ.* b. **sicula Ces. et DNtrs. ex Tod.** (cfr. Tod. Syn. pl. acot. vasc. Sic. p. 45). — *Sic. fra Palermo e Misilmeri al piano della Stoppia (Tod.).*

β *tegulensis* b. **maculosa Gennari** (Ann. Agric. sic. 1865, p. 175) (sub I. dubia). — *Isola Maddalena (Genn.), ma non più ritrovata (A. Vacc.).*

c. **emersa Gennari** (Giorn. bot. it. 1870, p. 96) (sub I. dubia). — *Isola Caprera (Genn.), ma non più ritrovata (A. Vacc.).*

80 (4) *I. Duriæi*. — *Giglio ed Elba (Somm. ecc.), Montecristo e Capraia (Bég.), Caprera (Somm.).*

81 (5) *I. Hystrix*. — *Malta (Armitage ecc.), Elba (Somm.).*

CONIFERAE

83 (2) *Pinus Pinea* b. **fragilis Nouv. Duhamel.** — Guscio dei semi sottile, fragile. — *Colt.*

84 (3) *P. Pinaster*. — *Romagne nella pineta di Cervia (Del Testa), Puglie, e Basil. ove dalla spiaggia di Taranto e da Ginosa arriva sino a Torremare e al bosco Imperatore in quel di Pomarico (Giordano), Elba (Somm.).*

c. **prolifera Parl.** — Pine minori, numerosissime, quasi addensate a capolino. — *Talora col tipo anche in Italia (Parl.).*

85* (4 bis) *P. brutia Ten.* = P. maritima Lamb. = P. pyrenaica Lap. = P. Paroliniana Webb. in Carr. = P. Parolinii Vis. — È da tenersi come buona spec., distribuita, oltre che in Cal. all' Aspromonte (ove però pare non sia più stata raccolta in tempi recenti), nell' As. min., Siria, Cipro, Candia ed anche nella Persia bor. ed Affganistan; essa è pure colt. lungo le coste dalmate dell' Adriatico e nella Provenza. L' indicazione dei Pirenei sarebbe derivata da un errore (cfr. *Asch.* Syn. I, p. 218).

86 (5) *P. nigra Arnold* (1785). — Per ragioni di priorità questo nome va sostituito a quello di *P. Laricio Poir.* (1804) (Fl. An. I, p. 28) e se ne possono distinguere le seguenti var. e for.:

α *austriaca (Hoess, 1825)* = P. nigra Arnold (sensu stricto) = P. nigricans Host (1826) (Fl. An. I, p. 28 [var. β]). — Fg. verdi-cupe, larghe sino a 2 mm., con ipoderma formato (cfr. *Longo*, Annali di bot. I, 1903) nella porzione mediana del lato convesso da 2-5 strati di cellule sporgenti a guisa di cuneo tra uno stoma e l' altro. Carena delle apofisi delle squame medie e super. acuta. — *Sec. il Longo (Annali di bot. I, p. 323, 1904) sarebbe così distribuito nell' It. centr. e mer.: Abr. al Gran Sasso al bosco Martese e Selva degli abeti (Crugnola), Majella in Val d' Orfenta (Ten.), Cal al Pollino (N. Terr.,* sub P. Laricio) *ove sale al Pollinello sino a quasi 1770 m. (B. Longo), Timpone del Pino presso Acquaformosa, M. Montea presso S. Agata d' Esaro, montagne di Orsomarso e M. Caràmolo presso Saracena sempre sul calcare e nei dirupi (B. Longo); il Pino dell' Etna ascritto da Parl. a questa var. è invece* (sec. *Longo*) *il P. Laricio.*

Digitized by Google

β *Laricio* (*Poir.*) – Fg. verdi, larghe 1 ½ mm. circa, con ipoderma formato (cfr. *Longo* l. c.) di 1-2 strati di cellule soltanto. Carena delle apofisi delle squame medie e super. ottusa.

a. **Poiretiana Ant.** = P. Corsicana Loud. — Chioma alla fine corta, formata da corti rami, patenti e raddrizzati. — *Monti della Cors.*

b. **stricta Carr.** = P. calabrica Hort. = P. Lar. β calabrica Koehne. — Chioma più allungata ed acuta, formata da rami più gracili, patenti o riflessi, però raddrizzati all'apice. Fg. meno robuste. — *Cal. alla Sila ecc.*

γ **leucodermis (Antoine)** = P. Prenja Beck. — Affine alla v. *austriaca;* distinguesi per i rami bianco-grigiastri, marmorati a guisa di una pelle di serpe per le cicatrici dei fascetti di fg. cadute e per l'unghia delle squame frutt. grigio-brunastra in ambedue le facce (nel tipo e nella v. *Laricio* nero-bruna di sotto). — *Basil. sul M. La Spina e Cal. al M. Pollino e nel giogo tra Orsomarso ed il M. Montea* (*B. Longo*).

87 (6) *P. silvestris* **a. genuina Heer.** — Pine ovato-coniche, a scudo convesso o piano ed umbone cenerino o bruno-cenerino.

b. **fruticosa Borbas** (1874) = P. Mughus Jacq. (non Scop.) = P. silv. v. nana Posp. (1897). — Fg. anche vecchie verde-aglio. Arbusto basso, ricordante il *P. montana.* — *Nel Goriziano* (*Posp.*).

c. **parvifolia Heer.** — Fg. non più lunghe di 25 mm. — *Valtellina presso Bormio* (*ex Asch. Syn. I, p. 222*).

d. **hamata Stev.** = P. rubra Poir. (non Mill.) = P. silv. v. rubra Beck, Posp. — Pine lunghe sino a 7 cm., più strettam. coniche, con squame a scudo piramidale con 4 carene ed umbone rosso-bruno, nelle infer. quasi uncinato. – *Istria* (*ex Posp.*) *e probabilm. altrove.*

e. **microcarpa Schroeter et Bettelini** (in Berichte Schw. Bot. Ges. 1903, p. 104). — Pine mature lunghe 15-28 mm. soltanto, a semi normali, ma lunghi solo 9-11 mm. compresa l'ala. — *C. Ticino a Mendrisiotto* (*Bettelini*) *e sopra Faido* (*Schroeter*).

88 (7) P. *montana.* — *Appenn. camp. ai Tre Confini ed al Zaffinetto* (*N. Terr.*).

A. Scudo delle squame più sporgente nel lato della pina opposto al ramo che in quello rivolto contro il ramo stesso e quindi pine ad asse ed inserzione eccentrica.

α **uncinata (Antoine).** — Apofisi delle squame nel lato della pina opposto al ramo assai sporgenti a forma di piramide, nelle squame infer. ricurva. Fg. cotiledonari 7.

a. **rostrata Antoine.** — Pine coniche o raram. ovoidali, riflesse od orizzontali; scudo delle squame prolungato in una appendice lunga sino al doppio della propria larghezza. — *Alpi occ.* (*ov' è esclusivo*), *più raram. nelle or.*

b. **rotundata (Lk.)** = P. humilis Lk. = P. obliqua Saut. = P. uliginosa Neum. — Pine coniche od ovoideo-coniche, orizzontali od inclinate in giù; scudo delle squame prolungato in una piramide più breve della propria larghezza. — *Alpi (escluse le occ.).*

B. Scudo delle squame egualm. sporgente su ogni lato della pina, la quale presenta quindi un asse centrico.

β **Pumilio (Haenke).** — Pine erette od orizzontali sino alla maturità, quindi ricurve in giù, più brevi delle fg., globose od ovoidee, lunghe 3-4 ½ cm., al principio d'autunno violette, presso la maturità rossastre o brunastre ed anche pruinose; appendice dello scudo convessa dal lato super., nell' infer. portante un umbone concavo, il quale nelle squame infer. trovasi al disotto della metà dello scudo. Fg. cotiledonari 3-4. — *Nelle Alpi centr. ed or. ed alla Majella nell' Abr.*

γ **Mughus (Scop.).** — Pine patenti o dirette in giù, dalla base appianata coniche o conico-ovoidee, lunghe 4-5 cm., al principio dell' autunno giallo-bruno-chiare, mature rosso-cannella, mai pruinose; appendice dello scudo costituita da una carena acuta trasversale, portante nel mezzo (anche nelle squame infer.) un umbone con mucrone pungente. — *Alpi or.*

91 (2) *Abies excelsa* α **typica a. crassifolia Goir.** (1882) (sub Pinus Picea Dur.), **Ugolini**

Digitized by Google

(1902). — Fg. tetragone, lunghe 16-17 mm., larghe 1 ½-2, appressate, rivolte da ogni parte. — *Veron.* (*Goir.*) *e Bresciano* (*Ugolini*).

b. tenuifolia Goir. (1882) (sub Pinus Picea Dur.), **Ugolini** (1902) = Pinus baldensis Zuccagni. — Fg. subtetragone, bicarenate, più intensam. verdi, più gracili, lunghe 8-15 mm., larghe 1-1 ½, appressatissime e diritte nella faccia super. dei rami, ai lati di questi incurvate e sulla loro faccia infer. distiche. — *Nell' area della spec.; nel Veron. più frequente della for. a.* (*Goir.*), *Bresciano* (*Ugolini*).

c. monocaulis (Nördl. ap. Wk.). — Fusto quasi interam. sprovvisto di rami, foglioso solo all' apice. — *Isola Bella nel lago Maggiore.*

β **alpestris Bruegg.** (1874) (**Stein,** 1887) = A. excel. v. medioxima Heer (non Nyl.) = Picea excel. v. mediox. Wk. — Distinguesi dal tipo per la corteccia bianco-grigiastra, pei germogli e fg. più grossi e più rigidi, i primi brevem. e densam. pelosi, le seconde bluastro-pruinose, nel secco giallo-verdastre, patenti, rivolte in dentro, sui rami più vecchi quasi unilaterali, più brevi (18 mm.), ottuse od acute, ma non pungenti. Coni lunghi 7 ½-12 ½ cm., a squame largam. arrotondate, non o poco smarginate. — *C. Ticino e Comasco.*

94 (1) *Juniperus communis.* — *Elba* (*Somm.*).

α *typ.* **b. arborea Rchb.** — Arboscello alto sino a 5-7 m. — *Qua e là.*

c. intermedia (**Schur**) = v. montana Endl. = v. prostrata Wk. = J. com. × nana Wettst. — Forma a caratteri intermedi tra il tipo e la var. *nana*, a cespuglio depresso e fg. lunghe circa 7 mm. sopra 2 mm. di larghezza, poco pungenti. — *Alpi.*

95 (2) *J. Oxycedrus.* — *Piem. in Val di Susa* (*Allioni*, *Re*, *Brinda*).

a. rufescens Carr. = v. microcarpa Neilr. — Bacche piccole, lunghe appena come le fg., rosso-brune, opache e raggrinzate, non o talora fuggevolm. pruinose all' apice.

b. coccinea Posp. — Bacche grosse, più lunghe delle fg., rosso-scarlatte, liscie e splendenti, con un triangolo pruinoso all' apice. — *Istria*, *It. mer. ecc.*

c. viridis Posp. — Bacche di media grandezza, lunghe come le fg., densam. aggrovigliate alla base dei rami, verdognole, increspate, opache, brunastre nel secco, con un piccolo triangolo pruinoso all' apice. — *Istria nel canal di Leme* (*Posp.*).

36 (3) *J. macrocarpa.* — *In Val di Susa col prec.* (*Brinda*).

Nota. — Sec. *Brinda* in Malpighia 1903, p. 28) le differenze più salienti tra *J. Oxycedrus* e *macrocarpa* sarebbero le seguenti:

J. Oxycedrus. — Chioma verde chiara. Corteccia fessa in placche esilissime e quindi quasi liscia. Fg. lunghe 15-20 mm. e larghe 1-1 ½, *con punta acutissima*, acutam. carenate di sotto, concave superiorm. e con 2 solchi glauchi ben evidenti. Amenti masc. tondeggianti, *a squame anterifere lunghe 1 mm.* Bacche solitarie od aggruppate, 6-10 mm. diam., *rossiccie e nitide* a maturità.

J. macrocarpa. — Chioma verde cupa. Corteccia fessa in placche più grandi. Fg. lunghe 12-18 mm. e larghe 1 ½-2, *con punta ottusa*, ottusam. carenate di sotto, pianeggianti superiorm. e con 2 solchi glauchi non sempre ben visibili. Amenti masch. ovali, *a squame anterifere lunghe 1 ½-2 mm.* Bacche solitarie, 8-14 mm. diam., *turchiniccie e glauco-pruinose* a maturità.

98 (5) *J. Sabina.* — *Marche alla grotta dell' Orso sui M. Sibillini* (*Paol. e Card.*).

99 * J. excelsa M. B. — *Un solo individuo sul M. Baldo in Brè, residuo di passate piantagioni* (*Rigo ex Goir.*); *origin. dell' Asia min.*

99 ** J. thurifera L. — *Indicata di Sard.* (*Grisebach ex Nyman Consp. Fl. Eur. p. 676*), *ma poi da alcun altro menzionata.*

GNETACEAE

101 (1) *Ephedra distachya.* — *Marche nella valle della Nera presso Visso* (*Paol. e Card.*).

α **typica.** — Otricello interno dei fi. femm. prolungato in un tubetto diritto.

a. Linnaei Stapf. — Fusti alti circa 3 dm., eretti od ascendenti, a rami con diam. non

Digitized by Google

super. ad 1 mm. Amenti agglomerati a 2-3; stipite delle antere grande. — *È la for. più comune.*

b. *monostachya (L.)* (Fl. An. I, p. 31 [for. b.]). — Fusti alti circa 1 dm. Amenti solitari, sessili o quasi; stipite delle antere piccolo. — *Qua e là.*

c. **tristachya Stapf.** — Fusti alti $^1/_2$-1 m., eretti od ascendenti, a rami con diam. sino di 2 mm., duri e rigidi. Amenti numerosi, spesso formanti grossi glomeruli. — *Da ricercarsi.*

β **helvetica (C. A. Mey.).** — Otricello interno dei fi. femm. prolungato in un tubetto contorto a guisa di cavatappo. — *Piem. nella Val d'Aosta ed a Susa.*

103 (3) *E. fragilis.* — *In Cal presso Gerace-marina (Huter, Porta e Rigo), Malta (Delicata).*

GRAMINACEAE

106 *Lygeum Spartum.* — *Laz. a Fondi (Ten.).*

108 *Andropogon distachyus.* — *Malta (Delicata, Daveau).*

109 (2) *A. hirtus* γ *podotrichus.* — *Laz. in più luoghi (ex Chiov.).*

110 (3) *A. Ischaemon* **for. rubricinctum (Gandoger).** — *Veron. (Goir.).*

112 *Heteropogon Allionei.* — *Colli di Vittorio presso il Castello (Adr. Fiori, Pampanini).*

115 (2) *Sorghum vulgare* β *sacchar.* — In luogo di « *c. rubens (W.)* » si ponga « *c. rubrum Posp.* = Holcus L. »

117 (2) *Saccharum Ravennae.* — *Reggiano a Boretto e Gualtieri (Casali).*

122 *Pennisetum longistylum.* — *Inselvat. a Verona, a Garda e presso Nizza* (cfr. *Goiran* in Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 324) *e ad Albano Laziale (Doria, Terracc.).*

122 * **Stenotaphrum dimidiatum Brogn.** = Panicum L. (1753) β **americanum (Schrank,** 1824) = St. glabrum Trin. (1826). — *Largam. diffuso nei paesi trop. e subtrop.; nat. presso Catania alla Plaja nelle sabbie mar. (Cavara* in Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 365).

124 (2) *Setaria glauca* **b. bracteata Bolzon et De Bonis.** — Culmo provvisto di una brattea erbacea, lunga 1-8 cm., inserita alla base della spiga o lontana da essa fino a 5-6 cm. — *Polesine a Badia, Lendinara e Rovigo (Bolzon e De Bonis).*

124 * **S. glauco × viridis** = *S. reclinata Vill.* — *C. Ticino a Gordola (Chenev.).*

125 (3) *S. viridis.* α **typica.** — Pannocchia manifestam. ristretta alle due estremità, lunga 5 cm. circa, con reste lunghe circa 5 mm., per lo più rossigne o raram. giallognole.

b. **nodiflora Sacc.** — Pianta assai diffusa e strisciante, con fusti emettenti ad ogni nodo un ramo foglioso portante una spiga. — *Nei campi arenosi del Trevigiano ad Arcade (Saccardo).*

β **major Posp.** = Panicum vir. β majus. Gaud. — Pannocchia poco ristretta o spesso rotondata alla base, lunga il doppio del tipo, con reste verdi-chiare, lunghe quasi 1 cm. — *Dune di Grado nel Goriz. (Posp.).*

129 (2) *Panicum repens.* — *Elba (Somm.).* [Aggiungi all'area geograf. « Austral »].

131 (4) *P. capillare.* — *Lig. occ. presso Ventimiglia, inselvat. (Bicknell), inselvat. presso Perugia (Palomba!).*

133 (6) *P. eruciforme.* — *Presso Assisi al M. Subasio (Morroi e Brizi), tra Manfredonia e Foggia (Porta e Rigo).*

134 (7) *P. colonum.* — Aggiungi all'area geograf. « *Giapp. Austral.* ». — Forse potrebbe considerarsi meglio come var. del *P. Crus-Galli.*

135 * (9) **P. phyllopogon Stapf** ap. Hook. Ic. plant. VII, 1901, tab. 2698. — *Farneti* in Atti R. Ist. bot. di Pavia IX, p. 9 (1904). — *Fiori* in Bull. Soc. bot. it. 1905, p. 66. — Prossimo al *P. Crus-Galli*, del quale ha la stessa struttura di spighette, ma se ne distingue pel portamento e per le fg. densam. villoso-barbate nel punto di congiunzione tra la lamina e la guaina. Ciuffi di peli si trovano pure ai nodi dell'infiorescenza. — *Comparso nel 1896 nelle risaie del Novarese, importato coi risi asiatici*

Digitized by Google

(*Arcangeli ex Stapf*), *poi nelle risaie del Pavese* (*ex Farneti*); *è una mal'erba peggiore del P. Crus-Galli.* — L' indicazione del Pisano, dello *Stapf* (l. c.), fu fatta per equivoco (cfr. *Fiori* l. c.).

136 (1) *Digitaria disticha.* — *Sestri Levante nella vallata di Cavi* (*Christ*).

137 (2) *D. sanguinalis* **for. esculenta Goir.** = Pan. sang. β esculentum Gaud. — Pianta più robusta con 8-12 spighe. — *Col tipo.*

138 (3) *D. filiformis.* — *Roma lungo il Tevere all'isola di S. Bartolomeo, avvent.* (*Bég.*).

139 (4) *D. debilis.* — *Lazio a Nettuno, Ariccia, Castelgandolfo e Subiaco* (*Doria, Chiov., Terr. A.*).

141 (2) *Oryza clandestina.* — *Laz. in più luoghi* (*Pasquale, Bég. ecc.*).

143 *Ehrharta panicea.* — *Laz. nella Valle della Ninfa Egeria* (*Cuboni ex Chiov.*).

144 (1) *Phalaris arundinacea.* — Aggiungi all' area geograf. « *Giapp.* ».

c. **Rotgesii Husnot** (1899), sub Baldingera = Bald. Rotgesii Fouc. et Mand. ex Husnot. — Pianta più gracile e più piccola. Pannocchia gracile, a rami brevi (lunghi 5-6 cm.). — *Cors. nella foresta di Casamente* (*Rotgès, Mand. et Fouc.*).

d. **macra Hack.** — *Cors. al M. Renoso a 1400 m.* (*Briq.*). — Forse è la stessa che la for. preced.

147 (4) *Ph. cærulescens.* — *Triest. a Stramare, rara* (*Marches.*), *Rimini presso al mare* (*Del Testa*).

148 (5) *Ph. paradoxa.* — *Presso Torchiara nel Parmigiano* (*Avetta e Casoni*).

154 (1) *Anthoxanthum gracile.* — *Malta* (*Delicata*).

155 (2) *A. odoratum a typ.* c. **strictum Asch. et Graeb.** (Syn. II, 1, p. 26). — *C. Ticino a Bironico e Pazzallo* (*Chenev.*).

d. **montanum Asch. et Graeb.** (l. c., p. 25). — *C. Ticino* (*Chenev.*).

e. **alpinum** (**Chenev.** in Bull. Herb. Boiss. 1903, p. 448) = A. odor. β Gaud. Fl. Helv. I, p. 62. — *C. Ticino al S. Gottardo* (*Lüscher*).

f. **tenerum Asch. et Graeb.** (l. c.). — *C. Ticino in Val d' Efra sopra Frasco* (*Chenev.*).

β * **glaucum** (**Vahl,** 1804) = A. amarum Brot. (1816). = A. odor. v. majus Hack. in Husnot (1896). — Pianta più robusta del tipo. Fg. larghe, con rade ciglia. Pedicelli pelosi. Glumtt. sterile quasi del doppio più grande, sorpassante più lungam. il fi. fertile; resta della glumtt. super. fortem. ginocchiata. — *Cors. al M. Rotondo* (*Mand. et Fouc.*) *e M. Renoso* (*Rotgès, Mand. et Fouc.*).

158 (1) *Stipa Calamagrostis* **a. glabra Asch. et Graeb.** (1898). — Guaine e spgt. glabre.

b. **hirsuta Asch. et Graeb.** (1898). — Guaine densam. cigliate al margine. Spgt. pubescenti. — *Liguria* (*ex Asch. et Graeb.*).

162 (5) *S. juncea.* — *Tosc. al M. Argentaro* (*Doria ex Somm.*), *Cal. presso Monteleone* (*Bisogni*).

164 (7) *S. pennata.* — *Malta* (*Delicata*). — Sec. *Asch.* e *Graeb.* (Syn. II, p. 106) da noi trovasi solo la sottospec. o var. β **mediterranea Trin. et Rupr.**, colle due for. **a. pulcherrima** (**C. Koch**) (*Alpi, Istria ecc.*) e **b. gallica** (**Celak.,** 1883) = S. penn. v. gallica Steven (1857)? (*Alpi ecc.*).

165 * **S. setigera Presl** = S. intricata Godr. — *Genova nella valle della Polcevera a Fegino presso la conceria di Bisio, Ghersi e C.* (*Canneva ex Somm.* in Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 115); *importata dall' Argentina colle pelli.*

165 * * **S. hyalina Nees.** — *Colla prec., pure importata dall' Argentina colle pelli* (*Canneva ex Somm.* l. c.).

165 * * * **Nassella trichotoma Hack** = Stipa trich. Nees = Urachne trich. Trin. = Stipa tenella Godr. — *Colle due prec., anch' essa importata collo stesso mezzo dall' Argentina* (*Canneva ex Somm.* l. c.).

166 (1) *Milium effusum.* — *Malta* (*Delicata*); *trovasi benchè raram. anche nella reg. pad.* [Aggiungi all' area geograf. « *Giapp.* »].

167 (2) *M. vernale* β *Montianum.* — *Malta* (*Delicata*).

169 (4) *M. paradoxum* α **typicum** = Agrostis par. L. = Milium par. L. = Oryzopsis

Digitized by Google

par. Nutt. — *Proprio della reg. medit. occ. e Madera* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 97-98); *forse da riferirsi qui la loc. di Cors. ad Ajaccio* (*Lutz*).

β **virescens Nob.** = M. paradoxum Scop. = Urachne vir. Trin. = Piptatherum paradox. Koch. = P. virescens Boiss. = Oryzopsis vir. Beck. — *Litorale Friulano, Goriziano, Triest. nel bosco di Sestiana, Istria (tra Mune e Starada, presso Pola, S. Andrea di Rovigno, isola Brioni ecc.), Umbria nei pascoli del Lecceto (Piccinini), Val Tiberina (Arc.), Laz. lungo il Tevere (Sang.) e Marche al M. Nero* (cfr. Asch. et Graeb. l. c.).

170 (5) *M. multiflorum.* — *Lago di Garda a Tremosine* (*Ugolini*).

171 (1) *Crypsis alopecuroides* β *brachystachys* = C. sicula Jan. — *Mantov. a Sermide* (*Magnaguti*), *Pisa* (*Caruel*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 125).

172 (2) *C. schoenoides* **b. minor Lge.** (cfr. Asch. et Graeb. l. c., p. 124). — *Mantov. a Sermide (Magnaguti ex Asch. et Graeb.).*

173 (3) *C. aculeata.* — *Malta* (*Delicata*).

b. cyperoides Asch. et Graeb. (l. c.). — *Livorno* (*Magnaguti ex Asch. et Graeb.*).

174 (1) *Phleum arenarium* α *typ.* **b. pusillum Bég.** (1897). — Culmi semplici, alti appena 2-3 cm., totalm. ricoperti dalle guaine rigonfie, di cui le 2 super. racchiudono la spiga. — *Lit. del Lazio* (*Bég.*).

175 (2) *Ph. tenue.* — *Elba* (*Sommier*), *Malta* (*Delicata*).

176 (3) *Ph. asperum Jacq.* (1786) = Phalaris asp. Retz (1779-91), va sostituito dal nome più antico di *Ph. paniculatum Huds.* (1762). — *Cors. presso Caporalino* (*Mand. et Fouc.*) *ed a Corte ed Ajaccio* (*Fouc. et Sim.*).

177 (4) *Ph. echinatum.* — *Basil. (Guss. ex Asch. et Graeb.* Syn. I, 1, p. 146); *le indicazioni del Veronese (M. Bolca e M. Baldo) sono erronee (ex Goir.) e tali pure sono da ritenersi quelle degli Euganei e dell' Istria.*

178 (5) *Ph. alpinum* — *Asch.* et *Graeb.* (Syn. II, 1, p. 144) lo considerano come var. di *Ph. pratense.*

β *commutatum.* — *Cors. al M. Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).*

γ **subalpinum Hack. in Br.** (1882) (**Goir.**, 1897-904, pr. spec.). — Culmi alti sino a 9 dm. Pannocchia cilindrica, lunga 4-8 cm. Glume violaceo-chiare, con resta lunga ½ di esse. Forma di passaggio al *Ph. pratense.* — *Nell' area della spec.*

179 (6) *Ph. pratense* α *typ.* **b. Bertolonii DC.** — Pianta ridotta, alta circa 2 dm., a fusto appena ingrossato a bulbo alla base e spiga ovata, lunga 1 cm. circa, glume brevi (2-3 mm.), con resta brevissima. — *Istria mer. ecc.*

β *nodosum* (*L.*) **b. serotinum** (**Jord.**) = Ph. prat. v. nod. for. altissimum Bizz. — Pianta più sviluppata in ogni parte. — *Nell'area della spec.*

c. abbreviatum Boiss. (1845), sub Ph. prat. = Ph. microstachyum Ruiz ex Nym. (1851) = Ph. praecox Jord. (1854). — Pianta ridotta, a fg. più strette e spiga raccorciata. — *Nei luoghi secchi, aridi.*

180 (7) *Ph. Michelii* β *ambiguum.* — *Verona fuori Porta Nuova, avvent.* (*Goir.*), *Basil. a Pomarico (Giordano), Cal. sul m. Stella* (*Porta*) *e sul m. La Mula* (*B. Longo*).

182 (1) *Alopecurus Gerardi.* — *Gli esemplari della Sila determ. con questo nome dal Solla appartengono all' A. pratensis!*

184 (3) *A. agrestis* β **versicolor Biasol.** = A. creticus Rchb. (non Trin.) = A. purpurascens Lk. = Pianta più gracile, a spiga, culmo ed antere rosso-porporine, culmo contorto. Spgt. a resta talora (**b. breviaristatus Marches.** in Asch. et Graeb.) breve, rinchiusa. — *Nella reg. medit.*

187 (6) *A. geniculatus.* — Aggiungi all' area geograf. « *Giapp. Austral. N. Zel.* ».

β *fulvus.* — Distinguesi dal tipo per la resta della glumtt. inserita circa a metà del dorso (nel tipo verso la base), spesso un po' sporgente e per le antere rosso-fulve.

190 *Lagurus ovatus.* — *Entro terra trovasi anche negli Euganei ad Abano (reg. pad.), Basil. a Melfi* (*N. Terr.*, *Fiori*) *e Pomarico, Potenza e Tricarico* (*Giordano*), *in Cal. a Tiriolo (reg. submont)* (*Fiori*) *ecc.*

Digitized by Google

b. nanus Guss. — Pianta alta appena 8-10 cm., a pannocchia subrotonda. — *Lampedusa.*

191 *Chaeturus fasciculatus.* — *Livorno* (*Mus. bot. di Berlino ex Asch. et Graeb.* Syn. I, 1, p. 167), *Puglie a Biccari* (*Baselice ex Ten.*).

192 (1) *Polypogon monspeliensis* **b. intermedius** (**Guss**). — Pannocchia più piccola, spiciforme. Glume ottuse, pubescenti-scabre, cigliate al margine. — *Isolette presso la Sic. e Lamped.*

192 * (1 bis) *P. litoralis Sm.* — È una buona spec., diffusa, oltre che lungo le coste occ. di Eur. e reg. med. (ove in molti luoghi è da ritenersi importata), anche nell' As. occ., mer. ed or., Abiss. ed Amer. bor.-occ. Quindi non ha fondamento l' opinione del Duval-Jouve che fosse un ibrido tra *P. monspel.* ed *Agrostis alba v. verticillata.* — *Dune di Grado e Primiero nel Goriz.* (*Posp.*), *Terra di Bari nella valle di Poggio Orsini* (*Palanza!*).

β **lobatus Posp.** — Differisce dal tipo per la pannocchia manifestam. lobata, lunga 8 cm. (nel tipo non lobata e lunga 2 $^1/_2$ cm.) e per le fg. a guaina non rigonfia ed a lamina più stretta, più lunga e meno patente. — *Nel Goriz. ad Isola (Posp.).*

193 (2) *P. maritimus* α *typ.* **b. acutiflorus** (**Guss.**). — Glume acute, non dilatate all'apice, meno villose, con squamette che le rendono più scabre alla base. — *Sic., Ustica, Pantell. e Lamped.*

196 *Sporobolus pungens* = Agrostis Schreb. (1779). Questo nome deve sostituirsi, per ragione di priorità, con quello di *Sp. arenarius Duval-Jouve* = Agrostis Gouan (1773).

197 (1) *Agrostis Spica-venti.* — *Nel Lazio* (cfr. *Chiovenda*, in Malp. 1897, p. 109).

198 (2) *A. anemagrostoides* — *Laz. a Terracina* (*Woods ex Chiov.*).

198 * **A. elegans Thore** = A. pulchella Guss. (1827). — *Sicilia al bosco di Castelbuono* (*Presl*); *ma non più segnalata.*

201 (5) *A. canina.* — *Cors. a Prunelli di Fiumorbo* (*Mand. et Fouc.*).

c. *mutica.* — *Cors. tra il ponte della Restonica e la masseria Timozzo* (*Briq.*).

for. nobilis (**DNtrs.**). — *Comasco presso Rovello* (*DNtrs*).

for. hybrida (**Gaud.**). — *Reg. Giulia nella Ciceria* (*Posp.*).

202 (6) *A. alba.* — Sono da aggiungersi le seg. var. o forme:

α *typica* **for. aristata Mad.** — *C. Ticino ecc.*

for. coarctata (**Ehrh., Hoffm.**). — *Reg. Illirica* (*Posp.*) *ecc.*

for. glaucescens (**Spr.**). — *Sicilia* (*ex Richter*).

for. montana N. Terr. (1889). — *Cal. al Piano di M. Pollino a 1782 m.* (*N. Terr.*).

for. patula (**Gaud.**) = A. alba × alpina Bruegg. — *C. Ticino* (*Chenev.*).

for. prorepens Asch. (1864) = A. stolonifera Rchb. (non L.) = A. stol. γ prorep. Koch. — *Reg. Illirica* (*Posp.*), *C. Ticino* (*Chenev.*) *ecc.*

for. silvatica (**Host**). — *Reg. Illirica* (*Posp.*).

for. silv. subfor. prolifera Asch. et Graeb. — *Lungo la ferrovia Pavia-Voghera* (*Penzig ex Asch. et Graeb.*, Syn. I, 1, p. 174).

β *vulgaris* **for. divaricata** (**Hoffm.**). — *Reg. Illirica* (*Posp.*).

for. dubia (**Lam.**). — *C. Ticino sotto Mergoscia* (*Chenev.*).

for. Gussonii Richt. = A. frondosa Guss. — *Sic. alle Madonie (Presl).*

for. tarda (**Bartl.**) = A. umbrosa Schur. (non Pers.). — *Tir. mer. a Bolzano* (*Bartl., Sauter*).

for. tenella (**Hoffm.**). — *Reg. Illirica* (*Posp.*).

ζ *verticillata* **for. convoluta Asch. et Graeb.** = A. alba ε conv. Freyn. — *Istria a Pola nel canale di Veruda* (*Freyn*).

for. frondosa (**Ten.**). — *It. mer.*

203 (1) *Calamagrostis arundinacea* γ *varia* **b. inclusa Torges** (1897). — *Reg. Illirica* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II. 1, p. 210).

c. **tenerrima Torges** = C. tenella Marchesetti (non *Lk.*). — *Reg. Illirica* (cfr. Asch. et Graeb. l. c.).

Digitized by Google

203 * C. Haussknechtiana Torges (1895) = C. arundin. × varia Torges. — *Reg. Illirica (Tommasini)* (cfr. Asch. et Graeb. l. c., p. 212).

203 ** C. arundinacea × Epigeios Heidenreich = Arundo Agrostis Scop.? = A. acutiflora Schrad. = C. acutiflora Rchb. (non DC.). — *Triestino (ex Marchesetti), Reg. Giulia sul M. Nanos (Posp.).*

204 (2) *C. tenella Lk.* = Arundo Schrader (non C. tenella Host [= C. Halleriana]) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 198).

205 (3) *C. Halleriana P. B.* (1812), *DC.* (1815) = Arundo Gaud. (1811).

206 (4) *C. Epigeios α typ.* **b. violacea Beck.** — *Reg. Illirica (Posp.).*

β **Reichenbachiana Grecescu** = C. glauca Rchb. (non Arundo glauc. M. B.) = C. Epig. v. canescens Posp. — *Presso Gorizia (Posp.).*

206 * C. Epigeios × litorea = C. Wirtgeniana Hausskn. — *Tir. Mer. a Bolzano, Giudicarie e lago di Garda* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 217).

206 ** C. Epigeios × varia = C. Bihariensis Simonkai. — *Tir. mer. presso Bolzano* (cfr. Asch. et Graeb. l. c.).

207 (5) *C. litorea.* — *Laz. a Fiumicino (Rolli ex Chiov.).*

b. laxa (Host.). — *Goriz. e basso Friuli, ove sostituisce il tipo (Posp.).*

208 (6) *C. lanceolata.* — *Basil. sul Vulture (N. Terr.).*

β **canescens Nob.** = Arundo Weber in Wigg. (1780) = C. Gaudiniana Rchb. = C. Calam. v. canescens Asch. et Graeb. — *Istria interna (Posp.).*

209 *Psamma arenaria* β **australis (Mabille)** = Ammophila Porta et Rigo exs. — Fg. più rigide, quasi giunchiformi, un po' pungenti. Pannocchia più allungata (sino a 2 dm.). Spgt. più lunghe, la terminale lungam. picciolettata, a glume e glumtt. più acute; queste con peli basali più copiosi, uguaglianti circa ½ della glumtt. — *È la forma più comune, anzi probabilm. l'unica, esistente da noi.*

211 (2) *Arundo Pliniana — Cesenate lungo il Savio (Del Testa), Perugia sulle sponde del Tevere (Palomba), frequente nelle isole Maddalena e Caprera (A. Vaccari).*

212 *Phragmites communis α typ.* **c. subuniflora DC.** = Arundo Pseudophragmites Lej. = A. nigricans Mérat. — Pianta ridotta in ogni parte, a spgt. 1-2-flore. — *Colla for. genuina.*

β *Isiaca (Kth., non Rchb.)* **b. chrysantha (Mab.).** — Pannocchia assai grande e densa. — *Corsica.*

213 *Ampelodesma tenax α typ.* **b. effusus (Steud.)** — Glume più lunghe e più acuminate, pannocchie più diffuse e con rami più flessuosi che nella for. tipica. — *Lit. del Laz. (ex Chiov.).*

β *bicolor. — Lazio a Velletri (Mariani!).*

214 (1) *Holcus mollis. — Elba (Somm.); scende talora anche nella pianura pad. come nel Veneto.*

215 (2) *H. lanatus. — Isola di Capraia (Somm.).*

b. coloratus Rchb. — Pannocchia quasi porporina. — *C. Ticino presso Locarno (Chenev.) ecc.*

c. aristatus Posp. — Glume colla carena prolungata in una breve resta. — *Trieste (Posp.).*

216 (3) *H. Notarisii.* — Sec. Asch. e Graeb. (Syn. II, 1, p. 227) è una var. di *H. lanatus.*

219 (2) *Aira caryophyllea α typ.* **c. divaricata (Pourr.)** = A. patulipes Jord. = Avena Todari Tin. ex Tod. — Pannocchia larga, coi rami infer. a rametti basali vigorosi come o più di tutto il resto della pannocchia, per cui spesso l'asse della stessa appare piegato da un lato. — *Sic. (Tin.) e precisam. ad Alcamo (A. Ponzo) ecc.*

γ. *Cupaniana* **b.** *biaristata Parl.* (1848) = A. cup. v. incerta Ces. P. et G. (1868); Fl. An. I, p. 67.

c. Magnagutii Asch. et Graeb. (1899). — Pianta assai debole, a fusti ascendenti (15 cm.), lisci. Fg. filiformi. — *Lago d'Agnano presso Napoli (Magnaguti).*

220 (3) *A. capillaris* **c. corsica (Jord.).** — Spgt. più piccole, lunghe circa 1 mm., con 1 fi. solo aristato. — *Corsica ecc.*

Digitized by Google

221 (4) *A. Tenorei* β *intermedia.* — *Tosc. al M. Argentario ed a Rapolano* (*Somm.*).

222 (5) *A. insularis* **b. natans Chiovenda** (1898). — Culmi filiformi, natanti. — *Laz. presso Nettuno e Fogliano* (*Chiov.*, *Pappi*) *e Sic. alla Piana de' Greci* (*Tod. ex Chiov.*).

223 (6) *A. minuta.* — *Isola di Capraia* (*Somm.*).

226 (1) *Deschampsia flexuosa* — *Bosco Fontana presso Mantova nella reg. pad.* (*Moretti - Foggia*).

α *typ.* **c. Legei Richter, Debeaux** = Aira Leg. Bor. — Pannocchia chiara, bianchiccia. Spgt. più grosse. Glume argentine, pellucide. — *C. Ticino* (*Chenev.*), *Cors.* (*Revel. ex Debeaux*) *ecc.*

d. corsica Richter = Aira cors. Tsch. — *Corsica.*

228 (3) *D. caespitosa b. altissima* **for. ochroleuca Richt. in Rchb.**, sub Aira caesp. — Spgt. giallognole in pannocchia piccola e povera. — *Qua e là.*

d. Gaudini Richter = Aira alpina Roth (non L.) = D. alp. Gaud. (non R. et S.). — Pianta più piccola, a fg. convolte e pannocchia breve e densa, assai colorata. Spgt. più grosse (lunghe 4 ½ mm.). — *Veron. nella reg. alp. del M. Baldo e dei Lessini* (*Goir.*) *e certam. altrove nelle Alpi.*

233 (5) *Trisetum argenteum* **b. Rotae Richter** = Avena DNtrs. ex Parl. = T. argent. b. parviflorum Parl. — Spgt. più piccole, con circa 3 fi. — *Bergam. sul Resegone* (*Rota*) *e Veron. sul M. Baldo* (*Goir.*).

235 (7) *T. flavescens.* — Crediamo coll' Hackel di riunire a questa spec. anche il *T. Burnoufii*, perchè legato ad essa da forme intermedie; esso diventa perciò la var. δ.

γ *alpestre.* — *Alpi di Brescia* (*ex Nicotra*).

ε *splendens* (*Presl*) *Hack. in Briq.* (1901) — Distinto dal tipo per le fg. più strette, più lunghe e più glabre, per le spgt. a 2 o raram. 3 fi. fertili, nitide pel largo margine scarioso della glumtt. infer. — *Proprio della Sic. e Sard.*

δ *Bournoufii* (*Parl.*) *Hack. in Briq.* (1901). — Si avvicina assai alla var. precedente. — Esisterebbe anche in *Sard. e Sic.* (sec. Fouc. in Bull. Herb. Boiss, 1899, p. 696 et in Bull. Soc. bot. de France 1899, p. 292), ma forse non si tratta della pianta tipica di Parlatore.

237 (9) *T. aureum.* — Si presenta talora colle guaine fogliari pelose ed allora rimangono come caratteri costanti per distinguerlo dal *T. paniceum*, solo il colore delle spgt. e la lunghezza della resta.

238 (10) *T. paniceum.* — *Istria a Pola* (*Richter ex Kern.*); *talora anche nella reg. submont. come a Tiriolo in Cal.* (*Adr. Fiori*).

b. pubescens Chiov. in Malp. 1897, p. 109, sub T. neglectum. — Caratterizzato secondo Chiovenda da « Paleis infer. dorso undique villosis, glumis glaberrimis carina scabris ». — *Roma* (*Chiov.*).

240 * *T. pygmaeum Goir.* = Arundo Spr. (1810), Moretti ex Pollini (1816). — Scoperto sul M. Baldo dal Gebhardt ma non più ritrovato; riferito da alcuni al *Tr. subspicatum*, da altri al *T. Cavanillesii.*

241 *Ventenata dubia Coss.* (1856), *F. Schultz* (1863), *Boiss.* (1884).

242 (1) *Avena sativa* **b.** *orientalis.* — Un carattere distintivo di questa for. sarebbe dato (sec. l' ing. Camperio) dai peduncoli delle spgt. infer. attorcigliati; anche le reste possono essere un po' attorcigliate.

242 * **A. sativa × fatua** = A. hybrida Peterm. (non Koch). — *Roma a Panisperna* (cfr. *Chiovenda* in Malp. 1897, p. 109).

243 (2) *A. fatua* β *sterilis* **c. patens Posp.** — Differisce dal tipo per avere la pannocchia imperfettam. unilaterale, a rami più lunghi, le glume aperte, i peli delle glumette bianco-argentini poi bruni (non rossiccio-bruni) ed i culmi più alti (10 dm). — *Istria* (*Posp.*).

d. pseudovilis Hausskn. (1894). — Forma robusta (15 dm.), grigio-verdastra, a glume con sino ad 11 nervi, a fi. poco chiaram. disarticolantisi a maturità, con peli solo alla base della glumtt., brevi e pallidi. — *Lig. a Bordighera* (*Hausskn.*).

Digitized by Google

γ *hirsuta* **b. Hoppeana (Scheele).** — *Istria* (cfr. *Asch. et Graeb.* Syn. II, 1, p. 241).
c. **solida Hausskn.** (1894). — *Presso Venezia (Rigo)* (cfr. *Asch. et Graeb.*, l. c., p. 242).
e. **Wiestii (Steud.).** — *Pantellaria* (cfr. *Asch. et Graeb.* l. c.).

244 (3) *A. pratensis* δ *brom.* **b.** *australis* (*Parl.*, 1848). — Sec. Asch. et Graeb. (Syn. II, 1, p. 255) è sinonima di *A. compressa Heuff.* (1835), nome che per ragione di priorità deve adottarsi.

246 (5) *A. pubescens* α *typ.* **b.** *lucida* (*Bert.*), è sinonima (sec. Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 245) di β *sesquitertia* (= A. amethystina DC.).
γ **levigata (Schur) b. insubrica Asch. et Graeb.** — *C. Ticino a Piora e Cima di Camoghè (Bornmueller ex Asch. et Graeb. l. c.).*

247 (6) *A. Parlatorei.* — *Val d'Aosta a La Balme (Beauverd).*

248 (7) *A. montana* **b. sedenensis (Clarion in DC.).** — *Alpi Mar. a Tenda (Reuter ex Asch. et Graeb.).*

250 *Arrhenatherum elatius.* — *Elba (Sommier).*
b. *tuberosum Nob.* = Avena tub. Gilib. (1791) = Holcus bulbosus Schrad. (1806) = Arrh. bulb. Presl (1820); Fl. An. I, p. 74 (for. b.).
c. **biaristatum (Peterm), Peterm.** — Fi. ermafr. anch' esso con una resta eguagliante quella del fi. infer. masc. — *Triest. ecc.*

251 *Gaudinia fragilis* β **filiformis (Albert,** 1900). — Spiga spesso lunga 3 dm. o più; spgt. non sporgenti dalle incavature della rachide (specialm. nel fresco), per cui la spiga risulta filiforme. Gluma super. lunga 2 $^1/_2$-3 volte l'infer. — *Cors. in più luoghi (Fouc. et Sim.) e certam. altrove.*

252 *Danthonia provincialis* **b. breviaristata Beck.** — Spgt. aperte, a reste lunghe appena $^1/_2$ volta la loro glumtt. e per lo più rivolte in fuori; culmi più rigidi, fogliosi sino in alto. — *Istria (Posp.).*

254 (2) *Spartina versicolor.* — *Nel lit. del Lazio anche a Torre di Foce Verde lungo il fosso di Mastro Pietro (Pappi ex Chiov.) e tra S. Severa e Civitavecchia (Chiov. e Pir.).*

258 *Eleusine indica.* — *Comunissima a Romano Lombardo (Rodegher), Camp. a Cassino (N. Terr.).*
β *coracana.* — *Inselvat. a Borgo S. Valentino nel basso Friuli (ex Posp.), una volta anche al Campo Marzio di Trieste (Marches.).*
γ *tristachya (Kunth)* = Cynosurus Lam. (1786) = E. oligostachya Lk. (1827) (cfr. Fl. An. I, p. 76 [var. γ]).

259 *Dactyloctenium aegyptiacum.* — *Torino presso la barriera del Colombaro (E. Ferrari!), lungo il litorale del Lazio in diversi luoghi (cfr. Chiov.*, in Malp. 1897, p. 110). — [Aggiungi all' area geograf. « *Austral* »].

261 (1) *Sesleria caerulea.* — *In Cors. sopra Furiani (Salis-Marschl.); trovasi benchè raram. anche nella reg. pad.*
a. **calcarea Celak.** (calcaria Asch. et Graeb.). — *È la for. comune.*
γ *argentea b. elongata (Host,* 1802). — Si sostituisca con: *b. autumnalis (F. Schultz,* 1861) = Phleum autumn. Scop. (1772).
c. **uliginosa (Opiz).** — Differisce dal tipo per avere la rd. orizzontale e quindi un cespuglio più lasso, le fg. convolte nel secco, più strette (2-3 mm.), bianco-pruinose all' epoca della fioritura, il culmo più alto (5-6 dm.) e la spiga ovato-rotonda. — *Presso Aquileja (Posp.).*

261* (1 bis) **S. insularis Somm.** (1905). — Intermedia tra *S. argentea* e *S. tenuifolia.* Dalla prima distinguesi soprattutto per la resta delle glume più lunga, pei fusti più bassi e più gracili, per le fg. più strette, deboli, convolte, liscie o quasi, uguaglianti i culmi; dalla seconda per la rd. stolonifera, per la pannocchia cilindrica più lunga (2 $^1/_2$-4 cm.), pel fusto foglioso sin oltre la metà, per le fg. non rigide e per le guaine non fibroso-reticolate. — *Sard. al Capo Figari (F.-Major) e nel Golfo degli Aranci (Gestro).*

Digitized by Google

262 (2) *S. tenuifolia* **b. interrupta** (Vis.). — Culmo ingrossato alla base. Fg. sottili, flaccide. Spiga a poche spgt. distanti. — *Triest. in luoghi ombrosi a S. Canziano ed Orleg* (*ex Marches.*).

c. juncifolia (**Suffren in Host**). — Fg. grosse, rigide, brevi. Spiga compatta, violacea. — *Triest. nei luoghi rocciosi assai aridi* (*ex Marches.*).

d. circeana Bég. (1897). — Fg. lineari, poco rigide, affatto glabre, mucronate, *lunghe, eguaglianti o superanti la spiga*, la quale è lunga 3-4 cm., lassa e spesso interrotta alla base. Spgt. un po' più lungam. pedicellate. — *Laz. al M. Circeo* (*Bég.*).

263 (3) *S. sphaerocephala*. — Spgt. bluastre (**a. caerulescens Rchb.**) o più spesso (**b. Wulfeniana Asch. et Graeb.** = Cynos. sphaer. v. Wulfen. Jacq. = S. leucocephala DC.) argentine.

264 (4) *S. microcephala* DC. (1805) = Cynosurus Hoffm. (1800). — Per ragione di priorità questo nome va sostituito con quello di: *S. ovata Kern.* (1882) = Cynosurus Hpe. (1799).

265 (5) *S. disticha* β *pedemontana*. — *Anche nelle Alpi Cozie.*

266 *Triodia decumbens*. — *Elba* (*Somm.*); *vive anche nella reg. pad. come nel Mantov., Polesine a Taglio di Po (Bolzon) e Veneziano.*

267 *Diplachne serotina*. — *Murge di Terra di Bari* (*Palanza*).

268 *Molinia caerulea* — *Cors. a Gravone* (*E. Petit*).

Si possono distinguere le seguenti forme:

A Glumtt. lunghe 3-4 mm., ottuse. Rd. cespugliosa.

α **typica.** — Pianta alta sino a 9 dm., a fg. larghe 3-8 mm., a pannocchia lassa, a rami eretti e molte spgt. bluastro-plumbee od un po' violette, ovvero (**b. viridiflora Lejeune**) verdastre o giallastre. — *Nell'area della spec.*

β **depauperata** (**Lindl.**). — Pianta alta circa 2 dm., a fg. larghe circa 3-6 mm., e pannocchia contratta, spiciforme, a poche spgt. brunastre. — *Nelle Alpi.*

γ *arundinacea* (cfr. for. b. in Fl. An. I, p. 78). — Pianta alta sino a 15 dm., a fg. larghe sino a 9 mm., a pannocchia ampia, a rami eretto-patenti e spgt. verdastre. — *Nei luoghi ombrosi.*

B Glumtt. lunghe sino a 6 mm., gradatam. ristrette in un mucrone acuto. Rd. spesso strisciante.

δ **litoralis** (**Host**) = M. altissima Lk. — Pianta alta e robusta come la var. γ, a spgt. per lo più scure. — *Basso Friuli e basso Goriz.* (*Posp.*), *Triest. ad Obrou* (*Marches.*), *Istria a Parenzo* (*Calegari in litt.*) *ecc.*

Gen. Koeleria. Vedi: *C. Domin*, Fragmente zu einer Monographie der Gatt. Koeleria (Magyar Bot. Lapok, 1904).

269 (1) *K. pubescens* **a. genuina.** — Glume acute, peloso-ispide; glumtt. infer. con resta sporgente.

b. Barrelieri (**Ten.**, 1831) = Phalaris Ten. (1824-29). — Glume ottuse, peloso-ispide ed inoltre densam. pubescenti; glumtt. infer. mutica o con resta breve, non sporgente dalle glume. — *Nap.*, *Ischia ecc.*

271 (3) *K. phleoides* **a. pubiflora Trautv.** — Glumtt. infer. villosa.

b. glabriflora Trautv. (1881) = v. glabra Marches. (1897). — Spgt. interam. glabre. — *Trieste* (*Marches.*), *Palermo (Tod. ex Domin* l. c., p. 338).

c. laxa (**Lk.**, 1827) = v. robusta Borb. 1884 = v. lobulata Hausskn. (1900). — Pianta più robusta, a pannocchia più ampia, lassa e spesso lobulata (lunga 1 dm. e larga 1 cm. alla base). — *Istria* (*Posp.*), *Lig.* (*Bickn. ex Domin*) *ecc.*

d. condensata (**Boiss. et Bl.**) **for. submutica Domin.** (l. c., p. 337). — *Cal. presso Reggio* (*Rigo*).

272 (4) *K. vallesiana Asch. et Graeb.* = Aira All. (1789) = K. tuberosa Pers. (1805), Lois. (1806-7) = K. tuber. v. setacea Pers. (1805) = K. valesiaca Gaud. (1811) = K. setacea Gr. et Godr. (1856) (Fl. An. I, p. 79). — *Alpi vicent. presso la malga Melegnone sul M. Toraro (Vasolin); la pianta dell'Avellinese a Piano Laceno* (*Ca-*

Digitized by Google

sali e Ferraris) indicata come K. setacea è invece la K. splendens (!). [*Aggiungi all'area geograf.* « *Algeria* »].

b. *pubescens Domin* = K. set. v. pubescens Parl. (Fl. An. l. c.).

β *alpicola* (*Gr. et Godr.*) *Asch. et Gr.* (Fl. An. l. c.).

274 (6) *K. cristata* α **ciliata (Kern.,** 1878) **Asch. et Graeb.** (1900).

b. **pyramidata Pers.** (1805) = Poa Lam. (1791) = K. cristata γ major Koch (1844). — Pianta alta sino a 6 dm., a pannocchia lunga circa 15 cm., lobata ed a spgt. lunghe 8-9 mm. — *Da ricercarsi.*

c. **pubescens Hausm. in Pacher** (1880) (**Dalla Torre,** 1882) (*Domin* l. c., p. 256). — *Tirolo.*

d. **rigidiuscula Domin** (1903) et in l. c., p. 257. — *Tir. nella valle d'Ampezzo* (*Domin*).

β **montana Hausm.** (1852) (**Dalla Torre,** 1882) (non Asch. et Graeb.) (Domin l. c., p. 257). — *Alpi tirol. e Trentino in Fiemme* (*Gelmi*); *forse da riferirsi qui la K. glauca del Friuli?*

γ **gracilis (Pers.)** = Poa nitida Lam. (Domin l. c., p. 265) **a. lanata** et **b. glabrescens Domin** (l. c.). — *Istria, Trentino e Moden. lungo il Panaro a S. Cesario (ex Domin).*

c. **latifolia Domin** (l. c., p. 269) = K. pseudoglauca Borb. (non Schur). — *Presso Trento* (*Murr*).

d. **cenisia Domin** (l. c., p. 346). — *M. Cenisio* (*Cesati*).

e. **aurea Posp.** (Fl. des Oest. Küstenl. I, p. 93 [1897]). — *Istria nel Canal di Leme e presso Rozzo e Pisino* (*Posp.*).

f. **dactyloides Posp.** (l. c.) = K. cristata Rchb. Ic. XI, fig. 1670 *b*. — *Basso Friuli ed Istria* (*Posp.*).

δ *splendens* (*Presl*, 1820) = K. grandiflora Bert. (1824) (var. β Fl. An. I, p. 80). — *Istria, Veron., Lig., Tosc., It. centr. e mer., Sic. e Sard.*

b. **pyramidata Domin** (l. c., p. 277). — *Istria presso Abbazia (Degen) e Sic. a Busambra* (*Todaro*).

c. **pseudorigidula Domin** (l. c., p. 279). — *Istria a Pola* (*Freyn sub K. crassipes*).

d. **subcaudata Asch. et Graeb** (Syn. II, 1, p. 360). — *Istria.*

subfor. pseudogracilis Domin (l. c., p. 280). — *Veneto (Rigo).*

e. **caudata (Steud.,** 1855) = Airochloa caud. Lk. (1843) = K. crassipes Lge. (1860) Cfr. Asch. e Graeb. Syn. II, 1, p. 360. — *Pare sia propria della Spa. soltanto.*

f. **canescens Asch. et Graeb.** = K. crist. β canesc. Vis. (1842) = K. grandifl. b. hirtella Parl. (1848) = K. australis Kern. (1867) = K. crassipes β velutina Freyn (1877 = K. crist. β cinerea Goir. p. p. = K. crist. δ canesc. Fiori p. p. (Fl. An. I, p. 80) Cfr. Asch. et Graeb. l. c., p. 361 e Domin l. c., p. 280. — *Istria, Trevig. sul M. Grappa* (*Bolzon*), *Bellunese* (*Tanfani*), *Veron.* (*Goir.*, *Massalongo*, *Rigo*), *Lig. a Sestri Ponente (DNtrs. ex Parl.) ed Abr. al M. Corno* (*Orsini*).

ε **carniolica (Kern.,** 1867) = K. crist. β cinerea Goir p. p. = K. crist δ canesc. Fiori p. p. (Fl. An. I, p. 80) = K. eriostachya v. carniol. Domin (l. c., p. 261). (La vera *K. eriostachya Panc.* è propria, sec. Domin, solo della Carniola, Carinzia, Serbia e Bulgaria). — *Veron. sul M. Baldo* (*Hack.*, *Engler*) *e sui Lessini a Campegna, Malera e Revolto* (*Rigo e Domin*), *Tir. a Bolzano* (*Heufler*); *l'indicazione del Carso* (*Posp.*) *sec. Asch. e Graeb. merita conferma.*

ζ *glauca* (*DC.*, 1813) = Poa Schkuhr (1799) (cfr. var. γ Fl. An. I, p. 80). — *È dubbio se realm. esista in Italia.*

276 (1) *Cynosurus cristatus.* — *Cors. a Serra di Pigno tra 700 e 900 m.* (*Briq.*).

277 (2) *C. echinatus* **b. foliosus Bolzon.** — Fg. super. inserita alla base della pannocchia. — *Euganei al M. Lozzo* (*Bolzon*).

278 (3) *C. elegans.* — *Talora anche nella reg. subalp. come nel M. Cocuzzo in Cal. da 1100 a 1400 m.* (*Adr. Fiori*).

Digitized by Google

β *gracilis* (*Viv.*) = Cyn. fertilis De Lens = Cyn. Pouzolzii Req. hb. ex Somm. — Simile al *C. paradoxus* in quanto alla gracilità ed alla forma della pannocchia, ma presenta delle spgtt. sterili, le quali però sono meno numerose che nel tipo e ne differiscono per le squame in minor numero, più strette, più molli, non divaricate, le super. non dilatato-ovate alla base, sicchè tutta la spgtt. sterile in luogo di essere pettiniforme e di allargarsi in alto, si restringe dal basso all'alto in forma di pennello. — *Laz. ad Aricia, Albano e Castelgandolfo, Sard. e Cors.*

278 * (3 bis) **Cynosurus paradoxus Sommier** in Bull. soc. bot. it. 1902, p. 208, sub Chrysuro. — Differisce dal *C. elegans* per la gracilità di tutta la pianta, per la pannocchia verdeggiante, povera, lassa, lineare-oblunga ed a rami infer. appressati (non ovato-triangolare nè a rami patenti come nel *C. elegans* e *soprattutto per la mancanza di spgtt. sterili*, benchè talora abbia una squama sterile sotto le glume che può ritenersi come un accenno alle spgtt. sterili delle altre spec. — *Isola del Giglio nella Valle della Botte* (*Varchesa L. Doria ex Somm.*), *Sard.* (*Moris ex Somm.*) *e precisam. al M. Sacro di Pula (Gennari ex Somm.).*

279 * **Schismus calycinus (L.) Coss. et Dur.** = Festuca L. = S. marginatus P. B. — *Cors. all'imboccatura del Liamone* (*Coste*) *; forse importato* (*Adr. Fiori).*

282 (1) *Eragrostis poaeoides* β *megastachya.* — A questa pianta deve essere riferita la *Poa cilianensis All.*, che non è altro che uno stato a pannocchie non bene sviluppate (*Vignolo- Lutati* in Malpighia, 1904).

283 (2) *E. pilosa* **a. genuina.** — Pannocchia eretta, a rami infer. solitari od appaiati, spesso patenti; spgtt. lunghe 5 mm. e per lo più con 6 paia di fi.

b. verticillata P. B. = Poa Cav. — Pannocchia coll'apice inclinato, a rami semiverticillati a 3-5, generalm. eretti; spgtt. lunghe 3 mm. e con 3 paia di fi. — *Col tipo.*

285 (2) *Melica ciliata* γ *nebrodensis* **a. Parlatorei Asch. et Graeb.** Syn. II, 1, p. 346.

288 (5) *M. nutans* β **picta (C. Koch).** — Spgtt. più brevi (4 mm.), a glume più tenere e scolorate, e glumtt. bianche, lucide e quasi liscie (non bianco-verdiccie e manifestam. punteggiato-ruvide come nel tipo). — *Reg. Giulia* (*Posp.*)*; ma assai dubbia.*

290 (1) *Briza media.* — *Malta (Delicata)* (*?*).

b. lutescens (Fouc. in Desv.) Lej. — Spgt. pallide, giallognole. — *Colli di Vittorio nel Trevigiano* (*Pampan.*).

292 (3) *B. maxima* **c. rubra (Lam.).** — Glume (e talora anche le glumtt.) rosso-scure col margine bianchiccio. — *Rara.*

294 *Dactylis glomerata a typ.* **b. flavescens Schröter** (1893). — Spgt. verdi-giallastre. — *C. Ticino al M. Ceneroso (Schröter).*

c. abbreviata (Bernh.). — Forma xerofila ridotta, a pannocchia raccorciata a mo' di spiga (però a fg. verdi e non glauche e così strette e rigide come nella var. *hispanica*). — *Col tipo.*

d. Hackelii Asch. et Graeb. (Syn. II, 1, p. 380) = D. hisp. β maritima Hack. (1880) (non D. glom. γ mar. Hallier, 1863). — *Cors, presso Calvi nelle scogliere mar.* (*Mand. et Fouc.*).

for. montana N. Terr. (1889). — *Cal. al M. Pollino da 1782 a 1800 m.* (*N. Terr.*).

295 (1) *Poa alpina.* — *Basil. sul Vulture* (*N. Terr.*), *Cal citer. al M. Cozzo del Pellegrino presso S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

α *typ.* **b. minor Hpe.** — *C. Ticino alla Bocchetta di Porcareccio e M. Generoso* (*Chenev.*).

c. brevifolia (DC.) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 397). — *Nelle Alpi.*

for. australis N. Terr. (1889). — *Cal. presso Castrovillari alla Pietà a m. 456* (*N. Terr.*).

for. glaucescens Posp. (an Beck?). — Culmo e fg. più gracili, glaucescenti; pannocchia più lassa, a spgt. verdognole. — *Reg. illirica presso Otelca e Dol* (*Posp.*).

for. Jolleri Chiovenda. — Distinguesi per le innovazioni lassam. cespugliose, per lo più estravaginali, arcuato-prostrate e pei fioretti con poca lana. — *Sempione.*

for. mucronulata N. Terr. (1889). — *M. Pollino alla Scala di Gaudolino da 1200 a 2271 m.* (*N. Terr.*).

Digitized by Google

δ *pumila*. — *Reg. illirica sui M. Nanos, Slavnik e M. Maggiore* (*ex Posp.*).

ε **exigua** (**Fouc. et Mand. in Husnot.** [1899]) (non Dum.) — Pianta di 1-5 cm. Fg. brevi, piane, acute o subacute; ligula breve, troncata. Pannocchia molto ridotta, a rami più brevi della spgt., a 2-8 spgt., con 4-8 fi. glabri. Glumtt. infer. a nervi salienti, ottuso-arrotondata e rosicchiata all'apice. — *Cors. sul M. Rotondo presso le nevi fondenti (Fouc. et Mand., Briq.) ed al M. Renoso a 1800-2000 m.* (*Briq.*).

295 * **P. alpina** × **caesia? Asch. et Graeb.** (Syn. II, 1, p. 419) = P. alpina v. intermedia Ambrosi = P. sclerocalamos Facch. — *Trent. in Val di Fassa* (*Facch.*).

296 (**2**) *P. bulbosa* α *typ.* **b.** *vivipara Koeler* (1802) (Mazziari, 1834) = P. crispa Thuill. (1791) = P. prolifera Schmidt (1791).

c. pseudoconcinna (**Schur**) — *Sard. al Gennargentu* (*Lovisato* ex Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 393).

for. calabra N. Terr. (1889). — *Cal. a M. S. Angelo presso Castrovillari* (*N. Terr.*).

for. ciliaris N. Terr. (1889). — *Cal nel Piano di m. Pollino* (*N. Terr.*).

β *concinna*. — *Istria (Asch. et Graeb)*.

297 (**3**) *P. annua* β **exilis Tomm. in Freyn.** (1877) (**Murbeck** in Asch. et Graeb. 1900) = v. remotiflora Hack. (1879). — *Ital. media e mer.* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 389-90).

b. Tommasinii Asch. et Graeb. (l. c., p. 390). — *Istria mer. (Tomm., Freyn, Marches.).*

var. campana Terr. N. (Atti Acc. Sc. Fis. e Mat., Napoli 1891). — *Laz. a Fondi (Terr.).*

298 (**4**) *P. laxa*. — *Abr. alla Majella* (*Ten.*).

b. *pallescens Koch* (1844) = v. flavescens Parl. (1848), *Fiori* in Fl. An. I, p. 86.

c. pauciflora Parl. — Pannocchia povera, a spgt. quasi tutte solitarie. — *Comasco sul M. Legnone* (*Parl.*).

d. conferta Parl. — Pannocchia addensata, breve; fg. strettissime; culmo breve, radicante alla base. — *M. Bianco* (*Parl.*).

299 (**5**) *P. violacea* β *breunia Richter* (1890), *Fiori* (1896).

γ **nebrodensis Asch. et Graeb.** (Syn. II, 1, p. 435) = Festuca Jan. (1826). — Pianta bassa, a culmi sottili, pieghevoli, alti circa 15 cm. Fg. filiformi. Pannocchia lunga sino ad 8 cm., stretta, a rami con 4 spgt. al più; queste piccole, 2-3 flore. — *Nei luoghi asciutti col tipo.*

δ **aetnensis** (**Guss.**, 1827) = Festuca Presl (1820). — Culmi rigidi, eretti. Fg. rigide. Pannocchia stretta, quasi spiciforme. — *Sic. sull'Etna.*

300 (**6**) *P. nemoralis* α *typ.* **b.** *glauca Gaud.* (1811) (*DC., 1815*) (an With.?).

c. *montana Gaud., Koch.* (non P. montana All., quae, sec. Asch. et Graeb., for. P. nemoralis sed dubia).

d. tenella Rchb. (1834). — *C. Ticino a Fusio* (*Chenev.*), *Regione illirica* (*Posp.*) *ecc.*

e. agrostoides Asch. et Graeb. (1900). — *C. Ticino a Bignasco e M. Generoso* (*Chenev.*).

β *uniflora M. et K.* (1823) = v. subuniflora Rchb. (1834).

γ *Balbisii (Parl.*, 1848). — Per ragione di priorità deve adottarsi il nome di: γ *capitata* (*Asch. et Graeb.*, 1900) = Festuca Balb. (1827), benchè improprio.

δ *firmula* **b.** *rigidula M. et K.* (1823), *Koch* (1844).

c. coarctata (**Hall. f.** [1810], **DC.** [1815]), **Gaud.** 1811. — *Nell'area della spec.*

ζ *caesia*. — *Bellunese sulla Punta Poina, a m. 2250, sopra S. Vito del Cadore* (*Pampan. ex Bolzon*), *M. Baldo (Poir.), C. Ticino a Lucomagno* (*Keller*).

301 (**7**) *P. palustris*. — Aggiungi nell'habitat «*dalla reg. pad. alla mont.*».

a. genuina. — Spgt. a 5 fi., lunghe 4 mm., di un verde-bluastro-scuro, in pianta di circa 1 m., a pannocchia ampia spesso inclinata.

b. fertilis (**Host**). — Spgt. a 2-3 fi., lunghe 2 mm., verdi-chiare, in pianta di 4-6 dm., a pannocchia piccola ed eretta. — *Reg. Illirica (Posp.).*

303 (**9**) *Poa compressa*. — Aggiungi la reg. bot. nell'habitat «*dal mare alla reg. subalp.*».

c. umbrosa Beck. — For. nemorale affine alla *b. Langeana*. — *Colli Euganei sul Venda* (*Bég.*), *Reg. illirica* (*Posp.*) *ecc.*

Digitized by Google

d. muralis (Wib.). — For. xerofila, ridotta. — *Colli Euganei (Bég.).*

304 (10) *P. Chaixi.* — *Alpi vicent. sulla cima Campomolon (Vasolin).*

β *hybrida.* — *Valle del Sestajone presso Boscolungo (Levier).*

305 (11) *P. pratensis* α *typ.* **b**[1] **strigosa (Hoffm., 1800) Gaud.** (1811) = P. Nymani Tin. in Guss. (1844) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 432). — *Etna a Nicolosi (Tin.).*

d. latifolia Weihe (1823), **Koch.** p. p. (1837) cfr. Asch. et Graeb. l. c.). — *Col tipo.*

β *anceps.* — *Reg. Illirica a Sagrado (Posp.).*

γ *attica (Boiss. et Heldr.) Boiss.* — In generale fu confusa con questa pianta (considerata dal Boissier stesso [Fl. Or. V, p. 601] come var. di *P. pratensis*) la *P. trivialis v. silvicola* (vedi sotto) ed è quindi molto incerto se essa si trovi realm. in Italia.

306 (12) *P. trivialis* α *typ.* **b. effusa Asch. et Graeb.** — *C. Ticino a Ravin di Vergeletto (Chenev.).*

β *silvicola (Guss.)* = P. attica Freyn, Arc., Haussk., Asch. et Graeb. ecc. (non Boiss. et Heldr.) = P. pollinensis N. Terr. = P. pratensis γ attica Fiori in Fl. An. I, p. 88. — Rz. strisciante, con stoloni muniti di ingrossamenti moniliformi, bianchi. Linguetta spesso più breve che nel tipo. Spgt. verdastre od anche (**b. versicolor Haussk.** [1900] = v. violascens Halacsy [1904]) screziate di violaceo. — *Istria e Pen. dalla Lig. e Faentino in giù ed Ischia.*

γ **multiflora Rchb.** (1834). — A questa var. (propria della Slesia ed Austria infer.) è riferita da Asch. e Graeb. (Syn. II, 1, p. 427) la *P. pollinensis N. Terr.* del M. Pollino in Cal.; a noi pare invece sia da riferirsi alla *P. silvicola.*

307 (1) *Glyceria fluitans* α *typica* **b. triticea Fr.** — Pannocchia racemosa, a rami solitari, brevi, portanti 1 sola spgt. con 5-7 fi. — *Goriz. ad Umago ed Isola (Posp.).*

308 (2) *G. aquatica.* — *Avellinese in più luoghi (Casale e Gussone, Casali e Ferraris), Malta (Delicata).*

309 (3) *G. distans* α *typica.* — La for. genuina non si troverebbe da noi (Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 455).

d. *maritima (Wahlb.* [1820], *M. et K.* [1823]) = Festuca thalassica Kunth. — Sec. Asch. et Graeb. l. c. p. 457) la pianta ritenuta per *G. marit.* nelle nostre flore è invece una entità diversa: cioè la **Gl. pseudo-distans Crép.** (1865) = Festuca Asch. et Graeb. (1900).

ε *festucaeformis.* — *Elba (Sommier).*

Gen. Festuca. — Vedi: *Hackel E.*, Mon. Festucarum europaearum, Kassel und Berlin 1882. — *Belli S.*, le Festuche ital. negli erbari del R. Ist. bot. di Torino. Malpighia 1900.

310 (1) *Festuca ovina* α *capillata (Lam.) Hack.* = F. ovina c. mutica Parl. (Fl. An. I, p. 90, var. α a). — *It. bor., A. Apuane ed Appenn. lucchese (Hack.), It. bor. e centr. (Parl.), Piem. e Comasco (ex Belli).*

β *vulgaris Koch, Hack.* (Fl. An. l. c., var. α b) **a. genuina.** — *Non esisterebbe al di qua delle Alpi (Hack); Colli di Torino ed Appen. piceno a M. Pizzo (ex Belli).*

b. *pubescens Parl.* (1848) = F. sciaphila Schur (1866) = F. ov. var. vulg. subvar. hispidula Hack. (1882) (Fl. An. l. c., var. α c.). — *Lago Sebino (Parl.), M. Cenisio ed Alpi Mar. a Tenda (ex Belli).*

c. levifolia Hack. — *Piem. presso Torino e Susa e Piceno a M. Pizzo (ex Belli).*

d. Lemani (Bast.) = F. ov. var. vulg. subvar. firmula Hack. — *Lig. tra Cogoleto e Varazze, Alpi Cozie a Susa e Fenestrelle (ex Belli).*

δ duriuscula (L.) Hack. (cfr. Fl. An. l. c., var β) **a. genuina.** — *Ital. super. e media (ex Hack.).*

subfor. curvula (Gaud.). — *Istria (Hack.), Alpi Mar. al Col di Tenda (ex Belli).*

subfor. longearistata Hack. — *Piem. (Hack.).*

b. gracilior Hack. (1882). — *Alpi Mar. ed Appen. pisano (sic!) (Hack.), Alpi piem. e lig. ed Appenn. Reggiano a Civago (ex Belli), Veronese (Goir.).*

c. villosa M. et K., Hack. = F. ov. β villosa Schrad. = F. duriusc. b. vulg. pube-

Digitized by Google

scens Parl. — *Nell'area della var. duriuscula* (*Hack.*), *Alpi Cozie e Lig. (ex Belli)*, *Veronese* (*Goir.*).

d. **trachyphylla Hack.** — *Presso Colico, Lanzo Torinese e Pegli (ex Belli), Lago di Garda a Riva* (*Hack.*), *rarissima nel Veron. sul M. Baldo e nei Lessini* (*Goir.*).

e. **pubescens Hack.** — *Alpi Mar. e Cozie* (*ex Belli*).

f. **robusta Hack.** — *Tosc. al M. Ferrato presso Prato* (*Hack.*).

g. **crassifolia Hack.** = F. glauca γ crassifol. Gaud. — *C. Ticino* (*Hack.*), *Alpi Cozie e Mar.* (*ex Hack. et Belli*).

subfor. levigata (Clairv.). — *Abr. al M. Morrone (ex Hack.).*

subfor. longifolia (Viv.) Parl. = F. ov. var. duriusc. η crassifolia for. longifol. Hack. — *Lig. a Portofino* (*Viv.*), *Piem. a Susa* (*Belli*).

subfor. ciliolata Hack. — *Alpi Cozie e Mar. e Lig. presso Pegli (ex Belli).*

subfor. subhirsuta Hack. in Belli. — *Alpi Cozie al Frejus* (*ex Belli*).

h. **flaccida Belli** — *Alpi Mar. al Colle di Tenda ed a Valdieri ed Appenn. piceno a M. Fortino* (*ex Belli*).

i. **breviseta Belli** — *Alpi Cozie a Susa alle Blaccie* (*ex Belli*).

γ **supina (Schur) Hack.** — *Valtellina sul M. Braulio* (*ex Belli*).

b. **vivipara (Sm.) Hack.** = F. ovina β vivipara L., Parl. = F. duriuscula ε Bert. — *Dintorni di Bologna (Monti ex Bert.), Trent. in Fassa* (*Facchini ex Bert.*).

ε *glauca* (*Lam.*) (Fl. An. l. c., var. β b.) **a. genuina.** — *Eur. occ.* (*Hack.*), *Alpi Cozie in Val Macra ed a Montechiaro d'Acqui* (*ex Belli*).

b. *cinerea* (*Vill.*) (Fl. An. l. c., var. β c.). — *Notata sinora soltanto del Delfinato* (*Vill.*, *Hack.*).

c. **pallens (Host).** — *Alpi ed Appen. bor. e Nap. nei M. di Castellamare* (*Hack.*), *Piem.* (*ex Belli*), *Veronese* (*Goir.*).

d. **inops (DNtrs.)** = F. duriusc. d. submutica Parl. — *Val d'Aosta* (*ex Belli*), *Lig. a Sestri ponente, dintorni di Firenze e M. Ferrato presso Prato* (*ex Hack.*).

e. **taurinensis Hack. in Belli** — *Prov. di Torino a M. Musinè* (*ex Belli*).

ζ **vaginata (W. et K.)** = F. ovina η amethystina Koch (non F. amethyst. L.). — *Appenn. pavese a Sotto Fabbrica tra Ottone ed Orezoli* (*Farneti*).

η *valesiaca* (*Schl.*) *Koch* (Fl. An. l. c., var. γ). — *Istria ed It. bor. lungo le Alpi* (*Hack.*, *Belli*).

θ *pseudovina* (*Hack.* in Wiesb., 1880), *Hack.* (1882) (Fl. An. l. c., var. γ c.). **a. parviflora Asch. et Graeb.** = F. duriusc. a. parvifl. Hack. (1878) = F. pseudov. β typica Hack. (1882). — *Torino a M. Musinè* (*ex Belli*).

b. **angustiflora Hack.** — *Istria* (*ex Hack.*), *Torino alla Venaria Reale* (*ex Belli*).

ι *sulcata* (*Hack.*, 1881), *Hack.* (1882) (Fl. An. l. c., var. γ b.), **a. genuina.** — *Istria, Triest., M. Baldo, Trent. e Tir. mer.* (*ex Hack.*).

b. **rupicola (Heuff.,** 1858) = F. sulc. β barbulata Hack. (1882). — *M. Baldo* (*Goir.*).

c. **hirsuta (Host).** — *M. Baldo* (*Goir.*).

d. **hispida Hack.** (1882). — *Veronese* (*Goir.*).

e. **glaucantha Hack.** (1882). — *Veronese* (*Goir.*).

f. **saxatilis (Schur) Hack.** — *M. Baldo* (*Hack.*), *Veronese* (*Goir.*).

κ **stricta (Host).** — *Goriziano* (*ex Posp.*).

λ *levis* (*Hack.*, 1881), *Hack.* (1882) (Fl. An. I, p. 91, var. δ b.) **a. genuina.** — *Appenn. e monti di Sic.* (*ex Hack. et Belli*).

b. **villosula Hack.** — *M. Baldo* (*ex Belli*), *M. S. Angelo di Stabia* (*ex Hack.*).

c. **gracilis Hack.** — *Sic. alle Madonie e Nebrodi* (*ex Hack.*).

d. **campana Hack.** = F. duriusc. c. campana N. Terr. — *Campania a Nola e Sora* (*Terr.*) *e Gargano* (*Guss. ex Hack.*).

μ **stenantha Hack. (Nym.).** — *Friuli presso Venzone e Cividale* (*ex Hack.*), *Goriziano* (*Posp.*).

Digitized by Google

ν *dura* (*Host.*) (Fl. An. l. c., var. δ). — *Alpi or. e Valtellina a Bormio* (*ex Hack.*), *Appenn. pavese* (*Farneti*), *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

ξ *Halleri* (*All.*) (Fl. An. l. c., var. ε). — *Alpi occ.*, *Valtell.*, *Appenn. abr. e Cors.* (*ex Hack.*).

o **pedemontana Hack. et Belli** in Belli l. c. — *Alpi Mar.* (*ex Belli*).

b. glaucescens Hack. et Belli in Belli l. c. — *Alpi Mar. nel territ. di Mondovì* (*ex Belli*).

c. planifolia Belli l. c. — *Alpi Mar. a Limone* (*ex Belli*).

π **rupicaprina Hack. (Richt.)** = F. ovina v. alpina Neilr., non Koch. — *Reg. illirica sul M. Golak* (*Posp.*), *Valtell. al M. Braulio*, *Alpi di Bugnanco*, *Val Sesia all' Ospizio di Valdobbia*, *Val d' Aosta ed Appenn. pic. alla Sibilla* (*ex Belli*); *sempre sul calcare* (*Hack.*).

ρ *alpina* (*Suter*) (Fl. An. l. c., var. ζ). — *Qua e là nelle Alpi* (*cfr. Hack. et Belli*) *ed Appenn. pic. al Vettore* (*ex Hack.*), *Cal al M. Pollino* (*N. Terr.*).

σ *Morisiana* (*Parl.*) (Fl. An. l. c., var. θ). — *Sard. al Gennargentu e M. di Aritzo.*

var. pseudo-varia Volkart ap. Chenev. (Bull. herb. Boiss. 1903, p. 449). — *C. Ticino* (*ubi?*) (*Chenev.*).

310 * Festuca bergomensis Rota (Prosp. Fl. prov. di Bergamo, p. 103 [1853]). — *Tra le fessure delle rupi marnose a Villongo*, *Adrara e Foresto nel Bergamasco* (*Rota*).

311 (2) *Festuca rubra* α *typica* **a.** *vulgaris Hack.* — *In tutta la Pen.*, *Istria*, *Sic.*, *isola di Nisida nel golfo di Napoli* (*Bég.*) *e Cors. alla Serra di Pigno a 600-900 m.* (*Briq.*).

b. *megastachys Gaud.* (1828) (non F. megastachys Heg. et Heer. [1840]) = F. rubra v. grandiflora Hack. (1882) = v. macrantha Richt. (1890) (Fl. An. I, p. 91, var. α d.). — *Qua e là col tipo* (*Hack.*), *Alpi piem. e M. Cimone nell' Appenn. moden.* (*ex Belli*).

subfor. alpina Parl. (sub F. rubra). — *Appenn. tosco-moden. alle Tre Potenze* (*Parl.*), *M. Cenisio* (*Hack.*).

c. *glaucescens* (*Heg. et Heer*) (Fl. An. l. c., var. α e.). — *Alpi Mar. ed a Voltaggio in Lig.* (*ex Belli*).

d. *juncea Hack.*, *Gremli* (Fl. An. l. c., var. α f.). — *Piem. e Moden. tra Barigazzo e Montefiorino* (*ex Belli*).

e. *barbata* (*Schrank*) = F. rubra dumetorum Gaud. = F. rubra α typ. g. dumet. Fiori Fl. An. I, p. 91 (non F. dumet. L. [1]). — *Qua e là col tipo* (*Hack.*).

f. rigidior Belli l. c. — *Alpi Cozie al Frejus* (*ex Belli*).

β **multiflora (Hoffm.) a. genuina** = F. megastachys Heg. et Heer. = F. rubra v. planifolia α typ. Hack. — *Alpi Mar. nelle Valli Valdesi* (*ex Hack.*), *Colli di Torino*, *Bussoleno e lungo il Ticino* (*ex Belli*).

b. *planifolia Trautv.* (sub F. rubra) (Fl. An. l. c., var. α c.) = F. rubra v. planif. γ villiflora Hack. — *Lago del Moncenisio* (*ex Belli*).

γ *trichophylla* (*Ducr. in Gaud.*) (Fl.An. l. c., var. α b.). — *Da ricercarsi; propria della Svizz. e Delfin.* (*ex Hack.*).

b. uliginosa Hack. = F. rubra v. ulig. Schur. — *Istria a Pola* (*ex Hack.*).

δ *fallax* (*Thuill.*) (Fl. An. l. c., var. α h.) **a. vulgaris Hack. ap. Belli** l. c. — *Alpi* (*ex Hack. et Belli*) *e Camp. al Matese* (*ex Hack.*).

b. glaucescens Hack. ap. Belli l. c. — *Piem. a Pinerolo* (*ex Belli*).

c. nigrescens (Lam.) = F. alpestris Wulf. — *M. Cenisio* (*ex Belli*), *Cal. sopra Gerace* (*ex Hack.*).

d. scabra Hack. ap. Hervier (1885). — *Lig. presso Pegli ed Alpi Mar. a Vinadio* (*ex Belli*).

e. barbata Hack. ex Belli l. c. — *Val d' Aosta in val di Gressoney* (*ex Belli*).

---

1) La *F. dumetorum L.* è un' altra var. della F. rubra propria del lit. dell' Atlantico.

Digitized by Google

f. **juncea Belli** l. c. — *Alpi piem. a Lanzo* (*ex Belli*).
g. **coleotricha Belli** l. c. — *Lig. a Pegli alla Madonna della Guardia* (*ex Belli*).
ε *heterophylla* (*Lam.*) (Fl. An. I, p. 91, var. β) **a. genuina.** — *It. pen. e Sic.* (*ex Hack.*), *Piem.*, *Lig. e Tosc.* (*ex Belli*), *Elba* (*Somm.*).
b. **lejophylla Hack.** — *Piem.*, *Comasco*, *Appenn. moden. e Cors.* (*ex Belli*).
c. **vulpioides (Schur).** — *Colli di Torino e Piceno a Montefortino* (*ex Belli*).
d. **puberula Parl.** — *Basilicata* (*Casp. ex Parl.*).
e. **balearica (Guatt. in Roem.).** — *Italia* (*ex Richter*).
f. **vivipara Parl.** — *Sopra Genova* (*ex Parl.*).
ζ **violacea (Schl. ap. Gaud.)** (Fl. An. l. c., var. γ) **a. genuina.** — *Alpi ed Appenn. sino al Nap.* (*ex Hack.*), *Avellinese al M. Cervalto* (*Casali e Ferraris*) *e Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*, *Adr. Fiori*).
b. *Tuccinellii* (*Parl.*) (Fl. An. l. c., var. δ). — L' *Hackel* ne fa un sinonimo della var. *violacea genuina.* — *Alpi Apuane ed Appenn. tosco-em.* (*Parl.*).
subfor. *mutinensis Hack. in Belli* (1889, uti var. F. rubrae) (Fl. An. l. c., var. δ b.). — *Appenn. moden. a Serrabassa* (*ex Belli*) *e pavese sopra Ottone e M. Penice* (*Farneti*).
c. **carnica Hack.** = F. viol. α minor Hack. — *Alpi ven. nella valle del Celline* (*ex Hack.*).
d. *aurata* (*Gaud.*) (Fl. An. l. c., var. γ b.). — *Raram. colla for. genuina.*
e. **flaccida (Schur).** — *Alpi Cozie al Frejus* (*ex Belli*).
η *nigricans* (*Schl.*) (Fl. An. l. c., var. ε) a. *genuina.* — *Alpi specialm. occ.* (*ex Hack.*), *Appenn. moden. alle Tre Potenze* (*ex Belli*).
b. *pubescens Asch. et Graeb.* = F. nigrescens b. pubesc. Parl. = F. nigrescens β Gaud. — *Valtellina* (*ex Parl.*).
θ **norica Hack. (Richt.).** — *Trent. e Tir. mer.* (*ex Hack. et Belli*).
ι **Longana Hack. et Belli** in Belli l. c. — *Valtellina al M. Braulio* (*Longa*).

312 (3) *Festuca gigantea.* — *Istria nel territ. di Parenzo* (*Calegari*), *Cors. nella foresta di Marmano* (*Rotgès ex Fouc.*).

313 (4) *F. elatior* α *pratensis* (*Huds.*) **a. genuina.** — *Nella Pen. al nord e negli Appenn.* (*ex Hack.*), *Sard. a Tempio* (*Reverch.*, *Nicotra*).
b. **subspicata G. F. W. Meyer** (1836) (sub F. elatior) = F. prat. v. pseudo-loliacea Fr. (1846). — *Nell'area della for. genuina* (*Hack.*), *Veronese* (*Goir.*), *C. Ticino a Ponte Brolla* (*Chenev.*), *Reg. illirica* (*Posp.*).
c. **drepanensis Ponzo** (1900). — Pannocchia allungata, lassa. Spgt. per lo più a 5-8 fi., avvicinati; glume con resta breve. Intermedia tra le v. *pratensis* e *pluriflora.* — *Trapani presso il litorale* (*Herb. pan. ex Ponzo*).
β *pluriflora* (*Schult.*, *Guss.*) = F. multiflora Presl. (Fl. An. I, p. 92, var. α b.), non Hoffm. = F. praten. b. sicula Parl. — *Sicilia.*
γ *apennina* (*DNtrs.*) Fl. An. l. c., var. α c.) = F. australis Schur. — *Col di Tenda* (*Burnat ex Hack.*), *Appenn. lig. tra S. Stefano d'Aveto ed il Gottro* (*De Not.*), *Appenn. pavese presso Ottone ed Orezoli* (*Farneti*).
δ *arundinacea* (*Schreb.*) (Fl. An. l. c., var. γ) = F. elatior β L., **a. vulgaris Hack.** — *Pen. ed isole.*
b. **strictior Hack.** — *Piem.*, *Lig. ad Albenga*, *Modenese*, *Reggiano ed Appenn. piceno* (*ex Belli*).
c. **pauciflora Hartm.** — *Lig. occ. a Cogoleto* (*ex Belli*).
d. **subalpina Hack.** — *Alpi piem.* (*Hack.*, *Belli*), *Veron. sul M. Baldo e sui Lessini* (*Goir.*).
e. **mediterranea Hack.** — *It. sup.* (*ex Hack.*), *Bolognese ed isole di Sic.*, *Sard. e Capraia* (*ex Belli*).
f. **fasciculata Sonder.** — *Alpi Cozie al Frejus* (*ex Belli*).
ε *Fenas* (*Lag.*) (Fl. An. l. c., var. β) **a. genuina.** — *Macerata a S. Maria*, *Camp. a Sora e S. Giovanni*, *Sic. e Sard.* (*cfr. Hack. et Belli*).
b. **corsica Hack.** — *Corsica* (*ex Hack.*), *Sard.* (*ex Belli*).

Digitized by Google

c. **spuria Hack.** — *Veron. a Vaio di Squaranto* (*Goir.*), *Tosc. a Castrocaro* (*Somm. ex Hack.*).

d. **longiglumis Hack.** — *Sic. a Girgenti* (*Somm. ex Hack.*).

314 (5) *F. spadicea* **a. aurea Hack.** — *Alpi, Appenn.*

b. **fibrosa (Griseb.)** — *Alpi Cozie, C. Ticino e M. Baldo* (*cfr. Belli*).

c. **interrupta Asch. et Graeb.** (Syn. II, 1, p. 515). — *C. Ticino sul M. Broglia* (*Muret*).

315 (6) *F. caerulescens.* — *Basilicata a Ginosa* (*Rosano, ex Ten. Syll., p. 47*).

316 (7) *F. pumila* α *typica* **a. genuina Hack.** — *Alpi* (*ex Hack. et Belli*) *e Cors. al M. Renoso* (*ex Hack.*).

b. *lutea Ser. exs. ex Gaud.* (1828), *Gremli* (1898) = F. pumila γ Gaud. (1828) = F. pum. v. flavescens Asch. et Graeb. (1900). — *Rara nelle Alpi, Cors. al M. Rotondo a 1950 m. ed al M. Renoso a 1800 m.* (*Briq.*).

c. **rigidior Mut. (Richt.)** = F. pumila β Negri Goiran. — *Alpi piem., bresc. e veron. al M. Baldo* (*cfr. Hack., Belli et Goir.*).

β *sardoa Hack.* (*sub F. varia*) (*Richt.*) (Fl. An. l. c., var. δ). — *Sard. al M. Limbara* (*ex Hack.*), *Cors. ai M. Rotondo e Renoso* (*Mand. et Fouc.*).

γ *varia* (*Haenke*) (Fl. An. l. c., var. β) **a. genuina.** — *Alpi* (*ex Hack. et Belli*), *Appenn. pavese sopra Ottone* (*Farneti*) *e camp. a S. Donato* (*ex Hack.*).

b. *acuminata* (*Gaud.*) = F. flavescens Gaud. (non Bell.). — *Alpi lig., piem. e veron.* (*ex Belli*).

c. **graeca Hack.** — *Monti dell'Italia* (*ex Richter*).

d. **brachystachys Hack. (Richt.).** — *C. Ticino a Vergeletto* (*Chenev.*).

e. **scabriculmis Hack. (Richt.).** — *Alpi Mar.* (*cfr. Hack. et Belli*).

f. **cenisia Hack. (Richt.).** — *Alpi piem. al Cenisio* (*ex Hack.*) *ed a Lanzo* (*ex Belli*).

δ **alpestris (R. et S.)** = F. alpina Host = F. varia β flavescens Koch p. p. — *Alpi or.* (*M. Baldo, Trent. ecc.*) (*ex Hack.*) *e piem. a Bugnanco e Valdieri* (*ex Belli*).

ε *flavescens* (*Bell.*) (Fl. An. l. c., var. γ) **a. genuina.** — *Alpi piem.* (*Auct.*) *ed in prov. di Pavia* (*ex Farneti*).

b. **rigidior Belli** l. c. — *Alpi Cozie a Bussoleno* (*ex Belli*).

c. **firmior Belli et Hack.** ex Belli l. c. — *Alpi Mar. a S. Bartolomeo di Pesio salendo alla Besimauda* (*ex Belli*).

ζ **Eskia (Ram.)** = F. varia γ crassifolia Koch. — *Tir. mer. presso Bolzano* (*ex Sauter*) (?) [*Propria dei Pirenei*].

316 * (7 bis) **F. laxa Host.** — *Alpi Giulie nella valle dell'Isonzo al M. Kren* (*Huter ex Hack.*).

317 (8) *F. dimorpha.* — *Lazio negli Ernici sul M. Passeggio* (*Béguinot*), *Cal. sul M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea nella reg. alp.* (*B. Longo*) *ed in prov. di Cosenza* (*Solla*).

318 (9) *F. pulchella* **a. genuina.** — *Forse mancante entro i confini della nostra Flora.*

b. **Scheuchzeriformis (Schur,** 1866) = F. pulch. v. plicata Huter ap. Hack. (1882). — *Trent., Vicent. a Recoaro ed al M. Toraro* (*Vasolin*) *e ad Ampezzo* (*Huter ex Hack.*).

319 (10) *F. spectabilis* α **Sieberi (Tausch) a. genuina.** — *Alpi centr. ed or. dal lago di Como al M. Bobio sopra Introbbio* (*ex Hack.*) *al Trent. e Veneto.*

b. **subvariegata Hack.** — *Tir. al Seiser-Alpe* (*ex Hack.*) *e Piceno?* (*herb. Orsini ex Belli*).

c. **carniolica Hack. (Richt.).** — *Alpi Giulie sul M. Nanos* (*ex Hack.*).

β **croatica (Kern.,** 1881) = F. spect. subsp. affinis γ croatica Hack. (1882) = F. spect. v. coarctata Posp. (non Hack.) = F. spectab. Marches. — *Reg. illirica* (*Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 531*).

γ *calabrica* (var. β Fl. An. I, p. 93). — *In Cal. anche presso il fiume Lao ed al M. Montea* (*B. Longo*).

320 (11) *F. montana* **a. genuina.** — *Val d'Aosta in valle di Cogne ed Alpi di Valdieri* (*ex Belli*), *Reg. illirica sul M. Cavin* (*Posp.*).

Digitized by Google

b. exaltata (Presl). — *Nap., Ischia, T. d'Otranto, Cal. e Sic.* (*ex Hack.*), *Capitanata* (*Porta e Rigo*), *Murge del Barese* (*Palanza*), *Vulture* (*N. Terr.*).

321 (12) *F. altissima.* — Aggiungi all'habitat « *qua e là nell'Appenn. tosc., centr. e mer., nella Maremma tosc. a Saturnia ed al Gargano al bosco Umbro* (*Adr. Fiori*) ».

323 (2) *Vulpia geniculata* α *typ.* **b. ciliata Parl.** — Glumt. infer. spesso cigliata. — *Vicent. a S. Michele d'Angarano* (*Montini*).

324 (3) *V. ligustica.* — *Bresciano a Castiglione delle Stiviere* (*Ugolini*).

326 (5) *V. myurus* α *typ.* **b. pseudo-nardurus Goir.** (1899) (sub V. pseudo-myuros). — Somigliante a *Nardurus Halleri.* — *Veronese* (*Goir.*).

β *dertonensis* (*Gola*, 1904) = Bromus All. (1785) = Festuca Asch. et Graeb. (1900) (cfr. *Gola* in Malpighia, 1904). — Per ragioni di priorità questo nome deve essere sostituito a quello di β *sciuroides* adottato nel testo.

b. ambigua Nob. = Bromus ambiguus Cyr. = Festuca brom b. ambig. Guss. — Pianta di 2-7 cm., ridotta in ogni parte. — *Nei luoghi aridi della reg. med.*

327 (6) *V. ciliata* **a. genuina.** — Pannocchia contratta, per lo più semplice e generalm. libera dalla guaina super. Spgtt. verdi-rossastre nel secco.

b. Gaudiniana Nob. = Festuca Guss. (1854) = F. barbata Gaud. (ex Guss.). — Pannocchia meno contratta, quasi sempre ramosa, cinta alla base dalla guaina super. spatacea. Spgtt. giallognolo-verdastre nel secco. — *Isola d'Ischia (Guss.).*

c. elongata Nob. = Festuca cil. b. elong. Guss. Fl. inar. p. 405. — Glume e peduncoli infer. pubescenti. Pannocchia allungata e più ramosa. — *Isola d'Ischia* (*Guss.*).

329 (1) *Nardurus unilateralis.* — *Abr. al M. Corno* (*Petrilli ex Crugnola*).

330 (2) *N. Halleri.* — *Elba* (*Sommier*).

332 (2) *Catapodium siculum* α **typicum.** — Spgtt. largam. bislungo-lineari, con 11-20 fi.; glumtt. infer. ottusa.

β **triticeum Nob.** = Megastachya triticea Presl = Desmazeria trit. Wk. — Spgtt. ovate, con 5-8 fi.; glumtt. infer acuta. — *Campi a Palermo frammista col tipo (Presl.)* (cfr. Willkomm in Oest. Bot. Zeitsch. 1890, p. 185).

335 (2) *Sclerochloa maritima* **b. loliacea Asch.** (1865) (sub Festuca mar.) = F. lanceolata b. lol. Asch. et Graeb. (1901). — Rami della pannocchia con 1 sola spgt. — *Sard.* (*Asch.*).

339 (1) *Bromus inermis.* — *Presso Trieste al Campo Marzio ed a Stramare* (*Marches.*).

340 (2) *B. ramosus Huds.* (1762). — Per ragione di priorità questo nome deve sostituirsi a quello di *B. asper Murr.* (1770) = B. asper β serotinus Fl. An. I, p. 98.

β *Benckeni* (*Syme*) = B. asper α typ. Fl. An. l. c.

341 (3) *B. erectus* α *typicus.* — *Elba* (*Somm.*).

Δ Spgt. a 4-8 fi.

* Spgt. glabre. Fg. cauline a lamina piana o lassam. conduplicata.

a. Borbasii Hack. (1882). — Fg. a lamina e guaine glabre. — *Nell'area del tipo.*

b. glabriflorus Borb. (1882). — Fg. a lamina pelosa e guaine glabre. — *Nell'area del tipo.*

* * Spgt. pubescenti o villoso-irsute.

c. villosus Kunth (1833), **Vis.** (1842) = Festuca montana β villosa M. et K. (1823) = Br. erect. β hirsutus Cocc. (1883) (Fl. An. I, p. 98, var. α b.). — Fg. a guaina affatto glabra e lamina nelle cauline piana o lassam. conduplicata. — *Nell'area del tipo.*

d. pubiflorus Borb. (1882). — Fg. a guaina e lamina pelosa, questa nelle fg. infer. convoluto-setiforme. — *Reg. illirica* (*Posp.*), *Italia* (*ex Asch. et Graeb.*).

Δ Δ Spgt. a 10-13 fi., lunghe sino a 4 cm.

e. multiflorus (Cast.) = B. erect. b. macrostachys Gr. et Godr. — Fg. a guaina glabra e lamina pelosa. Spgt. glabre. — *Nell'area del tipo.*

f. *longiflorus* (*W.*, 1813), (Spr., 1815) (Fl. An. l. c., var. α c) = B. inermis β laxus Gris. — Fg. a guaina e lamina pelose. Spgt. spesso pelose. — *Nell'area del tipo.*

β *transsilvanicus.* — *Pavese a Corbesassi* (*Farneti*), *Trent.*, *Ampezzo e Trieste al M. Spaccato* (*ex Asch. et Graeb.*).

Digitized by Google

b. **compactus Asch. et Graeb.** (Syn. II, 1, p. 584). — *Istria tra Pola e Fasana* (*Asch. et Graeb.*).

β[1] **stenophyllus** (**Lk.**). — *Tir. mer. a Bolzano* (*Funck ex Asch. et Graeb.*).

γ *pannonicus*. — *Istria* (*Posp.*).

ε *condensatus* (*Hack.*) = B. erect. v. insubricus Stebler (1895). — *C. Ticino a Gandria* (*Stebler*), *Tir. mer. ed Istria* (*Asch. et Graeb.* Syn. II, 1, p. 580).

342 (4) *B. tectorum* b. **nudus Klett.** (1830) = β glabratus Sond. (1851) = b. floridus Gremli (1898) (for. luxurians). — Spgt. glabre. — *Pavia* (*Cavara ex Farneti*).

343 (5) *B. rubens* β *villosus* (*Forsk.*, 1775). — Questo nome va sostituito a quello di β *maximus* (*Desf.*, 1798) (cfr. Fl. An. I, p. 99).

c. **rigidus** (**Roth**) = B. rubens Host = B. Boraei Jord. — Pianta più rigidam. eretta, a pannocchia contratta, con spgt. a peduncolo per lo più lungo solo 5 mm., più grosse e più lungam. aristate. — *Reg. illirica* (*ex Asch. et Graeb.*).

346 (8) *B. secalinus*. — *Salernit. nel territ. di Cava dei Tirreni* (*L. Marcello*), *Avellinese* (*Casale e Gussone*, *Casali e Ferraris*).

b. *velutinus*. — *Malta* (*Delicata*).

d. **multiflorus** (**Sm.**) = B. grossus DC. — Spgt. lunghe 2 cm., a 9-12 fi., glabre. — Pianta robusta. — *Nell'area della spec.*

e. **Billotii** (**F. Schultz**) = B. hordeaceus Gmel. (non L.) = B. secal. δ hordeac. Koch = B. secal. v. lasiophyllum Beck. — Fg. e guaine pubescenti. — *Tir. mer.* (*Kern.*), *Triest.* (*Marches.*).

347 (9) *B. arvensis*. — A questa spec. deve riferirsi (sec Asch. et Graeb. Syn. II, 1, p. 613) il *B. brachystachys* citato dal Pospichal e dal Marchesetti del Goriziano e Triestino.

for. caespitosus N. Terr. *sub Serrafalco* (1889). — *Cal. a Castrovillari alla Pietà* (*N. Terr.*).

β *patulus* (M. et K., 1823). — Sec. Asch. et Graeb. (Syn. II, 1, p. 619) e Stapf (Fl. Capen. VII, p. 730), questo nome deve essere sostituito con quello anteriore di *B. japonicus Thunb.* (1784).

348 (10) *B. hordeaceus L.* (1753). — Per ragioni di priorità questo nome va sostituito a quello di *Br. mollis L.* (1762) (Fl. An. I, p. 100), che diventa il tipo: α *mollis* (*L.*).

α *mollis* c. *molliformis*. **subfor. glabrescens Freyn.** — Spgt. glabre. — *Istria a Pola* (*Freyn*).

β *commutatus* b. **scabratus** (**Lk.**). — Fusti e guaine fogliari pubescenti, con peli riflessi. — *Italia* (*ex Asch. et Graeb.*).

349 (11) *B. scoparius*. — *Malta* (*Delicata*).

350 (12) *B. intermedius*. — *Parma al campo di Marte* (*Avetta e Casoni*).

c. **Hughi** (**Nym.**) = Serrafalcus Tod. — Pannocchia più lassa; glumtt. lunghe sino ad 1 cm.; reste più lunghe (1 cm.). — *Sic.* (*Tod.*).

351 (13) *B. macrostachys*. — *Pavese a M. Cesarino* (*Cavara ex Farneti*); *in Sic. troverebbesi sino alla reg. subalp.* (*Nicotra*).

352 (14) *B. squarrosus* b. **nanus Bolzon.** — Culmo alto 1-1 ½ dm. con 1-3 spgt. — *Sabbie del Po nel Polesine a Taglio di Po* (*Bolzon*).

(?) **B. intermedius Zum.** (Fl. Pedem. I, p. 166). — *Piem. a Verrone nel Biellese* (*Zum.*). — Quid?

352 * **Ceratochloa unioloides P. B.** (= Bromus Humb. et Bonpl.) — *Genova a Fegino nell'argine della Polcevera presso la conceria* (*Canneva ex Somm.*), *presso Firenze a Careggi* (*Levier*) *e presso Roma e Messina* (*ex Somm.*); *orig. dell'Amer. mer.*

353 (1) *Brachypodium distachyum* α *typ.* c. **pentastachyum** (**Nym.**) = Bromus Tin. = Festuca Presl = Brach. dist. f. caespitosum Posp. — Pianta più robusta, cespugliosa, a racemi con 4-5 (raram. più) spgt. — *Nell'area del tipo.*

β *asperum*. — *Colline dell'anfiteatro del Garda* (*Ugolini*).

354 (2) *Brach. silvaticum* α *typ.* b. **dumosum Beck.** = Bromus Vill. = Brach. gracile

Digitized by Google

v. pubescens Peterm. = Brach. silv. β pubesc. Posp. — Pianta più lungam. e mollem. pelosa. — *Nell'area della spec.*

β **glaucovirens (Murbeck).** — Pianta glauca, interam. glabra eccett. i nodi, alta sino a 2 m., con fg. larghe sino ad 11 mm. e più rigide. Spgt. con 14-22 fi., con reste uguali o nei fi. infer. più brevi della propria glumtt. Antere rosso-mattone-pallido. — *Istria (ex Asch. et Graeb.).*

355 (3) *Brach. pinnatum α typicum.*

I Fg. interam. piane

1 Spgt. pelose.

Δ Spgt. un po' allontanate dalla rachide.

a. vulgare Koch. — Glumtt. con resta lunga 4-7 mm. — *Nell'area del tipo.*

b. *Barrelieri (R. et S.)* = Festuca Ten. = Brach. pinn. b. muticum Parl. (cfr. Fl. An. I, p. 102, var. α c.). — Glumtt. mutiche o mucronate. Spgt. con sino a 20 fi. — *Nell'area della spec.*

c. genuense (R. et S.) = Triticum DC. — Glumtt. brevem. aristate. Spgt. (solo 2-3) per lo più con 8-10 fi. — *Verona, Genova ecc.*

Δ Δ Spgt. strettam. appressate alla rachide.

d. loliaceum (R. et S.) = Bromus Ten. = Brach. contractum Presl = Brach. Tenorianum R. et S. — Fg. per lo più convolte. Racemo spiciforme. — *Nell'area della spec.*

2 Spgt. glabre.

e. *gracile Posp.* = Bromus Leyss. (1761) = Bromus caespitosus Host (1809) = Brach. caesp. R. et S. (1817) (Fl. An. l. c., var. α b.). — Pianta per lo più bassa, densam. cespugliosa. Fg. strette, talora lassam. convolte, a linguetta assai breve. Racemo quasi spiciforme. Spgt. piccole (lunghe circa 2 cm.), a glumtt. arrotondate all'apice e con resta lunga al più 3 mm. — *Nell'area del tipo.*

subfor. collinum Posp. = Brach. caesp. β coll. Rchb. — Pianta ancor più bassa ed a fg. brevi. — *Reg. Illirica (Posp.) ecc.*

f. rupestre (R. et S.) = Bromus Host. — Pianta più alta e slanciata, glauca, a fg. più larghe e con linguetta più lunga della for. prec. Spgt. più grosse, talora incurvate, a glumtt. meno ottuse. — *Reg. illirica (Posp.) ecc.*

II Fg. setaceo-convolte.

g. setifolium (Schur) = Brach. pinn. δ angustifolium Goir. — Fg. assai più brevi dei culmi. Spgt. piccole, per lo più diritte. — *Nell'area della spec.*

h. longifolium (P. B.) = Bromus Schousb. — Fg. lunghe come i culmi. Spgt. per lo più incurvate. — *Da ricercarsi.*

β *phoenicoides* = Brach. pinn. β australe Gr. et Godr. = Brach. austr. Posp.

γ *ramosum.* — *Napoli, Capri, Basilic. (Ten. Syll., p. 55, sub Triticum caespitosum).*

b. Plukenetii (Lk.) = Bromus All. — Pianta gracile, elegante, a culmi con una sola spgt. terminale. Glumtt. attenuate all'apice e con resta lunga sino a 5 mm. (nel tipo ottuse e con resta non superante i 3 mm.). — *Nell'area della var.*

357 *Psilurus aristatus.* — *Elba (Somm.), Isole di Procida e Vivara nel golfo di Napoli (Bég.)*

358 (1) *Lepturus incurvatus β filiformis.* — *Lampedusa (Ross), Malta (Delicata).*

b. gracilis Asch. et Graeb. = Ophiurus grac. Gay. — Pianta più gracile in ogni parte, a fusti filiformi, alti sino a 3 dm. — *Goriz. ad Aquileja (Sieber ex Asch. et Graeb.).*

359 (2) *L. cylindricus.* — *Val d'Aosta tra Montjonet e S. Vincent (L. Vaccari).*

360 (1) *Lolium temulentum α typ.* **b. oliganthum Gr. et Godr.** — Spgt. con pochi fi. — *Colla specie.*

β *arvense (With,* 1796) = L. speciosum Stev. in M. B. (1808) (Fl. An. I, p. 102, var. β).

361 (2) *L. rigidum α typicum* **a. genuinum** — Culmi quasi sempre ruvidi in alto. Rachide della spiga scabra in avanti anche sul lato non coperto dalle spgt. — *Nell'area del tipo.*

b. strictum (Presl). — Culmi interam. lisci in alto. Rachide della spiga liscia sul lato

Digitized by Google

non coperto dalle spgt. o raram. debolm. scabro a ritroso. — *Col tipo nella reg. medit.*

β *subulatum (Vis.*, 1842) = L. lepturoides Boiss. (1853) (Fl. An. I, p. 104, var. β).

362 (3) *L. perenne* α typ. **for. compositum (Thuill.)**. — È una mostruosità a spgt. composte, cioè colla rachilla ad internodi ingrossati ed allungati (talora sino ad 1 dm.) e portante delle spgt. complete a pochi fi.

β *cristatum* (*Pers.*) = L. per. β compositum Fiori in Fl. An. I, p. 104. — Il L. compositum Thuill. è un' altra forma (vedi sopra).

γ *multiflorum* (*Lam.*, 1778) = L. italicum A. Br. (1834) (Fl. An. I, p. 104, var. γ).

c. *Boucheanum* (*Kth.*). — Si sopprima questa forma ch' è un sinonimo di *L. multiflorum* e si sostituisca con:

c. **submuticum Mutel** (1837) = L. ital. v. submut. Gennari (1866). — Solo una glumtt. brevem. aristata. — *Raro.*

363 (1) *Agropyrum caninum.* — *Cal. al M. Pollino al Vallo di Gaudolino* (*Fiori*) *ed alla Serra del Prete* (*B. Longo*).

365 (3) *A. repens* α *typ.* c. **majus Parl.** (1848) = Trit. rep. b. majus Doell (1843?). — Spgt. a 7-9 fi., mutiche od aristate; glume a 5-7 nervi. — *Col tipo.*

β *glaucum* c. **latronum Richter** = Trit. latron. Godr. = A. glauc. β microstachyum Gr. et Godr. — Spgt. piccole, strettam. appressate alla rachide. Pianta verde-glauca. — *Nell' area della var.; Grado nel Friuli* (*Posp.*).

d. **aristatum Sadl.** — Glumtt. brevem. aristate. — *Nell' area della var. glaucum.*

e. **longearistatum Posp.**(sub Trit. intermedium). — Glumtt. nelle spgt. super. con resta lunga 3 volte la sua glumtt. — *Nella reg. Illirica presso Coglio* (*Posp.*).

γ *Savignonei.* — *Brescia alla Bornata* (*Ugolini*).

δ *litorale.* — *Litorale della Romagna.*

ε *pungens.* — Sec. Asch. et Graeb. (Syn. II, 1, p. 663) sarebbe un ibrido tra *A. repens* ed *A. junceum.*

b. **aristatum Parl.** — Spgt. aristate, con resta più breve della glumtt. — *Lido di Venezia* (*Kellner ex Parl.*).

c. **majus Parl.** = v. megastachyum Gr. et Godr. — Fusti alti sino a 17 dm.; fg. larghe sino ad 1 cm. o più; spighe lunghe oltre 30 cm., con sino a 30 spgt., ciascuna con 8-12 fi. (*Somm.*). — *Nell' area della var.*

var. drepanense (Herb. pan. ex Ponzo, 1900). — Differisce dalla spec. principalm. pel culmo non fistoloso (sic in Herb. pan.). — *Trapani presso il litorale* (*Herb. pan. ex Ponzo*).

365 * *A. repenti* × *junceum* = A acutum R. et S. — *Cors. a Calvi (Mand. et Fouc.)*

365 ** *A. acutum* **var. intermedium Farneti** (1900). — Fg. completam. convolte, pungenti, glauche, scabre di sopra per aculei adunchi. Differisce da *A. pungens* per le glume ottuse, uguali ai $^2/_3$ della spgt. — *Pavese presso Varzi* (*Farneti*).

366 (4) *A. junceum.* — *Polesine nel terr. di Adria* (*Grigolato*).

367 (5) *A. elongatum.* — *Puglie attorno al lago di Lesina* (*Adr. Fiori*).

β *scirpeum.* — *Cors. anche a Calvi* (*Mand. e Fouc.*).

368 (6) *A. cristatum.* — *Vicentino alla forcella di Molon presso gli albi di Melegnone* (*Vasolin*).

369 (1) *Triticum villosum.* — *In Cal. sale sino alla reg. mont. o subalp. (1100-1200 m.)* (*Fiori, Terr.*).

371 (3) *T. aestivum* δ *turgidum* **for. Herrerae Körnk.** — *C. Ticino a Melide* (*Chenev.*).

372-73 (1 e 2) *Aegilops bicornis ed Ae. Aucheri.* — Sec. *Ascherson* (Magyar Bot. Lapok. I [1902], p. 6) si devono considerare come var. di una stessa specie e la loro sinonimia deve essere la seguente:

Ae. speltoides Tausch (1837) α *Aucheri* (*Boiss.* 1844) = Ae. speltoides Tausch s. str. = Agropyrum Tournefortii Savignone (1846) = Ae. caudata Bert. (1846) (non L.)

Digitized by Google

= Triticum Aucheri Parl. (1848) = Ae. macrura Jaub. et Spach. (1850) = Trit. speltoides Gren. (1857).

β *ligustica Nob.* = Agropyrum lig. Savignone (1846) = Tritic. lig. Bert. (1846) = Ae. speltoides Jaub. et Spach. (1850) = Tritic. obtusatum Godr. (1853) = Ae. bicornis Boiss. p. p., Fiori in Fl. An. I, p. 108 (non Jaub. et Spach et excl. syn. Tritic. bicorne Forsk.) = Ae. triticoides Lk. hb. (non Req.).

L' *Ae. bicornis Jaub. et Spach* (= Triticum Forskal) è un' altra spec. propria dell' Afr. bor.-or. ed As. occ., non ancora trovata avvent. in Eur.

375 (4) *Ae. cylindrica. — Trieste presso Bolliunz e Dollina ed avvent. al Campo Marzio ed al Porto Nuovo (Marches.) e lungo la Rosandra sotto Borst (Posp.).*

377 * *Trit. vulgare* × *Aeg. ovata* = Ae. triticoides Req. — *Terracina (Fiorini in Chiovenda).*

378 bis (7 bis) *Ae. triaristata W.* (Fl. An. I, p. 109, sub Ae. ovata var. γ). — Propenderemmo a ritenerla come spec. distinta.

381 (1) *Hordeum vulgare* γ *distichum* **e. muticum Farneti** (1900). — Spgt. tutte senza resta. — *Colt. nel l'avese (Farneti).*

384 (4) *H. maritimum* β *Gussoneanum. — Nel Lazio in molti luoghi (Cfr. Chiovenda, in Malp. 1897, p. 112).*

385 (5) *H. murinum* **c. pusillum Goir.** (1899), **Asch. et Graeb.** (1902). — Pianta alta 17 cm. al più, a spiga lunga (non comprese le reste) circa 2 cm. — *Nei luoghi molto secchi: Verona (Goir.).*

d. intermedium G. Beck. — Spgt. laterali con gluma interna più larga, pettinato-cigliata sul lato interno, ruvida sull' esterno (nella for. genuina più stretta e semplicem. ruvida). — *Nell' area della spec.*

387 (2) *Elymus europaeus. — Reg. Illirica sui M. Nanos e Cavin (ex Posp.), Appenn. Modenese a M. Modino di Frassinoro (Adr. Fiori !), Cors. nella foresta Valdoniello (Audigier ex Fouc.) e nella foresta di Marmano (Rotgès ex Fouc.).*

388 (3) *E. Caput-Medusae* α **Bobartii Nob.** = Hordeum Caput.-Med. A Bob. Asch. et Graeb. — Fg. a lamina spesso quasi glabra; guaine infer. sparsam. pelose. Glume lunghe sino a 5 cm., alla base patenti e quasi orizzontali, quindi curvate in alto, lunghe quasi $^1/_2$ della glumtt. (inclusa la sua resta ch' è lunga sino a 13 cm.); glumtt. per lo più glabre. — *Nizza (St.-Lager).*

β **asper Nob.** = Cuviera Caput-Med. v. aspera Simonkai (1897) = Hordeum Caput-Med. B asperum Degen in Asch. et Graeb. — Fg. a lamina densam. pelosa di sopra; guaine glabre o brevem. pelose. Glume lunghe 2 $^1/_2$-3 cm. soltanto, poco divaricate, lunghe circa $^1/_3$ della glumtt. (inclusa la sua resta ch' è lunga 7-8 cm.); glumtt. spesso lucenti, ruvide. — *Puglie (ex Asch. et Graeb., Syn. II, 1, p. 744); avvent. a Trieste al Campo Marzio (Marches.).*

γ *crinitus (Schreb)* (Fl. An. I, p. 110 [for. b.]. — Pianta più bassa e più rigida delle due var. prec., a fusti spesso non più lunghi della spiga. Guaine glabre. Glume lunghe 2 $^1/_2$-3 cm., eretto-divaricate, lunghe circa $^1/_4$ della glumtt. (inclusa la sua resta ch' è lunga sino ad 11 cm.); glumtt. spesso ruvide, con resta più larga che nella var. prec., nastriforme. — *Puglie tra Apricena e S. Nicandro (Porta e Rigo) e nelle Murge del barese (Palanza), Basil., Sic. sull' Etna e Sard.*

CYPERACEAE

389 (1) *Cyperus levigatus* β *distachyus. — Lazio nel litorale del Circeo (Fiorini-Mazzanti) ed a Terracina (Rolli, ex Chiov. in Malp. 1897, p. 107), Isole Maltesi (Duthie).*

390 (2) *C. serotinus.* — Aggiungi all' habitat: *Istria.*

391 (3) *C. flavescens* **b.** *monostachyus Sacc.* (1869) = v. pygmaeus Goir. (1875).

c. ferrugineus De Bonis ex Bolzon. — Spgt. ferruginee. — *A Costa di Rovigo lungo l' Adigetto (De Bonis).*

Digitized by Google

395 (7) *C. fuscus.* — Aggiungi all'habitat: *Istria.*

c. **calidus** (**Kern.**, 1864) = C. fuscus β elatior Sacc. (1869). — Pianta alta sino a 4 dm., a fg. cauline lunghe come o più dell'infiorescenza, ch'è assai lassa. — *Nell'area della spec.*

397 (9) *C. glomeratus.* — *Lig. occ. alla foce della Nervia* (*Bicknell*).

398 (10) *C. glaber.* — *Marche a Falconara marittima* (*Paol. e Card.*).

399 (11) *C. esculentus* **a. sativus Boeckel.** — Tuberi grossi, bislunghi, con anelli manifesti. Raram. fiorisce. — *Coltivasi.*

b. **aureus** (**Ten.**). — Tuberi piccoli, globosi o quasi, solo da giovani con anelli evidenti. Sempre fiorente. — *Spontaneo nei luoghi indicati* (Fl. An. I, p. 115) *ed anche in Cal. presso Monteleone* (*Bisogni*), *Elba e Giglio* (*Sommier*).

400 (12) *C. rotundus* **b. inconspicuus** (**Gennari ap. DNtrs.**, 1851). — Ombrella a 2-3 raggi, di cui 1 o 2 con una sola spgt. ed il centrale brevissimo con 3-4 spgt. Spgt. ovato-oblunghe, con circa 10 fi. — *Laz. sulle sponde del lago di Castel Gandolfo* (*Genn.*).

c. **hexastachyos** (**Rottb.**). — Pianta elegante, coi rami dell'ombrella per lo più semplici e con spgt. brevi. — *Da ricercarsi.*

d. **tetrastachyos** (**Desf.**). — Fusti allungati, con poche spgt. lunghe 18-24 mm. — *Da ricercarsi.*

e. **comosus** (**S. et S.**) = v. macrostachyos Boiss. — Spgt. più grandi, lunghe 25-50 mm. — *Da ricercarsi.*

408 *Fuirena pubescens.* — *Isole Sanguinarie presso la Cors.* (*Boullu*), *Bosco Fontana presso Mantova* (*Moretti-Foggia*) (?), *Cal. occ. alla foce del fiume Lao* (*Adr. Fiori*).

410 (2) *Scirpus silvaticus* β *radicans.* — *Lago di Garda presso Lazise* (*Fontana ex Goir.*), *presso Pavia* (*Cavara ex Farneti*).

411 (3) *S. maritimus* **d. minor Hausm.** — Pianta di 3 dm. circa, a spgt. più piccole, tutte sessili. Fi. a 2 stimmi. — *Tir. mer. presso Bolzano e Magrè* (*ex Sauter*).

e. **monostachyos G. F. W. Meyer** (1836) = v. simplex Tausch hb. ex Posp. (1897). — Fusto con una sola spgt. — *Nell'area della spec.*

413 (5) *S. Holoschoenus* α *typ.* **b. acutus M. Gortani** (1903). — Fusti indurito-spinosi all'apice. Antela più lunga dell'involucro, semplice o quasi. Capolini di 5-9 mm. diam. — *Basso Friuli sotto Castions di Strada* (*Gortani*).

β *globifer.* — *Malta* (*Delicata*).

414 * *S. lacustri* × *triquetrus.* — Sec. Farneti distinguesi subito dal *S. lacuster* tanto pel suo colore verde-scuro, quanto pel minore sviluppo. — *Pavese nelle risaie di Codalunga (Farneti) e Bresciano nella torbiera d'Iseo* (*Ugolini*).

415 (7) *S. litoralis* β **Philippi** (**Tin.**, 1846). — Glume interissime, largam. bianco-scariose al margine. Stimmi 3. Setole perigon. 3-4. — *Sic. al fiume dell'arena, tre miglia distante da Mazzara* (*Philippi ex Tin.*).

417 (9) *S. americanus Pers.* (1805) = S. mucronatus All. (1785) (non L.) = S. triquetrus β triangularis Pers. (1805) = S. pungens Vahl (1806) (Fl. An. I, p. 119). — *Presso le foci del Po vicino al faro di Punta della Maestra (Bolzon), Friuli (Pirona), lit. del Polesine presso Goro (ex Bert.) ed in quello venez. presso Chioggia ed alla foce del Piave (Moric.) e Camp. a Carnello nella reg. Magnene (Falqui).*

420 (12) *S. setaceus* α *typ.* — *Cors. tra il colle di Sorba e Ghisoni a 1000 m.* (*Briq.*), *a Caniccia presso Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*) *ed a Belgodere e nella valle della Restonica* (*Fouc. et Sim.*).

β *cernuus* (*Vahl*, 1806) = S. setaceus L. (1771) (non L., 1753) = S. filiformis Savi (1798) (non Lam.) = S. Savii Seb. et Mauri (1808) (Fl. An. I, p. 120). — *Cesenate vicino al Savio* (*Del Testa*).

421 (13) *S. fluitans.* — *Paludi di Castelletto presso Cormons nel Friuli* (*Posp.*).

422 (14) *S. caespitosus.* — Sec. Asch. et Graeb. (Syn. II, 2, p. 300) tra noi troverebbesi soltanto la var.:

β **austriacus Asch. et Graeb.** (1903) = Trichophorum austriacum Palla (1897).

Digitized by Google

γ **minutus Fouc. et Mand.** (1900). — Fusti assai gracili, alti 3-5 cm. — *Cors. ai M. Rotondo e Renoso (Mand. e Fouc.) ed al M. Cinto (Audigier ex Fouc.).*

423 (15) *S. alpinus.* — *Indicato del M. Bianco (Payot); ma forse erroneam. (ex L. Vaccari et Briquet).*

426 (1) *Heleocharis acicularis.* — *Istria (Posp.).*

427 (2) *H. carniolica.* — *Goriz. a Rocca di Cormons e nella Valle del Vippaco (Posp.).*

428 (3) *H. palustris α typ.* **a. genuina.** — Fusti per lo più alti 2-4 dm. Spgt. ovato-lanceolate.

b. *minor Schur* = Scirpus pal. b. minor Schrad. (cfr. Fl. An. I, p. 122). — Fusti alti 10-20 cm. Spgt. lanceolate. — *Nell'area della specie.*

c. **major Sonder.** — Fusti alti 4-6 dm. Spgt. strettam. lanceolate. — *Nell'area della specie.*

d. **reptans Parl.** — Rz. più lungam. strisciante, con parecchi fusti sterili ricurvi. Spgt. ovato-oblunghe, brevi, a pochi fi. — *Sicilia (Parl.).*

e. **filiculmis (Schur).** — Pianta più o meno intensam. glauca. Rz. brevem. strisciante. Fusti gracili, alti circa 3 dm. Spgt. lanceolate, lunghe 3 mm. Glume lanceolate, pallide. — *Sard. a Pula (ex Asch. et Graeb., Syn. II, 2, p. 291).*

δ *multicaulis.* — *Nelle Paludi di Castelletto di Cormons nel Friuli (Posp.), Pavese a M. Penice (Farneti).*

439 (1) *Rhynchospora alba.* — *Lazio nelle Paludi Pontine (Béguinot).*

442 (2) *Kobresia bipartita (All.) Dalla Torre* (1882) = Carex All. (1785) = Kobresia caricina W. (1805) (Flora An. I, p. 125). — *V. d'Aosta al M. di La Saxe (Payot).*

443 (1) *Carex Davalliana.* — *Triest. al Timavo ed a Senosecchia (Marches.) e Rive dell'Adige in Polesine (Grigolato).*

444 (2) *C. dioica.* — *Paludi di Castelletto di Cormons nel Friuli (Posp.).*

448 (6) *C. microglochin.* — *V. d'Aosta in Valgrisanche (Beyer).*

453 (11) *C. foetida All.* (1785), *Vill.* (1787).

453* *C. foetido × lagopina Kneucker* = C. Kuekenthalii Zahn. — *Gr. S. Bernardo (Kneucker), C. Ticino all' Alpe Piodajo in Val Vigornesso (Chenev.), M. Cenisio al lago d' Eau-blanche (Arv. T. ex Christ).*

453 * * C. foetido × stellulata Kuekenthal = *C.* Laggeri Wimm. — *C. Ticino in Val Maggia al lago di Magnole ed Alpe Forné (Correns) e S. Gottardo (ex Asch. et Graeb.).* — *Spesso confuso coll'ibrido prec.*

454 C. foetido × brunnescens Asch. et Graeb. = C. microstyla Gay in Gaud. (Fl. An. I, p. 128) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 2, p. 74).

455 (13) *C. curvula* **c. pallida Asch. et Graeb.** (1902). — Brattee e glume bianco-scariose, tranne una linea bruna mediana. — *M. Cenisio (Cesati ex Asch. et Graeb.).*

457 (15) *C. arenaria.* — *Comasco sul m. Baro (Ardissone).*

γ *disticha.* — *Goriz. nella marina di Monfalcone e presso Pradizziolo (Posp.).*

458 (16) *C. paniculata β paradoxa.* — *Presso Vittorio fra il lago di S. Maria e quello di Lago (Pampan.).*

γ *diandra (Schrank, 1782)* = C. teretiuscula Good (1794) (cfr. Fl. An. I, p. 129). — *Friuli austriaco nelle Paludi di Castelletto, presso Vertoiba e probabilm. presso Gorizia (ex Posp.).*

459 (17) *C. vulpina.* — *Isola del Giglio (Doria ex Somm.), Malta (Delicata).*

c. **longibracteata Beck.** — Spiga per lo più allungata, piuttosto stretta, talvolta un po' interrotta alla base. — *Sicilia (Todaro ex Asch. et Graeb. Syn. II 2, p. 36).*

460 (18) *C. muricata α typica* = C. contigua Hpe.

b. Pairaei (F. Schultz) = C. virens Hpe. (non Lam.?) [1]) = C. mur. α typ. b. virens Fiori in Fl. An. I, p. 129. — Forma intermedia tra il tipo e la *v. divulsa.* — *It. bor.*

1) La *C. virens Lam.* (1789) è incerto a quale for. di *C. muricata* debba precisam. riferirsi e quindi seguendo *Asch.* e *Graeb.* abbiamo abbandonato questo nome.

Digitized by Google

subfor. capitata Christ in Chenev. (1902). — Fusto alto 18-24 cm., con 3-4 spgt. quasi capitate all'apice. — *C. Ticino* (*ubi?*) (*Chenev.*).

c. **mediterranea Asch. et Graeb.** (1902). — Pianta bassa (3 dm.), a fg. generalm. brevi. Spiga breve, spesso quasi capituliforme. Glume rossastre o rosso-brune. Otricelli rotondo-ovati, bruscam. ristretti in rostro piuttosto breve. — *Risaie presso Pavia* (*Penzig ex Asch. et Graeb. l. c.*).

β *divulsa* **b. Chaberti (F. Schultz)** = C. litigosa Chaubard? — *Tir. mer. a Bolzano* (*ex Sauter*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 2, p. 43).

461 (**19**) *C. distachya.* — *Euganei sul m. Lonzina sopra Praglia nei vigneti* (*Adr. Fiori*).

463 (**21**) *C. leporina.* — *Pineta di Cervia in Romagna* (*Del Testa*), *Eolie a Lipari* (*Zodda*); *a questa spec. va riferita la* C. intermedia *della Sila* (*Solla, ex spec. in hb. Vallombrosano*) (*Adr. Fiori*).

d. **capitata Sonder** (1851). — Spgt. 2-5, raccolta in spiga breve, quasi capitata. — *Nelle Alpi.*

e. **atrofusca Christ** (1888). — Fusti robusti, grossi, rigidi, suberetti. Spgt. raccolte in capolino, con glume castane o rosso-scure, con margine scarioso più pallido. — *Alpi Mar.* (*Burnat*) *e M. Cenisio* (*Arv. T.*).

465 (**24**) *C. echinata* β *Grypos* **b. nana Christ in Briq.** (1901). — Pianta nana, ridotta in ogni parte — *Cors. al M. Renoso a 1900 m.* (*Briq.*).

466 (**25**) *C. canescens* β *brunnescens* **b. gracilis (Ehrh., Schk.)** = C. vitilis Fr. — Pianta più slanciata e più alta. Spgt. pallide, le infer. un po' allontanate tra loro. — *Alpi Retiche allo Spluga* (*Bruegg. ex Schroeter*).

466 * *C. canescens* × *stellulata* = C. tetrastachya Traunsteiner. — *Valtellina presso Morbegno* (*Bruegg. ex Schroeter*).

468 * *C. muricato* × *remota* = C. axillaris Koch (non Good.) = C. pseudo-axillaris Richt.

469 (**27**) *C. bicolor.* — Il Prof. L. Vaccari avrebbe trovato in V. d'Aosta questa spec. soltanto sugli scisti carboniferi o calcari e mai sul granito come indicano gli Autori. — *Alpi Mar. al Col de Cayolle* (*Burnat ex Christ*).

470 (**28**) *C. caespitosa* α *typ.* = C. pacifica Drejer. — *Nel basso Friuli* (*Posp.*).

β *stricta.* — *In Sard. anche al Limbara* (*Nicotra*).

b. **chlorocarpa Farneti** (1900). — Glume piccolissime, ovato-ottuse, interam. nascoste tra gli otricelli che sono verdi. — *Pavese a Cava Carbonara* (*Farneti*).

c. **melaena Farneti** (1900). — Glume ovato-ottuse, nere, un po' più brevi e più strette degli otricelli che sono grigio-verdastri. — *Pavese a Cava Carbonara* (*Farneti*).

γ *Buekii.* — *Friuli a S. Pietro all'Isonzo e certam. altrove* (*Posp.*).

δ *acuta* **c. prolixa (Fr.).** — *Presso Pavia* (*Cavara ex Farneti*).

ε *Goodenowii* **b.** *melaena* (*Wimm.*) = for. alpina Fiori in Fl. An. I, p. 132 (non C. caesp. β alpina Gaud.).

c. **chlorostachya Asch. et Graeb.** = C. vulg. v. chlorost. Rchb. (1846) = C. vulg. v. chlorocarpa Wimm. (1850). — Spgt. verdi per essere le glume interam. nascoste dagli otricelli (non variegate di nero e di verde come nella for. genuina). — *C. Ticino ecc., presso Pavia* (*Baccar. e Cavara ex Farneti*).

d. **stolonifera (Hpe.)** = C. caesp. β alpina Gaud. — *Alpi* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 2, p. 98).

ζ *intricata.* — *Cal. alla Sila* (*Fiori*).

471 (**29**) *C. Buxbaumii.* — *Carnia alle radici del M. Varniost* (*Gortani*).

473 (**31**) *C. atrata* β *nigra.* — *Abr. alla Majella al M. Amaro nel Vallone di Femminamorta* (*Andrea Fiori!*); *finora notata solo delle Alpi.*

473 * **C. pseudo-nigra Rota** (Prosp. Fl. prov. di Bergamo p. 102, 1853). — *Bergam.: comune nelle prealpi Retiche sino alla Val Camonia* (*Rota*).

473 * **C. Siberi Rota** (l. c. p. 103). — Sec. Brügger (cfr. Asch. et Graeb., Syn. II, 2 p. 230) potrebbe essere un ibrido, cioè: *C. atrata* × *frigida.* — *Bergam. in Val Brembana tra il Lago Gemello ed il Lago Moro* (*Rota*).

Digitized by Google

474 (32) *C. digitata* γ *ornithopoda* **b. elongata Asch. et Graeb.** (1903) = C. ornithopodioides for. elong. Leyb. (1855) = C. ornithopoda var. alpina Kuek. (1899). — Pianta per lo più vigorosa. Glume castano-scure. Otricelli lucidi, debolm. pelosi. — *Alpi* (*ex Asch. et Graeb.*).

δ *subnivalis*. — *Valtellina nel distretto di Bormio* (*Cornaz ex Christ*).

474 * *C. digitato* × *ornithopoda* = C. Dufftii Hausskn. — *Trento* (*Gelmi*).

476 (34) *C. humilis*. — *Comune nella Lig. occ. nel territ. di S. Remo e Bordighera* (*Bicknell*).

477 (35) *C. Halleriana* α *typ.* **b. occultata Genn.** — Fusto non oltrepassante 5-7 cm., con 3 spgt. femm., a peduncoli assai gracili, lunghi 1-2 cm., nascosti nelle guaine delle fg. — *Sard. nei M. di Oliena* (*Genn.*, *Asch.*) *e Corsica al Colle di S. Quilico* (*Fouc. et Sim.*).

β *depressa* (*Lk.*, 1799) = C. basilaris Jord. (1846) (Fl. An. I, p. 134 [var. β]). — *Lig. occ. tra Ceriana e Taggia* (*Bicknell*), *Lazio al m. Circeo* (*Chiov.*).

479 (37) *C. ericetorum*. — *Val d'Aosta* (*Gremli*), *Colle di S. Théodule* (*Jaccard*).

β **approximata** (**All.**, 1777) = C. membranacea Hpe (1835). — Glume più largam. scariose al margine, spesso affatto bianco-scariose. Spgt. più grosse. Fusti più gracili, assai più lunghi delle fg. — *M. Cenisio* (*All.*), *C. Ticino ecc.; sec. Asch. e Graeb.* (*Syn. II, 2, p. 122*) *nelle Alpi esisterebbe solo questa var.*

480 (38) *C. caryophyllea Latour* (1785) = C. verna Chaix in Vill. (1787) (Fl. An. I, p. 135). — *Elba* (*Somm.*).

α *typ.* **b. rotundifruga Sauter** (1899) (sub C. verna). — Frutti rotondi, quasi trigoni, pubescenti; otricello con nervi verdi e becco denticolato. — *Tir. mer. a Bolzano* (*Saut.*).

β *mollis* (*Host*, 1809) = C. verna v. insularis Christ (1884) (Fl. An. I, p. 136). — *Più diffusa del tipo* (cfr. *Béguinot* in Bull. Soc. bot. it. 1903, p. 336).

b. angustifolia Asch. et Graeb. (1902). — Fg. larghe appena 2 mm., sottili e pieghevoli. — *Reg. medit.*

γ *umbrosa* (*Host*, 1801) = C. longifolia Host (1809), Fl. An. I, p. 135.

480 * **C. caryophylleo × ferruginea? Asch. et Graeb.** (Syn. II, 2, p. 231) = C. ferrug. × praecox Krause (1898). — *Tir. mer. a Bolzano* (*Fischer-Benzon*).

482 * (40 bis) *C. Grioletii Roem.* — Per la entità e costanza dei suoi caratteri distintivi, nonchè per la sua distribuzione geografica, va considerata come buona spec. — *Lazio a Pagliano* (*Bég.*), *Isola del Giglio ad Acqua Selvaggia* (*Marchesa L. Doria ex Somm.*).

485 (43) *C. olbiensis*. — *A Rua di Feletto presso Vittorio* (*Pamp.!*), *Lig. occ. presso Ceriana* (*Bicknell*).

489 (47) *C. microcarpa*. — *Camp. al lago della Posta* (*Falqui*).

490 * **C. nitido × caryophyllea** = C. Ferdinandi-Sauteri Asch. et Graeb. = C. nitido × verna Saut. — *Tir. mer. presso Bolzano* (*Saut.*).

491 (49) *C. panicea*. — *Appenn. parmigiano* (*Avetta e Casoni*).

493 (51) *C. limosa*. — *Paludi di Castelletto nel Friuli* (*Posp.*).

β *magellanica* (*Lam.*, 1789) = C. lim. β irrigua Whlnb. (1803) = C. irrigua Sm. (1826) (Fl. An. I, p. 137).

494 (52) *C. glauca* α *typ.* **f. cuspidata** (**Host**). — Glume delle spgt. femm. prolungate in un mucrone lungo circa $^1/_2$ della gluma stessa. Otricelli assai più brevi che nel tipo. — *Istria* (*ex Posp. ecc.*), *C. Euganei* (*Fiori ex Bég.*) *e certam. nell' It. mer.*

g. praetutiana (**Parl.**) (cfr. Fl. An. I, p. 137). — *Appenn. pavese in Val d'Aveto ed al M. Penice* (*Farneti*), *Marche alla grotta dell' Orso sui M. Sibillini* (*Paol. e Card.*) *ed Abr. al Pizzo di Sivo* (*ex Parl.*).

h. chlorocarpa R. Keller (sub C. flacca). — Otricelli interam. verdi. — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Keller*).

var. tanyphylla Posp. (sub C. flacca). — Spgt. erette come nella f. *erythrostachys* ma

Digitized by Google

fg. più flaccide, più lunghe, più strette (larghe 2-3 mm.) e verdi almeno di sopra. — *Reg. Illirica* (*Posp.*).

495 (53) *C. hispida.* — *Lig. occ. nel terr. di S. Remo e Bordighera* (*Bicknell*), *Paludi del Toce in Val d'Ossola* (*Rossi*), *Lazio al Circeo* (*Rolli*) *ed a Torre del Fico* (*Terracciano*, ex Chiov., in Malp. 1897, p. 108), *Puglie attorno al lago di Lesina* (*Adr. Fiori*) *e Cal. a Monteleone* (*Bisogni*).

b. *retusa.* — *Isola Capraia* (*Req.*).

495 * **C. hispido × serrulata Christ** = C. glauco × hispida Asch. et Graeb. — *Ventimiglia* (*Burnat ex Christ*).

498 (56) *C. brachystachys.*— *Alpi goriz.* (*ex Posp. ecc.*), *Abr. al Pizzo di Sivo* (*Orsini*) *ed alla Majella* (*ex Ten.*).

500 (58) *C. ferruginea* δ *sempervirens.* — *Cal. citer. al M. Cozzo del Pellegrino nel territorio di S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

ε *levis.* — *M. Pollino in Cal.* (*Huter, Porta e Rigo*).

502 (60) *C. ventricosa.* — *Pavese a Cava Carbonara* (*Farneti*) *e lungo il Ticino in territ. di Abbiategrasso* (*Cozzi*).

504 (62) *C. punctata.* — *Malta* (*Delicata*).

505 (63) *C. distans* α *typ.* b. **composita Camperio** (in litt.). — Spicis foemineis compositis. — *Comasco ai Corni di Canzo a circa 1000 m.* (*Camperio*).

c. **salina Posp.** — Spgt. masc. clavate, lunghe 3 cm., a glume lucide, porporino-brune colla carena verde e senza margine scarioso. — *Luoghi mar. della Reg. Illirica* (*Posp.*).

506 (64) *C. extensa.* — *Elba* (*Sommier*).

508 (66) *C. flava* α *typ.* b. **lepidocarpa** (**Tausch.**) (cfr. Fl. An. I, p. 141). — *Nell'area della specie.*

β *Oederi.* — *Appenn. camp. al Picinisco* (*N. Terr.*), *Cal. all'Aspromonte* (*Huter, P. et R.*) *e Cors. anche tra Vivario ed il colle di Sorba* (*Mand. et Fouc.*) *e M. Renoso* (*Rotgès, Mand. et Fouc.*).

b. **elatior Anderss.** — Fusti alti 3-7 dm. — *C. Ticino in Val d'Efra* (*Chenev.*).

c. **canaliculata Calmé.** — Fg. molto strette. Spgt. piccole, rotonde. Otricelli piccoli. — *C. Ticino da Losone a Ronco* (*Chenevard*).

d. **minuta Fouc. et Rotg.** = C. nevadensis b. min. Christ (1901). — Pianta non raggiungente 1 cm. — *Cors. al M. Renoso a 1900 m.* (*Briq.*).

508 * **C. flavo × Hornschuchiana F. Schultz.** — *Trent. nelle torbiere di Fiavè ed abbondantissima sul Tonale* (*Gelmi*).

508 ** **C. Oederi × punctata Bruegg.** = C. adulterina Chenev. (Bull. Herb. Boiss. 1902, p. 781). — *C. Ticino a M. Ceneri* (*Bruegg.*, *Chenev.*).

512 (70) *C. riparia* α *typ.* b. **ramosa Pampanini** (1904). — Pianta meno evoluta (fusti alti 25-50 cm., fg. larghe 7-10 mm.). Spgt. terminale bi-trifida o più raram. divisa in 4-5 rami. — *Trevig. presso Vittorio lungo le rive del lago di S. Maria* (*Pamp.*).

β *acutiformis* b. **spadicea** (**Roth**, 1789) = C. Kochiana DC. (1813). — Otricelli ovato-bislunghi, glume masch. apicolate e scabre all'apice. — *It. bor. e Triest.*

e. **gracilis Posp.** — Portamento della *C. lasiocarpa* ma a fg. larghe ed otricelli frutt. glabri. — *Marcellina presso Monfalcone* (*Posp.*).

512 * **C. Nicoloffi Pampanini** = C. riparia f. ramosa × C. stricta Pamp. (cfr. Annali di bot. del prof. Pirotta, I [1904], fasc. 3). — *Trevigiano presso Vittorio lungo le rive del lago di S. Maria* (*Pamp.*).

513 (71) *C. nutans.* — Non più trovata sul M. Baldo dopo che ve la scoperse il Clementi (cfr. *Goiran*, Fl. ver. p. 91).

514 (72) *C. lasiocarpa Ehrh.* = C. filiformis L. hb. (non L. Sp. pl. = C. tomentosa) (Fl. An. I, p. 142). — Sulle ragioni della sostituzione di questi nomi vedi « Mattirolo (Malpighia VIII, p. 337) ed Asch. e Graeb. (Syn. II 2, p. 221) ».

Digitized by Google

PALMAE

Gen. 144 **Chamaerops.** Aggiungi il sinonimo: Chamaeriphes Ponted. (1720).

518 *Chamaerops humilis.* — Sulla variabilità nella forma e dimensioni dei frutti di questa spec. e sulla interpretazione delle cause che possono produrla, cfr. « *Bargagli-Petrucci*, in Malpighia 1900, p. 306, tab. VIII-XIII ».

TYPHACEAE

Typhaceae. Vedi: *Graebner* in Engler Pflanzenreich IV-8 (1900).

520 (2) *Typha stenophylla* F. et Mey. (1845). — Sec. Graebner (l. c.) a questa specie deve riferirsi la *T. Laxmannii Lepechin* (1801), nome che ha perciò il diritto di priorità. — *Basso Friuli tra il molino Trasáro e Pocenia, ott. 1900* (*A. Lorenzi!*).

521 (3) *T. angustifolia* **c.** *continua* Fl. An. I, p. 145, leggasi invece: **c.** *Sonderi Kronf.* = T. angustif. β Sond.

d. inaequalis Kronf. = T. media Rigo exs. — Spiga maschile assai più lunga della femm. (nella for. genuina circa egualm. lunga della femm.). — *Nell' area della spec.*

522 (4) *T. latifolia* **a.** *ambigua Sond.* — Spighe maschile e femm. circa della stessa lunghezza e discoste tra loro sino di 3 cm.

b. remotiuscula (Schur). — Spiga maschile più lunga della femm.; spighe quasi contigue.

c. elatior (Bor.). — Spighe più brevi, contigue o poco discoste. Fg. larghe $^1/_2$-1 cm.

523 (1) *Sparganium erectum* β *neglectum.* — *Lig. lungo la Nervia* (*Bicknell*), *Cors. a Capo Corso nelle paludi di Sisco* (*Mand. e Fouc.*).

523 * **S. ramoso × simplex.** — *Trent. a Pinè alla Serraja* (*Gelmi*).

524 (2) *S. simplex b. fluitans Gr. et Godr.* (1855), *A. Br. in Asch.* (1864) = var. longissimum Fr. (1868).

ARACEAE

526 *Acorus calamus.* — *Istria presso Fianona* (*Posp.*), *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*), *Laz. a Terracina* (*Gravis*).

529 (2) *Arum maculatum.* — Aggiungi all' habitat: *Istria.*

531 *Dracunculus vulgaris* — *Istria in val Dracogna e presso Trieste* (*Marches.*, *Posp.*), *Sic. a Rosariello presso Castelvetrano* (*G. Volpe in hb. Flor.!*).

LEMNACEAE

539 (2) *Lemma trisulca* **b. linearis Asch. et Graeb.** (Syn. II, 2, p. 392 [1904]). — Lamina stretta (larga poco più di 1 mm.), lineare, lungam. picciolata. — *Sicilia* (*ex Asch. et Graeb. l. c.*).

NAJADACEAE

543 (1) *Potamogeton pectinata.* — Anche in questa spec. le fg. fiorali possono essere talora opposte; come in esempl. del Friuli (*Gortani*).

α *typ.* **a. scoparia Wallr.** — *Nelle acque ferme.*

b. interrupta (Kit.) = P. Vaillantii R. et S. = P. pect. v. dichotoma Wallr. — *Nelle acque correnti.*

c. drupacea (O. F. Lang.) — *Sicilia* (*ex Asch. et Graeb.*, *Syn. I, p. 350*).

544 (2) *P. pusilla* β *trichoides.* — *Ai confini del Veronese col Mantovano* (*Masè*).

544 * (2 bis) **P. mucronata Schrad.** = T. Oederi G. Mey. = P. Friesii Rupr. = P. rutila Wolfg. (1827). — *Istria nel canale dell' Arsa sotto Carpano e canale delle Mee presso Aquileja* (*ex Posp.*), *Cors. a S. Severa presso la stazione di Ponte-Leccia* (*Mand. e Fouc.*).

Digitized by Google

545 (3) *P. acutifolia.* — *Dintorni di Pavia* (*Farneti*).

547 (5) *P. natans* α *typ.* c. **prolixa Koch.** — Forma a fusti e picciuoli assai allungati e fg. spesso più strette, bislungo-lanceolate. — *Trent. al Tonale* (*Gelmi*) *ecc.*

γ *polygonifolia.* — *Goriz. presso Monfalcone* (*Posp.*), *Cavanella d'Adige presso Chioggia* (*Adr. Fiori*).

δ *colorata.* — *Goriz. a Zaule, Noghera e Sicciole* (*Posp.*).

c. **Helodes (Dum.)** — Fg. strette, brevem. ristrette nel picciuolo. — *Probabilm. nell'area della var.*

d. **pachystachya Rchb.** — Spighe grosse sino a 4 mm. — *Presso Padova* (*Bizz.*).

548 (6) *P. lucens* β *alpina b. semipellucida.* — *Cors. a Campo di Loro nel Prunelli* (*Fouc. et Sim.*).

550 (8) *P. perfoliata.* — Aggiungi all'area geograf.: *Algeria.*

a. **genuina.** — Fg. largam. ovate.

b. **rotundifolia Sonder.** — Fg. quasi orbicolari. — *Nell'area della spec.*

c. **cordato-lanceolata M. et K.** (1823) = v. ovato-lanceol. Rchb. (1845). — Fg. ovato-lanceolate, lunghe il doppio che larghe. — *Nell'area della spec.*

552 *Ruppia maritima et* γ *rostellata.* — *Tanto il tipo che la var. all'Elba* (*Somm.*).

δ *brevirostris Agardh* (1823) = R. mar. b. recta Moris (1827) = R. brachypus J. Gay (1848) (Fl. An. I, p. 155 [var. δ]).

553 *Zannichellia palustris* α *typ.* e. **peltata (Bert.).** — Stimma grande, rotondo, piano, dentato. Acheni sessili, lisci. — *Cal. presso Rosarno* (*Gasparr. ex Bert.*).

β *pedicellata Whlnb.* (1821) (*Buch.-Ham., Fr.* [1842]).

c. *radicans* (*Wallm.*) = Z. repens Wallm. = for. c. reptans Fiori in Fl. An. I, p. 156.

556 *Zostera marina.* — *Malta* (*Delicata*).

Gen. Najas. Vedi: *Rendle* in Engler Pflanzenreich IV-12 (1901).

559 (1) *N. marina* α **typica** — Internodi sparsam. aculeati in pianta a fg. lunghe 1 $^1/_2$-2 $^1/_2$ cm. ovvero (**b. fluvialis [Thuill.,** 1799] = var. levis DC., 1805) per lo più inermi ed allungati in pianta a fg. lunghe 3-4 cm. e con denti più piccoli. Frutto lungo 4-6 mm. — *È la forma comune.*

β **intermedia (Wolfgang ap. Gorski).** — Internodi inermi o sparsam. aculeati. Fg. piccole, lunghe 12-20 mm., strettam. lineari, a denti spesso più lunghi della larghezza della lamina. Frutto lungo 3-4 o rr. 5 mm. — *Sicilia* (*ex Rendle l. c.*).

γ **muricata (Del.)** = Caulinia mur. Spr. — Internodi densam. aculeati. Fg. lineari, a denti fitti e grossi, spinose sul dorso. Frutto lungo 3 $^1/_2$ mm. — *Sicilia* (*ex Rendle l. c.*).

561 * *Caulinia microphylla Nocc. et Balb.* (1821) = Najas Rchb. (1832). — Sec. *Rendle* (l. c.) probabilm. è il *Ceratophyllum demersum.*

HYDROCHARITACEAE

563 *Vallisneria spiralis* b. **pusilla (Barbieri,** 1853). — Fg. più brevi (2 dm. al più) e più strette. Peduncolo frutt. con pochi giri di spirale. — *Nelle acque poco profonde: Pavese* (*Barbieri*).

592 *Helodea canadensis Rich. in Michx.* (1803) = Anacharis can. Planch. (1849) (Fl. An. I, p. 158). — Crediamo meglio coll'Ascherson (Asch. et Graeb. Syn. I, p. 401) conservare il gen. *Helodea Michx.* oramai dalla maggior parte adottato, tanto più che il gen. *Helodea Juss.* (anteriore) è caduto in sinonimia. — *Veron. in parecchi luoghi* (*Goir.*), *Lago di Garda a Riva* (*Degen, Ugolini*), *Torbole* (*Gelmi*) *e Sermione* (*Magnus*), *Lago Maggiore* (*Chiov. in Malpighia 1897, p. 106*), *in molti fossi e canali attorno a Milano* (*Calegari in litt. 26 febbr. 1899*) *e Laz. nelle Paludi Pontine* (*Gravis*).

ALISMATACEAE

566 *Sagittaria sagittaefolia.* — Coll'Ascherson e Graebner e col Buchenau si possono distinguere le seg. var. e forme che probabilm. si riscontreranno anche da noi:

Digitized by Google

A Fg. a lamina distinta dal picciuolo, le emerse sagittate.
a Fg. emerse a lobi basilari uguaglianti o superanti il terminale.
1 Fg. lanceolate. — Pianta talora (= **subfor. pumila Asch. et Graeb.**) alta appena 2 dm. **a. genuina.**
2 Fg. lineari, a lobi basilari talora (= **subfor. butomoides Asch. et Graeb.**) mancanti. — S. sagitt. v. gracilis Bolle (non Torrey) **b. Bollei Asch. et Graeb.**
b Fg. emerse a lobi basilari più brevi del terminale.
Δ Fg. super. spatolate od ottusam. sagittate. **c. heterophylla (Schreb.).**
Δ Δ Fg. super. lanceolate sino a bislungo-ovate o brevem. saettate. **d. obtusa Bolle.**
B Fg. tutte nuotanti, lineari, ottuse, — talora (= **subfor. stratiotoides Bolle**) brevi e rigidette. Difficilm. fiorisce. **e. vallisneriifolia Coss. et Germ.**

567 (1) *Alisma parnassifolium* **b. dubium (W.)** = Caldesia parn. A dubia Asch. et Graeb. — È la for. acquatica a fg. lungam. picciolate e nuotanti; **c. terrestre Asch. et Graeb.**, sub Caldesia = A. Damasonium W. (non L.), è la for. dei luoghi rimasti asciutti, a fg. con picciuolo breve (al più 5 cm.), erette e bislunghe. — *Nell'area della spec.*

567 * (1 bis) **A. natans L.** = Elisma nat. Buchenau. — Fusto strisciante o nuotante, radicante ai nodi. Fg. biformi, le infer. sommerse lineari, le super. nuotanti lungam. picciolate ed a lamina ovale, intera, 3-nerve. Fi. ascellari, lungam. peduncolati. Pezzi esterni del perigonio verdi, gl'interni petaloidei, assai più grandi, bianchi con una macchia gialla alla base. Ovari 6-9, rr. 10; acheni formanti un capolino irregolare, bislungo-ovati, con 12-15 costole, terminati dallo stilo persistente. ♃. *Già indicata del lit. Veneto* (*Zanardini*) (cfr. Fl. An. I, p. 161, nota) *ed ora del Friuli mer. ad Umago tra S. Lorenzo di Daila e Petrovia* (*Pospichal*).

568 (2) *A. Plantago L.* (1759) = A. Plantago-aquatica L. (1753).
α **Michaletii Asch. et Graeb.** = A. Plantago Michalet = A. major S. F. Gray. — Pianta terrestre ossia emersa. Rz. grosso, spesso più largo che lungo. Fusti eretti (sino a 7 dm.). Fg. verdi-chiare. Infiorescenza grande, piramidale. Pezzi perigoniali interni lunghi il doppio degli esterni. Stami lunghi il doppio degli ovari. Stilo generalm. più lungo dell'ovario. Acheni in generale leggerm. 1-solcati sul dorso e quasi diritti sul lato ventrale.
a. latifolium (Gilib.). — Pianta grande, a fg. con lamina ampia, ovata, generalm. cordata o rotondata alla base. — *Nell'area della spec.*
b. stenophyllum Asch. et Graeb. = A. lanceolatum With. (an. p. p. ?). — Pianta più piccola, a fg. con lamina largam. o strettam. lanceolata, attenuata alla base. — *Nell'area della spec.*
β **arcuatum (Michalet).** — Pianta emersa o più o meno sommersa. Rz. gracile, più lungo che largo. Fusti obliqui, ascendenti, eretti o sdraiati (raram. più di 3 dm.). Fg. quasi glauche. Infiorescenza più povera. Pezzi perigoniali interni lunghi circa 1 $^1/_2$ volta gli esterni. Stami uguali agli ovari. Stilo più breve dell'ovario. Acheni in generale leggerm. 2-solcati sul dorso e con un angolo ottuso sul ventre sotto lo stilo rudimentario.
a. *lanceolatum* (*With.* [*an. p. p.?*] *et Auct.*) *Buchenau* (cfr. Fl. An. l. c., for. b). — Pianta terrestre, cioè non sommersa. Fg. a lamina ellittica o lanceolata, raram. lineare-lanceolata, gradatam. attenuata alla base. — *Qua e là nell'area della spec.*
b. *angustissimum DC.* (1815) = A. Plant. v. graminifolium Whlnb. (1820) (cfr. Fl. An. I, p. 161, for. c.). — Pianta acquatica, cioè più o meno sommersa. Fg. generalm. tutte nuotanti e lineari (lunghe sino ad 1 m.) o talora 1-2 emerse e lineari-lanceolate. Fa passaggio alla prec. col diminuire dell'acqua. — *Qua e là nell'area della spec.*

569 (3) *A. ranunculoides.* — *Istria nella valle infer. del Quieto* (*Calegari*).
b. repens (Lam.). — Fusti laterali arcuato-prostrati, radicanti ai nodi — *Istria a Fianona* (*Posp.*), *Laz. a Fondi* (*Notarjanni ex Ten.*); *ma quest'ultima indicazione merita riconferma* (*Bég.*).
c. zosterifolium Fr. in Koch. — Fg. sommerse o nuotanti lineari, tenere. — *Nell'area della spec.*

Digitized by Google

570 *Damasonium Alisma.* — *Lago Trasimeno presso Terontola al Ferretto, in esemplari talora alti sino a 6-7 dm.* (*Montaldini*).

JUNCAGINACEAE

573 (1) *Triglochin maritima.* — *Pineta di Cervia alla foce del Savio e del Bevano* (*Del Testa*).

574 (2) *T. palustris.* — *Istria* (*ex Posp.*), *Romagne nella spiaggia fra Cesenatico e Cervia* (*Del Testa*).

575 (3) *T. bulbosa L.* (1771) = T. palustris β L. (1762) = T. Barrelieri Lois. (1828) (Fl. An. I, p. 163). — Riconosciuta l'identità della pianta della Reg. Medit. con quella dell' Afr. mer., è certo che la nomenclatura va modificata come sopra (cfr. *Buchenau* in Engler Pflanzenreich).

576 (4) *T. laxiflora.* — *Nel Lazio nei luoghi mar. abbondante in diversi luoghi* (*Chiov.*, *Pirotta*), *Capraia* (*Somm.*, *Bég.*).

COMMELINACEAE

578 (1) *Commelina communis.* — *Pavese tra Cava Manara e Zinasco* (*ex Farneti*), *colt. ed inselvat. nei giardini a Perugia* (*Palomba!*).

JUNCACEAE

580 (1) *Juncus glaucus* α *typ.* c. **microcarpus Asch. et Graeb.** (Syn. II, 2, p. 448). — Fusti per lo più sottili, allungati. Cassula piccola, lunga circa 2 mm., quasi globosa, almeno in una parte dei fi. più breve del perigonio. — *Sard. ad Isili* (*ex Asch. l. c.*).

β *longicornis* (*Bastard*, 1814) = J. paniculatus Hpe. in M. et K., 1826 (Fl. An. I, p. 165). — *Lig. occ.* (*Bicknell*), *Cors. alla stazione di Ponte-Leccia* (*Mand. e Fouc.*).

b. **Magnagutii Asch. et Graeb.** (Syn. II, 2, p. 450). — Fusti alti sino a 15 dm., finam. striati. Antela con 3 grossi rami, lunghi sino a 3 dm., con molti fi. situati nel $^1/_2$ o $^1/_3$ super. dei rami. Fi. lunghi sino a 4 mm., pallidi, a tepali piuttosto larghi, acuti, verdi con una stretta linea rossa ai lati e stretto margine bianco-scarioso. — *Spiaggia tra Pisa e Livorno* (*Magnaguti ex Asch. l. c.*).

580 * *J. conglomerato* × *glaucus* = *J. Leersii Marss.* — *Cors. tra Sorba e Ghisoni a 1000 m.* (*Briq.*).

581 (2) *J. conglomeratus* β *effusus* b. **insularis Fouc. et Mand.** (1900). — Differisce pei fusti rigidi, più lunghi, meno grossi e poco midollosi. — *Cors. alla stazione di Ponte-Leccia* (*Mand. e Fouc.*).

584 * *J. Tommasinii.* — *Dune presso Chioggia* (*Fiori!*), *Polesine* (*A. Terr.*).

b. **Heldreichianus (Marsson in Buchenau).** — Antela molto lassa. — *Col tipo?*

Nota. — Asch. e Graeb. (Syn. II, 2, p. 453-54) considerano tanto il *J. Tommasinii* quanto il *J. variegatus Caruel* come var. di *J. acutus* e non come for. ibride.

587 (8) *J. articulatus.* — Dietro esame del *J. nodosus Biroli* gentilm. trasmessoci dall' Erbario di Torino, abbiamo potuto stabilire che non si tratta del *J. nodosus L.*, ma semplicemente di una forma giovanissima del *J. articulatus* e probabilm. α *lamprocarpus.*

a. *lamprocarpus* c. *stolonifer* (*Wohlleb.*, 1796) = J. repens Nolte (1826) (Fl. An. I, p. 166).

d. **fluitans Koch.** — Fusti nuotanti o lungam. striscianti, lunghi sino a 6 dm. — *Nell' area della specie.*

e. **pallidiflorus (Becker) Asch. et Graeb.** — Tepali pallidi. — *C. Ticino a Frasco* (*Chenev.*).

f. **macrocephalus (Viv.) Parl.** — Capolini con circa 20 fi., subglobosi, densi, 10-14

Digitized by Google

mm. diam. — Distinguesi dalla var. *striatus* per le fg. e fusti lisci od appena striati e per i tepali non acuminato-aristati. — *Lucchese* (*Parl.*), *Cors.* (*Viv.*) *ecc.*

γ *atratus.* — *Reg. Illirica a Prem nella valle della Reca* (*Posp.*).

η *alpinus b. Requienii.* — *Sugli alti monti della Corsica.*

θ *anceps.* — *Cors. anche alla stazione di Ponte-Leccia* (*Mand. e Fouc.*).

b. atricapillus (Drej.) Buch. — *Laz. a Fiumicino* (*Rolli ex Chiov.*).

587 * **J. acutifloro × lamprocarpus Buch.** — *Litorale austriaco* (*Tommasini ex Buchenau*).

587 ** **J. alpino × lamprocarpus Buch.** = J. Buchenaui Doerfler. — *Piem. a Biella* (*Cesati ex Asch. et Graeb. Syn. II, 2, p. 481*).

587 *** **J. anceps × lamprocarpus Murbeck.** — *Dintorni di Trieste* (*ex Buchenau*).

587 **** **J. acuminatus Mchx.** — Questa spec. dell'Amer. bor. è stata identificata dal Chiovenda (Malpighia 1898, p. 415) in due esempl. raccolti nel Lazio dal Sanguinetti, uno ad *Ostia* (marzo 1835), l'altro a *Palo* (maggio 1830). — Il fatto di non essere tale spec. più stata ritrovata farebbe ritenere che fosse stata accidentalm. importata ed avvent. e non indigena come il Chiovenda propenderebbe a far credere (*Adr. Fiori*).

588 (9) *J. heterophyllus* **a. natans Chiovenda** (1898). — Fusti nuotanti. — *Laz. a Nettuno, Anzio e Terracina* (*Chiov.*).

b. terricolus Chiovenda (1898). — Fusti eretti e rigidi, muniti alla base di fg. capillari, — *Laz. a Nettuno* (*Pirotta ed A. Terr. ex Chiov.*).

590 (11) *J. subulatus* = J. multiflorus Desf.. — *Nel Lazio tra Porto e Fiumicino* (*Rolli*) *ed a Campo Salino* (*Chiov.*), *Puglie attorno al lago di Salpi* (*Fiori*).

b. siculus (Tin.). — Pianta più bassa, con antela abbreviata (lunga 5-6 cm.) e meno ramosa. — *Sic., Sard. e Cors.* (*ex Parl.*).

592 (13) *J. tenuis.* — *Presso Torino alla Venaria Reale, luglio 1898* (*F. Vignolo-Lutati!*) *e nella Vauda di Leynì* (*E. Ferrari!*).

594 (15) *J. trifidus.* — *Camp. al M. Settefrati* (*N. Terr.*).

599 (20) *J. capitatus* **b. versicolor Asch. et Graeb.** (Syn. II, 2, p. 489). — Tepali verdi, con margine scarioso, pallido, spesso allungati. — *Presso Palermo* (*ex Asch. et Graeb. l. c.*).

c. triander (Gouan). — Pianta ridotta, per lo più suffusa di rosso, con 1 (raram. 2) capolino di circa 1 cm. di diam. Tepali lunghi sino ad 8 mm. (nel tipo 3 ½ mm.), più lungam. attenuato-cuspidati. — *Nella reg. medit.: Istria, Lig., isole ecc.* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. II, 2, p. 489-90).

d. congestus Ten. = J. setaceus Ten. (non Rostk.). — Pianta ridotta, spesso suffusa di rosso, a capolini ravvicinati. — *Nell'area della spec.*

601 (22) *J. bufonius* α *typ.* **b. parvulus Hartm.** (1858) = v. jadarensis N. Bryhn (1876). — Pianta di circa 2 cm. — *Nei luoghi secchi.*

b. pumilio Griseb. — Pianta ridottissima, alta 1 cm. appena compresi i fi. Fg. lunghe il doppio dei fi. Cassule eguaglianti i tepali interni. — *Isole di Capraia, Giglio e Malta* (*ex Somm.*), *Sard.* (*ex Buchenau*).

δ **ranarius (Song. et Perrier)** = J. luzulaeformis Genn.? — Fg. con guaine rosso-scure in basso. Tepali interni un po' più brevi della cassula, gli esterni lunghi come o più di essa. — *Nei luoghi salsi: Italia* (*ex Asch. et Graeb. Syn. II, 2, p. 423*).

603 (1) *Luzula pilosa.* — *Basil. a Pomarico a Lamaferrara* (*Giordano*).

Nota. — Il *Béguinot* (Bull. soc. bot it. 1903, p. 162) pur amettendo l'esistenza di forme intermedie tra il tipo e la v. *Forsteri*, ritiene che esse siano degli ibridi corrispondenti alle due formole *pilosa* × *Forsteri* e *Forsteri* × *pilosa*.

604 (2) *L. flavescens.* — *Cors. al M. Renoso a 1700 m.* (*Briq.*), *M. Felce presso Corte, foresta di Vizzavona e M. Rotondo* (*Mand. e Fouc.*).

605 (3) *L. spadicea* β *glabrata* (*Desv.*) = Juncus Hpe. — *Nel Trent.* (*Gelmi*).

607 (5) *L. silvatica* β *Sieberi* **b. sicula (Parl.)** = L. maxima Guss. = L. graeca Guss. (non Kth.). — Infiorescenza più piccola e più povera. — *Sic. alle Madonie* (*Guss., Parl.*).

Digitized by Google

607 * **L. silvatico** × **pedemontana** = L. Lepetitiana R. Beyer (Verh. B. V. Brandenb., 1899). — *Alpi Cozie al M. Salancia presso Susa* (*R. Beyer*).

608 (6) *L. nivea* α *typ. b. rubella M. et K.* (1826) = for. rubescens Favr. in Gremli (1885) (Fl. An. I, p. 171).

δ *nemorosa* (*E. Mey.*, 1849) = Juncus Pollich (1776) = J. albidus Hoffm. (1791) = Luz. albida DC. (1805) (Fl. An. I, p. 171).

b. *cuprina* (*Roch.*, 1814) = L. rubella Hpe. (1819) (Fl. An. l. c.).

608 * **L. pedemontano** × **nivea** = *L. Levieri Asch. et Graeb.* (Syn. II, 2, p. 509 [1904]) = L. niveo × pedem. Levier ap. Buch. (1890). — *Appenn. tosc. a Boscolungo nel bosco della Fornace* (*Levier*).

609 (7) *L. campestris b. multiflora* **for. uliginosa Grml.** — Fusti parecchi, gracili; spgt. 5-6, peduncolate o quasi sessili; cassule nerastre. — *Trent. nelle torbiere di Fiavè* (*Gelmi*).

δ *sudetica.* — Spgt. parte peduncolate e parte sessili od anche (**b. alpina [Hpe]**) = L. camp. v. nivalis Wahlnb. = L. multifl. v. nivalis Koch) tutte sessili, raccolte in un capolino denso, lobato. — *Nelle Alpi, Cors. al M. Felce presso Corte ed a Caniccia presso Ghisoni* (*Mand. e Fouc.*).

609 * **L. spicato** × **sudetica?** = *L. depauperata R. Beyer* (*l. c.*, cfr. n. 607 *). — *Alpi Cozie* (*Rostan ex Bayer*).

610 (8) *L. spicata* **c. conglomerata Mielich.** — Spgt. raccolte in capolino subrotondo. — *Alpi.*

LILIACEAE

612 *Narthecium ossifragum* β *Reverchoni* = N. corsicum Le Grand hb. — *Cors. nella foresta di Casamente* (*Roigès, Mand. e Fouc.*) *e lungo il Fiume Grosso ai bagni di Guagno* (*Le Grand*).

613 (1) *Tofieldia calyculata.* — *Lago Bellano nel Parmigiano* (*Avetta e Casoni*); *non ancora registrata dell' Appenn.*

β *glacialis.* — *Alpi bellunesi sul Pelmo* (*Pampan. ex Bolzon*).

γ **collina (Schult.)** = Hebelia coll. Gmel. (1806) = T. racemosa Hpe. = T. cal. v. sparsiflora Sonder — Infiorescenza lassa, spesso allungata, con fi. più o meno allontanati. — *Nell' area della spec. nei luoghi erbosi.*

616 (2) *Veratrum nigrum.* — *Camp. a Sandonato e S. Biagio Saracinisco* (*N. Terr.*).

617 (1) *Colchicum montanum* β *pusillum.* — *Nizz. sul M. Vinaigrier presso Villafranca, ott. 1904* (*J. Arbost*); *già ivi raccolto dal Montolivo prima del 1881 ma confuso col C. arenarium* (= C. longifolium Castagne).

619 * (3 bis) **C. longifolium Castagne** = C. arenarium Gr. et Godr. — *Tra Nizza e Mentone* (*ex Asch. et Graeb., Syn. III, p. 27*) *e Corsica* (*ex Gr. et Godr.*).

β **provinciale (Loret).** — *Maremma tosc. presso Orbetello alla Marsiliana tra le Isoëtes nei luoghi umidi* (*Somm.*).

620 (4) *C. autumnale* **for. castrovillarense N. Terr.** (1889). — *Col tipo in Cal. nel terr. di Castrovillari* (*N. Terr.*).

β *Tenorii* (*Parl.*) = C. byzanthinum et C. Bivonae Ten. — Forse non è altro che una forma di *C. Bivonae Guss.*

γ *vernum* (*Sckrank*, 1789) = C. vernale Hoffm. (1791) (Fl. An. I, p. 178).

622 *Bulbocodium vernum.* — *Appenn. abruzz. nel territ. di Villavallelonga nel Feudo di Sipari, fiorito in marzo* (*Grande L.!*).

624 (1) *Tulipa silvestris.* — *Basil., comune nella valle del Basento* (*Giordano*).

β *australis.* — *Appenn. pavese al M. Tartago, M. Lesima e Pizzini* (*Farneti, Cavara*), *Elba sul M. Capanne* (*Somm.*).

627 (4) *T. Oculus-solis.* — La località « *Istria presso Parenzo* (*Calegari*) », dietro esame degli esemplari comunicatici dal prof. Calegari stesso, va invece attribuita alla var. γ *praecox* (*Ten.*).

Digitized by Google

δ **apula** (**Guss.**). — Sec. *Mattei* (Bull. Orto Bot. di Napoli, tom. II) è una entità distinta tanto da *T. praecox* quanto da *T. Oculus-solis* ed avvicinantisi alla *T. montana* dell' As. min. Distinguesi da *T. praecox* per la presenza di linee più scure nei tepali, persistenti anche nel secco e per altri caratteri. — *Puglie a Barletta e ad Ischia; indicata pure di Foggia e Basil.* (*ex Parl.*) *e Cal.* (*N. Terrac.*).

629 (6) *T. Gesneriana* β *Didieri* ε. **segusiana** (**Perr. et Song.**). — Macchia basilare delle lacinie del perigonio in gran parte gialla, ma colla base nerastra. — *Piem. presso Susa* (*Perr. e Song.*).

630 (1) *Fritillaria persica.* — *Villa Pamfili presso Roma, nat.* (*Béguinot*).

631 (2) *F. delphinensis.* — *Bresciano sul M. Conche* (*Ugolini*).

632 (3) *F. messanensis* β *neglecta* (Fl. An. I, p. 182 [for. b.]). — Perigonio senza variegazione a scacchi e con linea mediana verdognola o rosso-scura od anche (**b. illyrica Beck**, 1903) con variegazione a scacchi e linea mediana verde-giallastra. — *Tanto il tipo che la for. b. nell' Istria.*

634 (5) *F. tenella* α **typica** = F. montana Hpe. — Perigonio a lacinie lunghe 2 $^1/_2$-3 cm., vinoso-porporine e più o meno variegate a scacchi. — *Trento al Doss, Triest. ed Istria.*

β **micrantha Beck** (1903). — Perigonio a lacinie lunghe circa 2 cm. ed un po' acute. Il resto come in α. — *Col tipo ed anche nell' Appenn. Umbro in quel di Norcia al Pian Perduto* (*Clavari in Baenitz Herb. Eur., sub F. Orsiniana*).

γ **Orsiniana** (**Parl.**). — Perigonio a lacinie lunghe circa 3 cm., ristrette verso l' apice, poco variegate a scacchi. Pianta robusta. — *Appenn. piceno ed abr.* (*ex Parl.*) *e Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

δ **intermedia** (**N. Terr.**, 1896). — Perigonio a lacinie lunghe circa 2 cm., verdognole e con variegazione a scacchi poco manifesta. — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

ε **pollinensis** (**N. Terr.**, 1896). — Perigonio a lacinie lunghe 12-13 mm., rosso-sporche e senza variegazione a scacchi. Pianta gracile. — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

637 (3) *Lilium Martagon.* — Aggiungi all' habitat: *Istria.*

β **villosum Perona** = L. villosum Cavara. — Distinguesi dal tipo pei bulbi più grandi (8-10 cm. di diam. in luogo di 4-5), a squame bianco-sporche e lucide (non gialle nè pruinose); pei turioni in forma di mazze clavate di 5-6 cm. di diam., densam. bianco-lanuginosi. Fusto di 5-6 dm., robusto (2 cm. di diam. alla base), densam. foglioso per tutta la lunghezza, glabro. Fg. obovate, lungam. attenuate in basso, quasi carnosette, di un verde più cupo che nel tipo. Racemi ricchi, a brattee densam. tomentose e così pure i bocci dei fi. Cassula più piccola e ad angoli meno alati e semi più piccoli che nel tipo. (Per maggiori particolari e fig., cfr. *Cavara* in Malpighia 1899, p. 445). — *Alpi Mar. al colle della Maddalena* (*Perona*); *coll. nell' Arboreto di Vallombrosa. Lugl.*

Gen. Gagea. — Sopra questo difficile genere il prof. *A. Terracciano* sta da parecchi anni elaborando una monografia di cui attendevamo con impazienza la pubblicazione per potere rifare l' intero genere; di essa ne sono però comparsi alcuni frammenti che possono essere utilmente compulsati, cioè: Le Gagea della flora Portoghese, in Boll. Soc. Broteriana (1903) — Gagear. nov. diagn., in Boll. ort. mut. socc. Palermo (1904) — Esp. genre Gagea Afr. bor., in Bull. Soc. bot. de France (1905) — Revis. Monogr. Gagea fl. Spagn., in Bull. Soc. Arag. Cienc. nat. (1905) e Palermo (1905) — Gagearum spec. fl. or., in Bull. Herb. Boiss. (1905). — Vedi inoltre: *Pascher*, Uebers. Art. Gatt. Gagea, in Lotos (1904).

641 (1) *Gagea pratensis b. spathacea Parl.* (1852) = G. pomeranica R. Ruthe (1893). — *Umbria a M. Subasio* (*Cicioni e Palomba in litt.*).

c. **pollinensis N. Terr.** (1896) (sub. G. stenopetala). — Scapo 1-floro. Fg. radicale più stretta, le fiorali callose all' apice. Tepali più stretti. — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

642 (2) *G. lutea.* — *Goriz., Triest., Istria nel territ. di Parenzo* (*Calegari*), *Appenn. laziale* (*Bég. ecc.*).

Digitized by Google

α **typ. b. australis Lindemann** (1875) = var. pubescens Goir. (1884). — Peduncoli villosi. — *Veron.* (*Goir.*).

c. **maxima Schur** (1866) = var. major Goir. (1884). — Pianta più robusta in ogni parte: scapo alto 25-31 cm. con 2-8 fi., fg. radicale lunga 30-40 cm. e larga 12-15 mm. — *Veron.* (*Goir.*).

d. **minor Goir.** (1884). — Pianta ridotta: scapo alto 10-17 cm. con 2-7 fi., fg. radicale lunga 12-21 cm. e larga 5-9 mm. — *Veron.* (*Goir.*).

e. **bifida Goir.** (1884). — Scapo ripiegato in alto, con fg. fiorali distanti, l'infer. con un fi. ascellare brevem. peduncolato od anche senza. — *Veron.* (*Goir.*).

f. **prolifera Goir.** (1884). — Bulbo portante dei piccoli bulbilli. — *Veron.* (*Goir.*).

g. **bulbifera Goir.** (1884). — Fg. fiorali con bulbilli nell'ascella. — *Veron.* (*Goir.*).

h. **simplex Schur** (1866) = var. monantha Goir. (1884). — Scapo 1 floro, quasi nudo. — *Veron.* (*Goir.*).

β **Brentae** (**Evers**, 1896). — Fg. radicale lineare, larga circa $^1/_2$ del normale, più attenuata all'apice. Tepali più acuti, giallo-chiari in ambedue le facce (non verdi all'esterno), con 3-5 nervi verdi. — *Trent.: Brenta alla Malga Mezzodì presso la neve fondente* (*Evers*).

643 *G. pusilla* β **succedanea** (**Griseb. et Schenk**, 1852) = G. pusilla var. obliqua Kern. (1863). — *Istria* (*ex A. Terr.* in Bull. Herb. Boiss. 1905, p. 1075).

644 (4) *G. minima.* — *Appenn. laziale al M. Autore* (*G. Doria, A. Béguinot*); *la pianta del M. Pollino in Cal. sarebbe distinta come for. b.* **calabra N. Terr.** (**N. Terr.**) (1896).

646 (6) *G. fistulosa* = G. lutea var. pubescens Bég. — *Monti del Lazio* (*G. Doria, Bég.*), *Camp. a Campo rotondo nel bacino del Liri* (*Falqui*).

b. **prolifera Goir.** (1884) (sub G. Liottardi), **Bég.** (1899) — Bulbo portante alla base uno o più bulbilli fogliferi od afilli. — *Veron.* (*Goir.*), *Lazio a M. Calvo* (*Béguinot.*)

c. **fragifera A. et H. Schultes** = Ornithogal. fragif. Vill. = G. Liottardi δ anomala Goir. — Scapo terminato da un capolino di bulbilli in luogo dell'ombrello di fi. — *Veron.* (*Goir.*) *ecc.*

d. **bulbifera Goir.** (1884) (sub. G. Liottardi). — Fg. fiorali portanti dei bulbilli alla loro ascella. — *Veron.* (*Goir.*).

646 * *G. minima* × *fistulosa Asch. et Graeb.* = Ornithogal. intermedium Schleich (1830) = G. intermedia Rchb. (1848) (Fl. An. I., p. 184). — *Indicata del Piem.* (*Rchb. lc.*), *ma certo erroneam., perchè quivi manca uno dei genitori, cioè G. minima, e del Lazio a M. Calvo* (*Bég.*).

647 (7) *G. arvensis* α *typ.* **b. bulbifera Goir.** (1884), **Beck.** (1890) = Ornithogal. proliferum Pall. — Fg. fiorali, specialm. le infer., portanti dei bulbilli alla loro ascella (talora diventanti extrascellari per fenditura della fg.) o talora (= **subfor. bulbillifera Bolzon** [1904]) soltanto le due brattee super. con un bulbillo ascellare. — *Nell'area della spec.; la subfor. bulbillifera nel Parmig. a Langhirano* (*Bolzon*).

β *Granatelli.* — *Barese* (*Palanza*).

b. **obtusiflora Somm.** (1897). — Differisce dal tipo specialm. per i tepali interni ottusi (pel resto cfr. Sommier in « Bull. Soc. bot. it. 1897, p. 249 » ed in « L'Isola del Giglio 1900, p. 82 »). — *Isola del Giglio e Sard.* (*ex Somm.*).

647 * (7 bis) *G. foliosa* (cfr. Fl. An. I, p. 185 sub G. arven. var. γ). — *M. Gargano* (*Porta e Rigo*).

c. **calabra N. Terr.** (1896) (sub G. amblyopetala). — Fi. intensam. aranciati. Fg. cauline super. 2-3, talora verticillate. — *Cal. a Castrovillari sul M. Santangelo* (*N. Terr.*).

d. **ramulosa** (**A. Terr.**, 1904). — Intermedia tra la *G. arvensis* e la *G. foliosa.* — *Sic. al M. Busambra ed alle Madonie* (*ex A. Terr.*).

e. **Soleirolii** (**Schultz, Mutel**). — Fg. strettam. lanceolate o lineari. Peduncoli e tepali glabri, questi distintam. acuti. Cassula oblunga, leggerm. smarginata all'apice. — *Corsica.*

647 * * (7 ter) **G. bohemica R. et S.** (1829) = Ornithogalum Zauschn. (1776). — Pianta

Digitized by Google

alta circa 5 cm. Fg. cauline avvicinate, quasi opposte. Tepali allargato-rotondati all'apice. Ovario obcordato, incavato ai lati. — *Isola d' Elba al M. Capanne, fiorita in gennaio* (*Somm.*, *Béguinot*).

b. *saxatilis* (*Koch in R. et S.*, 1829) = Ornithogalum bohemicum β saxatile M. et K. (1826). — Pianta più gracile del tipo. Fg. cauline più allontanate. Tepali ottusi, ma non rotondati all'apice. Ovario obovato, convesso ai lati (cfr. Fl. An. I, p. 185 [sub G. arven. var. δ]). — *Cal. nel territ. di Castrovillari alla Dirupata di Murano ed a Masistri* (*N. Terr.*).

c. *busambarensis* (Fl. An. l. c. [sub G. arven. var. δ b] = Ornithogalum Tin. — *Cal. a Castrovillari sul M. S. Angelo presso la Cappella di S. Maria del riposo* (*N. Terr.*) *e Sic. a Busambra* (*Tin.*).

d. *nebrodensis* (Fl. An. l. c. [sub. G. arven. var. δ c]) = Ornithogalum Tod. — *Sic. alle Madonie.*

e. **corsica** (**Tausch**, 1852). — *Corsica.*

648 (1) *Ornithogalum exscapum* β **ambiguum** (**N. Terr.**). — Differisce dal tipo pel portamento più robusto e cioè fg. larghe 8-9 mm. e fi. grandi come in *O. umbellatum.* — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

Nota. — Anche l' *O. nanum* indicato dal Terraciano del M. Pollino è probabilm. una var. di *O. exscapum.*

650 (3) *O. montanum.* — *Nel Lazio sul M. Soratte* (*Chiovenda*).

651 (4) *O. comosum.* — *Elba* (*Sommier*).

γ *tenuifolium.* — *Bresciano in Val di Lodrino, Nozza ed altrove* (*Ugolini*), *Lig. occ. al M. Arpetta* (*Bicknell*).

δ *collinum.* — *Pavese al M. Oramala* (*Farneti*), *Elba* (*Doria ex Somm.*).

652 (5) *O. umbellatum* α *typ.* b. **minus** (**L.**) = O. praetextum Stev. — Fg. più strette, in pianta generalm. più piccola. — *Nell' area della spec.*

β *divergens.* — *Rovigo* (*Bolzon*), *Parma nell' Orto Bot.* (*Avetta e Casoni*), *Cors. anche a Grigione* (*E. Petit*) *ed a Ghisonaccia* (*Rotgès ex Fouc.*).

655 (8) *O. pyramidale L.* (1753) α **typicum** = O. brevistylum Wolfn. — Distinguesi dalla var. β per essere più robusto ed a fg. più larghe, pei pedicelli dei fi. eretti, lunghi sino a 3 cm. e quindi assai più delle brattee, che sono più brevem. acuminate e pei tepali attorcigliati insieme dopo la fioritura. — *Istria* (*Posp.*).

β *narbonense* (*L.*, 1759) (Fl. An. I, p. 187 [pr. spec.]). — La pianta ad infiorescenza più breve è la for. b. **brachystachys** [**C. Koch**].

656 (9) *O. pyrenaicum* α **sphaerocarpum** (**Kern.**) = O. pyrenaicum Jacq. — Perigonio a tepali bianchi o bianchicci, con una angusta striscia verde-chiara nel mezzo del dorso. Cassula globosa.

β **flavescens** (**Lam.**) = O. sulphureum Schult. — Perigonio a tepali zolfini, con una striscia verde sul dorso. Cassula ovale. — *Nell' area della spec.*

657 (1) *Urginea maritima.* — *Anche entro terra come in Basil. a Pomarico, Tricarico ecc.* (*Giordano*).

b. **Pancration** (**Nym.**, 1855) = Squilla Steinh. (1834). — *Malta.*

c. **insularis Richter** (1890) = Squilla Jord. et Fourr. (1866-68). — *Corsica.*

d. **litoralis Richter** (1890) = Squilla Jord. et Fourr. (1866-68). — *Sicilia.*

658 (2) *U. fugax.* — *In Sard. anche al Capo Ferro* (*A. Vaccari*).

663 (4) *Scilla peruviana* β *sicula b. glabra* (*Boiss.*, 1845) = Sc. Clusii Parl. (1852) (Fl. An. I, p. 189).

664 (5) *S. hyacinthoides.* — *Valdonega presso Verona, subspont.* (*Goiran*), *copiosa nei Ronchi di Brescia e nelle colline a Maderno ed altre località della Riviera benacense* (*Porta, Ugolini*), *Malta* (*Delicata*).

665 (6) *S. bifolia* c. **bracteata Tomaschek** (1868), **Halacsy et Braun.** (1882). — Squame del racemo spesso lunghe sino ad 1 cm., persistenti. — *Reg. illirica a Prewald* (*Posp.*).

666 (7) *S. amoena.* — *Scomparsa dal Veronese* (*Goir.*).

Digitized by Google

667 (8) *S. hispanica.* — *Abbondantem. inselvat. nell' Istria a S. Nicolò d' Oltre, Pirano e Corte d' Isola* (*Posp.*), *Ancona al M. Conero* (*Paol. e Card.*).

673 (5) *Hyacinthus trifoliatus.* — *Cal. nelle adiacenze del M. Pollino* (*N. Terr.*).

676 (2) *Muscari comosum α typ. a.* **genuinum** — Cassula con peduncolo 2-3 volte più lungo di essa, a lobi acuti, poco più larga del perigonio. Fg. nastriformi, più brevi dello scapo, ch' è gracile.

b. nephrocarpon Posp. — Cassula con peduncolo 4-5 volte più lungo di essa, a lobi ottusi, larga 3 volte il perigonio. Fg. lanceolato-lineari, lunghe come o più dello scapo, ch' è robusto. — *Triest. nel parco del castello di Duino* (*Posp.*).

c. Clusianum (C. Koch). — Fi. sterili pochi. — *Col tipo.*

d. segusianum (Perr. et Song.). — Pianta bassa, a fg. strette e brevi, più glauche, a fi. fertili più piccoli, con perigonio più stretto e fi. sterili a pedicelli patenti. Cassule immature verdi. Semi più piccoli. — *Piem. a Susa.*

β *Holzmanni.* — *Nell' Istria qua e là* (*Marches.*, *Posp.*), *presso Vicenza* (*Brachi*), *Otranto* (*Groves*), *Capri* (*Hackel*) *e Cors. a Bastia* (*Sieber*) (*cfr. Freyn. in Flora 1885, p. 20*).

γ *constrictum* (*Tausch.*) = var. γ tenuiflorum Fiori in Fl. An. I, p. 192. — Sec. Freyn è affine al **M. tenuiflorum Tausch** altra razza del *M. comosum* propria della Pen. balcan., Russ. mer. ed As. occ. — *Il Tausch* (*Flora 1841, p. 234*) *dà il* M. constrictum *come colt. senza indicazione di provenienza, il Freyn* (*Flora 1885, p. 20*) *vi riferisce un esemplare di Corsica a Bastia* (*Sieber*).

680 (6) *M. racemosum α typ.* **b. alpinum Adr. Fiori** (1900) — Pianta più piccola in ogni parte, a scapi di 6-10 cm., uguali o poco più lunghi delle fg. — *Basil. al m. Serino presso il Santuario a 1888 m.* (*Fiori*), *Abr. a Villavallelonga sul colle di Marcandrea* (*Grande Loreto!*).

c. albiflorum Parl. — Fi. bianchi o carnicini. — *Presso Firenze* (*Micheli*) *ed Elba al M. Calanche* (*Sommier*).

681 (7) *M. botryoides* β *Kerneri.* — *Tir. mer. e Bresc. sul Garda* (*ex Asch. et Graeb.*), *Pavese a Cava Carbonara* (*Cavara ex Farneti*).

γ **longifolium (Rigo) Pampan.** (N. Giorn. bot. it. 1905, p. 152). — Bulbo talora prolifero. Fg. lineari, larghe 3-5 mm., lunghe 20-65 cm., lunghe sino a 3 volte lo scapo, lungam. attenuate all' apice. Perigonio del diam. di 4-5 mm. — *Veron. sulla riviera del Garda tra Torri e Pai* (*Rigo*).

684 (2) *Allium Scorodoprasum.* — *Goriz. e Triest.* (*Marches.*, *Posp.*).

685 (3) *A. Ampeloprasum α typ.* — *Valdonega presso Verona, nat. da antiche colt.* (*Goiran*), *Pavese tra Varzi e Godiasco* (*Farneti*), *Cesenate* (*Del Testa*).

687 (5) *A. rotundum.* — *Reg. Illirica anche a Rojano e tra Isola e Strugnano* (*ex Posp.*).

β *Waldsteinii.* — *Nel Triest. più comune del tipo* (*ex Marches.*).

689 (7) *A. sphaerocephalum.* — *Isola di Capraia* (*Somm.*).

α *typicum* **b. bulbilliferum Lor. et Barr.** (1876). — Ombrella intieram. composta di bulbilli, come nell' *A. vineale f. compactum.* — *Cors. al Cardo* (*Mand. e Fouc.*).

for. pratense N. Terr. (1889). — *Cal. al M. Pollino nei piani della Pietrosa* (*N. Terr.*).

δ *descendens.* — *Reg. Illirica* (*ex Posp.*).

for. pulcrum N. Terr. (1889) = A. pulcrum N. Terr. (ibid.) — *Cal. a Castrovillari a M. Sassone ed alla Pietrosa alle falde del M. Pollino* (*N. Terr.*).

690 (8) *A. margaritaceum.* — *Murge del Barese* (*Palanza*).

691 (9) *A. carinatum* γ *asperum.* — *M. Serva nel Bellunese* (*Venzo*).

ζ *cirrosum* (*Vandelli*, 1796) = A. pulchellum Don (1826) (Fl. An. I, p. 197 [var. ζ]). — *Istria nel territ. di Parenzo, comunissimo* (*Calegari*), *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*).

b. gracile Posp. (sub A. pulchellum). — Infiorescenza povera. Spata sempre eretta. Portam. dell' A. oler. v. tenuiflorum. — *R. Illirica* (*Posp.*).

c. nanum Asch. et Graeb. (sub A. pulchellum). — Pianta alta 15 cm. al più, con infiorescenza piccola. — *Spiagge dell' Istria* (*Asch. e Graeb.*).

Digitized by Google

for. valdensium (Reut.) (cfr. Asch. et Graeb., Syn. III, p. 146). — *Alpi Mar. e Cozie.*

692 (10) *A. oleraceum* α *typ.* — *Lazio a M. Autore* (*Doria ex Bég.*), *Cors. ad Aullène* (*E. Rev.*) *ed a Ghisoni* (*Rotgès, Mand. e Fouc.*), *Elba* (*Somm.*).

b. complanatum Fr. (1828) (*Bor.*, 1844).

δ *tenuiflorum.* — *Elba* (*Somm.*).

695 (13) *A. Cupani.* — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*) *ed al Gargano.*

696 (14) *A. moschatum.* — *Istria a Parenzo lungo il Canale di Leme* (*Calegari in litt.*).

700 (18) *A. Schoenoprasum b. alpinum Lam. et DC.* (1805) = var. pumilum Bunge (1836) (Fl. An. I, p. 199).

d. nivale Fouc. et Mand. (1900). — Scapo di 5-10 cm., ricurvo-divergente, gracile. Fg. brevi, ricurvo-divergenti. — *Cors. alla sommità del M. Rotondo* (*Mand. e Fouc.*).

703 (21) *A. angulosum* β *montanum.* — *Istria, Triest. e Goriz. ove scende sino alla pianura* (*Posp.*).

705 (23) *A. suaveolens* α *typ.* **b. pallidiflorum Rota** (1853). — Fi. bianchi, coll'essiccazione giallognoli, tepali esterni roseo-pallidi. — *Bergam. sui m. Ocone e Resegone* (*Rota*).

706 (24) *A. globosum.* — *Lazio nei M. Simbruini* (*Doria ex Bég.*), *Appenn. centr. al M. Vettore* (*Paol. e Card.*) *e M. Velino* (*Levier*). (*Cfr. Sommier in Bull. soc. bot. 1898, p. 14*).

b. saxatile (*M. B.*). — *Appenn. abruzz. nel territ. di Villavallelonga a Coppo Cico a circa 1800 m.* (*Grande L. !*).

709 (27) *A. roseum* α *typ.* **d. humile Somm.** (1894). — Pianta più piccola e mai bulbillifera, a peduncoli più eretti e fg. più strette che nel tipo. — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

710 (28) *A. neapolitanum.* — *Trieste al Campo Marzio* (*Marches.*), *Cesenate nelle vigne nella valle del Rio Marano ed a Bertinoro* (*Del Testa*).

715 *Aphyllanthes monspeliensis.* — *Bresciano nel pendio arido, soleggiato, calcareo del M. Dragoncello alle Coste, fra 500 e 600 m.* (*U. Ugolini !*).

716 (1) *Asphodelus ramosus* β *albus*, **b. neglectus (R. et S.).** — Infiorescenza ramosa alla base. — *Col tipo.*

for. pollinensis N. Terr. (1889). — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

717 (2) *A. fistulosus* α *typ.* **b. grandiflorus Gr. et Godr.** = A. approximatus Gr. et Godr. — Fi. di un terzo più grandi; stami pubescenti sul dorso. Frutti spesso riflessi. — *Cors. a Bastia* (*Gr. et Godr.*).

721 *Simethis Mattiazzi Sacc.* (Atti e Mem. Accad. di Padova XVI, p. 76 [1900]) = Anthericum Vand. (Jul. 1771) = Anth. planifolium L. (Oct. 1771) = Simethis planifolia Gr. et Godr. (Fl. An. I, p. 205).

722 (1) *Anthericum ramosum* **b. scaberulus Beck** (1903). — Fg. più strette e più rigide, un po' papilloso-scabre all'apice. — *Alpi venete* (*ex Asch. et Graeb., Syn. III, p. 49*).

726 * **Yucca aloifolia L.** — *Spec. origin. dell'Amer. bor. ed Indie occ.: frequente nel Lazio nell'Isola Sacra* (*ex Chiov.*).

728 *Convallaria majalis.* — *Basil. al bosco Cognato e Pomarico all'Abbazia* (*Giordano*).

731 (1) *Polygonatum verticillatum.* — *Campania al M. Mela* (*N. Terr.*).

732 (2) *P. multiflorum.* — Aggiungi all'habitat: *Istria, Basil. sul Vulture* (*N. Terr.*).

734 (1) *Asparagus tenuifolius.* — Aggiungi all'habitat: *Istria.*

735 (2) *A. officinalis.* — *Isola di Montecristo* (*Doria ex Somm.*).

β *maritimus.* — *Nel Lazio anche a Fiumicino* (*Rolli, Chiov.*).

736 (3) *A. acutifolius* **c. commutatus (Ten.)** = v. australis Tod. = v. inarimensis Guss. = A. inarim. Torn. = A. ambiguus DNtrs. — Cladodi lunghi 6-7 mm.; perigonio cilindraceo, coi 3 tepali interni patenti, ricurvi all'apice. — *It. mer., Sic. ed Ischia.*

737 (4) *A. aphyllus.* — *Isola di Linosa* (*Ross*).

741 (2) *Ruscus Hypophyllum* β *Hypoglossum.* — *Istria nel terr. di Parenzo* (*Calegari*) *ed altrove, Pavese ad Orezoli* (*Farneti*).

742 *Smilax aspera.* — *Deve essere radiata dalla flora veronese* (*ex Goir.*), *Pineta di Ravenna* (*Del Testa*).

Digitized by Google

DIOSCOREACEAE

743 *Tamus communis* **a. communis Goir.** — Fg. cordate od ovato-cordate, acuminate ed indivise.

b. asarifolia Goir. — Fg. grandi, squisitam. reniformi, interissime. — *Veronese.*

c. hastifolia Goir. — Fg. cuoriformi-astate, facenti passaggio alla for. *cretica* (*L.*) — *Veronese.*

d. cretica (L.) (Fl. An. I, p. 211 [for. b.]).

AMARYLLIDACEAE

744 *Galanthus nivalis* **b. majus Ten.** (1811-15) = G. plicatus Guss. (1826), non M. B. = G. Imperati Bert. (1839). — Fg. più larghe, quasi piane. Fi. e bulbo più grandi. Fioritura più tardiva (Apr. Magg.). — *Triest., It. centr. e mer.*

751 (2) *Sternbergia colchiciflora* β **aetnensis (Guss.) Guss.** = Amaryllis Raf. — Tra noi abbiamo solo questa var., distinta principalm. (sec. Parl.) pel perigonio più piccolo, a lacinie più strette e più acute. — *Essa è stata trovata anche nel centro della Spagna* (cfr. *Rouy* in Bull. Soc. bot. Franc. 1884, p. 182).

751 * **Amaryllis Belladonna L.** — *Origin. dell' Afr. austr.; coll. e nat. in abbondanza a Procida nel golfo di Napoli* (*Bég.*).

753 (2) *Narcissus Jonquilla* α *typ.* — *Colli di Reggio Emilia a Piubello, Montericco ecc.* (*Casali*).

754 (3) *N. cupularis* γ *aureus.* — *Tra S. Remo e Coldirodi* (*Panizzi ex Bicknell*), *Cava de' Tirreni nel Salernit.* (*Marcello L.*).

754 * **N. Sequentiae Tod.** = Hermione Tod. — Affine al *N. Bertolonii* ne differisce pei fi. grandi, a lacinie giallo-slavate, pel fusto alto 50 cm., più lungo delle fg., che non sono strettam. lineari (*Tod.*) — *Presso Messina* (*Sequenza ex Tod.*).

755 * * **N. syracusanus Tod.** = Hermione Tod. — *Presso Siracusa* (*Tod.*).

756 (5) *N. dubius* γ *papyraceus.* — *Presso Brescia sui Ronchi* (*Ugolini*).

δ *unicolor.* — *Avellinese ad Altavilla* (*Milani*).

ζ *Barlae.* — *Presso Vittorio* (*Pampanini!*), *Colli Veronesi* (*Goir.*).

757 (6) *N. poëticus.* — *Elba* (*Sommier*), *Isole Ponziane* (*A. Terr.*).

β *radiiflorus b. pollinensis.* — *Col tipo presso Vittorio sulla montagna di Lago, raro* (*Pampanini*).

757 * *N. poëtico* × *Tazetta.* — *M. Conero presso Ancona* (*Paol. e Card.*).

757 * * *N. Pseudo-Narcisso* × *poëticus* = N. incomparabilis. — *Presso Avellino* (*Milani*).

759 (1) *Pancratium maritimum.* — *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*).

IRIDACEAE

762 (1) *Crocus biflorus* **d. argenteus (Sabine,** 1830) = C. minimus Bot. Mag. t. 2991. — *Italia* (*ex Richter*).

764 (3) *C. vernus.* — Aggiungi all' habitat: *Istria, Elba* (*Sommier*).

766 (5) *C. Imperati* β *suaveolens.* — *Nel territorio di Assisi in più luoghi* (*Morroi e Brizi*) *e nel resto della Pen. da Roma in giù.*

767 (6) *C. minimus* β *corsicus* (*Gay* (1831) (*Vanucci in Maw* [1881]).

768 (7) *C. sativus* α *typ. b. Orsinii.* — *Foligno presso Colle S. Lorenzo, pochi esemplari* (*Bellini*).

β *Pallasii.* — *Barese alle Mattine di Ruvo* (*Palanza*).

770 (9) *C. longiflorus.* — *Murge del Barese* (*Palanza*).

b. melitensis Richter = C. odorus v. melit. Herb. (Bot. Reg. 1844, t. 3). — Perigonio

Digitized by Google

in corrispondenza della fauce giallognolo all' interno e violaceo-porporino all' esterno (nel tipo intensam. giallo all' interno e giallognolo all' esterno). — *Malta sul M. Verdala* (*Herb.*).

771 (1) *Romulea Columnae* α *typ.* c. **modesta** (**Jord. et Fourr.**). — *Cors. a Portovecchio* (*Revel.*) *e Sard. ad Orune* (*Martelli ex Bég.*).

β *Rollii.* — *Trovasi anche nell' isola di Maddalena ed in Cors.* (*ex Bég.*).

γ *ramiflora.* — *Isola di Giannutri* (*Sommier*).

c. **Parlatoris** (**Tod.**) = R. purpurascens Parl., non Ten. — Scapo per lo più 1-floro. — *Sicilia* (*Tod.*), *Sard. a Pabellonis* (*Martelli ex Bég.*) *ed isole di Maddalena e Caprera* (*A. Vacc. ex Bég.*) *ed anche nella Pen. nell' area del tipo* (*ex Bég.*).

d. **violacea Somm.** (1894). — Lacinie perigoniali intensam. violacee internam., colla fauce giallo-aranciata; filamenti aranciati. — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

771 * (1 bis) **R. insularis Somm.** (1898) = R. Revelieri Jord. et Fourr.? — Dimensioni della *R. Columnae*, ne differisce principalm. per le lacinie perigoniali slargate in alto, ottuse e violacee. Differisce poi da *R. Linaresii* pel tubo del perigonio molto più lungo (uguale ad $^1/_3$ del lembo), per le lacinie gradatam. slargate dal basso all' alto, quasi arrotondate all' apice e per la fauce ed i filam. glabri; da *R. Requienii*, alla quale si avvicina per la forma del perigonio che non si apre a stella, differisce per lo scapo verde, per le lacinie meno intensam. colorate, le esterne pallide sul dorso, pei filam. bianchi e glabri, per il pistillo bianco e più corto degli stami; da entrambe le due ultime spec. per le dimensioni minori, massime del perigonio (lungo 10-15 mm.) e per lo scapo quasi sempre 1-floro. — *Isola di Capraia* (*Somm.*), *isole di Maddalena e Capraia* (*A. Vaccari ex Bég.*) *e Cors. a Portovecchio* (*ex Bég.*). *Apr.*

772 (2) *R. purpurascens.* — *Parco di Caserta* (*Guss. ex Bég.*) *e Sard. nel Cagliaritano a Pula, Domus de Maria, Grua e S. Angela* (*Belli ex Bég.*).

773 (3) *R. Linaresii.* — Sec. Béguinot (Bull. soc. bot. it. 1905, p. 173) non esiste in Sard., ov' è sostituita dalla vicariante *R. Requienii.*

β *ligustica.* — Perigonio talora lungo sino a 4-5 cm. (b. **grandiflora Martelli** [1896]) o talora assai ridotto e lungo 15-20 mm. soltanto (c. **parviflora Bég.** [1905]). — *Ambedue le for. in Sard.*

774 (4) *R. Bulbocodium.* — *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*).

for. collina N. Terr. — Scapo breve, spesso bifloro; fg. eretto-patenti (8 cm.); fi. un po' più piccoli che nel tipo, intensam. odorosi, più pallidi; stilo più lungo degli stami. — *Basil. nei colli presso il Vulture* (*N. Terr.*).

775 (1) *Iris florentina b. Mandraliscae* (Tod., 1858). — Come autore di questa entità fu erroneam. citato (Fl. An. I, p. 223) il Tornabene invece del Todaro.

777 (3) *I. germanica b. suaveolens N. Terr.* (cfr. Fl. An. I, p. 224) = I. suaveolens A. Terr. — Sec. Béguinot è uguale ad *I. olbiensis Henon.*, e quindi la località « *Laz. a Fondi al M. delle Fate* » va aggiunta all' area di questa.

β *illyrica.* — *Istria nel terr. di Parenzo a Docastelli* (*Calegari in litt.*).

780 (6) *I. Chamaeiris* β *olbiensis.* = I. suaveolens N. Terr. — *Nel Lazio sulla sommità del Lucretile, a Civitavecchia e sul M. Gennaro* (Cfr. Chiov., in Malp. 1897, p. 106) *ed A. Fondi al M. delle Fate* (vedi sopra al n. 777).

781 (7) *I. pumila b. pseudo-pumila.* — *Diffusissima sulle Murgie in T. di Bari* (*Palanza*).

782 (8) *I. Pseudo-Acorus.* — *Malta* (*Delicata*).

783 (9) *I. foetidissima* β **lorea** (**Janka**, 1877). — *It. mer.* (*ex Richter*).

784 (10) *I. sibirica.* — *Paludi di Ortanova e Cerignola presso Foggia* (*Porta e Rigo*).

β **erirrhiza** (**Posp.**). — Distinguesi pel rz. orizzontale, strisciante, coperto all' apice abbondantem. da guaine di fg. sfibrate e squame, pel fusto schiacciato, alto 6-7 dm., poco più lungo delle fg., foglioso fin sotto i primi fi., per le lacinie perigoniali strette, con grosse venature violette. — *Reg. Illirica sul M. Kojnik* (*Posp.*).

786 (12) *I. graminea* α *typ.* b. **silvatica** (**Balb.**). — *Veronese* (*Goir.*) *ecc.*

β *collina.* — Sec. Palanza avrebbe i semi rossastri e non bianchi come Parlatore descrive

Digitized by Google

quelli del tipo. — *Murgie di Ruvo di Puglia, piuttosto raro* (*Palanza*), *Basil. a Castel Lagopesole* (*Adr. Fiori*).

788 (14) *I. Xiphium.* — *M. Conero presso Ancona vicino all'antico convento* (*Paol. e Card.*).

789 (15) *I. juncea.* — *In Sic. anche a Mascali* (*Nicotra*).

790 (16) *I. Sisyrinchium.* — *Elba nel letto del torrente Marciana* (*Somm.*).

α *typ.* **b. albiflora Nob.** = Ginandr. Sisyr. b. Parl. — Fi. bianchi. — *Palermo* (*Parl.*).

β **maculata (Tod. exs.)** = Moraea sicula Tod. — Fusto con 1 sola fg. Perigonio con lacinie variegate per piccole e numerose macchie rotonde, le 3 esterne ristrette in breve unghia (nel tipo subeguale alla lamina). — *Sic. mer.* (*Tod.*).

792 *Hermodactylus tuberosus.* — *M. Berico presso Vicenza* (*Bizz.*), *Colli di Asolo nel Trevigiano* (*Bolzon*), *Polesine a Bagnolo di Po* (*De Bonis*), *Guardasone presso Traversetolo nel Parmig.* (*Avetta e Casoni*), *Reggiano nei boschi di Selvapiana* (*Casali*), *Cesena presso la R. Scuola Agraria* (*Del Testa*).

α *typ.* **b. decoloratus Palanza** (N. G. b. it. 1897, p. 280). — Perigonio e viridi-flavescente, tinctura fusco-violacea omnino destituto. — *T. di Bari qua e là col tipo.*

β **longifolius (Sweet).** — Fg. radicali lunghe 90-120 cm., con circa 14 mm. di circonferenza. Tepali esterni bislungo-obovati e smarginati, gl' interni spatolato-oblunghi, lungam. cuspidati. — *It. mer.* (*Sweet*).

794 (2) *Gladiolus imbricatus* α *typ.* — *M. Serva nel Bellunese* (*Venzo*), *Pavese nei boschi del Ticino* (*Farneti e Cavara*), *M. Mottarone in prov. di Novara e colle di Superga presso Torino* (*Nobili, in litt.*), *in Cal. ed a Capri* (*Ten.*), *Basil. a Castel Lagopesole* (*Adr. Fiori*), *Gargano* (*Ten.*, *Adr. Fiori*).

β *illyricus.* — Indicato dubitativam. dell' It. mer. avendovi riferito il *G. imbricatus Ten.*, ma questo è il tipo vero della spec. e quindi tale indicazione va tolta. — *Sard. nei campi tra il Rivo del Fangario ed il villaggio di Elmas* (*Gennari ex Martelli in Bull. soc. bot. it. 1896, p. 221*).

795 (3) *G. segetum.* — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

γ **vexillaris (Martelli** in Bull. soc. bot. it. 1896, p. 221 ed in « Monocot. sard. »). — Perigonio assai più grande del tipo, di color roseo molto pallido, colla lacinia super. mediana eretta e quasi piana. — *Sard. presso Sassari a Cala du Pintore* (*Martelli*).

796 (4) *G. communis* = Gl. dubius Guss. — *Nel Lazio a Fiumicino e Carroceto, abbondante* (*Chiov.*), *Malta* (*Delicata*), *Giglio* (*Somm.*).

796 * **Antholyza aethiopica L.** = Gladiolus pyramidalis Burm. — *Origin. del Capo di B. Speranza; inselvat. alla Favorita presso Palermo, Capraia* (*Doria e Béguinot*) *ed Elba presso Porto Longone* (*Sommier*).

ORCHIDACEAE

800 (1) *Ophrys aranifera* γ *lunulata.* — *Eolie a Salina* (*Zodda*).

b. Bonoitii (Tin. ex Tod.) = Arachnites lunul. v. Bonoitiana Tod. — Labello convesso, spianato al margine, verde-giallognolo, con alla base tra le gibbosità una macchia glabra formata di 3 linee, con una trasversa congiungente in alto le 2 laterali. — *Palerm. specialm. a Gibilrossa nei monti calcarei* (*Tod.*).

δ *quadriloba.* — Potrebbe essere sec. G. Camus (Journal de Bot. 1893, p. 113) una *O. aranifero* × *lutea.*

ε *fucifera* **d. linearis Moggr.** — Tepali super. interni lineari-oblunghi. — *Sul lago di Garda a Maderno* (*Haussknecht*).

θ *specularia.* — *Lig. occ. alle foci della Nervia* (*Bicknell*).

ζ *atrata.* — *Colline moreniche del Bresciano* (*Ugolini*), *Lig. occ.* (*Bicknell*).

var. fissa Moggr. — *Presso Nago-Torbole sul lago di Garda* (*Murr*).

var. Todaroana (Macchiati). — Sec. G. Camus (Journal de Bot. 1893, p. 156) sarebbe una *O. aranifero* × *atrata.* — *Sard.* (*Macchiati*).

802 (3) *O. apifera* **var. purpurata (Tsch.,** in Flora 1831, p. 222) **Richter.** — *Italia* (*Tsch.*).

Digitized by Google

803 (4) *O. Bertolonii* α *typ.* **b. Landaueri Appel.** — Labello giallo-solfino, gli altri tepali bianco-puri. — *M. Brione presso Riva di Trento* (*Appel et Landauer*).

803 * *O. aranifero* × *Bertolonii* = O. Saratoi G. Cam. — J. Murr. (Deutsch. bot. Mon.-Schr. 1898, p. 217) distingue le tre for. seguenti:

a. O. pseudo-aranifera Murr, b. O. Pseudo-Bertolonii Murr, c. O. Gelmii Murr. — *Trento a S. Rocco e Vigolo-Vattaro ed a Nago sul lago di Garda* (*Gelmi, Murr*).

for. disjecta (Murr) — *Presso Nago* (*Murr*).

803 ** *O.* × *bilineata* = *O. Barlae G. Cam.*

804 (5) *O. Arachnites* β *oxyrhynchos.* — *Parmig. a Ponte Taro* (*Bolzon*), *presso Perugia* (*Palomba !*).

β¹ **obscura (G. Beck).** — Distinguesi dal tipo soprattutto per la gracilità di tutta la pianta e pel labello interam. glabro. — *Istria* (*Posp.*), *presso Nago sul Garda* (*Murr*).

γ *exaltata.* — Sec. Sommier sarebbe piuttosto da avvicinarsi alla *O. aranifera.* — *Isola del Giglio* (*Somm.*) *ed isolotto di Port' Ercole* (*Doria ex Somm.*).

b. virescens Somm. (1900). — Tepali esterni del perigonio verde-chiari, i due interni verde-lividi. — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

δ *Scolopax* **for. cornuta Barla.** — *Dintorni di Nizza* (*Barla*).

var. viridis Palanza (in N. Gior. bot. it. 1897, p. 282). — Perigonii phyllis exterioribus interioribusque viridibus. — *Murgie di Ruvo di Puglia* (*Palanza*).

804 * **O. arachnitiformis Gren. et Philip.** — *Dintorni di Nizza* (*Barla*).

804 ** **O. Nicotrae Zodda** (Malpighia 1900, p. 183, tab. VII). — Tepali esterni verdi, gl' interni piccolissimi, triangolari-subastati, cigliolati al margine; labello anteriorm. largam. espanso, un po' concavo, con gibbosità spesso nulle e con appendice apicale assai sviluppata rivolta all' insù, con linee bianco-azzurre nel centro e nel resto giallognolo con peli dorati; gimnostenio brevem. ed ottusam. rostrato. Molto vicina all' *O. tenthredinifera.* — *Sic. presso Barcellona al Colle Lazzeria e presso S. Lucia del Mela a Rocca Corvo* (*Zodda*).

804 *** **O. Arachnites** × **Bertolonii.** — *Valdonega presso Verona* (*Goiran*).

805 * *O. tenthredinifero* × *aranifera* = *O. Sommieri G. Camus.*

805 ** **O. aranifero** × **tenthredinifera** = O. Grampini F. Cortesi (in Annali di bot. I, p. 359, 1904). — Si avvicina all' altro ibrido *O. tenthredinifero* × *aranifera Somm.*, soltanto mostra prevalenti i caratteri di *O. aranifera.* — *Presso Roma nella Via Appia Antica* (*Grampini*) *e nel M. Testaccio* (*F. Cortesi*).

805 *** **O. aranifero** × **myodes** = O. hybrida Pok. — *Trento a Vigolo-Vattaro* (*Gelmi*).

for. apiculata (J. C. Schmidt). — *Colla prec.*

806 (7) *O. lutea.* — *Dintorni di Cesena* (*Del Testa*), *Isole Maltesi* (*Duthie*).

808 * **O. ripaensis Porta** (Accad. Sc. di Rovereto, 1905). — *Trent. nel territ. di Riva nei colli del M. Brione, assai rara a 100-200 m.* (*Porta*).

809 * *Serapias cordigera* × *Orchis papilionacea* = Orchi-Serapias Debeauxii G. Cam. = S. Debeauxii G. Cam.

809 ** *S. longipetala* × *Orchis laxiflora.* — Il Marchesetti (Fl. di Trieste, p. 533) ritiene che debba riferirsi a questo ibrido la *S. triloba* raccolta dal Tommasini in unico esemplare a Stramare presso Trieste. — *Bocca del torrente Nervia presso Bordighera* (*Bicknell*).

809 *** **S. Lingua** × **Orchis papilionacea Barla** = Orchi-Serapias Barlae G. Cam. = S. Barlae Richter. — *Alpi Mar.* (*Barla*).

810 (1) *S. Lingua* α *typ.* **c. pallida Tod.** — Fi. carnicino-pallidi, coi 2 tepali interni più stretti e col lobo medio del labello più lungo, acuminato. — *Dintorni di Palermo alla Favorita* (*Tod.*).

γ **maculata Zodda** (1902). — Fg. e base del fusto con macchie porporine; tepali esterni ottusetti, abbreviati, uguali o poco più lunghi dei lobi laterali, labello più pallido, retroflesso. — *Presso Messina al Castellaccio ed al M. Telegrafo* (*Zodda*).

810 * *S. cordigero* × *Lingua* = S. ambigua Rouy.

Digitized by Google

811 (2) *S. occultata.* — *Presso Ancona* (*Paol. e Card.*), *Eolie a Vulcano* (*Zodda*).

812 (3) *S. longipetala* c. **maculata Zodda** (1902). — Fg. e base del fusto muniti di macchie porporine. — *Messina* (*Zodda*).

var. refracta Murr (sub S. hirsuta). — *Trento a Vigolo-Vattaro* (*Murr*).

812 * *S. longipetalo* × *Lingua* = S. Grenieri Richter p. p.

813 (4) *S. cordigera.* — *Friuli a Monfalcone* (*Brumati*) *e Cividale* (*E. De Toni*), *Reggiano a Selvapiana* (*Casali*).

β **pallens Zodda** (1902) = S. occultata v. pallens Borzì = S. occult. v. pallida Borzì hb. — Pianta più piccola della for. genuina, a fusto senza macchie, fi. quasi metà più piccoli, più eretti, cereo-pallidi, a labello ovato-lanceolato, acuminato, per lo più appressato all'ovario. — *Messina al Castellaccio* (*Borzì*, *Zodda*).

814 *Aceras anthropophora.* — *Istria presso Veruda* (*Untchj*).

817 (2) *Orchis papilionacea* α *typ. b. rubra.* — *M. Musinè in prov. di Torino* (*Ferrari!*).

var. Destephani L. Marcello (1902). — Spiga lassa, povera; brattee strette, più lunghe dell'ovario. Labello subrotondo, oscuram. trilobo, ristretto alla base, *densam. pubescente di sopra*, crenulato; sperone breve, ottuso, lungo $^1/_2$ dell'ovario. — *Salernit. a Cava dei Tirreni ad Alessio* (*L. Marcello*).

818 (3) *O. Morio* α *typ.* **b. variegata Pampanini** (1903). — Fi. violacei, a labello bianco. *Ven. presso Vittorio* (*Pamp.*).

c. **immaculata Posp.** — Labello senza punteggiature violaceo-scure. — *Nell'area della spec.*

β *picta* = O. Morio v. longicalcarata Boiss. — *Tir. mer. presso Bolzano* (*Sauter*).

b. pictarosea Barla. — Fi. pallidi, bicolori. — *Nizza* (*Barla*).

c. **Champagneuxii** (**Barnéoud**) = O. Morio v. pictaalba Barla. — *Nizza* (*Barla ex G. Camus*).

818 * *O. Permorio* × *papilionacea* = O. Debeauxii G. Cam. — *In Cors. anche a Bonifacio* (*E. Petit*).

819 (4) *O. longicornu.* — *Nizzardo* (*Barla ex G. Camus*), *Cesenate sotto Roversano* (*Del Testa*), *Malta* (*Delicata*).

821 (6) *O. coriophora.* — *Malta* (*Delicata*).

822 * **O. ustulato × Morio.** — *Sul lago di Como a Tremezzina* (*Christ*).

822 * * **O. ustulato × pyramidalis** = O. coccinea Posp. — Portamento dell' *O. ustulata*, dalla quale distinguesi pel colore rosso-carmino del labello. Sprone lungo $^1/_2$ circa dell'ovario; tepali esterni conniventi; labello con 2 gibbosità alla base; masse polliniche libere. — *Reg. Illirica nell'estremità sud della Sabotina in tre località* (*Posp.*).

823 * *O. ustulato* × *tridentata.* — *Ven. presso Vittorio sui colli di Mondragon, rariss.* (*Pampanini*), *Veron. a Prebian e Castel d'Azan* (*Goir.*), *Pavese sotto il M. Oramala* (*Farneti*).

823 * * **O. tridentato × militaris Canut** = O. Canuti Richt. — *Veronese* (*Goir.*), *C. Ticino sopra Riva S. Vitale* (*Chenev.*), *Alpi Mar.* (*Barla*).

824 (9) *O. purpurea* β **moravica** (**Jacq.**). — Lobo medio del labello soltanto smarginato, senza punta manifesta nella smarginatura. — *Reg. Illirica* (*Posp.*).

824 * **O. purpureo × tephrosanthos.** — *Trent. fra Ravina e Margone* (*Gelmi*).

826 * **O. tephrosanthos × Aceras anthropophora Paol. et Card.** (1900) = O. Bergoni de Nanteuil = Aceras Vayrae Richter = A. Vayredae Rouy = A. anthrop. × O. Simia Vayr. = Orchi-Aceras Bergoni G. Cam. — *Lig. occ. a Bordighera presso Apricale* (*Bicknell*), *a Pietra alla Croce presso Ancona* (*Paol. e Card.*).

Oss. Il Bicknell nella sua «Flora of Bordighera and S. Remo» non fa menzione dell'altro ibrido *O. milit.* × *A. anthr.* di cui ci scrisse il Penzig (cfr. Fl. An. I, p. 242).

831 * *O. Morio* × *laxiflora.* — *Reg. Illirica a Prevali tra Mossa e Medana* (*Posp.*).

831 * * **O. laxifloro × coriophora** α **fragrans Bickn.** = O. Timbali Velen. — *Lig. occ. alle foci della Nervia e a Diano Marina* (*Bicknell*).

Digitized by Google

831 * * * O. palustri × coriophora Barla = O. Barlae G. Cam. — *Dintorni di Nizza* (*Barla*).
831 * * * * O. × Camusi Duff. — *Cors. a Biguglia* (*Fouc. et Sim.*).
833 (18) *O. mascula.* — *Elba* (*Bolzon, Somm.*).
a. obtusiflora Koch. — Lacinie perigoniali ottuse.
c. acutiflora Koch. — Lacinie perigoniali acute o brevem. acuminate. — *È la forma più comune.*
d. speciosa (Host) = O. mascula Jacq. — Lacinie perigoniali lungam. acuminate. — *Triest. al M. Volnig e M. Slaunig* (*Marches.*), *Goriz. ed Istria* (*Posp.*), *C. Ticino a Cavigliano* (*Chenev.*) *ecc.*
e. stabiana (Ten.) Rchb. — Labello a lobi dilatati, assai retusi, con crenulature tutte eguali; perigonio più breve che nella *for. speciosa.* Fg. senza macchie. — *Nell'area della spec.*
f. alba Goiran. — Fi. bianchi. — *Nell'area della spec.*
833 * *O. masculo × maculata* = O. Spitzelii Saut. — *Nel Bergamasco sopra Branzi e al Passo Tonale* (*Rodegher e Venanzi*), *Alpi Mar.* (*Marcilly ex G. Camus sub O. brevicornis*).
834 (19) *O. quadripunctata* — *Camp. alle Baghelle nel bacino del Liri* (*Falqui*).
835 (20) *O. provincialis* β *pauciflora* **for. calabra N. Terr.** (1889). — *Cal. presso Castrovillari ed al M. Pollino* (*N. Terr.*).
γ **Capraria Somm.** (1898). — Brattee più brevi dell'ovario. Labello a lobi interi, i laterali divergenti (non rovesciati all'ingiù), separati dal mediano da un seno rotondato ed aperto; tepali interni divaricati, allontanati dal ginnostemio; sperone suborizzontale appena curvato. — *Isola di Capraia a S. Rocco* (*Somm.*).
837 (22) *O. sambucina* β *insularis.* — *Elba* (*Sommier*).
839 (24) *O. maculata* α *typ.* **b. alpina Chenevard** (1902). — Alta 14-19 cm. ed a fi. più piccoli. — *C. Ticino* (*Chenev.*).
c. elabiata R. Keller (1903). — Fi. actinomorfi (peloria!). — *C. Ticino all'Alpe di Croce* (*R. Keller*).
for. nitescens N. Terr. (1889). — *Cal. a M. Sassone presso Castrovillari* (*N. Terr.*).
β *saccifera.* — *C. Ticino in più luoghi* (*Chenevard*), *dintorni di Napoli* (*Rippa*), *Salernit. nel territ. di Cava dei Tirreni* (*L. Marcello*).
γ **longibracteata Schur.** — Fg. infer. bislungo-lanceolate, senza macchie o con poche macchie verso l'apice, le super. gradatam. decrescenti. Brattee super. un po' più lunghe dei fi. e formanti un ciuffo all'epoca della fioritura. Perigonio lilla-scuro, con macchiette bianche alla base del labello. — Potrebbe essere ibrida tra *O. macul.* ed *O. latif.* v. *incarnata.* — *Goriz. presso il Molino di Sdobba* (*Posp.*).
δ **Meyeri Rchb. f.** — *C. Ticino presso Ligornetto* (*Chenevard*).
ε **helodes Rchb. f.** — *C. Ticino* (*Chenevard*).
839 * O. maculato × angustifolia. — *C. Ticino presso Ponte Brolla* (*Chenevard*).
840 (25) *O. latifolia* γ *angustifolia* = O. haematodes Rchb. — *Reg. Illirica sui M. Nanos e Planik* (*Posp.*), *presso Vittorio nel Trevigiano* (*Pampanini*), *Canton Ticino a Ponte Brolla* (*Chenev.*).
840 * O. bosniaca Beck (1887). — *Istria* (*Klinge*).
840 * * O. latifolio × sambucina = O. monticola K. Richt. — *C. Ticino sopra Airolo* (*Chenevard*).
840 * * * O. latifolio × maculata = O. Braunii Hal. — *C. Ticino sopra Airolo, sopra Losone, a Fusio ed in Val Sambuco* (*Chenev.*).
840 * * * * *O. latifolia × Gymnadenia conopsea* = Orchi-Gymnadenia Lebrunii G. Camus.
841 (1) *Gymnadenia albida.* — *Nel Goriz. scende anche al piano presso Monfalcone a Porto Rosega* (*Posp.*), *Camp. al Picinisco allo Zaffineto* (*N. Terr.*).
b. tricuspis G. Beck. — Labello coi lobi laterali lunghi come il mediano o più. — *C. Ticino al M. Generoso ed a Pizzo Masne a 2100 m.* (*Chenev.*).
842 (2) *G. odoratissima.* — *Anche nell'Istria.*

Digitized by Google

b. Idae Goir. — Forma piccola, a spiga lassa, breve ed a pochi fi. — *Veron. in riva all' Adige sulle ultime pendici del M. Baldo* (*Goir.*).

c. oxyglossa G. Beck. — Labello quasi intero, spesso acuto. — *C. Ticino a S. Martino* (*Chenev.*) *e Trent. a Vigolo-Vattaro* (*Murr*).

843 (3) *G. conopsea.* — *Basil. al Vulture* (*N. Terr.*).

843 * **G. conopseo × odoratissima.** — *Trento a Kalisberg* (*Murr*).

844 *Nigritella nigra α typica* **b. rosea Gelmi** (1898). — Differisce dal tipo solo pei fi. rosei.

β *rubra* (*K. Richter*, 1890) = Gymnadenia Wettst. (1889) (Fl. An. I, p. 247 [for. b]). — Distinta dalla *for. rosea* del tipo, pei fi. di un bel color roseo o rosso in spiga cilindrica od ovato-allungata (non ovato-conica), pei tepali più larghi e pel labello ovato coi margini alla base rialzati così da formare un tubo (non triangolare, ristretto alla base e coi margini appena rialzati) (ex Gelmi). — *Alpi or.*

844 * *N. nigra × Gymnad. conopsea* = Gymnigritella suaveolens G. Camus.

844 ** *N. nigra × G. odoratissima.* — *M. Baldo sotto alle Sengie di Valfredda* (*Goir.*).

846 (1) *Coeloglossum viride* **b. bracteatum (Parl.)** = Orchis W. — Pianta a statura maggiore, con brattee sino a 2-3 volte più lunghe dei fi. e labello trilobo. — *C. Ticino a Corona di Redorta* (*Chenev.*) *ecc.*

850 *Malaxis monophylla.* — *Reg. Illirica presso Wippach* (*Posp.*).

852 *Corallorhiza Neottia.* — *Camp. al Picinisco allo Zaffineto* (*N. Terr.*), *Avellinese a Montevergine* (*Milani*).

859 *Epipogium aphyllum.* — *Reg. Illirica sul M. Orliak* (*Posp.*).

864 (1) *Epipactis palustris.* — *Cal. nel bacino del Lao* (*Longo, Fiori*) *e presso Castrovillari* (*N. Terr.*).

865 (2) *E. latifolia.* — *Istria sul M. Maggiore* (*Calegari in litt.*).

SALICACEAE

869 (3) *Salix fragilis.* — *Sard. nel circondario di Tempio* (*Tabacchi !*).

870 (4) *S. triandra b. amygdalina.* — *Elba* (*Sommier*), *Sard. centr. a Sorgono* (*Cavara !*).

d. tenuiflora (Host). — Amenti masch. più gracili, i femm. più lunghi; stimma bifido. — *Triestino* (*Marches.*).

870 * **S. speciosa Host** = S. alopecuroides Celak. = S. amygdalino × fragilis (?) Wimm. — *Rive dell' Isonzo a S. Pietro tra i genitori* (*Pospichal*).

872 (6) *S. purpurea.* — *Elba* (*Sommier*).

872 * **S. purpureo × nigricans.** — *M. Bondone di Trento* (*Gelmi*).

872 ** *S. purpureo × aurita et var.* — Sotto questa formola si comprendono i 3 ibridi:

a) *purpureo × cinerea* = S. Pontederana W., Koch = S. sordida Kern. — *Istria nella valle della Rasa al di sotto di Kazle* (*Posp.*).

b) *purpureo × Caprea* = S. Wimmeriana Gr. et Godr. = S. discolor Host (non Whlnb.).

c) *purpureo × grandifolia* = S. austriaca Host.

874 (8) *S. incana* **var. lavandulaefolia (Lap.)** = S. angustifolia Poir. — *Presso Trieste* (*Pospichal*).

876 (10) *S. daphnoides.* — *Basil. nel bosco di Gallipoli-Cognato* (*Giordano*).

877 (11) *S. hastata.* — *Trovasi nel Veronese anche sui Lessini* (*Goiran*).

878 (12) *S. phylicifolia* β *nigricans* **c. concolor Koch.** — Fg. verdi e nitide di sotto. — *Trentino* (*Gelmi*).

879 (13) *S. aurita α typica.* — *Istria a Parenzo* (*Calegari*), *Istria sett. in più luoghi* (*Posp.*).

γ *grandifolia* **b. angustifolia Kern.** — *M. Vasone di Trento* (*Gelmi*).

879 * **S. Capreo × nigricans Brunn** = S. latifolia Forb. = S. badensis Doell. — *Trentino a Povo* (*Gelmi*).

879 ** **S. grandifolio × Arbuscula** = S. fruticulosa Kern. — *M. Vasone di Trento* (*Gelmi*).

880 * *S. ambigua Ehrh.* — *Lungo l' Isonzo tra S. Pietro e Villesse* (*Pospichal*).

Digitized by Google

881 (**15**) *S. Lapponum.* — Manca tra noi il tipo proprio delle reg. artiche e dei Sudeti, abbiamo invece soltanto la var.:

β **helvetica** (**Vill.**). — Intermedia tra il tipo e la var. *glauca.*

b. velutina Ser. — Fg. più densam. pelose (vellutato-tomentose) sulle due pag., ma un po' meno di sopra. — *C. Ticino a Pizzo Dromegio e Pizzo Piancaccia a 2200-2350 m.* (*Chenevard*).

γ *glauca* (*L.*) (cfr. Fl. An. I, p. 260 [var. β]).

881* *S. hastato* × *helvetica Kern.* = S. Huteri Kern. = S. hastato × Lapponum Fiori in Fl. An. I, p. 260.

881** *S. Arbusculo* × *helvetica Gürke* = S. spuria Schleich., W. = S. Lapponum × Arbuscula Wimm. (Fl. An. l. c.) = S. helvetico-Myrsinites Kern.

881*** **S. glauco** × **hastata Gürke** = S. hastato × glauca Floder. — *C. Ticino in val Blenio al Pizzo Scai* (*R. Keller*).

881**** **S. glauco** × **Myrsinites Gürke** = S. Normani Anderss. — *C. Ticino in val Blenio al Pizzo Scai* (*R. Keller*).

882 (**16**) *S. Myrsinites.* — Si modifichi così la chiave delle var.:

a Fg. verdi in ambedue le pagine, piccole. Antere vuote violaceo-brune. Frutice alto 3-4 dm. al massimo.

α *typica.* — Fg. denticolato-glandulose, — alla fine del tutto glabre o talora (*b. lanata Koch* = v. pilosa Rchb. = for. c. Fl. An. I, p. 261) lanoso-sericee su ambedue le pagine. Cassula talora (**c. lejocarpa Koch**) alla fine glabra.

β *Jacquinii* (*Host*, 1797) = S. fusca Jacq., non W. = S. Jacquiniana W. (1805) = var. α for. b. Fl. An. l. c. — Fg. affatto intere, — cigliate ed alla fine glabre o talora (**b. incana Rchb.** pro v. S. Myrsin.) bianco- sericee. — *Alpi or.*

b Fg. glauche almeno di sotto, — ecc. (cfr. Fl. An. I, p. 261).

γ *Arbuscula* (*L.*) (cfr. Fl. An. l. c. [var. β]).

a. Waldsteiniana (**W.**) **Koch** = S. coruscans Sturm = S. ovata Ser. — Fg. a denti distanti ed appressati. Stilo quasi sempre profondam. diviso. — *Alpi.*

b. foetida (**Schleich.**) **Koch** = S. alpina Sut. — Fg. a denti avvicinati, terminati da una glandula più grossa. Stilo generalm. indiviso. — *Alpi.*

c. prunifolia (**Sm.**) **Koch** = S. venulosa et carinata Sm. — Fg. a dentatura un po' ondulata. Squame rossiccie. Stilo breve, poco allungato dopo l'antesi. — *Tir. mer. al Seiseralpe* (*Sauter*).

d. integrifolia M. Gortani (1903) — Fg. interissime al margine. — *Friuli nella Carnia* (*Gortani*).

885 (**19**) *S. retusa.* — *Camp. al Picinisco ai Treconfini* (*N. Terr.*), *Basil. alle falde del M. Arioso* (*Giordano*).

α *typ.* **b. rotundato-obovata R. Keller** (1903). — Fg. rotondo-obovate (5-9 per 4-8 mm.), con 7 paia di nervi un po' anastomosati — *C. Ticino in Val Blenio a Costa* (*R. Keller*).

γ **pedemontana Beyer** Beitr. Fl. Grisanche u. Rhêmes, p. 27 (1891). — *Aosta in Val Grisanche* (*Beyer*).

886 (**1**) *Populus nigra* β *italica* (*Duroi*, 1772) = P. dilatata Ait. (1789) = P. pyramidalis Roz. (1790), Salisb. (1796) (Fl. An. I, p. 262).

γ **neapolitana** (**Ten.**, 1835) = P. pannonica Kit. (1821) (nomen nudum). — Albero a corteccia grigiastra, meno screpolata. Fg. più larghe che lunghe (nel tipo più lunghe che larghe). — Rametti cilindrici e glabri od anche (*b. caudina* [*Ten.*]) angolosi e villosi assieme ai giovani picciuoli. Legno nella for. b. di qualità assai migliore. — *Colt. nel Nap. ed altrove.*

888 (**3**) *P. tremula* **a. genuina** = P. tremula Ten. — Rami giovani pubescenti. Fg. giovani subtomentose, da adulte peloso-biancastre di sotto, a picciuolo uguale o più breve della lamina.

b. australis (**Ten.**). — Rami giovani glabri. Fg. adulte glabre, glauche di sotto, a pic-

Digitized by Google

ciuolo esile più lungo della lamina, ch'è circa $^1/_2$ più piccola che nella forma genuina (ex Ten.). — *It. mer. ecc.*

c. **parvifolia Goir.** — Frutice basso, a fg. 2-3 volte più piccole del normale. — *M. Baldo presso l'Altissimo di Nago* (*Goir.*).

889 (4) *P. alba* β **nivea** (W.). — *Cors.* (*Math. ex DC. Prodr. XVI 2, p. 324*).

889 * *P. albo* × *tremula* **b. denudata** (A. Br. in Hartig.) — *Pisano* (*Savi ex DC. l. c.*).

BETULACEAE

892 (2) *Alnus alnobetula Hartig.* (1851) = Betula Ehrh. (1788) = B. viridis Chaix in Vill. (1789) = A. viridis DC. (1805) (Fl. An., I, p. 264).

γ *brembana* (*Rota*, 1853) = A. viridis v. pumila Ces. exs. ex Regel in DC. (1868) = v. parvifolia Regel in DC. (1868) (Fl. An. I, p. 264), non Sauter exs. ex Rchb. (1850) (quae planta omnino diversa, ex Winkler in Engler Pflanzenreich IV, 61, p. 107). — *M. Lessini Veronesi* (*Goir.*), *Cors. nella foresta di Vizzavona* (*Mand. et Fouc.*).

893 (3) *A. glutinosa*, **d. barbata C. A. Mey.** — Fg. a nervature secondarie pubescenti. — *Veronese* (*Goiran*).

894 (4) *A. incana c. glauca* (*Michx.*, *1813*, *pr. sp.*), *Ait.* (*1813*, *pr. var.*).

d. pinnata Lund. (1790) = v. pinnatifida Whlnb. (1824), Spach (1841) (Fl. An. I, p. 264) = v. laciniata Regel (1861).

e. **subrotunda Callier** (1891). — *C. Ticino a Frasco* (*Chenevard*).

f. **subargentata Callier.** — *C. Ticino sopra Peccia* (*Chenevard*).

893 * *A. glutinoso* × *incana*. — *Lungo l'Adige presso Verona* (*Goiran*). — Pampanini ci riferisce che avendo ricercato di nuovo questo presunto ibrido nella località presso Vittorio, non vi ha ritrovato che *A. incana typica*, ed è quindi propenso a ritenere che il primo esemplare, che servì per la determinazione, rappresentasse una variazione accidentale.

894 * **A. incano × viridis.** — *C. Ticino in val Blenio a Campra* (*R. Keller*).

894 ** *A. incano* × *glutinosa* **var. ambigua Beck** = A. Beckii Callier. — *C. Ticino a Sparvè in Val d'Osola* (*Chenevard*).

CUPULIFERAE

897 *Ostrya carpinifolia?* — *Elba* (*Sommier*) (*an Carpinus Betulus?*).

898 *Corylus Avellana c. glomerata Ait.* (1813), *Dochn.* (1860).

d. grandis Lam. (1804), *A. DC.* (1864) = v. sphaerocarpa Rchb. (1850) (Fl. An. I, p. 267) = v. pedemontana Dochn. (1860).

e. **glandulosa** (**Shuttlw.**). — Involucro frutt. con numerose glandule alla base. Frutto globuloso, appena compresso. — *C. Ticino tra Frasco e Sonogno* (*Chenevard*) *e certam. altrove.*

β *maxima* (*Mill.*, 1759) = C. rubra Borkh. (1800) = C. tubulosa W. (1805) (Fl. An. I, p. 267).

898 * *C. Colurna L.* — *Nat. in alcuni giardini di Verona presso S. Zeno* (*Goiran*).

899 (1) *Quercus Robur* α *pedunculata* **for. brutia** (**Ten.**, 1825). — *It. mer.* (*Ten.*).

for. heterophylla Loud. (1838) = Q. pinnatifida Lasch (1857) = Q. Robur v. laniciata DC. (1864). — *Italia* (*ex Gürke in Richter*).

for. macrobalanos, malacophylla et microbalanos Schur (Oest. bot. Zeit. VII, p. 3-4 [1857]). — *Veronese* (*Goiran*).

for. macrophylla Lasch, in Bot. Zeit. 1857, p. 413. — *Italia* (*ex Gürke in Richter*).

for. sessilis et sublyrata Bér. ex Borzi (Fl. Forest. Ital. p. 156 [1880]) (sub Q. pedunc.). — *Italia.*

γ *apennina.* — *Nell'Istria* (*Pospichal*).

for. Tommasinii (Kotschy). — *Istria.*

Digitized by Google

δ *sessiliflora* **for. australis Kotschy** = Q. tergestina Wg. — Fg. a lobi profondi, per lo più ottusi, di sotto con brevi peli. Gemme ovate. Frutti di solito geminati, a cupola glabrescente e squame ovate. — *Comunissima in tutto il Triest.* (*ex Marches.*).

for. congesta (Presl) = A. conglomerata Ten. hb. ex Borzì. — *Italia.*

for. crispata, intermedia, lobatissima, macrophylla, parvifolia, sublobata Bér. in Borzì (Fl. forest. Ital. p. 162 [1880]) (sub Q. Robur). — *Italia.*

for. Raineri Bér. (Antic. Stor. for. in Ital., tab 1 B). — *Italia.*

ε *Virgiliana* **for. Cupaniana (Guss.).** — *Sicilia.*

ζ *Dalechampii.* — *Istria* (*Pospichal, sub Q. croatica var. Tenorei*).

η *cuneata.* — *Dintorni di Perugia* (*Palomba in litt.*).

ι *lanuginosa* **for. australis (Kotschy).** — Fg. a lobi profondi, ottusi, pelose di sotto lungo il nervo mediano e con peli brevissimi sulla lamina. Squame della cupola ovate, acuminate. — *Comune nel Triest.* (*ex March.*).

for. acutiloba Borb. (1879), **Bér. in Borzì** (1880). — *Italia.*

for. canescens, Gussonei, macrolepis, microphylla, peduncularis Borzì (l. c., p. 162-63). — *Italia.*

for. microcarpa et macrocarpa Guss. ex Borzì (l. c.). — *Italia.*

for. roburoides Bér. (Antic. forest. in Ital., p. 293). — *Italia.*

899 * Q. lanuginoso × sessiliflora Gürke for. Kerneri (Simk. 1883). — *Istria* (*ex Gürke in Richter*).

899 ** Q. sessilifloro × Farnetto Chiovenda (Malpighia 1898, p. 417). — *Laz. a Castel Porziano* (*Chiov.*).

899 *** (1 bis) **Q. Toza Gillet ex Bosc.** in Lam. (1792) = Q. Tauzin Pers. (1807) = Q. pedemontana Colla (1836) = Q. Tanzini Bub. (1897). = Q. Robur θ pedemont. Fiori p. p. (Fl. An. I, p. 269). — Sec. Borzì (Boll. Orto Bot. Palermo 1905, p. 40) è questa una buona spec. che distinguesi da *Q. sessiliflora* per le fg. profondam. pennatifide, con lacinie piuttosto strette e bislungo-sinuate, con tomento denso e morbido, giallastro o talora cenerognolo, che riveste anche i ramoscelli. — *Piem. in Val di Susa a M. Musinè* (*Perret in hb. Colla*), *alla Sacra di S. Michele* (*Fontana*) *e a Monpantero* (*Ferrari e Berrino*) [*Franc. mer.-occ. Pir.*]).

β **brachyloba Borzì** (Boll. l. c., p. 43). — Fg. più piccole (lunghe 5 cm. al più), a lobi brevi, triangolari, spesso interi, ottusam. mucronulati all' apice. — *Val di Susa presso la Sacra di S. Michele* (*Fontana*).

γ **glabrescens Borzì** (Boll. l. c.). — Fg. mediocri, sinuato-lobate, a lobi stretti, grossam. ed irregolarm. angoloso-dentati, glabre di sopra, densam. tomentose di sotto sui nervi per peli giallastri e nel resto glabre. — *Val di Susa presso la Borgata Brun vicino alla cascata del Seghino* (*Mattirolo e Ferrari*).

899 **** (1 ter) **Q. vulcanica Boiss. et Heldr.** = Q. aurea Kit., Wierzb. = Q. pinnatiloba C. Koch = Q. apennina et Q. amplifolia Guss.hb. p. p. = Q. Robur θ pedemontana Fiori p. p. (Fl. An. I, p. 269). — Sec. Borzì (Boll. Orto Bot. Palermo 1905, p. 43 e seg.) è anche questa, come la prec., una buona spec., che ha caratteri intermedi tra *Q. sessiliflora* e *Q. conferta:* dalla prima distinguesi soprattutto per la tendenza nelle fg. *a persistere verdi sulla pianta tutto l'inverno*, per le fg. stesse più ampie e spesso a divisioni più profonde, per gli amenti masc. più lunghi, più gracili e più radi e per gli stimmi lunghetti, semplici e assottigliati all' apice (nella *Q. sessiliflora* invece sono corti, dilatati, bipartiti ed ispessiti); da *Q. conferta* distinguesi specialm. per la corteccia del tronco di colore più scuro e con screpolature meno profonde, più numerose e più regolari e per la lunghezza dei picciuoli. — *Istria, Terra di Lavoro* (*N. Terr. sub Q. Farnetto*), *Calabria e Sicilia; l' indicazione del Tirolo* (*Wenzig*) *probabilm. è errata.* [*Pen. balcan. Grec. As. min.*].

α **typica Borzì** (Boll. l. c.). — Fg. glabre di sopra, più o meno pubescenti di sotto specialm. sui nervi od alla fine glabre o quasi. — *Cal. nei boschi di Gioja-Tauro* (*Cardinale, Gerace*) *e Colli di Palermo a Boccadifalco* (*Tineo, Guss., Tod.*).

Digitized by Google

β **pinnatifida Borzi** (Boll. l. c.). — Rametti densam. cenerino-tomentosi. Fg. profondam. pennatifide, a seni stretti e lacinie irregolarm. lobato-dentate, sparsam. pelose di sopra per peli stellati, tomentose di sotto. — *Terra di Lavoro nei boschi di Carditello e presso M. Cassino* (*N. Terr.*) *e Sic. nei boschi di Valdemone* (*Todaro*).

γ **nebrodensis Borzi** (Boll. l. c.). — Rametti cenerino-tomentosi. Fg. sinuato-pennatifide, a seni ampi e lacinie intere o raram. smarginate sotto l'apice. — *Sic. alle Madonie nei boschi di Castelbuono* (*Minà-Palumbo*) *e colt. nel R. Orto Bot. di Palermo* (*Borzi*).

899 ***** (1 quater) *Q. conferta.* — *L'area di questa spec. in Italia comprende, sec. Borzì* (*Boll. l. c., p. 48*), *il Lazio mer., la Terra di Lavoro ed una parte degli Abbruzzi sino al M. Gargano.*

a. minor Ten. (Syll. p. 470), **b. sublobata Borzi** (Fl. forest. Ital. p. 166 [1880]), **c. arrioides Borzì** (Fl. forest. l. c.). — *Nell'area della spec.*

899 ***** (bis) **Q. Farnetto × pedunculata Chiovenda** (l. c.). — *Laz. presso Anzio a circa 4 km. andando verso Carroceto* (*Chiov.*).

900 (2) *Q. Cerris* **for. canescens Goiran.** — Simile alla forma *Tournefortii*, ma con rami e fg. biancastre e stipole lunghissime, per lo più superanti il picciuolo (= Q. crinita Lam.?) — *M. Baldo.*

900 * **Q. Cerris × lanuginosa Gürke** = Q. crispata Stev. = Q. undulata Kit. — *Istria* (*ex Gürke in Richter*).

900 ** *Q. Cerris × Suber* = Q. Pseudo-Suber Santi. — *Istria; rara* (*Pospichal*).

for. Gussonei DC. (sub Q. Pseudo-Suber) = Q. haliphleos Guss. (non Lam.). — Fg. ottusam. lobate, a lobi appena mucronati. Frutto più grande. — *Sicilia.*

for. aegylopifolia (Pers.) = Q. hispanica var. β Lam. — *Istria* (*ex Gürke in Richter*).

for. Fontanesii (Guss.). — *Istria* (*ex Gürke*), *Cal. e Sic.* (*Guss.*).

901 (3) *Q. Aegilops* β *macedonica* **b. crispata Palanza in Jatta.** — Fg. increspate al margine. — *Barese nella selva di Fasano* (*Palanza*).

902 (4) *Q. coccifera L.* — *Polesine* (*A. Terr., ex hb. Tovajera*), *diffusa nei muri a secco. in parecchi luoghi in prov. di Bari* (*Palanza*).

β *calliprinos* **b. dasyantha Wenzig.** = Q. coccif. v. dasyantha DC. f. = Q. pseudococcifera Huet. — Perigonio dei fi. masc. lungam. villoso, 2-5-fido ovvero bipartito, con i lobi 2-3-fidi. — *Sic. a Scoglietti* (*Huet*).

903 (5) *Q. Suber* α **vulgaris a. integrifolia Borzi** (Fl. Forest. ital. p. 175 [1880]), **b. crinita Borzi** (l. c.), *c. Bivoniana* (*Guss.*) (Fl. An. I, p. 270) [for. b]). — *Nell'area della spec.*

β *occidentalis* (*J. Gay*) (Fl. An. l. c. [for. c]) = β serotina Borzì.

for. brachylepis et racemosa Borzi (l. c.). — *Sardegna.*

903 * *Q. Ilex × Suber.* — *Lazio alla Capocotta e presso Anzio* (*Chiov.*).

904 (6) *Q. Ilex* **a. oleaefolia Tomm. ex Marches.** — Fg. uniformi, bislungo-lanceolate, intere, sinuate o con pochi denti. — *È la forma sotto la quale si presentano le piante adulte d'alto fusto.*

for. brachycalyx, microbalana et parvifolia Borzi (Fl. forest. Ital. p. 169 [1880]). — *Nell'area della spec.*

for. conocarpa, constricta, cylindrocarpa, Dehnhardtii, denudata, fimbriata, geminiflora, intermedia, lacera, macrophylla, oleaefolia, operculata, polycarpa, sphaerocarpa, strangulata, subocculta et undulata Ten. (Syll. p. 472-74 [1831]). — *Nell'area della spec.*

904 * **Q. Ilex × pedunculata Chiovenda** (Malpighia 1898, p. 416). — *Laz. al Quartaccio di Maccarese* (*Chiov., Pappi*).

905 *Castanea sativa* **b. androgyna Ugolini** (1902). — Amenti a fi. in gran parte o totalm. femm. — *Bresciano sopra Bagolino* (*Ugol.*).

906 *Fagus silvatica.* — *Anche nell'Istria.*

b. purpurea Ait. (1789) = var. sanguinea Rchb. (1830-32) (Fl. An. I, p. 271).

Digitized by Google

c. **angustifolia Ugolini** (1902). — Arbusto a fg. strette e brevi, quasi lanceolate. — *Bresciano in Valtrompia sulla dolomite a 1050-1100 m.* (*Ugol.*).

PLATANACEAE

902 (1) *Platanus orientalis* c. **cuneata** (Ten.). — *Basil. nella Fiumara di Staffoli nel Cilento* (*Giord. ex Ten.*), *Verona* (*Goir.*).

URTICACEAE

910 (2) *Ulmus campestris* d. **microphylla Goir.** (1890). — Piccolo frutice sdraiato al suolo e quasi repente, a fg. sempre piccolissime. — *Veronese* (*Goir.*).

912 (1) *Celtis australis* β *microphylla Goiran*, è la *C. occidentalis* (cfr. Ajuti in Bull. soc. bot. it. 1894, p. 42).

912 * **C. occidentalis L.** = C. austr. v. microphylla Goir. — *Verona ai piedi del colle di S. Bernardo* (*Goiran*) *; origin. dell' Amer. sett.*

915 (1) *Morus alba var.* **silvestris Goiran.** — Fg. per lo più a 3-5 lobi, raram. indivise, scabre; rami pungenti e spesso spinescenti. — *È la pianta spontanea nata da semi.*

918 * **Humulus japonicus Sieb. et Zucc.** — *Questa spec. origin. della Cina e Giap. fu trovata inselvatic. in Tosc. presso Viareggio a Torre del Lago in una siepe lungo la via di contro alla villa del Maestro Puccini in vicinanza di una casa colonica* (*Adr. Fiori*, in Sett. 1903).

922 (3) *Urtica urens.* — *Malta* (*Delicata*).

924 (5) *U. dioica* α *typ.* e. **elegans Chenevard** (1904). — Pianta con peli urticanti rari o nulli. Fg. finam. dentate (le infer. a denti larghi 2 mm. alla base ed alti 2 mm., le super. a denti aventi $^1/_2$ di tali dimensioni). Spighe femm. lunghe 1-3 cm. — *C. Ticino alla stazione di Locarno* (*Chenevard*).

925 (6) *U. atrovirens* **for. floribunda et angustifolia Wedd.** (1856-57). — *Nell' area della spec.* (*ex Gürke in Richter*).

926 (1) *Parietaria officinalis* β *judaica* b. **latifolia Strobl** (in Flora 1881, p. 367, sub P. diffusa). — *Sicilia* (*Strobl*).

927 (2) *P. lusitanica.* — *Muri a Cesena* (*Del Testa*).

α **typica.** — Involucro bratteale dei fi. a lacinie ovato-lanceolate, appressate ai calici frutt. e lunghe come questi.

β **filiformis** (Ten.). — Involucro bratteale dei fi. a lacinie lineari-lanceolate, alla fine quasi patenti e più lunghe dei calici frutt. Fusti più allungati che nel tipo. — *Capri, Ischia.*

LAURACEAE

932 *Laurus nobilis.* — *Colt. nella bassa Valle d' Aosta sino a 1050 m. circa* (*Trèves*).

THYMELAEACEAE

938 (6) *Daphne Mezereum.* — *Appenn. camp. nel bacino del Liri in più luoghi* (*Falqui*), *Avellinese* (*Ten.*, *Casali e Ferraris*), *Cal. citer. al M. Cozzo del Pellegrino presso S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

b. **serotina Goiran.** — Fg. e fi. coetanei. — *Nella reg. alp. nel Veron. Lugl., Ag.* (*Goir.*).

942 (4) *Thymelaea hirsuta.* — *Anche entro terra come in Basil. a Bernalda e Pomarico a S. Lorenzo* (*Giordano*).

Digitized by Google

SANTALACEAE

943 *Osyris alba.* — *Romagne nella pineta di Cervia* (*Del Testa*).

b. scadens Goiran (Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 377). — Fusti ramosissimi, deboli, scandenti, alti sino 1 $^1/_2$-2 m., con rami esili e lunghissimi, con fi. addensati. — *Dintorni di Nizza* (*Goir.*).

c. megalocarpa Goiran (Bull. Soc. bot. it. 1905). — Drupe 3-4 volte maggiori che nel tipo. — *Presso Nizza alla Lanterna* (*Goir.*).

945 (2) *Thesium humile.* — *Tosc. al M. Argentario* (*Doria ex Somm.*) *ed all'is. di Pianosa* (*Somm.*), *Basil. a Pomarico* (*Giordano*), *Isole Maltesi* (*Delicata, Duthie*).

946 (3) *Th. alpinum.* — *Camp. al M. Settefrati* (*N. Terr.*).

γ *pratense.* — *Avellino a Montevergine* (*Cas. e Ferr.*).

var. altissimum Beyer (in Beitr. Fl. Gris. et Rhêmes p. 26 [1891]. — *Aosta in Valgrisance* (*Beyer*).

947 (4) *Th. linophyllum* β *Parnassi.* — *App. abruzz. nel territ. di Villavallelonga a Coppo Cico a 1900 m.* (*Grande L. f.*), *Cal. sulla vetta del M. Cozzo del Pellegrino presso S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

γ *intermedium* **b. fulvipes** (**Griessel.**). — Frutti portati da un peduncolo carnoso, lungo 2-5 mm., di un bel colore giallo-fulvo nel secco. — *Gargano tra M. S. Angelo ed il bosco Umbro* (*Adr. Fiori*).

c. italicum (**A. DC.**) = T. intermedium Guss. pl. rar. — *Alpi Apuane, Abr. e Sard.* (*ex DC.*), *Cors.* (*ex Gürke in Richter*).

d. pumilum Guss. ex Arc. — Pianta assai bassa. Frutti quasi globosi, con coste rilevate e nervi secondari interposti. — *Habitat?*

δ *montanum* **b. serrulatum Ten. ex Arc.** — F. seghettato-scabre. — *Sul M. Vulture* (*ex Arc.*).

LORANTACEAE

948 *Loranthus europaeus.* — *In Cal. parassita anche sugli olivi* (*Pasquale*).

949 *Viscum album* β *laxum.* — *Abbondantissimo a Tremosine nel Bresciano sul Pinus silvestris* (*Ugolini*), *nel Veron. ad Ala* (*Goir.*) *ed in Val d'Aosta sempre sullo stesso Pinus* (*Trèves*), *nei monti del Nizzardo sul Pinus silvestris e sul Juniperus oxycedrus* (*Goiran*).

ARISTOLOCHIACEAE

958 (5) *Aristolochia longa* γ *pallida.* — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

POLYGONACEAE

959 (1) *Polygonum Fagopyrum* **b. laxum Goiran.** — Fusto allungato, suffrutescente alla base, quasi strisciante. — *Veronese.*

c. pusillum Goiran. — Forma pusilla, densam. cespugliosa. — *Veronese.*

961 (3) *P. Convolvulus* **for. parvifolium Goiran.** — Fusto ramosissimo, fg. tutte assai piccole. — *Forma serotina.*

962 (4) *P. dumetorum.* — *Isola di Capraia* (*Req.*).

var. montanum Ciccioni (N. G. Bot. it. 1889, p. 267). — Perigonio frutt. sprovvisto di ali come nel *P. Convolvulus*, ma in tutto il resto simile a *P. dumet.* — *Umbria sul M. Tezio* (*Cicc.*).

964 (6) *P. Bistorta* **b. confusum** (**Meisn.** 1832) = v. angustifol. Meisn. (1856). — Fg. più strette, le infer. bislungo-lanceolate, le super. lanceolate o lineari. Spiga spesso più breve. — *Col tipo.*

Digitized by Google

c. **capitatum C. Koch** (1847) = v. minus Meisn. (1856). — Pianta alta 10-30 cm., a fg. radicali lunghe (compreso il picciuolo) 3-6 cm. e spiga ovoideo-subglobosa (lunga 15 mm. circa). — *Col tipo nei luoghi alp.*

969 (11) *P. Hydropiper* β *mite* (*Schrank*). — Piuttosto che una forma ibrida crediamo meglio considerarlo come var. di *P. Hydropiper*. — *Trovasi in Cors. anche a Propriano* (*E. Petit*).

969 * **P. Hydropiperi** × **serrulatum Nicotra** ex Nym. Consp. Suppl. p. 272 (1889-90). — *Sicilia.*

969 ** *P. mite* × *Persicaria* = P. axillare Rigo. — *Caprino Veronese* (*Goiran*).

970 (12) *P. minus.* — *Laz. presso Torre Astura* (*Chiov. e Pappi*).

970 * *P. minori* × *Persicaria.* — *Veronese presso Geraino e Brentin* (*Goiran*).

970 ** **P. serrulato** × **nodosum Nicotra** ex Nym. l. c. — *Sicilia.*

973 (15) *P. aviculare* α *typ. b. minimum Murith* (1810) = P. nanum Bory (1820) (Fl. An. I, p. 295).

for. Debeauxii (**Le Grand,** 1883). — Differisce dalle numerose forme di *P. aviculare* pel suo portam., per le sue lunghe spighe lasse e flessuose e soprattutto per gli acheni piccoli (lunghi 2 mm.), trigoni, a facce profondam. scavate, biondi, lucenti, finam. punteggiati, sagrinati. — *Cors. allo stagno di Biguglia* (*Debeaux ex Le Grand*).

for. congestum Marchesetti. — Internodi abbreviati. Fg. ovate, ottuse. Spighe assai dense. — *Triestino* (*Marches.*).

974 (16) *P. romanum.* — Da radiarsi la loc. di Caprino nel Veronese, essendo la pianta indicata con tal nome una forma gigantesca di *P. aviculare* (*Goiran*). — *Maremma tosc. ad Ansedonia* (*Chiovenda*).

976 (18) *P. equisetiforme* α *typicum.* — *Barese alla Selva di Fasano* (*Palanza*).

γ *elegans.* — *Cresce nei terreni umidi, fortem. argillosi ed in Basil. non sale più in alto di 540 m.* (*Giordano*).

977 *Emex spinosa.* — *Malta* (*Delicata*), *Cors. presso Bastia* (*Debeaux*).

981 (4) *Rumex crispus* β *elongatus.* — *Nel Laz., assai diffuso* (*Béguinot*).

982 (5) *R. Patientia.* — *Barese in più luoghi* (*Palanza*), *Capitanata.*

983 (6) *R. conglomeratus* **b. campestris** (**Savi,** non L.) **Gürke** = R. divaricatus Thuill. — *Col tipo.*

984 (7) *R. sanguineus.* — *Lazio* (*Doria, Somm.*), *Basil. sul Vulture* (*Adr. Fiori*), *Cal. occ.* (*B. Longo*), *sopra Nicastro* (*Adr. Fiori*) *ed in quel di Laganadi in prov. di Reggio* (*Mottareale*).

b. viridis. — *Cal. occ. a Ciagola* (*B. Longo*).

986 (9) *R. pulcher* β *divaricatus* **b. pubescens Ambrosi** (1857). — Fusto in basso, picciuoli e nervi delle fg. scabro-pubescenti. Valve frutt. con callo minimo. — *Trent. sopra Gries* (*Facch.*).

986 * **R. dentatus L.** — *Istria* (*ex Gürke in Richter*); *originario dell' Oriente e dell' Afr. bor.*

987 (10) *R. maritimus* β *limosus* (*Thuill.* 1799) = R. paluster Sm. (1800) (Fl. An. I, p. 300). — *Gargano al lago di S. Giovanni Rotondo* (*Adr. Fiori*).

988 (11) *R. bucephalophorus.* — *Appenn. Reggiano lungo la strada da Cerreto al valico per Fivizzano, forse avvent.* (*Casali*).

989 (12) *R. Acetosella* **a. angiocarpus Celak.** (**Murb.**). — Lacinie perigoniali strettam. saldate col frutto.

d. repens DC. = var. procurrens Wallr. — Pianta sdraiata. — *Colla spec.*

e. minimus Wallr. (1822) = var. alpinus Gaud. (1828). — Pianta alta 2-5 cm. — *C. Ticino* (*Chenev.*), *Cors. al M. Cinto a 2200 m.* (*Briq.*), *e certam. altrove nella reg. alp.*

f. gracilis Meisn. — Fg. astate o saettate, a lobi lineari-allungati od i laterali subfiliformi ed interi. Fusti subsolitari, gracili. — *Nell'area della spec.*

g. linifolius G. F. W. Mey. (1836) = var. angustifolius Koch (1837). — Fg. lineari o strettam. lanceolate, spesso sprovvedute di 1 od anche di ambedue le orecchiette, le

Digitized by Google

quali possono talora essere bifide (*Ugol.*). — *Bergamasco* (*Rod. e Ven.*) *e Bresciano* (*Ugolini!*).

990 (13) *R. tuberosus.* — La pianta figurata nella *Iconografia* ed in gran parte la descrizione della *Flora Analitica* corrispondono a quella di Grecia e probabilm. di Sicilia, la quale si avvicina al *R. Acetosa var. alpinus* (= R. Gussonii Arc.); invece la pianta Veronese, della quale il Prof. Goiran ci ha comunicato esemplari dal Bosco Mantico, è il vero *R. tuberosus L.* e differisce per le fg. maggiorm. allungate, attenuate alla base e quivi con due orecchiette piccole (vedi Bertoloni, ov' è descritta tale pianta veronese). — *Reggio Cal.* (*Pasquale*).

991 (14) *R. Acetosa* β *arifolius* **for. amplexicaulis (Lap.).** — *Questa for. propria dei Pirenei sarebbe indicata di Cava dei Tirreni sui monti a Pietra Santa, Croce e S. Liberatore* (*Marcello L.*).

δ *alpinus* = R. tuberosus Ten. — *Avellinese sulla vetta del M. Cervalto* (*Casale e Guss.*).

992 (15) *R. thyrsoides* α *typ.* **b. pubescens N. Terr.** — Picciuoli e fg. pubescenti. — *Basil. sul Vulture* (*N. Terr.*).

β *intermedius.* — *Basil. a Tricarico ed Albano* (*Giordano*).

993 (16) *R. scutatus* α *typ.* **d. triangularis Koch.** — Fg. triangolari-ovate, con orecchiette basali nulle o brevissime. — *Bellunese* (*Bizz.*) *ecc.*

γ **reniformis Marchesetti** (1896-97). — Fg. glauche di sotto, bianchiccie, le infer. grandi, quasi reniformi-cordate, sinuate, le super. triangolari-acute, con lobi poco pronunciati o mancanti; ricordanti per forma e grandezza quelle del *Tamus.* Lacinie perigoniali fruttifere orbicolari. — *Triest. a S. Canziano sui vecchi muri attorno alla chiesa e nei dintorni di Besca* (*Marches.*).

CHENOPODIACEAE

Gen. Atriplex. — Vedi: E. Pons in N. Giorn. bot. it. 1902, p. 33 e 405.

998 (2) *Atriplex hastatum* θ *litorale* **b. serratum (Huds.).** — Fg. più larghe, sinuato-dentate. — *Friuli sulle dune di Grado* (*Posp.*).

999 (3) *A. laciniatum* **for. Sommieri E. Pons** (1902). — Fg. assai ridotte (cioè come nella for. *diffusum* [*Ten.*]), ma dentate. — *Livorno* (*Savi, Somm. ex Pons*).

β *Tornabeni.* — *Tosc. al M. Argentaro a Feniglia* (*Arc. ex Pons*).

1000 *A. portulacoides* **b. intermedium Guss.** — *Sicilia.*

c. **angustifolium Guss.** — *Sicilia a Trapani, Messina ed isole Lampione e Lampedusa.*

1002 (6) *A. Halimus.* — *Marche a Porto Civitanova* (*Paol. e Card.*).

1004 (1) *Beta vulgaris* γ *esculenta Salisb.* (1796) = B. sativa Bernh. (1800) = B. Rapa Dum. (1827) (Fl. An. I, p. 308).

Gen. Chenopodium. Vedi : Murr J., Chenopodien Beiträge in « Magyar Bot. Lapok 1902, p. 337, 359 ».

1007 (2) *Ch. Bonus-Henricus* **b. microphyllum Fouc. et Mand.** (1900). — Fusto di 2-3 dm., gracile. Fg. assai più piccole dell' ordinario, a picciuolo gracile. Spiga allungata, sottile. — *Cors. al M. Rotondo alla masseria Timozzo* (*Mand. e Fouc.*).

1009 (4) *Ch. Vulvaria* **b. microphyllum Moq.** (1840), **Goiran.** — Fg. assai piccole. — *Veronese ecc.*

1010 (5) *Ch. hybridum* **b. pumilum Goiran.** — Fusto piccolo (1-2 dm.), semplice, terminato da una breve pannocchia racemosa. — *M. Baldo intorno ai 1000 m.*

c. **subintegrum Moq.** (1840). — Fg. triangolari, quasi intere. — *Col tipo.*

1011 (6) *Ch. murale b. albescens Moq.* (1840) = v. pruinosum Guss. (1842) (Fl. An. I, p. 311).

1012 (7) *Ch. urbicum.* — *Malta* (*Delicata*).

β **rhombifolium (Muehl.).** — Fg. romboidali, a denti più lunghi, acuminati, a pag. concolori. — *Sic.* (*ex Gurke in Richter*).

Digitized by Google

γ *microspermum* (*Wallr.*, 1822) = Ch. intermedium M. et K. (1826) (cfr. Fl. An. I, p. 311 [var. β]).

1013 (8) *Ch. rubrum.* — *Basil. a Pomarico* (*Giordano*).

α *typ. c. blitoides* (*Lej.*, 1811) = var. acuminatum Koch (1843-45) (Fl. An. I, p. 311 [for. c.]).

β *botryoides.* — *Polesine a Runzi ed a Bagnolo di Po* (*De Bonis*).

1015 (10) *Ch. album* (cfr. Murr l. c.).

α **spicatum Koch (Murr).** — *È la forma tipica più diffusa.*

var. candicans (Lam., 1778) = var. incanum Moq. (1840). — *Sic.* (*Gürcke in Richter*).

var. concatenatum (Thuill.) — *Tir. mer. a Bolzano* (*Haussm.*), *Palermo* (*Tod.*).

for. striatiforme (Murr). — *Lago di Garda* (*Clementi*), *Trento* (*V. de Lievre*), *Bolzano* (*Funck*, *Hausm.*, *Pfaff*), *Bressanone* (*Murr*), *Sempione e Val d'Aosta* (*Chenev.*), *Napoli* (*Pittoni*) *e Cal. a Gerace* (*Gandoger*).

var. heterophyllum Fenzl (Murr). — *Napoli* (*Pittoni*).

for. pseudo-ficifolium (Murr). — *C. Ticino a Fusio* (*Chenev.*).

var. paganum (Rchb.). — *Qua e là col tipo.*

var. Pseudo-Borbasii (Murr) = Ch. Borbasii Murr. p. m. p. — *Bolzano* (*Hausm.*, *Murr*), *Trentino* (*Murr*), *Cal. a Gerace* (*Gandoger*), *Palermo* (*Tod.*) *e Sard. a S. Teresa di Gallura* (*Reverchon*).

var. rhombifolium (Schrad.) — *Cal. a Gerace* (*Gandoger*).

var. striatum Kras. (1893) **(Murr).** — *Verona e Trent.* (*Murr*), *Tir. mer. a Bolzano* (*Haussm.*) *e C. Ticino* (*Chenev.*).

var. viridescens S. Am. (Murr) — *Trentino* (*Murr*), *Sard. a S. Teresa di Gallura* (*Reverchon*).

1016 (11) *Ch. ambrosioides.* — *Malta* (*Delicata*).

1019 *Roubiaeva multifida.* — *Genova nel Corso Galliera presso il ponte di Marassi e nell'alveo della Polcevera presso Fegino* (*Canneva ex Somm.*), *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*), *Civitavecchia presso la riva del mare* (*Parsi!*), *Cagliari nel piazzale S. Bartolomeo racc. nel 1885* (*ex Cavara*), *Cors. presso Bastia* (*Mab. ex Debeaux*).

1024 (4) *Kochia arenaria.* — *Dune del Polesine presso Ariano e Donada* (*Bolzon*).

1026 (6) *K. saxicola.* — *A Strombolicchio presso l'isola di Stromboli raccoltavi prima dall'Arciduca Salvatore* (*in hb. Flor.*), *poi dal Lojacono* (*Baroni in Bull. soc. bot. it. 1902, p. 119 e 127*).

1027 *Corispermum hyssopifol.* β *Marschalii.* — *Polesine a Rosolina* (*Bolzon*).

1028 *Camphorosma monspeliaca.* — *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*).

β **canescens Moq.** (1840) = b. villosa Guss. (1842). — Pianta villosissima, biancastra o quasi argentina, con rami e fg. conformi. — *Sic. tra Catania ed Agosta* (*Guss.*).

γ **vigintimilleis (Tin.,** 1827) = C. sicula Jan. hb. (1829) ex Moq. (1840) = C. monsp. δ sicula Moq. (1840). — Pianta villosetta, a rami assai gracili, contorti. Fg. filiformi. — *Sic. a Termini, Olivieri e Milazzo* (*Guss.*).

1029 *Polycnenum arvense.* — *Isola di Capraia* (*Somm.*).

var. roseolum DNtrs. (Rep. Fl. Ligust., p. 344 [1844]). — *Lig. presso Gavi* (*Savignone*).

1030 (1) *Salicornia herbacea.* — *Malta* (*Delicata*).

1031 (2) *S. fruticosa* **a. glaucescens Ten.** (1831). — Pianta alta, a fusti legnosi e rami patenti ad articoli assai allungati.

b. intermedia Ten. (1831) = var. a. remotiflora Ung. (1874). — Pianta radicante, glauca. — *Nap. ecc.*

c. humilis Ten. (1831) = var. densiflora Ung. (1874) (Fl. An. I, p. 316 [for. b.]). — Pianta verdastra, a fusti sdraiati e radicanti, quasi legnosi e con rami divaricati. — *Nap. ecc.*

1032 *Arthrocnemum glaucum.* — *Basil. a Torremare* (*Giordano*).

1033 *Halocnemum strobilaceum.* — *Malta* (*Delicata*).

1034 *Halopeplis amplexicaulis.* — *Basil. a Torremare* (*Giordano*).

Digitized by Google

1040 (1) *Suaeda fruticosa.* — *Romagne nella spiaggia a Cesenatico e nelle saline di Cervia* (*Del Testa*); *nell'Arcipel. tosc. trovasi soltanto sull'isolotto di Troia* (*Doria ex Somm.*).

1041 (2) *S. maritima* α **typica.** — Fusto erbaceo (2-4 dm.), a rami patenti. Fg. acute. Glomeruli distanti. Pianta alla fine rossastra.

β **Jacquini (Nym.)**= Salsola salsa Jacq., non L. — Chenopodium salsum Guss., Rch . — Ch. Jacquini Ten. — Salsola Kochii Tod. exs. (forma). — S. mar. v. erecta Moq. — Fusto legnoso alla base (4-6 dm.), a rami eretti. Fg. ottusette. Infiorescenza contratta, a glomeruli avvicinati. Pianta di rado alla fine rossastra. — *Ital. mer.*, *Sic.*, *Malta.*

1042 (3) *S. splendens.* — *Puglie presso Trinitapoli sulle rive del lago Salpi* (*Adr. Fiori*).

AMARANTACEAE

1043 *Achyranthes aspera L.* α *sicula L.* (1753) (*Roth*, 1797) = A. argentea Lam. (1783) (Fl. An. I, p. 320 [for. b.]).

b. virgata (Poir. in Lam., 1811). — Fg. più piccole, pubescenti e verdi di sotto. Spighe più strette, lunghissime. — *Sic. e Sard.* (*ex Moq. in DC.*).

β **indica L.** (1753) **(Mill.,** 1768). — *Manca all'Ital. ed all'Europa.*

1047 (4) *Amarantus hypochondriacus.* — *Abbastanza diffuso presso Messina* (*Zodda*).

1048 (5) *A. paniculatus c. sanguineus.* — *Basil. presso Melfi* (*N. Terr.*).

1051 (8) *A. albus* **b. parviflorus Moq. in DC.** (1849). — Fg., glomeruli e fi. più piccoli. — *Tosc.* (*ex Moq.*) *ecc.*

1054 (11) *A. deflexus* **b. arenarioides Goiran.** — Pianta piccola, coll' aspetto dell'*Arenaria serpyllifolia.* — *Nei luoghi calpestati.*

1056 * **Alternanthera repens (L.) Steud.** (1840) = Illecebrum L. (1753) = Ill. Achyrantha L. (1763) = Alt. Achyrantha R. Br. (1810). — *Genova nell'alveo della Polcevera a Fegino presso la conceria* (*Canneva ex Somm.*); *importata probabilm. colle pelli dall' Argentina.*

NYCTAGINACEAE

1059 * *Oxybaphus nyctagineus.* — *Era stato indicato come inselvat. attorno a Pavia già sino dal 1888* (*Bozzi*).

AIZOACEAE

1062 (1) *Mesembryanthemum nodiflorum.* — *Al Forte Troja in Tosc.* (*Somm.*).

CACTACEAE

1067 * (1 bis) *Opuntia Ficus-indica Mill.* = O. vulgaris β Ficus-indica Fiori (Fl. An. I, p. 327) — Pare non possa essere una var. di *O. vulgaris*, piuttosto potrebbe essere derivata colla coltura da *O. Tuna* o forme affini.

1067 * **O. monacantha Haw.** — *Originaria dell' Amer. mer.*; *nat. nel castello di Nizza, tra Nizza e Villafranca ed a Mentone* (*Sauvaigo*).

1067 * * **O. intermedia S. Dyck.** — *Pisano a S. Giuliano e Livorno presso la villa del conte Passerini* (*Arcangeli, in Bull. Soc. bot. it. 1905, p. 145*).

PORTULACACEAE

1070 *Montia fontana* α *minor.* — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

b. ambigua Nic. (1886). — Pianta più gracile della *v. rivularis*, non radicante. Fg. assai piccole. Cime moltiflore. Cassule lunghe il doppio del calice. Semi con tubercoli poco sporgenti, ma assai più larghi. — *Sic. nel Messinese presso Fondachelli* (*Nic.*).

Digitized by Google

β *rivularis* **b. intermedia Strobl** (1903). — Perenne, a fusti alti, nuotanti. Fg. verdichiare, bislungo-cuneiformi, un po' più lunghe e più strette che nel tipo. Semi maggiorm. sagrinati, subrugosi. — *Sic. alle Madonie* (*Strobl*).

PARONYCHIACEAE

1076 (1) *Scleranthus annuus* β *collinus* (*Horng.*, 1825) = S. verticillatus Tausch (1829) (Fl. An. I, p. 332 [var. β]).

var. aetnensis (**Strobl**, in Oest. bot. Zeit. 1874, p. 69). — *Sic. sull' Etna.*

var. Delorti (**Gren.**). — *Cors. a Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*) *ed a Tattone* (*Mand. e Fouc.*).

var. hibernus Rchb. (1832) = v. biennis Fr. p. p. (1835) = S. biennis Reut. (1853-54) — *Nell' area della spec.*

var. hirsutus (**J. et C. Presl**) (cfr. Strobl l. c., p. 71). — *Sicilia.*

var. venustus (**Rchb.** ap. Strobl l. c., p. 70). — *Sicilia.*

1076 * **S. annuo** × **perennis Lasch** (1829) = S. intermedius Kitt. (1844) = S. ann. v. biennis Fr. p. p. — *Vallombrosa al Saltino* (*Fiori*).

1077 (2) *S. perennis b. neglectus* (*Rochel*, 1816) = S. marginatus Guss. (1827) (Fl. An. I, p. 332) = S. perenn. β repens (Jan hb.) Strobl (1874).

var. Stroblii (**Rchb.** ap. Strobl l. c., p. 72). — *Sic. sull' Etna.*

var. vulcanicus (**Strobl** l. c.) = S. margin. v. aetnicola Strobl in sched. — *Sic. sull' Etna.*

1081 (1) *Paronychia cymosa.* — *Sec. Burnat* (*Fl. Alp. mar. III, p. 222*) *questa spec. si trova solo in Francia di là dal Varo e quindi deve togliersi l'indicazione « Nizzardo ». — In Cors. anche a Solenzara* (*Fouc. et Sim.*).

1085 (5) *P. capitata* (*L.*) *Lam.* (1778) = Illecebrum L. (1753) = P. nivea DC. (1804) (Fl. An. I, p. 334) (cfr. Burnat, Fl. Alp. Mar. III, p. 226; Gürke in Richter II, p. 184). — *Appenn. camp. al M. Pizzodetta* (*Falqui*) (*?*).

1086 (6) *P. Kapela* α *typ.* — *Sec. Burnat* (*l. c.*) *la forma veramente tipica di questa spec. manca alle Alpi Mar.*

β *serpyllifolia.* — *Cal. cit. al M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

1087 (1) *Herniaria glabra.* — *Malta* (*Delicata*).

β *hirsuta b. cinerea.* — *Malta* (*Delicata*).

d. diandra (**Bunge**). — Stami fertili due soli, pelosità quasi della *for. cinerea.* — *Presso Mentone.*

1087 * **H. empedocleana Lojac.** (Nat. Sic. III, p. 284 [1884]) = H. Fontanesii Lojac. in sched. (non J. Gay). — *Sic. a Porto Empedocle* (*Lojac.*).

1088 (2) *H. alpina.* — *Appenn. camp. allo Zaffineto di Picinisco ed al Campo di grano in quel di Pescosolido* (*N. Terr.*).

a typ. **b. semproniana Williams** (1896) = H. alpina β Gaud. — Rami distintam. patenti, ramulosi. Fg. riunite a fascetti nelle ascelle ed uguaglianti i fi. — *Sempione* (*Gaud.*).

1091 *Polycarpon tetraphyllum* α *typ.* **b. diphyllum** (**Cav.**) **DC.** — Fg. opposte, subrotonde. — *Col tipo.*

β *alsinaefolium.* — *Sec. Burnat* (*Fl. Alp. Mar. III, p. 220*) *la presenza di questa var. in Liguria resta dubbia.*

CARYOPHYLLACEAE

1093 (1) *Spergularia rubra* α *campestris b. atheniensis* **for. elegans** et **for. decipiens Sarato in Burn.** — *Ambedue nel Nizzardo, la seconda anche in Cors. presso Ajaccio* (*Fouc. et Sim.*).

d. pinguis Fenzl (1844) (sub S. rubra). — Fg. un po' carnose; stipole brevi e poco lucenti; stami scarsi. — *C. Ticino in Val d' Efra* (*Chenev.*), *Isola del Giglio* (*Somm.*).

Digitized by Google

for. alpina Gürke = Alsine Wk. = S. rubra β stipularis Boiss. — *Cors. nella Valle della Restonica presso Corte* (*Fouc. et Sim.*).

for. arenosa Fouc. et Sim. (Trois sem. herb. en Corse p. 174, t. 3 [1898]). — *Cors. a Solenzara e presso Ajaccio* (*Fouc. et Sim.*), *a Ponte Leccia e Ghisoni* (*Rotgès, Mand. et Fouc.*).

for. oligantha Fouc et Sim. (l. c.). — *Cors. a Solenzara* (*Fouc. et Sim.*).

for. virescens Fouc. et Mand. (Bull. s. b. France 1900, p. 88). — *Cors. ai M. Rotondo e Renoso* (*Rotgès, Mand. et Fouc.*).

δ *marina* **for. australis Nob.** = S. Dill. β austr. Lebel = S. salina g. austr. Gürke. — *Nizza* (*Sarato*), *Cors.* (*Fouc. et Sim.*).

for. muralis Nob. = Lep. trachysperm. subsp. murale Kindb. = S. Dill. β perennis Rouy et Fouc. = S. salina f. muralis Gürke. — *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).

γ [1] **insularis (Fouc. et Sim.,** l. c. cum tab.). — *Cors. a Calvi e S. Bonifacio* (*Fouc. et Sim.*).

1093 bis (2) **Sp. segetalis (L.) G. Don.** — *Deve riamettersi tra le piante Italiane essendo stata trovata in Tosc. al M. Scalari ed al Poggio di Firenze* (*Somm.!*), *della qual ultima località esiste pure nell'erbario Micheli e nei manoscritti del Micheli è pure citata sopra Montevarchi a Monsoglio* (*cfr. Baroni in Bull. soc. bot. it. 1898, p. 96*), *Umbria a Castiglione del Lago* (*Montaldini!*) *e nel comune di Lisciano Niccone alle Bagnaie e nei dintorni di Preggio nel comune di Umbertide* (*Montaldini in Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 396*).

1094 (1) *Spergula arvensis* **for. gracilis E. Petit.** — *Corsica* (*Petit, Fouc. et Sim.*).

for. laricina (Wulf.) = var. glutinosa Wk. et Lge. — *Cors. a Calvi* (*Fouc. et Sim.*).

1096 (1) *Sagina procumbens* α *typ.* **d. glacialis Fouc. et Mand.** (Bull. s. b. France 1900, p. 87). — *Cors. sul M. Renoso* (*Mand. et Fouc.*).

β *apetala* **a. imberbis Fenzl** (1842) = var. α ruderalis Bég. (1897). — Pianta cespugliosa, sdraiata, quasi glabra; fg. lineari-lesiniformi, brevem. aristate.

for. arenarum Bég. (1897). — Pianta piccola, a fusto semplice, eretta, mai radicante, pelosetta; fg. mutiche come nella v. *maritima*. — *Laz. nelle arene tra Terracina e M. Circeo ed a Torre Astura* (*Bég.*).

for. barbata Fenzl. — *Nell'area della var.*

for. intermedia Bég. (1897). — Pianta meno cespugliosa, spesso semplice, eretta, pubescente, con peli talora glandulosi. — *Laz. nei luoghi arenosi* (*Bég.*).

β [1] *ciliata* (*Fr.*) (Fl. An. I, p. 340 [for. β b]) **for. filicaulis (Jord.).** — Fusti molto esili; sepali applicati alla cassula. — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

for. glaberrima Gürke in Richter = S. apet. β glaberr. F. W. Schultz. — *Sicilia* (*ex Gürke*).

γ *maritima* **for. corsica Fouc. et Sim.** (1898). — *Cors. a Solenzara* (*Fouc. et Sim.*).

for. debilis (Jord.) = v. elongata Gr. et Godr. — *It. pen., Cors.* (*ex Gürke*).

for. densa (Jord.). — *Cors. a Chiavari* (*E. Petit*).

for. glauca Strobl (1885). — *Sicilia* (*Strobl*).

for. stricta (Fr.). — *Italia* (*ex Gürke*).

for. viridis Strobl (1885). — *Sicilia* (*Strobl*)

1097 (2) *S. Linnaei.* — *Cal. all'Aspromonte* (*Huter, P. et R. sub S. saxatilis Wim.*).

α *typica.* — *Vanno tolte le loc. della Capraia da riferirsi invece alla v. subulata e quella dell'Elba da riferirsi alla v. subul. f. stricta* (*ex Somm.*).

for. nevadensis (Boiss. et Reut.). — *Cors. nella valle della Restonica* (*Fouc. et Sim.*).

β *subulata* **c. glabrata Rouy et Fouc.** — Pianta glabra. — *Nei luoghi mar. della reg. medit.*

d. stricta Somm. (1900) = S. Linnaei Bolzon. — Fusto spesso solitario e semplice, ad 1 o pochi fi., eretto, non radicante nè cespuglioso, senza rosetta di fg. radicali. Pianta scarsam. glanduloso-pelosa o glabra, a quanto pare annua. — *Isole del Giglio e dell'Elba e Maremma tosc.* (*ex Somm.*).

Digitized by Google

for. gracilis Fouc. et Sim. (1898). — *Cors. a S. Fiorenzo* (*Fouc. et Sim.*).

γ *glabra* **b. glandulosa Gürke** = S. repens b. glandulosa Rouy et Fouc. — Pianta pubescente-glandulosa. — *Colla var.*

δ *pilifera* **for. caespitosa Fouc. et Mand.** (l. c.) — *Cors. al M. Renoso* (*Fouc. et Mand.*) *ed al M. Cinto a 2700 m.* (*Briq.*).

1100 (1) *Alsine tenuifolia α typ.* **b'. Barrelieri Guss.** = Aren. Vill. = Als. intricata Martr.-Don. — Come la for. *subulifol.* ma più robusta, assai ramosa e con rami spesso intrecciati. — *Nell'area della spec.*

for. laxa (Jord.). — *Piem. ad Ivrea* (*L. Vacc.*), *Salernit. a Cava dei Tirreni* (*L. Marcello*).

β *arvatica b. mediterranea* (*Maly*) = Arenaria Ledeb. (1821) = Als. conferta Jord. (1852) (Fl. An. I, p. 342). — *Sic. nei monti di Palermo, Madonie ed isola Marettimo* (*ex Lanza*).

var. subulifolia (Guss.) = Arenaria Presl. — *Sicilia.*

1101 (2) *Al. mucronata α typ.* **for. brevifolia (Jord.).** — *Corsica.*

1102 (3) *Al. verna α typ. c. semiglandulosa Strobl* (1903) = Als. verna b. caespitosa Guss. (non Arenaria caespit. Ehrh.) (Fl. An. I, p. 342).

d. pubescens Guss. = Aren. verna b. grandiflora Presl.

g. subnivalis (Hegetschw., 1840) = Ar. liniflora Jacq. (1778), non L. = A. verna α nivalis Fenzl (1842). — Pianta formante un cespuglio denso, a fusto sempre 1-floro. Fg. più brevi e più larghe, glabre. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*) *ecc.*

for. latialis Terr. A. (Contr. IV, p. 156) = v. diffusa Bég. (1897). — *Laz. alla Semprevisa* (*Rolli, Evers in Terr.*) *e M. Lupone* (*Bég.*).

for. rhaetica Bruegg. (1860). — *Valtellina a Bormio* (*cfr. Gürke in Richter*).

β *recurva a. genuina* **for. ramosa Beauverd** (1903). — Fusti con rami ascellari, alterni e pluriflori. — *Val d'Aosta* (*Beauverd*).

b. hispidula Gürke = Aren. recur. v. hispid. Ser. in DC. = Als. recur. v. glandulifera L. Vaccari. — Pianta interam. glandulosa. — *Val d'Aosta a La Balme ed al Gr. S. Bernardo* (*Vaccari, Beauverd*).

c. nana Ducomm. = Aren. recur. v. nana Gaud. = Aren. striata All. Fl. Ped. t. 26, f. 4. — Pianta ridotta in ogni parte, a fusti pauciflori od anche (**for. uniflora Beauverd** [1903]) uniflori. — *Val d'Aosta al Gr. S. Bernardo ed al Col Fenêtre d'Ollomont* (*Beauverd*) *ecc.*

for. hispida Venetz in Rion (?). — *Val d'Aosta al Col Fenêtre de Bagne* (*Venetz*).

γ **condensata (Fenzl)** = Arenaria J. et C. Presl = Als. recurva b. condensata Guss. — *Cal. e Sic. alle Madonie.*

1103 (4) *Al. austriaca β Villarsii b. hirsuta Ducomm.* (1869) = Aren. Vill. β hirs. Gaud. (1828) = Als. Vill. β villosula Koch (1835) (Fl. An. I, p. 343).

for. Valonii Burn. (1892). — *Alpi Mar.*

1104 (5) *Al. biflora.* — La località « *Val di Cogne* (*Santi*) » indicata nel Vol. I, p. 343, va riferita ad *Arenaria biflora L.* (*cfr. L. Vacc.*). — *Alpi di Bormio sul Wormserjoch* (*Ball*).

1105 (6) *Al. laricifolia β liniflora.* — *Lazio nei M. Simbruini a M. Cotento* (*Doria, Terrac. A.*).

b. incana Gürke = Wierzbickia laricifol. β incana Rchb. (1842). — Pianta tutta bianca, fruticulosa. — *Trent. sul Garda a Torbole* (*Facch. ex Rchb., Fl. germ. exs. n. 2094*).

1107 (8) *Al. octandra* (*Sieb.*) *Kern.* (1882) = Cherleria Sieb. (1813) = Siebera cherlerioides Schrad. (1813), Hpe. (1819) = Aren. aretioides Portenschl. (1818) = Al. aretioides M. et K. (1831) (Fl. An. I, p. 344).

1108 (9) *Al. Cherleria Peterm.* (1846-49) (non Al. Cherleriae Fenzl) = Al. sedoides Kitt. (1844), non Froel. in Koch (1837).

b. corollata Fiori (1898) = Cherleria sedoides v. coroll. Schur. (1866) = Ch. sediformis v. coroll. S.-Lag. in Cariot (1889).

c. ciliata Wohlf. (1890) = Cherleria sed. v. cil. Huter (1882). — Fg. cigliato-frangiate. — *Nell'area della spec.*

Digitized by Google

1109 (10) *Al. lanceolata* = A. rupestris Fenzl (1833). — Questo secondo nome sarebbe da adottarsi qualora si ritenesse, colla maggioranza degli Autori, che la *Stellaria rupestris Scop.* (1772) fosse la stessa pianta che *Arenaria lanceolata All.* (1774); però la figura data dallo Scopoli lascia molti dubbi su tale identificazione.

b. cherlerioides Nob. = Arenaria Vill. (1779) = Al. lanc. β condensata Koch (1835) (Fl. An. I, p. 344).

1110 (11) *Al. geniculata.* — *Malta* (*Delicata*).

c. **extensa Nob.** = Arenaria Duf. (1820) = Ar. procumb. v. linearifolia Moris (1837). — Fg. più strette, quasi lineari. — *Sic.*, *Sard.*

1112 * **Arenaria emarginata Brot.** β **Salzmanni (Presl) Wk.** — *Sic. a Trapani* (*Presl*) (?).

1115 (5) *Ar. serpyllifolia* β *tenuior Koch* (*Gürke*) c. **viscidula Gürke** = Ar. leptocl. β visc. Rouy et Fouc. — Pianta pubescente, glandulosa in alto come nella for. *minutifl.*, ma a fi. di grandezza normale. — *Colla var.*

for. nana Goir. — Pianta di 2-4 cm., a fg. avvicinate. — *Veronese* (*Goir.*).

d. **crassifolia Gürke** = Ar. serpyll. v. crassif. Freyn (1876) = Ar. leptocl. v. crassif. Freyn (1878). — Fusti prostrati, fragili, glandulosi. Fg. carnose. Peduncoli abbreviati. — *Istria mer.* (*Freyn*) *e Triest.* (*Marches.*).

1116 (6) *Ar. ciliata.* — *Piceno al M. Vettore* (*Paol. e Card.*).

c. **fugax** (**J. Gay**) **Gr. et Godr.** — Pianta annua o bienne, senza fusti sterili fascicolati; petali eguali al calice; stili brevi; calice frutt. più rigonfio. — *M. Bianco* (*Payot*).

for. longipes Rouy et Fouc. — *Val d'Aosta a Courmayeur* (*Wilczek*).

1117 (7) *Ar. balearica* β **Gayana** (**Williams** in Journ. Linn. Soc. 1898, p. 422) **Gürke** = Ar. bal. v. brachypetala J. Gay hb. — *Cors. a Pastriciale* (*Serafino*).

1120 (10) *Ar. Huteri* **for. glareosa et rupestris Huter et Porta** exs. 1873, ex Gürke in Richter (1899). — *Ambedue nelle Alpi venete.*

1121 (1) *Moehringia trinervia* α *typ.* b. **pubescens Hausm.** (1851). — Fusto e fg. più o meno lanoso-pelosi. — *Trentino*, *M. Baldo* (*Goir.*).

1122 (2) *M. Ponae* α *typ.* c. **tetramera Gelmi** (1893). — Fi. tetrameri o talora tetrameri e pentameri sulla stessa pianta. — *Trent. a Salorno* (*Facch.*).

β *dasyphylla.* — *Alpi vicent. sui M. Toraro e Campomolon* (*Vasolin*).

γ *papulosa.* — *Tolgasi dall'habitat l'Istria.*

δ **Tommasinii** (**Marches.**) = M. glaucovirens Tomm. (non Bert.) = M. glaucescens Neilr. — Differisce dalla var. prec. (sec. Marches. Fl. di Trieste) per i peduncoli e pedicelli dei fi. più lunghi, questi ultimi 4-6 volte più del calice (nella v. *papulosa* eguali od appena 2 volte più del calice), per i sepali con largo margine scarioso (mancante o strettissimo nella *v. papulosa*) e per avere 4 stili (2 soli nella *v. papulosa*). — *Triest. sulle rupi a Bagnoli*, *Cernical*, *Popecchio ed Ospo* (*ex Marches.*).

1122 * **M. bavarico** × **muscosa Behrend.** = M. coronensis Behrendsen (Allgem. Bot. Zeitschr., von A. Kneucker, 1904). — Distinguesi dalla *M. bavarica* (= M. Ponae) pel portam. più gracile, pei fusti meno fragili, per le fg. più sottili, meno carnose, sempre piane di sopra, acute e verdi chiare, per l'infiorescenza spesso più ricca, pei fi. in parte tetrameri; dalla *M. muscosa* pel portam. più robusto, pei fusti un po' fragili, per le fg. più grosse ed un po' carnose, pei fi. in parte pentameri, pei sepali più larghi e 3-nervi e per i petali più grandi. — *M. Baldo presso la Madonna della Corona* (*Behrendsen*).

1123 (3) *M. muscosa* α *typ.* c. **filifolia G. Beck.** (1890). — *Veron.* (*Goir.*).

1124 (4) *M. ciliata* (*Scop.*) *Dalla Torre* = Stellaria Scop. (1772) = M. polygon. b. ciliata Beck (Fl. An. I, p. 347 [for. b.]).

b. polygonoides (*M. et K.*) (Fl. An. l. c. [pr. sp.]) = Arenaria Wulf. (1786). — Fg. glabre, non cigliate. — *Nell'area della spec.*

c. **obtusa Gürke in Richter** = Arenaria All. (1785). — Fg. più larghe e più grandi. — *Alpi piem.*

Digitized by Google

1125 (1) *Stellaria nemorum* **c. glochidisperma Murb.** (1891) (**Freyn,** 1892). — Semi forniti al margine di aculei portanti all' apice numerose papille uncinate. — *Triest.* (*Marches.*).

b. saxicola Beauverd. — Differisce dal tipo pel suo portamento più ridotto, per le fg. più glabre, triangolari o cuoriformi-acuminate, *tutte picciolate* (anche le fiorali) e per le cime in pannocchia multiflora. — *Indicata soltanto per la Savoia* (*declivi sassosi della reg. alp. del M. Soudine*), *ma da ricercarsi nelle nostre Alpi.*

e. montana (Pierrat). — Pianta più gracile in ogni parte, a fg. più piccole e brattee super. non fogliacee. — *Veron. sui Lessini* (*Goir.*).

1126 (2) *S. media* α *typ.* **for. brachypetala (Bor.,** 1857) = Alsine Opiz (1826). — *Veron.* (*Goir.*), *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).

for. glabra Strobl (in Oest. bot. Zeit. 1885, p. 245) = v. glaberrima G. Beck (1890). — *Sicilia.*

for. glandulosa Strobl (l. c.) — *Sicilia.*

for. hirsutiuscula Strobl (l. c.). — *Sicilia.*

for. pedicellata Rouy et Fouc. — *Veron.* (*Goir*), *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).

for. pygmaea O. Kuntze (1867) = S. humilis Sarato ex Arc. (1882) = S. media v. humilis Arc. (1882). — *Nell' area della spec.*

for. undulata Bréb. (1836). — *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).

β *neglecta* **for. glandulosa Strobl** (l. c.). — *Sicilia.*

β *grandiflora Guss.* (1842) = Alsine Ten. (1830) = Alsine Cupaniana Jord. et Fourr. (1866) = St. Cupaniana Nym. (1878) (Fl. An. I, p. 348). — *Malta* (*Duthie*).

for. apula Palanza (sub St. media). — *l'uglie in prov. di Bari.*

ε *pallida* (*Piré*, 1863) = Alsine Dum. (1827) = St. media v. apetala Gaud. (1828) = St. Boraeana Jord. (1852) (Fl. An. I, p. 348 [for. δ b.]).

for. glabella (Nym.) = Alsine Jord. et Fourr. — *Corsica.*

for. intermedia Gürke (1899) = St. apetala γ interm. Rouy et Fouc. (1896). — *Corsica.*

1128 (4) *St. uliginosa b. alpina Gürke* (1899) = Larbrea ulig. b. alp. Schur (1866) = St. glacialis Lagg. (1868) (Fl. An. I, p. 349 [for. b.]).

1129 (5) *St. Frieseana.* — *M. Stelvio* (*ex Ball*).

1130 (6) *St. graminea* **b. latifolia Peterm.** = Larbrea gram. v. latif. Godr. — *Cors. presso Ajaccio* (*Fouc. et Sim.*).

c. hispidula Goir. (1904). — Fg. cigliate su tutto il margine (e non soltanto alla base) e talora sulla nervatura mediana. — *M. Baldo* (*Goir.*).

1131 (7) *St. palustris.* — *Tir. mer. a Klobenstein* (*Sauter*), *ritrovata nei Colli Euganei sul m. Pendice* (*Bég.*).

1133 Holosteum umbellatum a. glabrum O. Kuntze (1867) = v. glaberrimum Strobl (1885) = v. glabratum G. Beck (1890). — Pianta affatto glabra. — *Sic. sull' Etna* (*Strobl*).

b. glutinosum (*Fisch et Mey*, 1839) = Arenaria M. B. (1808) — H. ciliatum Opiz (1825) (Fl. An. I, p. 350 [for. b.]).

c. roseiflorum Rouy et Fouc. — Petali rosei. — *Veron.* (*Goir.*).

1134 *Malachium aquaticum b. glabrum Peterm.* (1838), *Gelmi* (1893).

c. scandens Godr. = Cerastium Lej. — *Cors. presso Ajaccio* (*Fouc. et Sim.*).

1138 (4) *Cerastium brachypetalum.* — *Malta* (*Delicata*).

α *typ.* **b. Tenoreanum (Ser. in DC.)** = C. pilosum Ten. (non Alior.) = C. brach. v. pilosum Rouy et Fouc. — Petali un po' più lunghi del calice. — *Colla spec.*

β *tauricum.* — *Colli Euganei* (*Bég.*), *Bresciano ov' è comune* (*Ugolini*).

1139 (5) *C. glomeratum* **c. eglandulosum M. et K.** — Peli tutti senza glandule. — *Sic.* (*ex Gürke*).

for. elongatum Rouy et Fouc. — *Cors. a Belgodère* (*Fouc. et Sim.*).

1140 (6) *C. semidecandrum.* — *Al Gran Sasso d' Italia sarebbe stato trovato sino a 2000 m. circa ad Arapietra* (*Petrilli ex Crugnola*).

α *typ.* **b. dubium Guss.** (sub C. arenarium). — Intensam. verde, quasi punto vischioso,

Digitized by Google

a fusti eretti, cespugliosi, a rami diffusi od ascendenti, con articoli caulini abbreviati. — *Sicilia.*

c. **macilentum** (**Alpegren,** 1823) = v. glaberrimum Koch (1835). — Pianta affatto glabra. — *Veronese* (*Goir.*).

γ *siculum.* — Differisce dal tipo, oltre che pei caratteri citati, anche per le divisioni del calice più lungam. e densam. pelose, meno lungam. glabre all' apice, pei fi. almeno di $^1/_3$ più grandi e per la fioritura più tardiva. (ex Sommier, Gita alla Gorgona).

1140 * **C. divaricatum Herbich** (in Flora 1824, p. 184). — *Napoli nella Valle di S. Rocco e presso i Ponti Rossi* (*Herbich*) (*quid?*).

1141 (7) *C. campanulatum.* — *Malta* (*Delicata*), *Cors. presso Vico* (*Coste*).

c. **longe-pedunculatum (Ten. ex Marcello).** — Differisce dal tipo (sec. L. Marcello in Boll. Soc. Nat. di Napoli 1903, p. 22) per essere più grande, villoso-viscoso, con fi. assai grandi, lungam. pedicellati, e specialm. per colore giallo dei petali (non bianco). — *Salernit. nei monti di Cava dei Tirreni* (*Guss.*) *e precisam. al convento della Trinità* (*L. Marcello*).

d. **granulatum Huter P. et R.** (N. G. Bot. it. 1879, p. 247). — Pianta robusta in ogni parte, a semi acutam. granulosi. — *Cal. al M. Pollino.*

1142 (8) *C. triviale Lk.* (1821) = Stellaria Lk. (1795). — Questo nome dal Gürke (in Richter Pl. eur. II, p. 222) è sostituito con quello anteriore di *C. caespitosum Gilib.* (1781); nell' Index Kewensis però la spec. di Gilibert è invece riferita a *C. glomeratum.* Siccome poi vi sono altri *C. caespitosum* di Autori differenti, così, a scanso di confusione, crediamo non convenga cambiare il nome di *C. triviale.*

b. glandulosum Rchb. (1832) (*Schur,* 1869) = C. visc. β glandul. Boenn. (1824) = C. triv. v. viscosum M. et K. (1831).

c. **holosteoides (Fr.)** = C. vulgat. γ glabratum Neilr. — Fg. e calici quasi glabri. Fusto con una linea di peli, non vischioso. — *C. Ticino, Veron. ecc.*

for. caespitosum Goir. (Fl. Ver. p. 123 [1904]). — Affine al *C. silvaticum.* — *Veron. presso Avesa* (*Goir.*).

β *spurium* (*Posp.*). — *Val d' Aosta* (*L. Vacc.*).

1143 (9) *C. silvaticum.* — *Bresciano al Castello di Serle ed alla Cornablacca fino a 2000 m.* (*Ugolini*).

1144 (10) *C. alpinum* α *typicum* — Sec. L. Vaccari il tipo di questa spec. manca o deve essere assai raro nelle Alpi. — *Camp. in vari luoghi del bacino del Liri* (*Falqui*) (*?*).

d. **glabrum W.** (1799) = v. glabratum Whlnb. (1812) = C. glaberrimum Lap. (1813) (Fl. An. I, p. 353 [for. α d.]).

for. atratum (Lap., 1813) = C. alp. v. glutinoso-lanatum Facch. in Rchb. (1842-43). — *Tir. mer.*

for. pumilum N. Terr. (Relaz. I, p. 82). — *Camp. ad Itri al M. Faito* (*N. Terr.*).

for. salassarum Beyer (Beitr. Fl. Gris. et Rhêm. p. 16 [1891]). — *Alpi piem.*

β *latifolium* **d. intermedium Hegetschw.** (1825) = v. grandifolium Koch (1835). — Fg. largam. ovate, acute, assai avvicinate. Pedicelli appena più lunghi del fi. — *M. Baldo* (*Goir.*).

γ *pedunculatum* (*Gaud.*) = C. filiforme Schleich (1815) (nomen anter. sed nudum).

1145 (11) *C. arvense* = C. mutabile Gren.

α *typ.* **c. alpicolum Fenzl ap. Led.** — Fg. come nella *for. strictum* ma pelose sulle due pag. — Pianta talora (= **for. glanduliferum L. Vacc.**) glandulosa nella parte super. — *Val d' Aosta* (*L. Vacc.*).

b. strictum **for. glanduliferum L. Vacc.** — Parte super. del fusto con peli glandulosi. — *Val d' Aosta* (*L. Vacc.*).

β *suffruticosum* **b. glanduliferum L. Vacc.** — Parte super. del fusto e talora pure le fg. super. glandulose. — *Val d' Aosta* (*L. Vacc.*).

c. **canescens L. Vacc.** — Pianta tutta densam. pubescente-biancastra, per peli brevi e diritti. — *Tra Aosta e Valpelline* (*L. Vacc.*).

Digitized by Google

γ *subulatum*. — Nell' habitat (Vol. I, p. 353) poni « *M. Majella* » in luogo di « *M. Morrone* ».

ε *hirsutum*. — *Comune in Tosc. nelle prov. di Firenze e di Arezzo, ove scende sino alla zona mediter., ed anche in Sic. a Busambra e Ficuzza.*

θ *lineare*. — Sec. il Negri (Malpighia XVIII [1904]) questa pianta deve ritenersi come spec. autonoma. — *C. Ticino al M. Generoso* (*Chenev.*), *M. Baldo* (*Goir.*).

ι *Boissieri* **b. lanuginosum Gren.** (1841) = C. arvense Moris (1827) (non L.) = C. alp. v. angustifol. Moris (1837) = C. physospermum J. Gay ex Gren. (1841). — Interam. peloso-lanoso, con peli glandulosi, increspati, anche nei peduncoli e calici. Peduncoli 1-3-flori. — *Sardegna.*

var. Cavillieri Briq. (1901). — Pianta alta 10-15 cm., assai ramosa, a rami intrecciati. Fg. lineari-oblunghe, vellutato-tomentose, quelle dei fascetti più strette ed assai biancheggianti. Peduncoli e calici tomentoso-biancastri, a tomento alla fine diradato. — *Cors. alla Serra di Pigno a 900 m.* (*Briq.*).

var. ciliatum (W. et K.). — Fg. quasi glabre, cigliate. — *Istria* (*ex Gürke in Richter*).

var. insubricum (Moretti). — Pianta di 20-25 cm., pubescente, a peli brevi e riflessi. Fusti gracili, ascendenti, nudi nel $^1/_2$ super. Fg. lineari-lanceol. (15-20 per 1-3 mm.), attenuate alle due estremità, pubescenti, verdi-grigiastre. Fi. lungam. peduncolati, mediocri, formanti delle ampie cime divaricate. — *Lungo il Ticino ed il Zerbo* (*Moretti*) *e Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

var. viscidulum Gremli. — Pianta tutta glandoloso-vischiosa. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

1146 (12) *C. tomentosum* α *typ. La pianta dei colli Euganei va riferita alla var. repens* (*ex Bég.*), *nat. nella Valdonega presso Verona, ma non esiste in altri punti del Veron.* (*Goiran*), *fra Cesena e Roversano nei luoghi incolti* (*Del Testa*).

c. aetnaeum Gürke = C. arvense v. aetn. Jan. = C. tom. v. minus Presl = C. tom. b. Guss. = C. repens δ aetn. Strobl. — *Sic. sull' Etna* (cfr. Strobl, Fl. d. Etna in Oest. bot. Zeitschr. 1885, p. 278).

for. elatum (Ten.). — *It. mer.*, *Sic.*

var. viridescens Huter. P. et R. (N. G. Bot. it. 1879, p. 286). — *Cal. presso Castrovillari* (*Huter P. et R.*).

var. glabrescens L. Marcello (1903). — Pianta glabrescente. — *Salernit. a Cava dei Tirreni, col tipo* (*L. Marcello*).

1147 (13) *C. manticum* β **octandrum Arc.** (1882) = Sagina Ziz (1823) = C. tenue Viv. (1824) (Fl. An. I, p. 354 [v. β]) = Moenchia octandra J. Gay (1833).

1148 *Agrostemma Githago* **c. humilis Goir.** (1904). — Pianta di 15-20 cm., a fusto semplice, 1-floro. — *Veronese.*

1151 (3) *Lychnis Flos-cuculi* α *typ.* **b. albiflora Peterm.** (1838) = v. leucantha Borb. (1883). — Corolla bianca. — *Verona* (*Goir.*).

β *Cyrilli*. — *Ferrara* (*Revedin !*).

1152 (4) *L. Viscaria b. albiflora Fiori* (1898) = Viscaria Sweet (1830).

1154 (5) *L. Coeli-rosa* **a. levis (Poir.).** — Fusto angoloso. Fg. liscie.

b. aspera (Poir.). — Fusto subcilindrico. Fg. strette, scabre. Calice denticolato-scabro agli angoli. — *Sic.* (*Strobl*) *ecc.*

c. parviflora Strobl (sub Eudianthe) (1903). — *Sic.*

1155 (7) *L. laeta*. — *Colli Euganei presso Galzignano* (*Bizz. sub L. Coeli-rosa, ex Bég.*).

1156 (8) *L. alba* α *typ.* **b. stenopetala Goir.** (Bull. soc. bot. it. 1896, p. 13). — Petali più lunghi e più stretti tanto nell' unghia che nel lembo. — *Veronese.*

c. parviflora Goir. (1904). — Fi. 2-3 volte più piccoli. — *Veronese.*

β *divaricata*. — *Cors. a Tattone* (*Mand. e Fouc.*).

1157 (9) *L. rubra*. — *Elba* (*Marcucci*).

1158 *Cucubalus baccifer*. — *Sic. a Piazza Armerina* (*Lanza*).

1159 (1) *Silene vulgaris* α *vesicaria b. angustifolia* **subfor. carneiflora Le Grand.** = S. Bailleti Timb. — Petali rosei. — *Cors. a S. Fiorenzo* (*Fouc. et Sim.*).

Digitized by Google

c. commutata. — *Carnia sul M. Lovinzola a circa 1300 m.* (*Gortani !*).

subfor. ciliata Strobl (1903). — Fg. cigliate. — *Sic.* (*Strobl*).

subfor. glaberrima Strobl (1903). — Fg. affatto glabre. — *Sic.* (*Strobl*).

α *vesicaria* **for. angustissima** (**Bor.**, 1857) = Cucubalus Nocca et Balb. (1816). — *Nell'area della specie.*

for. calabra N. Terr. (1889) (sub S. inflata). — Scabrosetta e verde-scura. Fg. carnosette, ovali-lanceolate, acute. Cassule ovoidee, subeguali al calice. — *Cal. al M. Pollino all'Afforcata a 1200 m.* (*N. Terr.*).

for. oleracea (**Bor.**) = S. infl. v. oler. Ficin. — *Litor. austr. e Sic.* (*ex Gürke*).

for. pauciflora Beyer in L. Vacc. — Fusto 1-floro, con 2 altri fi. atrofizzati alla base delle fg. super. — *Val d'Aosta in Valgrisenche* (*Beyer*).

γ *alpina* **for. minor Gaud** (1828) (sub S. inflata) = S. glareosa Jord. (1852). — *Val d'Aosta in Val di Cogne* (*Wilczek*).

for. antelopum Vest. — Fg. lunghe 4-6 cm., sottili, le medie e super. arrotondate alla base; brattee cartilaginee ai margini. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*), *M. Baldo* (*Goir.*).

for. marginata Rouy = Cucubalus Kit. — *Val d'Aosta a Cogne* (*Gysperger*).

for. microphylla Boiss. (sub S. infl.) = S. alp. γ ambigua Rouy et Fouc. — *Corsica* (*ex Rouy*).

var. aetnensis Strobl (1885) (sub S. infl.). — Calice lungo solo 10 mm., strettam. campanulato, verde, quasi senza vene. Stilo appena ingrossato. Infiorescenza abbastanza ricca. Fg. spatolate, assai acute, glauche, un po' grasse. Portam. denso. — *Sic. sull'Etna* (*Strobl*).

1163 (5) *S. quadrifida* β *monachorum.* — *Appen. abruzz. nel territ. di Villavallelonga a Balza di Ciotto* (*Grande L. !*).

1164 (6) *S. alpestris.* — *Appenn. camp. al m. S. Marcello nel territ. di S. Donato ed alle Pietre Roscelle nel territ. di S. Donato - Opi a 1850 m.* (*Falqui*).

Oss. Essendo indicata questa spec. solo delle Alpi or., tale indicazione merita riconferma (Fiori).

1165 (7) *S. rupestris* **b. latifolia Bolzon.** — Fg. larghe sino a 9 mm. — *Col tipo nel Parmig. ove scende anche nella reg. submont. a 700 m. nei boschi di castagno sotto Bosco di Corniglio* (*Bolzon*).

c. major Gaud. (1828). — Pianta alta circa 25 cm. — *C. Ticino sotto Sesto presso il Ticino* (*Gaud.*).

1166 (8) *S. acaulis* α *typ. Appenn. romagnolo al M. Comero* (*Del Testa*) *e camp. ai m. Meta e Picinisco a Valcopella* (*N. Terr.*).

b. elongata (*Bell.*, *1788*), *DC.* (*1805*) = S. ac. γ pedunculosa Rchb. (1832) (Fl. An. I, p. 361 [for. b]).

c. dianthifolia Rchb. (1832). — Più lassa, con fg. più lunghe e peduncoli bratteati. — *Val d'Aosta a Col Scaletta* (*Wilczek*).

d. pedemontana Favre (1880). — Differisce dalla for. *elongata* pei fusti di 3-6 cm. senza o con un solo paio di fg. e pei calici più rigonfi alla base. — *Val d'Aosta e M. Cenisio* (*cfr. L. Vacc.*).

e. alba Otth in DC. — Fi. bianchi. — *M. Baldo* (*Goir.*) *ecc.*

f. plena Otth in DC. — Fi. doppi. — *M. Cenisio, Alpi veron.* (*Goir.*).

β *excapa* (Fl. An. l. c. [for. c.]) **b. caulescens L. Vacc.** — Fi. un po' più grandi, portati da un fusto di $^1/_2$- 2 cm. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

c. polytricoides (**Zumaglini**). — Fauce della corolla senza squame. — *Gr. S. Bernardo* (*Zum.*).

1167 (9) *S. saxifraga* α *typ.* **d. fusca Evers** (1896) = v. atropurpurea Strobl (1903) = v. rubriflora Goir. (1904). — Petali porporino-scuri in ambedue le pag. — *Trent.* (*Evers*), *Veron. nei m. Baldo e Pastello* (*Goir.*), *Sic. alle Madonie* (*Strobl*) *ecc.*

c. Seguierii Rchb. (1832). — Fg. lineari, larghe circa 1 mm., in pianta più ramosa e diffusa. — *Nell'area della spec.*

Digitized by Google

var. campana N. Terr. (1872). — Petali intensam. rosso-porporini all'esterno, ad unghia glabra (ex Terr.). — *Camp. al Matese* (*N. Terr.*).

var. petracea (**W. et K.**). — Pianta gracile, a fg. quasi acicolari ed a fi. minori, inferiorm. giallognoli. — *Triest.* (*Marches.*).

var. lanceolata Huter P. et R. (1879) = v. pumila N. Terr.? (1889). — Fg. lanceolate, seghettato-cigliate al margine. Forse da riferirsi alla v. *multicaulis*. — *Cal. al M. Pollino* (*Huter P. et R.*, *N. Terr.*).

1171 (**13**) *S. vallesia*. — *Alpi vicent. sul M. Tormeno* (*Vasolin*).

1175 (**17**) *S. muscipula*. — *Marche al M. Conero presso Ancona ed a Serravalle* (*Paol. e Card.*), *Avellinese* (*Cassito*).

c. bracteosa (**Bert.**). — Pianta meno viscosa, a fg. più larghe, le infer. ovato-lanceolate, tutte acuminate. Cassula ovoidea (nel tipo oblunga). — *Lig. occ.* (*Savignone*).

1177 (**19**) *S. cretica* α *typ.* — *Bresciano alla Bornata nel vigneto, avvent.* (*Ugolini*).

1178 (**20**) *S. inaperta*. — *Camp. al M. Meta a Costa cavallara* (*N. Terr.*).

1183 (**25**) *S. rubella*, α *typica* (cfr. Lanza in Boll. Orto Bot. Palermo 1905, p. 30). — Fusto ramoso dalla base, con rami diffuso-ascendenti. Fg. ondoso-increspate. Infiorescenza contratta. Calice leggerm. pubescente, a denti lanuginoso-cigliati. Petali obovato-cuneati, interi o leggerm. smarginati. Cassula ovato-cilindrica, più lunga del calice, 2-3 volte più lunga del carpoforo. — *In Sic. soltanto presso Palermo* (*Todaro in hb. Panorm. ex Lanza*).

β *turbinata* (*Guss.*) (Fl. An. I, p. 365 [for. b.]) (cfr. Lanza l. c.) = S. rubella Auct. Fl. Sic. = S. rubella β apetala Batt. et Trab. — Fusto semplice, eretto. Fg. piane. Infiorescenza lassa, a fi. più lungam. peduncolati. Calice glabro, più breve e più largo che nel tipo. Petali obovato-lineari, bilobi. Cassula ovoidea, uguale al calice, quasi sessile. — *Sic. a Delia, Serradifalco e Caltanissetta ed isole di Ustica, Alicuri e Filicuri* (*ex Lanza*).

1186 (**28**) *S. conoidea* β *conica*. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

1187 (**29**) *S. apetala*. — *Puglie a Manfredonia?* (*Porta e Rigo*).

b. congesta Godr. — Fi. avvicinati in gruppetti all'apice dei rami. — *Linosa* (*Tineo in hb. Panorm. ex Lanza*).

1188 (**30**) *S. sericea* **for. distachya** (**Brot.**). — *Sic.* (*ex Gürke in Richter*).

1189 (**31**) *S. pendula* **b. lepinensis A. Terr.** (1894). — Fusti abbreviati, eretti, poco ramosi, con dense rosette alla base. Fg. più piccole e più rade. Fi. *subunilaterali*, mediocri. Semi *subrotondo-reniformi*, tubercolato-ispidi. — *Laz. sotto Norma e verso Bassiano* (*Evers in Terr.*).

1182 * **S. Minae Strobl** (in Verh. Zool.-bot. Ges. 1903, p. 492). — Differisce da *S. fuscata* pei fusti maggiorm. ramosi dalla base, pei fi. sparsi (non addensati in cime terminali) e più piccoli, per la cassula a corpoforo più breve, per la pubescenza vischiosa evanescente ed infine pei semi non solcati sul dorso. — *Sic. presso Polizzi a circa 800 m., un solo esemplare* (*Strobl*).

1191 (**33**) *S. nocturna* α *typ.* **f. pauciflora Otth in DC.** — Fi. 2-6, allontanati, a petali più piccoli. — *Cors. a Bonifacio* (*Kral.*) *ed a Calvi e Caporalino* (*Fouc. et Sim.*).

Il quesito II va così modificato:

II Petali rinchiusi (o raram. nulli), senza squame alla fauce.

Δ Petali cuneiformi, poco più corti del calice. Fi. brevem. peduncolati, talora (**b. uniflora Béguinot**) ridotti ad 1-2 soltanto, in pianta assai piccola.

β *brachypetala* (*Rob. et Cast.*).

ΔΔ Petali lineari, assai più corti del calice. Fi. con peduncoli più lunghi (sino a 2 cm.), talora (**b. caprariae** [**Sommier**]) ridotti ad 1-2 soltanto, in pianta assai piccola. — S. noct. β brachypetala b. permixta Fiori in Fl. An. I, p. 367 γ *permixta* (*Jord.*).

Segue il quesito *b.* colla var.: δ *Boullui* (*Jord.*).

1191 * (**33** bis) **S. neglecta Ten.** = Cucubalus reflexus L.? = S. reflexa Auct. it., an Ait.? = S. nocturna v. reflexa Arc., Fiori in Fl. An. I, p. 367. — Secondo quanto scris-

Digitized by Google

sero il Ross (Nat. Sic. 1892) ed il Sommier (L' Isola del Giglio, p. 18) deve essere considerata come specie autonoma intermedia tra *S. nocturna* e *S. gallica*. Oltre i caratteri distintivi già indicati (Vol. I, p. 367), si aggiunga che i semi sono quasi uguali a quelli di *S. gallica*, circa il doppio più grandi invece di quelli di *S. nocturna* e nerastri (mentre in questa sono rossicci). Il Ross (l. c.) distingue una for. (**a. erecta Ross.** = var. A. Ten.) a fusto subsemplice, eretto, a fi. in cima allungata, moltiflora, aprentisi di giorno ed a corolla di $^1/_2$ più lunga del calice o più; ed una for. (**b. diffusa Ross.** = var. B Ten.) a fusto ramosissimo dalla base, sdraiato od ascendente, a fi. solitari od in cime brevi e povere, aprentisi di notte ed a petali più brevi. — *Alle località indicate si aggiunga: Laz. a Civitavecchia* (*Sang.*) *ed Elba* (*Somm.*).

1192 (**34**) *S. gallica* **for. agrestina** (**Jord. et Fourr.**). — *Cors.* (*ex Rouy et Fouc.*).

for. hirsuta Strobl (1903). — Fusti con lunghi e densi peli articolati. — *Sic. a Polizzi* (*Strobl*).

for. litoralis (**Jord.**) = S. Candollei Jord. ap. Guss. — *Basil. sul Vulture* (*N. Terr.*), *Ischia* (*Guss.*) *e Cors. a Bastia* (*Debeaux*).

for. minutiflora (**Jord. et Fourr.**). — *Cors.* (*Kralik, Fouc. et Sim.*).

for. modesta (**Jord. et Fourr.**). — *Cors.* (*Fouc. et Sim.*).

for. occitanica (**Jord. et Fourr.**). — *Cors.* (*Kralik, Debeaux*).

for. parvula (**Jord. et Fourr.**). — *Cors. a Bonifacio* (*Kralik*).

for. rosella (**Jord. et Fourr.**). — *Sicil.* (*ex Rouy*), *Cors.* (*Fouc. et Sim.*).

for. semiglabrata (**Jord. et Fourr.**). — *Cors.* (*Kralik, Reverch.*).

for. suboccultata (**Jord. et Fourr.**). — *Cors.* (*Fouc. et Sim.*).

1196 (**38**) *S. fruticosa* **b. rosea Tornab.** (1887, nomen), (1889, descriptio). — Pannocchia grande, ombrelliforme. Corolla grandicella «rosacea (*sic!*)». Fusto e fg. più grandi. — *Catania all' Armisi* (*Tornab.*).

1199 (**41**) *S. italica* α *typ.* **c. rubriflora Otth in DC.** (1824). — Pianta assai tomentosa, a calici porporini e petali con lamina porporina — *Tir. mer.* (*ex Gürke*).

d. humilis Ten. (1831). — Fusto a pochi fi. Fg. radicali subrotonde. — *Cal., Scogli del Pizzo* (*Ten.*).

β *floccosa* **c. rubella Evers** (1896) (sub S. nemoralis, sine descript.). — *Trento* (*Evers*).

γ *Salzmanni*. — *Elba* (*Marcucci*).

δ *pauciflora*. — *Cal. al M. Pollino presso la Mandra Rovitti* (*N. Terr.*).

b. Burnati Briq. (1901). — Pianta più robusta (4 dm.), a rami divergenti-ascendenti, un po' rigonfi ai nodi. Calice lungo 20 mm. nell' antesi e 25 nel frutto (nella forma genuina 15-18 mm. nell' antesi e 20-22 nel frutto). Petali sensibilm. più grandi. — *Cors. tra il ponte della Restonica e la masseria Timozzo* (*Briq.*).

1200 (**42**) *S. paradoxa*. — *Elba* (*Sommier*).

for. angustifolia Rouy et Fouc. — *Cors. a Bastia* (*ex Rouy et Fouc.*)

for. tenuicaulis Rouy et Fouc. — *Cors. a Corte* (*ex Rouy et Fouc.*).

1201 (**43**) *S nutans* **h. acaulis R. Keller** (1903). — Fi. brevem. pedicellati sopra un breve asse circondato da una rosetta di fg. assai pelose. Calice lungam. peloso, non glanduloso (cecidio?). — *Canton Ticino ad Olivone* (*R. Keller*).

i. pygmaea L. Vacc. (1904). — Fusto di 10-12 cm., con 4-5 fi. — *Val d'Aosta a 2000-2400 m.* (*cfr. L. Vacc.*).

j. alpina Reyn in DC. (1824) = v. alpestris Goir. (1904). — Pianta alpina, ridotta in ogni parte, a pannocchia contratta, subracemosa. — *Alpi veron.* (*Goir.*).

l. rubens (**Vest**). — Petali rossi. — *Veron. nel colle delle Ungherine* (*Goir.*).

1202 (**44**) *S. viridiflora*. — *Elba* (*Marcucci ex Baroni*), *Cors. a Solenzara* (*Fouc. et Sim.*).

1204 (**46**) *S. Otites* **d. parviflora** (**Pers.**, 1805) = Cucubalus Ehrh. (1792) (non Lam.). — Fi. come nella for. genuina, ma pedicelli e calici scabri e petali cigliati. Fg. lineari-spatolate. — *C. Ticino* (*ex Gürke*).

1206 *Drypis spinosa* (cfr. Béguinot in Bull. soc. bot. it. 1905, p. 54).

α **Linnaeana** (**Murb. et Wettst.**). — Pianta a fusti per lo più deboli e ad internodi al-

Digitized by Google

lungati. Fg. lesiniformi, sottili, allungate; le fiorali esterne lanceolate, lunghe 8-12 mm., con spine lunghe, superanti di molto i fi., le interne lunghe 5-8 mm. e validam. spinose. Calice manifestam. ristretto alla base. Petali a lamina divisa sin presso la base, ad unghia più lunga del calice. — *Appenn. centr. da quello l'iceno a quello di T. di Lavoro e Cal. al M. Pollino* (*Huter P. et R.*) *ed Istria presso Pola.*

β **Jaquiniana** (**Murb. et Wettst.**) = D. spinosa Jacq., Vis. — Pianta a fusti più robusti, ad internodi di solito raccorciati. Fg. più corte e più robuste; le fiorali esterne ovali, lunghe 5-8 mm., con spine brevi non sorpassanti i fi., le interne lunghe 4-5 mm. e brevem. spinose. Infiorescenza in generale più densa e ricca. Calice non attenuato in basso e membranaceo. Petali a lamina divisa fino ad $^1/_3$-$^1/_4$ e con unghia un po' più lunga del calice. — *Fiume, Triestino, Friuli or. e Veronese nella valle di Caprino ed a Torri* (*nelle quali due loc. sarebbe scomparsa sec. Goiran*).

1207 (2) *Saponaria officinalis c. hirsuta Wierzb.* (1842-43) = v. puberula R. Br. (1875) (Fl. An. I, p. 371). = v. hispida Posp. (1897) = v. aspera Saut. (1899).

1208 (2) *S. ocymoides* c. **caespitosa Goir.** (1904). — Fusti lunghissimi, ramosissimi, prostrati in cerchio. Fi. intensam. rossi. — *Veron. lungo l'Adige* (*Goir.*).

d. **albiflora Goir.** (1904). — Corolla bianca. — *Veron.* (*Goir.*) *ecc.*

1210 (4) *S. bellidifolia. — Nell' Abr. anche al Sirente* (*Groves*).

1212 (6) *S. Vaccaria* b. **grandiflora Fisch. in DC.** = Vaccaria Jaub. et Spach. — Fg. ovato-lanceolate. Fi. più grandi. — *Triest.* (*Marches.*) *e certam. altrove.*

c. **minor. Goir.** (1904). — Fusto di 20-25 cm., con 1 o pochi fi. — *Veron.* (*Goir.*).

1215 * **Gypsophila hispanica Wk.** β **papillosa** (**Porta**, Atti Accad. Rovereto 1905) = G. fastigiata Rigo in schedis et in Goir., non L. = G. fastig. v. benacensis Rigo in schedis (cfr. Béguinot in Bull. soc. bot. 1905, p. 6). — Differisce dal tipo di Spagna (sec. Porta) pei rami dicotomi, cilindrici, per le bratteole cilindriche, pel calice azzurro sul dorso, per i petali lunghi quasi il doppio del calice, non smarginati, ma rotondati e per essere sparsa di papille. Tali caratteri però sec. Béguinot (Boll. del Naturalista 1906, n. 2) non sarebbero attendibili e sufficienti per distinguerla. — *Veron. sulle colline benacensi presso Garda nel luogo detto i Campioni. Ag. Sett.* (*Rigo*).

Oss. — Potrebbe essere stata importata, ma però ora si presenta coi caratteri di pianta spont. ed in appoggio del suo indigenato sta il fatto della presenza di una spec. affine (*G. Visianii Bég.* = G. fastigiata Vis., non L.) nel M. Dinara in Dalmazia. La *G. fastigiata L.* fu indicata del Novarese in Val Formazza (Biroli, Rossi), ma per errore (cfr. Béguinot in Bull. soc. bot. l. c.).

1216 (4) *G. Arrostii* a. **glaberrima Strobl** (1903). — Pianta tutta glabra.

b. **pubescens Guss.** — Pianta a fusto, fg. e peduncoli glanduloso-pubescenti. — *Nell' area della spec.*

1218 (1) *Tunica illyrica* α *typ.* **for. flava Huter**, Pl. exs. itin. Ital. III, n. 256 et in Gürke ap. Richter (1903). — *Calabria.*

β **paniculata Lanza** (Boll. Orto Bot. di Palermo 1905, p. 33). — Fusti più alti e più robusti, terminati in pannocchia ampia, dicotoma, diffusa, moltiflora, a fi. racemosi, avvicinati, subunilaterali; peduncoli un po' più lunghi del calice. Pianta interam. glanduloso-pubescente. — *Sic. a Girgenti* (*ex Lanza*).

γ **armerioides** (**Halacsy**) = Gypsopila illyrica S. et S. = Gyps. armer. Ser. in DC. = T. Sibthorpii Boiss. = T. ill. γ fasciculata Lanza (l. c.). — Fusti terminati in pannocchia breve, addensata; peduncoli più brevi del calice. Pianta quasi glabra, a peduncoli e calici glanduloso-pubescenti. — *Sic. a Caltagirone* (*ex Lanza*).

δ **ochroleuca** (**Boiss.**) = Gypsophila S. et S. = T. ill. δ stricta Lanza (l. c.). — Fusti terminati da una pannocchia stretta, un po' divaricata, a pochi fi.; peduncoli gracili, eguali al calice. Calice stretto, a denti triangolari-acuminati. Pianta inferiorm. glanduloso-pubescente, superiorm. glabra. Petali (nel secco) pallidi. — *Sic.* (*ex Lanza*).

c. **cretica** (**Boiss.**) = Saponaria L. = Gypsophila S. et S. — Densam. cespugliosa alla base, a fusti bassi, diffusi od ascendenti, quasi semplici, a pochi fi.; peduncoli filiformi,

Digitized by Google

un po' più lunghi del calice. Fg. lineari-lanceolate. Calice con striscia verde più larga sui nervi. Pianta ovunque glanduloso-pubescente. Petali bianchi di sopra e senza macchie, di sotto con linee porporine. — *Sic. alle Madonie* (*ex Lanza*).

1219 (2) *T. saxifraga* α *typ.* e. **albiflora M. Gortani** (1903). — Petali interam. bianchi o talora venati di roseo all'esterno. — *Friuli presso Tolmezzo* (*Gortani*).

f. **grandiflora Goir.** (1904). — Pianta più robusta, a fi. grandi il doppio dell'ordinario. — *Veron. a S. Anna d'Alfaedo* (*Goir.*).

g. **muscoides Goir.** (1904). — Pianta contratta, ridotta in ogni parte. — *Veron. nei luoghi calpestati* (*Goir.*).

1220 (3) *T. prolifera* α *typ.* d. **albiflora Goir.** (1904). — Fi. bianchi. — *Veron. nella Valdonega* (*Goir.*).

β *velutina* b. **levicaulis** et c. **uniflora Rouy et Fouc.** — *Ambedue in Cors.*

γ **Nanteuillii Rouy et Fouc.** = Dianthus Burn. a. **genulna** et b. **pubescens Rouy et Fouc.** — *Ambedue in Cors.* (*Fouc. et Sim.*).

1221 *Velezia rigida.* — *Elba* (*Sommier*).

b. **sessiliflora Williams** (in Journ. of Bot. 1899, p. 28). — Pianta tutta leggerm. pubescente. Fi. a pedicelli brevissimi. Calice più lungo che nella for. genuina, coperto di peli più rigidi. — *Piem. a Mondovì ed a Benevento* (*ex Williams l. c.*).

1223 (2) *Dianthus barbatus L.* **var. compactus (Kit.)** = D. barb. v. alpinus Neilr. — *Italia media* (*ex Gürke in Richter*).

1224 (3) *D. Carthusianorum* α *typ.* c. **nanus Ser. in DC.** (1824) = v. pygmaeus Gaud. (1828) = v. pumilus L. Vacc. (1904). — Pianta alpina subacaule. — *C. Ticino al S. Gottardo* (*ex Ser.*) *ed a Sonogno* (*Chenev.*), *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

d. **anisopodus Ser. in DC.** (1824) = v. proliferus Lenticchia (1896). — Fi. aggregati, parte peduncolati e parte sessili. — *C. Ticino* (*Lenticchia*).

β *vaginatus* b. **pauciflorus (Bruegg.).** — Fi. solitari od in fascetti di 2-3. — *C. Ticino in val Blenio* (*R. Keller*).

γ *atrorubens* b. **uniflorus N. Terr.** (1889). — Fusto esile, 1-floro. — *Cal. al M. Pollino all'Afforcata a 1980 m.* (*N. Terr.*).

ε *Balbisii b. Levieri* (*Borb.*, 1876 e 1877). — Sec. Gürke in Richter (Pl. eur. II, p. 375) sarebbe un ibrido, cioè: *Balbisii* × *inodorus.* — *Firenze a M. Cuccioli* (*Levier, 1876*).

c. **sassinianus Arc.** (1892) (sub D. Carthus). — Petali a lamina romboideo-oblunga, munita nel mezzo di 1 o 2 laciniette bifide. — *M. Pisano nel luogo detto la Sassina presso Ripafratta* (*Arc.*).

1224 * **D. paradoxus R. Keller** = D. vaginatus × inodorus R. Keller (Bull. herb. Boiss. 1903, p. 383). — *C. Ticino in val Blenio a Camperio a 1200 m.* (*A. Keller*).

1225 (4) *D. Seguierii* c. **minor Gaud** (sub D. collinus) = v. uniflorus Goir. — Fusti semplici, spesso con un sol fi. — *Nelle Alpi.*

var. collinus (W. et K.) — *Veronese* (*Goiran*).

1226 (5) *D. rupicolus* c. **virescens Guss.** — Fg. verdi, più acute e più sottili. — *Sic.*

d. **albiflorus Presl.** — Fi. bianchi. — *Sic.*

for. aeolicus (Lojac., Fl. Sic. I, p. 163 [1888]). — *Isola di Lipari* (*Lojac.*).

1227 (6) *D. tripunctatus.* — *Elba nel Golfo Stella* (*Sommier*).

1228 * **D. deltoides** × **Seguieri** = D. decrescens Borb. (Oest bot. Zeit. 1877, p. 378). — *Lig. occ. ad Albissola marina* (*Piccone*).

1230 (9) *D. glacialis* b. **Buchneri Dalla Torre** (1892). — *Valtellina a Bormio.*

c. **acaulis Tausch** (1839). — Fi. radicali, sessili o quasi, quasi nascosti dalle fg. — *Alpi.*

1231 (10) *D. alpester* δ *neglectus.* — *Alpe di Rigoso e M. Orsaro nell' Appenn. parmigiano* (*Avetta e Casoni*).

1231 * **D. Gyspergerae Rouy.** – Prossimo *a D. furcatus Balb.* — *Cors.* (*Gysperger ex Rouy*).

1223 (12) *D. Caryophyllus* β *virgineus* **for. gracilis Fouc. et Mand.** (Bull. Soc. bot. France 1900). — *Cors. sul M. Felce presso Corte* (*Mand. e Fouc.*).

Digitized by Google

for. Godronianus (Jord., 1855-62) = D. virgin. β longifolius Rouy (1892). — *Alpi Mar. e Cors.*

γ *longicaulis* (Fl. An. I, p. 379 [for. β b.]).

for. albiflorus Guss. (1855). — Fi. bianchi. — *Ischia ecc.*

for. garganicus Nob. = D. silvestris C. garg. Ten. (1831) = D. neapolitanus A. Terr. p. p. (N. Giorn. bot. it. 1894, p. 151). — *M. Gargano* (*Ten.*).

for. hirtocaulis Kern. in Porta et Rigo exs. n. 380 (1875). — *It. mer.*

for. lucanus N. Terr. (N. Giorn. bot. it. 1873, p. 19) = D. neapolitanus b. luc. A. Terr. (1894) — *Basil. a Muro* (*N. Terr.*).

for. maritimus A. Terr. (1894, l. c.) = D. Caryoph. v. minor Moris (1837) — *Arene mar. in Sard.* (*Moris*).

for. minor Ten. (1831) = v. parviflorus A. Terr. (1893). — *It. mer.* (*Ten.*, *A. Terr.*).

for. pollinensis Nob. = D. silvestris N. Terr. (Fl. M. Pollini, p. 58) = D. neapolitanus α pollinensis A. Terr. (1894). — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

for. tenuifolius A. Terr. (1894, l. c.) = D. caryoph. β tenuifol. Moris (1837). — *Sard.* (*Moris*).

for. virgatus (Pasq., 1864). — *Cal. a Grotteria* (*Pasq.*) *e Tiriolo* (*Guss.*).

δ *inodorus* (Fl. An. l. c. [v. γ]). — *Anche nell' Istria.*

c. pygmaeus (Fl. An. l. c. [v. δ]). — *Bellun. nelle vette di Feltre* (*Montini*) (*loc. class.*) *ecc.*

d. uniflorus Gaud. (1828) = D. Scheuchzeri Rchb. (1832) = D. silvestris β humilior Koch (1835). — Fusto 1-floro. — *Reg. elevate delle Alpi.*

e. frigidus (Koch, 1824) = D. silv. γ subacaulis Koch (1835). — Fusto quasi nullo, 1-floro. Portam. del *D. glacialis.* — *Reg. elevate delle Alpi.*

f. humilis Evers (1896). — Pianta alta 5 cm., bruna ai nodi. Fg. rigide, le cauline patenti. — *Trent. a Brenta* (*Evers*).

g. juratensis (Jord.) = D. rupicola v. grandiflorus Reut. — Fi. grandi, con unghia dei petali sporgente dal calice, che ha i denti nettam. ottusi, quasi arrotondati. Fg. strettam. lineari. — *C. Ticino sulla Cima di Cagnone a 1700 m.* (*Chenev.*).

h. parviflorus Beyer in L. Vacc. (1904). — Fi. assai piccoli, a squame calicine assai più acute dell' ordinario. — *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. micropetalus Gürke (1903) = D. silv. v. micropet. Rchb. (1844). — *Alpi.*

for. brachycalyx (Huet exs., 1855) = D. silv. v. brachycal. F. N. Williams (1885). — *Napoletano.*

ε *tergestinus.* — *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

b. flaccidus Marches. — Fusti cespugliosi, gracili, assai ramosi, con nodi grossi. Fg. lineari-strettissime, molli. Fi. un po' odorosi. — *Triest. ad Obrou ed Odollina* (*Marches.*).

c. brevifolius Marches. — Fusto per lo più semplice, grosso, depresso. Fg. corte, rigide, glauche, quasi ensiformi. — *Triest. sulle rupi calcari d' Isola* (*Marches.*).

ζ *Arrostii.* — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

for. biflorus Presl = D. contractus β evolutus Lojac. (cfr. Strobl, in Verh. Zool.-bot. Ges. 1903, p. 488-89). — *Sicilia.*

for. contractus (Jan) Guss. = v. uniflorus Presl = v. pygmaeus N. Terr. (1889) (cfr. Strobl l. c.). — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*) *e Sic.*

for. graminifolius (Presl) (cfr. Strobl. l. c.). — *Sicilia.*

for. latifolius Lojac. (1888). — *Sic. a Busambra.*

η *siculus* **for. Gasparrinii (Guss.).** — *Cal. e Sic.* (*cfr. Strobl l. c.*).

for. miniatus (Huet exs., 1855), **F. N. Williams** (1885). — *Sicilia.*

1235 (14) *D. superbus* **b. speciosus Rchb. (Rchb.)** = v. alpinus Herbich. — *Veron. sui Lessini* (*Gelmi ex Goir.*).

1237 * *D. controversus.* — *M. Baldo in Val Losana* (*Goir.*).

Digitized by Google

TAMARICACEAE

1240 (1) *Tamarix gallica* **a. cylindrica Strobl** (1903). — Spighe cilindriche.
b. ovalis Strobl (1903). — Spighe ovali. — *Sic.* (*Strobl*) *ecc.*

1242 *Myricaria germanica* β *squarrosa.* — Sec. Haussknecht (Mitth. Thür. Bot. Ver., 1898) questa var. altro non è che una deformazione prodotta da animali ossia un *cecidio* ed è stata pure raccolta nel *Trent. in Val di Fassa presso Campidello.* — Di questa pianta si sono occupati anche: E. Girod et A. Faure (Bull. Herb. Boiss, 1904, p. 1221), i quali senza essersi accorti della presenza di un insetto portano però delle osservazioni che vengono a convalidare che si tratti di un cecidio.

ELATINACEAE

1244 (1) *Elatine Alsinastrum.* — *In Tosc. anche al lago Secco presso Capalbio* (*Sommier !*), *Umbria a Castiglione del Lago* (*Montaldini*) *e Lazio nelle Paludi Pontine* (*Béguinot*).

1245 (2) *E. Hydropiper* ε *macropoda.* — *Paludi Pontine* (*Béguinot*).

HYPERICACEAE

1249 (4) *Hypericum calycinum.* — *Inselvat. qua e là nei parchi nel Triest. e specialm. a Miramare* (*Marches.*), *Camp. a Civitavecchia d'Arpino* (*Falqui*).

1252 (7) *H. quadrungulum.* — *Abr. lungo l'Aterno* (*Groves*).
α *typ.* **b. punctatum Schinz.** — *C. Ticino alla Cima di Cagnone* (*Chenevard*).
γ *acutum.* — *Istria nel territ. di Parenzo sotto Visinada* (*Calegari*).
c. insulare (**Fouc. et Mand.**, 1900), **Briq.** (1901). — Forma intermedia tra la var. *acutum* genuina e la var. *corsicum* (ex Briq.); differisce dalla prima per i fusti bassi, gracili, ad ali assai strette e non od appena intaccate, per le fg. più piccole, più arrotondate, meno fortem. nervate ed i fi. un po' più piccoli, dalla seconda differisce pei fi. più numerosi, in corimbo denso od anche più lasso ed allora piramidale. — *Cors. tra il colle di Sorba e Ghisoni* (*Fouc.*, *Briq.*).

1254 (9) *H. perforatum* α *typ.* **c.**[1] **angustifolium DC.** = H. stenophillum Opiz. — Fg. allungate, le cauline oblunghe e le rameali lineari-oblunghe. — *Nell' area del tipo.*
for. mediterraneum Rouy et Fouc. — *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).
for. pollinense N. Terr. (1889). — Fusti densam. cespugliosi, ramosi dalla base. Fg. misuranti 20 per 5-7 mm. Sepali acuminato-rostrati, glanduloso-dentati all'apice. — *Cal. al M. Pollino presso la Mandra Rovitti* (*N. Terr.*).
β *alpinum.* — *M. Lessini nel Veron.* (*Goir.*). — A questa var. deve probabilm. riferirsi l' *H. Desetangsii v. grandiflorum Somm. ex Boggiani*, delle Terme di Valdieri (cfr. Boggiani in Marchisio, Guida alle Terme di Valdieri, Torino 1898).

1255 (10) *H. humifusum.* — *Malta* (*Delicata*).
α *typ.* **b. Liottardi** (**Vill.**). — Pianta bienne, a fusti gracili, brevi (3-8 cm.), eretti. Fi. a 4 sepali e 4 petali; stami numerosi. — *Piem. presso il lago di Candia* (*L. Vacc.*).
β *australe* **b. albiflorum N. Terr.** (Relaz. I, p. 4). — *Laz. a Fondi* (*N. Terr.*).
c. minus Rouy et Fouc. — Pianta ridotta in ogni parte, di 10-15 cm. — *Corsica.*

1259 (14) *H. perfoliatum* α *typ.* **b. acutifolium DC.** (sub H. ciliatum). — Fg. più piccole e più acute. Fi. più lungam. pedicellati. — *Sic.* (*Guss.*, *Strobl*).

1261 (16) *H. montanum* **c. imperforatum L. Vacc.** — Fg. senza punti pellucidi come nella for. *b. caucasicum*, ma a fg. brevem. e densam. pubescenti ed un po' ruvide di sotto. — *Val d'Aosta nella val di Cogne ad Epinel* (*L. Vacc.*).
d. scabrum Koch. — Fg. scabre di sotto — *C. Ticino a Mergoscia* (*Chenevard*) *ecc.*

1262 (17) *H. hirsutum.* — *Anche nell'Istria.*

1265 (20) *H. Coris.* — Gli esemplari di Cal. presso Cosenza determ. con questo nome dal Solla appartengono all' *H. hircinum !*

Digitized by Google

(?) **H. dichotomun Zum.** (Fl. Pedem. II, p. 388). — *Sine loco, forte importata* (*ex Zum.*). — *Quid?*

CISTACEAE

Cistaceae. — Vedi: Grosser in Engler Pflanzenreich IV-193.

1267 * **Helianthemum Sieberi Bruegg.** (1880) = H. Fumana α × Chamaecistus? — *Bergamasco* (*Bruegg. ex Grosser l. c. p. 127*).

1268 (2) *H. arabicum.* — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

β *Savii.* — *In Tosc. anche al M. Argentario* (*Riccasoli, ex Bert.*).

1272 (6) *H. rubellum Presl* (1822). — Visto che questo nome è generalm. adottato, mentre l'altro anteriore, cioè *H. rubellum Moench* (1802) è affatto caduto in sinonimia, crediamo si possa seguire l'uso e mantenerlo. Lo sostituiamo poi a quello di *H. rotundifolium* adottato precedentem. (Vol. I, p. 393), perchè il vero *H. rotundifolium Dun. in DC.* (= Cistus nummularius Cav., non L. = H. nummularium Gross., non Mill.) secondo Willkomm e Grosser è una pianta differente propria della Spa., Port., Alger. e Marocco e non un sinonimo di *H. rubellum* come ritenne il Parlatore (Fl. it. V, p. 622). — *Camp. al M. Cajro ed al Zaffineto* (*N. Terr.*).

a. bicolor Wk. — Fg. verdi di sopra e quivi glabre o sparsam. pelose, bianco-tomentose di sotto. Calice brevem. pubescente od irsuto. — *Cal. e Sic.*

b. nebrodense (*Heldr. in Guss.*) = H. rubellum β Bert. = H. canum β nebrodense Parl. — Fg. bianco-tomentose in ambedue le pag. Calice villoso per peli patenti. — *Sic. sulle Madonie.*

c. atroglandulosum Grosser l. c. — Fg. verdi di sopra e bianco-tomentose di sotto. Racemi, pedicelli e sepali più o meno coperti di glandule stipitate violaceo-scure. — *Sic. sul monte Pizzuta* (*Todaro, Ross.*).

1273 (7) *H. canum α typ.* — *Bolognese alla Rocca di Badalo* (*Baldacci ex Betti*), *Murgie di Gravina in T. di Bari* (*Palanza*).

d. candidissimum Ten. (sub H. ital.) = H. canum Ten. Fl. Nap. — Fg. bianco-tomentose in ambedue le pagine, lanceolate. — *Appenn. centr. e mer.*

β *italicum.* — *Bolognese alla Rocca di Badalo* (*Baldacci ex Betti*).

d. melanostrictum Nob. = H. penicillatum f. melan. Grosser l. c., p. 116. — Rami fioriferi assai allungati, stretti, superiorm. violaceo-glandulosi. Fg. glabrescenti, assai revolute. Sepali con strie violacee. — *Abruzzo* (*O. Stein ex Grosser l. c.*).

N.B. Il Grosser (l. c.) ha sconvolto gran parte della sinonimia e nomenclatura riferentisi a questa specie (sensu lato); noi non possiamo però seguirlo, perchè non faremmo che creare confusione.

1274 (8) *H. lunulatum.* — *Assisi a Colcaprile in pochissimi esemplari* (*Morroi e Brizi*) (?)

1276 (10) *H. apenninum α typicum* **d. calcareum (Jord.).** — Fg. più piccole (lunghe 10-18 mm.), pulverulente, assai revolute. Sepali giallo-verdastri, vellutati. — *Nell'area del tipo* (*ex Grosser l. c.*).

γ *pilosum.* — *Bolognese alla Rocca di Badalo* (*Baldacci ex Betti*).

b. farinosum Gross. l. c. = H. racemosum β farin. Dun. — Fg. bianche sulle due facce, talora quasi nivee. Sepali pulverulento-tomentosetti, spesso rossastri sotto il tomento, talora ispidetti sulle coste. — *Alpi liguri occ.* (*ex Grosser l. c.*).

1276 * **H. apennino × glaucum Gross.** l. c. = H. Andersoni Sweet = H. polyfol. v. rupicolum Huter P. et R. — *Cal. presso Stilo sul M. Stella* (*Huter P. et R. ex Grosser*).

1277 (11) *H. Chamaecistus.* — I dispareri degli Autori sull'interpretazione dei vecchi nomi, applicabili alle entità di questa spec., hanno dato luogo ad una sinonimia intricatissima, che sembrava fosse stata ben chiarita nella bella monografia del Willkomm alla quale ci eravamo attenuti; recentem. però il Grosser (l. c.), con interpretazioni diverse a quelle del monografo precedente, ha di nuovo sconvolto tale sinonimia, aumentando la confusione, perchè male a proposito (in alcuni casi) volle conservare i vecchi nomi. A

Digitized by Google

scanso di equivoci riteniamo perciò opportuno di fare le seguenti modificazioni di nomenclatura e sinonimia:

α *barbatum* (*Pers.*) = Cistus Lam. = H. vulg. a. genuinum α concolor Wk. = H. Chamaec. α vulg. Fiori in Fl. An. I, p. 395.

a. obscurum (*Pers.*), Fiori in Fl. An. l. c. = Cistus hirsutus Thuill. (1799), non Lam. (1790) = H. vulg. β hirsutum Koch. = H. hirsutum Kern. = H. vulg. a. genuinum 2. lanceolatum Wk.

b. ovatum (*Dun. in DC.*) = Cistus Viv. = Cistus nummularius L. (et Auct. pl.) = H. nummularium Mill. (ex Wk.) = H. vulg. a. genuinum 1. heterophyllum Wk. = H. Chamaec. α vulg. b. numm. Fiori in Fl. An. l. c.

c. hyssopifolium (*Ten.*), Fiori in Fl. An. l. c. = H. vulg. α conc. 3. angustifolium Wk.

c. glabrum Koch (1837) (pr. var. H. vulg.) (*Kern.* [1883]) = Cistus serpyllifolium Crantz (non L.) = C. helianthemoides Crantz (non Desf.) = H. vulg. b. grandiflor. 1 alpestre Wk. p. p. = H. Chamaec. α vulg. d. glabrum Fiori in Fl. An. l. c. = H. Chamaec. β serpyllifolium Gross. l. c.

d. aurantiacum Goiran. — Corolla aranciata. — *Verona in Valdonega.*

β *tomentosum* (*Dun. in DC.*) = Cistus Scop. (ex Gross.) = C. serpyllifolium L.? = H. serpyll. Mill. (ex Wk.), Dun. in DC. = H. nummularium Mill. (ex Gross.) = H. vulgare Gaertn. p. p., Dun. in DC. = H. vulg. α tomentosum Koch = H. vulg. a. genuinum β discolor Wk. = H. Chamaec. β serpyllifol. Fiori in Fl. An. l. c. = H. Chamaec. subspec. nummularium α tomentosum Gross. l. c.

γ *grandiflorum* (*DC.*) = Cistus Scop. **a. eugrandiflorum Gross.** l. c. — Fg. larghe, tutte ovato-rotondate od obovate, verdi-chiare.

b. cenisiacum Gross. l. c. — Fg. più piccole, ovato-lanceolate, con lunghi peli patenti. Fi. assai grandi. — *Reg. alp. nelle Alpi occ. e centr.* (*ex Grosser*).

c. Seguieri (Pollini). — Corolla solfina. — *Monti del Veron.* (*Poll., Goir.*).

δ **Scopolii Wk.** = Cistus tomentosus Scop. (ex Wk. et Auct. plur.) (non H. tomentosum Dun. in DC.).

ζ *Berterianum* **b. albiflorum Bolzon.** — *Parmig. a Ponte Taro* (*Bolzon*).

θ *leptophyllum.* — *Puglie nella duna di Lesina presso la spiaggia* (*Adr. Fiori*).

ι *glaucum* (*Pers.*) = H. glaucum b. flavum Wk. — Petali gialli. Calice glaucoverdastro. — *Sec. Grosser proprio solo della Spa. e da escludersi dalla Sicilia.*

κ *croceum* (*Pers.*) (Fl. An. I, p. 396 [for. ι b.]). — Petali ranciati. Calice coperto di minuta pubescenza stellata, giallognola, raram. (**b. intermedium Guss.**) con peli lunghi e patenti. Fg. glauche di sopra e pubescenti od anche (**c. candidissimum Strobl,** 1903) quivi densam. bianco-tomentose, le infer. quasi tonde, le medie ellittiche e le super. lanceolate ed acute (**d. acutiusculum Presl,** sub H. glauc.) od anche ottuse (**e. obtusiusculum Presl,** sub H. glauc.), ovvero (**f. stellatum [Guss.]** [cfr. Strobl] = for. longepedicellatum Wk. = for. lanceolatum Grosser = for. angustifolium Strobl) quasi lineari e più lunghe (10-22 per 3 mm.) in pianta a pedicelli talora allungati od infine (**g. subovatum Presl,** sub H. glauc.) ovali e densam. pelose. — *Nizz., A. Apuane, It. mer., Sic. e Sard.*

λ **bicolor (Presl).** — Petali ranciati, calice irsuto per peli bianchi più copiosi che nella var. prec. Fg. verdi di sopra, da giovani irsute, bislungo-lanceolate. Pianta talora (**b. hirsutissimum Strobl,** 1903) maggiorm. pelosa. — *It. mer. e Sic. sulle Madonie da 1500 a 2000 m.*

1277 * **H. Chamaecistus × glaucum Gross.** (l. c. p. 87). — *M. Corchia nelle Alpi Apuane* (*in hb. hort. Pisani ex Grosser*).

N.B. Sec. Grosser sarebbe da riferirsi a questo ibrido (che per noi è una forma intermedia tra var. di una stessa spec.) l'*H. stabianum Ten.* dei monti di Castellamare nel Nap.

1278 (12) *H. retrofractum.* — *Liguria* (*Bradley in hb. Pittoni ex Grosser*).

1279 (13) *H. aegyptiacum.* — *Cors. presso Bastia* (*Billiet*).

Digitized by Google

1280 (14) *H. salicifolium.* — *Isola del Giglio* (*Martelli ex Somm.*).

α *typ.* **d. pilosum Guss.** — Fusti e peduncoli pubescenti-pelosi per peli patenti, bianchi, distinti (non riuniti a fascetti). — *Sic.*

1281 (15) *H. lediditolium.* — *Puglie nelle Murge di Altamura e Ruvo* (*Palanza*).

1282 (16) *H. guttatum* α *typ.* **c. siculum Nob.** = Tuberaria villosissima α sicula Gross. l. c. — Pianta lungam. bianco-villosa, a rami dell' infiorescenza pelosi ed in alto viscoso-glandulosi. Pedicelli nell' antesi subeguali ai sepali (nella for. genuina più lunghi dei sepali). Cassula villosa. — *Sic. a Scoglitti* (*Sommier ex Gross.*).

γ *plantagineum* **for. micropetalum Wk.** — *Corsica* (*Salzm., Fouc. et Sim.*).

for. viscosum Fouc. et Sim. (1898). — Pianta vischiosa nella parte super. — *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).

1283 (17) *H. Tuberaria* **a. triviale Nob.** = Tuberaria melastomatifolia α trivialis Gross. (l. c.). — Fg. verdi di sopra, bianco- o sericeo-tomentose di sotto.

b. lanatum Nob. = Tuberaria vulgaris β lanata Wk. — Fg. basali sericeo-villoso-nivee in ambedue le pag. — *It. mer.* (*Huter P. et R.*) *e Sic.* (*Lojac.*) (*ex Grosser l. c.*).

1285 (1) *Cistus Clusii.* — *Puglie presso Lesina alla Torre del Fortore nelle sabbie mar.* (*Adr. Fiori*).

1286 * *C. monspeliensi* × *salvifolius* = C. Flichei Fouc. et Simon (1898) (cfr. Grosser in Engler Pflanzenreich IV-193, p. 30). — *Corsica a Capitello* (*Fouc. et Simon*).

1287 (3) *C. salvifolius.* — *Colli di Reggio Em. tra Puianello e Casina e tra Ciano d'Enza e Vetto* (*Casali*).

α *typ.* **a. brevipedunculatus Wk.** (1856) = C. apricus Timb. (1892). — Peduncoli nell' antesi lunghi 2-3 cm., 1-flori.

b. longipedunculatus Wk. = C. velutinus Timb. — Peduncoli allungati nell' antesi, lunghi 4-8 cm., 1-flori. — *Ambedue le for. nell' area della spec.*

Seguono le for. *c. biflorus Wk.* e *d. cymosus Wk.* già descritte (Vol. I, p. 399).

e. fruticans (Timb.) = Ledonia Jord. et Fourr. = C. corbariensis Rchb. (non Pourr.) = C. salvifol. β corbariensis Vis. et Sacc. ? — Fg. piccole (lunghe 14-16 mm.), ovali. Fi piccoli. Cassule largam. troncate. — *Euganei* (*?*) (*Kellner, Maly*) *e Cors. a Portovecchio* (*Revel. ex Rouy.*).

f. arrigens (Timb.) = Ledonia Jord. et Fourr. — Fg. strettam. oblunghe, acute, contratte in picciuolo gracile, subeguale ad $^1/_2$ del lembo. Fi. grandi. — *Cors. a Bastia* (*Revel. ex Rouy*).

f. humifusus DC. — Fusti sdraiati — *Sic.* (*Strobl*).

1287 * (3 bis) **C. laurifolius L.** — Distinguesi a prima vista dal *C. salvifolius* per le fg. grandi, ovali-lanceolate ovvero (**b. angustifolius Rouy**) lanceolate, pei fi. grandi, in racemi corimbosi, a petali bianchi con unghia gialla e pel calice a 3 sepali. — *Tosc. nei monti tra il Mugello e la Valle delle Sieci, non lungi dalla Madonna del Sasso in copia e sopra larga estensione di terreno* (*Sommier, in Bull. soc. bot. it. 1899, p. 61*); *perfettamente naturalizzato nel parco della villa Panciatichi a S. Mezzano presso Rignano nel Val d' Arno super. ed anche nei terreni circostanti* (*Sommier !*), *Cors. nella foresta demaniale di Marmano presso Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*).

1288 (4) *C. parviflorus.* — *Assisi presso Biagiano in due esemplari* (*Morroi e Brizi*) (*?*).

1289 (5) *C. incanus* α *typicus* = C. polymorphus subsp. incanus var. occidentalis α genuinus Willk.

β *villosus.* — *Colli del Cesenate* (*Del Testa*).

δ *creticus.* — *Golfo di Napoli nell' Isoletta di Vivara* (*Béguinot*), *Malta*, (*Delicata*).

1290 (6) *C. crispus.* — *Isole Ponziane a Zannone* (*Béguinot*).

1291 (7) *C. albidus.* — L' indicazione « *Vallombrosa a Donnini* (*Borzì ex Piccioli*) » è certam. erronea e deve riferirsi a *C. incanus* β *villosus* (non menzionato dal Piccioli), il quale però non cresce proprio a Donnini ma più giù lungo l' Arno. Anche l' indicazione del « *Teramano* (*Crugnola*) » è forse dovuta allo stesso equivoco.

Digitized by Google

VIOLACEAE

1292 (10) Viola arborescens L. — *Sardegna nel Sassarese in ristretta area fra contrada Crabolazzi e contrada Malafede, a circa 200 m.; in frutto nel luglio* (*Nicotra*).

N.B. Questa specie, che avevamo esclusa dalla Flora It. (cfr. Fl. An. Vol. I, p. 409), è quindi da riamettersi.

1292 (1) *V. canina α typ.* — *Cors. al lago di Nino* (*Romagnoli*) *e tra Sidoni e Ponte Alto* (*Audigier ex Fouc.*).

e. ericetorum Rchb. — Pianta depressa, a fg. allungate, verdi. — *Triest. nei terreni soleggiati* (*Marches.*), *Veron.* (*Goir.*) *e certam. altrove.*

f. sabulosa Rchb. — Pianta depressa, a fg. piccolissime, cordate, soffuse di violetto — *Triest. in luoghi rupestri soleggiati* (*Marches.*).

g. lanceolata Martr.-Don. = V. Guitteanae Giraud. — Fusti allungati, semplici o ramosi. Fg. medie e super. o le super. solam. lanceolate, quasi troncate ed a picciuolo allungato. — *Tosc. alla Badia al m. Scalari* (*Somm. fide Chiovenda*).

β *lactea.* — In luogo di « *Carnia* (*Posp.*) » leggasi « *Friuli presso Cormons* (*Posp.*) ».

γ *Ruppii.* — Sec. Burnat e Briquet (Ann. du Conserv. et Jard. Bot. de Genève 1902, p. 143) la *V. Ruppii All.* è la *V. montana L.* Sp pl. ed. I, p. 935 (1753) (p. p.); Fl. Suec. ed. II, p. 305 (1755). — *Trovasi in parecchi luoghi delle Alpi Mar.*

δ *Schultzii.* — *Alpi carniche a M. Paularo in Valpudia* (*Gortani!*).

ε *persicifolia b. nemoralis* (*Kuetz.*) = V. Kützingiana Rouy et Fouc. — *C. Ticino in Val Verzasca tra Brione e Frasco* (*Chenev.*).

η *pumila* = V. lactea K. et Z. (non Sm.) = V. Ruppii Presl. (non All.). — *Tir. mer. a Salorno* (*Sauter*).

θ *silvatica* **a¹. alba Parl.** — Fi. bianchi. — *Raram. col tipo.*

d. arenicola (A. Chabert) = V. silv. v. alpicola Goir. — Pianta ridotta in ogni parte, colle fg. rossastre di sotto. — *Veron. sul m. Baldo e sui Lessini* (*Goir.*).

1292 * V. Weinharti W. Becker = V. Ruppii × Riviniana = V. montano × Riviniana. — *Alpi Mar. sul m. Stope tra Garessio e Pamparato* (*Briquet et Cavillier, ex Burn. et Briq. l. c., p. 152*), *C. Ticino a Contra, sopra Losone, a Frasco e sopra Altanca* (*Chenev.*).

1293 * V. mirabilis × silvatica Rap. = V. spuria Celak. — *Veron. presso Montecchio* (*Goir.*).

1293 * * V. mirabilis × Riviniana Uechtrz. = V. Uechtritziana Borb. — *Veron. nella Valpantena al M. Tondo* (*Goir.*).

1294 (3) *V. hirta α typ.* **for. calcarea Bab.** = V. parvula Opiz. — *Veronese* (*Goir.*).

for. fraterna Rchb. — *C. Ticino.*

for. hirsuta (Schultes) Lge. — *Veronese* (*Goir.*).

β *collina.* — *Bosco Fontana presso Mantova* (*Moretti-Foggia*), *Parmigiano* (*Avetta e Casoni*), *Alpi Apuane sotto il Procinto, Garfagnana a Gramolazzo e a Benabbio in Val di Lima* (*Somm. fide Chiovenda*).

ε *permixta.* — *Tosc. ai Bagni di Lucca* (*Somm. fide Chiov.*).

η *adulterina* = V. abortiva Jord. — *C. Ticino sotto Morbio inferiore* (*Chenevard*).

θ *alba.* — *Elba* (*Sommier fide Chiov.*).

b. scotophylla **subfor. glaberrima W. Becker** (Mittel. d. thüring. bot. Ver. 1904, p. 40). *Trentino.*

e. violacea. — *Capraia, Elba e Giglio* (*Somm.*).

for. pungens Gr. et Godr. — *Verona nella Valdonega* (*Goir.*).

for. vinealis (Bor.). — *Verona nella Valdonega* (*Goir*).

ι *multicaulis* = V. odorata β Burnat = V. pluricaulis Borb. = V. scotophyllo × odorata W. Becker. — *Alpi Mar. nella reg. litoranea, Val d'Aosta* (*L. Vacc.*), *Elba sul M. Volterraio* (*Somm. fide Chiov.*).

Digitized by Google

κ *odorata* **for. Favrati Gremli.** — Fg. in parte completam. orbicolari; stipole più strette. Corolla più carica — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*) *e C. Ticino.*

for. alba Parl. — Corolla bianca. — *Qua e là.*

for. bicornis Goir. (1904). — Sperone bipartito, con partizioni lunghe 10 mm., ovvero sacciforme e smarginato (for. teratologica). — *Veronese* (*Goir.*).

for. macrantha Goir. (1904). — Corolla lunga 25 mm. e più, a petali crenati, bifidi, intensam. violacea, odorosissima; sperone grosso, assai più lungo delle appendici calicine. Cassula globosa, pubescente. — *Verona nella Valdonega* (*Goir.*).

μ *suavis.* — *Firenze a Scandicci* (*fide Chiov.*), *Elba* (*Marcucci fide Chiov.*).

1294 * **V. hybrida Val d. Lievre** = V. collino × hirta. — *Tir. mer. a Bolzano verso Kastelrut* (*Sauter*).

1295 * **V. pinnato × uliginosa** = V. Rossii Chiovenda. — *Val Sesia presso Valduggia* (*Rossi, ex Chiov. in Bull. Soc. bot. it. 1893, p. 207*).

1299 (8) *V. cenisia* β *Comollia.* — *M. Generoso?* (*Penzig*).

γ *valderia* **b. glabrescens A. Terr.** in Bull. Soc. bot. XXI, p. 327 (1889). — *Colla spec.* (*A. Terr.*).

1300 (3) *V. calcarata* α *typica e. apennina A. Terr.* — Non è ben chiaro a quali entità debba applicarsi questo nome e ad ogni modo, basandosi sulle località citate, esso abbraccia diverse forme per cui è da abbandonarsi, affine di evitare confusione. — *L'habitat della V. calcarata typica resta quindi limitato alle Alpi.*

β *Eugeniae c. Levieri* (*Parl.*) = V. grandiflora Seb. et Maur. = V. Tenorii v. intermedia A. Terr. l. c. — Distinguesi, oltre che per la forma allungata delle fg. e per la pubescenza (talora però mancante), anche per i fi. con sperone più lungo delle appendici dei sepali. La corolla è piuttosto piccola negli esemplari autotipi, ma dubitiamo si tratti di rifioritura, assai grande invece negli altri esemplari che riferiamo a questa forma. — *Appenn. umbro, laziale, abr. e camp.; indicata anche dell'Appenn. tosco-em. al Teso* (*Somm.*), *ma per scambio colla var. heterophylla b. lancifolia.*

e. grandiflora A. Terr. (*sub V. Tenorii*). — Va tolta perchè si riferisce collettivam. ad un gruppo di forme e sostituita con:

e. subasica A. Terr. l. c. (*sub V. Tenorii*) = V. grandiflora Ten. p. p. — Fi. più grandi dell'ordinario, a petali larghi e contigui. Fg. subrotonde, profondam. scavate alla base. — *Appenn. march. al M. Catria, umbro al M. Subasio, abr. al Morone e Sirente ecc.*

f. microphylla (Rolli hb.!) = V. cenisia v. micr. A. Terr. l. c. — È una forma altitudinale, distinta per la brevità dei fusti e per la piccolezza delle fg.; ad essa crediamo siano da riferirsi anche *V. Tenorii v. parvifolia A. Terr.* e *V. cenisia v. caespitosa A. Terr.* l. c. — *Nella reg. alp. degli alti monti dell'Appenn. centr.*

γ *nebrodensis.* — Si tolga dall'habitat il « *M. Pollino in Cal.* », dovendosi la pianta di tale luogo meglio riferire alla for. *calabra* della var. *gracilis.*

d. pseudo-gracilis. — *Avellinese al M. Taburno* (*Trotter!*).

δ *aetnensis.* — *Citata di Tosc. al M. Amiata e dell'Elba al M. Capanne, ma a nostro avviso per isbaglio; di tali luoghi vedemmo soltanto la var. heterophylla* (*Bert.*).

ζ *gracilis.* — Elevando al grado di var. le for. *c. heterophylla* e *d. pubescens* (vedi sotto), la distribuzione di questa var. va ristretta alla « *Basil., Cal. e Sic.* ».

c. lucana A. Terr. Prodr. Fl. Luc. I, p. 52 (sub V. Tenorii) = V. calcarata Ten. p. p. = V. gracilis β insularis N. Terr. Add. Syn. Pl. M. Poll. — Forma alpina, distinta pel fusto ad internodi raccorciati, per la pubescenza delle fg. super. e per la corolla più grande. — *Reg. alp. del M. Cervialto nell'Avellinese* (*Trotter!*), *M. Serino in Basil.* (*Fiori*), *M. Pollino in Cal. ecc.* — Crediamo debba riunirsi a questa forma la *V. calcarata v. apennina A. Terr. ibid.*

d. garganica A. Terr. in Bull. soc. bot. l. c. = V. tricolor v. lutea Fiori in Bull. Soc. bot. 1899, p. 213. — Fi. assai più piccoli dell'ordinario, a sperone sottile; fusti allungati e gracili. — *Gargano.*

Digitized by Google

e. insularis A. Terr. — Anche questo nome va soppresso, a scanso di confusione, riferendosi collettivam. ad un gruppo di entità; si sostituisca con:

e. calabra A. Terr. = V. calcarata b. nebrodensis N. Terr. Syn. Pl. M. Poll. — Si avvicina assai alla *for. pseudo-gracilis* della *var. nebrodensis*. — *Cal. al M. Pollino.*

f. elongata (Huet exs.). — Distinta (a quanto potemmo arguire dall'esame di un meschino esemplare dei M. di Tito in Basil.) per le fg. subconformi, come nella for. *calabra*, quasi rotonde, pei fusti allungati e pei peduncoli lunghissimi (16 cm.). — *Indicata del Nap. e Basil. a Muro Lucano* (*A. Terr.*) *e M. di Tito* (*Fittipaldi ex A. Terr.*).

g. lutea Guss. (1842), **Boiss.** (1867), **Parl.** (1890). — Corolla gialla. — *Cal. e Sic.* (*Guss.*, *Parl.*).

η *heterophylla* (*Bert. p. p.*) = V. calc. v. aetnensis Baroni (Suppl. Prodr. Fl. Tosc.). La sua area comprende « *l'Appenn. ligure, A. Apuane, Appenn. tosco-em. sino al Corno alle Scale, il M. Amiata e l'Elba ed anche l'It. mer. e Sic. ma con forme di passaggio alla var. gracilis* ». — Nella reg. alp. dell'Appenn. tosco-em. si presenta con una forma a fusti molto raccorciati che fu generalmente ritenuta come *V. calcarata* typica, alla quale certam. molto si avvicina, tanto da non differirne in alcuni casi; riteniamo che questa pianta corrisponda alla forma **b. lancifolia A. Terr.** l. c., che sarebbe però indicata dal Terracciano anche dei *Corni di Canzo in Lomb.*, ma probabilm. per scambio colla var. *Dubyana*. Questa for. *lancifolia* riteniamo a sua volta sia la stessa cosa che *V. Cavillieri W. Becker* (Bull. herb. Boiss. Ser. 2, III (1903), p. 45, tab. II (1902) descritta delle « *Alpi Mar. tra Garessio e Pamparato sul M. Stope* (*Briq. et Cavillier*) ».

θ *pubescens A. Terr.* = V. lutea Bert. p. p. = V. calcarata Milani. = V. tricolor v. lutea Fiori in Bull. Soc. bot. it. 1899, p. 211. = V. splendida W. Becker. — Distinguesi dalle var. *gracilis* ed *heterophylla* per le proporzioni maggiori di tutta la pianta, che assume il portamento di *V. tricolor* v. *lutea*, per la pubescenza, per le fg. più grandi, per le stipole profondam. divise in 6-10 lacinie, per i fi. grandi a sperone gracile e diritto. — *Basil. al Vulture! ed a Potenza!, M. Vergine presso Avellino!, Matese!, Pizzo delle Tende presso Amalfi* (*Lacaita ex Becker*), *Puglie e Taburno* (*ex A. Terr.*) (cfr. Fiori in Giorn. bot. it. 1905, p. 169).

ι *Dubyana* (*Burnat*) = V. declinata Gaud., Parl. (non W. et K.), = V. heterophylla β Bert. = V. heteroph. Borbás in Koch's Syn. ed. III, p. 217 = V. tricolor η declinata Fiori in Fl. An. I, p. 469. — Il Borbás (l. c.) dice che la nostra pianta confrontata colla *V. declinata W. et K.* apparisce differente per la mancanza di stoloni fogliosi e per le stipole più profondam. divise; tale differenza fu pure confermata dal Burnat (Fl. Alp. Mar. I, p. 178), il quale però, come già aveva dimostrato il Parlatore, dice anche che essa è pure, e forse meglio, distinta da *V. heterophylla* genuina. Essa offre ancora molta affinità con *V. lutea* e per essa con *V. tricolor* alla quale l'avevamo prima erroneamente avvicinata.

1301 (10) *Viola tricolor a arvensis* **for. gracilescens (Jord.).** — *Veron.* (*Goir.*), *C. Ticino* (*Chenev.*); *Ischia* (*Guss.*), *Basil. alle falde del Vulture* (*N. Terr.*) *ecc.*

for. segetalis (Jord.). — *Veron.* (*Goir.*), *C. Ticino* (*Chenev.*), *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. valesiaca Thom. = V. arv. b. canescens Rap. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. variata (Jord.). — *Cors. presso Corte* (*Mand. e Fouc.*).

for. variegata (Jord.). — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

β *Kitaibeliana.* — *Polesine a Canda* (*De Bonis*).

γ *parvula.* — *Basil. alle falde del Vulture* (*N. Terr.*), *Cal. presso Bovallino e all'Aspromonte* (*Huter P. et R.*), *Malta* (*Duthie*).

ε *saxatilis* **b. vallumbrosana** Fiori in Giorn. bot. 1905, p. 170 = V. alpestris subsp. vallombr. Wittrock Viola studier I, p. 93, t. XIV, fig. 251-255 = V. lutea γ multicaulis Arc., non Koch. — Distinguesi, a quanto pare, dalla forma genuina soltanto per i petali dei fi. adulti (almeno i 2 super.) violacei, anzichè tutti gialli; forse è iden-

Digitized by Google

tica a *V. polychroma A. Kern.* — *Appenn. tosc. a Vallombrosa, Camaldoli, Verna, M. Morello presso Firenze e certam. altrove.*

for. contempta (Jord.). — *Veronese* (*Goir.*).

for. flavescens (Jord.). — *Veronese* (*Goir.*).

for. Sagoti (Jord.). — *C. Ticino a Brissago* (*Chenev.*).

ζ *lutea* (*Huds.*). — Questa var. deve essere certam. esclusa dall' Appennino e con molta probabilità anche dalle nostre Alpi e quindi per ora la radiamo dalla flora it.

η *declinata* = V. calcarata var. Dubyana (vedi sopra).

1301 * *V. cornuta L.* — *Sarebbe stata trovata presso Como* (*Guthnick, ex Gremli Fl. anal. p. 578,* (*forse avvent.*).

RESEDACEAE

1302 (1) *Reseda luteola* **for. australis Muell.** = Luteola tinctoria v. austr. Webb. — *Sard. e Capraia* (*cfr. A. Terr. in Parl.*).

1303 (2) *R. alba α typ.* — *Romagne nella spiaggia di Cesenatico* (*Del Testa*).

b. Tenorei = R. undata Ten., non L. (nec undulata uti scrips. pr. err. in Fl. An. I, p. 310).

for. incisa (Ten.) A. Terr. in Parl. = R. suffruticulosa α pectinata Strobl. — *Puglie, Etna.*

for. macrantha Muell. — *Nell' area della spec.*

for. major A. Terr. in Parl. = R. fruticulosa A major Ten. = R. frutic. d. Guss. — *It. mer. e Sic.*

for. sardoa A. Terr. in Parl. = R. alba Moris. — *Sard. e Cors.*

β *Hookerii.* — *Elba a S. Caterina di Rio* (*Marcucci ex Baroni*).

1304 (3) *R. lutea* **for. abortiva Béguinot.** — Foglie indivise. Fi. piccoli, verdastri, tutti o quasi tutti sterili. — *Roma nelle alluvioni del Tevere* (*Béguinot*).

for. heterophylla Schur. — *Nell' area della spec.*

for. hispidula Muell. = v. scabriuscula A. Terr. — *Nell' area della spec.*

for. latisecta Schur = v. latifolia A. Terr. in Parl. — *Nell' area della spec.*

for. longifolia Ten. (1831). — *Puglie* (*Ten.*).

for. major A. Terr. in Parl. — *Nell' area della spec.*

for. minor Muell. — *Nell' area della spec.*

for. papillosa Genn. — R. lutea b. Guss. — *Sard. a Sette Fratelli* (*Genn.*) *ed Ischia* (*Guss.*).

for. pauciflora N. Terr. — Fi. piccoli, formanti un racemo lasso, contratto. — *Basil. sul Vulture nel faggeto di Monticchio* (*N. Terr.*).

for. tenuisecta N. Terr. — Fg. a lacinie strettam. lineari, nelle radicali subundulate, nelle cauline piane, mucronulate. — *Podere dell' Ist. tecnico di Melfi in Basil.* (*N. Terr.*); *ma non più ritrovata* (*Paoletti in litt.*).

1305 (4) *R. Phyteuma α typ.* **for. undulatifolia, latisepala et microsepala A. Terr. in Parl.** — *Nell' area della spec.*

for. integrifolia Texid. — *Piem., Veron. ecc.*

for. ligustica A. Terr. in Parl. = R. Phyteuma DNtrs. — *Lig. occ. e Nizza* (*ex A. Terr.*).

for. glaucescens A. Terr. in Parl. — *Laz., Puglie, Nap., Ischia ecc.* (*ex A. Terr.*).

1306 *Astrocarpus sesamoides α purpurascens.* — *Voltaggio salendo al M. Tobbia in prov. di Alessandria* (*Ferrari!*).

b. oblongifolius Nob. = Reseda sesamoides oblongifolia Moris. — Fg. lineari-oblunghe o subspatolate (non lineari) — *Sard.* (*Moris*).

Digitized by Google

CRUCIFERAE

Gen. Matthiola. — Vedi: Conti, Genre Matthiola in Bull. Herb. Boiss. 1897, p. 31 e p. 315, Mem. Herb. Boiss. 1900, p. 1.

1308 (1) *Matthiola incana.* — *Camp. ad Arpino al M. Castello* (*Falqui*); *frequentem. inselvat. sui muri ad Avellino* (*Casali e Ferraris*).

α *typica* **d. furcata Conti** l. c. (1897). — Siliqua terminata da due corna derivanti dai lobi stimmatici. Pianta glabrescente, slanciata, a rami fioriferi spesso divisi e fg. arrotondate all' apice. — *Isola Palmaiola nel canale di Piombino* (*Marcucci*).

e. glandulifera Lojac. Fl. sic. = M. pulchella Tineo in hb. Pan. = M. incana v. pulchella Conti l. c. (1900). — Rachide, pedicelli e silique glandulose. Fg., specialm. le infer., superficialm. sinuato-dentate. — *Pantelleria* (*Calcara, Ross*).

f. neapolitana Conti l. c. (1897). — Fg. lanceolate o lineari-lanceolate, subacute, rami fioriferi spesso divisi. — Intermedia tra il tipo e la v. *rupestris.* — *Nap. presso Pozzuoli* (*Huet, Pasquale, Sternberg*), *Nisida, isole Ponziane, Capri, Gaeta, Sperlonga e probabilm. Ischia* (*ex Béguinot*).

1309 (2) *M. sinuata* α **pubescens Conti** l. c. (1897). — Pianta tomentoso-grigiastra.

b. ligurica Conti l. c. (1897). — Pianta meno robusta e meno glandulosa. Silique meno robuste. a placentario sottile e spesso troncato all' apice. — *Costa del Tirreno dalla Lig. a Napoli ed isolette vicine, Sard. e Cors.*

γ **glabrata Guss.** (1843) = v. glabrescens Conti l. c. (1897). — Pianta glabrescente, generalm. più bassa e meno robusta ed a fi. più grandi che nel tipo. — Fg. spesso subpinnatifide. — *Coste della Pen. da Napoli e Bari in giù e costa or. della Sic.* (*ex Conti*).

b. intermedia Conti l. c. (1897). — Fusto peloso. Fg. pubescenti-grigiastre, spesso intere. — *Estremità mer. d'Italia* (*ex Conti*).

1310 (3) *M. tristis* α *valesiaca* (Fl. An. I, p. 422 [var. β]. — Fusto con fg. tutte basilari in rosetta, il fiorifero semplice ed unico in ogni rosetta. Fg. lineari, intere. Fi. in spiga generalm. densa, spesso grandi, a petali bislunghi od obovati, raram. bislungo-lineari. Silique fortem. compresse, erette od ascendenti.

a. genuina. — Pianta verde, poco glandulosa, spesso robusta. Fi. grandi, a petali obovati od oblunghi, azzurro-violacei o rossastri. — *Attorno al lago di Garda e Friuli.*

b. sabauda DC. (Chodat) = M. valesiaca v. pedemontana Gremli. — Pianta grigiastra, glandulosa, meno robusta e talora assai piccola, a fg. generalm. più brevi e convolte. Fi. più piccoli, a petali bislunghi o bislungo-lineari, verdi-brunastri con vene porporine. — *Val d'Aosta e probabilm. da riferirsi qui anche la pianta di Susa.*

β **provincialis Conti** l. c. (1897) = Hesperis L. (1753). — Fusto foglioso, spesso ramificato. Fg. lineari o lineari-oblanceolate, piccole, ordinariam. con 2-4 lobetti acuti, patenti. Fi. piccoli, a petali bislungo-lineari. Silique cilindriche o compresse, erette. — Pianta grigiastra, poco o punto glandulosa. Petali giallastri. — *Nizzardo.*

γ **italica Conti** l. c. (1897). — Fusto afillo o foglioso, semplice o ramificato. Fg. lineari o lineari-lanceolate, generalm. intere. Fi. mediocri, a petali bislunghi o lineari. Silique erette, lunghe o mediocri, gracili, compresse.

a. genuina. — Pianta piccola o mediocre, verde-grigiastra, a fusto semplice, afillo. Fg. in rosetta, lineari, intere. Silique mediocri. — *Laz. sopra Filettino, Abr. al Velino, Sirente e Gr. Sasso ad Assergi.*

b. caulescens Conti l. c. (1897). — Pianta grande, verde, a fusto ramificato e foglioso, talora (= **subfor. fasciculata Conti** l. c.) con un fascetto di fg. ascellari. Fg. quasi intere. Silique erette, lunghe e gracili. — *Appenn. centr.*

c. calabrica Conti l. c. (1897). — Pianta grigiastra, a fusto semplice ed afillo. Fg. larghe, sinuato-dentate o lobate, a 2-4 denti o lobi. Silique erette, assai lunghe. — *Calabria alla Dirupata di Morano.*

Digitized by Google

δ **sicula Conti** l. c. (1897) = M. coronopifolia Guss. (non DC). — Fusto foglioso. Fg. mediocri o grandi, ora (**a. dentato-pinnatifida Strobl** [1903] [sub M. coronopif.]) dentato-pennatifide, a 2-6 lobi stretti ed acuti, ora (**b. integrifolia Guss.** [sub M. coronopifol.]) intere o subdentate. Fi. mediocri, a petali bislunghi. Silique erette od eretto-patenti, a valve spesso un po' gibbose alla base o più raram. (**c. basiceras Conti** l. c.) con due gobbe ben salienti. — Pianta grigiastra od anche (**d. virescens Guss.** [sub M. tristis]) verde e glabrescente, talora (**e. montana Todaro** ex Conti l. c.) piccola, acaule e spesso più o meno glandulosa. Stimma talora (**f. bicornis Guss.** [sub M. coronopifol.], Fl. An. I, p. 422 [for. γ b.]) accresciuto ai lati da 2 cornetti lunghi ed incurvati. — *Sic.; la for. c. presso Caccamo, la e. nelle Madonie e Nebrodi e la f. nelle Madonie.*

Oss. Strobl (Verh. Zool.-bot. Gesel Wien, 1903) distingue della *M. tristis* ancora le due entità seguenti, la cui posizione sistematica ci rimane dubbia:

for. dentata Strobl (1903). — Pianta bianco-tomentosa. Fg. dentate. — *Sic. nelle Nebrodi* (*Strobl*).

for. dentato-pinnatifida Strobl (1903) = M. tristis v. elata Tod. exs. — Come nella for. *dentata*, ma fg. dentato-pennatifide. — *Sic. nelle Nebrodi* (*Strobl*).

1311 (4) *M. tricuspidata b. arcuata Guss.* (1843), *Lojac.* (1888).

c. **integrifolia Strobl.** (1903) = Hesperis fasciculata Raf., DC.? — Fg. quasi intere. — *Sic.* (*Strobl*).

1313 (2) *Malcolmia maritima.* — *Presso Ancona, avvent.* (*Paol. e Card.*).

1315 (4) *M. parviflora.* — Su questa spec. e sulla seg. vedi: Fiori in «Bull. Soc. bot. it. 1905, p. 64». — *Si trova soltanto lungo il litorale del Tirreno dal Nizz. alla Cal., Sic., Sard., Cors., Elba ed Ischia.*

1315 * (4 bis) **M. confusa Boiss** = M. parvifl. β confusa Paol. in Fl. An. I, p. 423. — Si distingue dalla prec., oltre che pei caratteri indicati, anche per la gracilità della pianta. Vista la costanza dei suoi caratteri distintivi e la sua distribuzione geografica, crediamo meglio ritenerla come spec. distinta da *M. parviflora*; piuttosto è da avvicinarsi a *M. nana Boiss.* (= Sisymbrium nanum DC. = S. binerve C. A. Mey. = M. binervis Boiss.), dalla quale però differisce specialm. per le fg. infer. mai sinuato-pennatifide, ma invece intere o leggerm. dentate. Pel resto cfr. Fiori (l. c.). — *Arene mar. in Tosc. a Follonica e M. Argentaro, Laz. a Fiumicino, Piceno a Porto d'Ascoli, Gargano a Rodi, Gallipoli, Taranto e Sic. a Catania, Scoglitti, Terranova, Balestrate e Vittoria nelle arene mar. ed a Piazza Armerina nell'alveo dei torrenti* (*ex Lanza*); *certam. sono da riferirsi qui tutte le località del lit. Adriatico indicate per M. parviflora. Marz.-Magg.* [*Grec., As. min., Siria, Ciren., Tripol., Tunis., Alger., Maroc., Spa.* (*Barcellona*), *Franc. mer.*] (*ex Adr. Fiori l. c.*).

Gen. Hesperis. — Vedi: V. Borbás, Species Hesperidum Hungariae atque Haemi, in «Magyar Botanikai Lapok I-II, 1902 e 1903».

1317 (1) *Hesperis laciniata* **d. Columnae Ten.** — Fg. radicali runcinato-lirate. Petali con unghia 4-5 mm. più lunga del calice. Fusto ovunque egualm. setoso-glanduloso, superiorm. ispido. — *Abruzzi.*

1318 (2) *H. matronalis.* — Dal Borbás (l. c.) ricaviamo il seguente specchietto:

A Fg. super. ristrette alla base o brevem. picciolate, calloso-denticolate od anche (for. γ) dentate.

a Silique glabre.

I Petali a lembo obovato.

1 Petali smarginato-mucronati. Fg. ovato-lanceolate, densam. pubescenti in ambedue le pag. — Internodi talora (**b. densifolia Borb.** l. c. II, p. 13 = H. matronalis Rchb. Ic.) abbreviati e quindi fg. addensate. Pianta non glandulosa o raram. (**c. adenopoda Borb.** l. c.) glandulosa al margine delle fg. e nell'infiorescenza. Petali violaceo-porporini o nelle forme colt. anche (**d. alba** [**Mill.**] = v. albiflora DC.) bianchi. — *Qua e*

Digitized by Google

là nei colli e monti della Pen.; la for. c. nel Trent. nelle Giudicarie presso Daone (*Porta*). — H. euganea Mars. in Ten. α *typica*.

2 Petali ottusissimi, non smarginati. Fg. allungate, lanceolate, sparsam. pelose sulle due pag. — Pianta non glandulosa. Petali violaceo-porporini od anche (**b. candida** [**Kit.**]) bianchi in pianta pubescente ovvero (**c. calvata Borb.** l. c. II, p. 15) bianchi in pianta a fusti e fg. glabre. — *Coltivata nei giardini; la for. b. in Piem. nei boschi di Bussoleno* (*Balbis*), *la c. nel Friuli nella valle del Celline sopra Cimolais* (*Huter e Porta*). β **sibirica** (**L.**) **L.**

II Petali a lembo oblungo, — violacei. Fg. lanceolate, dentate, sparsam. glandulose, massime al margine; peduncoli glanduloso-villosi. Portam. intermedio tra il tipo e la var. *inodora*. — *Laz. sopra Lago di Castello ad Albano* (*Haynald*). γ **oblongipetala** (**Borb.** l. c. I, p. 379).

b Silique pubescenti. — Pianta puberulo-vellutata, non glandulosa, a fusto ramoso-diffuso. Petali violacei, obovato-oblunghi. — *Abr. sulla Majella nel vallone di S. Spirito* (*Ten.*). δ *heterophylla* (*Ten.*) (Fl. An. I, p. 424 [for. d]).

B Fg. dilatate alla base, sessili, subcordate, grossam. dentate o sinuato-dentate.

Δ Pianta non glandulosa, pubescente-biancastra, a fg. sinuato-dentate, ovate. Petali bianchi, ovali. — *Alpi Mar. a Tenda nella valle di Riofreddo* (*Reverchon*). γ **subsinuata** (**Borb.** l. c. II, p. 20).

Δ Δ Pianta glandulosa, a fg. (eccett. le primordiali) grossam. dentate, ovato-oblunghe. Petali violacei, oblunghi. — *Sec. Borbas propria della Reg. Danubiale soltanto.* — H. silvestris Crantz p. p. — H. bituminosa Savi. ζ *inodora* (*L.*) (Fl. An. l. c. [for. b]).

1320 (1) *Erysimum cheiranthoides.* — *Appenn. romagnolo al Comero e M. Fumaiolo* (*Del Testa*), *Avellinese a Montevergine* (*Baccarini*).

1323 (4) *E. hieracifolium* γ¹ **Bonannianum** (**Presl**) = E. lanceolat. Presl = Cheiranthus helveticus Raf. — Vedi Strobl., Fl. d. Etna in Oest. bot. Zeitschr. 1884, p. 437; Dialypet. d. Nebroden in Verh. Zool.-bot. Gesel. Wien 1903, p. 454.

a. genuinum Strobl (1884) = E. lanc. v. minus Guss. = E. lanc. v. nebrodense Heldr. — *Sic. alle Madonie ed all' Etna tra 700 e 1950 m.*

b. majus Strobl (1884) = E. lanc. v. majus Guss. — *Col tipo nella zona più bassa.*

ε¹ *rhaeticum* (*DC.*) (Fl. An. I, p. 426 [for. ε b]). — Chenevard (Bull. Herb. Boiss. 1902, p. 765) distingue questa entità pel carattere dei petali a lembo obovato insensibilm. attenuato nell' unghia, mentre nella v. *helveticum* il lembo è quasi sempre orbicolare e bruscam. contratto nell' unghia. Del *rhaeticum* distingue poi queste tre forme:

a. alpinum Chenev. — Silique patenti-ascendenti, assai grosse e relativam. brevi. — *Alpi Retiche nelle vallate sett.*

b. genuinum. — Silique un po' curvato-ascendenti, più lunghe e più gracili. — *C. Ticino a Misocco e Rovio.*

c. dubium (**DC.**). — Silique assai lunghe (10-16 cm.) e flessuose. — *C. Ticino presso Mendrisio, Valtellina a Morbegno e Buco del Piombo.*

1325 (1) *Arabis glabra* = A. ochroleuca Loiac. (non Boiss.). — *Sic. nel Valdemone* (*Tod.*, *Citarda e Riccobono in hb. Panorm. ex Lanza*).

1328 (4) *A. alpina* α *typ. d. declinata* (*Tausch*). — *Soltanto in Cors.*

f. Verlotii Rouy et Fouc. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*) *e Cors.*

g. angustifolia Rota (1853). — Pianta densam. cespugliosa, colle fg. delle rosette spatolato-ristrette e le cauline lanceolato-ellittiche. Racemi poveri. — *Bergam. sulle rupi gneissine dei m. Farno, Pizzo del Diavolo e Valle de' Frati in Valle Brembana* (*Rota*).

for. anachoretica Porta. — *Val d'Aosta in Valgrisenche* (*Beyer*).

γ *albida* **c. sicula** (**Stev.**) (cfr. Strobl, Fl. d. Etna in Bot. Zeitschr. 1884, p. 402) = A. alpina Biv. = A. albida Presl, Guss. — Pianta biancastro-tomentosa nei getti sterili e densam. pelosa nel resto. Fi. molto grandi (calice lungo 7 mm., corolla lunga

Digitized by Google

2 cm.). Silique larghe $2^1/_2$ mm., alla fine porporine. — *Sic. sull' Etna ed alle Madonie* (*Guss.*, *Strobl ecc.*).

1329 (5) *A. hirsuta* γ *ciliata b. alpestris* — *Umbria a M. Malbe* (*Palomba in litt.*).

δ *sagittata* **for. integrifolia (Lap.).** — *C. Ticino.*

for. Kochii (Jord.). — *Cors. a Calvi* (*Fouc. et Sim.*).

for. virescens (Jord.). — *Cors. a Calvi* (*Fouc. et Sim.*).

1330 (6) *A. muralis.* — *C. Ticino.*

α *typ.* **d. ciliata Strobl** (1884). — Pianta quasi glabra, soltanto a fg. al margine evidentem. cigliate per peli stellati. — *Reg. boschiva dell' Etna* (*Strobl*).

e. madonia (Presl). — Differisce dalla for. *ciliata* (sec. Strobl, Dialypet., 1903, p. 452), colla quale condivide la glabrezza, principalm. per le fg. cigliate di peli affatto semplici o solo in parte forcuti e pei peduncoli frutt. assai più brevi (1-3 mm.). — *Sic. alle Madonie* (*Presl*, *Strobl*).

1335 (11) *A. serpyllifolia.* — *Nell' Appenn. camp. anche a Forca d' Acero nel territ. di S. Donato ed al piano di Macchia Arvaja nel territ. d' Oppi* (*Falqui*).

1336 (12) *A. pumila.* — *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

b. stellulata. — *Nel Lazio presso Terni e sul M. Viglio* (*ex Chiov.*).

1341 (17) *A. Thaliana* **for. pinnatifida Pirona** (sub Sisymbrio) (sine descript.). — *Intorno ad Udine* (*Pir.*).

1343 (19) *A. auriculata.* — *Nella Camp. anche a m. Cairo* (*Falqui*).

b. dasycarpa Andr. — Silique pubescenti-irsute. — *Sic. alle Madonie* (*Strobl*).

1348 (4) *Sisymbrium Irio.* — *Malta* (*Delicata*).

b. xerophilum. — *Cors. a Cittadella di Calvi* (*Fouc. et Sim.*).

1349 (5) *S. austriacum.* — Sulle forme riferibili a questa spec. (sensu lato) cfr. Valbusa in «Malpighia 1899». Da questo lavoro ricaviamo il seg. specchietto:

A Silique cilindriche, filiformi, a rostro largo circa come la siliqua stessa.

a Silique affatto glabre, portate da peduncoli gracili, diritti.

I Silique lunghe 2-5 cm., patenti od in alto piegate tutte da un lato. — *Da verificarne la distribuzione in Italia.* α **typicum**

II Silique più lunghe, più copiose, assai gracili e nitidissime, diritte o poco arcuate, diffuse o confluenti. Semi più piccoli. — Fusti diffusi o talora (**b. Bellianum Valbusa**) prostrato-diffusi e più gracili, in pianta a fg. più lungam. picciolate e silique più brevi (1-2 cm.) e più grosse (2 mm.). — *Piem. nella Val d' Aosta; la for. b. sotto il Cervino e presso la cascata di Giomein* (*Belli*). — S. acutang. v. augustanum Gaud. β **Tillieri (Bell.)**

b Silique ispidette, portate da peduncoli più o meno ingrossati, arcuati in modo che le silique riescono parallele alla rachide o divergono dalla parte opposta, lunghe 2-5 cm. — *Alpi Mar.*, *Lig. occ. ove scende sino al mare ad Oneglia e Nizz.* — Sinapis maritima All. — Sisymbr. acutang. v. hyoseridifolium Gaud. γ **erysimifolium (Pourr.).**

B Silique un po' compresse, attenuate alle due estremità, a rostro assai più stretto della siliqua stessa, — a peduncoli poco ingrossati ed arcuati in modo da portare le silique a contatto della rachide, queste a valve un po' pubescenti. — *Alpi Mar. e Piem.* — Synapis pyrenaica L. δ *acutangulum* (*DC.*) (Fl. An. I, 432 [var. β]).

1351 (7) *S. Columnae.* — *Parma* (*Avetta e Casoni*).

1352 (8) *S. altissimum.* — *Udine fuori porta Aquileia* (*Gortani!*), *Camp. a m. Cairo alla Raja Pizzutella* (*N. Terr.*).

1354 (10) *S. Sophia* **b. heterophyllum Goir.** (1891). — Lacinie delle fg. infer. tenuissime, quelle delle super. larghe circa 2 mm., bislungo-lineari, intere od 1-2-dentate. — *Veron. a S. Pancrazio* (*Goir.*).

c. minus Bolzon. — Fusto eretto, semplice (10-18 cm.). Fg. più brevi. — *Polesine nelle dune di S. Basilio fra Ariano e Rivà* (*Bolzon*).

1355 (11) *S. polyceratium* **b. eriocarpum N. Terr.** (1878). — Silique dapprima peloso-irte,

Digitized by Google

alla fine glabre o sparsam. pelose. — Pianta densam. cespugliosa, a fusti eretti e fg. sinuato-pennatifide, a lacinie triangolari-acuminate, intere od inegualm. dentate. — *Lit. di Fondi nella Camp.* (*N. Terr.*).

1358 *Alliaria officinalis* **b. pumila Goir.** (1904). — Pianta alta appena 20 cm. — *Colla specie.*

1359 (1) *Barbarea vulgaris* γ *verna* **b. australis (Jord.).** — *Corsica* (*cfr. Rouy et Fouc.*).
δ *intermedia.* *Cors. a Prunelli* (*Petit*) (?).

1361 (1) *Nasturtium officinale* **c. asarifolium Kralik ex Rouy.** — Fg. ridotte al lobo terminale orbicolare-cordato e più o meno lungam. picciolato. Pianta bassa. — *Cors.* (*Kral.*).

d. microphyllum (Boenn.). — Pianta ridotta, con fg. a segmenti piccoli, ovali o lanceolati, quasi picciolettati. — *Cors.* (*Petit*) *ecc.*

e. parvifolium (Peterm.). — Pianta come nella for. *d.* ma a segmenti delle fg. orbicolari. — *Nell' area della spec.*

1364 (4) *N. lippizense.* — *Trento* (*Gelmi*).

1366 (6) *N. amphibium* δ *palustre* **b. pusillum DC.** = Roripa pal. f. pusilla Gelmi. — Pianta nana, a fusti gracili, sdraiati, poco più lunghi delle fg. radicali. — *Trent. nella reg. alp.* (*Gelmi*).

for. laxum Rikli (Ber. Schweir. Bot. Gesell. 1903, p. 77). — *C. Ticino presso Locarno* (*Franzoni ex Rikli*).

1366 * *N. amphibio* × *silvestre* = N. anceps DC. — *Padovano* (*Ugolini*) *e presso Rovigo* (*Bolzon*).

Gen. Cardamine. Vedi: O. E. Schulz, Mon. Gatt. Cardamine in Engler Bot. Jahrbücher 1903, p. 280.

1368 (1) *C. asarifolia* **c. pilosa O. E. Schulz** l. c. — Fusto in basso e fg. sparsam. pelose. — *Qua e là nelle Alpi.*

d. hirsuta O. E. Schulz l. c. — Pianta tutta, compresi i calici, densam. bianco-irsuta. — *Alpi Mar. nella Valle delle Finestre e Col di Tenda* (*ex Schulz*).

e. parviflora O. E. Schulz l. c. — Petali lunghi $4^1/_2$-$5^1/_2$ mm. (in luogo di 6-10 mm.). *Piem. in Val Fontana, Bresc. in Val Trompia, Appenn. tosco-em. a Boscolungo ed all' Acero* (*ex Schulz*).

f. microphylla O. E. Schulz l. c. — Fg. del rz. lunghe 3 cm. ed a lamina misurante 10 per 19 mm., le cauline lunghe 1-$1^1/_2$ cm. ed a lamina misurante 8-10 per 11-19 mm. — *Alpi Mar. al Col di Tenda* (*ex Schulz*).

1369 (2) *C. bellidifolia* α **petiolaris DC.** — Fusto con 1 o raram. 2 fg. od anche nudo. Fg. caulina super. manifestam. picciolata, piccola. — *Propria delle reg. artiche e degli alti monti delle reg. sett. dell' emisf. bor.*

β **alpina (W.).** — Fusto con 1-3 fg., di cui la super. brevem. picciolata o sessile, grandicella. — Pianta talora (**b. pygmaea O. E. Schulz l. c.**) ridottissima (1-$1^1/_2$ cm.). Fg. cauline infer. talora (**c. subtriloba DC.**) profondam. trilobe e le super. trisette, con segmenti laterali minuti. — *Nelle Alpi; la for. c. al Gr. S. Bernardo, in Val Sesia sul M. Tagliaferro e sull' Ortler.*

1372 (5) *C. amara:*

A α *typica* — Antere rosso-violacee. Siliqua terminata da uno stilo manifestam. attenuato-pungente (lungo 1-3 mm.), con stimma puntiforme, appena distinto (largo 0,2 mm.). — *Dall' It. bor. sino all' Appenn. tosc.* (*Casentino*) *e forse all' Abr.*

a. glaberrima Sauter (1899). — Fg. e fusti glabri; fg. poco divise. — *Nell' area della spec.*

b. subglabra Schur = v. umbraticola Schur. — Fusto peloso alla base. — *Nell' area della spec.*

c. *umbrosa* (*Lej.*) = C. bicolor Presl = C. amara β hirta Wimm. et Grab. (cfr. Fl. An. I, p. 438 [for. b.]). — *Nell' area della spec.*

d. aequiloba C. Hartm. — Fg. membranacee, le cauline a segmenti bislungo-lanceo-

Digitized by Google

lati, rotondato-mucronulati all'apice, nel resto interi od appena denticolati. — *Tir. mer. presso Bolzano sul M. Mendel* (*ex O. E. Schulz l. c.*).

e. **trisecta DC.** = C. trifolia Wahlnb., non L. = C. amara v. trifolia O. E. Schulz l. c. — Fg. trisette, cioè a 3 segmenti o foglioline. — *Piem. tra Crissolo e Luserna* (*ex O. E. Schulz l. c.*).

f. **minor Lange.** — Pianta ridotta in ogni parte, alta 9-15 cm. — *Nella reg. alp.*

g. **macrophylla Wend.** = C. amara v. calabrica Paoletti (Fl. An. I, p. 438, p. p.). — Pianta più robusta, a fg. più grandi, le cauline a segmento terminale lungo 35-70 e largo 18-48 mm. — *Qui le loc. citate di Malghera presso Venezia, Bergamasco ed Appenn. emil. al M. Ventasso ed anche presso Milano ecc.*

h. **erubescens Peterm.** — Petali in parte o totalm. violacei o raram. rosei. — *Qua e là.* — Qui è da riferirsi il *Nasturtium offic. v. roseum M. Gortani* in Bull. soc. bot. it. 1903, p. 263 (ex ipso in litt.).

B Antere bianco-gialliccie. Siliqua terminata da uno stilo più grosso e meno attenuato (lungo 2 mm. circa), con stimma manifesto, più largo dello stilo (largo 0,5–0,75 mm.). Piante generalm. più robuste (4-6 dm.).

β **grandifolia Bert.** = C. uliginosa Ten. (an p. p.?), N. Terr., non M. B. = C. amara β calabrica Paoletti (Fl. Anal. I, p. 438, p. p.). = C. raphanifolia v. calabrica O. E. Schulz l. c. (p. p.). — Fi. bianchi, in racemo spesso composto. Silique patenti, lunghe $3^1/_2$-4 cm. e larghe 1 mm. circa. Fg. variabili in ampiezza, le cauline a segmento terminale subrotondo o bislungo (largo 10-35 mm.). — *Appenn. piceno a S. Severino* (*Narducci!*) *ed a Montefortino* (*Orsini!*), *Abr. al M. Corno, Laz.* (*Chiovenda*), *Campania al lago di Posta ed a Calvi* (*N. Terr.!*) *e Basil. a Melfi* (*N. Terr.!*).

γ **calabrica DC., Ten.** (sub C. latifolia) = C. latifolia Caruel (non Vahl) = C. amara v. calabrica Paoletti (Fl. Anal. I, p. 438, p. p.) = C. raphanifolia v. calabrica O. E. Schulz l. c. (p. p.). — Fi. violacei, in racemo semplice (an semper?). Silique erette od eretto-patenti, lunghe $1^1/_2$-$2^1/_2$ cm. e larghe $1^1/_2$ mm. circa. Fg. a segmento terminale suborbiculare (largo 10-17 mm.). — *Cal. al M. Pollino ed alla Sila!* (*il DC. dice «prope Scyllam», ma crediamo debba intendersi Sila*).

1373 (6) *C. pratensis* α *typ.* c. **pilosa Beck.** — Fg. pelose. — *Nell' area della spec.*

β *Hayneana* b. **pumila Hausskn.** ex O. E. Schulz l. c. — Pianta alta 6-10 cm., con fusto a 2-3 fg. — *C. Ticino presso Locarno* (*Hausskn.*).

NB. — Nelle pag. 438-39 del testo devono introdursi nella chiave e nella delimitazione delle spec. le seguenti modificazioni:

5 (2) *Petali lunghi 3-4 volte i sepali, misuranti 6-13 mm., largam. obovati ed interissimi all'apice, a lembo più o meno patente.* **6**

— *Petali lunghi circa il doppio dei sepali, misuranti 2-4 mm. ed obovato-oblunghi od anche misuranti 5-8 mm., ma allora obcordato-bilobi all'apice ed a lembo eretto o suberetto.* **8**

8 (5) *Fg. radicali a segmenti subrotondi.* **8** *bis*

— *Fg. radicali a segmenti ovato-oblunghi od oblunghi.* **9**

8 *bis* *Pianta bienne o perenne, a rd. grossa, obliqua, densam. fibrillosa. Fg. cauline parecchie, più grandi delle radicali. Peduncoli eretto-patenti.* Fusti fortem. angolosi, flessuosi, fragili specialm. alla base. Fg. cauline infer. simili alle radicali, le super. a segmenti bislunghi o lineari, interi od ottusam. angoloso-dentati. Corimbo semplice o composto. Petali lunghi 3-4 mm. Stami sempre 6. Silique parallele alla rachide, ma allontanate da essa; stilo lungo $^1/_2$-$^2/_3$ mm. Il resto come nella spec. seg. ⊙, ♃. [*Eur. As. media sett. ed or. India Giava Havai Amer. bor. Messico*]. — C. silvatica Lk. (1803). — C. hirsuta A major Ten. (1820).

6 *bis* **C. flexuosa With.** (1796) 1373 *bis*

A Pianta gracile (1-3 dm.), dall'aspetto della *C. hirsuta*, benchè molto distinta massime nel fresco, a fusti più o meno irsuti, almeno in basso, nel resto glabra o quasi, — nei luoghi ombrosi (b. **umbrosa Gr.** et **Godr.** sub C. silvat.) più sviluppata, più flaccida ed a fg. con segmenti più grandi, nei luoghi aprici (c. **rigida Rouy et Fouc.** sub C.

Digitized by Google

silvat.) invece ridotta, più rigida ed a fg. con segmenti più piccoli, nei luoghi subalp. (**d. pusilla** [**Schur**]) ridotta in ogni parte, alta 7-14 cm. — *Luoghi acquitrinosi della reg. mont. o più raram. submont.: ne vedemmo esempl. del Bresc. in V. Trompia (Parl.!), Appenn. tosco-em. a Boscolungo e Mad. dell' Acero, Vallombrosa e Casentino; indicata del Goriz. (ex Posp.), Bellun., Trevig., Trent., Bresc., basso Bergam., Val d' Aosta, Napoli a Capodimonte (Kralik) e M. S. Angelo di Castellamare (Ten.), Palermo (Todaro) e Cors. (ex Rouy et Fouc.). Magg.-Lugl.* α **typica**

B Pianta più lussureggiante (2-6 dm.) dall' aspetto della *C. amara*, a fusti glabri come il resto della pianta o con radi peli in basso, — talora (**b. calabrica** [**Arc.**] = C. pratensis v. micrantha Caruel = C. prat. γ calabr. Paoletti in Fl. An. I, 438) con portamento più slanciato e fg. a segmenti più piccoli, nelle super. assai stretti. — *Basil. al Vulture e Cal. alla Sila, Platania, Serra S. Bruno ecc.; la forma b. in Cal. a S. Cristina e Pimenoro.* — C. amara v. calabrica e v. parviflora Fiori Contr. Fl. Cal. e Basil. β **glaberrima N. Terr.** (1869) (sub C. silvat.) [1]).

— *Pianta annua, a rd. sottile, fittonosa. Fg. cauline 1-3, generalm. meno sviluppate delle radicali. Peduncoli eretti.* Pianta glabra o sparsam. pelosa. Fusti di 3-30 cm. Fg. radicali a segmenti interi o subtrilobi, il terminale un po' maggiore; le cauline a segmenti ovali, ovato-oblunghi o lineari, interi od ottusam. dentati. Corimbo semplice; peduncoli lunghi $^1/_3$-$^1/_2$ circa delle silique. Sepali lunghi $1\,^1/_3$-$1\,^2/_3$ mm. Petali bianchi, interi, lunghi 2-3 mm. Stami talora 4 soltanto. Silique per lo più strettam. appressate alla rachide; stilo quasi nullo. ⊙. *Luoghi erbosi selvatici od ombrosi dal mare alla reg. mont. nella Pen., Istria ed isole: comunissima. Genn.-Giu.* [*Quasi cosmopol.*].

7 C. hirsuta L. 1374

1374 (7) *C. hirsuta* **b. pilosa O. E. Schulz** l. c. — Fusto peloso specialm. in basso. — *Qua e là colla for. genuina.*

c. unicaulis O. E. Schulz l. c. — Pianta ridottissima, a fusto semplice o quasi, con 1-2 fg. e 3-9 fi. circa, questi più piccoli ($1\,^1/_2$-2 mm. lunghi). — *Specialm. nella reg. mediter.*

d. maxima Fischer (1808) ex Beck (1892). — Pianta più robusta (4 dm.), con pedicelli frutt. infer. lunghi 10-25 mm. — *Trent. presso Bressanone (ex Schulz l. c.).*

e. petiolulata O. E. Schulz l. c. = C. hirs. f. umbrosa Chiovenda. — Fg. più lunghe (le basali lunghe 9-$10\,^1/_2$ e le cauline 4-$6\,^1/_2$ cm.), le cauline super. uguali alle infer., a segmenti distintam. picciolettati, spesso intercalati qua e là con segmenti assai più piccoli, interi. — *Nei luoghi molto ombrosi.*

f. umbrosa (**Andrz.**). = C. hirs. β laxa Rouy et Fouc. — Pianta più lassa e delicata, a fg. più flaccide e con segmenti più larghi. — *Nei luoghi umidi, ombrosi specialm. della reg. mont.*

1375 (8) *C. parviflora. — Presso Venezia (Kellner ex O. E. Schulz l. c.).*

1376 (9) *C. glauca. — Basil. sul m. Papa (Adr. Fiori), ritrovata sull' Etna (Cavara).*

b. pumila O. E. Schulz l. c. — Pianta ridotta ($2\,^1/_2$-5 cm.), a fusti nudi o con 1-2 fg. — *Cal. all' Aspromonte (Strobl).*

c. grandiflora O. E. Schulz l. c. — Petali lunghi 10 mm. (in luogo di 6-8). — *Cal. all' Aspromonte sopra S. Stefano (Huter P. et R.).*

d. kopaonikensis (**Pancic**) **Pantocsek.** — Pianta a rd. forte, ramosissima (4-25 cm.), a rami per lo più sdraiati, a fg. assai piccole, con 4-8 paia di segmenti, a fi. piccoli (4-5 mm.) e silique più brevi (1-2 cm.), con stilo abbreviato ($^1/_2$-1 mm.). — *Cal. all' Aspromonte (Huet ex O. E. Schulz l. c.).*

1377 (10) *C. impatiens. — Elba (Sommier).*

b. apetala (**Gilib.**). — È la forma a petali abortiti. — *Col tipo.*

---

1) Quando mancano i fi. potrebbe facilm. confondersi con *C. amara*, ma se ne distingue per la brevità dello stilo.

Digitized by Google

c. **obtusifolia Knaf** (1864). — Fg. cauline a segmenti più grandi, il terminale misurante 15-28 per 10-20 mm., lobi ottusissimi, mucronulati. — *Nei luoghi molto ombrosi.*

d. **humilis Peterm.** (1838) = v. minor Rouy et Fouc. (1893). — Pianta ridotta in ogni parte, alta 10 cm. circa, spesso rosseggiante. — *Nei luoghi aprici.*

1378 (11) *C. resedifolia α typica.* — Fg. radicali primordiali indivise, intere ed ovali, le altre trisette o pennatosette, — a segmenti oblunghi od oblungo-lanceolati. Pianta talora (**b. platyphylla Rouy et Fouc.**) in cespugli più lassi (8-15 cm.) ed a fg. con segmenti più larghi, ora (**c. nana O. E. Schulz** *l. c.*) ridotta (1-3 cm.). — *Alpi, App. bor. e centr. e Cors.; la for. b. nelle Alpi e Cors., la c. sui monti più alti.*

β *integrifolia DC.* (1824). = C. hamulosa Bert .(1832) (Fl. An. I, p. 439 [var. β]). = C. resed. β subintegrifolia Caruel = C. hamulosa v. herbacea Ugolini. — Fg. ora intere od appena denticolate ed in tal caso obovato-cuneate ovvero (**b. insularis Rouy et Fouc**). largam. ovali, arrotondato-troncate all' apice, ora (**c. gelida [Schott]**) lirato-incise con 3-4 lobi per parte, in pianta assai ridotta (2-3 cm.). (NB. Il carattere dei fusti legnosi alla base va trascurato). – *Qua e là col tipo; la for. b. in Cors. al M. d' Oro* (*Kralik*), *la c. nelle Alpi piem. e lomb. ed in Cors. al M. Cinto* (*Briq.*).

1379 (12) *C. maritima.* — *Indicata per l' Istria vagamente* (*Maly ecc.*), *non è riportata per questa regione nè dal Pospichal* (*Fl. Oest. Küstenlandes*) *nè dallo Schulz* (*l. c.*).

1380 (13) *C. graeca.* — *Piceno a Montefortino* (*Orsini*), *Laz. a Vicovaro* (*Chiov.*) *e nella valle dell' Aniene* (*Chiov., Pappi*), *Gargano* (*Sieber, Porta e Rigo*) *e Capri* (*A. Terr.*).

b. eriocarpa Fritsch = Pteron. graec. β eriocarp. DC.

c. **brachystilis O. E. Schulz** l. c. — Stilo più breve e più largo, lungo $^1/_2$ mm. nell' ovario ed 1-3 mm. (in luogo di 4-6 mm.) nella siliqua. — *Qua e là colla for. genuina.*

d. **Cupanii (Nym.)** = Pteroneurum Jord. — Petali più piccoli, lunghi $2^1/_2$-$4^1/_2$ mm. (in luogo di 5-7 mm.). — *Sicilia.*

1381 (14) *C. Chelidonia.* — *Presso Messina* (*ex O. E. Schulz l. c.*).

b. **brutia Huter P. et R.** — Stilo lungo 3 mm. (in luogo di 1-2). — *M. Pollino in Cal. ecc.*

Gen. Dentaria. Vedi: O. E. Schulz Mon. Gatt. Cardamine l. c.

1382 (1) *D. enneaphyllos* **b.** *alternifolia Hausm.* (1854) (*Dalla Torre*, 1882). — Fu erroneam. attribuita (Fl. An. I, p. 440) al *Sonder.*

c. **angustisecta Glaab** (1894). — Fg. strettam. lanceolate, lunghe 6-10 e larghe 1-2 cm. — *Carniola presso Idria* (*Freyer*).

d. **grandiflora O. E. Schulz** l. c. (sub Cardam.). — Petali lunghi 20 mm. (in luogo di 12-15). — *Colla for. genuina.*

1383 (2) *D. pentaphyllos* β *polyphylla* **b. angustifolia (Ten.** hb. ex O. E. Schulz l. c.). — Fg. a segmenti più stretti e più lunghi, il terminale lungo 12 cm. e largo 16 mm. — *Italia* (*senza indicazione di luogo preciso*).

β' **canescens (Ten.).** — Lo Schulz (l. c. p. 592) la ritiene affine a *D. polyphylla*, ne differirebbe per altro per i fi. porporini (?), per i segmenti delle fg. lanceolato-lineari, a denti grossi terminati in punta lesiniforme, inoltre per la pubescenza di tutta la pianta. — *Abr. alla Majella, Matese ed Avellinese al M. Vergine* (*ex Ten.*).

δ *digitata.* — Pianta ora (**a. glabrescens A. Schmidely**) con fusto brevem. peloso in basso e fg. cigliate od anche (**b. glabra O. E. Schulz** l. c. sub Cardam.) a fusto glabro, più raram. (**c. pilosula Gelmi** [1896]) con leggera pubescenza grigiastra anche sulle fg. Fi. rarissimam. (**d. lactea O. E. Schulz** l. c. sub Cardam.) bianchi. — *La for. b. qua e là colla genuina, la c. nel M. Bondone di Trento* (*Gelmi*), *la d. nel Trent. in Val Vestino* (*Porta ex O. E. Schulz*).

1384 (3) *D. bulbifera.* — Fusto e fg. glabre di sotto ovvero (**b. pilosa A. Waisb.** [1901]) fusto brevem. e densam. peloso in basso e fg. più o meno pelose di sotto. Fg. super. talora (**c. ptarmicifolia DC.** [1821]) più acutam. dentate. Petali lunghi 12-15 o più raram. (**d. grandiflora O. E. Schulz** l. c. sub Cardam.) 18 mm., rosei o porporini, raram. (**e. lactea Wirtgen** ex O. E. Schulz l. c.) bianchi. — *Le for. b. e d. qua e*

Digitized by Google

là colla genuina, la c. nel Laz. presso Nemi (ex O. E. Schulz l. c.), la e. da ricercarsi.

1387 *Eruca sativa. — Cors. anche a Sartene (Le Grand), Elba forse inselvat. (Somm.).*

1389 (2) *Sinapis alba. — Malta (Duthie).*

1391 (1) *Brassica pubescens. — Può salire sino alla reg. mont., come in Cal. alla Sila (Adr. Fiori).*

d. **glabrata Nob.** = Sin. pub. b. glabr. Guss. — Fusto e fg. verdi, poco irsuti o quasi glabri. — *Sic. (Guss.).*

1392 (2) *B. adpressa. — Puglie in prov. di Foggia e Bari; può salire sino alla reg. mont.*

c. **inflexa Nob.** = Hirschfeldia inflexa et integrifolia Presl. = Sinap. panormitana Spr., Guss. = Erucastrum incan. v. dasycarpum Lge. — Silique pelose (nella for. genuina glabre). — *Sic. ecc.*

d. **acutifolia Nob.** = Sin. incana β acutifolia Moris = S. heterophylla Guss. (non Lag.). — Fg. infer. col lobo terminale ovato-lanceolato ed i laterali acuti. — *Sic., Sard. ecc.*

e. **crassifolia Nob.** = Sin. incana γ crassifolia Moris. — Fusto setoloso-scabro in basso. Fg. grassette, quasi intere, ottuse, poco pelose. Silique più grosse e più lunghe, a 6 semi per valva, con rostro diritto, cilindrico-conico. — *Sard. (Moris.)*

1393 (3) *B. nigra. — Elba (Sommier).*

1394 (4) *B. Sinapistrum.* — Silique glabre (**a. lejocarpa Neilr.**) o con setole rivolte all'ingiù ed in tal caso ora (**b. orientalis Nob.** = Sinapis L.) patenti, ora (**c. villosa Nob.** = Sinapis Mérat = S. retrohispida Bor. = v. dasycarpa Neilr.) applicate. — *Le for. b. e c. nell'area della spec.*

1395 (5) *B. monensis α typ.* **for. petrosa (Jord.).** — *Cors. (ex Rouy), a Solenzara (Fouc. et Sim.).*

1396 (6) *B. fruticulosa. — Malta (Delicata), Elba (Sommier).*

β **exaltata (Huter P. et R.)** (in N. Giorn. bot. it. 1879, p. 258, sine descript.). — Differisce dal tipo per essere pianta suffruticosa, per le silique con strozzature meno appariscenti, sostenute da pedicelli più brevi (5-10 mm.) e più grossi. — *Cal. presso Gerace (Huter P. et R. exs. n. 139).*

1397 (7) *B. elongata Ehrh.* — Sopra questa spec. ed entità affini vedi: Béguinot in «Bull. Soc. bot. it. 1905, p. 258». Da questo lavoro si può riassumere quanto segue:

α *typica. — Manca all'Italia (ex Bég. l. c.).*

β *persica (Boiss.)* (Fl. An. I, p. 445 [for. b.]). — Differisce dal tipo per le fg. infer. oblungo-lanceolate, superficialm. ondulato-crenate o quasi intere, le super. anzi del tutto intere, e per le silique un po' più lunghe, con rostro spesso brevissimo; lo stipite è invece bene sviluppato come nel tipo — *Dintorni di Trieste e di Genova, avventizia (cfr. Bég. l. c.).*

1397 * (7 *bis*) **B. palustris Pirona.** — Differisce da *B. elongata*, per le fg. regolarm. ma meno profondam. inciso-lobate, a lobi ovali-ottusi, interi o dentellati, per la corolla circa il doppio più grande, per le silique 2-3 volte più lunghe (30-55 mm.), a rostro assai più sviluppato ed a stipite brevissimo o talora mancante, infine per i semi ovali e non compressi (ex Bég. l. c.). ♃. *Paludi argillose del basso Friuli a Virco, Talmasson, Flambro, Castions di Strada ecc. (cfr. Bég. l. c.).*

1401 (11) *B. oleracea ζ incana. — Malta (Delicata).*

γ *rupestris* **b. longirostris Guss.** — Silique pendule, patenti ed erette. Fg. a lobi per lo più acuti. Rostro lungo 6-12 mm. — *Sic. (Guss.).*

var. nivea (Boiss. et Sprun.). — *Cors. nelle rupi presso Ghisoni (Rotgès ex Fouc.); ma il Rouy mette in dubbio la presenza in Cors. di tale pianta propria della Grec.*

1402 (12) *B. macrocarpa β drepanensis Paol. (1898, pr. var.) (Ponzo, 1900, pr. spec.).* — Sopra questa pianta vedi: Ponzo A., Flora trapanese p. 39, Palermo 1900.

1404 * **B. valentina DC.** = Sisymbrium L. — *Citata dal Gussone come raccolta dal Gasparrini in Sic., non vi è stata più ritrovata; è propria della Spa.*

Digitized by Google

1406 (16) *B. Gravinae.* — *Avellinese a M. Terminio* (*Casali e Ferraris*), *Cal. occ. al M. Mula* (*Huter P. e R.*).

1410 (1) *Diplotaxis erucoides.* — Sec. Béguinot (Annali di Bot. I, p. 305, 1904) presenta le quattro var. seguenti:

A Pianta glabra o sparsam. pelosa lungo il fusto. Fg. a lobo terminale poco più grande degli altri.

a Fg. lirato-roncinate o roncinato-pennatifide, a lobi triangolari, il terminale lanceolato-acuto. Petali bianchi. — *Anche a Malta* (*Delicata*). α **typica**

b Fg. piuttosto sinuato-dentate che lirato-roncinate, a lobi subtriangolari, il terminale obovato-ottuso. Petali carnicini, porporini nell'unghia. — Silique lungam. peduncolate, circa il doppio più lunghe che nelle altre forme. — *Puglie e Basil.* (*Ten.*). — Sinapis Ten. (1811-15). β *apula* (*Ten.*, 1830) (Fl. An. I, p. 148 [for. c.])

c Fg. lirato-sinuate, piccole e strette, a lobo terminale c. s. Petali piccoli, strettam. obovati, bianchi nel fresco, tendenti a divenire violacei nel secco. — Fusto ramoso quasi dalla base; racemi lunghi e virgati. — *Cal. mer.-or. presso Roccella* (*Huter P. e R.*). — D. apula Rigo in Dörfler exs. n. 259. γ **versicolor (Huter P. et R.)**

B Pianta peloso-ispida in ogni parte. Fg. lirato-pennatopartite, a lobi ovali-ottusi, il terminale assai più grande dei laterali. — Petali bianchi con venature violacee. — *Basil. e T. d'Otranto* (*Ten.*). — Brassica hispida Ten. (1815).
δ *hispidula* (*Ten.*, 1830) (Fl. An. I, p. 448 [for. b.]).

1411 (2) *D. viminea.* — *Malta* (*Delicata*).

b. integrifolia Guss. — Fg. bislungo-spatolate, ottuse, indivise. — *Sic.* (*Guss.*), *Malta* (*Duthie*).

c. praecox Lge. — Differisce dalla for. *hiemalis* per le silique infer. più brevem. pedicellate e per le fg. regolarm. sinuato-pennatofesse. Fiorisce in marzo. — *Terra di Bari* (*Palanza ex Somm.*).

d. hiemalis Somm. (1900). — Pianta nana (1-15 cm.), a fg. sinuato-dentate, crenate o subintere. Silique infer. portate da un pedicello più lungo della loro metà; stilo ristretto alla base. Fiorisce in nov. e dic. — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

1412 (3) *D. scaposa.* — I petali sono il doppio del calice (6-8 mm.) e non appena più lunghi di esso, come è detto nel vol. I, p. 448. — *La pianta di Malta a Gozo* (*Duthie*) *appartiene a D. viminea* (*ex Somm.*), *quindi tolgasi questa località.* [*Tunisi*].

1413 (4) *D. muralis.* — *Comunissima in tutta l' Umbria* (*Palomba in litt.*), *Elba* (*Sommier*).

b. pollinensis. — *Dintorni di Perugia col tipo* (*Palomba!*).

d. intermedia Schur. — Fg. profondam. pennatifide o pennatopartite. — *Trento* (*Gelmi*).

1416 (7) *D. Harra* **b. hispida (DC.)** = D. crassifolia b. Guss. — Fg. un po' irsute. Silique in generale più brevem. peduncolate. — *Sic.* (*Guss.*).

1417 *Moricandia arvensis.* — *Cors. a Bastia verso Toga* (*Le Grand*).

b. fabariaefolia Presl = v. albiflora Strobl (1884). — Fi. bianchi. — *Sic. ecc.*

1418 *Conringia orientalis.* — *Laz. a M. Circeo* (*Maratti*).

1419 (1) *Raphanus Raphanistrum* α *typ.* **c. flavus Sch. M.** = v. citrinus Gaud. — Fi. solfini con vene più cariche (non però violette come nella for. genuina). — *Col tipo.*

var. microcarpus (Lge.). — *Cors. in più luoghi* (*Klalik ex Rouy, Fouc. et Sim.*).

v. microc. **for. intermedius Rouy et Fouc.** — *Cors. a Corte* (*Fouc. et Sim.*).

1421 (1) *Rapistrum perenne.* — *Avellinese* (*Casale e Guss.*).

1422 (2) *R. rugosum* α *typ.* **c. indivisum Vis. et Sacc.** (1869). — Fg. indivise in pianta glabra (ex Sacc. in litt.). — *Trevigiano* (*Sacc.*).

γ *orientale.* — *C. Ticino a Moscia lungo la ferrovia, probabilm. avventizio* (*Chenev.*), *Laz. nelle Paludi Pontine* (*Ten.*, *Fiorini*, *Sang.*), *Camp. nel bacino del Liri comune* (*Falqui*), *Cal. occ. al M. Pollino* (*Ten.*) *ed a Laino Castello* (*B. Longo*), *isola di Capraia* (*Moris et De Not.*, *Somm.*).

1427 *Cakile maritima* **g. Bauhini (Jord.).** — *Cors. a Capo Corso* (*Fouc. et Sim.*).

Digitized by Google

1427 * *Erucaria aleppica Gaertn.* — *Lig. nel letto dello Zemignano affluente della Polcevera* (*Canneva ex Somm.*).

1427 ** **Enarthrocarpus pterocarpus DC.** — *Malta sui bastioni della città* (*Armitage*); *certam. importato dall'Egitto.*

1428 *Bunias Erucago* **e. integrifolia Koch.** — Fg. intere. — *Nell'area della spec.*

1435-36 *Clypeola Jonthlaspi* α **typica.** — Pianta robusta, a siliquette larghe 4-5 mm. — *Polesine ad Ariano* (*Grigolato*) *e nelle dune di Rosolina* (*Bolzon*); *manca in Sic.* (*ex Lanza*).

β **Gaudini (Trachsel,** 1831) = C. Jonthl. Guss. p. p. = Jonthlaspi clypeolatum B microcarpum Caruel. — Pianta gracile, a siliquette piccole, larghe $2\frac{1}{2}$-3 mm., quasi esattam. orbicolari, pubescenti-cigliate al margine e glabre nel disco (**a. lejocarpa Strobl** [1903]) od anche (**b. lasiocarpa Strobl** [1903] = C. Jonthl. v. lasioc. Guss.) quivi sparse di peli rigidi, col seme occupante $\frac{1}{3}$-$\frac{1}{2}$ della loggia. — *Sicilia* (*ex Strobl et Lanza*); *a questa var. debbono pure riferirsi gli esempl. del Polesine a Rosolina* (*for. a*) (*Bolzon*), *Parma* (*for. b*) (*Pass.*), *Porto Maurizio* (*for. a*) (*Gentile*), *Orbetellano e M. Argentaro* (*for. a e b*) (*Somm. ecc.*), *Gargano* (*for. b*) (*Porta e Rigo*) *e Cagliari* (*for. a*) (*Gennari*), *da noi visti nell'Erb. di Firenze.*

γ *microcarpa* (Fl. Anal. I, p. 455 [pr. spec.]) = C. messanensis Tin. ex Strobl. — Pianta gracile, a siliquette minime, larghe 2 mm., un po' attenuate alla base, glabre al margine e con brevissimi peli rigidi nel disco, col seme occupante quasi tutta la loggia. — *Sic. alle Madonie e presso Messina* (*ex Lanza*) *e Sard.*

b. spathulifolia (Jord. et Fourr.). — Fg. obovato-spatolate, ottuse, brevem. attenuate alla base. Siliquette 2-$2\frac{1}{2}$ mm. diam., scabre al margine e sul disco. — *Cors. a Corté* (*Burnouf ex Le Grand*), *Bastia* (*Mabille*) *e Capo Corso* (*Chabert*).

1437 (1) *Alyssum sinuatum.* — *Umbria al lago Trasimeno a Castel Rigone* (*Palomba!*).

1442 (6) *A. alpestre.* — *Aosta sulla Becca di Vioù a 2000 m.* (*L. Vaccari*).

1443 (7) *A. montanum* **e. collinum (Jord. et Fourr.).** — *Val. d'Aosta* (*Vilczek*).

1446 (10) *A. campestre* **b. suffruticulosum N. Terr.** — Fusti suffruticulosi, ramosissimi dalla base, diffusi ed ascendenti. — *Campania nella vallata del Volturno* (*N. err.*).

1455 *Aubrietia deltoidea* **var. sicula Strobl** (in Verh. Zool.-bot. Ges. 1903, p. 458) = A. deltoidea Guss. — *Sic. alle Madonie* (*Strobl*).

1456 *Fibigia clypeata.* — *Reggiano a Ca' del Conte e S. Ruffino* (*Casali*), *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*).

1457 (1) *Lunaria annua.* — *Cesena e Rimini* (*Del Testa*).

1460 (1) *Draba aizoides.* — Le entità appartenenti a questa spec. vanno così distribuite:

α *typica* = D. aiz. α alpina Koch = D. aiz. β minor Burn.

b. Beyeri L. Vacc. — Racemo allungato, fi. piccoli. — *Val d'Aosta a Valgrisenche* (*Beyer*).

β *tenuifolia Rchb.* = D. ciliaris DC. (non L.) — D. Candollei Rouy et Fouc. = D. aiz. α typ. b. tenuif. Paol. in Fl. An. I, p. 460. — *Alpi, nella reg. più elevata.*

γ *affinis* (*Host*) = D. aiz. v. grandiflora Rchb. = D. aiz. α major Burn. = D. saxigena Jord. = D. aiz. α typ. d. affinis Paol. in Fl. An. I, p. 460.

δ **longirostra (Schott)** — Cfr. Strobl Dialypet. in Zool.-bot. Ges. 1903, p. 458. Colle for.: **a glabriuscula Huet** = α lejocarpa Neilr. — **b. armata Schott** = D. turgida Huet = β lasiocarpa Neilr. — **c. capsularis Nob.** = D. oxycarpa v. caps. Lojac. = D. turgida v. caps. Ces. Pass. Gib. — *Cal. e Sic. alle Madonie.*

ε **olympicoides (Strobl** l. c., p. 459 et in Lojac. Contr. Fl. Sic., 1878, p. 4 [nomen]) = D. olympica Strobl exs. (non S. et S.). — **a. lejocarpa** et **b. lasiocarpa Strobl** (l. c.). — *Sic. alle Madonie.*

ζ *Zahlbruckneri* (*Host*). — Cfr. Fl. An. I, p. 461 (var. β). — *Val d'Aosta* (*ex L. Vacc.*).

η *Bertolonii* (*Nym.*). — Cfr. Fl. An. l. c. (var. δ).

θ *Loiseleurii* (*Boiss.*). — Anche questa entità, come pure la seg., ritenute nella Fl. An. (l. c. p. 461) come spec., vanno riunite al ciclo della polimorfa *D. aizoides.*

Digitized by Google

ι *Sauteri* (*Hpe.*). — Cfr. Fl. An. l. c.

Nota. La *D. aizoides v. eriocarpa Caruel* (Fl. An. I, p. 461 [var. γ]) = D. aiz. var. Lojac. comprende diverse for. di *D. aiz.* a siliquette pubescenti.

1463 (4) *Dr. tomentosa α typ. c. frigida* **subfor. ramosa E. Thomas in Gaud.** — Fusti più grossi, ramosi, diffusi, con 1-3 fg. più irsute. — *Gr. S. Bernardo* (*Murith*).

d. nivea (Saut.). — Calice verde-cupo. Fi. più grandi, bianco-giallastri nel secco. Fg. meno tomentose. Peduncoli per lo più glabri. — *Tir. mer. allo Schlern* (*Sauter*).

1464 (5) *D. fladnizensis α typ.* **c. levigata (Hpe.)** = D. Wahlenb. γ glabrata Koch. — Fg. affatto glabre ovunque. — *Col tipo della spec.*

1466 (7) *D. muralis.* — I petali sono talora bilobi sino a metà lunghezza del lembo in esempl. del Comasco (Camperio in litt.).

1468 (9) *D. verna* **var. Krokeri Rchb.** — *Nel Polesine* (*De Bonis*).

1469 *Petrocallis pyrenaica* **b. pubescens L. Vacc.** — Pianta fortem. pubescente. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

1471 (2) *Cochlearia brevicaulis.* — *Tir. mer. in più luoghi.*

1473 (3) *C. glastifolia.* — *Avellino sopra un vecchio muro al colle dei Cappuccini* (*T. Ferraris*). — Gli esemplari avellinesi risulterebbero, sec. le oss. dell'Autore, perenni; alcuni raggiungevano l'altezza di 2 m. o più.

1474 *Chamaelina sativa δ foetida.* – *Bergamasco ad Orzivecchi tra i seminati di lino* (*Ugolini*), *Beneceto presso Parma* (*Avetta e Casoni*).

1479 (1) *Lepidium Draba* **b. crassifolium N. Terr.** (1889). — Fg. grasse. Siliquette più grandi, manifestam. reticolato-venose, quasi smarginate all'apice; stilo lunghetto. — *Cal. nel territ. di Castrovillari a Cammarata* (*N. Terr.*).

1481 (3) *L. hirtum β nebrodense* **a. canescens Guss.** — Fg., fusti, pedicelli e siliquette peloso-irsuti.

b. semiglabrum Strobl (1885). — Come in *a.*, ma fg. radicali glabre. — *Nell'area della var.*

c. glabrum Strobl (1885). — Fg. e siliquette glabre. — *Sic. alle Madonie al Piano della Battaglia* (*Strobl*).

1483 (5) *L. Iberis* **d. glaucescens Gillot** (sub L. graminifol.). — Pianta glauca, a fg. cauline tutte interissime, lanceolato-acute, a rami rigidi ed allungati e racemo lasso. Stami 6. — *Cors. a Bastia* (*Gillot*), *Ghizoni* (*Rotgès ex Fouc.*) *e Ajaccio* (*Fouc. et Sim.*).

1485 (7) *L. virginicum.* — *Cava dei Tirreni al convento dei Cappuccini* (*L. Marcello*).

1486 (8) *L. sativum* **b. incisum A. Terr.** (in Chiov. Bull. Soc. bot. it. 1892, p. 405). — *Paludi Pontine* (*A. Terr.*).

1487 * **L. subulatum L.** — *Indicato dei luoghi mar. salsi argillosi a Martinsicuro nell'Abr.* (*Orsini ex Ten.*); *ma certam. avvent., essendo proprio della Spa.*

1489 (2) *Hutchinsia petraea.* — *Puglie nelle Murgie di Altamura* (*Palanza*), *Cal. al m. Cocuzzo* (*Adr. Fiori*).

1490 (3) *H. procumbens α typ.* **c. diffusa (Jord.).** — Fusti diffusi, allungati, ascendenti. Fg. infer. a 3-5 lobi. Silicole ottuse e quasi rotondate all'apice. — *Trent. sotto il forte Civezzano* (*Gelmi e Murr*).

for. Prostii, Revelieri et **speluncarum (Jord.).** — *Trentino* (*ex Murr*).

Gen. Capsella. — In base al lavoro del Borbas «Varietates Bursae pastoris, in Magyar bot. lapok I, 1902, p. 17», introdûciamo le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1491 *C. Bursa-pastoris* = Bursa pastoris Weber.

I° Riguardo agli organi vegetativi ed alla mancanza dei petali registriamo le modificazioni seguenti alla sinonimia delle forme già distinte nel testo:

α typica b. apetala (*Opiz, 1822*) *Rchb.* (Fl. An. I, p. 469 [for. *b.*]) = v. decandra Doell (1862).

c. nana Baumg. (1816) = v. minor DC. (1822) = v. humilior Hagenb. (1843) = v. pygmaea Baenitz exs. (1891) = v. parvula G. Beck (1892) = v. subacaulis Rouy et Fouc. (1895) (Fl. An. l. c. [for. c]) = Bursa nana Borb.

Digitized by Google

d. canescens Mart.-Don. (Fl. An. l. c. [for. *d.*]). = Bursa canescens Borb.

e. Schrankii Gmel sub Thlaspi (1796) = Thl. hirtum Schrank., non L. = v. simplicifolia Pers. (1807) = v. integrifolia DC. (1822) (Fl. An. l. c. [for. e.]) = Bursa Schrankii Borb.

f. **sinuata Schlecht** (1823) sub Bursa = B. runcinata Kitt. (1844). — Sarebbe la forma genuina del testo.

g. coronopifolia DC. (1822) (Fl. An. l. c. [for. f.]) = Bursa pinnatifida Schlect. (1823).

II° Riguardo alla forma della silicola sono distinte dal Borbas molte altre forme, nelle quali possono rientrare anche le precedenti. Quelle registrate per località italiane o che presumibilm. si troveranno da noi, possono distribuirsi nel seg. specchietto:

A Silicole non smarginate, quindi acute o rotondate all' apice.

h. drabiformis Murr (1899) = Bursa Borb. — Siliquette tra l'ovoideo ed il lanceolato, più o meno acuminate. — *Trento alle Ghiaie* (*Gelmi ex Murr*).

i. cameliniformis Murr (1899) = Bursa Borb. — Silicole obovoidee, rotondate all' apice, apicolate dallo stilo di $^1/_4$-$^1/_2$ più breve di esse. — *Trento alle Ghiaie* (*Gelmi ex Murr*).

B Silicole più o meno smarginate all' apice.

a Dorso dello silicole formante una linea diritta o leggerm. convessa, quindi silicola sensibilm. ristretta in basso, triangolare o triangolare-cuneata.

I Silicole leggerm. smarginate, troncate all' apice.

j. Gelmii (**Murr,** 1899) = Bursa Borb. — Silicole obtriangolari; racemi frutt. densi. — *Trento nella Piazza del Vo'* (*Murr*).

k. stylosa Vis. = Bursa Borb. — Silicole più piccole, collo stilo uguagliante i lobi. — *Da ricercarsi.*

II Silicole distintam. smarginate all' apice, obcordate.

1 Silicole circa tanto larghe (in alto) quanto lunghe.

a. Bursa-pastoris L. (sub Thlaspi) = α typica del testo = Thlaspi polymorphum Gilib. = C. virgata et praecox Jord. = v. triangula G. Beck. = Bursa pastoris Borb. — *È la più comnne ed alla quale si possono in generale riferire le forme dalla b. alla g.*

l. bifida Crép. = C. sabulosa Jord. = Bursa bif. Borb. — Silicole triangolari, con smarginatura profondissima e lobi rotondati. — *Cors. a Calvi* (*Fouc. et Sim.*).

2 Silicole molto più strette (in alto) che lunghe, quindi notevolmente ristrette a cuneo alla base.

m. major Hagenb. (**Bég.**) = Bursa major Borb. = v. macrocarpa Heldr. exs., non Hobk. — Silicole lunghe sino ad 1 cm.; stilo 3 volte più breve della smarginatura. — *Veneto* (*Bég.*).

n. stenocarpa Crép. (**Timb.**) = C. agrestis Jord. = Bursa sten. Borb. — Silicole angustam. cuneate, il doppio più lunghe che larghe; stilo generalm. uguagliante la smarginatura. — *Veneto* (*Bég.*).

b. Dorso delle silicole concavo-scavato o formante un angolo ottuso, col lato super. più breve e diritto e l' infer. più lungo e subconvesso, quindi silicola bruscam. ristretta nella parte infer.

β *rubella* (*Reut.*) (1853-54) (Fl. An. l. c. [var. β]) = C. rubescens Personnat (1860) = v. parviflora Caruel = v. genuina Rouy et Fouc. = Bursa rub. Borb. — Petali bianchi o rossigni, di poco superanti i sepali, i quali sono porporini assieme alle silicole. Queste lunghe 5 e larghe 4 mm., triangolari-cordate, bruscam. attenuate e strette alla base, a lobi arcuati, assai divergenti, lunghi il doppio dello stilo. Semi più piccoli e meno numerosi che nella *Bursa-pastoris.* — *Comune.*

for. cuneata Rouy et Fouc. — *Cors. a Calvi* (*Fouc. et Sim.*), *Padovano* (*Bég.*).

γ *gracilis* (*Gren.*) = C. Bursa-pastoris × rubella = Bursa gracilis Borb. — Racemo molto lungo. Silicole piccole, spesso sterili, triangolari, collo stilo superante la smarginatura. Petali rossigni, quasi il doppio dei sepali. — *Veneto* (*Bég.*) *ecc.*

Digitized by Google

δ *grandiflora* (*Boiss.*) (Fl. An. l. c. [var. γ]) = Thlaspi Fauchè et Chaub. = Bursa grandifl. Borb. — Petali superanti più del doppio i sepali.

Oss. — Sono ancora da aggiungersi le due for. seg., che non furono comprese nello specchietto sopra riportato:

for. acaulis Ugolini (1902). — Fusti raccorciati, senza fg. cauline, con fi. sino dalla base, nascenti al centro di una rosetta di fg. intere o divise. Forma xerofila, precoce, a frutti in gran parte abortiti. — *Bresciano sui muriccioli dei vigneti* (*Ugol.*).

for. ruderalis (Jord.). — *Veneto, Trent. in Valsugana* (*ex Bég.*).

1495 (1) *Æthionema saxatile* **c. dentatum Guss.** — Siliquette con ala acuta, denticolata. — *Sic. alle Madonie.*

1497 *Teesdalea nudicaulis* α *regularis*. — *Isola di Capraia* (*Somm.*).

1500 (3) *Thlaspi perfoliatum*. — *Malta* (*Delicata*).

1501 (4) *Th. virgatum*. — *Cal. alla Sila a Tempone Morello a 1600 m.* (*Adr. Fiori*).

1502 * **Th. Mureti Gremli** = Th. virens Jord.? = Th. alpestre v. pumilum Gaud. — Differisce da *Th. alpestre* pel racemo più breve, bislungo, per le siliquette ad ali strette verso l'apice, poco o punto smarginate, e per lo stilo sporgente; da *Th. alpinum* per gli stami lunghi circa come i petali, che sono cuneiformi (non obovati), e per le antere alla fine violette. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

1503 (6) *Th. montanum*. — *Appenn. camp. a Pozzocone e m. Cairo* (*N. Terr.*).

β *praecox*. — *Abr. a Villavallelonga* (*Grande Loreto!*).

b. italicum Chiov. = Th. praecox β apenninus A. Terr. — Distinguesi dalla forma genuina per le fg. cauline largam. ovate e più larghe delle radicali. — *Nel Lazio ed in Cal. alla Sila* (*ex Chiov.*).

1503 * **Th. alpino × rotundifol. b. corymbosum.** — *Val d'Aosta al Col di Champorcher* (*Gysperger*).

1508 (3) *Iberis sempervirens*. — *Presso Brescia sui Ronchi inselvat.* (*Ugolini*); *indicata anche di Cal. al M. Cocuzzo* (*Solla*), *ma per equivoco colla J. Tenoreana!* (*Adr. Fiori*).

1509 (4) *I. Pruiti*. — La forma genuina del tipo sarebbe l'*I. Tenoreana var. glabrescens Huter P. et R.* — *Barese nelle Murge di Gravina ed a Bellafilippi* (*Palanza*). — I peduncoli negli esemplari pugliesi sono irsuti per brevi peli a guisa di papille soltanto nella faccia super. come nell'*I. sempervirens* (Palanza).

1510 (5) *I. spathulata* β *nana* **b. Candolleana (Jord.)**. — Differisce pei suoi fusti spesso ramificati verso la base, per le fg. meno decisam. spatolate, non dentate, per le silicole meno orbicolari, con ali meno visibili alla base. – *Nizz. a M. S. Honorat* (*Briq. et Cavillier*).

1512 (7) *I. linifolia*. — *Bellunese sopra Maniago verso M. Croce* (*Venzo!*).

1514 (9) *I. umbellata*. — *Salernit. a Cava dei Tirreni* (*L. Marcello*), *Cal. occ. alle falde della Malaspera* (*B. Longo*).

1515 (10) *I. amara*. — *Inselvat. nei campi presso Brescia* (*Ugolini*), *Polesine* (*Grigolato*).

1516 (11) *I. pinnata*. — *Presso Castiglione delle Stiviere nel Mantovano* (*Ugolini*), *Laz. al M. Circeo* (*Maratti*).

1517 (1) *Biscutella cichoriifolia*. — *C. Ticino sul M. Generoso nella parte super. della ferrovia* (*Chenev.*), *Veron. anche nel M. Pastello presso Monte* (*Goir.*), *Lig. occ. a Caprazoppa presso Finalmarina, a Rocchetta Nervina sul M. Terca ed a Libri* (*Bicknell*).

1519 (3) *B. didyma*. — *Laz. a Ponte Badino* (*Bég.*), *Malta* (*Delicata*).

α *typica c. apula*. — *Laz. a Fondi* (*Terr.*).

β *lyrata*. — *Laz. a Terracina e Paludi Pontine* (*Fiorini-Mazz.*, *Bég. ecc.*).

b.[1] **intermedia Strobl** (1885). — Come la for. *maritima*, ma siliquette pelose nel centro (non quivi glabre e lucide). — *Sic. a Palermo e Castelbuono* (*Strobl*).

1520 (4) *B. levigata* α *typ.* **for. superalpina Payot.** — Pianta nana (7-10 cm.), a fg. piccole, glabre, assai strette, appena dentate, con 1 sola fg. caulina capillare, sessile. Corimbo di 5-6 fi., a corolla giallo-pallida. — *M. Bianco a 2200 m.* (*Payot*).

γ **Rotgesii (Fouc.,** *1900*). — Pare caratterizzata pel rz. legnoso, pei fusti di 3-4 dm.,

Digitized by Google

gracili e fragili, ispidi inferiorm., per le fg. oblunghe, ruvido-ispide, grossam. dentate. — *Cors. a Ghisoni e Ghisonaccia* (*Rotgés ex Fouc.*).

δ. **corsica** (**Rouy**) (Rev. bot. 1903, Fl. de France IX, p. 459). — Fusti di 1-2 dm., filiformi, assai ramosi dalla base o quasi. Fg. bislungo-spatolate, sinuate o pennatifide, ispido-tomentose, biancastre. Silicole del diam. di 5 mm., scabre, in pannocchia raceniforme. — *Corsica all' Jnzecca presso Ghisoni* (*Gysperger*).

PAPAVERACEAE

1521 (1) *Fumaria capreolata* α *typ. b. speciosa* **subfor. atrosanguinea Broch. et Neyr.** — Corolla porporino-scura. — *Isola del Giglio* (*Somm.*), *Cors. in più luoghi* (*Fouc. et Sim.*).

for. provincialis Rouy et Fouc. — *Cors. ad isola Rossa* (*Fouc. et Sim.*).

β *flabellata.* - *Linosa* (*Ross*).

b. scandens Hausskn. — Pianta elevata, scandente, a fg. grandi. — *Isola del Giglio* (*Somm.*) *ecc.*

ε *bicolor.* — *Gorgona ed Elba* (*Sommier*).

θ *Boraei.* — *Messina, frequente negli orti della reg. mar.* (*Zodda*).

1521 * **F. specioso** × **Gussonei Somm.?** — *Isola del Giglio* (*Somm.*).

1522 (2) *F. officinalis* β *anatolica.* — *Copiosam. inselvat. nelle aiuole dell' Orto bot. di Padova* (*Adr. Fiori*).

γ *densiflora* = F. micrantha Lag. — *Pianosa* (*Béguinot*).

ζ *Schleicheri.* — *Qua e là nella Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

η *Vaillantii.* — *Versante mer. del M. Bianco e del Gr. S. Bernardo* (*Payot*), *Malta* (*Delicata*), *Cors. a Calvi* (*Fouc. et Sim.*).

1524 (1) *Corydalis capnoides.* — *Tir. nella Pusteria anche a St. Jacob in Defferegggen, castello di Heinfels presso Sillian ed Inner Villgratten* (*Sauter*).

1525 (2) *C. lutea* β *ochroleuca.* — *Alpi vicent. in valle Barbarena* (*Vasolin*).

1526 (3) *C. solida.* — *Lungo il Ticino nei comuni di Lugagnano e Casterno* (*Cozzi*).

1528 *Hypecoum procumbens.* — *Litorale romano tra Ladispoli e Torre Flavia* (*Béguinot*).

1530 (1) *Glaucium flavum* **b. glabratum Wk.** — **Fg.** glabre, almeno le super. Cassula liscia. — *Cors. a Solenzara* (*Fouc. et Sim.*).

1531 (2) *G. corniculatum.* — *Cors. a Bonifacio* (*Petit*).

1535 (3) *Papaver Rhoeas* α *typ. d. integrifolium* (*Vig. ex DC.*). — *Mogliano nel Trevig.* (*Majer ex Bert.*), *Palermo a M. Pellegrino* (*Tineo in hb. Panorm. ex Lanza*).

f. pallidum Gr. et Godr. — Fusto gracile, con un sol fi. più piccolo e pallido. — *Padovano* (*Ugolini*).

for. collinum (**Bogenh.**). — *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. laciniatum Goiran. — Fi. doppio, a petali profondam. laciniati. — *Veronese.*

for. Lecoqui (**Lamotte**). — *Val d' Aosta* (*L. Vacc.*).

γ *obtusifolium.* — *Malta* (*Delicata*).

δ *pinnatifidum.* — *Malta* (*Delicata*).

δ′ **Simoni** (**Fouc.**, 1896 et 1897 cum tab.). — Differisce dalla var. *pinnatifidum* per i bocci ovoideo-oblunghi, pei fi. più piccoli, a petali strettam. ovali, violetti alla base, profondam. dentati all' apice, per le antere violacee e per le cassule più piccole, lungam. claviformi. — *Cors. in parecchi luoghi* (*Fouc.*).

δ″ **Tinei** (**Lanza** in Bollet. Orto Bot. Palermo 1905, p. 24). — Portamento della *v. pinnatifidum*, ma cassule della *v. dubium* e probabilm. ibrido tra essi. — *Palermo a Mondello* (*Todaro in hb. Panorm.*) *ed isola Maretimo* (*Tineo in hb. Panorm.*).

ε *dubium* **for. confine** (**Jord.**) = P. corsicum Jord. et Fourr. — *Corsica* (*Jord.*, *Fouc. et Sim.*).

for. depressum (**Jord. et Fourr.**). — *Cors. a Corté* (*Fouc. et Sim.*).

for. errabundum (**Jord.**). — *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).

Digitized by Google

for. frentanum (Ten.) Ten. — Fg. bipennatifide, a lacinie oblungo-lanceolate. — *Abr. nella Valle di Fara* (*Ten.*).

NYMPHAEACEAE

1537 *Nymphaea alba* **b. minor Guss.** (1843) = N. alba β DC. (1821) = v. terrestris Clav. (1881). — Fi. e fg. grandi circa $^1/_2$ del tipo. — *Nei pantani e nelle acque meno profonde.*

RANUNCULACEAE

1542 (3) *Clematis Viticella.* — *Avellinese* (*Cassitto*).

1544 (5) *C. recta.* — *Nel Bolognese anche lungo il Savena presso Sesto* (*Mattei*), *Colli di Cesena* (*Del Testa*), *Cors. a Novella* (*Fouc. et Sim.*).

1545 (6) *C. Flammula.* — *Presso Galbiate sul lago di Como* (*Ardissone*), *Bologna fuori porta S. Stefano* (*Betti*), *colline del Cesenate* (*Del Testa*).

a. elata Bég. (1897). — Caule lungo ed esile. Pannocchia rada, con fi. distanti, portati da lunghi peduncoli.

f. contracta Bég. (1897). — Pannocchia densa, a fi. ravvicinati, con portam. che ricorda la *C. Vitalba.* — *Laz. a Terracina* (*Bég.*).

1546 (7) *C. Vitalba* **d. macrophylla Goir.** — « Foliis plerumque integerrimis, latissimis ». — *Veronese* (*Goir.*).

1547 (1) *Thalictrum aquilegifolium.* — *Lungo il Ticino in territ. di Abbiategrasso* (*Cozzi*).

c. umbelliforme Costa. — Pannocchia più densa, con fi. quasi ad ombrella. Fg. a lobi profondi, più arrotondati, appena crenati. — *Veron. al Maso* (*Goir.*).

d. macrophyllum Goir. — Foglioline misuranti 48 per 50 mm., incise, dentate o talora intere. — *Veronese* (*Goir.*).

e. alpestre Rickli ex Chenevard (Bull. hb. Boiss. 1904, p. 542). — Fusto alto 22-25 cm., con 3 fg. ridotte. Infiorescenza contratta, a pochi fi. — *C. Ticino sull'Alpe Fornaro a 2100 m.* (*Rickli*).

1550 (4) *Th. foetidum* β *minus* **for. brachycarpum (Timb.).** — *Forse in Cors. al Pigno, ma troppo immaturo per determinarlo con sicurezza* (*Roux ex Fouc.*).

for. collinum (Wallr.). — *C. Ticino a Solduno e Bugnosco* (*Chenev.*).

for. flexuosum (Bernh., Rchb.). — *M. Baldo* (*Goiran*).

for. odoratum (Gr. et Godr.). — *Versante mer. del M. Bianco tra Visaille e Courmayeur* (*Payot*).

1551 (5) *Th. angustifolium.* γ *exaltatum* **for. glabrum Rickli.** — *C. Ticino* (*Chenev.*).

δ *flavum.* — *Anche nell'Istria.*

1552 (1) *Anemone alpina.* — *Appenn. camp. al Zaffineto, Settefrati e Picinisco* (*N. Terr.*).

1553 * **A. montano × vernalis Gürke** = A. bolzanensis Gürke (1903) = Pulsatilla vernal. × mont. Murr (in Allgem. bot. Zeit. VIII, p. 147 [1902]) = P. bolzanensis Murr (1902). — *Tir. mer. sul M. Ritten.*

1554 (3) *A. Pulsatilla* α *typ. b. propera* (*Jord.*), non *procera* come sta scritto nel vol. I, p. 495.

γ *pratensis b. montana* **subfor. humilis, pratensiflora** et **pulsatilliflora Val de Lièvre** (1873) (sub Pulsatilla), **Gürke** (1903) (sub Anem.). — *Tutte tre nel Tir. mer.*

subfor. nigricans (Kern.) = Pulsatilla Stoerck = A. pratens. L. p. p. — *It. super.* (*ex Gürke in Richter*).

1555 (4) *A. narcissiflora.* — *Camp. a Forca d'Acero nel territ. di S. Donato* (*Falqui*).

1556 (5) *A. apennina.* — *L'indicazione del M. Baldo è del Pona, ma giustam. il Goiran crede si tratti di un errore.*

b. albiflora Strobl (1903). — Fi. bianchi o bianco-rosei. — *Nell'area della spec.*

Digitized by Google

1557 (6) *A. ranunculoides* **b. biflora Peterm.** (1838). — *C. Ticino a Mendrisio* (*ex Gürke in Richter*).

1558 (7) *A. nemorosa b. purpurea DC.* (1805) = v. rosea Peterm. (1838) = v. rubra Pritz. (1841) = v. rubicunda Sacc. et Vis. (1869) (Fl. An. I, p. 496 [for. b.]).

c. **grandiflora Blytt** (1876), **Rouy et Fouc.** (1893). — Fi. più grandi (sino a 7 cm. diam.), in pianta più robusta. – *Veronese sui M. Lessini* (*Goir.*).

d. **hirsuta Wierzb. in Rchb.** — Pianta più alta e più pelosa. — *It. bor.* (*ex Gürke in Richter*).

e. **silvicola Schmidely** (1898-99). — Fusto molto gracile, pieghevole. Corolla di grandezza normale. — *Val d'Aosta* (*ex L. Vacc.*).

1558 * **A. nemoroso × trifolia Glowacki** = A. Pittonii Glowacki (1869). — *Val Groina presso Gorizia* (*ex Gürke*), *Trevig. nei colli di Vittorio* (*Pampanini!*) *e Trento* (*ex Gürke*).

1559 (8) *A. trifolia.* — *Camp. al M. Cajro* (*N. Terr.*).

a. **major Val de Lièvre** (1874).

b. **minor Val de Lièvre** (1874), **M. Gortani** (1903). – Pianta più piccola in ogni parte, a sepali all' esterno e fg. più o meno suffusi di porporino. — *Nei luoghi aridi* (*ericeti, castagneti ecc.*), *nel Tir. mer.*, *Trevig. nei colli di Vittorio* (*Pampanini*) *e Carnia* (*Gortani*).

c. **caerulescens Hausm. ex Dalla Torre** (1882). — Petali azzurro-violetti tanto esternam. che internam. — *Ven. nei colli di Vittorio* (*Pampanini!*) *e presso Tolmezzo* (*Gortani!*).

d. **biflora Gross** (1900). — Pianta lussureggiante, con 2-3 fi. — *Ven. nei colli di Vittorio* (*Pampanini!*), *Bolzano* (*Gross*), *Trentino* (*Gelmi*).

1560 (9) *A. baldensis.* — *C. Ticino sul versante mer. del colle del Gries* (*Schroeter*).

for. alpina et **subnivalis Val de Lièvre** (Oest. bot. Zeit. 1874, p. 111). — *Ambedue nel Tir. mer.*

1563 (12) *A. hortensis* α *stellata* **c. albiflòra Lojac.** — Fi. bianchi. — *Sic.*

β *pavonina b. fulgens.* — *Reggiano presso il Castello di Albinea* (*Casali*).

1564 (13) *A. coronaria.* — *Malta* (*Delicata*).

h. **rosea** (**Hanry**). — Fi. roseo-violacei. — *Liguria* (*ex Rouy et Fouc.*).

i. **minor N. Terr.** (1889). — Fusti di 8-10 cm., appena superanti le fg., che sono inciso-pennatifide ed a lacinie mucronulate. Fi. più piccoli, violacei. — *Cal. a S. Angelo presso Castrovillari* (*N. Terr.*).

1565 (14) *A. Hepatica* **a. macrantha Goir.** — Sepali lunghi 5-8 mm.

b. **minor Rouy et Fouc.** = β micrantha Goir. — Sepali più brevi, lunghi 5 mm. — *Cors. presso Corte* (*ex Rouy*), *Veronese* (*Goir.*) *ecc.*

c. **rosea Neumann** (1885). — Fi. rosei. — *Nell'area della spec.*

d. **alba Gürke** = Hepatica alba Mill. (1768) = v. albiflora Lenticchia (1896). — Fi. bianchi. — *C. Ticino a M. Caprino* (*Lenticchia*).

e. **plena Gürke** = Hepatica plena Mill. (1768). — Fi. doppi. — *Tir. mer.* (*ex Gürke in Richter*).

f. **multiloba C. Hartm.** = A. rhaetica Bruegg. — Lobi di parecchie fg. con 2 lobetti e quindi fg. con 5 o più lobi. — *C. Ticino a S. Salvatore* (*Chenev.*) *ecc.*

g. **marmorata T. Moore** = Hepatica triloba v. picta G. Beck. — Ciascun lobo con due macchie bianche, bislunghe, ben distinte. — *Mentone* (*ex Gürke in Richter*).

1567 (2) *Adonis distortus.* — *Dietro esame degli esemplari del prof. Solla esistenti all'Istituto Forestale di Vallombrosa, la località della Sila presso Cosenza deve radiarsi ed è da riferirsi invece al Ranunculus millefoliatus* (*Adr. Fiori*).

1568 (3) *A. annuus* β *microcarpus.* — *Eolie a Lipari* (*Zodda*), *Malta* (*Delicata*).

1569 *Myosurus minimus.* — *In Sic. anche a Busambra* (*Tod.*, *Huet in hb. Panorm. ex Lanza*).

1572 (2) *Ranunculus aquatilis* α *typ. a. peltatus et b. truncatus.* – *Ambedue a Malta* (*Delicata*).

Digitized by Google

α *diversifolius* **for. rhipiphyllus (Bast.).** — *Cors. ad Ajaccio* (*Wilczek ex Rouy Fl. de France VIII, p. 376*).

ε *trichophyllus b. Cesatianus.* — *Faentino* (*Cald.*), *Parmig. a Tabiano* (*Ces.*) *e Padov. a Montegrotto* (*Bizz. ex Bég.*). — Sec. Béguinot (Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 62) questa for. andrebbe riferita alla *var. paucistamineus.*

ζ *paucistamineus* **a. fluitans Bég.** (1904). — Forma delle acque più o meno rapidam. scorrenti. — *Trevigiano* (*Sacc. ex Bég.*).

c. natans Bég. (1904). — Forma delle acque ferme o lentissimam. scorrenti, più robusta e più pelosa, a fg. super. quasi sessili, a lacinie più o meno divaricate. — *Comunissimo nel basso Veneto* (*Bég.*).

var. confervoides (Fr.) = R. lutulentus Perr. et Song. — *Nel Trent. nello stagno di Campagnola a circa 2300 m.* (*Gelmi*), *Val d'Aosta* (*Vaccari*).

1573 (3) *R. amplexicaulis* γ *pyrenaeus.* — *Cors. al M. Nino* (*Romagnoli*) *e nella valle dell'Erco in quel di Niolo* (*Audigier ex Fouc.*).

b. bupleurifolius (Lap.) DC. — Fg. capillari. Fusto 1-floro. — *Colla var. pyren.*

1575 (5) *R. rutaefolius* β *anemonoides*, si sostituisca con:

β *Kernerianus Bolzon* (1898) = Callianthemum Freyn in Kern. = R. anemon. v. baldensis Rigo in Sched. = R. Kernerianus Fiori (1905). — Il vero *R. anemonoides Zahlbr.* va escluso dalla nostra Flora (Cfr. Fiori in N. Giorn. bot. it. 1905, p. 174).

1576 (6) *R. alpester* α *typicus* **b. ambiguus Bruegg. in Rouy et Fouc.** — Fg. radicali più profondam. lobate, quasi 3-sette, a segmenti inciso-dentati. — *M. Veronesi* (*Goir.*).

1577 (7) *R. crenatus* β *magellensis* (Fl. An. I, p. 503 [for. b.]). — Dietro osservazioni fatte su copioso materiale abbiamo constatato che la fossetta nettarifera dei petali è quasi sempre protetta da una squama ben evidente e generalm. bifida, squama che manca sec. Schott (Skizzen oesterr. Ranunkeln sect. Allophanes, Wien 1852) nel *R. crenatus* tipico. Le fg. sono sempre subtrilobe. I petali ora rotondati ed ora smarginati quanto nel *R. alpestris.* Di conseguenza i quesiti 7° ed 8° della chiave (Vol. I, p. 503) vanno modificati (Cfr. etiam: Pons in N. Giorn. bot. it. 1898, p. 357).

1578 (8) *R. glacialis* **e. chritmifolius Rchb.** — Fg. tripennatosette, a lacinie lanceolate. — *C. Ticino* (*Chenevard*) *e certo altrove.*

for. minimus Gaud. — *C. Ticino al Camoghe* (*Chenev.*), *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

1580 * **R. aconitifolio × glacialis** = R. glacialis v. aconitoides DC. — *Gr. S. Bernardo* (*cfr. L. Vacc.*).

1582 (12) *R. Lingua.* — *Lazio nelle paludi Pontine nella palude della Mortola* (*Maratti, Béguinot*).

1584 (14) *R. ophioglossifolius* α *typ.* — *Elba* (*Sommier*), *Malta* (*Delicata*).

a. elatus Bég. (1897). — Pianta a fusto lungo, fg. lungam. picciolate e fi. grandi.

b. pusillus Bég. (1897). — Pianta a fusto basso (3-6 cm.), gracile, fg. piccole, quasi sessili e fi. più piccoli. — *Laz. nelle paludi Pontine nei luoghi rimasti all'asciutto* (*Béguinot*).

β *fontanus.* — *Malta* (*Delicata*).

1585 (15) *R. lateriflorus.* — *La località di Aosta* (*ex Zumagl. sub R. nodiflorus*) *è dubbia, sia perchè tale pianta non vi è più stata ritrovata, sia perchè non è certo se spetti al R. nodiflorus L. od al R. lateriflorus, specie che il Zum. evidentem. riunisce in una sola e forse a ragione.*

1586 (16) *R. Ficaria.* α *typ.* — Fg. a lobi ora avvicinati alla base (**for. incumbens F. Schultz**), ora divergenti (**for. divergens F. Schultz**). Fi. ora del diam. di 20-30 mm. (**for. grandiflorus Lamotte**), ora di 15-20 mm. (**for. parviflorus Lamotte**). — *Tutte nell'area del tipo.*

β *ficariaeformis* **b. crenatolobus Strobl** (1903). — Fg. fortem. crenate, quasi lobate. — *Sic. alle Nebrodi* (*Strobl*).

1587 (17) *R. bullatus.* — *Isola di Pianosa* (*Somm.*).

1590 (20) *R. orientalis* β *Marchesinii.* — Sec. Lanza (Nat. Sicil. 1896) non vi è alcuna dif-

Digitized by Google

ferenza tra il tipo e la var., quindi *R. Marchesinii Lojac.* è un semplice sinonimo di *R. orientalis.* — *Cresce in Sic. anche a Piazza Armerina a S. Andrea* (*Roccella ex Lanza*) *ed a Caltanissetta* (*Ross!*).

1593 (**24**) *R. mospeliacus* β *saxatilis.* — *Eolie a Salina* (*Zodda*).

1595 (**25**) *R. flabellatus d.* **Heldreichianus** (**Jord.**) = R. flab. v. maximus Lanza. – Statura 3-4 volte maggiore dell'ordinario; fusto ramificato, spesso flessuoso ed a molti fi.; fg. più grandi, a lacinie più larghe e vellutate. — *Sic. alla Ficuzza e presso Piazza Armerina* (*Lanza*).

1596 (**26**) *R. millefoliatus.* — Sopra questa pianta in confronto col *R. garganicus Ten.* cfr. « Degen in Oest. Bot. Zeitschr. 1899, p. 261 ». — *Sale sino alla reg. mont. e talora fino all'alp., avendolo raccolto alla Madonna di Serino in Basilicata a 1888 m.* (*Adr. Fiori*).

β *garganicus* **for. Tenorii N. Terr.** (1891). — *Laz. a Fondi nel M. delle Fate* (*N. Terr.*).

1597 (**27**) *A. Agerii.* — *Orto bot. di Perugia, inselvat.* (*Palomba in litt.*).

1598 (**28**) *R. cassubicus* α *typ.* — *Quasi certam. il tipo manca all'Italia* (*Pons, Bég.*).

β *auricomus.* — *Cal. alla Sila nella reg. Ciricilia* (*Adr. Fiori*).

c. **silvicolus Wimm. et Grab.** — Fg. basali di solito trilobe, a lobi interi, crenati o moltipartiti, le cauline infer. oblungo-lanceolate, generalm. seghettate. — *C. Euganei* (*ex Bég.*) *ecc.*

d. **pratensis Wimm. et Grab.** — Fg. cauline strettam. lineari ed intere. — *Veneto* (*ex Bég.*).

e. **pseudopsis** (**Jord.**). — Acheni più piccoli ed assai pubescenti, a rostro più breve e meno ricurvo-uncinato. — *Piem. e Moden. al bosco di S. Felice* (*ex Bég.*).

1599 (**29**) *R. repens* e. **serotinus Ugolini** (1904). — For. stagionale estiva a fg. coi lobi larghi. — *Bresciano* (*Ugolini*) *ecc.*

f. **pleniflorus Vis. et Sacc.** (1869). — Fi. doppi. — *Colt. per ornamento.*

1600 (**30**) *R. serbicus.* — *Cal. alla Sila nella reg. Ciricilia, lungo il fiume Ampollino tra Berberano e Trepidò e tra S. Giov. in Fiore ed il fiume Neto, abbondante nella reg. mont.* (*Adr. Fiori*).

b. **uliginosus Fiori** (1900). — Pianta di 6-10 dm., a fg. cauline infer. con segmenti muniti di picciuoletti lunghi per lo più 4-6 cm. (nel tipo pianta alta $3^1/_2$-5 dm. e picciuoletti lunghi 2-3 cm.). — *Col tipo nei luoghi più umidi* (*Adr. Fiori*).

Oss. Questa spec. è affatto distinta dal *R. caucasicus M. B.*, al quale era stata riunita nella Fl. Anal. (Vol. I, p. 511) (Cfr. Fiori in N. Giorn. bot. it. 1900, p. 258).

1602 (**32**) *R. geraniifolius* β *montanus* **for. nanus Bouvier.** — *Piccolo S. Bernardo* (*Bouv.*).

ε *pollinensis.* — *Basil. tra m. Serino e m. Papa* (*Adr. Fiori*).

ζ *apenninus.* — *Appenn. parmig. al M. Cajo* (*Bolzon in litt.*).

1603 (**33**) *R. polyanthemos* α *typicus.* — *Non esiste in Italia la for. tipica propria dell'Eur. centr.* (*Pons, Bég.*).

β *Thomasii.* — *Camp. a M. Faito* (*Terr. N.*), *Cal. alla Sila a Tempone Morello e reg. Ciricilia* (*Adr. Fiori*).

γ *nemorosus.* — A seconda della larghezza maggiore o minore dei segmenti delle fg. si possono distinguere le due for. **latisectus** ed **angustisectus Celak.** — *Ambedue nel Padovano* (*ex Bég.*).

d. **giganteus DNtrs.** (1844). — Pianta di statura 2-3 volte maggiore del solito. — *Genova al Forte de' Ratti* (*DNtrs.*). — Potrebbe essere lo stesso che la for. b. *romanus Sommier.*

e. **serotinus Ugolini** (1904). — For. stagionale estiva a fg. coi lobi larghi. — *Bresciano* (*Ugol.*) *ecc.*

1604 (**34**) *R. acer* β *Steveni et b. Frieseanus.* — Sec. Béguinot (Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 69), la presenza di queste due entità in Italia merita ulteriore conferma.

1605 (**35**) *R. lanuginosus.* — *Isola di Capraia* (*Somm.*); *ma forse è il R. velutinus* (*cfr.* n. 1606).

Digitized by Google

α *typ.* **b. apenninus DNtrs.** (1844). — Differisce dal tipo per le fg. poco villose (nec holosericeis), a villosità appressata. — *Comune nell' Appenn. ligure* (*De Notaris*).

c. geraniifolius DC. (Fl. An. l. c. [for. c.]).

β *umbrosus* (*Ten. et Guss.*) (Fl. An. I, p. 513 [for. b]). — *Va elevato al grado di var. geografica rappresentante il tipo nell' Appenn. centr. e mer.*

b. muriculatus Nob. for. n. — Pianta più robusta in ogni parte, alta sino ad 1 m. Acheni portanti sulle facce dei minuti tubercoli sormontati da una breve setola. — *Vallombrosa attorno all' Istituto Forestale unitam. al tipo* (*Fiori*).

1606 (36) *R. velutinus.* — *Polesine tra Bagnolo di Po e Runzi* (*De Bonis*), *Capraia* (*Doria ex Somm.*). — Forse da riferirsi a questa spec. anche il *R. lanuginosus* già indicato di quest' isola (Somm.).

b. parviflorus DNtrs. (1844). — Fi. grandi una metà del normale. — *Genòva nei colli d' Albaro* (*De Notaris*).

1606 * R. petiolulatus Fouc. et Sim. (1898) = R. bulboso × velutinus. — *Cors. a Caporalino tra i genitori* (*Fouc. et Sim.*).

1607 (37) *R. bulbosus* α *typ. b. albonaevus* (*Jord.*). — For. più robusta, a fg. 1-2-ternate, macchiate di bianco. — *C. Ticino a Mergoscia* (*Chenevard*).

for. luxurians DNtrs. (Rep. Fl. Lig. p. 14). — *Presso Genova* (*De Notaris*).

for. ambiguus DNtrs. (Ibid.). — *Presso Genova a S. Siro di Stroppa* (*De Notaris*).

for. valdepubens (Jord.). — *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).

β *Aleae* **for. dentatus et laciniatus Freyn.** — *Ambedue nel Padovano* (*Bég.*).

γ *neapolitanus.* — *Elba* (*Somm.*).

for. pauciflorus N. Terr. (1872). — *Laz. a Fondi nell' andare a Lenola* (*N. Terr.*).

1608 (38) *R. sardous* β *cordiger.* — *Barese a Bellafilippi* (*Palanza*).

ε *intermedius.* — *Corsica* (*Petit*).

b. granulatus Nob. = R. angulatus b. granul. Guss. — Acheni tubercolati. — *Colla var.*

1609 (39) *R. parviflorus.* — *Trovasi nelle isole di Pantelleria e Marettimo, per le quali invece è probabilm. da togliersi la var. chius* (*DC.*) (cfr. Ross, Nat. Sic., 1896).

β *chius.* — *Malta* (*Delicata*).

1610 (40) *R. muricatus.* — *Presso Cesena* (*Del Testa*).

b. depressus A. Terr. — *Laz.* (*A. Terr.*, *Bég.*).

1614 *Trollius europaeus* **b. grandiflorus Bolzon.** — Fusti semplici, 1-flori, con fi. più grande (petali lunghi 20-24 mm., mentre nel tipo misurano 12-16 mm.). — *Bellunese sul M. Pelmo a circa 2000 m.* (*Bolzon*).

1615 *Eranthis hiemalis.* — *Nel Lazio trovasi nella reg. mont. tra 1500 e 1700 m.* (*Bég.*).

1616 (1) *Helleborus viridis.* — *Il tipo della spec. sec. Béguinot, che esaminò copioso materiale, sarebbe limitato alle Alpi; la var. odorus si trova nei Colli Euganei, qua e là nell' It. bor. traspad., quindi comune ed esclusiva nell' Emil., Tosc., Marche, Umbria e forse Laz.*

1617 (2) *H. niger.* — *Monti del Riminese* (*Matteini ex Del Testa*).

1620 *Isopyrum thalictroides* **b. insignis Gib. et Pir.** (1882). — Differisce dal tipo per avere i carpelli numerosi (non 2-4), le foglioline a contorno cordato-reniforme, profondam. segmentate, colle lacinie dentato-crenate, a denti rotondi ed i petali nettariformi più ampii e colla fossetta nettarifera più piccola (ex Gib. et Pir.). — *Appenn. tosco-moden. al Libro Aperto.*

1621 (1) *N. damascena* **c. divaricata Brand** (Helios 1895, p. 35). — Fusto ramosissimo, a rami *patenti orizzontalm.* Fi. grandi. — *Sic. a Termini e Palermo* (*ex Brand*).

d. pallidiflora Reverchon exs. ex Brand (l. c.). — Fusto ramoso, a rami subdivergenti. Fi mediocri. *Stami più brevi dei sepali.* — *Sard. tra S. Teresa Gallura e Tempio* (*Reverch.*).

e. africana Brand (l. c.). — Fusto più basso (4-5 cm.), ramoso, a rami divergenti. Fi. *piccoli.* Sepali lanceolato-ovati, appena attenuati alla base. Stami *poco più lunghi dei sepali.* Cassule piccole. — *Is. Lampedusa* (*Gürke in Richter, Somm.*).

Digitized by Google

1621 * **N. gallica var. divaricata Brand** (l. c.) = N. divaricata Wk. = N. hispanica Gr. et Godr., Rouy et Fouc. (non L.) = N. hisp. v. glaucescens Boiss. — Fg. brevissime. Semi più piccoli, *compresso-triquetri, foschi.* — *Sic. in luoghi argillosi a Girgenti* (*Citarda ex Brand*).

1622 * **N. hispanica L. β intermedia Coss.** — *Sicilia* (*A. Terr.*).

1623 (3) *N. arvensis.* — *Frequente nei campi dell' Imolese* (*Mattei*), *Cesenate a Sogliano* (*Baldacci ex Del Testa*), *Avellinese* (*Cassitto*).

1625 (2) *Aquilegia pyrenaica γ Bertolonii.* — *Appen. lig.-parmig. al M. Penna* (*Bolzon in litt.*), *Majella nella Valle d' Orfenta e Valle di S. Spirito* (*Porta e Rigo*).

b. Reuteri. — *Bresciano a Montesnello* (*Ugolini*) (?).

δ *Einseleana.* — Intorno a questa pianta e sue forme vedi: Pampanini in N. Giorn. bot. it. 1906, p. 42. — *L' indicazione del Gr. S. Bernardo deve essere radiata* (*cfr. L. Vacc.*), *perciò l' area di questa pianta si arresta al Comasco.*

c. **Portae** (**Huter,** 1893). — Differisce dalla for. genuina (sec. Pampanini, l. c.) principalm. per essere pianta densam. irto-pubescente, ma mancante di viscosità nella parte super., pei fi. più grandi (sepali lunghi 28-30 mm. mentre nel tipo sono 19-25 mm.), pei sepali ovato-lanceolati (non lanceolato-acuminati), pei petali a lamina rotondata (non subtroncata), lunghi meno di $^1/_2$ dei sepali (nel tipo lunghi $^1/_2$-$^2/_3$ dei sepali), a sperone più breve (8 mm.) e diritto (nel tipo lungo 11-12 o talora sino a 15 mm. e diritto o ricurvo all' apice). — *Bresciano sul M. Cornablacca* (*Porta*).

d. thalictrifolia. (Fl. An. I, p. 521 [var. ε]). — *Comasco presso Bellaggio* (*Ebuer ex Zimm.*) *ed al M. dei Fiori* (*Calegari in hb. Pampanini*).

e. **pseudo-thalictrifolia Pamp.** (l. c.). — Pianta tutta densam. viscido-irta. Fg. a lobuli ovato- od obovato-oblunghi, ottusetti, divaricati. Sepali come nella for. c (lunghi 22-24 mm.). Petali a lamina subtroncata, più larga che nella for. d. (8-9 mm. in luogo di 5-7), lunghi $^1/_2$ dei sepali; sperone lungo 10-11 mm. Stami appena più brevi della lamina dei petali (in tutte le altre for. lunghi $^2/_3$ circa). — *Bresciano sul lago di Garda sopra Tremosine a 1000-1200 m.* (*Cimarolli*) *e Friuli sul monte Raut presso Barcis* (*Venzo*).

1626 (3) *A. vulgaris α typ. c. Ottonis* **for. magellensis** (**Porta et Rigo exs.,** 1877) = A. Otton. v. unguisepala Borb. (1882). — *Abr. alla Majella* (*Porta e Rigo*).

for. dumeticola (**Jord.**). — *Corsica.*

for. platysepala (**Rchb.**). — *Tir. mer. a Bressanone* (*ex Gürke in Richter*).

for. sicula Strobl (Oest. bot. Zeit. 1884, p. 369). — *Sic. alle Madonie ed Etna* (*Strobl.*).

Gen. Delphinium. — Vedi: E. Huth Monogr. der Gattung Delphinium, in Bot. Jahrb. XX, p. 322-499 (1895); Zodda, in Malpighia 1902, p. 342.

1627 (1) *D. Consolida α typ. β paniculatum* (*Host*) (Fl. An. I, p. 522 [for. b]). — Distinguesi dalla for. genuina soprattutto pei fi. minori, a sepali lunghi 5-9 mm. (in luogo di 12-15 mm.) e pei follicoli lunghi il doppio che larghi (invece che lunghi il triplo che larghi). — *Istria a Pola e lago di Como presso Bellaggio* (*ex Huth*) *e probabilmente altrove.*

γ *pubescens* (Fl. An. l. c. [var. β]). — *Barese nelle Murge di Ruvo e presso Barletta* (*Palanza*).

b. **heterophyllum N. Terr.** (1889). — Parte super. della pianta e follicoli con peli spesso glandulosi. Semi quasi foschi. — *Cal. presso Castrovillari* (*N. Terr.*).

1628 (2) *D. Ajacis* c. **minus Huth.** — Fusto alto 10-30 cm. Fi. più piccoli, a sepali azzurro-pallidi, assai più brevi dello sperone. — *Corsica.*

d. **longepedunculatum Guss.** (1854). — Fg. a lacinie più strette. Peduncoli lunghi 2$^1/_2$-5 cm. — *Ischia.*

1629 (4) *D. peregrinum α typ.* — *Sicilia, Malta* (*ex Huth*).

b. **subsaccatum Huth** (1895). — Sperone un po' gibboso all' apice, quasi sacciforme. — *Euganei* (*ex Gürke in Richter*).

δ *longipes.* — *Malta* (*Delicata*).

Digitized by Google

1630 (5) *D. Staphysagria.* — *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*), *Malta* (*Delicata*).

1631 (6) *D. fissum.* — L' Huth adotta il nome di *D. hybridum Steph. ex W.*, ma essendovi un *D. hybridum L.* riferito a *D. elatum v. villosum* (*Stev. in DC.*), a scanso di confusione crediamo meglio conservare la nostra nomenclatura, che è quella pure adottata dalla maggioranza.

α *typicum.* — *Si trova solo nell' Istria.*

β *velutinum* (Fl. An. I, p. 524 [for. b]). — *Cal. citer. al Piano del Minatore nel territ. di Saracena* (*B. Longo*).

γ *narbonense* (*Huth*) (Fl. An. l. c. [for. c]).

1632 (7) *D. pentagynum* β *emarginatum.* — *Malta* (*Delicata*).

1633 (8) *D. elatum* α *typ.* — *Il tipo sec. Huth è proprio dell' Eur. centr.*, *Russia*, *Cauc.*, *Sib. e Mongolia.*

β *alpinum* (*W. et K.*) = var. α (Fl. An. I, p. 524). — Sostituiamo, seguendo l' Huth, questo nome a quello di *D. intermedium Sol. in Ait.* che va riferito al tipo, mentre il *D. intermedium DC.* comprende diverse forme.

b. Haynaldi Huth (1893) (sub D. alpin.) = D. alp. v. productum Huth (1895). — Brattee infer. simili alle fg. super., per lo più eguaglianti o superanti il peduncolo, le medie strettam. lanceolate; lacinie delle fg. e delle brattee infer. strette, acuminate. — *Alpi Mar. a Valdieri* (*Huth*).

γ *montanum.* — *Vette di Feltre* (*Huth*).

δ **oxysepalum (Borb. et Pax) b. productum Huth** (1894 et 1895). — *Bellun. nelle Vette e Valle di Feltre ed all' alpe Aquerda presso Primiero* (*ex Huth*).

1633 * **D. Oliverianum DC.** — *Questa spec. della Siria è indicata del Salernit. a Cava dei Tirreni in un campo a Rotolo* (*Marcello L.*). — *Forse avventizia?*

1634 (1) *Aconitum variegatum* γ *paniculatum* **for. depauperatum Bouvier.** — Fg. $^1/_2$ più piccole, a lacinie lineari. Pannocchia contratta, a 3-6 fi. — *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. hebegynum (DC.). — Elmo più stretto ed a rostro più lungo. — *Gr. S. Bernardo* (*cfr. L. Vacc.*).

for. parviflorum (Rchb.) Rchb. — *M. Baldo.*

for. penninum Ser. in Tiss. — Fusto un po' flessuoso, con rami a pochi fi. Elmo semicircolare, lungam. rostrato. — *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

1634 * **A. paniculato × Napellus** = A. Clairvilleanum Bruegg. — *Trentino a Pejo* (*Gelmi*).

1635 (2) *A. Napellus* **for. eustachyum (Rchb.).** — *M. Baldo.*

1636 (3) *A. Anthora.* — *Appenn. bolognese ai Campi di Lustrola* (*Lorenzini ex Betti*) (?).

b. Jacquini (*Rchb.*, 1819 et 1820) = v. Jacquinianum Ser. (1823) (Fl. An. I, p. 525).

for. eulophum (Rchb.). — *Liguria.*

1637 (4) *A. Lycoctonum* α *typ. d. ranunculifolium* **subfor. dolomiticum Evers** (1896). — Fg. radicali con lacinie più larghe, meno profonde e più avvicinate, a contorno quasi reniforme. — *Trentino* (*Evers*).

for. laxiflorum DC. (1818) = A. Lycoctonum All. = A. meloctonum Rchb. (1819). — Pannocchia molto lassa. — *Piem.*

for. pauciflorum Bouvier. — Fusto con pubescenza molto fine. Fg. e fi. assai più piccoli. — *Piccolo S. Bernardo* (*L. Vacc.*).

for. penninum Ser. — Pianta pubescente, con fi. grandi, a spiga od a pannocchia. Elmo conico, con rostro grande. Ovari 3-5, villosetti (Ser.). — *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. pubiflorum DC. in Ser. — Fi. come nella for. prec. Pianta con peli lunghi, molli e patenti. — *Gr. S. Bernardo* (*DC.*, *Ser.*).

1637 * **A. giganteum Zum.** (Fl. Pedem. II, p. 345). — *Piem. nel Biellese sopra il lago della Vecchia presso le nevi perpetue* (*Zum.*). — È una for. di *A. Lycoctonum.*

1638 *Paeonia officinalis* γ *villosa* (*Desf.* [1804], *Sweet* [1827]) = P. paradoxa Anders. (1817) (Fl. An. I, p. 527 [var. γ]).

Digitized by Google

ζ *corsica* **b. Reverchoni Nob.** = P. Russi β Reverchoni Legr. (cfr. Rouy Fl. de France VI, p. 460). — Carpelli glabri come nel tipo ma fg. della var. *Russi*. — *Cors. a Serra di Scopamene* (*Reverchon*).

BERBERIDACEAE

1640 *Epimenium alpinum*. — *Umbria sul M. Malbe* (*Palomba in litt.*).

1641 *Berberis vulgaris* α *typ*. — *Nelle Alpi Graie sale sul M. Baraveuil sino a 2400 m.* (*L. Vacc.*).

b. rupestris Goir. — Pianta umile, depressa, ramosissima. — *Veronese in Val d'Adige al colle S. Marco* (*Goir.*).

β *aetnensis*. — Distinguesi dal tipo, sec. Schneider, anche per la presenza di stomi nella pag. super. delle fg., mancanti invece in esso.

a. macroacantha Strobl (1903) = B. vulg. β macroac. Guss. — Fg. verdi-glauche, misuranti 15-45 per 6-17 mm., di sotto con nervature a maglie strette ed acute, finam. denticolate, oblanceolate od obovato-oblunghe, appena acute all'apice. Racemi ad 8-14 fi., lunghi 2-3 cm. Spine eguali o più lunghe delle fg. — *Sic. sull'Etna*.

b. brachyacantha Strobl = B. vulgaris α Guss. — Distinta dalla for. *a*. per le spine più brevi delle fg. — *Sic. nelle Nebrodi* (*Strobl*).

c. calabrica C. K. Schneider (Bull. Herb. Boiss. 1905, p. 660). — Distinta dalla for. *a*. per le fg. lanceolate, acute ad ambedue le estremità. — *Cal. al M. Pollino* (*Huter P. et R.*).

d. Boissieri (**C. K. Schneider**) (l. c.). = B. cretica Lois. (non L.) = B. aetnensis Moris. — Fg. verdi-chiare, misuranti 18-22 per 6-15 mm., quindi più rotondeggianti, con nervature come nel tipico *vulgaris*, a denti più allontanati e più brevi. Racemi a 3-4 fi., lunghi circa 20-25 mm. — *Monti di Sard. e Cors.*

DROSERACEAE

1642 (1) *Drosera rotundifolia* β **corsica** (**R. Maire in Rouy**, 1904). — Fusti fioriferi più vigorosi portanti 1-2 fg. cauline picciolate. Fi. tutti situati all'ascella di brattee fogliacee, sessili o quasi, cigliato-glandulose come le fg. — *Cors. al lago di Creno* (*R. Maire*).

1644 (3) *D. intermedia*. — *Friuli presso Cormons* (*Pospichal*) *e presso Amaro* (*Morassi*).

SAXIFRAGACEAE

1646 *Parnassia palustris*. — *Aggiungere all'area geograf.: Alger., Marocco.*

1647 (1) *Saxifraga hederacea*. — *Trapanese al M. S. Giuliano* (*Herb. Panor. ex Ponzo*).

1648 (2) *S. rotundifolia* **c. glandulosa Griseb.** — Fusto alto, a pannocchia grande, con rami moltiflori, glanduloso-pubescente. Fg. basali ottusam. crenate, le cauline inciso-dentate. — *Istria sul M. Maggiore ed Appenn. lucchese* (*ex Engler*).

for. reniformis Vis. et Sacc. (sine descr.). — *Bassanese* (*Parolini*).

1649 (3) *S. tridactylites* β *adscendens*. — Sec. Vaccari questa var. sarebbe sempre perenne.

b. Scopolii (**Vill.**). — Fusto gracile, semplice, a fg. distanti, le basali e cauline spatolato-lanceolate, intere. — *Colla forma genuina.*

c. intermedia L. Vaccari (sub S. controversa). — Differisce dal tipo della spec. pel portam. più contratto, pei rami eretti, per i peduncoli 2-3-flori, pei fi. più grossi, per la rosetta di fg. basilari più densa e per essere bienne o perenne; dalla *adscendens* genuina pel portam. più slanciato, pei rami più lunghi e più sottili e pei fi. più piccoli, a peduncoli molte volte più lunghi dei fi. e non 1-2 volte soltanto. — *Colla forma genuina nella reg. alp. e subalp. in Val d'Aosta* (*L. Vaccari*).

γ *Bellardi*. — *Monte Baldo, una volta sola* (*Goir.*).

Digitized by Google

1650 (4) *S. petraea* β **berica Béguinot** (Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 384). — Differisce dal tipo per essere glabrescente ed a fusti esili, per le fg. infer. e medie cuoriformi-orbicolari, a lobi numerosi, quasi eguali e solo il mediano un po' più sviluppato e per i petali oblungo-lanceolati, della metà circa più piccoli. — *Colli Berici nel Vicentino.*

1652 (6) *S. cernua.* — *Alpi Mar. tra Tenda e Pesio andando dalla cima Marguareis al colle del Pas a circa 2400 m.* (*Briq. et Cavillier*). — *Sec. Burnat* (*Fl. Alp. mar. III, p. 244*) *non sono più state confermate per questa spec. le indicazioni del Gr. S. Bernardo e del Sempione.*

1653 (7) *S. granulata.* — *Lungo il Ticino in territ. di Abbiategrasso* (*Cozzi*).

1656 (10) *S. sedoides* β *aphylla.* — *Sec. Engler* (*Mon. p. 199*) *la S. aphylla Ten. va riferita al tipo e quindi va tolto dall' hab. di questa var. la loc. dell' Abruzzo.*

1657 (11) *S. Seguieri.* — Meglio forse considerarla come var. della *S. androsacea;* però ha i fi. giallognoli.

1658 (12) *S. muscoides.* — *L'indicazione «Alpi Mar. sotto il Colle delle Rovine* (*Valbusa, sub S. planifolia*)» *si basa sopra un errore di determinazione* (*Burnat, Fl. Alp. mar. III, p. 251*).

α *typ.* **c. citrina (Hegets.).** — Petali giallo-citrini. — *M. Rosa* (*ex Engl.*).

1660 (14) *S. androsacea* **a. genuina.** — Fg. spatolate, intere.

b. pyrenaica (*Scop.*) = S. andros. β tridentata Gaud. (Fl. An. I, p. 536 [for. b]). — Fg. obovato-cuneate, attenuate in picciuolo, 3- o raram. 5-dentate all' apice. — *Colla forma genuina.*

c. tridens (Jan ex Engl.). — Fg. infer. e cauline obovato-cuneate, sessili, trifide all' apice, brevem. cigliate. Fusti bassi, 1-flori. Petali più grandi. — *Abr. alla Majella* (*Huet*).

1661 (15) *S. pedemontana c. cervicornis* **subfor. pulvinaris Briq.** (1901). — Pianta nana, formante dei cuscinetti emisferici. Fg. piccole. Fusti di 1-3 cm., con 1 o pochi fi. più piccoli ed a calice spesso rossastro. — *Cors. al M. Renoso a 2300-2350 m.* (*Briq.*).

1661 * S. aquatica Lap. — *Spec. propria dei Pirenei, indicata di Corsica* (*Noisette ex Engl., Mon.*), *ma forse per sbaglio con S. pedemontana.*

1662 (16) *S. exarata.* — Deve essere considerata come una var. di *S. moschata* (cfr. Burnat Fl. Alp. mar. III, p. 250). — *Appenn. tosc. al M. Beni e Sasso di Castro sopra il Covigliaio* (*Somm. in Baroni*).

α *typ.* **b. maculata Rchb.** — Petali bianchi con una macchia porporina alla base. Fg. indivise o brevem. trifide all' apice. — *Alpi al Cervino, S. Gottardo ecc.* (*ex Engler*).

β **Vetteri (Burnat).** — Portam. che ricorda la *S. pedemontana,* tanto che fu sospettata come una *S. exarata* × *pedemontana.* — *Alpi Mar. sopra Valasco di Valdieri* (*Burnat*).

1664 (18) *S. stellaris* **b. pauciflora Engl.** (1872) = S. stell. b. acaulis Rod. et Ven. (1894) (Fl. An. I, p. 537 [for. b.]). — Pianta umile, 1-2-flora. Fg. generalm. più larghe, obovato-cuneate, irsute. Cassula più grande. — *Nelle alte Alpi.*

e. glabrata Sternb. — Tutta glabra. Fg. spesso più piccole, dentate all' apice soltanto od intere. Pedicelli esilissimi. — *Colla forma genuina.*

f. hispidula Rochel. — Fg. ispido-irsute. — *Comune.*

g. obovata Engl. — Fg. obovate, attenuate alla base, un po' dentate all' apice. — *Cors. sul M. Rotondo* (*ex Engl.*).

1666 * *S. autumnalis* × *mutata.* — *Veron. sui Lessini al M. Trapola* (*Goir.*).

1667 (21) *S. bryoides* α *typ.* — *L'indicazione «Appenn. emil. all' Alpe di Succiso* (*Avetta e Casoni*)» *deve essere riferita alla var.* β *aspera* (*Bolzon in litt.*).

b. intermedia (Hegets.). — Fg. dei fusti sterili distanti, patenti; fascetti di fg. ascellari più brevi della fg. che li porta; fg. cauline piccole, brevem. cigliate. Intermedia tra le var. α e β. — *S. Gottardo, Tirolo* (*ex Engl.*).

1668 (27) *S. cuneifolia* **d. polypetala Sternb.** — Pianta più grande, a fi. polipetali. — *M. Spinale nel Trent.* (*ex Engl.*).

Digitized by Google

1672 * **S. mutata** × **aizoides** = S. Hausmanni Kern. — *Veron. sui Lessini al M. Trapola* (*Goir.*).

1673 (**27**) *S. lingulata.* — *Cal. citer. sul M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

1674 * **S. crustato** × **Hostii Engl.** — *Alpi Giulie all'alpe Jezerith* (*Engler*).

1675 (**29**) *S. Aizoon.* — Seguendo l'Engler (Mon. p. 244), crediamo meglio disporre le forme raggruppate sotto α *typica* (Fl. An. I, p. 539) nel seguente modo:

α **brevifolia Sternb., Engl.** = v. minor Koch. — Fg. basali larghe $^1/_2$-$^1/_3$ della loro lunghezza. Calici e peduncoli glabri o talora (*b. stabiana* [*Ten.*] [for. c. Fl. An. l. c.]) glanduloso-pelosi. — *La for. b. anche nel Bresciano all'Alpe di Vaja* (*Ugolini*).

β *recta* (*Lap.*) (Fl. An. l. c. [for. α *b.*]). — Fg. basali larghe $^1/_4$-$^1/_6$ della loro lunghezza, e precisam. ora (**a. robusta [Schott] Engl.** = v. major Koch) lingueformi, lunghe 2-3 cm. e larghe 3-5 mm. in pianta a rami della pannocchia 3-5-flori, ora (**b. carinthiaca [Schott]** = v. gracilis et v. elongata Engl.) spatolato-lineari, lunghe 2-2 $^1/_2$ cm. e larghe 1 $^1/_2$-2 mm. in pianta a rami della pannocchia per lo più 1-3-flori. — *Nell'area della spec.*

γ *Hostii* (var. β Fl. An. l. c.). — *Veron. sui Lessini* (*Goir.*), *A. Apuane* (*sec. Engl.*).

1675 * **S. Aizoon** × **elatior** (= S. Hostii). — *M. Serva nel Bellunese* (*Huter*).

1676 (**30**) *S. Cotyledon* **b. purpurata Gaud.** — Fusti e rami della pannocchia porporini. Petali venati di rosso. — *M. Spluga* (*ex Engl.*).

1677 (**31**) *S. media* β *porophylla.* — *Cal. occ. sul M. Serramale presso Tortora a 1287 m.* (*B. Longo*).

1677 * **S. aretioides Lap.** — *Spec. propria dei Pirenei, indicata del M. Cenisio* (*Engl. ex spec. hb. Berol.*).

1678 * *S. Rocheliana Sternb.* — *M. Baldo in Valfinestra, Valdritta e Valfonda* (*C. Mass. ex Goir.*).

1680 (**34**) *S. caesia* α *typ. b. valdensis.* — *È limitata alle Alpi del gruppo del M. Viso.*

c. luteola Nobis. — Fi. giallognoli, a petali con lembo bislungo-spatolato, a tessitura più consistente e nervature più salienti che nel tipo. — *Bellunese al M. Pelmo* (*Pampanini!*).

d. glandulosissima Engl. — Fusti, peduncoli e calici densam. coperti di peli glandulosi. — *A. Apuane al M. Forato* (*Engler ex spec. hb. Pisani*).

1680 * **S. squarroso** × **aizoides Engl.** — *Valle dell'Isonzo sopra Sotcha all'alpe Jezerith* (*Engler*).

1681 (**35**) *S. Vandellii* α **typica.** — Fg. dei fusti sterili lanceolate, rigidam. mucronate, quelle dei fusti fertili lungam. mucronate. — *M. Pavione verso Primiero ai confini col Bellun.* (*Crépin*).

β **Tombeanensis (Boiss. in Engl.).** — Fg. dei fusti sterili brevi, ovato-lanceolate, mucronulate, quelle dei fusti fertili acute. Portam. che l'avvicina a *S. diapensioides.* — *Trent. in V. di Storo a Tombea* (*Boiss.*), *Val Vestino* (*Porta*) *e M. Baldo all'Altissimo di Nago* (*Kerner*).

1682 (**36**) *S. Burseriana* **b. alpina Evers** (1896). — Corolla grande $^1/_2$ del tipo in pianta più piccola. — *Trentino* (*Evers*).

1683 (**37**) *S. purpurea All.* (1870-73) = S. retusa Gouan (1773, poster.) (Fl. An. I, p. 541) = S. imbricata Lam. (1778). (Cfr. L. Vacc. in Bull. Soc. bot. it. 1905 p. 113 e N. Giorn. bot. it. 1906, p. 79).

α **Wulfeniana (Schott)** = S. retusa Gouan = S. retusa v. glabrata L. Vacc. (1905) = S. Baumgarteni Schott = S. perporosa et scrobiculata Schur. — Fusti, peduncoli e calici completam. glabri o talora (**b. pubescens L. Vacc.** [1906]) con scarsi e brevi peluzzi non glanduliferi. Pianta generalm. (**a. acaulis L. Vacc.** [1906) acaule più raram. (**c. caulescens L. Vacc.** [1906]) con fusti alti 5-15 o raram. sino a 20 cm. — *Nelle Alpi dalla Val d'Aosta al Sempione e Valle di Ozernone nel C. Ticino; pro-*

Digitized by Google

pria dei terreni silicei [*Piren. or. Delfin. Alpi or. Rumen. Bulgar. Carpazi*] (cfr. L. Vaccari in N. Giorn. bot. it. 1906).

β **augustana L. Vacc.** (1906) = S. retusa v. august. L. Vacc. (1903) = S. retusa Lap., Bert. = S. purpurea Hayek. — Fusti in alto, peduncoli e tubo del calice fortem. peloso-glandulosi. — *Alpi Mar., Cozie, Graie e Pennine sino all' Ossola; propria dei calcescisti* [*Endemica*] (cfr. L. Vacc. l. c.).

1684 (38) *S. biflora* **b. macropetala (Kern.)** = S. Kochii Hornung. p. p. = S. biflora b. Kochii Paol. (Fl. An. I, p. 541). — *Tirolo presso Kals* (*Huter*).

1684 * **S. bifloro × Murithiana** = S. spuria Kern. (sec. L. Vaccari l. c.). — Pianta con portam. che si avvicina a *S. biflora*. Fg. spesso più grandi che in *S. oppositif.*, quasi rotonde, bruscam. ristrette alla base, talvolta molto distanti e più divaricate che nel tipo di essa. Parte super. dei fusti, peduncoli e calici fortem. ragnateloso-glandulosi. Petali molto stretti. — *Assai rara tra i parenti in Val d' Aosta a Valgrisenche e Piccolo S. Bernardo* (*A. Vaccari*).

1684 ** *S. oppositifolio × biflora*. — Se ne conoscono tre forme: una intermedia tra i due genitori (= **S. hybrida Kern.**); una più vicina a *S. biflora* (= **S. Kochii Hornung. p. p.**); una terza più vicina a *S. oppositifolia* (= **S. Huteri Ausserd. p. p.?**). — *Tir. al Brennero* (*Kerner*), *C. Ticino in Val Blenio a Scopi a circa 3000 m.* (*R. Keller*).

1685 (39) *S. oppositifolia*. — *Camp. al M. Settefrati* (*N. Terr.*). — Nella Val d' Aosta, sec. L. Vaccari (Bull. Soc. bot. it., 1903), si trovano le seguenti var.:

A Tubo del calice e peduncolo glabro; ciglia dei lobi calicini e delle fg. super. non glandulifere. — Rz. con molti rami lassi, allungati, formanti un largo cuscinetto. Fg. oblunghe, fortem. carenate, embriciate in 4 file, ma non fittam. stipate, spesso eretto-patenti od arcuate in fuori, generalm. con una fossetta terminale, ma piccola. Rami fioriferi lunghetti e ad internodi allungati. Petali larghi, toccantisi coi margini, poco più lunghi degli stami od anche (**b. macrantha L. Vacc.**) fino a due volte più lunghi.

α *typica*

B Tubo del calice e peduncolo quasi sempre coperto da piccoli peli glanduliferi; ciglia dei lobi calicini e spesso delle fg. super. terminati da glandole (= *Subsp. glandulifera L. Vacc.*).

a Portamento, forma e disposizione dei rami e delle fg. come nel tipo, ne differisce però per le fg. meno carenate ed a faccia super. canaliculata, lunghe 3-5 mm. e larghe $1^1/_2$-$2^1/_2$ mm., raram. sino a 7 per 3 mm. Rami talora (**b. pubescens L. Vacc.**) coperti da peli ragnatelosi che danno alla pianta un colore grigiastro. — *Val d' Aosta tra 2000-3550 m.* (*L. Vaccari*). — S. Rudolphiana Auct. Helv. et It.

β **Murithiana (Tissière)**

b Rami fortem. stipati, formanti dei cuscinetti piccoli e compattissimi, molto rigonfi nel mezzo. Fg. largam. obovate, piccole (lunghe 2-4 e larghe 1-$2^1/_2$ mm.), subcarenate, embriciate in 4 serie regolarissime molto marcate, così fittam. appressate da non lasciare vedere altro che l' apice fortem. ingrossato e calcificato. Rami fiorali molto raccorciati, in modo che i fi. sembrano sessili. — Petali oblunghi, piccoli, di poco superanti gli stami o raram. (**b. macrantha L. Vacc.**) molto più lunghi di essi. — *Val d' Aosta colla var. prec. ma più rara tra 2500-3559 m.; trovasi pure nelle Alpi lomb. e carniche.* γ *Rudolphiana* (*Hornsch.*) (for. b. Fl. An. I, p. 541)

c Portam. della var. *Murithiana*, ma fg. più allungate e proporzionalm. più strette e più rotonde all' apice, a carena appena accennata verso la punta, piane, leggerm. canaliculate di sopra, più molli, più rade e più lassam. disposte. Tubo calicino, peduncoli ed anche fusti superiorm. ragnateloso-glandulosi. Petali spesso più stretti e non toccantisi coi margini. — *Val d' Aosta colle prec. da 2500* (*raram. 2000*) *a 3500 m.*

δ **Huteri (Ausserd. in Kern.)**

ε *meridionalis A. Terr.* (for. c. Fl. An. l. c.).

Digitized by Google

1685 * *S. sarmentosa L. — Inselvat. presso Brescia già da molti anni (Ugolini); origin. della Cina e del Giapp.*

1689 (3) *Chrysosplenium macrocarpum. — Cal. citer. al Varco dei Salinari nel territ. d'Aquaformosa (B. Longo).*

1695 (6) *Ribes alpinum. — Appenn. lig. a Salogno (Ces.).*

1696 *Philadelphus coronarius. — Alpi novaresi in V. Anzasca (Rossi), inselvat. nelle siepi presso Avellino (Casali e Ferraris).*

CRASSULACEAE

1697 (1) *Cotyledon Umbilicus. — Rimini (Matteini ex Del Testa), Barese, comune (Palanza).*

1698 (2) *C. horizontalis. — Terramano (D'Amato).*

1698 * **C. orbiculata L.** — *Originaria del Capo di B. S.; nat. dal 1850 sul castello di Nizza (Sauvaigo).*

1700 (2) *Sempervivum hirtum b. soboliferum (Sims.)* = S. hirtum Jacq. = S. globiferum Rchb. (Cfr. Wohlfarth in Koch's Syn. ed. III).

c. **arenarium (Koch,** 1837) = S. hirtum Sternb. = S. hirtum var. β Bert. = S. Kochii Facch. (1855). — *Tir. nella Pusteria e Bellunese a Comelico nell'Alpe detta il Forame (Facch.).*

1700 * **S. debile Schott** (1852). — *Tirolo occ. nelle Giudicarie sul granito (cfr. Wohlfarth l. c.).*

1701 (3) *S. arachnoideum* β **Doellianum (C. B. Lehm.)** = S. arach. v. glabrescens Wk. — *Alpi del Tir., C. Ticino ecc.*

1701 * **S. arachnoideo × montanum Bruegg.** — *Alta Engadina al Pizzo Padella, Bernina, Spluga e S. Bernardino all'Alpe Vignone (ex Wohlfarth l. c.).*

1701 ** **S. Doelliano × montanum** = S. hybridum Bruegg. — *S. Bernardino all'Alpe Vignone e Pian-Lumbriv (ex Wohlfarth l. c.).*

1702 (4) *S. Funkii. — Alpi novaresi a Macugnaga (Ardissone).*

1703 (5) *S. montanum L., Jacq.* = S. Candollei Rouy et Cam. **for. alpestre (Lamotte).** — *Cors. al M. Rotondo, Alpi ed Appenn. (ex Rouy et Cam. Fl. de France VII, p. 140).*

for. frigidum (Lamotte). — *Piem. al M. Viso (ex Rouy. et Cam. l. c.).*

for. Huteri Hausm. (1856). — *Tirolo (cfr. Wohlfarth l. c.).*

for. minimum (Timb.) = S. pygmaeum Jeaub. et Timb. — *Piem. al M. Cenisio (ex Rouy et Cam. l. c.).*

1703 * **S. montano × arachnoideum Focke** = S. barbulatum Schott. — *Alpi ven. sul M. Rosso (Kotschy), Tir. mer.-or. (Baker), Trent. a Trafoi (Evers).*

1703 ** **S. montano × alpinum** = S. rhaeticum Bruegg. — *S. Bernardino nell'Alpe Vignone e Bernina (ex Wohlfarth l. c.).*

1704 * (6 *bis*) **S. Gaudini Christ** (1866) = S. globiferum Gaud. et Auct. pl. (non L., nec Koch) = S. grandiflorum Haw. = S. Wulfenii et S. Braunii Auct. it. p. p. — Cfr. L. Vaccari in Annali di bot. 1905, p. 21. — *Alpi occ. dalla Valle di Susa fino al Sempione (ex L. Vacc. l. c.).*

1704 ** **S. Gaudini × montanum** = S. Christii Wolf. = S. rupiculum Chenev. et Sch. (non Kern.). — *Alpi Graie e Pennine (cfr. L. Vacc. l. c.).*

1704 *** **S. Gaudini × arachnoideum** = S. Vaccarii Wilczek. — *Val d'Aosta (cfr. L. Vacc. l. c.).*

1704 **** **S. Gaudini × Funckii?** = S. Wolfianum Chenev. — *Val d'Aosta a Cogne (cfr. L. Vacc. l. c.).*

1705 * **S. Wulfeni × arachnoideum** = S. roseum Hut. et Gand. — *Valtellina a Bormio all'Alpe Musocco (Longa ex L. Vacc. l. c.).*

1705 ** **S. Wulfeni × montanum** = S. Braunii Facch. (non Koch) = S. Huteri A. Kern. = S. Theobaldi Bruegg. = S. Widderi Lehm. et Schnittsp. — *Trentino in Val di*

Digitized by Google

Fassa (*Facch. ex syn. rel.*) (*cfr. Wohlfarth l. c.*), *Valtellina a Bormio all'alpe Musocco* (*Longa ex L. Vacc. l. c.*).

1705 *** **S. Wulfeni × tectorum Dalla Torre** = S. Comollii Rota = S. globiferum Comolli = S. rhaeticum Rota. — Petali lunghi il doppio del calice, con squama nettarifera basale piccolissima, glanduliforme (nel tipo lunghi 3 volte il calice e con squama nettarifera lamellare subquadrata). — *Prealpi bergam. in Val Brembana, di Scalve e Camonica* (*Rota*).

1706 (8) *S. tectorum c. Schottii* — *Tir. a Bolzano e Merano, Trent.* (*Evers*), *Trieste al M. Spaccato ecc.*

for. affine (Lamotte). — *M. Viso* (*ex Rouy et Cam. l. c.*).

for. brachiatum (Lamotte) = S. saxosum Jord. et Fourr. — *M. Viso* (*ex Rouy et Cam. l. c.*).

for. Mettenianum (Schnittsp. et Lehm.) = S. tect. v. angustifolium Doell = S. tect. v. parviflorum Wk. — *Tir. mer. a Bolzano nella valle dell' Eisack, Bernina e Valtellina* (*ex Wohlfarth l. c.*).

for. speciosum (Lamotte) = S. rigidum Jord. et Fourr. — *M. Viso* (*ex Rouy et Cam. loc. cit.*).

1706 * *S. tectorum × arachnoideum* = S. piliferum Jord. (Fl. An. I, p. 546 [pro for. b. S. arachn.]). — *Tirolo nella Pusteria ed Alpi Mar.* (*cfr. Wohlfarth l. c. et Rouy et Cam. Fl. de France VII, p. 144*).

1706 ** **S. Metteniano × Doellianum** = S. Fontanae Bruegg. = S. Metteniano × arachnoideum Bruegg. — *Valtellina a Bormio in V. Furva sopra S. Antonio e Passo di Foscagno* (*ex Wohlfarth l. c.*).

1707 (1) *Sedum maximum* **b. corsicum Rouy et Camus** = Anacampseros Jord. et Fourr. — *Cors. a Vivario* (*Revel:*).

1713 (7) *S. nicaeense.* — *Eolie a Salina e Panaria* (*Zodda*).

1715 (9) *S. pruinatum.* — *Sec. Rouy* (*Fl. de France VII, p. 111*) *questa spec. è ben distinta da S. Forsterianum ed esclusiva del Portogallo. Anche S. Forsterianum probabilm. non trovasi in Italia, perchè scambiato con delle forme di S. rupestre.*

1716 (10) *S. alpestre.* — *Appenn. camp. al m. Pizzodetta* (*Falqui*).

1717 (11) *S. sexangulare* β *acre.* — *Elba* (*Sommier*).

1718 (12) *S. album* **e. purpurascens Goir.** (1904). — Petali porporini. — *Veron. nella Valdonega* (*Goir.*).

1720 (14) *S. dasyphyllum.* — Briquet (in Ann. Conserv. et Jard. bot. de Genève, V, 1901, p. 99) ha osservato in Corsica le seg. for. riferibili a questa spec., che così distingue (l. c. p. 101):

A Fg. e rigetti glabri.

a Sepali ottusi od ottusetti all' apice. Piante verdi-glauche o violacee, assai vischiose nell' infiorescenza. Cime scorpioidi. Petali violetti o bianchi suffusi di roseo. Stilo lungo $^1/_4$-$^1/_3$ del carpello.

1 Asse dell' infiorescenza glabro, breve. Petali bianchi suffusi di roseo, lunghi 3-4 mm. Stilo lungo circa $^1/_3$ dei carpelli, che sono verdastri. — *In Cors. sugli alti monti a 1800-2000 m.* (*Briq.*). *for. genuinum*

2 Asse dell' infiorescenza un po' peloso-glanduloso, allungato, moltifloro, rigido. Petali violetti, lunghi 5 mm. circa. Stilo lungo circa $^1/_4$ dei carpelli, che sono violacei. — *Cors. nella valle della Restonica a 800-1000 m.* (*Briq.*).

for. Burnati (Briq.)

b Sepali distintam. acuti all' apice. Pianta verde-giallastra, peloso-glandulosa e vischiosa nell' infiorescenza. Cime brevi, pauciflore, elicoidali o subscorpioidali. Petali giallo-verdastri. Stilo lungo $^1/_3$-$^1/_2$ dei carpelli. — *Cors. nella valle della Restonica a 700-1000 m.* (*Briq.*). **for. luteo-virens (Briq.) Briq.**

B Fg. e rigetti peloso-glandulosi, almeno da giovani. Il resto come nella for. *genuinum*

Digitized by Google

ma asse dell' infiorescenza e sepali peloso-glandulosi. — S. corsicum Dub. (ex Briq.). *for. glanduliferum* (*Guss.*) (Fl. An. I, p. 550 [for. α *b.*])

for. ovalifolium N. Terr. (1889). — Fusto sdraiato, ramoso. Fg. semiovate, acute, solcate di sopra, le infer. più piccole, addensate, le super. maggiori ed allontanate. Fi. più grandi. Cassule coniche, acute, rostrate, più brevi della corolla. — *Cal. al M. Pollino da 500 a 1700 m.* (*N. Terr.*).

1721 (15) *S. magellense.* — *Cal. citer. al M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

b. brutium. — *Col tipo sul M. Cozzo del Pellegrino* (*B. Longo*).

1727 (22) *S. litoreum.* — *Lamped. e Linosa* (*Ross*).

1733 (27) *S. rubens* **b. mediterraneum Rouy et Camus** = Procrassula Jord. et Fourr. — Calice a tubo glabro, con sepali ovali, cigliato-glandulosi. Petali più grandi, striati di rosso di sotto, peloso-glandulosi sulla carena. Fg. bislungo-ellittiche. — *Cors. presso Bastia* (*Gillot*).

1734 (28) *S. caespitosum.* — *In Tosc. anche presso Firenze a Fiesole e Montebuoni* (*cfr. Baroni*), *Camp. nel monte sopra Pescosolido* (*N. Terr.*), *Basil. presso Melfi* (*N. Terr.*) *ed Elba* (*Somm.*).

1734 * (28 *bis*) **S. Sommierianum Palanza in Jatta.** — Affine al *S. caespitosum* dal quale differisce pel portam. gracile, le fg. assai più piccole e distanti, i fi. piccoli, peduncolati, in racemo semplice e lasso, le lacinie calicine ovate, ottuse ecc. — *Ruvo di Puglia nel Parco del Conte* (*Palanza*).

1736 *Bulliarda Vaillantii.* — *Puglie a Monopoli e Polignano* (*Guss. pl. rar.*).

ROSACEAE

1740 (3) *Prunus Armeniaca* β **dasycarpa (Ehrh.)** = Armeniaca vulg. v. das. Pers. = A. das. Ser. in DC. = A. atropurpurea Lois. = A. nigra Desf. — Fg. ovato-acuminate, doppiam. seghettate. Fi. pedicellati, a pedicelli filiformi. Frutto globoso, peloso, nero. — *Coltivasi.*

1742 (5) *P. Cocomilia* β *brutia* **b. oblonga B. Longo** (1904). — Drupa ovata, coll' apice ottuso o fornito di una piccola punta appena accennata (nel tipo la drupa è ovata coll'apice depresso). — *Cal. occ. a Mormanno e Morano Calabro nei luoghi selvatici per lo più pietrosi della reg. submont. e mont.* (*B. Longo*).

1747 (10) *P. avium.* — *Elba* (*Marcucci*).

1748 (11) *P. Cerasus* γ *pumila* **b. microphylla Goir.** (sub Pr. Chamaecer.). — Fg. 2-3 volte più piccole. Fusto prostrato, ramosissimo. — *Veron. alla Cola* (*Goir.*).

1749 (12) *P. Mahaleb.* — *Colli di Reggio-Em. ad Albinea* (*Samoggia ex Casali*).

1750 (13) *P. Padus* **b. petraeus Tausch.** — Fg. più consistenti e più glabre. Racemi quasi eretti. — *C. Ticino in Val Bedretto* (*Rikli*).

1755 (3) *Spiraea lancifolia.* — Sec. Pampanini (N. Giorn. bot. it. 1905, p. 180) i caratteri differenziali delle due var. α e β di questa spec. debbono essere così rettificati:

α *typica.* — Pianta cenerino-pubescente, a rami gracili, filiformi, decombenti. Fg. lanceolate (circa 3 volte più lunghe che larghe) o lanceolato-ovate, raram. ovate od anche (**b. angustifolia Pamp.**) lanceolato-lineari, nella metà super. seghettate, più raram. (**c. integrifolia Pamp.**) più ottuse ed intere od ottusam. denticolate, con nervi laterali prominenti di sotto e convergenti all' apice della fg. Follicoli irsuto-pubescenti lungo la sutura. — *Alpi or. dal Friuli al Vicentino; le for. b. e c. nel Trevigiano* (*Pampan.*).

β *decumbens.* — Pianta glabra in ogni parte, a rami più robusti e spesso eretti. Fg. ovato-lanceolate, acutam. dentate su tutto il margine o nella metà super. soltanto, a nervi laterali poco visibili di sotto, obliqui. Follicoli glabri. — *Nelle Alpi carniche soltanto* (*cfr. Pampan. l. c., p. 39*).

Digitized by Google

1758 (6) *S. filipendula* **b. pubescens (DC.)** — Petali bianchi, spesso rossigni all'esterno. — *Veron. al Bosco Mantico.*

1759 (7) *S. ulmaria* **d. quinqueloba (Baumg.).** — Fg. a segmenti laterali largam. 3-lobati, il terminale profondam. 5-lobato. — *Nelle Alpi ecc.*

1761 *Dryas octopetala.* — *Basil. al M. Arioso nel bosco* (*Giordano*).

1762 (1) *Geum rivale* **b. hirsutum N. Terr.** (1878). — Fusti e fg. densam. irsuti. — *Camp. al Matese in Vallecupa* (*N. Terr.*).

c. humile Goir. — Pianta ridotta in ogni parte. — *M. Baldo.*

1763 (2) *G. urbanum α typ.* **a. platylobum Rouy et Cam.** — Fg. a segmenti largam. lanceolati o subellittici.

b. stenolobum Rouy et Cam. – Fg. a segmenti più strettam. lanceolati, il terminale più piccolo che in a. e più attenuato alle due estremità. — *Nell'area della spec.*

β **australe Guss.** = G. intermedium Guss. (non Alior.). — Pianta maggiorm. pelosa per peli patenti, a fg. più consistenti e più piccole ed acheni con resta pelosa anche nell'articolo super. — *Monti della Sic., ove trovasi solo questa var.*

1764 (3) *G. molle.* — *Cal. alla Sila. a Tempone Morello a 1650 m.* (*Adr. Fiori.*).

1765 * *G. montano* × *rivale.* — *Gr. S. Bernardo* (*Muret, Favre*).

1766 (5) *G. montanum* **b. nanum Gaud.** — Fusto appena più lungo delle fg., queste a segmenti avvicinati, il terminale più piccolo che nel tipo. — *Reg. alp. nelle Alpi e Cors.*

c. ascapum Goir. (1904). — Fusto nullo. Fg. brevi, in rosette densissime. — *M. Baldo.*

1766 * **G. montano × reptans** = G. rhaeticum Bruegg. — *M. Rosa* (*Bruegg.*).

1767 (6) *G. reptans* **b. villosum Bruegg.** — Pianta interam. villoso-glandulosa. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

1769 (2) *Potentilla alba* **b. obovata Th. Wolf** (1903). — Foglioline largam. obovate. Fusti e picciuoli con pelosità patente. — *Trentino in Val di Non e Val Vestino* (*ex Wolf*).

c. luxurians Goir. (1904). — Rd. grossa. Fg. a picciuoli villosissimi, lunghi 15-30 cm., con foglioline misuranti $6^1/_2$ per 2 cm. — *Veron. alle falde dei Lessini* (*Goir.*).

d. reducta Vidal ap. Rouy et Fouc. — Pianta nana. — *Veron.* (*Goir.*) *ecc.*

e. virens Ugolini (1904). — Fg. radicali più o meno verdi di sotto, poco o punto sericee. — *Bresciano alla Croce di Vallio a 550 m.* (*Ugol.*).

1771 (4) *P. nitida* **b. multidentata Ser.** — Fg. radicali a foglioline con 5-7 denti all'apice. — *Nell'area della spec.*

c. edentata Ser. in DC. — Foglioline intere o brevem. 2-dentate all'apice. — *Nell'area della spec.*

d. reducta Goir. (1904). — Pianta nana, ridotta in ogni parte — *Nell'area della spec.*

e. albiflora Goir. (1904). — Fi. bianchi. — *M. Baldo* (*Pollini*).

1772 (5) *P. apennina.* — *Trovasi anche nell'Erzegovina ed in Serbia.*

1774 (7) *P. crassinervia* **b. glabriuscula Sal.-Marschl.** — Pianta meno vellutata, non vischiosa, verde-gaia, alta 15-25 cm. — *Cors. ai monti Renoso ed Incudine* (*Kralik in hb. Rouy*).

c. glauca Mutel = v. viscosa Rouy et Cam. — Pianta vischiosa, fortem. vellutata, verde-scura, nana o quasi. — *Cors. ai monti d'Oro e Rotondo* (*Kralik in hb. Rouy*).

1775 (8) *P. grammopetala.* — *Anche nelle Alpi Graie or.* (*cfr. L. Vacc.*).

1777 (10) *P. caulescens.* — *Piceno sul M. Sibilla* (*Paol. e Card.*).

α **anadena Burn. et Briq.** — *Laz. nei M. Simbruini* (*ex Bég.*).

b. Kristoflana (Zimm., 1884) = P. caul. v. laria R. Beyer (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 692). — Pianta più robusta (alta sino a 3 dm.). Fg. basali lungam. picciolate, per lo più con 7 foglioline lanceolato-oblunghe, con 6-12 denti acuti per lato, quasi glabre di sotto. — *Attorno al Lago di Como* (*Beyer*).

β *petiolulosa Ser.* (1823) (Fl. An. I, p. 569 [for. c.]) = P. Huteri Porta (ex Goir.).

b. viscosa Huter (*sub P. caul.*) (Fl. An. l. c. [for. *b.*]) = P. caul. for. viscida Gelmi.

Digitized by Google

γ **nebrodensis** (**Strobl**, 1903) = P. caulescens Presl, Guss. = P. caul. b. petiolulosa Guss. (non Ser.). — Differisce per le foglioline più larghe bislungo- od ellittico-cuneate, quasi glabre, verdi-scure, maggiorm. seghettate e pei fi. più grandi. — *Sic. alle Madonie.*

var. nivalis (**Lap.**) **Ser.** = P. valderia Vill., non L. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

1778 (11) *P. Sibbaldi.* — *Cors. al Capo Berdato* (*Audigier ex Fouc.*), *M. Cinto a 2700 m. e M. Rotondo a 2600 m.* (*Briq.*).

1779 (12) *P. erecta* α *typ.* c. **minor Goir.** (1904) = Tormentilla recta a. alp. Schur. (1866) (non P. Torment. β alp. Ser. in DC. [1825]) = P. Torment. v. minor Sauter (1889) = P. erecta f. pusilla Favr. (1890). — Pianta ridotta, alta 2-10 dm. — *Nei pascoli alp. ecc.*

for. daonensis (**Evers**, Verh. zool.-bot. Ges. in Wien, 1896). — *Trent. in Val Daone* (*Evers*).

for. divergens (**Nym.**) = Tormentilla div. Rchb. = P. dacica Zimm. — *Veron. nella valle di Caprino* (*Goir.*).

for. reducta (**Rouy et Cam.**). — *Cors. al lago di Melo sopra Corte* (*Burnouf in hb. Rouy*).

for. sciaphila (**Zimm.**). — *Alpi mer. dalla Svizz. alla Carniola* (*ex Wolf in Asch. et Graeb.*), *C. Ticino ad Olivone* (*R. Keller*), *Veron.* (*Goir.*).

β *procumbens* **b. Salisii** (**Bor.**, 1863) = P. nemoralis Salis (non Neck) = Torment. reptans β Bert. (1842). — Pianta di 3-8 cm., gracile, a foglioline obovate od ellittiche, piccole, a stipole piccole, lanceolate, intiere, peduncoli lunghi come la fg. o meno e fi. più piccoli. — *Alti monti della Corsica.*

1780 (13) *P. reptans* α *typ.* **for. microphylla Tratt.** (**Zimm.**). — *C. Ticino a Brissago* (*Chenev.*), *Veron.* (*Goir.*) *ecc.*

for. glabrata Rouy et Cam. = P. rept. v. glabra Méline in hb. Rouy (non Koch). — *Veron.* (*Goir.*).

for. lanata Lge. (**Zimm.**). — *It. pen. e Sic.* (*ex Wolf in Asch. et Graeb.*).

for. sericea Bréb. — *Veron.* (*Goir.*) *ecc.*

β *italica.* — Sec. Béguinot i caratteri della pubescenza sericea e del colore verde-chiaro delle fg. sarebbero i più notevoli per distinguerla dal tipo; invece gli stoloni non radicanti ai nodi si osserverebbero anche in esemplari tipici per gli altri caratteri. — *Lazio* (*ex Béguinot*); *a questa var., come fu da noi* (*Fl. An. I, p. 570*) *descritta ed intesa* (*cioè come forma non ibrida*), *ci pare sia da riferirsi come sinonimo la P. Mandoni Fouc.* (*Bull. soc. bot. France 1900, p. 90, t. 4*), *raccolta in Corsica al Pigno* (*Mand. e Fouc.*) *ed a Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*).

1780 * *P. erecta* × *reptans* = P. ascendens Gremli — *Bresciano presso Lograto nella Lama la Bissa* (*Ugolini*).

1780 ** *P. mixta Nolte* **v. corsica Fouc. et Sim.** (Trois sem. herb. Cors., p. 178 [1898]). — *Cors. nella bassa valle della Restonica* (*Fouc. et Sim.*) *e nella foresta di Vizzavona* (*Mand. e Fouc.*).

1782 * **P. niveo × salisburgensis** = P. grayana Wilcz. et Siegf. — *Val d'Aosta in Valsavarenche al colle di Lauzon* (*Wilczek*).

1783 (16) *P. grandiflora* **for. minor Venetz in Gaud.** — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. cinereo-sericea Schmidely (1899). — *Piem.* (*ex Wolf in Asch. et Graeb.*).

1783 * **P. grandifloro × frigida Siegfr.** = P. valesiaca E. Huet — *Piccolo S. Bernardo* (*L. Vacc.*).

1783 ** **P. grandifloro × salisburgensis Siegfr.** = P. rhaetica Bruegg. — *Gr. S. Bernardo* (*Wilczek*), *C. Ticino all'Alpe d'Efra* (*Chenev.*).

1784 * **P. baldensis × cinerea Zimm.** = P. bellunensis Huter et Porta = P. Kerneri Huter et Porta (non Borb.) = P. villosa × arenaria Asch. et Graeb. — *M. Serva nel Bellunese* (*Huter in Kern.*).

Digitized by Google

1784 ** **P. incano** × **verna Asch.** = P. subcinerea et subarenaria Borb. = P. verna × cinerea Zimm. = P. Tabernaemontani × arenaria Asch. et Graeb. — *Veron.* (*Goir.*).

1785 (18) *P. aurea b. minor Lehm.* (1856) = P. Halleri γ min. Ser. in DC. (1825) = v. alpina Wk. (1863) = P. alp. Zimm. (1884), Dalla Torre (Fl. An. I, p. 572).

c. **latifolia Ser.** — Pianta più grande (15-18 cm.), a foglioline più larghe, obovate, a 5-7 denti più grandi. — *Colla specie.*

1785 * **P. aureo** × **salisburgensis Rouy et Cam.** = P. aureo × alpestris Siegfr. = P. Huteri Siegfr. = P. villoso × aurea Asch. et Graeb. — *C. Ticino all'Alpe Barone e Cima di Cagnone* (*Chenev.*).

1785 ** **P. salisburgensi** × **aurea** = P. Trefferii Siegfr. = P. alpestri × aurea Siegfr. — *Aosta* (*L. Vacc.*), *presso Trento* (*Gelmi*).

1786 (19) *P. verna α Tabernaem. b. glandulifera* (*Krasan*). — Sotto questo nome sono state riunite diverse forme (cfr. Asch. et Graeb. Syn., VI, p. 815), per la maggior parte però da riferirsi al var. *Gaudini.*

c. longifolia Th. Wolf (*non Borb.*) (Fl. An. I, p. 572) = P. verna v. longifrons Focke.

for. aestiva Hall. f. — *Veron.* (*Goir.*).

for. salassorum Beyer. — *Val d'Aosta in Valgrisenche* (*Beyer*).

for. septenata Bouvier. — *Val d'Aosta a l'ré-Saint-Didier* (*Bouvier*).

for. subopaca (Zimm.). — *Veron. sui Lessini presso Cerro* (*Goir.*).

γ *Gaudini* **for. benacensis (Zimm.).** — *Attorno al Lago di Garda.*

for. bolzanensis (Zimm.) = P. vindobonensis Zimm. = P. oenipontana Murr. = P. ossulana Siegfr. hb. = P. bormiensis Cornaz hb. — *In tutta la catena delle Alpi* (*ex Asch. et Graeb. Syn.*).

subfor. macrantha Saut. (1889) = P. bolz. for. grandiflora Wolf = P. mezzocoronae Evers. — *Trent.* (*Evers*) *ecc.*

subfor. micrantha Saut. (1889) = P. bolz. for. parviflora Wolf = P. Elisae Goir. hb. — *Veron.* (*Goir.*).

for. grisancensis Beyer. — *Val d'Aosta in Valgrisenche ad Arvier* (*Beyer*).

for. longifolia (Zimm.) = P. verna v. longifol. Borb. in Zimm. = P. longifrons Borb. — *Veron.* (*Goir.*) *e qua e là in tutta la catena delle Alpi* (*ex Asch. et Graeb. Syn.*).

ε *salisburgensis.* — *Cal. al m. Pollino verso la cima* (*Adr. Fiori*).

for. gracilior Nob. = P. alpestris β gracil. Koch (1837) = P. villosa v. gracil. Focke (1892). — *Nell'area della var.*

for. macropetala Nob. = P. villosa for. macropet. Saut. (1889) = P. alpestris for. grandiflora Wolf (1903). — *Tir. mer. sullo Schlern* (*Sauter*).

for. tridentina (Gelmi, in N. Giorn. bot. It. 1898, p. 307). — *M. Vasone di Trento a circa 1500 m.* (*Gelmi*).

subfor. dumetorum, bordalensis et caufedinensis Evers. — *Trentino* (*Evers.*).

for. Verloti (Jord.). — *Val d'Aosta in Valgrisenche* (*Beyer*).

ζ *frigida.* — *Cors. al M. Renoso* (*Rotgès ex Fouc.*); *ma il Rouy fa delle riserve su tale indicazione.*

Sono ancora da riferirsi a *P. verna* (sensu lato) le seguenti entità:

P. bolzanensis × **glandulifera** = P. verna v. Gelmiana Siegfr. — *Trento* (*Gelmi*).

P. gardae Evers. — *M. Baldo e Val di Ledro nel Trent.* (*Evers*).

P. Gaudini × **longifrons R. Keller** (Bull. herb. Boiss. 1903, p. 465). — *C. Ticino ad Olivone* (*R. Keller*).

for. superlongifrons R. Keller (l. c.) — *C. Ticino tra Aquila e S. Valentino* (*R. Keller*).

P. glandulifero × **Gaudini.** — *C. Ticino ad Olivone* (*R. Keller*).

P. laresciae R. Keller (Bull. herb. Boiss. 1903, p. 463). — *C. Ticino in val Blenio a Pt. di Larescia a 2200 m.* (*R. Keller*).

P. opaco × **Gaudini Wolf** = P. rubens × Gaudini Asch. et Graeb. — *Presso Trento* (*Murr.*).

Digitized by Google

P. salisburgensi × Gaudini = P. alpestris × Gaudini Th. Wolf = P. Schroeteri Siegf. — *C. Ticino sul M. Caslano* (*Chenev.*).

P. minimo × salisburgensis = P. amthoris Huter = P. salisburgensi × minima Chenev. = P. villoso × dubia Zimm. = P. alpestri × minima Bruegg. = P. subternata Bruegg. — *C. Ticino a Casaccia in Val S. Maria ed al colle di Lukmanier* (*Chenev.*), *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

P. tridentino × glandulifera = P. vasonis Evers. — *Trento sul M. Vasone* (*Gelmi*).

1786 * **P. frigido × nivea Gremli** = P. Wolfii Siegfr. = P. niveo × frigida Asch. et Graebn. — *Val d'Aosta in val di Cogne* (*Favre e Wolf*).

1786 ** **P. frigido × multifida** = P. ambigua Gaud. = P. geranioides Thomas. — *Val d'Aosta tra Breuil e St.-Théodule, ma sul versante Svizzero* (*Thomas in Gaud.*); *da cercarsi nel territorio ital.* (*L. Vacc.*).

1786 *** **P. minimo × aurea** = P. semiternata Huter et Porta = P. pulchella et subnivalis Bruegg. = P. dubio × aurea Asch. et Graeb. — *Val d'Aosta a Gressoney al col di Bettaforca* (*L. Vacc.*).

1787 (20) *P. heptaphylla* α *Nestleriana* **for. parviflora** (**Gaud.**). — *Val d'Aosta in val di Cogne a Chavanis* (*Wilczek*).

1788 (21) *P. hirta* α *typ. d. laeta* **subfor. ophiolithica Levier in Zimm.** (1889). — Pianta molto piccola. — *Italia: Tosc.?* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, 1, p. 769).

for. diversifolia Ser. in DC., Lehm. = P. hirta β Bert. — *Mura di Padova e Viterbese* (*ex Bert.*). (Cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 768).

for. ligustica (ligurica) (**Siegfr.**) = P. pallida × laeta Siegfr. — *Lig. a Portofino e presso Verona* (*Siegfr.*) *e Laz. tra Furbara e S. Severa* (*Chiov.*).

for. pinnatifida Griseb. (1843). — *Sicilia* (*ex Asch. et Graeb. Syn. l. c.*).

β *recta b. obscura.* — *Tosc. in val di Lima alla Villa* (*Duthie*).

1789 (22) *P. De-Tommasii* **b. cinerea Bég.** — Fg. *cenerino-sericee* di sotto, alla fine denudate, glabre di sopra o con peli radi. Pianta tutta *cenerino-villosa* o glabra. — *M. Laziali e Simbruini* (*ex Bég.*).

1789 * *P. incrassata* = **P. pedata × Thomasii ? Chiovenda** (Malpighia 1898, p. 419). — *Laz. al m. Autore sopra Subiaco* (*Chiov.*).

1790 (23) *P. argentea* α *typ. d. dissecta Wallr.* (1822), *Ser. in DC.* (1825) (*Zimm.* [*1884*]) (*Fl. An. I, p. 574*).

for. argentata (**Jord.**). — *Nell'area della spec.*

for. Cornazi (**Buser ex Zimm.**). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

for. decumbens (**Jord.**). — *Veronese* (*Goir.*).

for. perincisa (**Zimm.**). — *Verona* (*Goir.*) *ecc.*

for. pseudo-argentea (**Blocki**). — *Verona* (*Goir.*).

for. septemsecta Mey. (**Zimm.**) = P. arg. v. septenata Lehm. — *Veronese* (*Goir.*).

for. tenuiloba (**Jord.**). — *C. Ticino a Buzza di Biasca* (*R. Keller*).

β *calabra* **a. discolor Strobl** (1886). — Fg. verdi-tomentose di sopra ed argentino-tomentose di sotto.

b. concolor Strobl (1886). — Fg. argentino-tomentose in ambedue le pag. — *Colla for. genuina.*

1790 * *P. argenteo × verna.* – Al ciclo di entità raggruppate sotto questo ibrido, di cui alcune certam. ibride ed altre forse non ibride, appartengono ancora:

P. argenteo × Wiemanniana Wolf. — *Tir. mer. e Trent.* (*ex Asch. et Graeb.*).

P. decipiens Jord. = P. inaperta Jord. = P. Petryana Blocki. — *Dintorni di Verona* (*Goir.*).

P. Goirani Zimm. = P. argenteo × Johanniniana Wolf. — *Dintorni di Verona* (*Goir.*).

P. Hausmanni Uechtritz — *Tir. mer.* (*ex Asch. et Graeb.*).

P. Johanniniana Goir. — *Trent.* (*Gelmi*), *Verona, val d'Adige fra Domegliara e la Chiusa ed a Custoza* (*Goir.*).

P. Schultzii P. J. Mueller. — *Verona* (*Goir.*).

Digitized by Google

P. thyrsiflora Huelsen = P. Wiemanniana v. grandiflora Blocki. — *Tir. mer.* (*Wolf*), *dintorni di Verona* (*Goir.*).

1790 ** *P. hirto* × *argentea* = P. inclinata Vill. — *Marche a Piamperduto* (*Papl. e Card.*). — A questo gruppo, racchiudente delle entità in parte ibride ed in parte anche (sec. alcuni) non ibride, appartengono ancora:

P. alpicola De la Soie. — *C. Ticino in Val di Vergeletto ed a Ronco d'Ascona* (*f. hirsutior*) (*Chenev.*).

P. Sadleri Rchb. — *Dintorni di Verona* (*Porta*) *e sul lago di Garda* (*Rigo*).

P. cana Jord. — *Dintorni di Verona* (*Goir.*).

1791 (24) *P. anserina.* — *Lazio* (*Maratti, Solla*).

b. nuda Gaud. (1828) = v. viridis Koch (1835). — Fg. verdi in ambedue le pag., leggerm. pelose od anche glabre di sopra. — *Qua e là colla specie.*

c. sericea Hayne (1816) = v. concolor Wallr. (1822) = v. holosericea Gaud. (1828) = P. sericea Zimm. (non L.) = P. concolor Zimm. — Fg. egualm. bianco-sericee in ambedue le pag. Calice più lungam. peloso. — *Verona* (*Goir.*) *ecc.*

1792 (25) *P. supina.* — *Lazio al lago di Canterno* (*Béguinot!*).

1793 (26) *P. rupestris* **d. Beniczkyi (Friv.,** 1836) = P. rup. β grandiflora Heuff. ap. Zimm. (1884). — Pianta alta per lo più 10-15 cm. Fg. spesso con 3 sole foglioline, queste lunghe 13 mm., acutam. e profondam. seghettate. Fi. grandi, a petali lunghi 11 mm. e larghi 10. — *Tir. sul M. Ritten e C. Ticino* (*ex Wolf in Asch. et Graeb. Syn.*).

1795 (28) *P. multifida.* — *Val d'Aosta a Cogne al Crêt e tra Liconi e Taverone* (*Favre et Wolf*).

1796 (29) *P. pensilvanica* β *sanguisorbifolia* (*Favre*). — La specie fu prima battezzata da Favre (1882) che da Wolf. — *Trovasi solo in Val di Cogne a la Barma Peleusa e ad Arvier tra la Ravoire sopra Liverogne e Montmayeur* (*cfr. L. Vacc.*).

1798 (1) *Fragaria vesca.* — *Elba* (*Marcucci, Somm.*).

β *sativa L.* (1753) = F. vesca v. pratensis L. (1762) = F. moschata Duch. (1766) = F. elatior Ehrh. (1792) (Fl. An. I, p. 577). — *Tosc. a Casal Guidi presso Pistoia e M. Amiata* (*cfr. Baroni*).

γ *viridis* (*Duch.*, 1766) = F. collina Ehrh. (1792) (Fl. An. l. c.).

1798 * F. chiloensis (L.) Ehrh. = F. vesca v. chiloensis L. — *Origin. dell'Amer. mer.; spesso colt. nei giardini pei suoi grossi frutti.*

1798 ** F. virginiana Duch. — *Origin. dell'Amer. sett.; colt. talora nei giardini.*

1798 * *F. chiloensis* × *virginiana Focke* = F. grandiflora Ehrh. (Fl. An. I, p. 577 [vesca γ]) = F. calycina Mill. = F. chilensis β ananassa Ser. in DC. — *Colt.*

1801 (2) *Rubus Idaeus* **a. inermis G. Br.** = v. levis Bauch. Pianta inerme. — **b. echinatus G. Br.** Pianta densam. spinosa. — **c. denudatus Schimp.** = f. viridis Doell. Pianta quasi glabra, a fg. verdi di sotto. — **d. obtusifolius (W.)** = v. anomalus Arrhen. = R. Leesii Bab. For. anomala colle fg. dei rami fioriferi e le infer. dei polloni semplici, reniformi e frutti per lo più sterili. — *Tutte nel Veron.* (*Goir.*).

1801 * R. Idaeus × caesius G. F. W. Mey. — *C. Ticino presso Olivone* (*R. Keller*).

1802 (3) *R. fruticosus* α *ulmifol.* **a. rusticanus (Merc.)** = R. dalmaticus et fruticosus Guss. (ex Strobl). — *In tutta l'Italia.*

for. myrianthus (Freyn). — *Istria presso Rovigno* (*Freyn.*).

ε *robustus* (*P. J. Mueller*, 1859) = R. pubescens Burnat, non Weihe (ex Focke). — Fi. bianchi od anche (*b. macrostemon* [*Focke*] [Fl. An. I, p. 579 (var. ε)]) rosei e generalm. più condensati. — *La for. b. anche nel Veron.* (*Goir.*) *e Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

ζ *thyrsoideus c. Caldesianus.* — *C. Ticino e Piem.* (*ex Focke in Asch. et Graeb.*).

subfor. laciniosus Focke (1902). — *Piem. a Pinerolo* (*Focke in Asch. et Graeb.*).

for. phyllostachys (P. J. Muell.). — *Italia* (*ex Focke in Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 489*).

θ *Radula.* — *Piccolo S. Bernardo* (*L. Vacc.*).

Digitized by Google

ι *incanescens*. — A questa var. vanno riferiti come sinonimi: *R. maritimus DNtrs.* (Fl. An. I, p. 579 [var. α *d.*]), *R. numidicus Focke* e *R. atlanticus Pomel* (ex Focke in Asch. et Graeb.). — *Lig. tra Bracco e Sestri Levante, Portofino, Paraggi, Sestri Ponente, distretto di S. Remo e Nizz.* (*ex Burnat Fl. Alp. Mar. III, p. 14-15*).

ι′ **vagus** (**Focke**, in Burnat Fl. Alp. Mar. III, p. 11, 1899), *a.* **insubricus Focke** *l. c.* — *Attorno al lago Maggiore* (*Focke*).

b. **pesianus** (**Gremli hb.**) **Focke** *l. c.* — *Alpi Mar. in Val Pesio* (*Gremli*) *e presso S. Bartolomeo, intorno a Bajardo e bacino della Nervia* (*Bicknell*).

c. **brigianorum** (**Gremli hb.**) **Focke** *l. c.* — *Alpi Mar. nella foresta di Sanson presso la Briga* (*Burnat*).

κ *tomentosus* **d. dissectus** (**Ten.**). — Differisce dalla forma genuina per le foglioline verdi-pubescenti di sopra, argentino-biancastre di sotto, profondam. bidentato-incise, a denti acuminati, le laterali lobate sul lato esterno. — *Abr. a Cappadocia e Majella, Avellinese al M. Terminio e Gargano* (*ex Ten.*).

for. setoso-glandulosus Wirtg. — *Vallombrosa verso il Lago* (*Levier fide Favrat fil.*).

for. siculus (**Presl**) = R. toment. β hypoleucus Guss. = R. australis Kern. (cfr. Strobl Fl. d. Etna in Oest. bot. Zeitschr. 1886, p. 279). — *Sic.*

μ *brachybotrys*. — *Veronese* (*Goir.*).

ν *caesius b. acheruntinus*, **subfor. hypoleucus Strobl** (l. c.) = R. caesius et acheruntinus Guss. (ex Strobl.). — *Sicilia.*

for. brutius N. Terr. (1889). — Fg. più piccole, subromboideo-ovate, ottuse. Fi. 3-4 in corimbo. Sepali brevem. acuminati. Drupeole 3-4, ovate, apiculate. — *Cal. al M. Pollino alla Grotta della Manca a 1282 m.* (*N. Terr.*).

ο *suberectus*. — *Veronese* (*Goir.*), *Alpi Mar. in Val Pesio* (*Burnat*).

π′ **nitidus** (**Weihe et Nees**). — *Tir. mer. a Salorno* (*Sauter*).

ρ *sulcatus*. — *M. Baldo* (*Goir.*), *Val d'Aosta* (L. *Vacc.*), *Alpi Mar. nella Valle dell'Ellero e Val Pesio* (*Burnat*).

τ *glandulosus* (*Bell.*, 1791) = R. hirtus W. et K. (1805). — Come ha dimostrato il Burnat (Fl. Alp. Mar. III, p. 13), la pianta del Bellardi descritta delle Alpi Mar. è il *R. hirtus W. et K.* e non il *R. Bellardi Weihe et Nees* il quale manca a quel distretto. Essendo però il nome del Bellardi anteriore, deve avere la preferenza.

c. simplicifolius Vis. et Sacc. — Fg. super. affatto semplici. — *Vicentino sul M. Portule* (*Spranzi ex Vis. et Sacc.*).

for. Kaltenbachii (**Metsch**). — *Tir. mer.* (*ex Focke*).

for. cercophyllus (**Focke**, in Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 622 [1902]). — *Alpi Cozie ad occ. di Torino* (*Rostan*).

υ *Guentheri b. chlorostachys* (*P. J. Muell.*, 1861) = R. brachyandrus Gremli (1870) (Fl. An. I, p. 581 [for. b.]). — *Tir. mer. e probabilm. nelle Alpi Cozie* (*ex Focke*).

ϑ *saltuum*. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

var. carpinetorum (**Freyn**) = R. villicaulis β trifoliolatus Freyn. — *Istria.*

var. gorizianus (**Kern.**) = R. sulcato × rusticanus. — *Presso Gorizia.*

var. hypoleucos (**Lefèvre et P. J. Muell.**, 1859) = R. adscitus Genev. = R. micans Quest. — *Una for. a fg. verdi di sotto presso Como* (*Adlerz ex Focke*).

var. Lejeunei (**Weihe et Nees**, 1825). — *Alpi Cozie* (*ex Focke in Asch. et Graeb.*).

b. napaeus (**Focke**, in Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 543 [1902]). — *C. Ticino a Lugano e Luino* (*ex Focke*).

c. euprepes Focke (Abh. N. V. Bremen XIV, p. 75 [1897] et in Asch. et Graeb. l. c.). — *Sopra Pegli in Lig. Giu. Lugl.* (*Focke*).

var. Maassii b. clathrophilus Focke in Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 478 (1902) = R. vulgaris b. clathr. Sudre (1900). — *Presso Luino sul Lago Maggiore.*

var. Questierii (**Lefèvre**, 1859). — *Piem.* (*Rostan*) (cfr. Focke in Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 526).

Oss. Dall'Evers (Verh. zool.-bot. Ges. in Wien, 1896) sono ancora descritte le seg.

Digitized by Google

spec. da riferirsi a *R. fruticosus* sensu lato: **R. brentonicus** = R. superdiscolor × tomentosus? (*M. Baldo sopra Brentonico*). — **R. bruginoënsis** = R. tomentosus-glaber × dalmatinus? (*Trent. a m. Brugino*). — **R. cognolensis** = R. tomentosus × discolor? (*Trento presso Cognola*). — **R. decumbens** (*M. Baldo presso S. Giacomo*). — **R. loppiensis** (*Trent. a Mori in Val Loppio*). — **R. maranzae** = R. caesio × sulcatus? (*Trento*). — **R. rusticano × caesius** (*Trent. a Martignano*). — **R. tomentosus-glaber × caesius** (*Trentino*). — **R. tridentinus** = R. rusticano × discolor? (*Trento*). — **R. Vestii × caesius** = R. molveno Evers. hb. (*Trentino*). — **R. vezzanensis** (*Trento tra Vezzano e Terlago*).

1802 * *R. caesio × ulmifolius. — Veron.* (*Goir.*), *Firenze alle Cascine ed a Scandicci* (*Somm. fide Focke*).

1802 ** *R. caesio × tomentosus. — Firenze all'Incontro* (*Somm. fide Focke*).

1802 *** *R. tomentoso × ulmifolius. — M. Baldo* (*Goir.*), *presso Firenze agli Scopeti* (*Somm. fide Favrat fil.*).

1803 (l) *Agrimonia Eupatoria α typ.* **b. minor Koch hb.** ex Asch. et Graeb. — Pianta piccola, a fg. addensate in rosetta alla base. Infiorescenza povera. — *Nelle stazioni calde.*

c. **humilis (Wallr.).** — Pianta alta 10-15 cm., a fg. fortem. pelose. Infiorescenza povera. Fi. e frutti piccoli. — *Nei luoghi secchi.*

1806 (l) *Alchemilla vulgaris.* — Burnat (Fl. Alp. mar. III, p. 137-156) dà per le entità riferibili alla var. α di questa spec. esistenti nelle Alpi Mar. il seguente prospetto analitico che crediamo utile riportare:

α **alpestris** = A. vulgaris Burnat (l. c. p. 146-156).

A Fusti e picciuoli affatto glabri.

a Pianta bassa, a fusti numerosi e divaricati. Lobi delle fg. super. semi obovati o semi-ellittici. — *Alpi occ., Veron.* (*Goir.*). **a. demissa (Buser,** 1894)

b Pianta grande, vigorosa. Fg. coriacee, spesse, a lobi semi circolari o parabolico-arrotondati. — *In tutte le Alpi.* — A. inconcinna Buser (1894). **b. coriacea (Buser,** 1892)

B Fusti (almeno alla base) e picciuoli (almeno gli ultimi) forniti di peli applicati o patenti-raddrizzati.

I Peli patenti-raddrizzati, scarsi (generalm. solo alla base dei fusti e sopra gli ultimi picciuoli).

* Lobi delle fg. raggiungenti $^2/_5$ od $^1/_2$ del raggio, quelli delle fg. super. parabolico-triangolari, acuti, a denti marcati, eguali, affilato-acuti, conniventi. — *In tutta la catena delle Alpi.* **c. acutidens (Buser,** 1894)

** Lobi delle fg. più larghi, raggiungenti $^1/_4$-$^1/_2$ del raggio, a denti più larghi, meno affilati e spesso assai irregolari.

+ Infiorescenza lassa. — *Alpi.* — A. vulgaris W. **d. alpestris (F. W. Schm.,** 1794)

++ Infiorescenza compatta. — *Alpi occ., C. Ticino* (*Chenev.*). — A. frigida Buser (1894), non Weddel. **e. frigens (Buser,** 1894)

II Peli applicati (sericeo-lucenti sopra gli ultimi picciuoli), eguali e poco densi.

Δ Pianta alta, robusta, a fg. grandi, coriacee. Infiorescenza assai densa. — *Alpi Mar. nel vallone di Puriac presso l'Argentera* (*Briq. e Cavillier*). **f. Cavillieri Briq. in Burn.** (1899)

ΔΔ Pianta meno robusta, a fg. più piccole e meno coriacee. Infiorescenza lassa. — *In tutte le Alpi.* — A. reniformis Buser. **g. obtusa (Buser,** 1894)

C Fusti (almeno alla base) e picciuoli (almeno gli ultimi) irsuti per peli lunghi e patenti.

1 Fusti irsuti nella metà infer., glabri nella metà super.

a Fg. debolm. vellutate di sopra ed ancora meno di sotto, a nervi sericei. Infiorescenza più o meno condensata — *Nelle Alpi.* — A. filicaulis Buser. **h. minor (Huds,** 1762 [ex Buser])

Digitized by Google

b Fg. vellutato-irsute su ambedue le pag., a nervi irsuti. Infiorescenza più lassa. — *Nelle Alpi Mar., Piem., C. Ticino, Veron. e Tir. mer.*

i. strigosula (*Buser*, 1893) (Fl. An. I, p. 583 [var. β])

2 Fusti irsuti su tutta la loro lunghezza, sino alle stipole bratteali super.

* Fg. glabre di sopra. — *Nelle Alpi.* — A. vulgaris Dum., Buser.

j. pratensis (F. W. Schm., 1794)

** Fg. più o meno pelose di sopra.

Δ Fg. leggerm. pelose di sopra, generalm. solo sulle pieghe ed al margine; lobi delle fg. più grandi parabolici. — *In tutta la catena delle Alpi ed Appenn. emil. alla Sega di Civago ed al M. Ventasso* (*Adr. Fiori, fide Buser*).

l. subcrenata (*Buser*, 1893) (Fl. An. l. c. [var. α *b.*])

ΔΔ Fg. vellutate di sopra su tutta la superficie; lobi più larghi. — *Nelle Alpi ecc.* — A. pastoralis et crinita Buser. **m. silvestris (F. W. Schm., 1794)**

Oss. — Oltre alle for. comprese nella chiave di cui sopra, sono ancora da aggiungersi, sempre come appartenenti al tipo, le seg.:

for. compta (Buser, 1901). — *Distretto di Bormio* (*Longa*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 410).

for. decumbens (Buser, 1894). — *Distretto di Bormio* (*Longa*) *ed in generale nelle Alpi dalla Savoia al Tirolo* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 410).

for. effusa Buser (1895). — *Distretto di Bormio* (*Longa*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 414).

for. glomerulans (Buser, 1893). — *Appenn. Emil. alla Sega di Civago* (*Adr. Fiori, fide Buser*) *e certam. altrove* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 415).

for. heteropoda (Buser, 1894). — *C. Ticino* (*Chenev.*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 409).

for. hirtipes (Buser, Bull. herb. Boiss. 1901, p. 473). — *Distretto di Bormio* (*Longa*).

for. impexa (Buser, 1894). — *Distretto di Bormio* (*Longa*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 414).

for. Longana (Buser, 1901). — *Distretto di Bormio tra 2000 e 2700 m.* (*Longa*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 418).

for. longiuscula (Buser, 1894). — *Gr. S. Bernardo nel versante della Val d'Aosta* (*Buser*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 417).

for. micans (Buser, 1893). — *Diffusa nelle Alpi* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 407).

o. montana (*F. W. Schm.*, 1794) = A. connivens Buser (1894) (Fl. An. l. c. [var. α d.]). — *In tutta la catena delle Alpi.*

for. semisecta (Buser, 1894). — *Gr. S. Bernardo* (*ex Buser*).

for. sinuata (Buser, 1894). — *Gr. S. Bernardo* (*Besse*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 411).

for. straminea (Buser, 1895). — *Distretto di Bormio* (*Longa*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 417).

for. tenuis (Buser, 1894). — *Distretto di Bormio* (*Longa*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 410), *Appenn. Emil. nei prati del M. Ventasso* (*Adr. Fiori, fide Buser*).

for. trunciloba (Buser, 1894). — *Distretto di Bormio* (*Longa*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 418).

for. undulata (Buser, in Bull. Herb. Boiss. 1893, app. II, p. 26). — *Bormio in Val Furva* (*Longa*).

n. versipila (*Buser*) (Fl. An. I, p. 583 [var. α *c.*]). — *Nelle Alpi.*

β *hybrida* (*L.* 1787, F. W. Schm., 1794) (Fl. An. I, p. 584 [var. γ]) = A. alpina v. hybrida L. (1753) = A. pubescens Lam. (1791).

e. colorata. — *Abr. al Gr. Sasso d'Italia nei pascoli alp.* (*Adr. Fiori, fide Buser*).

f. Vetteri (*Buser*) (Fl. An. l. c. [var. δ]).

g. intermedia (*Hall. f.*) (Fl. An. l. c. [var. ε]).

Digitized by Google

for. exigua (Buser, 1894) = A. pusilla Buser, non Pomel. — *Distretto di Bormio* (*Bruegg.*, *Levier*, *Longa*).

γ *glaberrima* (*F. W. Schm.*, 1794) (Fl. An. l. c. [var. ζ]) = A. vulg. γ glabra DC. et Lam. (1805) = A. glabra Poir. (1810) = A. fissa Guenth et Schum. (1819) (Fl. An. I, p. 584 [var. ζ]) = A. pyrenaica L. Duf. (1821).

for. fallax (Buser, 1893-94). — *C. Ticino ed Alpi piem.* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 399).

subfor. major Asch. et Graeb. (Syn. VI, p. 399) = A. fissa a. major Schur (1866) = A. sericoneura Buser (1894). — *Alpi.*

for. flavicoma (Buser, ap. Chenev. in Bull. herb. Boiss. 1903, p. 432). – *C. Ticino in Val di Vergeletto* (*Chenev.*).

for. incisa (Buser, 1892). — *Alpi Mar. nel bacino super. della Stura* (*Burnat*).

for. venosula (Buser, Bull. herb. Boiss. 1901, p. 466). — *Bormio in Val di Sotto* (*Longa*) (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 396).

1807 (3) *A. alpina α'* **saxatilis (Buser).** — Distinguesi dalle var. α *typ.* e β *Hoppeana* pei glomeruli dei fi. compatti, formanti delle infiorescenze moniliformi, per lo più aggruppate in corimbo lasso. — *Valtellina in Val Grosina* (*Cornaz*, *Longa*), *Val di sotto* (*Cornaz*) *e C. Ticino* (*Chenev.*).

β *Hoppeana.* — *App. Emil. al Rondinaio* (*C. Zanfrognini*, *fide Buser*).

b. transiens -- *Appenn. Emil. al M. Ventasso, M. Cimone e Corno alle Scale* (*Adr. Fiori*, *fide Buser*).

subfor. corsica Buser (1901) = A. saxatilis f. corsica Buser (1894). — *È la forma di A. alpina più comune in Corsica.*

γ *subsericea* **for. pseudo-grossidens Asch. et Graeb.** (1902). — *Gr. S. Bernardo al Col de Fenêtre de Ferret* (*F. O. Wolf*).

Gen. Rosa. — Cfr. Burnat, Flore Alp. Mar. III (1899), R. Keller, in Asch. et Graeb. Syn. VI; in L. Vaccari, Cat. rais. des pl. vasc. de la Vallée d'Aoste, Fasc. I, Aoste 1904.

1814 (2) *Rosa sempervirens* β *scandens* **a. pauciflora Strobl.** — Corimbo di 2-3 fi. — *Col tipo.*

b. floribunda Guss. — Corimbo di 5-7 fi. — *Col tipo.*

δ **microphylla DC.** = v. minor Guss. — Foglioline assai piccole ed acutam. seghettate. Fi. quasi solitari. — *Nell'area della spec.*

ε **Bicknellii Burnat** (Fl. Alp. Mar. III, p. 23 [1899]). — Picciuoli, peduncoli e ricettacoli muniti di numerose glandule stipitate. — *Lig. occ. nel bacino della Nervia tra Apricale e Bergi* (*Bicknell*).

var. Broteri Tratt. = R. semp. latifolia Red. — *Faentino* (*Caldesi*).

var. flaccida Christ in Caldesi (1880). — *Faentino* (*Caldesi*).

var. microtricha Borb. (1880). — *Istria a Canfanaro* (cfr. Asch. et Graeb. Syn. VI, p. 38).

var. nicaeensis Burn. et Gremli (Ros. Alp. mar. Suppl. 49 [1882-83]). — *Alpi Mar.*

var. prostrata Desv. (DC.) = v. leiostyla Koch. — *Faentino* (*Caldesi*).

1814 * R. ruscinonensis? Désegl. = R. semperv. v. pilosula Ser. in DC. — *Faentino a S. Mamante* (*Caldesi*).

1814 ** R. corrugata Caldesi (Giorn. bot. it. 1880, p. 100). — *Faentino nei boschi di Pidevra* (*Cald.*).

1815 (3) *R. arvensis* **for. atrata Christ** (1873). — *Verona nella Valpantena* (*Tonini ex Goir.*).

for. baldensis (Kern., 1876). — *M. Baldo, Lessini e colli Veron.* (*Goir.*).

for. bibracteata (Bast., 1815) = v. multiflora Bor. (1841) = v. umbellata Godet (1853). — *Veron.* (*Goir.*), *Val d'Aosta* (*Keller*), *Appenn. pistoiese* (*Major*) *ecc.*

for. brevistyla Gelmi (1884). — *Trentino* (*Gelmi*), *Veron.* (*Goir.*).

for. gallicoides (Désegl., 1876) = R. stylosa v. gallic. Baker (1869). — Apice dei fusti,

Digitized by Google

rametti fioriferi, picciuoli, peduncoli e ricettacoli muniti di glandule stipitate più o meno abbondanti. — *Alpi Mar.* (*Burn.*), *Tir. mer. e Veron.* (*Goir.*).

for. glandulifera (**Crép.**, 1879). — *Alpi Mar.*, *Tir. mer. ecc.*

for. Hermanniae Borzi (1885). — Foglioline piccole, ovali-tonde, pubescenti-tomentose di sotto. — *Vallombrosa* (*Borzi*).

for. herporhodon Ehrh., W. — *Faentino* (*Caldesi*).

for. levipes Gremli, Rouy. — Peduncoli senza glandule. — *Nell'area della spec.*

for. ovata (**Lej.**, 1811). — *Veron.* (*Goir.*), *Faentino* (*Caldesi*) *ecc.*

for. paradoxa (**Burn. et Gremli**). — *Alpi mar.*

for. transalpina (**Christ**, 1873). — Foglioline ovato-lanceolate, pubescenti. — *Comasco al M. Grigna e presso Lugano, Faentino* (*Caldesi*).

1815 * R. pervirens Gren. in Crép. = R. andorae Burn. et Gremli. — *Lig. occ.* (cfr. Burnat, Fl. Alp. Mar. III, p. 30). — Sec. parecchi sarebbe un ibrido, cioè: *R. arvensis* × *sempervirens Duffort.*

1816 (4) *R. stylosa.* — *Salernit. a Cava dei Tirreni sul M. S. Adjutore* (*L. Marcello*) (?).

1817 (5) *R. gallica* α **eriostyla R. Kell. for. incarnata** (**Mill.**) **et ruralis** (**Désegl.**). — *Ambedue nel Veronese* (*Goir.*).

for. pumila (**Jacq.**). — *Nell'area della spec.*

β **eriostyla Gelmi** (1893), **for. elata Christ** (1873). — *Raram. nell'area della spec.*

for. tridentina Gelmi ex R. Kell. — *Trentino.*

var. provincialis (**Ait.**). — *Faentino* (*Caldesi*).

for. microphylla Caldesi (1880). — *Faentino a Moronico.*

1817 (*bis*) **R. caudina N. Terr.** (Quarta relaz. [1878] p. 84). — Pel suo portam. e per i fi. grandi semipieni ed odorosissimi, parebbe una for. della *R. centifolia* (N. Terr.). — *Camp. in Valle Caudina nelle selve sopra Forchia* (*N. Terr.*); *probabilm. si tratta di pianta di giardino inselvat.* (*Adr. Fiori*).

1817 * R. gallico × sempervirens Christ. — *Tosc. sul M. Ferrato presso Prato* (*Lev. in Christ*).

1817 ** *R. gallico* × *arvensis Crep.* (1880) = R. arvensi × gallica R. Kell. in Asch. et Graeb. (1902).

for. geminata (**Ran**). — *Faentino* (*Caldesi*).

for, hybrida (**Schl.**) = R. Schleicheri Braun. — *Qua e là presso i genitori.*

for. Polliniana (**Spr.**) = R. pumila v. Pollinii Poll. — *M. Baldo, Alpi Mar. presso Mondovì* (*ex Burnat*).

1817 *** *R. gallico* × *canina* = R. Chaberti Désegl. — *Alpi Mar. tra Mondovì ed il Santuario di Vicoforte* (*Ferrari ex Burnat*).

1817 **** *R. gallico* × *agrestis Crep.* in Fi. e Paol. Fl. An. I, p. 588 (nota) (1898), R. Kell. in Asch. et Graeb. (1902) = R. agrestis × gall. Christ (1884) = R. sepium v. grandiflora Rap. = R. Klukii Gren. (non Bess.) = R. formosula Gren. = R. anisopoda Christ = R. subdola Désegl. = R. infesta Kmet = R. bibracensis Sagorski. — *Faentino a S. Lucia delle Spianate* (*Caldesi*) *ecc.*

1818 (6) *R. canina*, **for. biserrata** (**Mérat**) **Baker.** — *Veronese* (*Goir.*), *C. Ticino a Frasco* (*Chenev.*), *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vaccari*), *Tosc. a Vallombrosa* (*Solla*) *ed a Rapolano* (*Somm. in Baroni*).

for. eriostyla (**Rip. et Désegl.**). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

for. Giorgii Kell. et Chenev. (Bull. Herb. Boiss. 1903). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).

for. glaberrima (**Dum.**). — *M. Baldo e Riva di Trento* (*Gelmi*), *presso Verona* (*Goir.*), *Faentino* (*Caldesi*), *Tosc. nelle A. Apuane, presso Firenze e nel Senese* (*cfr. Baroni*).

subfor. insubrica Christ (1873). — *Presso il lago di Lugano* (*Christ*).

for. glaucescens (**Desv.**) **Desv.** — *Faentino* (*Caldesi*), *Sic. alle Madonie* (*Strobl*).

for. hirtella (**Rip. hb.**) **Christ.** = R. can. v. adenotricha Burn. et Gremli p. p. — *Tosc. in Val di Nievole* (*cfr. Baroni*).

Digitized by Google

for. hispidula (Rip. p. p.). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*), *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. lasiostylis Borb. (1880). — *Piem. a Candia* (*L. Vacc.*).
for. malmundariensis (Lej.)? — *A. Apuane a Forno* (*Somm. in Baroni*).
for. nitens (Desv.) Desv. — *Faentino* (*Caldesi*).
for. oenensis (Kern.) R. Kell. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. orthacantha Burn. et Gremli. — *Riviera* (*Burn. et Gr.*).
for. transitoria R. Kell. — *C. Ticino in Val di Vergeletto* (*Chenev.*) *ecc.*
for. umbellata Guss. — Fl. corimbosi. — *Sic.*
η *dumetorum*, **for. Burnati (Burn. et Gremli,** 1879) = R. tomentella f. Burnati Christ (1876). — *Alpi Mar.* (*Burn.*), *Faentino a Moronico* (*Caldesi*).
subfor. microphylla Caldesi (1880). — Foglioline piccole. Corolla roseo-bianchiccia. — *Faentino al M. della Bicocca* (*Cald.*).
for. capitata Christ. — *Veronese* (*Goir.*).
for. glandulosa Christ in Strobl (1903). — *Sic. alle Madonie* (*Strobl*).
for. hemitricha (Rip.) = R. villosiuscula Boullu. — *Veronese* (*Goir.*), *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. incanescens Borzi. — *Vallombrosa* (*Borzi in Piccioli*).
for. leventinae R. Kell. in Asch. et Graeb. — *C. Ticino in V. Levantina* (*R. Kell.*).
for. longistyla Burn. et Gremli (1882-83). — *Alpi Mar. a Tenda* (*Burn.*).
for. orthacantha R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Val d'Ossola* (*R. Kell.*).
for. pesiana Burn. et Gremli (1882-83). — *Alpi Mar.* (*Burn.*).
for. platyphylla (Rau). — *Veronese* (*Goir.*), *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*), *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*), *Vallombrosa* (*Solla*), *Faentino* (*Caldesi*).
for. semiglabra (Rip.). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).
for. submitis (Gren., 1852) = R. collina DC. (non Jacq.) = R. dumet. f. Thuillieri Christ (1873). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*), *Faentino* (*Caldesi*).
for. syntrichostyla (Rip.). — *Faentino* (*Caldesi*).
for. trichoneura (Rip.). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. urbica (Lém.). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*), *Faentino* (*Caldesi*).

1819 (7) *R. tomentella*, **for. affinis (Rau).** — *Faentino* (*Caldesi*).
for. canescens Christ (1873). — *Val d'Aosta in Val di Champorcher* (*L. Vacc.*).
for. concinna (Lag. et Pug.). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*), *Faentino* (*Caldesi*).
for. Friedlaenderiana (Besser). — *Gr. S. Bernardo* (*L. Vacc.*).
for. hispidior R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).
for. Longae Cornaz in Crép. (1889). — *Valtellina a Bormio* (*Longa*).
for. monregalensis Burn. et Gremli (Roses Alp. mar. Suppl. p. 19). — *Alpi Mar. presso Garessio* (*Burnat*).
for. obtusifolia (Desv.). — *Trentino* (*Gelmi*), *Veron.* (*Goir.*), *V. d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*), *Firenze a M. Senario* (*Lev. in Arc.*).
for. orfanensis R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Piem.: M. Orfano, Val d'Ossola* (*R. Kell.*).
for. pedemontana Burn. et Gremli (l. c. p. 20). — *Alpi Mar. presso Ceva* (*Burnat*).
for. sclerophylla (Scheutz). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).
for. sinuatidens Christ. — *C. Ticino in Val di Vergeletto* (*Chenev.*) *e Val Blenio* (*R. Kell.*), *Val d'Aosta in Val di Champorcher* (*L. Vacc.*).
for. tiranensis Cornaz in Crép. (1889). — *Valtellina in V. Tirano* (*Cornaz*).
for. tridentina Gelmi (1886). — *Trento* (*Gelmi*).

1819 * R. tomentella × coriifolia? R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *C. Ticino ad Olivone.*

1819 ** R. Allionii Burn. et Gremli (Roses Alp. mar. Suppl. p. 16; Burnat, Fl. Alp. mar. III, p. 81-83). — *Lig. occ. presso Ceriana e tra il M. Alto e la Nervia* (*Bicknell*)

Digitized by Google

e Nizz. al M. Colla Rossa sulla Giandola, tra Braus e Sospello ed intorno ad Escarène (*Burnat*).

1819 *** **R. Beatricis Burn. et Gremli** (l. c., p. 14; Burnat, l. c., p. 83-84). — *Alpi Mar. presso Tenda, vallone di Crosilias presso Isola e valle della Tinée* (*Burnat*).

1820 (8) *R. Pouzini.* — *Veronese* (*cfr. Goir.*). — Burnat (Fl. Alp. Mar. III, p. 61-62) distingue le seg. forme:

b. pauciglandulosa Burn. et Gremli. — *Lig. occ. tra S. Remo e Ceriana.*

c. pubescens Crép. in Wk. et Lge.? — *Lig. occ. nel bacino della Nervia tra Soldano e Dolceacqua.* – Forse *R. Pouzini* × *dumetorum?*

d. oneliensis R. Kell. = R. dumetorum v. platyphylla Burn. hb., Crép. = R. dumet. v. onel. Burn. et Gremli. — *Lig. occ. tra Erli e Cerisola e presso Alassio.*

e. polyadena (Burn. et Gremli). – *Lig. occ. nel bacino della Nervia a Gola di Gota* (*Bicknell*) *e nella valle di Cairos.*

f. Tendae Crép. (1882) = R. dumetorum v. Tendae Burn. et Gremli (1882-83). — *Alpi Mar. presso Tenda.*

Oss. 1ª — Sono ancora da aggiungersi:

for. Burnati R. Kell. in Asch. et Graeb. — *Tra Castillion e S. Agnès presso Mentone.*

for. florentina Arc. = R. hispanica v. florent. Christ (1873). — *Firenze a M. Ceceri ed all' Impruneta* (*cfr. Baroni*).

Oss. 2ª – Alla *R. Pouzini* sono ancora da riferirsi:

R. hispanica for. amplissima Christ in Strobl (1903). — *Sic. alle Favare di Petralia* (*Strobl*).

for. nevadensis Boiss. et Reut. — *Sic. all' Etna ed alle Madonie* (*Strobl*).

1820 * **R. Gallinariae Burn. et Gremli** (Roses Alp. mar. Suppl. p. 25 [1882-83]). — *Isola Gallinaria presso Albenga nella Lig. occ.* (*Burnat*).

1821 (9) *R. glauca*, **for. bernardensis R. Kell. in L. Vacc.** (1904) = R. pimpinellifolia × pomifera f. bernardensis R. Kell. (1899). — *Val d' Aosta sopra la Thuile* (*R. Kell.*).

for. caballicensis (Puget). — *Alpi Mar.* (*Burn. et Gremli*).

for. complicata (Gren.) = R. Reuteri v. intermedia Gren. = R. Reuteri v. Morthieri Godet. — *Val d' Aosta a la Thuile* (*Kell.*).

for. Cornazii R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Valtellina.*

for. denticulata R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *C. Ticino in Val Levantina e Val Blenio* (*R. Kell.*).

for. diodus R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *C. Ticino in Val Levantina e Val Blenio* (*R. Kell.*).

for. falcata (Puget, 1875), Borb. (1880). — *Val d' Aosta presso la Thuile* (*R. Kell.*).

for. hispido-caballicensis R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Val d' Aosta a la Thuile* (*R. Kell.*).

for. Jaccardii R. Kell. in L. Vacc. (1904). — *Val d' Aosta in val di Cogne* (*Jaccard*).

for. lagenoides R. Kell. (1899). — *Val d' Aosta a la Thuile* (*R. Kell.*).

for. macrophylla Favrat hb. ex R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Valtellina a Bormio.*

for. Mayeri (H. Braun, 1886). — *C. Ticino a Frasco* (*Chenev.*).

for. myriodonta R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901) = R. Reuteri f. myr. Christ (1873). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).

for. pseudo-montana (R. Kell., 1891). — *Trentino e M. Baldo* (*Gelmi*), *C. Ticino* (*R. Kell.*), *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. subcanina (R. Kell., 1891), Braun in Beck. (1892) = R. Reuteri f. subcanina Christ (1873). – *C. Ticino a Frasco* (*Chenev.*), *Val d' Aosta* (*L. Vacc.*), *Alpi Mar.* (*Burnat*).

η *coriifolia*, **for. Aschersonii R. Kell. in Asch. et Graeb.** (1901). — *C. Ticino* (*R. Kell.*).

Digitized by Google

for. Bovernieriana Christ (1873), (**Lagger et Delasoie,** 1876). — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).
for. cenisia R. Kell. (1899). — *Bardonecchia* (*R. Kell.*).
for. Christii R. Kell. (1899). — *Val d'Aosta a la Thuile* (*R. Kell.*).
for. clavata R. Kell. (Bull. Herb. Boiss., 1903). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).
for. comes R. Kell. (1899). — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*), *Bardonecchia* (*R. Kell.*).
for. frutetorum (Bess.), H. Braun in Beck. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. glabrescens R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. grajica R. Kell. (1899). — *Alpi Graje* (*R. Kell.*).
for. hirtifolia (Braun, 1885), **R. Kell.** (1901). — *Val d'Aosta in val di Champorcher* (*L. Vacc.*).
for. Hoffmannii R. Kell. in L. Vacc. (1904). — *Val d'Aosta in val di Champorcher* (*L. Vacc.*).
for. lucida Braüker (1882). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. militaris R. Kell. (1899). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. parcensis R. Kell. (1899). — *Val d'Aosta al M. Parc presso la Thuile* (*R. Kell.*).
for. pastoralis R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *C. Ticino in Val Levantina e Val Blenio* (*R. Kell.*), *Aosta* (*L. Vacc.*).
for. pseudopsis (Gremli, 1885). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. subbiserrata Borb. (1890). — *Val d'Aosta* (*Wilczek et Jaccard*).
for. subcollina Christ (1875). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*), *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*), *Alpi Mar.* (*Burnat*).
for. subhispida R. Kell. (1899). — *Val d'Aosta* (*R. Kell.*).
for. Vaccarii R. Kell. in L. Vacc. (1904). — *Val d'Aosta presso S. Remy* (*L. Vacc.*).
λ *cinerea* (*Rap.*) *Christ.* — *Val d'Aosta presso Cogne* (*Wilczek*).
μ *rhaetica* (*Gremli,* 1881) = R. caryophyllacea Christ, Crép. (non Bess.) (Fl. An. I, p. 590). — *Valtellina a Bormio.*
for. Levieri Gremli (1890) = R. caryophyllacea f. Levieri Christ (1873). — *Valtellina.*
for. Killiasii Gremli (1890) = R. caryophyllacea f. Killiasii Christ (1873). — *Valtellina.*
for. taraspensis R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901) = R. caryophyllacea f. taraspensis Christ (1873). — *Bormio.*
for. thermalis (Cornaz hb.), R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Valtellina.*
1822 (10) *R. montana*, **for. burmiensis (Cornaz in Gremli,** 1883). — *Valtellina a Bormio.*
for. Crepini Cornaz hb., ex R. Kell. in Asch. et Graeb. — *Valtellina a Bormio.*
for. grajica R. Kell. in Asch. et Graeb. — *Alpi Graje a Forno* (*R. Kell.*).
for. intromissa R. Kell. in L. Vacc. (1904). — *Val d'Aosta in val di Cogne* (*Wilczek, L. Vacc.*).
for. transiens R. Kell. (1899). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*), *Bardonecchia* (*R. Kell.*).
1822 * *R. Chavini Rap.* = R. montano × glauca vel R. montano × canina. — *C. Ticino, Valtellina* (*cfr. R. Kell. in Asch. et Graeb.*), *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*), *Alpi Mar.* (*Burnat*).
for. aretiana Gremli (1893), (**Cornaz hb.**). — *Valtellina a Bormio.*
for. latibracteata R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901) = R. montana f. latibracteata Christ (1873). — *Val d'Aosta a Cogne* (*Wilczek*).
for. mutata Burnat (Fl. Alp. Mar. III, p. 50 [1899]) = R. glauca v. mutata Burn. et Gremli (1879) = R. montana v. marsica Burn. et Gremli (1882-83). — *Alpi Mar.* (*Burnat*).
for. transitoria R. Kell. in L. Vacc. (1904). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
1822 ** **R. abietina Gren.** = R. foetida Gren. (non Bast.) = R. Thomasii Puget. — *C. Ticino* (*ex R. Kell in Asch. et Graeb.*).
for. Dematranea (Lag. et Pug.). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).
for. insubrica R. Kell. (Bull. herb. Boiss., 1903). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).
for. Thomasii (Pug.). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).

Digitized by Google

1822 *** **R. uriensis Lagger** (1869) = R. conferta Pug. (1874). — *C. Ticino.*
for. addensis R. Kell. in Asch. et Graeb. = R. abietina v. addensis Cornaz hb. — *Valtellina a Bormio.*
for. adenophora R. Kell. l. c. — *C. Ticino.*
for. biserrata R. Kell. l. c. — *C. Ticino.*
for. glabriuscula R. Kell. l. c. — *C. Ticino.*
for. glandulifera R. Kell. l. c. — *C. Ticino in Val Levantina e Val Blenio* (*R. Kell.*).
subfor. heteracantha R. Kell. l. c. — *C. Ticino.*
for. hispidissima R. Kell. l. c. — *C. Ticino.*
for. inermis R. Kell. l. c. — *C. Ticino in Val Levantina.*
for. longipedunculata R. Kell. l. c. — *C. Ticino in Val Levantina* (*R. Kell.*).
for. pubescens R. Kell. l. c. — *C. Ticino.*
subfor. uniserrata R. Kell. l. c. — *C. Ticino in Val Levantina* (*R. Kell.*) *ed a Frasco* (*Chenev.*).
for. simplicidens R. Kell. l. c. — *C. Ticino.*
1823 (11) *R. rubrifolia*, **for. glaucescens (Wulf.,** 1805). — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).
for. Kelleri Crép. (1895) = R. ferruginea f. pubescens R. Kell. (1890). — *C. Ticino.*
1824 (12) *R. micrantha* α **nemorosa (Libert)** = R. Libertiana Tratt. — *Faentino* (*Caldesi*) *ecc.*
for. Burnati R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Alpi Mar. presso Ceva* (*Burnat*).
for. calvescens Burn. et Gremli. — *Lig. occ. e Nizz. nella reg. littorale* (*Burnat*), *Valtellina* (*ex R. Kell. in Asch. et Graeb.*), *Vallombrosa* (*Solla*), *Faentino* (*Caldesi*).
subfor. plicata Burn. et Gremli. — *Nizz. al colle di Braus* (*Burnat*).
for. fallax R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *C. Ticino a Brugnasco* (*R. Kell.*).
for. leucantha R. Kell. (Bull. Herb. Boiss. 1903). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).
for. Lucomagni R. Kell. l. c. — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).
for. meridionalis (Burn. et Gremli, 1879) = *R. hispanica f. nevadensis Christ* (*1876*) = R. lantoscana Burn. et Gremli (1882). — *Nizz. presso S. Martino Vésubie nel vallone di Nandeubis* (*Burnat*), *Faentino* (*Caldesi*).
for. permixta (Déséglise). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*), *V. d'Aosta in Val di Cogne* (*Wilczek*), *Vallombrosa* (*Solla*), *M. Amiata* (*Somm. in Baroni*).
for. polyacantha (Borb., 1880). — *Veron. alle falde del m. Pastello* (*Goiran*), *Istria e Tir. mer.* (*ex R. Kell. in Asch. et Graeb.*).
for. serrata Christ (1873). — *Val d'Aosta a S. Remy* (*Wilczek*).
1825 (13) *R. Seraphini.* — *Alpi Mar. liguri* (*Burnat*).
1826 (14) *R. agrestis*, **for. abscondita Caldesi** (1880) = R. sepium f. abscond. Christ (1874). — *Alpi Mar.* (*Burnat*).
for. arvatica (Pug.). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*), *Firenze a M. Ceceri ed all'Impruneta* (*Lev. in Christ*), *Faentino* (*Caldesi*).
for. discosa Caldesi (1880) = R. sepium f. disc. Christ (1874). — *Presso Firenze a Quarto* (*Lev. in Christ*), *Faentino* (*Caldesi*).
for. farinulenta Caldesi = R. sepium. f. farin. Christ ap. Caldesi (Giorn. bot. it. 1880, p. 105). — Glandule delle fg. biancheggianti. — *Faentino* (*Cald.*).
for. Forsythii Christ in Arc. (1882). — *Appen. Pistoiese a Zeri* (*Major in Arc.*).
for. inodora (Fr.). — *Faentino* (*Caldesi*).
subfor. ambigua Caldesi (1880) = R. sepium v. ambigua Desv. (1813). — *Faentino a Castelraniero* (*Cald.*).
for. mentita (Dés.). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).
for. pseudo-mentita R. Kell. in L. Vacc. (1904). — *Gr. S. Bernardo* (*Wilczek*).
for. pubescens (Rap., 1861). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*), *Alpi Mar.* (*Christ et Gremli*), *Faentino* (*Caldesi*).
for. robusta R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901) = R. sepium f. robusta Christ (1873). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

Digitized by Google

for. Vaccarii R. Kell. in L. Vacc. (1904). — *Val d'Aosta a Montjovet* (*L. Vacc.*).

1826 * R. rubiginoso × agrestis. — *Val d'Aosta a S. Vincent* (*L. Vacc.*).

1827 (15) *R. graveolens Gren. et Godr.* (1847). — Questo nome va sostituito con quello più antico di *R. elliptica Tausch* (1819). — *Veronese* (*Goir.*), *Tosc. in Casentino fra Bibiena e Camaldoli* (*Lev. et Somm.*).

for. Billietii (Pug.). — *Val d'Aosta in Valpelline* (*L. Vacc.*).

for. Bouvieri (Crép.). — *Val d'Aosta a Cogne* (*Wilczek*).

for. cheriensis (Dés.) = R. inodora γ Cheriensis Caldesi (Giorn. bot. it. 1880, p. 104). — *Faentino a Pidevra* (*Cald.*).

for. Cornazii (Gremli, 1887) = R. graveol. × rubigin. Cornaz hb. — *Valtellina a Bormio.*

for. hispida R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. Jordani (Dés.). — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. Klukii (Bess.) R. Kell. = R. rubigin. β iberica Boiss. — *Faentino* (*Caldesi*).

subfor. macrocarpa et hispida Caldesi (Giorn. bot. it. 1880, p. 104). — *Ambedue nel Faentino* (*Cald.*).

for. latifolia Favrat ap. Kell. in L. Vacc. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. liostyla R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901) = R. graveol. v. leiostyla R. Kell. (1899). — *Alpi piem. a Rochemolles presso Bardonecchia* (*R. Kell.*).

for. Lugdunensis (Dés.). — *Val d'Aosta a Cogne* (*Wilczek*).

for. pseudo-graveolens (Moutin, 1882). — *Trentino* (*ex R. Kell.*).

1828 (17) *R. rubiginosa.* — *Elba* (*Sommier*).

for. abbreviata Cornaz hb. ex R. Kell. in Asch. et Graeb. — *Valtellina a Bormio.*

for. aciculosa R. Kell. subfor. lactea R. Kell. (1899). — *Alpi Cozie a Bardonecchia* (*R. Kell.*).

for. amphadena R. Kell. (Bull. Herb. Boiss., 1903). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).

for. apricorum (Rip.). — *C. Ticino in Val Blenio e Val d'Aosta a la Thuile* (*R. Kell.*).

for. Baumgartneri R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *C. Ticino a Fiesso* (*R. Kell.*).

for. Caldesiana Christ. in Caldesi (Giorn. bot. it. 1880, p. 104). — *Faentino nei boschi della Iana* (*Cald.*).

for. camadrae R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *C. Ticino in Val Camadra sopra Olivone ed in Val Blenio* (*R. Kell.*).

for. comosa (Rip.). — *Veron.* (*Goir.*), *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*) *e Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. fallax R. Kell. (1899). — *Alpi Graje a Chiampernotto* (*R. Kell.*).

for. Gremlii Christ (1873), **(Christ in Gremli,** 1874). — *Alpi Mar. nella val d'Inferno presso Garessio e fra Roburent e Pamparato* (*Burnat*), *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).

for. homoeacantha Burn. et Gremli. — *Alpi Mar* (*Burnat*).

for. imitans (R. Kell., 1899). — *Alpi Cozie a Bardonecchia* (*R. Kell.*).

for. jenensis M. Schulze (1884). — *C. Ticino* (*R. Kell.*), *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*), *tra Susa e Novalesa* (*R. Kell.*).

for. lagynoides R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

for. liostyla Christ (1885). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

for. pulvinaris Christ (1876). — *Alpi Mar. nella valle di Castiglione presso Isola* (*Burnat*).

for. Rochemollensis R. Kell. (1899). — *Presso Bardonecchia a Rochemolles* (*R. Kell.*).

for. sospitelli Burn. (1899). — *Nizz. tra il colle di Braus e Sospello* (*Burnat*).

for. subcuneata Burn. hb. ex R. Kell. in Asch. et Graeb. (1901). — *Alpi Mar.*

for. umbellata (Leers) Christ. — *Veronese* (*Goir.*), *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).

1829 * *R. rubiginoso × tomentella.* — *C. Ticino ad Olivone* (*R. Keller.*).

1829 ** R. rubiginoso × montana R. Kell. in Asch. et Graeb. = R. sanguisorbella De

Digitized by Google

la Soie hb. (1872) = R. montana f. sanguisorbella Christ (1873) = R. montana f. gracilens Crép.? — *Alpi Graie nella Valle Stretta* (*R. Kell.*).

1829 *** **R. rubiginoso × elliptica R. Kell. in Asch. et Graeb.** (1901) = R. graveolens × rubiginosa M. Schulze (1887). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

1831 (19) *R. sicula*, α **veridica Burn. et Gremli** (1887) = R. Serafini f. veridica Christ (1877) = R. sic. α typica Crép. in Fl. An. I, p. 592.

b. ligustica Burn. et Gremli (1887) = R. Serafini f. ligustica Christ (1876). — *Alpi Mar. presso Spisios tra Margheria di Roure e Puch* (*Burnat*).

β **Thuretii (Burn. et Gremli,** 1883) = R. glutinosa Guss. = R. glutin. f. sicula Christ = R. calabrica v. Thuretii Burn. et Gr. (1879). — *Alpi Mar. e Sic.* — Burnat (Fl. Alp. Mar. III, p. 111-115) pur mantenendo l'autonomia specifica di questa entità dichiara che essa comprende delle forme intermedie tra *R. glutinosa e R. sicula.*

γ **Gussonii Burn.** = R. Seraphini Guss. — *Sic. alle Madonie.*

1832 (20) *R. tomentosa*, **for. cristata Christ** (1873). — *Veronese* (*Goir.*).

for. dumosa (Pug.). — *Val d'Aosta a S. Remy* (*Bouv.*).

for. micans (Dés.) = R. velutina Chabert. — *Tir. mer.*

for. scabriuscula (Winch in Sm., 1824), **Baker** (1869). — *Trent. a Primiero* (*Gelmi*), *Val d'Aosta in Valgrisenche* (*Beyer*), *Vallombrosa* (*Solla*).

for. subglobosa (Sm.). — *Veronese* (*Goir.*), *Vallombrosa* (*Solla*) *ecc.*

1833 (21) *R. villosa* β *pomifera for. Franzonii* (*Christ*, 1873) = R. pomifera × ferruginea Christ. — *C. Ticino in Val Maggia.*

for. Gaudini (Pug.). — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Kell.*).

for. Gibellii R. Kell. in Asch. et Graeb. (1900) = R. villosa v. Gibellii R. Kell. (1899). — *V. d'Aosta a la Thuile* (*R. Kell.*).

for. Grenieri (Dés.). — *Val d' Aosta* (*cfr. L. Vacc.*), *Alpi Mar.* (*ex R. Kell.*).

for. Hausmannii Gelmi (1886). — *Trentino* (*Gelmi*).

for. lagenoides Favrat ex Crép. (1889). — *Val d' Aosta* (*R. Keller*).

for. leventinensis R. Kell. in Asch. et Graeb. (1900). — *C. Ticino in Val Levantina* (*R. Kell.*).

for. microphylla Crép. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. Murithii (Pug.). — *C. Ticino in Val Levantina* (*R. Kell.*).

for. ogensis Cornaz ex Crép. (1889). — *Valtellina.*

for. recondita (Pug.). — *Veronese* (*Goir.*), *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

for. rhoënsis R. Kell. in Asch. et Graeb. (1900) = R. villosa v. rhoënsis R. Kell. (1899). — *Alpi Graje e Cozzie* (*ex R. Kell.*).

for. semproniana Favrat et Schimper f. ex Christ (1874) = R. pomifera × coriifolia Christ. — *Sempione a 1700 m.*

1833 * **R. pomifero × glauca R. Kell.** (1891). — *C. Ticino a Prato* (*R. Kell.*), *M. Baldo* (*Gelmi, Goir.*).

1835 (23) *R. Jundzilli* **for. trachyphylla (Rau).** — *Trentino* (*Gelmi*).

1836 (24) *R. cinnamomea L.* Syst. ed. X (1759) et Sp. ed. II (1762), non L. Sp. ed. I (1753) (= R. pendulina). — Cfr. Crépin in Bull. herb. Boiss. 1897, p. 135, 138 e 143; Burnat Fl. Alp. Mar. III, p. 39.

1837 (25) *R. alpina L.* (1762). — Conforme a quanto ha dimostrato il Burnat (Fl. Alp. Mar. III, p. 38), questa spec. va denotata col nome più antico di *R. pendulina L.* (1753).

α *levis R. Kell.* (1901) = R. alp. α levis Ser. (Fl. An. I, p. 594 [alp. α]).

β *pyrenaica* (*Gouan., Auct.*) (Fl. An. l. c. [alp. β]).

γ *aculeata R. Kell.* (1902) = R. alpina v. aculeata Ser. in DC. (Fl. An. l. c. [alp. γ]).

Oss. — Si aggiungano ancora le seguenti forme:

for. adjecta (Dés.). — *Val d'Aosta a Cogne* (*L. Vacc.*).

for. alpina (L.) = R. alp. v. globosa Desv. — *Val d'Aosta presso la Thuile* (*Kell.*) *ecc.*

Digitized by Google

for. brachycladа Burnat (1899) = R. alp. v. brachycl. Burn. et Gremli. — Come la v. *pyrenaica*, ma con peduncoli brevi, appena sorpassanti il ricettacolo. — *Alpi Mar.*

for. gentilis (Sternb.). — *Istria sul M. Maggiore* (*ex R. Kell.*).

for. intermedia Gr. et Godr. (sub R. alpina). — *Alpi Apuane al Procinto* (*Somm.*).

for. lagenaria (Vill.). — *Veron.* (*Goir.*), *Val d'Aosta a la Thuile* (*R. Kell.*).

for. latifolia R. Kell. (1902) = R. alpina v. latifol. Ser. in DC. (1825). — *Val d'Aosta a Champorcher* (*L. Vacc.*) *ecc.*

for. Malyi (Kerner). — Fg. medie ed infer. con glandule, talora numerose. — *Alpi Mar. ecc.*

for. pubescens R. Kell. (1902) = R. alp. f. pubesc. Koch (1857). — Foglioline pubescenti di sotto. — *Col tipo.*

for. pumila Christ in Baroni (sub R. alpina). — *A. Apuane al Pisanino e sopra Boscolungo* (*Somm. fide Christ*).

for. setosa R. Kell. (1902) = R. alp. v. setosa Ser. in DC. — *Veron.* (*Goir.*), *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

1837 * *R. coriifolio* × *pendulina R. Kell. in Asch. et Graeb.* (1902) = R. salaevensis v. pubescens Bouvier (1875) = R. alp. × coriif. Christ (1875) (Fl. An. II, pag. 594 [nota]). — *Val d'Aosta* (*R. Kell.*, *Bess.*).

for. stenosepala (Christ, 1873). — *Piemonte* (*ex R. Kell.*).

1837 ** *R. glauco* × *pendulina R. Kell. in Asch. et Graeb.* (1902) = R. alp. × glauca Uechtr. (1881) (Fl. An. II, p. 594 [nota]) = R. impariserrata Beyer. — *Val d'Aosta in Valgrisenche* (*Beyer*).

for. alpinoides (Dés.). — *Da ricercarsi.*

for. Perrieri (Songeon, 1872) = R. alp. × glauca v. complicata Christ (1873). — *Val d'Aosta* (*ex R. Kell.*).

1837 *** *R. pomifero* × *pendulina R. Kell. in Asch. et Graeb.* (1902) = R. alp. × pom. Christ. (1874) (Fl. An. II, p. 594 [nota]). — *M. Baldo* (*Gelmi*, *Goir.*), *Laz. al m. Piano sopra Filettino* (*Baldini ex Chiov.*).

var. Christii R. Kell., colle **for. philophylla, longicruris** (= R. pom. v. longicr. Christ) e **laxa R. Kell.** — *Tutte in Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

var. velutina R. Kell. (1902), colle **for. pseudovestita, distans** e **bathyodonta R. Kell.** — *Tutte in Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

1837 **** *R. tomentoso* × *pendulina R. Kell. in Asch. et Graeb.* (1902) = R. alpino × tom. Christ (1884) (Fl. An. II, p. 594 [nota]) — *M. Baldo* (*Gelmi*, *Goir.*).

1838 (26) *R. pimpinellifolia α typ.* **for. lagenoides R. Kell.** (1899). — *Alpi Cozzie a Bardonecchia* (*R. Kell.*).

for. rosea Koch (1837). — *Alpi Mar.* (*ex R. Kell.*).

1838 * **R. pimpinellifolio** × **elliptica** = R. admista Burnat (Fl. Alp. Mar. III, p. 37) = R. pimpinell. × graveolens Crép. = R. ellipt. × pimp. R. Kell. — *Alpi Mar. nell'alto bacino del Varo ad Adrech* (*Burnat*).

1838 ** *R. pendulino* × *pimpinellifolia R. Kell.* = R. reversa W. et K. (1812) = R. rubella Auct. (an Smith, 1813?) = R. pimp. × alp. Reut. — *Alpi Mar.* (*ex Burnat*), *Appenn. tosco-moden. al Lago Nero e alle Tre Potenze ed Appenn. pistoiese* (*cfr. Baroni*).

for. mediterranea R. Kell. in Asch. et Graeb. (1902) = R. rubella f. medit. Christ (1876). — *Alpi Mar.*

for. pendula R. Kell. in l. c. = R. rub. f. pend. Christ (1873). — *Tir. mer. ed Alpi Graje* (*ex R. Kell.*).

for. recurva R. Kell. in l. c. = R. rub. f. rec. Christ (1873). — *Alpi Cozzie e Graje.*

1838 *** **R. pomifero** × **pimpinell. R. Kell. in Asch. et Graeb.** (1902) = R. pimp. × pom. Crép. (1891).

for. Crepiniana R. Kell. (1899). — *Alpi Graje a Rochemolles* (*R. Kell.*).

(?) **R. intermedia Tin. ex Strobl** (1903). — *Sic. alle Madonie alla Abbazia* (*Porcari*).

Digitized by Google

(?) **R. molvenoënsis Evers** (Verh. Zool.-bot. Ges. in Wien 1896, p. 65). — *Trentino a Molvena* (*Evers*).

1842 (3) *Crataegus Oxyacantha α typ.* **for. incisa Goir.** = Mespil. oxyac. β laciniata Wallr. = C. Oxyac. γ lacin. DC. (non C. lacin. Ucria). — *Veronese* (*Goir.*).

for. inermis Sart. — *Veronese* (*Goir.*).

for. intermedia (Tausch) = C. Tauscheri Gandog. — *Veronese* (*Goir.*).

for. macrophylla Goir. (1904). — Fg. misuranti 8-9 per 7-8 cm., a stipole grandi. — *Veron. a Brognoligo presso Monteforte* (*Goir.*).

β *monogyna* **b. glabrata Strobl** (1903). — Peduncoli ed ovari glabri (nella for. *genuina Strobl*) *pubescenti*. — *Sic. alle Madonie* (*Strobl*).

for. microphylla Fouc. et Sim. (1898), **Goir.** (1904). — *Veronese* (*Goir.*), *Cors. a Caporalino* (*Fouc. et Sim.*).

1843 *Mespilus germanica*. — *Elba* (*Doria ex Somm.*).

α **silvestris Goir.** (1904). — Arbusto od arboscello a rami spesso spinosi. Frutti piccoli, maturi a polpa acidula. — *È la for. inselvatichita.*

β **sativa Goir.** (1904). — Arboscello a rami sempre inermi. Frutti più grandi (2-5 cm. diam.), maturi a polpa dolce. — *È la for. colt.*

1845 (2) *Cotoneaster integerrima* β *tomentosa*. — *Cal. occ. al M. Serramale presso Tortora* (*B. Longo*).

1846 *Amelanchier vulgaris* **a. glabriuscula Strobl** (1903). — Peduncoli subglabri, calici e frutti affatto glabri.

b. tomentosa Goir. (1904) = Aronia rotundifol. β toment. Koch (1837) = Pirus Amelanchier b Guss. = Amel. vulg. f. villosiuscula Strobl (1903). — Peduncoli e calici villoso-lanati a tomento persistente, frutti glabri. — *Veron. sul M. Baldo* (*Goir.*), *Sic. alle Madonie ecc.*

c. *cretica* (*DC.*) = v. floccosa Strobl = Pirus Amel. c. floccosa Guss. — Fg. di sotto, peduncoli e calici fioccoso-lanosi, bianchi; frutti solo alla fine glabri; fg. debolm. dentate solo all' apice. — *Sic. alle Madonie.*

d. macrocarpa Goir. (1904). — Frutti grandi il doppio del normale. — *Veron. nel M. Baldo e sui Lessini* (*Goir.*).

1849 (1) *Pirus Cydonia* α **sativa Goir.** et β **silvestris Goir.** (1904). — Questa seconda è la for. inselvat.

1850 (2) *P. communis* γ *amygdaliformis*. — *Veronese* (*Goir.*), *Elba* (*Sommier*).

for. crassipes, crastrovillarensis, latifolius et inaequalis *N. Terr.* (1889). — *Tutte in Cal. nel territ. di Castrovillari* (*N. Terr.*).

1851 (3) *P. Malus* α *silvestris* **a. glaberrima Strobl** (1886) (sub P. acerba). — Fg. di sotto interam. glabre o pelose solo sul nervo mediano.

b. hirsutiuscula Strobl (1886) (sub P. acerba). — Fg. giovani pelose di sotto, le adulte sparsam. e lungam. pelose su tutti i nervi. — *Sic. sull' Etna e sulle Madonie* (*Strobl*) *ecc.*

c. tenuiflora Bluff et Fing. = P. acerba β tenuifl. Boenningh. — Calici pubescenti all' apice, petali lanceolati, attenuati alle due estremità, piani, patenti. — *Veronese* (*Goir.*).

d. praecox (Bluff et Fing.) = Malus Borkh. — Alberetto precoce, a frutti maturanti alla fine di luglio. — *Colt.*

var. oblonga N. Terr. (1889). — Fg. più piccole, brevem. picciolate. Frutti bislunghi, rotondati alla base ed all' apice, non ombelicati. — *Cal. al M. Pollino col tipo* (*N. Terr.*).

1852 (4) *P. torminalis* **b. pubescens Goir.** (1904). — Fg., anche adulte, pubescenti di sotto almeno sulle nervature e sul picciuolo. — *M. Baldo* (*Goir.*).

1852 * *P. Aria* × *torminalis*. — *Veron. sul M. Precastio presso Cogolo* (*A. e C. Mass. ex Goir.*).

1853 (5) *P. Aria b. graeca* = P. Aria S. et S. = Sorbus Lodd. ex Stend. (1841) = P. meridionalis Guss. (1845) = Sorb. Aria v. incisa Lojac. — Distinguesi oltre che per i

Digitized by Google

caratteri indicati (Fl. An. II, p. 601), anche per le fg. generalm. più piccole (9-15 per 6-10 cm.) e con 5-8 paia (nel tipo 9-12 paia) di nervi soltanto e pel tomento più copioso di sotto.

1853 * *P. Aria* × *Aucuparia*. — Sec. K. Fritsch (Oesterr. bot. Zeitschr. 1899, p. 381) il *Sorbus hybrida L.* (= P. pinnatifida Ehrh. = P. hybr. Sm.) deve riferirsi all'ibrido *P. Aucuparia* × *suecica*, trovato finora nella Scandinavia.

All'ibrido *P. Aria* × *Aucuparia* appartengono invece i sinonimi: *P. semipinnata Roth* (1827) (non Sorbus semipinn. Borbás) = Sorb. hybrida Koch (non L.) = Pir. thuringiaca Ilse (1881) = Sor. thuring. Fritsch (1896).

1855 (7) *P. Aucuparia* **a. lanuginosa Beck** = Sorbus Kit. — Gemme vellutate o tomentose. Foglioline ed infiorescenza più o meno pelose. Foglioline lanceolate o bislunghe, acute od acuminate. Frutti globulosi.

b. praemorsa (*Guss.*). — Fg. villosette di sotto. Peduncoli tomentosi, eretti. Foglioline ellittico-oblunghe ed ottuse. Frutti ellittici.

c. glabra Goir. (1904) = Sorbus Gilib. = S. Auc. v. glabrata Wimm. et Grab. — Gemme poco vellutate o talora glabre. Foglioline ed infiorescenze glabrescenti o glabre. Il resto come in a. — *Alpi Mar., Cors. al M. Renoso* (*Rotgès, Mand. et Fouc.*), *al M. Rotondo a 1950 m. ed al M. Cinto a 2000 m.* (*Briq.*) *e certam. altrove nel continente.*

d. macrocarpa Goir. (1904). — Frutti grandi il doppio del normale. Albero grande. — *Veronese* (*Goir.*).

1856 (8) *P. domestica* **a. pomifera Goir.** (1904) = Sorbus dom. α pom. Rchb. — Frutto globoso.

b. pirifera Goir. (1904) = Sorbus dom. β pir. Rchb. — Frutto piriforme.

c. rupestris Goir. (1904). — Fg. più piccole, più acutam. seghettate, pubescenti di sopra, villose di sotto assieme ai picciuoli, non mai denudate, neppure alla fine dell'autunno. Pianta piccola, sterile. — *Veron. presso Grezzana e M. Baldo nel Gazo* (*Goir.*).

LEGUMINOSAE.

1866 (4) *Lupinus hirsutus* β *micranthus*. — *Cors. presso Bastia* (*Mand. e Fouc.*).

1867 (5) *L. luteus L.* — *Ritrovato sull'Etna in parecchi luoghi* (*Cavara*).

1870 (2) *Cytisus alpinus*. — *Cal. citer. al M. Palanuda nel territ. di Mormanno (B. Longo)*.

1871 (3) *C. nigricans* **for. sericeus Rochel** = for. nanus Favrat? — *C. Ticino al San Salvatore* (*Chenev.*) *ed altrove*.

1875 (7) *C. aeolicus* β **Bartolottae (Tod.)**. — Foglioline più piccole, subeguali al picciuolo comune (nel tipo più lunghe di questo). Peduncoli più brevi della corolla (nel tipo più lunghi). Pianta più glabra in ogni parte ed anzi nei legumi affatto glabra (nel tipo a legumi pelosetti sul dorso e lungo la sutura). — *Lipari* (*Mandralisca ex Tod.*).

1876 (8) *C. triflorus*. — *Trovasi anche nella bassa Valle d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

1878 (10) *C. purpureus* **b. albiflorus M. Gortani** (1903), **Goir.** (1904). — Corolla bianca. Calice scolorato. — *Friuli presso Tolmezzo. ove forma larghe colonie* (*Gortani*), *Veron. nell'altipiano di Rivoli* (*Goir.*).

1879 (11) *C. hirsutus* α *typ.* **c. ciliatus Koch.** — Ovario e legumi glabri sulle facce, irsuto-cigliati al margine. — *Tir. mer. presso Bolzano a Rentsch* (*Sauter*).

d. purpurascens Evers (1896). — Corolla rossa come nel *C. purpureus*. Legumi quasi glabri ai lati. — *Trento a Goccia d'Oro* (*Evers*).

δ *supinus* **c. grandis Goir.** = Genista supina β grandis Rouy. — Pianta di 5-6 dm., a foglioline lunghe 15-18 mm. — *Nell'area della spec.: Veron.* (*Goir.*).

d. microphyllus Goir. = Genista supina γ microph. Rouy. — Pianta di 2-3 dm., a foglioline lunghe 4-8 mm. (nella for. genuina lunghe 10-14 mm.). — *Colla prec.*

Oss. — Sono da riferirsi ancora al *C. hirsutus*, ma ulteriorm. da studiarsi per vedere se siano forme distinguibili:

Digitized by Google

C. biflorus B **calabrus Ten.** (Fl. Nap. V, p. 94) = C. biflor. γ subspinescens DC. Prodr. II, p. 155, p. p., Ten. Syll. p. 343, p. p. — *Cal. alla Sila* (*Thomas ex Ten.*).

C. Lamarckii A **stabianus Ten.** (Fl. Nap. V, p. 95). — *M. S. Angelo di Castellamare* (*Ten.*) *e Cava dei Tirreni* (*L. Marcello*).

B **lucanus Ten.** (l. c.). — *Basil. e Cal alla Sila* (*Ten.*).

(?) **C. proteus Zum.** (Fl. Pedem. II, p. 192). — *Vercellese nella valle del Sessera presso l'acqua sino a Crevacuore* (*Zum.*). — Quid?

1883 (1) *Genista sagittalis* **b. minor Ten.** (Fl. Nap. V, p. 95). — Fruticulosa, pubescens. — *Regno nap.* (*Ten.*).

1884 (2) *G. pedunculata* α *typ.* — *Abr. anche alle Gole d'Androdoco* (*Mozzetti ex Ten.*).

1886 (4) *G. tinctoria* α *typ.* **c. Marii Favrat** = v. insubrica Bruegg. — Fg. più strette, racemi più gracili e fi. più piccoli che nel tipo. — *Lago di Como a Tremezzina* (*Christ*) *e C. Ticino.*

δ *mantica.* — *Sul gneiss delle Alpi Graie or. in Val Brengolle e Col di Valbella* (*L. Vacc.*); *forma volgente alla var. apennina.*

η *apennina.* — *Appen. parmig. al M. Caio* (*Bolzon in litt.*).

1888 (6) *G. pilosa* **for. subsericea Rouy** (?). — *Parmig. fra Bosco di Corniglio e il lago Santo* (*Bolzon*). —Forse il nome è errato e doveva essere *b. subalpina Rouy.*

1892 (10) *G. germanica* α *typ.* **d. insubrica R. Keller** (1903). — Pianta con rami ascellari fogliosi portanti delle spine di secondo ordine. Infiorescenza povera, con fi. grandi $^2/_3$ del normale. — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Keller*).

1900 (18) *G. ephedroides.* — *Isola di Ponza* (*Béguinot!*).

1901 (19) *G. aetnensis.* — *Messina presso il torrente Camaro e Portella di Castanea; forse inselvat. dietro coltura* (*Zodda*).

(?) **G. cordifolia Porta** (Accad. Sc. Rovereto, 1905). — *Trent. nel territ. di Bressanone presso il confine colle Giudicarie ad 800-1000 m.* (*Porta*).

1904 *Ulex europaeus.* — *Tir. mer. a Bolzano sopra S. Osvaldo* (*Sauter*), *Litorale friuliano* (*Brumati*), *T. di Lavoro tra Pietramelara e Pietravairano* (*N. Terr.*), *Avellinese* (*Cassitto, Milani*).

b. ligusticus. — *Carnia a Tolmezzo sopra la Picota a m. 500* (*Gortani!*).

1905 *Calycotome spinosa* β *infesta.* — Fi. giallo-dorati od anche (**b. pallidiflora Strobl,** 1903) bianco-giallognoli. — *La for. b. alla Madonie in Sic.* (*Strobl*).

δ *villosa* **b. inermis Somm.** (1902). — Rami allungati, molli, fogliosi sino all'apice, mai spinosi. Fi. meno affastellati, anzi spesso solitari. — *Isolotto dei topi nel canale di Piombino* (*Somm.*).

1906 (1) *Ononis spinosa* α *spinosa* **d. albiflora Goir.** (1904). — Corolla bianca. — *Veron.* (*Goir.*) *ecc.*

1908 (3) *O. mitissima.* — *Avellinese* (*Casale e Guss.*), *Elba* (*Sommier*).

1909 (4) *O. serrata* **var. major Lge.** — *Linosa* (*Ross*).

1910 (5) *O. alba* β *oligophylla.* — *Avellinese* (*Guss., Ten.*).

1911 (6) *O. alopecuroides.* -- *Avellinese* (*Guss.*).

1913 (8) *O. pusilla,* **d. macrantha L. Vacc.** — Corolla grande, sorpassante il calice. — *Aosta* (*L. Vacc.*).

1914 (9) *O. pusilla.* — *Elba* (*Martelli ex Somm.*).

1915 (10) *O. minutissima* **b. calycina Wk. et Lge.** — Denti calicini allungati, sensibilm. più lunghi della corolla e delle fg. fiorali. — *Cors. a S. Bonifacio* (*Fouc. et Sim.*).

1916 (11) *O. Natrix* α *typ.* **d. arachnoidea (Lap.).** — Pianta mollem. villoso-lanosa, non o poco vischiosa. Vessillo striato di porpora. — *Veron. al M. Pastello e nell'altipiano di Rivoli* (*Goir.*).

e. picta (Desf.) = var. media Boiss. — Pianta più bassa, assai pelosa, vischiosa, a peduncoli più corti delle fg. e fi. grandi circa metà del tipo, a vessillo fortem. striato di porporino. Racemo ora (**subfor. laxa Rouy**) breve e lasso, ora (**subfor. conden-**

Digitized by Google

sata [Gr. et Godr.] Gr. et Godr.) denso, più allungato e con fi. più numerosi. — *Veron.* (*Goir.*).

f. **Perusiana Gr. et Godr.** = O. picta Lap., non Desf. — Pianta assai meno vischiosa e villosa che nel tipo, quasi verde, a fg. più piccole, avvicinantesi alla var. *ramosissima*. — *Veron.* (*Goir.*).

1919 (14) *O. Sieberi*. — *Eolie a Lipari* (*Zodda*).

1926 (21) *O. rotundifolia* b. **cuneata L. Vacc.** — Foglioline tutte obovato-cuneiformi (anche la mediana), più piccole del normale. — *Val d'Aosta a la Thuile* (*L. Vacc.*).

1927 (1) *Medicago lupulina* α *typ.* c. **canescens Moris.** — Foglioline peloso-biancastre. — *Sard. a Cagliari* (*Moris*), *Cors. presso Soveria* (*Fouc. et Sim.*).

c. **eriocarpa Rouy.** — Legume pubescente o vellutato. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*), *Veron.* (*Goir.*) *ecc.*

1928 (2) *M. arborea*. — *Nat. anche a Mentone e S. Remo* (*Sauvaigo*).

1930 (4) *M. sativa* β *varia a. spuria* (*Hy*) = M. sat. β versicolor Koch = M. varia α pseudo-sativa Rouy = M. sativa × falcata Rouy. — Legumi glabri, con $1^1/_2$-2 giri di spira.

b. **pseudo-falcata Rouy** = M. falcata β versicolor Wallr. = M. media Bor. = M. falcata × sativa Rouy. — Legume glabro, con 1 giro di spirale. — *Veron.* (*Goir.*).

c. **pseudo-glomerata Rouy** = M. sativa × glomerata Burn. — Legumi un po' più piccoli che nelle due for. prec., pubescenti-glandolosi, con 1-2 giri di spira. — *Alpi Mar.* (*Burnat*).

δ *falcata* **for. silvestris Fr.** — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

for. cyclocarpa (Hy). — Fi. violacei. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

1933 (7) *M. orbicularis* α *typ.* **for. ambigua** (Jord.). — *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).

1935 (9) *M. rugosa*. — *Malta nell'isola Gozo* (*Duthie*).

c. **glandulifera Strobl** (1887). — Legumi peloso-glandulosi. — *Sic.* (*Strobl*) *ecc.*

1939 (13) *M. truncatula* β *tribuloides* e. **rectiuscula Rouy** (Fl. de Franc. V, p. 23). — *Cors.* (*ex Rouy*).

1940 (14) *M. litoralis d. cylindracea*. — *Malta nell'isola Gozo* (*Duthie*).

1941 (15) *M. turbinata* β *olivaeformis*. — *Isola del Giglio* (*Martelli ex Somm.*).

1946 (20) *M. minima* β *recta* d. **latifolia Goir.** (1904). — Foglioline obcordate, larghe 10 mm. e più. Pianta quasi glabra, alta 45-50 cm. — *Veron.* (*Goir.*).

1947 (21) *M. coronata*. — *Cors. a Prunelli di Fiumorbo* (*Pieri ex Fouc.*).

1951 (25) *M. arabica* c. **pilosiuscula Lev.** — Fusti, fg. e peduncoli sparsam. pelosi per peli patenti, flessuosi. — *Nell'area della spec.*

d. **longispina Rouy.** — Legume a spine lesiniformi, assai arcuate, lunghe circa come la larghezza del legume. — *Col tipo; Veron.* (*Goir.*).

1952 (26) *M. hispida* β *lappacea* b. **paucigyrosa Guss.** = for. 2ª Lam. = M. gracillima Tin. — Legumi con 1-2 giri di spira. — *Sicilia ecc.*

1953 (27) *M. praecox*. — *Capri* (*Cerio e Bellini*).

Gen. Melilotus Vedi: O. E. Schulz, Monogr. der Gattung. Melilotus, in Bot. Jahrb. XXIX, p. 660-735 (1901); Zodda, in Malpighia 1902, p. 351.

1956 (1) *M. messanensis* b. **stoechadica O. E. Schulz.** — Fusti più bassi. Legumi terminati da una punta acuminata e diritta e perciò pungenti. — *Sic. a Mazzara* (*ex Zodda*).

c. **caespitosa O. E. Schulz.** — Fusti brevi (5-10 cm.), cespugliosi. — *Sic. a Mazzara* (*Zodda*) *e Sard.* (*ex Schulz*).

1957 (2) *M. sulcata* α *typica* d. **libanotica Ser. in DC.** — Legumi più grandi (lunghi 4 mm.). — *Col tipo.*

e. **Aschersonii O. E. Schulz.** — Fusti per lo più diffusi, un po' scabri. Foglioline con grossi denti. Legumi più piccoli (lunghi 2-$2^1/_2$ mm.). — *Presso Genova, Sic. a Comiso e Malta* (*ex Schulz*).

f. **humilis Rouy.** — Fusti di 6-10 cm. Foglioline delle fg. super. lineari. Racemi a 6-8 fi. e questi lunghi $2^1/_2$ mm. — *Istria, Tosc., Sic. e Lamped.* (*ex Schulz*).

Digitized by Google

g. **procerior Guss.** — Fusti alti circa 70 cm. Racemi più lunghi, con 30-35 fi., lassi, lunghi 2-4 volte le fg. — *Ischia* (*Guss.*) *e Sic. a Castelbuono* (*Minà ex Schulz*).

h. **diffusa O. E. Schulz.** — Fusti ramosissimi, a rami quasi orizzontali o talora prostrati. — *Col tipo.*

β *segetalis* b. **Salzmannii O. E. Schulz.** — Foglioline un po' più strette. Racemi a 20-30 o raram. 40 fi., lunghi il doppio della fg. Fi. lunghi 4-5 mm. Legumi un po' più grandi. — *It. centr. e mer., Sic. e Sard.* (*ex Schulz*).

c. **prostrata O. E. Schulz.** — Fusti alti 3 dm., prostrati. Foglioline più piccole, spesso subtriangolari. Racemi con 6-12 fi. Il resto come in b. — *Abr. a Pescara, Cal. a Gerace, Palermo e Cagliari* (*ex Schulz*).

γ *leiosperma* (*Pomel*). — Lo Schulz ne fa un sinonimo di *M. segetalis.*

δ *infesta* b. **elatior O. E. Schulz.** — Fusti robusti, alti 5-9 dm. Fi. lunghi 8 mm. — *Presso Messina* (*Zodda*) *ecc.*

1958 (3) *M. neapolitana.* — *Talora anche nella reg. subalp., come in Cal. alla Dirupata di Morano a 1300 m. circa* (*Adr. Fiori*).

b. **microcarpa** (**C. A. Mey.**). — Fusti spesso diffusi. Fi. lunghi $3^1/_2$ mm. Legumi lunghi 2 mm.; semi circa $1^1/_2$ mm. — *Sicilia* (*ex Schulz*).

c. **diffusa O. E. Schulz.** — Fusti ramosissimi dalla base, diffusi. — *It. centr.* (*ex Schulz*).

d. **simplex O. E. Schulz.** — Fusti semplici, alti 8-10 cm. — *Presso Roma* (*ex Schulz*) *e Messina* (*Zodda*) *ecc.*

e. **angustifolia O. E. Schulz.** — Foglioline delle fg. infer. bislungo-cuneate, quelle delle super. lineari. — *Presso Napoli* (*ex Schulz*) *ed isola Linosa* (*Solla ex Zodda*).

1960 (5) *M. elegans.* — *Sul colle di Montagnolo presso Ancona* (*Paol. e Card.*).

β **Pertusiana** (**Gennari**). — Fusti più ramosi. Legumi addensati, obovati, attenuati alle 2 estremità, acuti, con nervature più arcuate, bruni o verde-bruni. — *Lig. e Sard.* (*ex Schulz*).

γ **sardoa O. E. Schulz.** — Legumi acuti, più grandi (lunghi 5-7, larghi 4 e grossi 2 mm.), a 2 o raram. 1 seme. — *Sard. presso Dorgali a Osala* (*Mortelli ex Schulz*).

1961 (6) *M. indica* α *typica* b. **parvula Rouy.** — Fusti di 5-18 cm., diffuso-prostrati, con racemi a pochi fi. — *Liguria* (*ex Schulz*).

c. **angustifolia O. E. Schulz.** — Foglioline delle fg. infer. lanceolate, quelle delle super. lineari. — *Italia* (*ex Schulz*), *Lampedusa* (*Solla ex Zodda*).

γ *exaltata* (*Biv. ex Bianca*, 1857). — Questo nome va sostituito con quello anter. di: γ *Bonplandii* (*Ten.*, 1833). — *Anche in Sard.*

δ *densiflora Somm.* (1898). — Anche questo nome va sostituito con quello anter. di: δ *conferta Hausskn.* (1893). — *Aggiungi: Istria, Messina, Lampedusa.*

1962 (7) *M. dentata.* — *Val d'Aosta* (*Parl., Carrel*).

1963 (8) *M. officin.* α *Petitp.* b. **Vatkeana O. E. Schulz.** — Pianta alta 1-2 dm., eretta, ramosissima, ridotta in ogni parte, cioè: a foglioline lunghe 1 cm., racemi a circa 20 fi., fi. lunghi 4 e legumi 3 mm. — *Trent. in Val Fersina* (*W. Valtke*).

c. **arvensis** (**Wallr.**). — Pianta bassa, a fusti diffusissimi dalla base, ascendenti. Legumi un po' più grandi. — *Campi e luoghi asciutti.*

1963 (8 *bis*) **M. alba Desr.** — Lo Schulz (l. c.) mette in evidenza altri caratteri importanti dell'ovario per distinguere questa pianta dal *M.offic* cioè: *M. alba*, ovario sessile, con 3-4 ovuli, stilo incurvato; *M. offic.*, ovario stipitato, con 5-8 ovuli, stilo suberetto. Di conseguenza crediamo meglio conservarle come spec. distinte. — *Cors. presso Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*).

b. **oxycarpa O. E. Schulz.** — Legumi più grandi (lunghi 4-4,2 mm.), manifestam. attenuato-apicolati. Pianta più robusta. — *Presso Pavia e Pistoia* (*ex Zodda l. c.*).

c. **tenella** (**Wallr.**). — Fusti semplici. Fi. piccoli, coi petali tutti circa egualm. lunghi. — *Nell'area della spec.*

1964 (9) *M. altissima* α **eualtissima O. E. Schulz.** — Fusti a rami suberetti. Foglioline grandi, generalm. lunghe 3 o raram. $4^1/_2$ cm., le infer. obovate, le super. bislunghe,

Digitized by Google

acutam. e grossam. dentate quasi sino alla base. Racemo denso. — *Da ricercarsi nell' It. bor.*

β **macrorrhiza** (**Pers.**) = Trifol. W. et K. — Fusti più alti, a rami diffusi, ramosissimi. Foglioline più piccole, lunghe 1 $^1/_2$-2 cm., più strette, denticolate od anche (*b. palustris* [*Kit. in DC.*] = Trifol. W. et K.) le super. intere o quasi e più lunghe. Racemo lasso, a circa 30 fi. — *Dall' It. bor. sino alle Puglie e Basil.*

γ **linearis** (**Cav. in Pers.**). — Fusti frutescenti, ramosissimi. Foglioline piccole, lunghe 1 cm. e larghe circa 1 $^1/_2$ mm., intere o quasi. Racemo lasso, a 10-25 fi. — *Istria, It. bor., Lig., Tosc.; probabilm. è la for. più diffusa da noi.*

1970 (6) *Trigonella corniculata.* — *Presso Brescia estesam. nat. alla Bornata e nel Cidneo* (*Ugolini*).

1970 * *T. Pes-avium Bert.* — Secondo Chiovenda (Malpighia XIV, 1900, p. 10) sarebbe uguale alla *T. Balansae Boiss. et Reut.* dell' Asia occ., ciò deducendo dalla corrispondenza delle due diagnosi, non avendo potuto fare il confronto di esemplari.

1973 (3) *Trifolium subterraneum* **var. Marsillyi Fouc. et Sim.** (1898). — *Corsica* (*Fouc. et Sim.*).

1974 (4) *T. arvense* α *agrest.* **b. littorale** (**Jord.**) = T. arv. v. perpusillum Ser. in DC. — *Cors. presso Ajaccio* (*Fouc. et Sim.*).

1978 (8) *T. striatum.* — *Nella Sila in Cal. trovasi sino nella reg. mont., ov' è anche colt. come foraggio* (*Adr. Fiori*).

b. *tenuiflorum.* — *Colli Euganei* (*Bég.*); *a questa for. deve pure riferirsi* (*sec. Béguinot*) *il T. scabrum v. lucanicum citato dal Fiori degli stessi Colli.*

1979 (9) *T. scabrum.* — *Sale talora sino alla reg. mont., come al M. Cocuzzo in Cal.* (*Adr. Fiori*).

1980 (10) *T. phleoides* β **Audigieri Fouc.** (1900). — Differisce dal tipo pei fusti più gracili, il centrale portante, opposto alla fg. super., un ramo divaricato ad angolo retto, pei capolini fortem. conici e pel calice a denti assai più brevi. — *Cors. a Calacuccia in quel di Niolo* (*Audigier ex Fouc.*) *ed a Bastia* (*Revel. exs. sub T. tenuiflorum Ten.?*).

1984 (14) *T. Cherleri.* — *Sale anche sino alla reg. mont., come in Cal. sopra Paola ed alla Sila* (*Adr. Fiori*).

1986 (16) *T. stellatum.* — *Dintorni di Reggio E.* (*Casali*).

1987 (17) *T. incarnatum* **e. depauperatum Negri ap. Goir.** (1904). — Pianta ridotta in ogni parte, ricordante il *T. lagopus.* — *Mantov. al Bosco Mantico e Piem. a S. Martin d' Aosta* (*ex Goir.*).

1989 (19) *T. angustif.* β *intermedium.* — *Elba* (*Sommier*).

1991 (21) *T. leucanthum.* — *Barese* (*Palanza*).

1993 (23) *T. maritimum.* — *Elba* (*Sommier*).

1994 (24) *T. echinatum.* — *Veron. nella valle di Caprino* (*Goir.!*), *presso Cesena* (*Del Testa*), *Elba* (*Sommier*).

1995 (25) *T. ochroleucum b. roseum.* — *Veronese in più luoghi* (*Goir.*).

c. Burnati Briq. (1901). — Pianta alta 10-15 cm., a rd. grossa e profonda. Fg. piccole, a foglioline obovato-arrotondate, più o meno grigiastre (5-8 per 5-6 mm.). Fusti ascendenti o sdraiati. Capolini quasi sferici anche a maturità (2 $^1/_2$-3 cm. diam.). Calice poco contratto alla fauce, a dente infer. lungo 3 volte il tubo. Corolla bianco-giallastra. — *Cors. a Serra di Pigno a 900 m.* (*Briq.*).

d. pollinense N. Terr. (1889) — Fusti ramosi, bassi (1 dm.?). Fg. infer. con picciuoli lunghi e gracili; foglioline piccole, ovate od obovate, smarginate. Capolini a pochi fi. — *Cal. al Piano di Pollino* (*N. Terr.*).

1998 (28) *T. pratense* α *typ.* **e. villosum Wahlb., Goir.** — Pianta coperta di lunghi peli bianchi, setolosi, patenti o riflessi. — *Col tipo.*

f. microphyllum (**Desv.**) = for. delicatulum Goir. — Pianta di 1-3 dm., ridotta in ogni

Digitized by Google

parte, a foglioline piccole, obovali. — *Veron.* (*Goir.*), *M. Vettore nel Piceno* (*Paol. e Card.*) *ecc.*

g. **albiflorum Goir.** (1904). — Corolla bianca. — *Col tipo.*

β[1] **americanum Harz.** — Distinguesi dalla *var. sativum* per la pelurie patente nei fusti, stipole, picciuoli, pag. infer. delle foglioline e denti del calice, e pei fusti più lunghi e più deboli, sdraiato-ascendenti ed assai ramosi dalla base. — Sec. Haussknecht questa var. non sarebbe altro che la for. colt. del *T. prat. v. expansum* (*W. et K.*). — *Coltivasi.*

ε *nivale* e. **minor Rouy.** — Pianta piccola, a fusti gracili, ascendenti solo all'apice, semplici, a foglioline 1-2 volte più piccole. Capolini più piccoli. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

η *pallidum.* — *Elba* (*Sommier*).

1999 (29) *T. medium* c. **microphyllum Lej.** = T. affine Lej. in DC. — Foglioline ellittiche, 1-2 volte più piccole del normale. Capolini poveri. — *Veronese* (*Goir.*).

2000 (30) *T. alpestre* d. **humile Goir.** (1904). — Pianta ridotta, alta 8-10 cm. — *M. Baldo* (*Goir.*).

2003 (33) *T. spumosum.* — *Isole del Giglio* (*Doria ex Somm.*) *e dell' Elba* (*Becc.*, *Marc.*).

2005 (35) *T. tomentosum.* — *Sabbie lit. a Cesenatico in Romagna* (*Del Testa*).

2008 (38) *T. levigatum.* — *Nella Sila in Cal. sale sino alla reg. mont. a circa 1550 m. al Tempone Morello presso Carlopoli* (*Adr. Fiori*).

2013 (43) *T. nigrescens* α *typ.* b. **macropodum** (**Guss.**) = Amoria macrop. Presl = b. Gussonei Fiori in Fl. An. II, p. 61. — Distinguesi dalla for. genuina (sec. Strobl, Dyalipet. d. Nebroden, in Verh. Zool. bot. Gesh. 1903, p. 542) pei denti calicini assai più lunghi e molto ricurvi indietro, subeguali tra loro in lunghezza, più lunghi del tubo e lanceolato-acuti, pei fusti più raccorciati e più densam. cespugliosi, pei peduncoli solcati e pei legumi generalm. a 2 semi e più brevi del calice. — *Sic.*, *assai raro.*

for. intermedium Rouy. — Pianta più robusta e più sviluppata in ogni parte. — *Piem. ad Ivrea* (*L. Vacc.*).

2017 (47) *T. repens* α *typ.* **for. viviparum Bolzon.** — Deve essere il *T. repens v. phyllanthum Ser. in DC.*, coi denti calicini trasformati in foglioline sessili o picciolettate e da considerarsi come una mostruosità od un cecidio. — *Polesine* (*De Bonis ex Bolz.*).

2021 (51) *T. filiforme.* — *Reggiano sopra Ramiseto* (*Casali*).

β *dubium* b. **microphyllum Ser. in DC.** (sub T. filif.) = T. controversum Jan. exs. = T. filif. β pygmaeum Soy.-Will. = T. filif. β minimum Gaud. — Pianta di 3-5 cm., ridotta in ogni parte, a fogliolina mediana subsessile. — *Nell' area della var.*

2022 (52) *T. Sebastiani.* — *Avellinese* (*Guss.*, *Milani*).

2026 (56) *T. campestre* β **pratense Posp.** (sub T. agrarium). — Pianta più robusta in ogni parte, forse talora bienne, a fusti ascendenti-eretti (3-4 dm.). Capolini circa del doppio più grandi, con peduncoli robusti, un po' divaricati, lunghi 2-4 volte la fg. Fi. intensam. giallo-dorati. Portam. che si avvicina a *T. aureum.* — *Istria e Friuli* (*Posp.*), *Euganei* (*ex Béguinot*).

2032 (2) *Anthyllis Vulneraria* α *typica* a. **lutea L.** (1755) et *b. alba L.* (1755) = A. rustica Mill. (Fl. An. II, p. 68 [for. α b.]).

δ *rubra L.* (1755). — Corolla violaceo-porporina od anche (c. **coccinea L.** [1755]) rossa.

d. **variegata Evers** (sub A. Dillenii). — Vessillo ed ali gialle, poi aranciate, quindi rosso-brune. Calice non rigonfio, violetto-scuro. — *Trentino* (*Evers*).

var. pulchella Vis. = v. pauciflora Asch. et Hut. exs. — *Val d'Aosta a 1200-2700 m.* (*cfr. L. Vacc.*).

2033 (3) *A. montana* α *typ.* b. **alba Fiori** (1900). — Corolla bianca. — *Basil. sul m. Coccovello presso Lagonegro* (*Fiori*).

2034 (4) *A. Barba-Jovis.* — *Basil. al M. Arioso* (*Giordano*); *forse per scambio con A. montana?* (*Fiori*).

Digitized by Google

Gen. Dorycnium. — Vedi: M. Rikli, Die Gattung Dorycnium in Engler. Bot. Jahrb. XXXI (1902), p. 314-404 (pubbl. in Dec. 1901).

2037 (1) *Dorycnium pentaphyllum* γ *suffruticosum* **a. elongatum (Jord. et Fourr.).** — Denti del calice appena più brevi del tubo. Vessillo ellittico, subacuto. Legume subgloboso. Pianta alta, a rami rigidi, allungati. — *Nell'area della var.*

b. collinum (Jord. et Fourr.). — Denti del calice c. s. Vessillo obovato, acuto all'apice. Legume ovoide, subacuto. Pianta a rami gracili, rigidi. — *Nell'area della var.*

c. insulare (Jord. et Fourr.) = D. corsicum Jord. — Denti del calice lunghi circa $^1/_2$ del tubo. Vessillo strettam. obovato, subacuto. Legume c. s. Pianta a rami densi, allungati, rigidi. — *Corsica.*

d. humile (Jord. et Fourr.). — Denti del calice appena più brevi del tubo. Vessillo piccolo, largam. obovato, arrotondato. Legume globoso, piccolo. Pianta bassa, a rami brevi, flessuosi, diritti. — *Corsica.*

γ *suffruticosum.* — Pare non esista nel Parmig., perchè il Passerini, che ve l'aveva dapprima indicato, poi si corresse sostituendo il nome di *D. herbaceum* (cfr. Passerini Fl. cont. di Parma, p. 407); anche l'indicazione di Vallombrosa è errata e tale deve ritenersi pure quella del Moden. al M. Cimone (Adr. Fiori).

δ **germanicum** Rouy. = D. pentaph. α sericeum Neilr. (1859) = D. suffruticos. Koch (non Vill.) = D. decumbens Kern. exs. (non Jord.) = D. Jordani subspec. germanic. Gremli (1889) = D. suffrut. v. sericeum G. Beck (1893) = D. suffrut. v. german. Burn. (1896). — Distinguesi dalla *var. suffruticosum* per essere pianta più erbacea, bassa e gracile, per le fg. di una sola forma (nella *var. suffrut.* le basali sono invece assai più piccole delle super. e con peli meno appressati), pei pedicelli più lunghi, spesso sorpassanti $^1/_2$ del tubo del calice e pel legume ellittico-subacuto. — *C. Ticino, Comasco presso Canzo, M. Baldo, Trent. in Val Vestino, Goriz., Triest. ed Istria (ex Rikli l. c.); certam. da riferirsi qui anche le località del Bellunese.*

2039 (3) *D. hirsutum* α **hirtum Rikli** l. c. = Bonjeania hirta Jord. et Fourr.

d. prostratum Rikli l. c. = Bonjeania prostr. Jord. et Fourr. — Pianta prostrato-ascendente, a foglioline più grandi e legumi più grossi (lunghi 7-8 mm.). Ali del fi. avvicinate, quasi ricoprentisi (nella for. genuina allontanate). — *Nell'area del tipo.*

γ **glabrum Somm.** (1901). — Pianta affatto glabra. — *Isola di Pianosa insieme col tipo, ma in piccola quantità (Somm.).*

2040 (1) *Lotus coimbrensis.* — *Isola del Giglio (Doria ex Somm.).*

c. granatensis Wk. et Lge. (Strobl, 1903) = L. conimbricensis Guss. — Fusto semplice. Fg., stipole e calici con lunghe e rade ciglia. Denti calicini lineari-setacei, un po' più brevi del tubo. Corolla a vessillo rossigno, ali bianche striate di rosso, carena bianchiccia coll'apice porporino-scuro (ex Wk. et Lge.). — *Sic. (ex Strobl).*

2041 (2) *L. angustissimus* α *typ.* **f. incanus Strobl** (1903). — Fg. assai densam. pelose, grigiastre. — *Sic. alle Madonie (Strobl).*

2043 (4) *L. corniculatus* α *arven.* **d. minor Rouy.** — Pianta ridotta, assai pelosa. — *Val d'Aosta (L. Vacc.).*

e. pilosissimus Rouy. — Pianta molto pelosa, quasi biancastra. Fg. e stipole di grandezza media. — *Val. d'Aosta (L. Vacc.).*

f. parvifolius Rouy. — Fg. e stipole 2-3 volte più piccole dell'ordinario. — *Col tipo: Veron. (Goir.).*

g. latifolius Schur. — Pianta di 3-5 dm., più robusta, a fi. lunghi 10-12 mm. — *Colla prec. (Goir.).*

h. grandiflorus Rouy. — Fg. grandi. Fi. lunghi 13-15 mm. — *Veron. (Goir.).*

i. rubriflorus Lamotte. — Petali porporini. — *Col tipo.*

δ *pedunculatus.* — *Bresciano a Bione e Montesnello (Ugolini).*

2045 (6) *L. ornithopodioides.* — *Presso Cesena (Del Testa).*

2055 (3) *Astragalus sesameus.* — *Avellinese (Ten.).*

2065 (13) *A. australis* α *typ.*, **b. canescens L. Vacc. in Beauverd** (1903). — Pianta tutta

Digitized by Google

grigio-pubescente per peli appressati od un po' patenti. Legumi con stipite lungo almeno come il calice. — *Val d'Aosta al Col de Fenêtre alla Balme a 2400 m.* (*L. Vacc.*).

c. **minor Rouy** (1899). — Pianta quasi glabra, nana (5-15 cm.). — *Nell'area della spec.: Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

β *Gerardi* **b. balmaeus Beauverd** (1903). — Differisce per le stipole largam. ovali-ottuse (non lanceolato-acuminate) e pel denso indumento grigiastro-lanoso, a odore muschiato. — *Val d'Aosta alla Balme, colle for. preced.* (*Beauverd*).

2067 (15) *A. montanus* β *lapponicus.* — *Tir. mer. al Seiseralpe e presso Runggaditsch* (*Sauter*).

2068 (16) *A. pilosus.* — *Vicino all'Adige presso Legnago in un prato sabbioso, probabilm. importato colla rotta del 1882* (*Bolzon*).

2070 (18) *A. campester c. alpinus.* — *Sul calcare di Champorcher nelle Alpi Graje or. ed a Grauson nella Val di Cogne* (*L. Vacc.*), *Abr. sul M. Greco* (*Ten.*).

2078 (26) *A. Onobrychis* c. **major Rouy.** — Pianta di 5-6 dm., robusta (fusto di 4 mm. di diam.), suberetta, a racemi frutt. lineari, lunghi 6-10 cm. — *Verona lungo l'Adige* (*Goir.*).

2072 (20) *A. Hypoglottis* γ *purpureus.* — *Cal. occ. presso Saracena al Piano di Novacco* (*B. Longo*).

2081 (29) *A. alopecuroides.* — *Val di Cogne tra Epinel e Cretaz a 1300-1400 m.* (*scopertovi dal Thomas nel 1810*), *con piccole colonie in luoghi vicini sino a 2000 m.; Valtornenche a mezzogiorno del Breuil* (*scopertovi dal De Saussure nel 1790*) *e nel territorio di Torgnon* (*Treves, ex L. Vaccari in Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 378*).

2084 (32) *A. siculus.* — *Sull'Etna è specialm. comune sul versante mer. da 1000 a 2400 m., più scarso sui versanti or. ed occ., mancante in quello nord, sempre nella reg. diboscata* (*cfr. Cavara in Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 358*).

2084 (32 *bis*) *A. calabrus* (*Ten.*) *Fisch. em.* = A. siculus **Ten.** (1831) (non Biv.) = A. eriocephalus Ten. (1811) (non W.) = A siculus v. calabrus **Ten.** (1835-36) = A. calabricus Fisch. (1853). — È da ritenersi come spec. distinta da *A. siculus* e non var. di esso (cfr. Fiori in N. Giorn. bot. it. 1900, p. 264). — *Sila sopra Carlopoli e nel territ. di S. Giovanni in Fiore ove ricopre una larga estensione nella reg. submont. e mont.* (*Adr. Fiori*), *Sic. sull'Etna* (*Parl. ex spec. in hb. Patavino servato*).

2086 (2) *Glycyrrhiza echinata.* — *Basil. a Pomarico* (*Giordano*).

2092 *Robinia Pseudo-Acacia* γ **monophylla (Hort.).** — Fogliolina terminale grandissima (5-12 per 3-4$^1/_2$ cm.), le laterali nulle od 1-2 soltanto ed assai più piccole. Pianta inerme o quasi. — *Colt. nei viali.*

2093 *Colutea arborescens* β *alpestris Bolzon* = Astragalus penduliflorus (ex ipso).

2094 (1) *Scorpiurus muricatus* δ *subvillosus.* — *Polesine a Rosolina* (*Bolzon e De Bonis*).

2100 (2) *Coronilla cretica.* — *Colli di Cesena ed a Roversano in Romagna* (*Del Testa*).

2101 (3) *C. varia* c. **violacea Briq.** — Pianta più robusta (4-6 dm.), a fg. con 8-10 paia di foglioline largam. oblunghe od ellittiche. Corolla nel fresco di un bel violetto. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

2103 (5) *C. minima* α *typ.*, c. **fruticans (Jord.)** = C. **glauca** Asso (non L.) = C. min. β australis Gr. et Godr. = C. **rupestris** Miég. — Rz. grosso, fusti legnosi alla base, ascendenti-eretti, formanti un piccolo cespuglio alto 15-35 cm., a rami ispessiti. Foglioline bislungo-cuneiformi, mediocri. Ombrelle con 12-15 fi. — *M. Baldo in Piore* (*Goir.*); *da ricercarsi nella reg. medit.*

2106 (8) *C. Emerus* α *typica* **b. repens Chenev.** (1902). — Pianta con rz. sotterranei lunghi 30-50 cm., emettenti dei rami annuali alti 10-15 cm., con un fi. solitario $^1/_4$-$^1/_3$ più piccolo del normale. Fg. più piccole. — *C. Ticino ai Denti della Vecchia* (*Chenev.*).

β *emeroides.* — *Veronese* (*Goir.*), *Salernit. nel territ. di Cava dei Tirreni* (*L. Marcello*), *Cal. a Paola* (*Adr. Fiori*).

Digitized by Google

2107 (1) *Hippocrepis comosa* α *typ.*, **c. alpestris (Arv. T.).** — Pianta assai suffrutescente alla base (2-3 dm.), più glauca, a peduncoli lunghi 2-4 volte la fg. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*), *M. Baldo* (*Goir.*).

d. major Rouy. — Pianta di 4-10 dm., multicaule, assai ramosa, un po' legnosa alla base, a peduncoli lunghi 8-15 cm. e fi. lunghi 10-12 mm. — *Veron. sul M. Baldo e sui Lessini* (*Goir.*).

2108 (2) *H. multisiliquosa.* — *Linosa* (*Ross.*).

2112 (2) *Hedysarum spinosissimum* γ *capitatum.* — *Malta nell'isola Gozo* (*Duthie*).

2113 (3) *H. coronarium.* — *Elba* (*Sommier*).

2114 (1) *Onobrychis viciaefolia* α *sativa*, **b. decumbens (Jord.).** — Pianta più gracile. Denti calicini quasi il doppio del tubo. Ali più ottuse, quasi arrotondate. Legumi con spine decisam. più lunghe che la larghezza della cresta. — *Veronese* (*Goir.*).

γ *Gaudiniana.* — *Val d'Aosta* (*ex L. Vacc.*).

δ *Tommasinii.* — *Val d'Aosta a Diémoz* (*L. Vacc.*), *Veronese* (*Murr ex Goir.*).

2120 *Pisum sativum* γ *elatius.* — *Tir. mer. tra Gmund ed il lago Kalterer* (*Sauter*).

c. melanospermum Strobl (1887). — Semi neri (nel tipo screziati). Pianta ridotta. — *Sic.* (*ex Strobl*).

2124 (4) *Lathyrus articulatus* γ *Clymenum.* — *Cesena a S. Demetrio* (*Del Testa*).

2126 (6) *L. Cicera* α *typ.* **b. tenuifolius Fouc. et Sim.** (1898). — Pianta ridotta, cigliata. — *Cors. a Caporalino* (*Fouc. et Sim.*).

β *sativus* **c. angustatus Ser. in DC.** — Pianta più gracile, a fg. più strette.

d. latifolius Goir. (1904). — Pianta più robusta, a fg. più larghe.

2128 (8) *L. odoratus.* — *Inselvat. presso Toscolano nel Bresciano* (*Ugolini*) *e presso Ancona* (*Paol. e Card.*).

2130 (10) *L. silvester* α *typ.* **d. prolixus Goir.** (1904). — Fusto lungo 1-1$^1/_2$ m. Foglioline larghe 1$^1/_2$-4 mm. e lunghe 10-12 cm., eguaglianti i peduncoli. — *Monte Baldo ai Lumini* (*Goir.*).

e. brachyphyllos Goir. (1904) (**an Schur?**). — Fusto breve. Foglioline larghe 5-8 mm., lunghe 15-18 mm. Peduncoli lunghi 8-10 cm. – *Colla for. prec.*

β *latifolius* **b. abbreviatus Goir.** (1904). — Fusto semplice, largam. alato, insieme coi picciuoli. Fg. avvicinate, quasi embriciate, a foglioline bislungo-lanceolate, quasi sessili; stipole ovato-lanceolate, subeguali ai picciuoli. Peduncoli con circa 3 fi., molto più lunghi delle fg. Legumi cultriformi. — *Veron. nella Valpantena a Spredino* (*Goir.*).

2132 (12) *L. tuberosus.* — *Istria nel territ. di Parenzo* (*Calegari*).

2134 (14) *L. setifolius.* — *Elba* (*Sommier*).

α *typ.* **b. alatus Fouc. et Sim.** (1898). — Fusti alati e più alti. Peduncoli pelosi. Legumi con sino a 4 semi. — *Cors. a Belgodere e Caporalino* (*Fouc. et Sim.*).

β *heterocarpus.* — *Veronese* (*Goir.*).

2135 (15) *L. angulatus.* — *Reggiano a Piubello* (*Casali*), *Avellinese* (*Casale e Guss.*), *Elba* (*Sommier*).

2136 (16) *L. sphaericus* **d. stenophyllus Boiss.** — Foglioline strettam. lineari. Semi orbicolari-compressi. — *Aosta* (*L. Vacc.*).

2137 (17) *L. inconspicuus.* — *Abr. a Villavallelonga a 1000 m.* (*Grande L.!*).

2138 (18) *L. pratensis* **d. sepium (Scop.)** = var. latestipulatus Marchesetti. — Stipole più larghe (8-10 mm.). Pianta glabra. — *Nell'area della spec.*

e. Lusseri Heer = v. subalpinus Rouy. — Pianta più corta e più robusta, a foglioline più grandi, quasi glabre. Fi. grandi (lunghi 16-18 mm.). — *Val d'Aosta nella reg. mont. e subalp.* (*700-2000 m.*) (*cfr. L. Vacc.*), *C. Ticino a Fusio* (*Chenev.*) *ed altrove.*

f. montanus Lec. et Lam. — Pianta più bassa, diffusa, a fg. quasi vellutate. Fi. mediocri (lunghi 15-16 mm.). — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

2142 (22) *L. filiformis.* — *Marche a M. Pattino* (*Paol. e Card.*).

2143 (23) *L. pannonicus* β *varius b. angustissimus Fiori* = Orobus albus f. angustiss. Cocc.

Digitized by Google

2148 (**28**) *L. vernus* β *flaccidus*. — Foglioline larghe talora 5-8 mm. soltanto. — *Alpi trevigiane nel Cansiglio* (*Domenico Saccardo!*).

2151 (**2**) *Vicia Faba*. — *Sul M. Baldo in Ime coltivasi sino a 1131 m.* (*Goir.*).

b. equina Pers. (Rchb.) = V. Faba β L. = Faba vulg. β equina Bluff et Fing. = V. Faba β minor Goir. — Frutti e semi più piccoli, questi subrotondi. — *Colt. per biada.*

2154 (**5**) *V. pannonica*. — *Presso Ancona* (*Paol. e Card.*), *presso Messina* (*A. Vacc. in hb. Fiori!*).

2155 (**6**) *V. hybrida*. — *Trovasi talora anche nella reg. pad., come nel Polesine* (*Bolzon, Grigolato*).

2156 (**7**) *V. melanops*. — *Cal. a Capo Spartivento* (*Micheletti*).

2157 (**8**) *V. lutea* α *typ.* **b. violacescens Fiori** (1900). — Corolla a vessillo azzurro-porporino. — *Basil. presso Lagonegro* (*Adr. Fiori*) *e Colli Euganei* (*Bég.*).

c. amphicarpa Goir. = v. heterocarpa Goir. (1904). — Pianta con qualche legume alla base dei fusti, ripiegati su loro stessi e nascondentisi sotto terra. — *Verona* (*Goir.*).

2158 (**9**) *V. grandiflora* α *typ.* **c. Biebersteinii (Besser)** = V. sordida M. B. (non W. et K.) = V. grandifl. γ Biebersteiniana Koch. — Foglioline delle fg. super. lineari. — *Tir. mer. nel territ. di Bolzano* (*Sauter*) *e certam. altrove.*

2160 (**11**) *V. sativa* α *vulgaris* **for. torulosa (Jord.)**. — Legumi assai rigonfi, con semi giallastri marmorati di bruno. Foglioline delle fg. super. bislungo-lineari. — *Aosta* (*L. Vacc.*), *Veron.* (*Goir.*) *ecc.*

θ *cordata et* ι *heterophylla*. — *Ambedue nel Veronese* (*Goir.*).

μ *angustifolia* **b. parviflora Rouy.** — Corolla lunga 12-13 mm., pallida. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc.*).

c. albiflora Goir. (1904). — Corolla bianca. — *Veron.* (*Goir.*).

ν *Sallei* = V. sat. v. linearis Lge. — *Sic.* (*Strobl*).

var. diversifolia Strobl (Fl. d. Etna in Oest. bot. Zeitschr. 1887, p. 321). — *Catania nei campi al Simeto* (*Strobl*).

var. leptocarpa (Bianca, 1857). — *Sic. ad Avola nella Cava dell'Amico, un solo individuo* (*Bianca*).

var. stenophylla (Bianca, 1857). — *Sic. nei dintorni di Avola* (*Bianca*).

2161 (**12**) *V. lathyroides*. — *Lungo il Ticino in territ. di Abbiategrasso* (*Cozzi*).

2163 (**14**) *V. bithynica* **c. angustifolia Goir.** (1904). — Fg. strettam. lineari-lanceolate. — *Veron.* (*Goir.*).

d. sessiliflora Ser. in DC. — *Veron.* (*Goir.*).

2165 (**16**) *V. altissima*. — Sec. Béguinot (Bull. soc. bot. it. 1901, p. 112) la *V. polysperma Ten.* posta in sinonimia di questa spec., può essere distinta come for. **b. polysperma (Ten.)** per le foglioline ovato-oblunghe, più larghe nel mezzo ed arrotondate alla sommità e quivi mucronate (35-40 per 8-10 mm.). Mentre nella for. genuina tali foglioline sono invece insensibilm. attenuate in basso e troncate in alto (11-15 per 6-9 mm.). — *La forma b. si trova da sola nelle località del Nap., ma negli altri luoghi è frammista al tipo* (*ex Béguinot*).

2168 (**19**) *V. silvatica*. — *Appenn. Reggiano a Mora presso Toano ed a Montemiscoso* (*Casali*).

2174 (**25**) *V. Cracca* α *imbricata* **for. alpina Verlot.** — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

ε *tenuifolia*. — *Val d'Aosta* (*cfr. L. Vacc.*).

2175 (**26**) *V. atropurpurea*. — *Presso Ancona* (*Paol. e Card.*).

2176 (**27**) *V. villosa*. — *Elba* (*Sommier*).

β *dasycarpa* **d. albiflora Goir.** (1904). — Fi. bianchi. — *Veron.* (*Goir.*) *ecc.*

ε *Rosani*. — *Salernit. a Cava dei Tirreni* (*Leopoldo Marcello*).

ϑ *litoralis*. — *Dune del Polesine* (*Bolzon*).

2179 (**30**) *V. leucantha*. — *Barese nelle Murge di Bitonto* (*Palanza*).

2180 (**31**) *V. tetrasperma*. — *Elba* (*Sommier*).

δ *pubescens* **c. macrocarpa Béguinot.** — Denti del calice subuguali al tubo, legumi

Digitized by Google

lunghi 15-20 mm. con 6-7 semi rossastri, pianta glabra in ogni parte. — *Isola di Nisida nel golfo di Napoli* (*Bég.*).

d. **nebrodensis Strobl.** — Pianta alta soltanto 1-3 dm., a peduncoli costantem. 1-flori. — *Sic. alle Madonie* (*Strobl*).

2181 (32) *V. hirsuta.* — *Nella Sila in Cal. sale sino alla reg. mont. a 1600 m.* (*Adr. Fiori*).

2182 (33) *V. disperma.* — *Presso Ancona* (*Paol. e Card.*).

MYRTACEAE.

2193 *Myrtus communis* α *typ.* e. **microphylla Wk. et Lge.** — Fg. oblungo-lanceolate, acute, assai dense, lunghe 9-14 e larghe 5-7 mm. — *Isola di Giannutri* (*Somm.*).

β *tarentina.* — *Presso Firenze nella valle del Mugnone* (*Gemmi in Baroni*).

2194 *Punica Granatum* α *rubrum* a. **silvestre Strobl** (1903), **Goir.** (1904). — Arbusto a rami con lunghe spine. Frutto più piccolo, molto acido. — *Subspont. nelle siepi del Veron.* (*Goir.*), *Sic.* (*Strobl*) *ecc.*

b. **sativum Strobl** (1903), **Goir.** (1904). — Arboscello a rami con brevi spine. Frutto più grande e meno acido. — *Coltivasi.*

LYTHRACEAE.

2196 *Ammannia verticillata* b. **elatior Goir.** (1904). — Pianta alta 1 m. o più. — *Basso Veron.* (*Goir*).

c. **pumila Goir.** (1904). — Pianta bassa, strisciante, col portam. della *Peplis Portula.* — *Colla prec.*

2196 * *A. baccifera* L. β *ægyptiaca* (W.) = A. verticillata β ægypt. Paol. in Fl. An. II, p. 128. — Differisce dalla *A. verticillata* soprattutto per la cassula non completam. racchiusa nel tubo calicino, ma soltanto per $^1/_4$ - $^1/_2$ della sua lunghezza. — *Presso Pavia non sarebbe più stata ritrovata e quindi è da ritenersi che fosse puram. avventizia* (cfr. Koehne in Engler Pflanzenreich IV, 216, p. 55).

2197 (1) *Peplis Portula* b. **elatinoides Goir.** (1904). — Pianta piccola, col portam. della *Elatine hexandra.* — *M. Baldo* (*Goir.*).

2198 (2) *P. nummulariaefolia.* — Distinguesi da *P. Portula* anche per le fg., almeno alla base, e fusto negli angoli in alto minutam. scabro-cigliolato sotto la lente e pel calice frutt. a tubo un po' più lungo della cassula (nella *P. Portula* invece le fg. ed il fusto sono aflatto lisci ed il calice frutt. a tubo più breve della cassula). La cassula è talora irregolarm. deiscente come nella *P. Portula.* — Il Koehne (l. c. p. 62, sub Lythrum) distingue le seg. var. e forme:

A Fusto glabro o di rado minutam. ispido. Fg., almeno le infer., larghette alla base, sessili, sparse di piccole verruche, larghe 6 $^1/_2$-10 mm. Calice a tubo più lungo che largo. Stami 5-1, rr. 6.

a Fg. alterne o poche super. opposte, misuranti 6-11 per 2 $^1/_2$-6 $^1/_2$ mm., le medie ellittico-obovate, le super. spesso orbicolari-obovate, ottusissime. — *Pisano, Lazio, Sard. e Cors.* — P. australis R. et S. — P. tithymaloides Bert. — P. erecta Auct. it.

α **typica**

b Fg. infime alterne, le susseguenti quasi opposte, le super. disposte spiralm., misuranti 5-21 per 2 $^1/_2$-10 mm., spatolate o largam. obovate, acute od ottusissime. — Fi. ora (**a. hamulosa Nob.** = Middendorfia Trautv.) solitari e senza petali o raram. con 1-2, ora (**b. biflora (DC.)** = Lythrum Gay) quasi tutti geminati e con petali per lo più presenti. — *Da ricercarsi tra noi* [*Franc. mer. Alger. Costantinopoli*].

β **erecta (Req.)**

B Fusto pelosetto. Fg. tutte attenuate alla base, quasi picciolate, densam. puberule, larghe 2-3 $^1/_2$ rr. 5 mm. Calice nell'antesi tanto lungo o poco più lungo che largo. Stami 6.

Digitized by Google

— Petali nulli o talora pochi. Fg. bislungo-oblanceolate o bislunghe (lunghe 6-11 mm.), ora (**a. Boraei [Jord.]**) le infime alterne e le altre disposte in spirale, ora (**b. oppositifolia Nob.** = Lythrum numm. β boryst. f. oppositifolium Koenhe) tutte alterne ed assai strette. — *Tra noi solo la for. b. in Sard. a Cala d'Ostia* (*Ascherson*).

γ **borystenica (Bess.)**

2199 (1) *Lythrum Salicaria* α *typ. b. dubium* (cfr. Fl. An. II, p. 128 [for. b.]).

c. **gracile Zersi** (1871) = v. pumilum Evers (1896). — Fusto semplicissimo, virgato (3-4 dm.). Fg. tutte assai più piccole che nel tipo, bratteiformi, appressate al fusto. Spiga lassa, interrotta alla base, a verticillastri con brattee brevi, cordate alla base. — *Sul lago di Garda a Torbole* (*Zersi*), *Veron. sotto Rivoli* (*Goir.*) *e Trent. al M. Terlago* (*Evers*).

d. **bracteosum DC.** (1828). — Spighe allungate, con brattee più lunghe dei fi., riflesse dopo l'antesi. — *Trevig. a Valdobbiadene* (*Bérenger ex Vis. et Sacc.*).

β *tomentosum* (*Mill.*, *DC.*) (*cfr. Fl. An. l. c.* [*for. c*]).

a. **gracile (DC.).** — Fg. larghe $^1/_2$-$^1/_7$ della loro lunghezza. — *Specialm. nella reg. medit.*

b. **oblongum Koehne.** — Fg. larghe $^1/_4$ della loro lunghezza o più. — *Colla for. prec.*

2200 (2) *L. virgatum.* — *Presso Nizza nei dintorni di Drap* (*Deleuse ex Burn.*), *Comasco nei prati umidi dei monti di Bellagio e della valle d'Intelvi ed in Valtellina nella valle di Malenco* (*Comolli*).

2201 (3) *L. Graefferi.* — Il Koehne nei suoi vari lavori sulle Lythraceae ed anche ultimamente nella monografia inserita nel Pflanzenreich di Engler (IV-216 (1903)) dà la priorità a *L. flexuosum Lag.* (1816), attribuendo al nome Tenoreano la data del 1819 (Ten. Cat. ed. 2, p. 45), ma effettivamente tale nome apparve invece nel « Prodr. fl. Nap. Suppl. II, p. LXVIII (non p. XXVII come erroneam. scrisse il Tenore stesso nel predetto Catalogo e nella Sylloge) che fu pubblicato tra il 1811 ed il 1813. Quindi chiaro risulta che la denominazione Tenoreana deve avere la precedenza. — *Elba* (*Marcucci*).

2202 (4) *L. Hyssopifolia.* — Il Koehne pone come carattere distintivo principale tra le var. α e β la lunghezza del calice fruttifero, il quale misura (senza le appendici) 4-7 mm. in « α *typica* » e $2^1/_2$-3 mm. in « β *Thymifolia* », ch'egli tiene come spec. distinta. Quest'ultima sarebbe indicata anche del « *Lazio a Ponte Galera e Cisterna di Roma* (*ex Chiovenda*) ».

2203 (5) *L. tribracteatum* α **Salzmannii (Jord.) Koehne** = L. bibracteatrum Gr. et Godr. — Bratteole minime, bianchiccie, intere. — *Nell'area della spec.*

β **Candollei Koehne** = L. Thymifolia β major DC. = L. bibracteatum Salzm. in DC. (1828) = L. Thymifol. (L. p. p.) Guss. Pl. rar., Bert. — Bratteole più lunghe del calice, di rado assai più brevi, verdi, generalm. acute, denticulate. — *Col tipo.*

2203 * *L. thesioides.* — *Al confine del Veronese col Mantovano nelle risaie Demorta* (*Masè*); *ma non più ritrovato.*

OENOTHERACEAE.

Gen. Epilobium. — Vedi: Haussknecht. Monogr. der Gattung Epilobium, Jena 1884.

2204 (1) *Dodonaei* α **palustre Burnat** = Chamaenerion palustre Scop. (1772) = E. angustissimum Weber (1784).

β **nicaeense Burnat** (Fl. Alp. Mar. III, p. 176). — Differisce dal tipo per i rami grigiastri in alto, per le fg. biancastre da giovani, munite all'apice di una callosità nera appariscente e per lo stilo di 3-5 mm. più lungo degli stami. — *Nizz. a Duranus presso Levens* (*Barla ex Burnat*).

γ *alpinum Burnat* = E. angustifol. γ L. (1753) = E. rosmarin. β alpin. DC. (1815) = E. Fleischeri Hochst. (1826) (Fl. An. II, p. 131 [for. b.]).

Digitized by Google

2205 (2) *E. angustifolium* **b. verticillatum** (**Ten.**). — Fg. almeno in parte verticillate. — *Col tipo.*

c. albiflorum Hausskn. (1884), **Kohl** in Rchb. Fl. Germ. (1898-99). — Petali bianchi; sepali più pallidi. — *Istria* (*ex Hausskn.*), *Vallombrosa in una colonia abbastanza estesa* (*Fiori*).

d. brachycarpum (**Leight.**). — Cassule lunghe circa 2 cm., subeguali ai peduncoli e più grosse. — *C. Ticino nella Cima di Cagnone e sopra Airolo* (*Chenev.*).

e. macrocarpum (**Steph.**). — Cassule gracili, lunghe circa 5 cm., assai più brevi dei peduncoli. — *Da ricercarsi.*

2206 (3) *E. montanum* α *typ.* **c. grandiflorum Kerner** = for. subcordatum Hausskn. — Fi. lunghi 10-15 mm., in pianta a fg. più grandi (le intermedie 4-6 per 2-3 cm.), subsessili e dilatato-subcordate alla base. — *C. Ticino sopra Brusino Arsizio* (*Chenev.*).

β *collinum* (cfr. Fl. An. II, p. 131 [for. α c.]).

γ *lanceolatum* (cfr. Fl. An. l. c. [var. β]).

δ *Duriaei* (cfr. Fl. An. l. c. [var. γ]).

2206 * *E. montano* × *trigonum Hausskn.* = E. pseudo-trigonum Borb. = E. pallidum Tausch hb. ex Hausskn. — *Alpi Mar. nella valle di Pesio* (*Bicknell*).

2207 (4) *E. parviflorum* (*Schreb.*) *DC.* = Chamaenerion (Epilob.) parvifl. Schreb., *b. umbrosum* (*Dum.*) = E. rivulare Heg. (Fl. An. II, p. 131 [for. b.]) (non Whlnb. = E. palustre × parviflorum). — Pianta quasi glabra, più robusta ed a fg. più larghe e più flaccide, bruscam. contratte in picciuolo. - *Nei luoghi ombrosi.*

d. lejocarpum N. Terr. (sub E. pubescens). — Fg. infer. leggerm. pubescenti, le super. glabre unitam. alle cassule. — *Campania nella vallata del Volturno* (*N. Terr.*).

2207 * **E. parvifloro** × **hirsutum Rchb.** = E. intermedium Rchb. — *Trent. a Loppio* (*Evers*).

(?) **E. subhirsutum Gennari ap. De Not.** (Linnaea XXIV, 1851, p. 201). — Forse ibrido tra *E. hirsutum e parviflorum.* — *Lazio a M. Cavi* (*Genn.*).

2207 ** *E. parvifloro* × *roseum F. Schultz* = E. persicinum Rchb. — *C. Ticino a Muralto* (*Chenev.*) *ed altrove.*

2208 (5) *E. hirsutum* **d. villosum** (**Thunb.**) **Hausskn.** — Fusto munito di peli lunghi villosi e di altri più brevi glandulosi. Fg. villose in ambedue le pag., cenerino-verdastre. Fi. lunghi $1^1/_2$-2 cm. od anche (**subfor. Todari** [**Strobl ms. ex Hausskn.**]) 1 cm. soltanto. — *Nell'area della spec.*

2208 * *E. hirsuto* × *montanum Hausskn.* = E. purpureum Fr. = E. erroneum Hausskn. = E. montano × hirsutum Gelmi (Fl. An. II, p. 133, nota).

2208 ** **E. hirsuto** × **Tournefortii Hausskn.** (1881) = E. nebrodense Strobl in Hausskn. l. c. et in Verh. Zool. bot. Ges. 1903, p. 511. — *Sic. a Polizzi* (*Strobl*).

2209 (6) *E. palustre c. Schmidtianum* (*Rostk.*). — Sec. Haussknecht sotto questo nome furono confuse dall'Autore tre piante, cioè: *E. obscurum*, *E. palustre for.* ed *E. obscurum* × *palustre.*

2210 (7) *E. tetragonum* α *adnatum* (*Griseb.*) (Fl. An. II, p. 132 [var. α typ.]). — *Nell'Appenn. tosc. giunge sino alla reg. mont., come presso Boscolungo ed al Pratomagno* (*1450 m.*).

c. stenophyllum Hausskn. (1884). — Fg. strettam. lanceolate, lunghe 6 cm. e larghe 5 mm. Cassula più gracile, lunga 9 cm. Pianta a fusto e fg. spesso porporine. — *Istria presso Pola e Rovigno, Veron. a Peschiera e Pisa* (*ex Hausskn.*).

d. altissimum (cfr. Fl. An. l. c. [for. α e.]).

β *Lamyi* (Fl. An. l. c. [for. α c.]). — *Veron. a Peschiera, Pisa e Sic. alle Madonie* (*ex Hausskn.*).

γ *Tournefortii* (cfr. Fl. An. l. c. [var. β]). — *Malta* (*ex Hausskn.*).

δ *obscurum* (*Schreb.*, *Roth*) (Fl. An. l. c. [for. α d.]) = Chamaenerion (Epilob.) obscur. Schreb. — Differisce per la presenza di stoloni spesso numerosi, lunghi sino a 16-20 cm., portanti piccole fg. obovate, brevem. picciolate e separate da internodi lunghi

Digitized by Google

2-6 cm. (nelle altre for. gli stoloni sono nulli o ridotti a rosette di fg. sessili). — *Alpi Mar., C. Ticino, Lucca, Sard. e Corsica* (*cfr. Hausskn., Burnat*).

b. strictifolium Hausskn. = E. virgatum Fr., non Lam. — Fusto non stolonifero all'epoca della fioritura, robusto, ramoso, con fg. marcescenti alla base, per lo più rosso-porporino. Fg. sessili, lanceolate, lungam. attenuate all'apice, lunghe circa 6 cm. e larghe 8 mm., brevem. scorrenti, le super. pelose. — *Nei luoghi pingui solatii; Tosc. in più luoghi* (*cfr. Baroni*).

2211 (8) *E. alpinum* α *anagallidifolium* (*Lam.*) = α typ. Fl. An. II, p. 133.

γ *nutans* (Fl. An. l. c. [for. α b.]). — Distinguesi dalle due var. prec. anche per i semi papillosi. — *Tir. mer. ed Alpi Retiche e Leponzie specialm. sul versante svizzero* (*ex Hausskn.*).

2211 * *E. alsinaefolio* × *montanum Hausskn.* = E. salicifolium Facchini = E. nitidum Sauter p. p. = E. origanifolio × montan. Gelmi (Fl. An. II, p. 133 [nota]). — *Tir. al Brennero* (*Hausskn.*).

2211 ** **E. alsinaefolio collinum Hausskn.** = E. Huteri Borb. — *C. Ticino a Fusio* (*Chenev.*) *ed altrove.*

2211 *** *E. alsinaefolio* × *palustre Hausskn.* = E. Haynaldianum Hausskn. = E. palustre × origanifolium Gelmi (Fl. An. l. c.). — *Alpi Mar. nella valle di Riofreddo di Vinadio* (*Burnat*).

2211 **** **E. alsinaefolio × gemmascens Hausskn.** = E. gemmiferum Bor. = E. gemmascens Michalet. — *Alpi Mar. nella valle di Pesio presso il Gias Piano del Creus* (*Bicknell*).

2212 (9) *E. roseum* (*Schreb.*) *Pers.* = Chamaenerion (Epilob.) roseum Schreb.

2212 * **E. gemmascens C. A. Mey.** — Vedi su questa spec. critica: Burnat Fl. Alp. mar. III, p. 194-196. — Distinguesi soprattutto per la rd. stolonifera, per le gemme a forma di bulbilli esistenti all'ascella delle fg., per lo stimma capitato e per i semi densam. papillosi. — *Alpi Mar.* [*Cauc. Armen.*].

2212 ** **E. gemmascens × roseum Hausskn.** = E. bicolor et Biknelliarum Hausskn. ex Burnat. — *Alpi Mar. nel vallone di Rumiana di Pesio* (*Bicknell*).

2216 * (2 *bis*) *Oenothera muricata L.* — Oltre ai caratteri indicati (cfr. Fl. An. II, p. 134), differisce ancora da *Oe. biennis* per i fusti più gracili, per le fg. più piccole, le radicali bislungo-lanceolate (non bislungo-obovate), per le lacinie del calice ruvide all'esterno per peli portati da un tubercolo rosso, per la corolla lunga come le lacinie calicine (nella *Oe. bienn.* più breve di queste) ed infine per i semi bicompressi, piccoli e bruno-grigiastri (nella *Oe. bienn.* irregolarm. cubici, acutam. angolosi e bruni). Essa appare quindi essere una spec. distinta e non una var. di *Oe. biennis*, come il Paoletti (cfr. Fl. An. l. c.) ed altri la ritennero. — *Trovata anche in Tosc. a Viareggio nelle arene marittime contro alla pineta* (*Adr. Fiori, in sett. 1903*).

2217 (3) *Oe. stricta.* — Aggiungi all'area geogr.: *Argentina, Patagonia; nat. Spa., Franc. Inghilt.* (cfr. Arcangeli in Bull. soc. bot. it. 1899, p. 204). — È da osservarsi per altro che in Inghilterra è notata come inselvat. anche l'*Oe. odorata Jacq.*, spec. molto affine colla quale potrebbe confondersi.

2220 *Trapa natans* β *verbanensis.* — *Veronese nelle valli del Tartaro* (*Masè*).

HALORRHAGIDACEAE.

2222 (2) *Myriophyllum verticillatum.* — *Istria nella Valle del Quieto* (*Calegari in litt.*).

2223 *Hippuris vulgaris* **b. fluviatilis** (**Hoffm.**). — Pianta interam. sommersa, sterile, a fg. molli ed allungate. — *Veronese* (*Seg.*).

ARALIACEAE.

2224 *Hedera Helix* β *chrysocarpa.* — *Avellino alla villa Amabile* (*Baccarini*).

Digitized by Google

UMBELLIFERAE.

2232 (4) *Eryngium campestre* **c. contractum Micheletti** (Bull. Soc. bot. it. 1905, p. 234). — Rami raccorciati. Capolini più numerosi e più addensati, colle brattee involucrali uguali ad essi o poco più lunghe. Fg. cauline a contorno ovale-rotondo. — *Piemonte.*

d. elegans Micheletti (l. c.). — Rami più lunghi, biancastri assieme al caule. Capolini meno numerosi e più radi, colle brattee involucrali 2-3 volte più lunghe di essi, ellittico-lanceolate, un po' più patenti. Fg. cauline meno profondam. divise, talora semplicem. inciso-dentate. — *Piemonte.*

2233 (5) *E. amethystinum b. siculum Lojac. exs., Ross.* (1901) = E. dilatatum Bert., Guss. (non Lam.) = E. crinitum Lojac. (non Presl) = E. ameth. b. crinitum Paoletti in Fl. An. II, p. 149 (cfr. Ross, in Bull. herb. Boiss. 1902, p. 1215).

2243 *Hacquetia Epipactis — Friuli presso S. Pietro al Natisone nella valle dell' Erbezzo e dell' Alberone* (*M. Minio!*).

Gen. Bupleurum. — Vedi: Briquet, Mon. des Bupleures des Alpes Maritimes, Bale et Genève, 1897.

2244 (1) *B. rotundifolium* β *intermedium Lois.* (1810) (*Steud.* 1821) = B. subovatum Lk. (1818) = B. protractum Hoffgg. et Lk. (1820).

a. genuinum Briq. — Fg. infer. attenuato-perfogliate alla base, tutte (anche le super.) ottuse o subottuse ed apicolate all' apice, le infer. misuranti 2-8 per 0,8-3 cm.

b. Savignonei (*DNtrs.*). — È una forma mostruosa del tipo colle bratteole dell' involucro concrescenti sino a metà.

c. acuminatum Briq. — Fg. infer. largam. ovate alla base, insensibilm. attenuate in una lunga punta acuminata, misuranti sino a 12 per 4 cm., le super. pure acuminate. — *Lig. occ. sul M. Nero presso Bordighera* (*Bicknell ex Briq.*) *e meno tipico presso Porto Maurizio* (*Strafforello ex Briq.*).

d. Bicknellii Briq. — Pianta ridotta, fusti semplici, alti 12 cm. circa. Fg. infer. strette, allungate, misuranti 5 per 0,6 cm., acute e brevem. mucronulate. — *Lig. occ. a Bordighera* (*Bicknell ex Briq.*).

2245 (2) *B. stellatum.* — La for. *b. petraeum* (*L.*) va radiata (vedi n. 2251).

2249 *B. fruticosum* β **insulare (Rouy et Cam.).** — Differisce dal tipo per le fg. lanceolate, lungam. attenuato-acuminate all' apice, con reticolo di piccoli nervi più evidente e per l' involucro ed involucretto più tardivam. caduco. — *Cors. a Bastia* (*Kralik, Debeaux*).

2250 (7) *B. falcatum* γ **Lisae Briq.** (**Briq.**) l. c. p. 97. — Fg. basali bislunghe, lanceolate, larghe 1 cm. e lunghe 10 cm., acuminate, attenuate alla base in picciuolo alato, pennato-rettinervie, con poche anastomosi; le cauline medie simili, ma sessili. Fusto alto 30-35 cm., poco ramoso. — *Alpi piem. a S. Peire nella Valle di Varaita* (*Lisa ex Briq.*).

2251 (8) *B. graminifolium.* — Il Briquet (l. c., p. 74) combatte l' opinione di Caruel, che riferiva il *B. petraeum* L. al *B. stellatum*, e dimostra, come già altri avevano sostenuto, che esso deve riferirsi alla presente specie. Noi condividiamo tale modo di vedere e quindi la sinonimia sarà la seguente:

B. petraeum L. (1753) = B. graminifolium Vahl (1794).

a. lonchophorum Briq. — Involucretto a brattee ellittico-lanceolate od obovato-lanceolate, acuminate all' apice (5-8 per 1-2 $^1/_2$ mm.), più brevi od eguaglianti le ombrellette.

b. dolichatum Briq. — Involucretto a brattee lanceolate, ellittico-lanceolate o lanceolate, acuminato-acute all' apice (8 per 2-2 $^1/_2$ mm.), più lunghe delle ombrellette, che appariscono stellate. — *Alpi Mar. ecc.*

c. incurvum (Bell.) Briq. — Involucretto a brattee largam. ovali-lanceolate od ovali, subottuse all' apice (8-10 per 3-5 mm.), più lunghe delle ombrellette, che appariscono stellate. — *Alpi Mar. ecc.*

Digitized by Google

d. globosum Briq. — Involucretto a brattee largam. ovate, piuttosto ottuse all'apice (3-5 per 2-3 $^1/_2$ mm.), più brevi od eguali alle ombrellette, che appariscono globulose. — *Alpi mar. ecc.*

2252 (9) *B. ranunculoides.* — Il Briquet (l. c.) distingue le seg. var. e forme:

α *typicum* (cfr. Fl. An. II, p. 154).

a Involucretto a brattee largam. ovate, più o meno brevem. acuminate od ottusette ed apicolate all'apice, assai slargate alla base.

I Involucretto sorpassante le ombrellette, che appariscono stellate. — Fg. basali relativam. larghe. Piante robuste.

1 Fg. basali relativam. larghe. Fusti semplici o poco ramosi. — *Alpi Mar.* — B. ranunc. γ latifolium Gaud. **a. Burserianum (W.).**

2 Fg. basali meno larghe, molto allungate. Fusto più o meno ramoso. Involucretto a brattee meno grandi che nella for. prec. – *Alpi Mar. nei m. di Garessio, Val di Pesio e col della Maddalena.* — B. ranunc. v. Bicknellianum Briq. in sched. **b. proximum Briq.**

II Involucretto più breve od eguale alle ombrellette, che appariscono più o meno globulose. — *Nell'area della spec.* — B. ranunc. v. exiguum Timb. p.p. (1882). **c. humile Gaud.** (1828)

b Involucretto a brattee ellittico-lanceolate od ovato-lanceolate, più strette, acuminate od attenuato-cuspidate all'apice, attenuate alla base.

Δ Involucretto sorpassante le ombrellette, che assumono un aspetto stellato. — *Alpi Mar. ecc.* **d. obtusatum (Lap.)**

ΔΔ Involucretto più breve od eguagliante le ombrellette — *Alpi Mar., C. Ticino ecc.* **e. elatius Gaud.**

β *gramineum* (cfr. Fl. An. II, p. 154).

* Fusto semplice o quasi.

+ Involucretto a brattee strettam. lanceolate, assai più lunghe delle ombrellette, che assumono un aspetto stellato. — *Alpi Mar. a M. Galè e Col di Tenda e dintorni di Genova.* **a. actinoideum Briq.**

+ + Involucretto a brattee obovato-ellittiche, più brevi od appena più lunghe delle ombrellette. — *Alpi Mar. e certam. altrove.* **b. syntonum Briq.**

** Fusto ramoso, a rami ascendenti o subpatenti.

[1]) Involucretto a brattee strette, ellittiche, attenuate alla base, acuminate all'apice. — *Alpi Mar. a Garessio, Ponte di Nava ed Alpi di Viozene.* **c. telonense (Gren.)**

[2]) Involucello a brattee più larghe, ovali, brevem. acuminate all'apice. — *Franc. mer.; da ricercarsi nelle Alpi Mar.* **d. ramosum (Gaut. et Timb.)**

var. Souliei Coste (Bull. Soc. bot. de France 1903, p. CXX) = B. Souliei Calestani. — Vedi: Rouy, Fl. de France IX, p. 464. — *Cors. al M. Cinto a 2500 m.* (*Soulié ex Coste*).

2254 (11) *B. Odontites.* — Per maggior chiarezza e precisione ad «α *typicum*» si sostituisca «α *opacum Ces.* (1837) (*Lge.*, 1880)».

2257 (14) *B. Gerardi All.* (1774), *Jacq.*, p.p. (1775).

A Frutto a vallecole provviste di 3-5 listerelle. Involucretto più lungo dei fi. **α typicum**

a Pianta a rami numerosi, appressati, formanti una pannocchia piccola. Ombrellette a 5-8 raggi quasi eguali. **a. Jacquinianum (Jord.)**

b Pianta a rami patenti. Ombrellette ordinariam. a 3-6 raggi, con involucretto un po' più lungo che in *a*. Frutto più nettam. troncato alle estremità. — *Nell'area della spec.* — B. australe Jord. (1852). **b. patens Rchb.** (1824)

B Frutto a vallecole provviste di una sola listerella. Involucretto più breve od eguagliante i fi. — Infiorescenza più densam. fascicolata. Portam. che si avvicina a *B. junceum.* — *Nell'area della spec.* — B. affine Sadl. (1825-26) — B. Rissoni Rich. in DC. (1830). β **virgatum Rchb.** (1824) (Fl. An. II, p. 155 [for. b.])·

Digitized by Google

2257 * *B. filicaule Brot.?* — *Cors. al M. Felce, ma con dubbio per l' incompleto sviluppo della pianta* (*Fouc. et Mand.*); *proprio della Spa. e Port.*

2259 (1) *Trinia glauca* α **typica for. calabra N. Terr.**, sub T. vulgaris (1889). — Fg. a lacinie mucronulate, scabre al margine. Ombrelle lungam. peduncolate, a 4-5 raggi; pedicelli frutt. lunghi. Acheni ovali od ellittici. — *Cal. nelle basse Murge di M. Pollino* (*N. Terr.*).

β *dioica* (*Fourr.*). (Fl. An. II, p. 156 [for. c.]) = Pimpinella L. = P. pumila Jacq. = T. pumila Rchb. = Apinella dioica Calestani (1905). — *Italia sett.*

2259 * (2) *T. carniolica Kern.* = Seseli pumilum L. ? = Meum Dalechampii Ten. = T. pumila A. Kern. (non Rchb.) = T. glauca b. pumila Paol. (Fl. An. II, p. 156) = Triniella carniolica Calestani (1905). — Distinguesi, oltre che pel portamento nano e addensato, per le lacinie fogliari abbreviate e le ombrelle molto compatte; ma sopprattutto per i frutti biancastri, con 4 coste secondarie interposte tra le principali, tanto che il Calestani ne fa un nuovo genere. — *Alpi carniche e monti dell' Il. centr.*

2261 (2) *Bunium flexuosum.* — *Piem. in Valle della Bormida sopra Dego nelle faggete* (*E. Ferrari in litt.*).

2266 (6) *B. alpinum.* — *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*, *Adr. Fiori!*).

2271 (2) *Ammi Visnaga* **b. resiniferum N. Terr.** (1889). — Fg. resinifere alle ascelle, a lacinie numerose, mucronulate, largam. lineari. Ombrelle e fi. più grandi. Involucri pennatifidi. Acheni glabri. — *Cal. nel territ. di Castrovillari a Cammarata* (*N. Terr.*).

2273 (1) *Petroselinum hortense.* — *Elba* (*Sommier*).

c. heterophyllum Rchb. (1830-32). — Fg. cauline a segmenti cuneato-dilatati, incisi e lineari. Rd. sottile. — *Colt.*

d. latifolium DC. = Apium Mill. — Fg. infime trifide, dentate, con picciuolo lunghissimo. — *Colt.*

2276 (1) *Apium graveolens* **b. dulce (Mill.)** = A. Celleri Gaertn. — Fg. erette, a picciuolo lunghissimo, a segmenti 5 lobati, dentati. — *Colt.* — Volg. *Sedano.*

c. rapaceum (Mill.). — Fg. patenti, a picciuolo breve, a 5 segmenti dentati. Rd. tuberosa, quasi rotonda. — *Colt.* — Volg. *Sedano rapa.*

2278 (3) *A. nodiflorum* **for. phyllanthum Gillot** (sub Helosciad.). — *Corsica.*

2281 (2) *Sium latifolium.* — *Nell' Istria anche lungo il Quieto a nord di Visinada* (*Calegari*).

2282 *Cicuta virosa.* — La pianta della *Sila in Cal.* pubblicata con questo nome dal Solla è invece il *Chaerophyllum hirsutum* (!).

2285 (2) *Pimpinella saxifraga* β *hircina b. alpestris* **subfor. rubra Nob.** = P. alpina v. rubra Ugolini (1902). — Petali rossi. — *Bresciano all' Alpe di Vaja* (*Ugol.*).

2294 *Aegopodium Podagraria* **b. baldense Evers** (1896). — Fusti alti circa 1 m., slanciati. Fg. infer. lungam. picciolate; segmenti fogliari ellittico-lanceolati, lungam. acuminati, doppiam. dentati. — *M. Baldo nei boschi presso S. Giacomo* (*Evers.*).

2297 (2) *Seseli montanum.* — *Umbria sul M. Subasio* (*Bellini*).

2297 (2 *bis*) **S. austriacum (G. Beck) Drude** (1897) = S. Gouani Koch p. p. = Seselinia austr. G. Beck (1892) = Pimpinella Gouani Jacks. = P. seselinoides March. = S. mont. δ elatum Paol. p. p. (Fl. An. II, p. 167). — Sui caratteri distintivi di questa pianta in confronto del *S. elatum L. p.p.*, *Gouan.* vedi: Calestani, in Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 253. L'habitat certo di questa specie è il *Triestino*, ma probabilm. la sua area estendesi alle *Alpi Venete*, ciò che però non può asserirsi con certezza pel fatto di essere stata finora confusa col *S. elatum* (cfr. etiam Fl. An. II, p. 167, nota).

2298 (3) *S. tortuosum.* — *Elba* (*Sommier*).

2300 (5) *S. annuum* **b. viviparum Goir.** (1904). — Rami dell' ombrella allungati, portanti delle gemme foglifere. — *Veron.* (*Goir.*).

2304 *Silaus flavescens.* — *Non più ritrovato nel Veronese* (*Goir.*).

2310 (1) *Meum Mutellina* α **typicum.** — Fg. a segmenti secondari o terziari a contorno

Digitized by Google

largam. ovale-lanceolato, a lobi pennatifidi o moltifidi, i terminali 3-dentati nella metà super. — *Nelle Alpi.*

β **adonidifolium** (**Gay**, sub Ligusticum). — Fg. a segmenti secondari o terziari a contorno lungam. ellittico-acuminato, interi o 2-3 fidi, a lobi terminali interi o trifidi al disotto della loro metà. — *Alpi occid.*

2311 (1) *Ligusticum corsicum.* — Nell' unico esempl. (in fiore soltanto) di questa spec. esistente nell' Erbario centr. di Firenze (*M. d' Oro in Cors.* [*Jordan*]), le brattee dell' involucro variano in numero da 1 a 4-5; quelle dell' involucretto sono un po' più brevi dell' ombrelletta. I frutti disegnati nella Iconografia, ci furono trasmessi dal Museo di Parigi per gentilezza del sig. Bonnet.

2312 * (2 *bis*) **Ligusticum cynapiifolium Viv. ap. DC.** — Differisce da *L. ferulaceum* (sec. Rouy et Cam. Fl. de France VIII, p. 283 e 284) per l' involucro a più foglioline lineari, intere, acute, caduche, pel frutto oblungo, a costole liscie, per l' ombrella piccola a 6-12 raggi e per le fg. a contorno triangolare. Dal *L. corsicum* differisce per gli stessi caratteri dell' involucro e del frutto e pel calice brevem. 5-dentato. — *Cors. al M. Rotondo* (*Viv.*) *e M. d' Oro* (*Kralik*) [*Endemico*].

2313 (3) *L. pyrenaeum* β *Kochianum* (*Rouy et Cam.*) = L. Seguieri Koch (non Vill.) (cfr. Fl. An. II, p. 172 [var. β]).

2320 *Bonania resinosa Strobl* = Laserpitium Presl. — Si sostituisca per ragioni di priorità con: *B. graeca Hal.* = Sium L. = Foeniculum graecum Calestani.

2322 *Aethusa Cynapium.* — *Avellinese* (*Casale e Guss.*).

2324 (2) *Angelica Archangelica.* — *In Basil. anche nei dintorni di Potenza* (*Giordano*).

2325 (1) *Ferula communis.* — *Avellinese a Roccabascerana* (*Casali e Ferraris*).

δ *glauca.* — *Avellinese* (*Cassitto*).

2327 (3) *F. Ferulago.* — *Barese nelle Murge di Gravina* (*Palanza*).

2333 (4) *Pastinaca sativa.* α **typ. a. silvestris (Mill.).** — Rd. sottile. Fg. pubescenti, le infer. a segmenti non o poco attenuati alla base.

b. subpinnata Sacc. (1864) = var. laciniata Vis. et Sacc. (1869). — Fg. a segmenti laciniati e quindi fg. quasi bipennate. Forse è la stessa cosa che la for. seg. — *Ven. qua e là* (*Vis. et Sacc.*).

c. bipinnatifolia Babey (1845). — Fg. a segmenti attenuato-cuneiformi alla base, quasi decussati, irregolarm. e profondam. pennatipartiti. — *Corsica* (*ex Rouy et Cam.*) *ecc.*

d. edulis DC. = P. sativa Mill. — Rd. carnosa. Fg. glabre, lucide di sopra, a segmenti attenuato-cuneiformi alla base. — *Colt.*

β **insularis Rouy et Cam. (pr. subspec.) (Calestani pr. spec.).** — Differisce dalla *P. divaricata* pel frutto maturo ellittico, arrotondato alla base, ma attenuato all' apice, per le fg. infer. a segmenti picciolati e per essere pianta più robusta; dal tipo per le fg. infer. strette, a lembo oblungo-lineare, a segmenti piccoli, crenati ed incisi e per essere cenerino-pubescente. — *Cors. a Fiumorbo* (*Kralik ex Rouy*).

γ *divaricata* (cfr. Fl. An. II, p. 178, pr. spec.). — Con Rouy e Cam. (Fl. de France VII, p. 374) consideriamo questa entità come una var. di *P. sativa.*

2334 (5) *P. latifolia.* — Distinguesi dalla spec. prec. (sec. Rouy e Cam. l. c.) per le fg. più spesse ed a nervature più prominenti in rete, le cauline infer. a 3-5-7 segmenti (nella *P. sativa* 5-11) assai grandi, a picciuolo grosso (sino ad 1 cm. di diam.) e spugnoso; le rameali super. a lembo subromboidale, trilobo (nella *P. sativa* lineare od oblungo, intero o 3-dentato), infine pel frutto a canali resiniferi percorrenti tutta la faccia commissurale (nella *P. sativa* interrotti alla base ed all' apice). — *Sec. Rouy sarebbe speciale alla Corsica soltanto.*

β *corsica* (cfr. Fl. An. l. c., pr. spec.). — Con Rouy e Cam. (l. c., p. 375) consideriamo questa entità come semplice var. a fusto angoloso di *P. latifolia.*

2339 (3) *Peucedanum gallicum.* — Da noi trovasi soltanto la var. β *coriaceum* (cfr. Fl. An. II, p. 180 [for. b.]).

Digitized by Google

2342 (6) *P. venetum.* — *Tosc. nella Lunigiana ed in val di Lima* (*cfr. Baroni*), *Avellinese a M. Vergine* (*Milani*); *l'indicazione di Vallombrosa* (*Piccioli*) *merita riconferma.*

c. **altissimum Goir.** (1904). — Fusto ramosissimo, alto 2-2$^1/_2$ m.; fg. grandissime ed ombrelle lungam. peduncolate — **d. nanum Goir.** (1904). — Fusto semplice alto 2 dm. appena, contorto, con ombrelle sessili. — *Ambedue nel Veron.* (*Goir.*).

2343 (7) *P. Cervaria.* — *Avellinese a Montevergine* (*Ten.*).

c. **latifolium DC.** = Athamantha lat. Viv. — Fg. a segmenti più grandi e meno glauchi. Pianta più rigogliosa. — *Nei luoghi pingui.*

2344 (8) *P. Orseolinum.* — *Cal. occ. nel bacino del Lao* (*B. Longo*).

b. **angustiseptum Goir.** (1904). — Pianta ridotta in ogni parte, con fg. a lacinie più strette. — *Veron.* (*Goir.*).

2347 (11) *P. Ostruthium* α *typ.* b. **triternatum Rouy et Cam.** = Imperat. Ostr. β triternata DC. — Fg. più profondam. divise, tutte a segmenti profondam. tripartiti o quasi trisetti, a lobi ellittico-lanceolati, incisi. — *Alpi, Corsica* (*ex Rouy et Cam.*) *ecc.*

β *angustifolium.* — *Alpi Graie* (*Biroli hb. ex Noelli*). — Sopra questa var. cfr. Noelli in «Atti Soc. It. sc. nat., XXXIX, 1900».

2355 (1) *Daucus Carota* α *typ.* f. **Allionii Rouy et Cam.** = D. mauritanicus All. — Pianta robusta (8-12 dm.), glabrescente o vellutata. Fg. a divisioni ultime assai larghe. Ombrelle grandi, a raggi numerosi. Acheni lunghi 2$^1/_2$-3 mm., ad aculei allungati. — *Nizzardo* (*All.*).

δ *mauritanicus* = D. maximus Desf. — *Presso Ancona e Jesi* (*Paol. e Card.*), *Elba* (*Parcucci, Somm.*).

η *Bocconei.* — *Campi a Cesena* (*Del Testa*), *Cors. a St. Manza presso Bonifacio* (*Revel. ex Rouy*).

ξ *gummifer* b. **intermedius Corb.** — Fg. non lucenti. Frutto ad aculei lunghi 1 mm. (invece di $^1/_2$ mm.), più gracili, patenti, liberi alla base. — *Cors. a Bonifacio* (*ex Rouy, Fl. de France VIII, p. 384*).

2356 (2) *D. bicolor.* — *Maremma tosc. sul Tombolo di Burano* (*Somm.*).

2359 (5) *D. Broteri.* — *Reggiano a Ciano d'Enza e Canossa* (*Casali*).

2360* Daucus Daucorlaya Nob. = Orlaya Daucorlaya Mürb. (in Lunds Univ. Arsskrift 1892, p. 119). — *Abr. presso Caramanico* (*Rigo ex Degen in Bull. Soc. bot. it. 1906, p. 75*) [*Erzegovina*].

2364 (2) *Laserpitium marginatum* γ *Gaudini.* — *Tir. mer. nel territorio di Bolzano* (*Sauter*).

2367 (5) *L. Siler.* — *Cal. occ. al M. Serramale sopra Tortora* (*B. Longo*).

α *typ.* b. **angustifolium Goir.** (1904) = var. β Pollini. — *Veron. nel M. Summano* (*ex Pollini*).

2374 (1) *Torilis arvensis* β *purpurea et b. heterophylla.* — *La var. nel Veron.* (*Goir.*), *la for. b. all'Elba* (*Somm.*).

2378 *Caucalis daucoides.* — *Elba* (*Somm.*).

2380 (1) *Anthriscus silvestris* α *typ. b. nitida.* — *C. Ticino* (*Gremli*) *e precisam. presso Chiasso* (*Chenevard*), *Veron.* (*Goir., Rigo*).

β *nemorosa.* — *Marche a Serravalle* (*Paol e Card.*).

b. gymnocarpa. — *Tosc. sul M. Argentaro presso il Convento dei Passionisti* (*Somm.*).

c. **mollis (Boiss.).** — Fg. più o meno pubescenti in ambedue le pagine. — *Barese nel bosco Jannuzzi nelle Murgie di Toritto* (*Palanza*).

γ **Candollei (Rouy et Cam.)** = Myrrhis bulbosa All. (ex Rouy et Cam.) = A. torquata Duby (non Thomas = Chaerophyll. torquatum DC.). — Rz. tuberoso, conico od ovoideo. Fg. infer. lungam. picciolate, a lembo breve, uguale circa ad $^1/_2$ del picciuolo, solamente bipennatosetto, coi segmenti secondari pennatopartiti. — *Piem.* (*ex Rouy et Cam.*), *M. Cenisio* (*Gandoger*).

2383* Gen. Myrrhis. — Si aggiunga il nome specifico: **M. odorata (L.) Scop.**

Digitized by Google

2387 *Physocaulis nodosus.* — *Avellinese* (*Casale e Guss.*), *Barese nelle Murge di Gravina* (*Palanza*).

2390 (3) *Chaerophyllum hirsutum* α *typ.* **c. lucidum (Moretti).** — Simile alla for. *Cicutaria* (*Vill.*) ma più vigoroso e poco peloso. — *C. Ticino a Mogno* (*Christ*) *ed a Fusio* (*Chenev.*).

d. roseum Goir. (1904). — Ombrelle di un bel color roseo. — *Veron.* (*Goir.*).

e. minimum (Vand.) Comolli — Fusto basso, irsuto (ex Comolli). — *Monti milanesi* (*Vand.*), *M. Legnone* (*Comolli*).

β *Villarsii* **b. Briqueti Chenevard** (1902). — Pianta sparsam. pelosa soltanto sul fusto in basso e sul picciuolo e nervature delle fg. — *C. Ticino a Mogno in Val Lavizzara ed a Vergeletto* (*Chenev.*).

ε *magellense.* — *Cal. nel gruppo del M. Pollino* (*N. Terr.*, *B. Longo*).

2393 (1) *Athamanta macedonica.* — *Campobasso al castello di Monforte* (*Villani!*).

2402 (1) *Smyrnium Olusatrum.* — *Cesenate a Roversano* (*Del Testa*).

2404 *Conium maculatum* **c. aromaticum Fouc. et Rotgès** (1900). — Pianta con odore gradevole ricordante quello dell'*Anethum graveolens.* — *Cors. in un giardino a Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*).

2405 *Coriandrum sativum.* — *Presso Ancona* (*Paol. e Card.*).

2409 *Hippomarathrum Libanotis.* — *Avellinese* (*Casale e Guss.*, *Ten.*).

2415 (3) *Oenanthe fistulosa.* — *Cors. a Caniccia presso Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*).

2416 (4) *Oe. pimpinelloides* α *typ.* **for. major Fouc. et Mand.** (Bull. Soc. bot. de France 1900, p. 91). — *Cors. a Corte* (*Mand. e Fouc.*).

δ *peucedanifolia.* — *Puglie alle Mattine di Bitonto* (*Palanza*).

η *Jordani.* — *Nel Salernit. anche a Cava dei Tirreni* (*L. Marcello*).

RHAMNACEAE.

2422 *Paliurus Spina-Christi.* — **b. macrophyllus Goir.** (1904, sub P. austral.). Fg. misuranti 25-30 per 30-35 mm. — **c. microphyllus Goir.** (1904, sub P. austral.). Fg. 2-3 volte più piccole del normale. — **d. macrocarpus Goir.** (1904, sub P. austral.). Frutto del diam. di 25-30 mm. ed anche più. — **e. humilis Goir.** (1904, sub P. austral.). Arbusto contratto, densam. ramoso, alto 2-3 dm., eretto o prostrato, con fg. misuranti 7-15 per 4-10 mm., avvicinate, quasi ricoprentisi a vicenda. Frutti del diam. di 7-15 mm. — *Tutte nel Veron., la for. e. nei luoghi sassosi* (*Goir.*).

2425 (1) *Rhamnus Alaternus.* — *Presso Brescia ai Ronchi* (*ex Ugolini*); *incerto se inselvat. o spont.*

b. angustifolia Borzì, pongasi invece: *b. angustifolia Presl* (Fl. Sic. p. XVIII [nomen], *Guss.* (Syn. I, p. 275)).

d. parvifolia Arc. (1882). — Fg. più piccole del normale. — *Puglie nelle Murge di Fasano* (*Palanza*) *ecc.*

2428 (4) *Rh. cathartica* β **hydriensis (Hacq.)** = Rh. silvatica Serres. — Rami subinermi. Fg. affatto glabre, spesso più grandi, ovali-bislunghe o sublanceolate, più o meno attenuate alla base, con 4 nervi per lato, meno convergenti che nel tipo. — *Goriziano.*

2429 (5) *Rh. saxatilis.* — *Istria al M. Maggiore* (*Calegari in litt.*).

α *typ.* **c. angustifolia Rouy.** — Fg. più piccole, lanceolato-acute, attenuate alle due estremità, più o meno conduplicate. — *Veronese* (*Goir.*).

d. grandifolia Goir. (1904). — Fg. misuranti 28-32 per 17-18 mm., a picciuolo lungo 7-8 mm. — Forse identica alla for. *b. intermedia* (Fl. An. II, p. 214). — *Veron. sul M. Baldo e sui Lessini* (*Goir.*).

e. peduncularis Goir. (1904). — Pedicelli dei fi. superanti molte volte il calice. — *Veron. nella Valdonega* (*Goir.*).

Digitized by Google

β *infectoria.* — *Abr. a Lama* (*Ten.*) *e piuttosto abbondante nei territori di Balsorano e Collelongo* (*Grande in litt.*).

γ *tinctoria.* — Va radiata dalla Flora ital.: gli esemplari della Sila in Cal. determinati come *Rh. tinctoria* dal Solla, senza fi. e senza fr., sembrano appartenere a qualche var. di *Pirus communis* (Adr. Fiori).

2452 (8) *Rh. rupestris.* — *Istria nel territ. di Parenzo nel Cul di Leme* (*Calegari*).

2433 (9) *R. Frangula* **b. subrotunda Rouy.** — Fg. largam. ovali o suborbicolari, troncate o quasi arrotondate all'apice. — *M. Baldo ai Lumini* (*Goir.*).

c. serotina Goir. (1904). — Pianta fiorente in sett. ed ott. — *Veron.* (*Goir.*).

AQUIFOLIACEAE.

2434 *Ilex aquifolium* **d. platyphylloides Christ.** — Albero alto sino a 10 m., a fusto spesso diritto, con chioma ovale. Fg. più grandi dell'ordinario (100-125 per 80-93 mm., mentre nel tipo sono 75-85 per 44-45 mm.), largam. ovali. — *Lago Maggiore nella Val Cannobina* (*Christ*).

e. crispa Strobl (1903). — Fg. assai increspate. — *Sic.* (*Strobl*).

f. marginata Guss. — Fg. orlate di bianco. — *Sic. alle Madonie.*

CELASTRACEAE.

2443 (2) *Evonymus europaeus* **e. multiflorus (Opiz)** = E. floribundus Stev. — Fg. ellittico-lanceolate, le più grandi lunghe 6-7 cm. Peduncoli a molti fi. Cassule più piccole. — *Veronese* (*Goir.*).

2444 (3) *E. verrucosus.* — *Piem. nel Biellese* (*Zum.*) *ed in Val d'Aosta* (*Trèves*), *Istria nel territ. di Parenzo comunissimo* (*Calegari*). — Già indicato dell'Abr. al M. Grande (Cecchetti ex Ten. Syll. pag. 534), ma per dichiarazione dello stesso Tenore (Syll. p. 577) trattasi di *E. europaeus* con fusto sparso di verruche; trovato però recentem. «*a Villavallelonga alla Difensa* (*Grande Loreto!*)».

2445 (4) *E. latifolius* **a. grandifolius Rouy.** — Fg. maggiori lunghe 9-10 cm., ovali, acute od ottusette.

b. parvifolius Rouy. — Fg. maggiori lunghe 6-7 cm., spesso più acute od acuminate. — *Nell'area della spec.: Veron.* (*Goir.*).

SAPINDACEAE.

2446 *Staphylea pinnata.* — *Camp. a Pietraroja* (*N. Terr.*), *Salernit. nel territ. di Cava dei Tirreni* (*Leopoldo Marcello*), *dintorni di Avellino alla Sciorta* (*Baccarini*) *ed ai Cappuccini* (*Casali*), *Cal. occ. nel bacino del Lao e presso la sorgente del fiume Esaro* (*B. Longo*).

Gen. Acer.— Vedi: Pax in Engler Pflanzenreich IV-163 (1902).

2447 (1) *A. monspessulanum b. quinquelobum Borzì* (1885), *Pau ex Wk. et Lge.* (1893). — È la forma genuina descritta sopra i rami estivi, che, come già osservò il Pax (l. c. p. 61, 62), spesso presentano fg. a lobi lobulati.

e. commutatum (*J. et C. Presl*). — Distinto, sec. Pax, per le ali del frutto incurvato-incrociate.

f. liburnicum Pax = A. denticulatum et A. litorale Hort. — Fg. a lobi ottusissimi, dentati, qua e là quasi 5-lobate.

g. cassinense N. Terr. ex Schwerin (1896) — Frutti intensam. rosso-corallini. — *Colt.*

2448 (2) *A. campestre α typ.* **e. erythrocarpum (Opiz)** = A. camp. v. purpurascens Legr. — Frutti maturi rossi. — *Col tipo.*

f. saxatile Goir. (1904). — Pianta cespugliosa, prostrata, a fg. piccole, generalm. sterile. — *Veron. nei luoghi rupestri o sassosi* (*Goir.*).

Digitized by Google

β *collinum* **c. affine (Opiz)** — Fg. glabre di sotto, ma carpelli pelosi. — *Sic.* (*Todaro exs.* 401, ex Pax l. c. p. 55).

2449 (3) *A. platanoides* α *typ.* **b. crispum (Lauth).** — Fg. assai increspate al margine. — *Colt.*

c. laciniatum (Lauth). — Fg. increspate, profondam. e strettam. lobate, assai revolute al margine, a denti stretti. — *Colt.*

β *Lobelii.* — *Cal. occ. nel bacino del Lao* (*Longo*).

2450 (4) *A. Opalus.* — Sec. Strobl (Fl. des Etna), Pax (l. c.) e l'esame del materiale dell'Erb. centr. di Firenze si possono distinguere le seg. var.:

A Fg. glabre o pubescenti di sotto, — a 5 lobi. Ali del frutto bislunghe, slargate nel mezzo.

α **opulifolium (Vill.).** — Fg. glabre di sotto, - cordato-troncate alla base o leggerm. cuneate, a lobi acuti ed acutam. dentati. Corimbo pendente. — *Alpi mar. ed Appenn. emil.*

β **rotundifolium (Lam.)** = A. Opalus Ait., Ten. — Fg. glabre di sotto, - cordate alla base, a contorno quasi rotondo, a lobi subacuti, ottusam. dentati. Corimbo suberetto. — *Alpi Apuane, Appenn. lucchese e probabilm. anche in quello emil. ed altrove.*

γ **ambiguum Fiori** (N. Giorn. bot. it. 1906, p. 169). — Fg. da adulte pubescenti o tomentosette di sotto, da giovani densam. tomentose, - cordato-troncate alla base, a lobi subacuti. Corimbo suberetto. Intermedio tra le var. α e δ. — *Appenn. tosc. a Vallombrosa e nel Casentino, marchig. e piceno.*

B Fg. più fortem. pelose o tomentose di sotto.

δ *obtusatum* (*Kit.*) (Fl. An. II, p. 222 [fob. b.]). — Fg. a 5 lobi, - ottusetti. Frutto ovale, ad ali bislunghe, assai slargate nel mezzo, larghe 6-10 mm. — Fg. di grandezza variabile. — *Appenn. centr. e mer. e Sic. alle Madonie* (*Ten.*).

ε **neapolitanum (Ten.).** — Fg. a 5 lobi, - ottusi od ottusissimi. Frutto rotondo, ad ali slargate all'apice, quasi semiorbicolari, larghe 10-17 mm. — Fg. per lo più molto grandi (15 per 12 cm.). Rami giovani, picciuoli e pedicelli raram. (**b. villosum Lojac. exs.**) densam. villosi. — *Appenn. centr. e mer. e Gargano; la for. b. in Cal. a Serra S. Bruno* (*Lojac.*).

ζ **aetnense (Tin. exs. in Tod.) Strobl** = A. obtusatum Guss. — Fg. a 3 lobi, - subrotonde (5 cm. diam.), a lobi acuti od ottusi. Ali del frutto come nella var. *obtusatum.* — *Sic. sull'Etna.*

2450* A. Peronaï Schwerin (Mitt. Deut. Dendrol. Gesell. 1901, n. 10, p. 59) = A. Opalus (italum) v. ambiguum × monspessulanus. — Differisce dall'*A. Opalus v. rotundifol.* per la forma acuta e la lunghezza dei lobi delle fg. e per le fg. stesse trilobate e rilucenti di sopra; dall'*A. monspess.* per le fg. più rotondate alla base e per la loro maggiore grandezza e differente dentatura; da ambedue per lo stilo alla fine assai lungo e sporgente dai fi., per l'ovario quasi glabro in gioventù ed infine per il portamento intermedio tra le due specie indicate. — *In pochi esemplari al Masso del Diavolo a Vallombrosa tra i parenti* (*Perona*).

2451 (5) *A. Pseudo-Platanus.* — *Istria nel territ. di Parenzo, spontaneo* (*Calegari*).

β *villosum.* — Distinguesi dal tipo anche per le fg. ad escavazione basilare più aperta, per essere grossam. incise e pubescenti di sotto nell'antesi (nel tipo invece irregolarm. dentato-incise e pubescenti solo sui nervi nell'antesi); inoltre per le ali del frutto larghe sino a 2 cm., ora (**a. latialatum Pax**) rotondate all'apice e divergenti ad angolo quasi retto, ora (**b. truncatum [Tin. ex Strobl]** = A. nebrodense Tin. ex Strobl = A. macropterum Guss. ex Strobl = A. Pseudoplat. v. macropt. Lojac.) obovate ed obliquam. troncate all'apice e ricoprentisi quivi a vicenda.

2451* Acer tataricum L. = A. cordifolium Moench. — *Istria a Bilimek, Cadore a 100 m. in pochi esemplari* (*Soravia ex Piccioli L., Le piante legnose ital. p. 695*). *Probabilm. coltivato.*

Digitized by Google

2453 *Aesculus Hippocastanum.* — *Questa pianta, ritenuta originaria delle Indie or., trovasi invece spontanea negli alti monti della Grec. sett. (Tessalia Epiro) e nell' Imerezia, estendendosi probabilm. dall' As. min. sino al Cauc. ed Himal. occ.*

ANACARDIACEAE.

2455 (2) *Pistacia Terebinthus.* — *Elba (Marcucci).*

b. angustifolia Lec. et Lam. — Fg. con 11-13 foglioline, più strette, lanceolato-oblunghe, spesso quasi acuminate. — *Veron. nella Valdonega (Goir.).*

2456 (3) *P. Lentiscus* **b. massiliensis (Mill.)** = v. angustifolia DC. — Arbusto basso, a foglioline strettam. lineari-bislunghe, brevi. Racemi brevi, semplici. Drupe piccole. — *Dintorni di Nizza (ex Rouy).*

2457 (1) *Rhus Cotinus.* – *Elba, colt.? (Martelli ex Somm.).*

2459 (3) *Rh. Coriaria.* — *Elba (Somm.).*

c. humilior Nic. (1878) = var. b. Guss. = var. microphylla Strobl (1886). — Distinguesi oltre che per le proporzioni minori, anche per le foglioline mollem. pubescenti in ambedue le pag. e bianchiccie.

BALSAMINACEAE.

2462 *Impatiens Noli-tangere* **b. micrantha Rouy et Fouc.** — Fi. lunghi 2-4 mm. — *Qua e la.*

c. apetala Rouy et Fouc. – Fi. tutti apetali. — *Qua e là.*

POLYGALACEAE.

2464 (1) *Polygala major* **for. angustifolia N. Terr.** (1889). — Fg. tutte strettissimam. lineari-acute, le infer. più brevi. — *Cal. al M. Pollino a Vallecupa (N. Terr.).*

2466 (3) *P. vulgaris α typica* **for. albiflora N. Terr.** (1889) = P. albiflora N. Terr. (ibid.) — *Cal. al M. Pollino a Bellizia (N. Terr.).*

for. pseudo-gracilis Gremli. — *C. Ticino sopra Mergoscia (Chenev.).*

for. rosulata Fr. = for. palustris Chodat. — *C. Ticino nei prati umidi sotto Gordola ed a Mergoscia (Chenev.).*

for. valdensis Chodat. — *C. Ticino sopra Indemini (Chenev.) ecc.*

for. virescens Freyn. — Pianta lassa, a pochi fi. verdastri. — *Istria (Freyn) e Triest. (Marches.).*

ε *Carueliana.* — *A. Apuane anche alla Tambura (Savi), al Procinto, alla Pania ed all' Alpe della Grotta (Somm.).*

η *flavescens.* — *Istria nel territ. di Parenzo (Calegari), Elba (Marcucci).*

ι *comosa* **for. Hoppeana Rchb.** — Fi. due volte più grandi che nella for. genuina, in racemo allungato. — *Triest. nel Carso (ex Marches.):*

2468 (5) *P. monspeliaca.* — *Elba (Sommier).*

GERANIACEAE.

2470 (1) *Geranium macrorrhizum.* — *Camp. anche a Sandonato sul M. Croce ed a Lungagna (N. Terr.).*

2471 (2) *G. Robertianum.* — *Malta (Delicata).*

β *purpureum* **for. succulentum Evers,** sub G. parviflorum (1896). — Pianta piccola, a fusti rigidi, eretti o diffusi, nei luoghi freschi un po' succosa. — *Sulle rupi calde nel Trent. ed Abr. presso Oronto (Evers).*

2474 (5) *G. molle.* — *Malta (Delicata), Linosa (Ross).*

Digitized by Google

2474 * **G. luganense Chenevard** = G. molle × pyrenaicum. — *C. Ticino al M. S. Giorgio* (*Chenev.*).

2475 (6) *G. pyrenaicum* **for. lejocarpum Guss.** — Carpelli glabri — *Sic. alle Madonie e nel Valdemone.*

for. subvillosum Schur. — Pianta più gracile; fg. quasi vellutate; fi. più piccoli, a petali poco più lunghi del calice. — *Aosta* (*L. Vacc.*).

2476 (7) *G. pusillum* α *typ.* **c. villosum Sauter** (1899). — Pianta peloso-glandolosa. Fg. fiorali glabre. — *Tir. mer. nel territ. di Bolzano* (*Sauter*).

2478 (9) *G. rotundifolium* **b. emarginatum Goir.** = var. β Poll. — Petali leggerm. smarginati. — *Veron.* (*Goir.*).

c. albiflorum Goir. — Fi. bianchi. — *Veron.* (*Goir.*).

2479 (10) *G. columbinum* **b. albiflorum Goir.** — Fi. bianchi. — *Veronese* (*Goir.*).

2481 (12) *G. lanuginosum.* — *Colli di Cesena a S. Demetrio* (*Del Testa*).

2483 (14) *G. cinereum.* — *Camp. anche al M. Settefrati ed al M. Maro* (*N. Terr.*).

2484 (15) *G. sanguineum b. prostratum* (Fl. An. I, p. 238) = G. lancastriense With. — Differisce dal tipo pei fusti sdraiati od ascendenti, a peli più lunghi e per i petali di un rosso più chiaro. — *Euganei sul M. Ricco* (*Bolzon*).

d. parviflorum Evers (1896). — Corolla grande $^1/_2$ del normale. — *Trento a Goccia d'Oro* (*Evers*).

2490 (21) *G. nodosum.* — Gli esemplari della «*Sila in Cal.*» determ. con questo nome dal Solla appartengono a *G. striatum!*

2493 * (2 *bis*) **Erodium Reichardi DC.** (1824) = Geranium Murr. (1780) = Ger. Chamaedr. Cav. (1887) = Erod. Chamaedr. L'Hér. (1788). — *Cors. sulla Montagna di S. Michele* (*Boccone, Museo p. 160, tab. 128* [*1697*]), *Cors.* (*De Lens, in Herb. Florentino*). [*Finora noto solo delle Baleari*]. — L'*Erod. Bocconi Viv.* (1825) (excl. Syn. Bocc.) è una var. montana di *E. maritimum* (cfr. Adr. Fiori in N. Giorn. bot. it. 1906, p. 170).

2495 (4) *E. chium* δ *laciniatum.* — *Malta e Gozo* (*Duthie*).

2502 (11) *E. cicutarium* α *typ.* **for. bicolor Somm.** (N. Giorn. bot. it. 1905, p. 462). — Pianta nana (1-3 cm.). Corolla molto irregolare, a 3 petali lunghi 7-8 mm., ellittico-allungati e 2 lunghi circa 4 mm., largam. obovati. — *Prov. di Firenze a M. Albano tra Montelupo e Carmignano, fiorito il 14 Marzo* (*Somm.*).

for. praetermissum (Jord.). — *Cors. a Calvi* (*Fouc. et Sim.*).

for. pumilum Goir. (1904). — Fusto semplicissimo. Pianta annuale, alta 2-3 cm. — *Veron.* (*Goir.*).

2502 * **Pelargonium zonale L'Herit. in Ait.** — *Siepi della ferrovia tra Reggio Cal. e Capo Spartivento* (*Micheletti*); *origin. dell'Afr. austr.*

2502 * **P. cucullatum? Ait.** — *Col preced. tra Reggio Cal. e Palizzi* (*Micheletti*); *origin. dell'Afr. austr.*

2504 (2) *Oxalis cernua.* — *Lampedusa* (*Ross*), *Capri* (*Cerio e Bellini*).

2505 (3) *O. corniculata* α *typ.* **e. villosa (M. B.).** — For. ridotta, a foglioline più piccole, densam. villose sulle due pag. — *Colli Euganei sul M. Ricco* (*Bég.*), *Veron.* (*Goir.*) *e certam. altrove.*

for. variegata Goir. (1904). — Fg. più o meno variegate. — *Veron.* (*Goir.*).

for. subacaulis Chast. — Pianta acaule o quasi. — *Veron.* (*Goir.*).

for. minor Lang. — Pianta gracile, a fg. 2-3 volte più piccole (lunghe poco più di 4 mm.), cigliate e nel resto quasi glabre. Peduncolo spesso 1-floro. — *Veron.* (*Goir.*).

for. parviflora Goir. (1904). — Fi. 2-3 volte più piccoli del normale. — *Veron.* (*Goir.*).

2508 (3) *Linum perenne* β *alpinum.* — *Camp. a Settefrati* (*N. Terr.*).

δ *austriacum.* — *Appenn. piacent.-parmig. all'Incisa nella vetta dell'Alpe* (*e non* «*Alpe di Succiso*» *come per err. scrissero Avetta e Casoni*) (*Bolzon in litt.*), *Camp. al M. Taburno* (*N. Terr.*).

2509 (4) *L. usitatissimum* α *typ.* **b. grandiflorum Goir.** (1904). — Corolla straordinariam. grande. — *Veron. sui Lessini presso S. Francesco* (*Goir.*).

Digitized by Google

2510 (5) *L. narbonense.* — *Cesenate nel bosco dell' Eremo e fra Cesena e Roversano* (*Del Testa*). — Gli esemplari della «*Sila in Cal.*» determ. con questo nome dal Solla appartengono al *L. usitatiss. var. angustifolium!*

2512 (7) *L. tenuifolium* α *typ.* **b. caespitosum Pirona.** — Fg. più larghe, più lunghe e più copiose. — *Friuli presso Gemona* (*Pir.*).

c. laetiflorum Rouy et Fouc. — Fi. bianchi o bianchicci. — *Veron.* (*Goir.*).

2516 (11) *L. strictum* β *corymbulosum.* — *Elba* (*Sommier*).

2518 (13) *L. flavum* β *campanulatum.* — *Friuli lungo l' Erbezzo* (*Minio ex Bolz.*).

γ *capitatum.* — *Avellinese sul M. Terminio* (*Casali e Ferraris*).

ZYGOPHYLLACEAE.

2522 *Tribulus terrester* **e. grandiflorus Goir.** — Fi. il doppio del normale; frutti più grandi. — *Veron.* (*Goir.*).

RUTACEAE.

2524 (1) *Ruta chalepensis.* — *Elba* (*Marcucci, Sommier*).

2527 (4) *Ruta graveolens* **d. latisecta Goir.** (1904). — Lacinie delle fg. allungate e larghe sino a 10-12 mm. — *Veron.* (*Goir.*).

e. virens Goir. (1904). — Fg. verdi-scure. — *Veron.* (*Goir.*).

2529 *Dictamnus albus* **b' venosus Vis. et Sacc.** (sub D. Fraxinella) = D. Fraxinella β Pirona. — Fg. ovate, non punteggiate, venate. — *Friuli tra Faedis e Purzuso* (*Pir.*).

SIMARUBACEAE.

2532 * **Ailantus excelsa Roxb.** — Foglioline intere, pubescenti nella pag. infer. — *Indicato del Salernit. a Cava dei Tirreni assieme ad A. glandul.* (*L. Marcello*): *origin. delle Indie or.*

MALVACEAE.

2535 *Malope malachoides* — *Cors. a Rogliano* (*E. Petit*).

2537 (2) *Althaea cannabina.* — *Trovata già in Sard. dal Moris* (*ex Mattirolo rel. ecc.*).

2543 (3) *L. Olbia* α *typ.* **c. intermedia Rouy** = L. Olbia β hispida Gr. et Godr. — Pianta più alta. Fg. un po' più verdi, a picciuolo con pubescenza appressata, breve. Calice con peli più abbondanti e meno appressati. — *Nell'area della spec.; Cors.* (*ex Rouy*).

2553 (4) *Malva silvestris.* — Seguendo lo Strobl (Fl. d. Etna in Oest. bot. Zeitschr. 1885, p. 400) distinguiamo le seg. var. e for.:

A Fg. lobate.

a Cocche glabre o quasi.

α *typica.* — Pianta peloso-irsuta per peli patenti od anche (**b. tomentella [Presl]** = v. canescens Strobl) a fg. mollem. tomentose per peli stellati (le giovani glabre). — Fi. raram. (**c. albiflora Goir.**) bianchi — *La for. b. in Sic. ecc.*

β *mauritiana.* — Pianta glabra o quasi.

b Cocche più o meno densam. tomentose.

γ *erecta* (*Presl*). — Pianta più o meno pelosa, a fusti eretti e peduncoli lunghi come le fg., ovvero (**b. racemosa [Presl]**) a fusti prostrati e peduncoli un po' più brevi del picciuolo delle fg.; pelosità della pianta talora (**c. hirsuta [Viv., Presl] Strobl**) più copiosa ed irsuta.

δ *ambigua* (*Guss.*). — Pianta glabra o quasi, a 1-3 fi. ascellari od anche (**b. polymorpha [Guss.]**) 2-7 fi., formanti quasi una spiga. — *Sic., Malta* (*Delicata*) *ecc.*

Digitized by Google

B Fg. rotondate, non lobate.

ε **orbicularis Deth.** — *Sic.* (*Strobl*).

2553 * (4 *bis*) **M. crispa L.** — Distinguesi da *M. silvestris* specialm. per i pedicelli dei fi. assai brevi e per le fg. increspate al margine. — *Veronese nella Valle d'Ilasi sopra Tregnago ed al Corno Saline tra 700-800 m.* (*Goiran!*), *Vicentino ad Enego* (*Spranzi in hb. Pat.*), *Carnia a Sauris di Sopra colt. ed inselvat.* (*Gortani!*); *origin. a quanto pare dell'Eur. sett. e Russia.*

2555 (6) *M. rotundifolia.* — *Cors. a Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*).

2561 (3) *Hibiscus roseus.* — *Presso S. Girolamo di Guastalla nel Reggiano* (*Casali*).

TILIACEAE.

2566 (3) *Tilia cordata.* — *Avellinese a Montevergine* (*Pedicino, Baccarini*), *ma dubiam. spontanea* (*Bacc.*).

EUPHORBIACEAE.

2571 (2) *Euphorbia maculata.* — *Lungo la ferrovia Milano-Lecco* (*Camperio!*).

2573 (4) *E. Engelmanni.* — *Le località di Villa Serbelloni presso Bellagio ed Isola Bella citate per questa spec., devono invece riferirsi ad E. maculata* (*A. Thellung in litt.*).

2575 (6) *E. humifusa.* — *A Malgrate nel Comasco nei viali di giardino* (*Camperio!*), *orti e cortili a Castions di Strada nel Friuli* (*Gortani!*).

2582 (13) *E. epithymoides* ε *verrucosa.* — *Camp. a Pastena sul M. Lartalo* (*N. Terr.*).

2585 (16) *E. dulcis.* — Gli esemplari della «*Sila in Cal.*» determ. con questo nome dal Solla appartengono all'*E. coralloides!*

2587 (18) *E. pilosa.* — *In Piem. anche presso Racconigi* (*Noelli in litt.*).

2589 (20) *E. pubescens.* — *Cesenate all'Eremo* (*Del Testa*); *forse per equivoco?*

2590 (21) *E. akenocarpa.* — *Camp. al Pantano di Minturno* (*N. Terr.*).

2591 (22) *E. cuneifolia.* — *Tosc. in Maremma presso Capalbio e sul Tombolo di Burano* (*Somm. ex Baroni*), *nel Laz. anche al lago di Fogliano* (*Pappi ex Chiov.*).

2593 * **E. perramosa Borbàs.** — *Comune nel Veronese* (*Goiran*) - *Quid?*

2596 (27) *E. falcata*, **e. mucronata Evers** (1896). — Fg. mucronate. — *Trentino* (*Evers*).

2599 (30) *E. aleppica.* — *Malta* (*Daveau*).

2601 (32) *E. segetalis* γ *pinea.* — *Cal. occ. nell'isolotto Cirella* (*B. Longo*).

2606 * **E. lugubris Chabert** (Journ. de Bot. 1900, p. 71). — Affine alla *E. Pithyusa*, dalla quale si distingue pei fusti semplici o poco ramosi (6-7 dm.), per le fg. uniformi, coriacee, lanceolate, acute, infine per le glandole dell'involucro troncate e portanti sulla faccia dorsale e presso le estremità un piccolo tubercolo (nella *E. Pithyusa* invece le glandole sono semilunari e ad estremità *prolungate* in punta ottusa). — *Corsica tra Ponte alla Leccia e Ponte-nuovo. Lugl.*

2609 (40) *E. Myrsinites.* — *Camp. anche a Forcadacero* (*N. Terr.*), *in Cal. anche a Mormanno ove scende talora nella reg. submont.* (*B. Longo*).

2610 (41) *E. Seguieriana* γ *Gerardiana.* — *Salernit. nel territ. di Cava dei Tirreni* (*L. Marcello*).

b. **tiphatina N. Terr.** (**N. Terr.**). — Fg. involucranti simili alle altre. Ombrella a molti raggi. — *Presso Caserta.*

2611 (42) *E. Barrelieri.* — *Cal. occ. in più luoghi* (*B. Longo*).

2611 * **E. Valliniana Belli** (in Pirotta Annali di Bot., I, 1903). — Tra le nostre spec. si avvicina più di tutto ad *E. Barrelieri var. carnica.* — Fusti sdraiato-ascendenti, alti 10-25 cm., coperti in basso di squame ovate od ovato-lanceolate, passanti gradatam. nelle fg. cauline che sono ellittiche od ellittico-oblunghe, raram. ovato-oblunghe, ottuse, smarginate o mucronulate all'apice, le involucranti triangolari od irregolarm.

Digitized by Google

semiorbicolari-reniformi. Ombrella a 5 raggi bifidi. Glandole rossigne, semilunari e brevissimam. cornute od ovali e senza corna. Cassule liscie, bislunghe od ovate. Semi ellissoideo-ovati o cilindrico-compressi, color grigio-acciaio, a caruncola conica. ♃. *Piem. nelle Alpi Cozzie sulle roccie calcaree in Val Macra; reg. subalp. ed alp.* [*Endemica*].

2612 (43) *E. Gayi* β *variabilis.* — Il Cesati (Stirpes It. rar. 1840) distingue e figura le seg. forme: **a. communis** (Ces. l. c. fig. II). — Pianta di circa 25 cm., a fg. bislungo-lineari, senza o tutt' al più con 1 ramo nell' ascella delle fg. super. (oltre il verticillo terminale), a brattee intere.

b. elatior Nob. (Ces. l. c. fig. I). — Pianta come in *a*, ma di circa 35 cm. e con 2-3 rami nell' ascella delle fg. super.

c. humilis Ces. (l. c. fig. III). — Pianta di circa 20 cm., a fg. in gran parte piccole ed ovali, le altre lineari-ovali a brattee intere.

d. erosa Nob. (Ces. l. c. fig. IV e V [la fig. V rappresenta un lusus accidentale]). — Pianta come in *a*, ma a brattee qua e là rossicchiato-dentate.

2616 (47) *E. serrata.* — *Val d' Aosta tra S. Vincent e Verres* (*E. Ferrari in litt.*).

2617 (48) *E. amygdaloides* α *typ.* **d. Gussoneana Nob.** = E. silvatica Guss. (non L.). — Forma dei luoghi ombrosi, a portam. più sdraiato, di un verde più pallido, a ghiandole con corna più grosse e più avvicinate (ex Strobl). — *Sic. alle Madonie.*

2618 (49) *E. Characias.* — *Cesenate a Longiano e fra Cesena e Roversano* (*Del Testa*).

γ *melapetala.* — *Isole Maltesi* (*Duthie*).

2620 Gen. Chrozophora Neck. (1790) va sostituito con quello anteriore di **Tournesolia Adans.** (1763), *Scop.* (1777) ed il nome specifico deve essere: *T. tinctoria* (*L.*) *O. Kze.*

b. angustifolia N. Terr. (*sub Croton*). — Fg. subromboideo-lanceolato-ovate, acute, lassam. sinuato-dentate, larghe 10-15 mm. — *Campania.*

CALLITRICHACEAE.

2626 *Callitriche palustris* γ *obtusangula* **b. campana N. Terr.** (sub C. autumnalis). — Differisce per le fg. troncato-bidentate all' apice, le infer. lineari. — *T. di Lavoro* (*N. Terr.*).

ERICACEAE.

2631 *Hypopithys multiflora.* — *Istria sul M. Maggiore* (*Calegari in litt.*), *Sic. nel Messinese nei boschi alla Miraglia* (*S. Nicotra-Ferro*), *Cors. in più luoghi.*

2634 (3) *Pirola minor.* — *Cors. nella foresta d' Aitone* (*R. Maire ex Rouy*).

2636 (5) *Pirola chlorantha.* — *Tir. mer. nel territorio di Bolzano* (*Sauter ecc.*).

2637 (1) *Rhododendron hirsutum* **c. latifolium Hpe.** — Fg. largam. ellittiche od obovate, fi. più grandi e meno intensam. colorati. — *M. Baldo* (*Goir.*) *e certam. altrove.*

d. albiflorum Goir. (1904). — Fi. bianchi. — *Veron. sul M. Baldo e sui Lessini* (*Goir.*).

2637 * Rh. intermedium Tausch = *Rh. hirsutum* × *ferrugineum* = Rh. hirsutum v. ciliatum Caruel. — Differisce per le fg. con ciglia rade al margine, con glandole più dense di sotto. — *Tirolo mer., M. Baldo, Val Venosta ed Alpi di Bormio* (*Ball*).

2637 ** Rh. Halense Grembl. = *Rh. superferrug.* × *hirsutum.* — *Tir. mer. allo Schlern* (*Sauter*).

2639 *Rhodothamnus Chamaecistus* **b. baldensis Goir.** (1904). — Pianta ridotta in ogni parte, contratta, a fg. piccole, lunghe circa 8 mm., a ciglia più brevi. Lacinie calicine più strette. — *M. Baldo in val Losana* (*Goir.*).

2642 (1) *Erica scoparia.* — *Isola Montecristo* (*Béguinot*).

2648 (7) *E. carnea* **c. purpurascens** (L.). — Fi. porporini. — *Veron.* (*Goir.*).

d. albiflora Goir. (1904). — Fi. bianchi. — *Veron.* (*Goir.*).

Digitized by Google

2650 *Calluna vulgaris* **c. puberula Goir.** (1904) (sub C. Erica). — Rami pubescenti, ma fg. glabre. — *Veron.* (*Goir.*).

d. albida Goir. (1904) (sub C. Erica). — Fi. bianchi o bianchicci. — *Veron.* (*Goir.*).

2654 *Arbutus Unedo* **c. angustifolia O. Debx.** = A. Doumeti Romagnoli hb. — Fg. lanceolate, larghe $^1/_2$ del tipo (4-6 per $1^1/_2$-2 cm.), seghettate, a denti corti, irregolari. — *Cors. tra Ajaccio e Vizzavona* (*Romagnoli ex Debeaux*) *e presso Ghisoni* (*Rotgés, Mand. et Fouc.*).

2658 (3) *Vaccinium Myrtillus* **b. leucocarpa Hausm.** — Bacche bianche. — *Presso Bolzano e nei colli Bergamaschi.*

PRIMULACEAE.

2662 * *Primula elatior* × *offic.* **b. purpurascens (Posp.)** = P. acaul. v. purpurasc. Camus = P. acaul. × elat. for. hortensis Pax. — *Friuli* (*Posp.*).

2663 * **P. intricata × grandiflora** et **intricata × officinalis Goir.** (1904). — *Ambedue nel Veronese* (*Goir.*).

2664 (3) *P. officinalis* α *typ.* **d. ampliata Koch.** — Calice campanulato, ampliato, maggiorm. aperto. — *Tir. mer. Bolzano* (*Hausm.*).

β *canescens* (*Opiz*, 1838) = Pr. pannonica Kern. (1886) (Fl. An. II, p. 310 [var. β]).

γ *suaveolens.* — *Sul calcare di Champorcher nelle Alpi Graie or.* (*L. Vaccari*) *ed a Valgrisenche* (*R. Beyer*).

δ *Tommasinii.* — Sec. Pax (in Engler Pflanzenreich IV, 237, p. 64) è un ibrido tra *P. suaveolens* e *P. acaulis.*

2667 (6) *P. Palinuri.* — *Rupi mar. presso Scalea nella Cal. occ.* (*B. Longo*).

2668 (7) *P. Auricula* α *typ.* **c. Seguieri Goir.** (1904). — Pianta ridotta, a pochi fi. con corolla bianca. — *Veron. sui m. Alba e Zeola* (*Goir.*).

2671 (10) *P. hirsuta All.* (Auctar. [1774]) è anteriore a *P. villosa Wulf. in Jacq.* (1778), il primo nome ha quindi il diritto di precedenza per denominare la specie collettiva. Di conseguenza la var. β *cottia* (*Wid.*) deve passare a var. α, perchè è la forma che con maggiore probabilità rappresenta il tipo di Allione e le altre var. seguiranno nell'ordine seguente: β *viscosa* (*Vill.*), γ *oenensis* (*Thom.*), δ *apennina* (*Wid.*), ε *pedemontana* (*Thom.*), ζ *latifolia* (*Lap.*): mentre la *var. villosa* (*Wulf.*) rimane esclusa dalla nostra flora.

2673 * *P. minimo* × *oenensis* **v. Widmerae Pax** (in Engler Pflanzenreich, 1905). — *Trent. nell'Alpe Magiassone* (*Porta*).

2677 (16) *P. spectabilis* δ *Wulfeniana.* — *Carnia nella Valle di Suola presso Forni di Sopra a 1500 m.* (*L. Gortani hb.!*).

2679 *Douglasia Vitaliana.* — *C. Ticino all'Alpe Pianascio sopra Fusio* (*Coaz*), *nell'Abr. anche sui M. della Duchessa* (*Martelli*).

2680 (1) *Androsace alpina* ζ *Hausmanni.* — *Tir. mer. in più luoghi, Veron. sul M. Posta* (*Goir.*).

2682 * **A. heterophylla Ardissone** (Rendic. R. Ist. Lomb. di sc. e lett., vol. XXXVI [1903], p. 993). — *M. Rosa al Ghiacciaio di Macugnaga a circa 1600 m.* (*Ardissone*).

2683 (4) *A. villosa.* — *Cal. citer. al M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

2684 (5) *A. lactea.* — *Nel Veron. anche sui Lessini* (*cfr. Goir.*).

2690 *Soldanella alpina* α *typ.* **b. albiflora Goir.** (1904). — Fi. nivei. — *M. Baldo* (*Seguier*).

2691 (1) *Cyclamen neapolitanum.* — *Isola del Giglio* (*Béguinot*).

β *Poli.* — *Sic. a Piazza Armerina a S. Pietro* (*Lanza*).

2693 (3) *C. europaeum* **c. pusillum Goir.** (1904). — Pianta ridotta in ogni parte. — *Veron.* (*Goir.*).

2694 (1) *Lysimachia vulgaris* **c. westphalica (Weihe).** — Fg. fiorali infer. del racemo terminale molto grandi. — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Keller*) *e certam. altrove.*

Digitized by Google

2703 (4) *Anagallis tenella.* — *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*).

2707 *Samolus Valerandi* **b. elatior Goir.** (1904). — Pianta alta 80 cm. e più, a fusto ramosissimo. — *Rive del Garda* (*Goir.*).

c. **humilior Goir.** (1904). — Pianta di 2-6 cm. — *Veron. presso Legnago* (*Goir.*).

PLUMBAGINACEAE.

2716 (8) *Statice minuta* ε' **Doriae** (**Sommier** in Bull. Soc. bot. it. 1902, p. 211). — Affine alle *var. Tenoreana e minutiflora*, ne differisce sopra tutto per la mancanza di rami sterili e per le spightt. raccolte in spighe grosse, brevi, subcapitate, formanti una infiorescenza densa, corimbosa. — Scapi alti 10-15 cm.; fg. larghe sino a 12 mm., poco revolute al margine; brattea super. lunga 4 mm.; tubo del calice lungo 3 mm. — *Nell' isolotto detto Formica maggiore di Grosseto* (*G. Doria ex Somm.*).

γ *Sommieriana Fiori* (*Somm. pr. spec.*). — *Isola di Montecristo* (*Doria ex Somm.*).

2721 (4) *Armeria vulgaris* ι *marginata.* — *l'armig. sul M. l'rinzera* (*Bolzon!*).

ϰ *plantaginea.* — *Lungo il Ticino nel territ. di Abbiategrasso* (*Cozzi*).

OLEACEAE.

2726 *Phillyrea angustifolia* γ *latifolia* **for. benacensis Goir.** (1904) (sub Ph. variab.). — Fg. piccolissime. — *Veron. a Pai* (*Goir.*).

2731 (1) *Fraxinus Ornus* α *typ.* **b. microphylla Goir.** (1904). — Frutice sdraiato, basso, a fg. lunghe 3-8 cm., con foglioline misuranti 1,3-5 per 0,5-1,5 cm. — *Veron. sulle rupi del M. Pastello* (*Goir.*).

APOCYNACEAE.

2734 (1) *Vinca major* **c. obliqua Huter P. et R.** — Segmenti della corolla obliquam. troncati, terminati dalla parte destra da un apicolo quasi diretto verso il tubo. — *Messina.*

ASCLEPIADACEAE.

2739 (2) *Periploca levigata Ait.* (1789) (cfr. Ross. in Bull. Herb. Boiss. 1899, p. 287).

α **typica.** — Fg. verdi-cupe, opache, varianti dalla forma lineare-oblunga alla ellittico-oblunga, ottuse e nello stesso tempo con o senza punticina od anche attenuate all' apice. — *Propria delle isole Canarie.*

β **angustifolia** (**Labill.**, 1791) = P. rigida Viv. — Fg. verdi-glauche, lineari-oblunghe, di solito più piccole che nel tipo, ottuse e nello stesso tempo con o senza punticina all' apice. — *Da riferirsi qui le località italiane; però sec. il Ross* (*l. c.*) *quelle di Palermo e Trapani, citate dal Caruel, sarebbero erronee.*

Nota. — Il carattere della direzione verticale od orrizontale delle fg., citato dal Ross (l. c.), non ci apparì evidente sugli esemplari d' erbario; ad ogni modo potrebbe dipendere solo dalla direzione dei rami.

2742 (3) *Cynanchum Vincetoxicum* α *typicum* **b. puberulum G. Beck.** — Corolla finam. pubescente all' interno. — *C. Ticino sopra Airolo* (*Chenev.*).

c. **cordatum Kral.** — Fg. largam. cordato-ovate. — *Col tipo qua e là.*

β *laxum.* — *C. Ticino. ove pare assai diffuso* (*Chenev.*)

β' **Burnati Nob.** = Vincetox. offic. v. Burnati Briq. (1901). — Fusto finam. pubescente. Fg. brevi, largam. ovate, cordate, brevem. e bruscam. ristrette all' apice (3-3 1/2 per 2 1/2-3 cm.), a picciuolo lungo 5 mm., finam. pubescenti sui nervi di sotto. Corimbi addensati, a peduncoli e pedicelli finam. pubescenti. Fi. lunghi 4-5 mm., a sepali verdi-

Digitized by Google

scuri, strettam. lanceolati. Corolla giallo-verdastra. — *Cors. al M. Cinto tra 1700-2000 m.* (*Briq.*).

2743 *Asclepias fruticosa.* — *Eolie a Salina* (*Zodda*).

GENTIANACEAE.

2745 *Swertia perennis.* — *Alpe di Mommio sul versante del Reggiano* (*Casali*).

2747 (1) *Gentiana lutea.* — *Nella Cal. occ. anche presso Saracena al Piano di Novacco* (*B. Longo*).

2748 (2) *G. purpurea* **var. flavida Gremli.** — Fi. gialli. — *Comasco a Castel Rain.* (*Artaria*).

2750 (4) *G. Asclepiadea* **a. pectinata Wartm. et Schl.** — Fusto talora incurvato. Fg. pettinate, cioè disposte in 2 file. Fi. unilaterali, allontanati dall'asse. — *Nei luoghi boschivi ombrosi.*

b. cruciata Wartm. et Schl. — Fusto eretto. Fg. incrocicchiate. Fi. raccolti verso l'apice del fusto ed appressati all'asse. — *Nei prati umidi.*

2753 (7) *G. acaulis.* — L' Ugolini ha osservato nel Bresciano che la var. *Clusii* è calcicola e distribuita da 300 ad oltre 2000 m.; la var. *Kochiana* è invece silicicola e trovasi da 1000 m. in su. — L'appetenza per la silice di quest' ultima è confermata anche dall' essere essa rara nelle Alpi or. e diffusa invece nell' Appenn., ove sono estesi i territori silicei (*Adr. Fiori*).

α *Clusii* **a. obtusiflora Ugolini** (1904). — Fg. ovate; corolla svasata ed arrotondata. — *Bresciano* (*Ugol.*).

b. apiculata Ugolini (1904). — Fg. ovato-lanceolate; corolla subsvasata ed apiculata. — *Bresciano* (*Ugol.*).

c. submucronata Ugolini (1904). — Fg. lanceolate; corolla tubulosa e mucronulata. — *Bresciano* (*Ugol.*).

β *Kochiana* **a. obtusiflora Ugolini** (1904). — Fg. ovate, corte; corolla svasata e subottusa. — *Bresciano* (*Ugol.*).

b. apiculata Ugolini (1904). — Fg. ovate, allungate; corolla subsvasata, apiculata. — *Bresciano* (*Ugol.*).

δ *alpina* **b. caulescens R. Keller.** — Fi. con peduncolo lungo sino a 6 cm. Fg. basali $3^1/_2$ per $1^3/_4$ cm. Denti calicini brevi, non od appena ristretti dalla metà all' apice. — *C. Ticino in val Blenio* (*R. Keller*).

2755 (9) *G. verna.* — *Cal. citer. al M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea* (*B. Longo*), *assieme con la for. elongata.*

δ *imbricata* = G. tergloviensis Hacq. — *C. Ticino a Pizzo Barone a 2860 m.* (*Chenev.*).

2760 (14) *G. ciliata.* — *Istria nella pianura del Quieto a 11-12 m. sul mare* (*Calegari in litt.*); *stazione anormale essendo spec. di collina e montagna.*

2761 (15) *G. campestris* α *typica* **a. islandica Murbeck.** — Pianta non ramosa, con una sola fioritura estiva. — *Propria delle alte Alpi.*

b. suecica Moench. — Pianta ramosa, a fioritura estiva (da metà maggio al principio di agosto), a fg. cauline medie ottuse e con 3-5 rami, di cui i super. assai più lunghi delle fg. — *Nei luoghi più bassi.*

c. germanica Froel. — Pianta ramosa, a fioritura autunnale (dal principio d' agosto ad ottobre), con fg. cauline acute e con 4-11 rami, di cui i super. quasi più brevi delle fg. — *Colla prec.*

2762 (16) *G. Amarella* β[1] **carnica M. Gortani** (1903). — Fusto generalm. ramoso dalla base, con infiorescenza corimbosa (3-8 cm.). Fg. cauline medie oblunghe o lanceolate, denticolato-cigliate, $2^1/_2$-3 volte più lunghe che larghe. Calice a 5 denti molto ineguali, peloso-lanosi almeno sul nervo mediano ed ai margini, separati da seni acuti, a tubo alato. Corolla bianco-giallastra, lunga 20-26 mm. Ovario e cassula stipitati.

Digitized by Google

Fioritura autunnale (ag. - sett.). — *Friuli nella Carnia sul M. Coglians a 1800-2100 m.* (*Gortani*).

γ *antecedens.* — *Veron. sul M. Baldo e sul M. Bolca* (*Goir.*).

ε *Sturmiana.* — *Tir. mer. a Bolzano al Rittnerhorn ed al M. Röen* (*Sauter*).

η *rhaetica* **b. candida E. De Toni** (*sub G. Amarella*) (cfr. M. Gortani in Bull. Soc. bot. it. 1903, p. 267-68; Fiori in Fl. An. II, p. 355 [nota]). — Differisce dalla for. genuina pel fusto ridotto, le fg. più strette, il calice a denti scabri al margine e sul nervo mediano e pei fi. assai più piccoli ed a corolla bianca. — *Anfiteatro morenico del Friuli, assieme colla for. genuina* (*E. De Toni, Lorenzi, Gortani*).

c. **albiflora M. Gortani** (1903). — Fg. lanceolate. Calice glaberrimo, a denti lanceolato-acuti, piani, con seni acuti. Corolla bianco-lattea. Fioritura autunnale. — *Friuli presso Tolmezzo sul m. Strabut a 400-500 m.* (*Gortani*).

2767 (2) *Chlora perfoliata* α *typ.* **d. exilis Goir.** (1904). — Pianta ridotta, a fusto di 4-7 cm., 1-floro. Calice poco più breve della corolla. — *Veron.* (*Goir.*).

β *grandiflora.* — *Veron.* (*Goir.*).

γ *serotina.* — *Cors. in più luoghi* (*Marsilly, Mand. et Fouc.*).

d. **acuminata (Koch et Ziz.).** — Lacinie della corolla acuminate. — *Veron.* (*Goir.*).

2770 (3) *Erythraea Centaurium* **e. albiflora Goir.** (1904). — Fi. bianchi. — *Nell'area della spec.*

2771 (4) *E. pulchella* α *typ.* **d. pseudo-spicata Goir.** (1904). — Pianta ridotta, a fusto spesso semplicissimo ed a pochi fi. — *Nei luoghi aridi.*

2772 *Menyanthes trifoliata.* — *Cors. al lago di Nino assai abbondante* (*Maire*).

POLEMONIACEAE.

2774 *Polemonium caeruleum.* — *Tir. mer. presso Bolzano sul M. Röen a 1700 m.* (*Sauter*).

BORRAGINACEAE.

2775 (1) *Cerinthe minor* α *typ. b. Allionei.* — Deve togliersi il sinonimo *C. maculata All.* (vedi sotto); però si può conservare egualm. questa entità per indicare le for. di *C. minor* con corolla a 5 punti porporini all'esterno contro l'inserzione degli stami.

c. **ciliaris M. Gortani** (1903). — Fg. cauline, almeno le super., lacinie calic. e brattee denticolato-cigliate per setole brevi, sorgenti da punti callosi. — *Dintorni di Udine più comune del tipo* (*Gortani*).

β *maculata.* — Deve riferirsi qui anche la *C. maculata All.* ed aggiungere le località: *Alpi Cozzie e Mar. ed Appenn. vogherese* (*cfr. Gola in Malpighia* [1904]).

2780 (1) *Echium italicum.* — *Colli di Reggio-Em. sull'altipiano del Ghiardo ed a S. Bartolomeo di Sassoforte* (*Casali*).

β *altissimum.* — *Veron.* (*Goir.*).

2791 (6) *Lithospermum apulum.* — *Presso Cervia in Romagna* (*Del Testa*).

2793 (8) *L. arvense* γ *caerulescens.* — *Abr. a Villavallelonga in molte località della Difensa e altrove* (*Grande Loreto!*). — Pel portamento corrisponde alla for. *incrassatum* (*Guss.*), ma i fi. sono normali.

Gen. Myosotis. — Vedi: Béguinot in « Annali di botanica del Prof. Pirotta, vol. I, 1904 ».

2794 (1) *M. palustris* α *memor Kitt.* = M. pal. α typica Fiori in Fl. An. II, p. 369. — Qui anche la for. *b. parviflora Celak.* (Fl. An. l. c. [for. c.]). — *Questa var. sec. Béguinot, è rara in It. e forse localizzata alla reg. pad.*

β *strigulosa* (*Rchb.*) (Fl. An. II, p. 369 [for. α b.]). — Differisce dal tipo per avere peli appressati nel fusto e nei rami o per essere quasi glabra (**b. elatior [Opiz]**). Corolla anche qui ora più grande ed ora (**c. micrantha Nob.**) più piccola. — *È la var. più comune in Italia.*

Digitized by Google

γ **pseudo-caespitosa Nob.** = M. caespitosa Auct. it. = M. strigulosa v. pseudo-caespitosa Bég. (1904). — Differisce dalla *v. strigulosa* per essere più gracile, più ramosa, pel rizoma breve o nullo e per le fg. più strette ed aride e pel calice più profondam. inciso. Varia per la corolla ora (*a. macrantha Nob.* = M. caespitosa b. macrantha Fiori in Fl. An. II, p. 369) del diam. di 4-7 mm. ed ora (**b. apennina Nob.** = M. sicula v. apennina Bég. [1904] = M. pal. γ sicula Fiori p. p. (Fl. An. l. c., p. 370) di 3-4 mm. e con tubo spesso più lungo del calice. — *Nella zona collina e mont. dell' Appenn.; la for. b in Tosc. a Boscolungo, nel Mugello ed a Vallombrosa e certam. altrove.*

δ *caespitosa* (Fl. An. l. c. var. β). — Il Béguinot non vide alcun esemplare ital. di questa var., che perciò deve mancare tra noi od esservi rarissima. Differisce dalla preced., colla quale viene in generale confusa (sec. Béguinot), pel calice largam. campanulato, quasi tanto lungo che largo e non mai ristretto in basso a maturità, per le lacinie calicine più profondam. divise (sin oltre la metà) e separate da un seno ottuso (nelle due var. prec. invece è tubuloso, attenuato in basso ed a lacinie divise sino a meno della metà lunghezza del calice).

ε *sicula* (Fl. An. l. c. var. γ) **b. virgata Bég.** = M. sicula Auct. fl. Etrur. — Differisce dalla for. genuina pel fusto cespuglioso, robusto (2-4 dm.), fortem. ramoso dalla base, a rami suberetti, allungati e quasi virgati, lunghi come l' asse centrale o più, per le fg. strettam. lanceolato-acute, robuste, aride e tuberculoso-scabre, pei racemi lunghi fino a 2 dm., pel calice campanulato-tubuloso, circa $^1/_2$ più piccolo, a divisioni più strette ed acute, infine per la corolla grande, a tubo eguale al calice ed a lembo subeguale a questo. — *A Castagnolo presso Pisa.*

2795 (2) *M. pusilla α typica. — Sec. Béguinot trovasi solo in Sard. e Cors.; ed anche nell' Abr. presso Villavallelonga (Grande!).*

β *incrassata* (*Guss.*) = M. pusilla Guss. — Differisce dal tipo (sec. Béguinot) pel racemo costantem. ebratteato, per i peduncoli frutt. più allungati e robusti, alla fine un po' ingrossati e sopratutto per la corolla (anche nel secco) azzurro-carica e per essere pianta spesso in ogni parte più sviluppata. — *Abr. presso Villavallelonga (Grande!), Gargano e Sic.; probabilm. da riferirsi qui anche la pianta di Cal.*

2796 (3) *M. pyrenaica.* — Le var. comprese sotto questa spec. (sensu lato), seguendo i rilievi fatti dal Béguinot (l. c.) vanno meglio così distribuite:

α *typica.* — Distinguesi dalla v. *alpestris* per i rami dell' infiorescenza diritti e ravvicinati, per i pedicelli più corti del calice, eretti, quasi applicati all' asse, per il calice grigiastro, più grande e con le lacinie conniventi alla maturità. — Fusti di 5-20 o talora (*b. exscapa DC.*) 2-5 cm. soltanto. — *Alti monti della Corsica.* [*Pirenei*].

β **ambigens Bég.** (1904). — Intermedia tra il tipo e la *v. alpestris.* Differisce dal tipo per le fg. basilari meno allungato-spatolate e più piccole, per quelle caulinari più strette, pei racemi più lunghi e più robusti e per essere pianta assai più peloso-ispida. — *Appenn. tosco-em.* (*Alpe di Mommio, m. Orsaio, Tre Potenze e Corno alle Scale*) (*ex Béguinot*).

γ **alpestris (Schmidt).** — Vedi sopra i caratteri pei quali si distingue dal tipo. — *Alpi ed Appenn.*

δ *suaveolens* (*W. et K.*) (Fl. An. II, p. 370 [for. α *c.*]). — Differisce dalla *v. alpestris* per le fg. più strette, le infer. attenuate in lungo picciuolo ed un po' spatolate, pei racemi più allungati, per i peduncoli 1-2 volte più lunghi del calice e per essere questo più grande e più profondam. fesso. — *Istria sul m. Maggiore.*

ε *Gussonei Zodda* (1900) = M. silv. v. Gussonei Nic. (1879-83) = M. elongata Strobl (1884); Fl. An. II, p. 370 (var. β). — Colle due forme **a. grandiflora** e *b. parviflora Bég.* = M. elong. b. parvifl. Strobl (Fl. An. l. c. [for. *b.*]).

ζ *silvatica.* — Vedi Fl. An. II, p. 370 (var. γ).

η **Soleirolii (Gr. et Godr.)** = M. marginata Soleir. in hb. Webb = M. lactea Bor. — Differisce dalla *v. silvatica* pel racemo breve e flessuoso, per i peduncoli gracili ə

Digitized by Google

subeguali al calice, con tendenza a curvarsi in basso dopo l'antesi, per la corolla bianca e piccola. — *Corsica* (*m. Rotondo, al Dragone presso Restonica, Bastelica, Vizzavona e foresta di Casamente*).

2797 (4) *M. arvensis* β *collina* **b. gracillima** (**Losc. et Pard.**) = M. collina var. Huet exs. — Differisce dalla forma genuina per i fi. il doppio più grandi, per la pubescenza molle e per i fusti e rami più robusti. — *Sic. al m. Busambra* (*Huet*) (*cfr. Béguinot l. c.*).

γ *stricta*. — *Sec. Béguinot questa var. è assai rara in Italia e forse localizzata all'It. sett. ed a qualche punto di quella centr.*

δ **Marcillyana** (**Burnat in Bég.**) = M. tenella Bonn. et Layens (non C. A. Mey, nec Nutt.). — Fusto sottile, flessuoso, ascendente, a rami gracili e patenti, spesso allungati (5-12 cm.). Fg. verdi-pallide, con minuti e radi peli, oblunghe od obovate, assai grandi in rapporto alla statura della pianta. Racemi fogliosi in basso; peduncoli uguali al calice o spesso alla fine 1-3 volte più lunghi di esso, curvati verso il basso. Calice lungo appena 2 mm., a denti ovali-lanceolati, quasi chiuso a maturità, a peli patenti, ricurvi all'apice. Corolla dapprima bianca, poi violaceo-bluastra. — *Appenn. piceno al M. della Sibilla alla Grotta di Foce scura* (*Marzialetti ex Bég.*).

2798 (5) *M. versicolor*. — *Ritrovata nei Colli Euganei sul M. Sengiari* (*Bég.*), *Cors. a Biguglia* (*E. Petit*).

β **caprariae Bég.** (1904). — Pianta con tendenza a diventare perenne, a racemi brevi, con fi. avvicinati. Corolla alla fine con tubo poco più lungo del calice (non il doppio come nel tipo). — *Isola Capraia* (*Sommier ex Bég.*).

2797 * **M. sparsiflora Mik.** — Questa spec. propria dell'Eur. sett. sarebbe stata racc. nel « *Litorale veneto* (*Kellner*, 1846, *sec. un esemplare dell'Erb. centr. di Firenze*) », ma questa indicazione sec. Béguinot (l. c.) merita conferma. — *l'più recentem. sarebbe stata trovata nel Tir. mer. a Bolzano sui muri a Guntschna* (*Sauter*).

2803 (3) *Nonnea ventricosa b. alba* (DC.). — Non fu possibile rintracciarne gli esempl. nell'Erb. centr. di Firenze ove conservasi l'erbario Groves, per cui l'unica località ital. citata da questo Autore, cioè « *T. d'Otranto* », rimane dubbia (Adr. Fiori).

2810 (5) *Anchusa officinalis*. — *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*).

2817 (2) *Symphytum tuberosum* α *typ.* — *Corsica ad Ajaccio ed altrove* (*E. Petit*).

2818 (1) *Cynoglossum apenninum*. — *Cal. citer. al Piano di Novacco nel territ. di Saracena* (*B. Longo*).

2819 (2) *C. officinale* δ *nebrodense* = C. Tenorii Guss. ex Nym. — *Abr. nei M. della Duchessa* (*Martelli*).

2820 (3) *C. creticum* **b. albiflorum Goir.** (1904). — Corolla interam. bianca. — *Nell'area della spec.*

2825 *Omphalodes verna*. — *Appen. lig.-parmig. presso Casale di Tornolo* (*Bolzon in litt.*).

CONVOLVULACEAE.

2839 (8) *Convolvulus tricolor*. — *Cors. a Brando* (*E. Petit*).

2842 (11) *C. arvensis* α *typ.* **e. elatior M. Gortani** (1903). — Segmenti calicini glabri sulle facce ma cigliati al margine. Fg. medie e super. saettate, con orecchiette ottuse, molto divergenti e formanti un largo seno col resto della lamina, ch'è ovata od ovato-bislunga ed arrotondata all'apice. Fusto alto più di 2 m. — *Friuli nella Carnia presso Oltris* (*Gortani*).

2843 (12) *C. sepium* α *typ.* **c. micranthus** (**Goir.**) (1904) (sub Calystegia). — Fg. piccole. Corolla 2-3 volte più piccola del normale. — *Veron. a Ceredolo* (*Goir.*).

2850 (1) *Cuscuta Epithymum* **for. Sarothamni** (**Bruegg.**). — *C. Ticino in Val Broglio sul Cytisus* (*Sarothamnus*) *scoparius* (*Chenev.*) *ed altrove.*

2851 (2) *C. europaea* **c. Schkuhriana** (**Pfeiff.**) = C. europ. β vacua Gr. et Godr. — Co-

Digitized by Google

rolla senza squame sotto gli stami. Cassula ovale, ottusa. — *Sull' Humulus Lupulus nel Parmig.* (*Avetta e Casoni*).

SOLANACEAE.

2857 (2) *Datura Stramonium* α *typica* **b. dubia (Bianca).** — Fusto pieno (non fistoloso come nella for. genuina). — *Sic. nel territ. d' Avola lungo la Fiumara Cassibili* (*Bianca*).

β *Tatula.* — *Dintorni di Messina* (*Zodda*).

2859 (1) *Hyoscyamus niger* **e. micranthus Goir.** (1904). — Fi. più del doppio più piccoli del normale. — *Veron.* (*Goir.*).

2871 (3) *Solanum nigrum* α *vulgare* **for. grossidens Luescher.** — *C. Ticino* (*Luescher ex Chenev.*).

θ *villosum* **for. nigrocarpum Luescher.** — *C. Ticino* (*Luescher ex Chenev.*).

2873 (5) *S. sodomaeum.* — *Isola di Procida nel Golfo di Napoli* (*Béguinot*), *Salernit. al M. S. Angelo* (*L. Marcello*).

2877 (2) *Physalis Alkekengi.* — *Cors. a Prunelli di Fiumorbo* (*Pieri ex Fouc.*).

2882 * **Salpichroa rhomboidea Miers.** — *Questa Solanacea originaria dell' Argentina la vedemmo perfettam. naturalizzata nell' Orto Bot. di Pisa nel Sett. 1903* (*Adr. Fiori*), *nel 1905 fu pure trovata inselvat. alla Villa Kraus a Fiesole presso Firenze* (*Sommier hb.!*) *e nel 1906 nell' Orto Bot. di Napoli* (*Béguinot*).

SCROPHULARIACEAE.

2884 * **Verbascum montano × Thapsus.** — *C. Ticino a Locarno* (*Chenev.*).

2884 ** **V. Lychnitis × montanum.** — *C. Ticino a Locarno* (*Chenev.*).

2891 * *V. pulverulento × sinuatum* = V. hybridum Brot. — *Presso Firenze* (*Somm.!*), *Cal. or. a Spanadi* (*Mottareale*).

2834 (12) *V. conocarpum.* — *Is. di Montecristo, da sostituirsi al V. Boerhaavei indicatovi erroneam.* (*Somm.*)

2896 (14) *V. nigrum* α *typ.* **g. giganteum Goir.** (1904). — Pianta alta 15 dm. e più, a fg. misuranti 38 per 14 cm. — *M. Baldo* (*Goir.*).

2896 * **V. Thapso × nigrum Schiede.** — Differisce dal *V. nigro × Thapsus* pei fi. molto più piccoli, simili a quelli di *V. nigrum*, e pel fusto e per le fg. cauline tutte eguali a quelle di *V. Thapsus.* — *Friuli nella Carnia presso Forni Avoltri* (*Gortani*).

2896 ** *V. nigro × thapsiforme.* — *C. Ticino ad Olivone* (*R. Keller*).

2896 *** **V. nigro × phlomoides R. Keller** (Bull. herb. Boiss. 1903, p. 477). — *C. Ticino ad Olivone* (*R. Keller*).

2896 **** *V. nigro × Lychnitis.* — *Tir. mer. presso Bolzano a S. Cristina in Gröden* (*Sauter*), *C. Ticino a Rovio, S. Martino, sopra Olivone e Val Blenio* (*Chenev.*).

2897 (15) *V. Chaixi.* — *C. Ticino in Val di Muggio ed a Melide* (*Chenev.*).

β *austriacum* **b. albiflorum M. Gortani** (1903). — Corolla bianca. — *Friuli sopra Ampezzo Carnico in Cima Corso* (*Gortani*).

2897 * **V. Chaixi × Lychnitis.** — *Veron. nella Val Marchiora sotto S. Anna d' Alfaedo* (*Goir.*).

2898 (16) *V. phoeniceum.* — *Nelle Marche anche sul M. Regnolo ed a Piamperduto* (*Paol. e Card.*).

2900 (1) *Linaria Cymbalaria* α *typ.* **d. minor Goir.** (1904). — Pianta ridotta in ogni parte, densam. cespugliosa, quasi acaule. — *Veron.* (*Goir.*).

2907 (8) *L. spuria* **d. platyphyllos Goir.** (1904). — Fg. bislunghe, ovate o quasi rotonde, misuranti 4-5 per 3 cm. — *Veron.* (*Goir.*).

2912 (13) *L. vulgaris.* — *Isola d' Elba* (*Doria ex Somm.*).

Digitized by Google

2917 (18) *L. laxiflora* β *pseudo-laxiflora* (*Lojac.*). — Secondo le informazioni forniteci dal Dott. Ross da Monaco di Baviera e dietro esame di esemplari dallo stesso gentilm. comunicatici, come pure per notizie forniteci dal Cav. Sommier che recentem. potè ritrovare e raccogliere numerosi esemplari di questa pianta critica, la chiave e la sinonimia alle p. 422-23 vanno così modificate:

20 *Peduncoli fiorali lunghi quasi il doppio delle fg., eretti nel fiore, curvati ad arco nel frutto.* **L. reflexa**

— *Peduncoli fiorali assai brevi o quasi nulli, sempre eretti.* **21**

21 *Corolla gialla. Cassula un po' più lunga del calice. Semi alveolato-rugosi.* **L. flava**

— *Corolla porporina o biancastra. Cassula un po' più breve del calice. Semi fortem. reticolato-alveolati.* — Fusti diffusi, gracili, alti 6-7 cm., terminati da racemi brevi, aventi 2-3 fi. soltanto, piccoli, porporino-biancastri. Portam. della *L. flava*. ⊙. *Is. di Linosa* (*Ross*, *Lojac.*, *Zodda*, *Somm.*). *Apr.* [*Endemica*]. — L. virgata β albiflora Asch. (1882). **18 L. pseudo-laxiflora Lojac.** (1884)

Nota. — La nostra pianta non può essere paragonata a *L. laxiflora Desf.* che è spec. assai differente, più prossima è invece a *L. virgata Desf.* tanto che l'Ascherson ne l'aveva considerata come varietà, però ne differisce assai nel portamento costantem. diverso, in modo che si può considerare, col Lojacono e col Sommier, come spec. distinta.

2920 (21) *L. genistifolia* α *typ.* — *Tir. mer. presso Bolzano a Guntschna* (*Sauter*).

2922 (23) *L. purpurea b. litoralis Caruel* (1860) = Antirrhinum purpureum S. et S. = L. purp. v. gracilior Caruel (1885).

2927 * (29) **L. origanifolia DC.** = Antirrhinum L. — *Scoperta nel giugno 1906 dal sig. E. Ferrari conservatore dell'Orto Bot. di Torino sulle rocce calcaree alla destra del torrente Macra a monte del Ponte di Dronero in prov. di Cuneo* (!).

2932 *Simbuleta bellidifolia* β *laxiflora*. — *Cors. salendo dalla foresta di Marmano al M. Renoso tra 1200-1300 m.* (*Briq.*).

2936 (4) *Scrophularia aquatica* β *alata* **b. subaptera Goir.** (1904). — Fusto strettamente alato. — *Veron.* (*Goir.*).

2944 *Lindernia pyxidaria All.* (1762-65), *L.* (1771).

2947 (3) *Veronica Beccabunga* **for. limosa Lej.** — *C. Ticino sotto Crocefisso, M. S. Giorgio* (*Chenev.*).

2950 (6) *V. Teucrium* α *typ.* **d. vestita Gr. et Godr.** (1850) = V. canescens Bast. (1812) (non Schrad.) = V. Bastardi Bor. (1857). — Pianta biancastro-pubescente. — *Veron.* (*Goir.*).

2953 (9) *V. officinalis* **f. spadana Lej.** = for. luxurians Goir. — Pianta lussureggiante, a racemi ramoso-pannocchiuti. — *Veron.* (*Goir.*).

2960 (16) *V. fruticosa* β *fruticans*. — *Il Briquet crede che in Cors. si trovi solo questa var. e manchi il tipo, ch'è calcicolo.*

2963 (19) *V. bellidioides* **b. Townsendi Gremli** = v. lilacina Townsend. — Pianta più robusta, a fg. piu lunghe e distintam. dentate. Antere biancastre. Cassula attenuata verso l'apice. — *Propria del Vallese; ma una for. che le si avvicina è indicata del C. Ticino a Costa in Val Blenio* (*R. Keller*).

2966 (22) *V. brevistyla*. — *Citata erroneam. dell'isola di Capraia* (*cfr. Sommier in N. Giorn. bot. it. 1902, p. 341*).

2969 (25) *V. peregrina*. — *Tir. mer. a Bolzano* (*Sauter*).

2971 (27) *V. praecox*. — *Monti della Cal. occ.* (*B. Longo*).

α *typ.* **b. pusilla Goir.** (1904). — Pianta ridottissima di 2-3 cm. — *Nei luoghi aridi.*

β *didyma*. — *Eolie a Lipari* (*Zodda*).

c. rosiflora Evers, sub V. polita (1896) (sine descriptio). — *Trento* (*Evers*).

2974 (30) *V. hederaefolia* **c. praestabilis G. Beck** = V. cymbalariaefolia Schmidt, non Vahl. — Fg. più grandi, con 2-4 denti per lato; peduncoli quasi filiformi, 3-4 volte

Digitized by Google

più lunghi del calice frutt.; frutti spesso vuoti. — *C. Ticino a Locarno, Intragno e Contra* (*Chenev.*).

2979 * **Digitalis Gyspergerae Rouy.** (Rev. bot. syst. 1904). — *Corsica* (*Gysperger ex Rouy*); *prossimo a D. dubia Rodriguez delle Baleari.*

2981 * *D. ambiguo* × *lutea* = D. media Roth. — *C. Ticino in Val di Muggio* (*Chenevard*).

2984 (1) *Melampyrum cristatum* **b. angustissimum Bolzon** = M. cristatum Bolzon in Suppl. gen. Fl. Ven. — Fusto e rami più esili, questi più lunghi e più divaricati; fg. strettissime (larghe 1-3 mm.), lineari-lesiniformi. — *Nel Trevigiano* (*Bolzon*).

2986 (3) *M. barbatum* **var. variegatum Porta et Rigo** exs. n. 206 (1875) = M. variegatum Porta et Rigo in Giorn. bot. it. 1877, p. 299 [nomen]. — *Gargano nei boschi presso Vico* (*Porta et Rigo*).

2987 (4) *M. nemorosum* α *typ.* **for. subalpinum Juratzka** (1857) (**Kern.**, 1863) = M. silvatico × nemoros. Bermann (1855) = M. nemoros. β angustifolium Neilr. (1859). — *Tir. mer. a Bolzano tra S. Isidoro e Kohlern* (*Sauter*).

β *pratense* **d. dissectibracteatum Evers** (1896). — Corolla giallo dorata, più grande che nel tipo. Brattee divise in 6-8 lunghi denti lesiniformi e cigliati. Denti calicini minutam. cigliati. Fusti generalm. assai ramosi dalla base, con fg. non più lunghe nè più strette delle brattee fiorali infer. — *Trento a M. Calisio* (*Evers*).

2988 (5) *M. silvaticum* **b. angustifolium M. Gortani** (1903). — Fg. lineari, 12-18 volte più lunghe che larghe; brattee lineari o lineari-lanceol., almeno 8 volte più lunghe che larghe. — *Friuli presso Forni di sopra* (*Gortani*).

2990 (1) *Euphrasia salisburgensis.* — *Cors. sul M. Renoso (Kralik, Briq.).* — Il Briquet dice che è da riferirsi a questa spec. l'*E. nemorosa v. parviflora* citata dal Burnouf delle montagne di Corte e quasi certam. l'*E. nemorosa v. parviflora* citata da Foucaud dei M. Rotondo e Renoso.

δ *Marchesettii.* — *Bresciano presso Lograto nella Lama la Bissa* (*Ugolini*).

2991 (2) *E. tricuspidata* β *cuspidata.* — *Bresciano sulla dolomite in Valsabbia fra Coste di S. Eusebio e Costa Antana* (*Ugolini*).

2991 * **E. vestinensis Wettst.** = E. tricuspid. × Kerneri. — *Trent. in Val Vestino* (*Evers*).

2992 (3) *E. officinalis* β *stricta.* — *Trentino* (*Evers*).

ε *nemorosa* **b. parviflora Soy-Willm.** — *Cors. al M. Rotondo* (*Mand. et Fouc.*) *e M. Renoso* (*Rotgès ex Fouc.*).

ζ *gracilis* (*Fr.*) **for. rigidula** (**Jord.**). — *Tir. mer. presso Bolzano allo Schlern e Seiseralpe a 1600-2000 m.* (*Sauter*).

η *minima c. drosocalyx.* — *Trent. allo Schlern ed alla Marmolata* (*Evers*).

θ *hirtella.* — *Trent. in Val di Sole, Rabbi e Fucine* (*Evers*).

ι *brevipila.* — *Trent. sull'Adamello* (*Evers.*).

b. tenuis (**Wettst**, 1896) = E. offic. v. tenuis Brenn. (1886). — *Nei prati di Agnelezza presso Vittorio nel Trevigiano* (*Pampanini*).

var. pumila (**A. Kern.**). — *Tir. mer. a Bolzano al Seiseralpe a 1500-1800 m.* (*Sauter*).

var. versicolor (**A. Kern.**). — *Tir. mer. allo Schlern, Seiseralpe e Salten a 1500-2000 m.* (*Sauter*), *C. Ticino* (*Chenev.*, *R. Keller*).

2992 * **E. Freynii Wettst.** = E. minima × hirtella. — *Trent. a Franzenshöhe* (*Evers*).

2993 (4) *E. alpina* γ *Kerneri.* — *Istria, copiosa nel territ. di Parenzo* (*Calegari*), *Trent. in Val Vestino* (*Evers*).

δ *Rostkoviana b. montana.* — *Trentino* (*Evers*).

c. minuta Beck. — *C. Ticino all'Alpe di Lago ed in Val Lavizzara* (*Chenev.*).

var. calvescens Chab. ap. Fiori, Bég. et Pamp. in N. Giorn. Bot. it. 1906, p. 178. — *Piem. in Val d'Aosta in Val di Champorcher* (*L. Vaccari*).

2993 * **E. hybrida Wettst.** = E. Rostkoviana × stricta. — *C. Ticino in Val Redorta* (*Chenev.*).

Digitized by Google

Gen. Rhinanthus. — Vedi anche: Behrendsen, in Verhandl. des Bot. Ver. der Prov. Brandenburg, 1903.

3005 (1) *R. Alectorolophus* β *patulus.* — *C. Ticino ad Olivone in Val Blenio ed a Casaccia in Val S. Maria* (*Chenev.*), *Brunate presso Milano* (*Magna ex Behrendsen*).

η Facchini. — *Trento presso S. Maria di Campiglio ed al M. Spinale* (*A. Engler ex Behrendsen*).

δ *modestus.* — *Friuli nei m. della Carnia, a 1500-1900 m.* (*Gortani*).

3006 (2) *R. maior* β *ovifugus.* — *Alpi Cozzie e Pennine* (*Beyer ex Behrendsen*).

β¹ **Beyeri (Behrendsen** l. c., sub Alect.). — Intermedio fra le var. *ovifugus* e *divaricatus.* Fusto alto 10-15 cm., quasi glabro, sempre ramoso dal basso o dalla metà, a molti internodi più brevi delle fg., privo di fg. intercalari o con 1 o raram. 2 paia. Fg. lineari o lineari-lanceolate, acute o subacute; brattee simili alle fg., triangolari, più lunghe del calice. Semi alati. Fiorisce dalla fine di luglio al principio d'agosto. — *Piem. nelle Alpi Graie in Val di Rhêmes, Col della Fenêtre de Tei e Val d'Aosta alla Piccola Montagna* (*Malinverni ex Behrendsen*).

γ *divaricatus.* — *Piem. in Val Sesia, Val d'Aosta* (*Malinverni*), *Rodoret, Massel e Pramol* (*Rostan*) *ed Appenn. di Reggio-Em. sopra Ligonchio* (*Adr. Fiori*) (*cfr. Behrendsen*).

b. demissus Behrendsen l. c. sub Alect. — Fusto di 5-15 cm., ramoso dalla base. Fg. a denti più densi e quasi appressati; brattee più piccole, a pochi denti subeguali al calice, che è violaceo-scuro. — *Piem. sul M. Zeda in Val Intrasca ed a Rodoret, Massel e Pramol* (*Rostan ex Behrendsen*).

var. serotinus Schönh. (1850) = Alectorolophus G. Beck (1892), Sterneck (1895) = Rh. major β angustifolius Koch (1844) (non Rh. angustifol. Gmel.) = Fistularia serot. Wettst. in Engl. et Prantl (1891). — *C. Ticino a Forné ed in Val Sambuco* (*Chenev.*).

ε *Burnati.* — *Basso Friuli fra S. Giorgio di Nogaro e Nogaro* (*Gortani*), *Piem. nelle Alpi Cozzie in Val Macra* (*Beyer ex Behrendsen*).

ζ *mediterraneus.* — *Alpi Cozzie in Val Macra, Massel, Bobbi e M. Cenisio* (*Rostan ex Behrendsen*).

η *arvernensis.* — *Alpi Cozzie in Val Pellice e Piano del Prá* (*Beyer*).

θ *Wettsteinii.* — *Abr. al Gr. Sasso* (*ex Behrendsen*).

b. neapolitanus Behrendsen l. c., sub Alect. — Differisce dalla forma genuina pel fusto più alto (2-4 dm.), scarsam. glanduloso-peloso, quasi glabro inferiorm., sempre ramoso, a rami obliquam. ascendenti e più brevi del fusto e per avere 2-4 paia di fg. intercalari. Labbro infer. della corolla spesso non raggiungente il dente del labbro super. — *M. Vergine presso Avellino e M. Esule presso il Matese* (*Guadagno ex Behrendsen*).

3007 (3) *R. angustifolius* β¹ **Pampaninii (Chab.** ap. Fiori, Bég. et Pamp. in N. Giorn. Bot. it. 1905, p. 199). — Prossimo alla *var. lanceolatus*, se ne distingue per la fioritura più precoce, pel fusto eretto e rigido, pei denti delle fg. patenti, per le brattee e calici cigliati per peli glandulosi brevissimi, pel tubo della corolla lungo e poco incurvato superiorm. e pel labbro super. a denti largam. conici e troncati. — *Nelle prealpi venete presso Vittorio fra i 300-800 m.* (*Pampanini*) *ed a Soleschiano nel Friuli* (*G. di Brazzà in hb. Taurinen.*).

γ *subalpinus b. brevifolius.* — *Tir. al Brennero ed Ospizio del S. Gottardo* (*Behrend.*).

3008 (4) *R. minor* β *stenophyllus.* — *Tir. sul Ritten* (*Hausm.*), *Vallombrosa* (*Adr. Fiori*).

3015 (6) *Pedicularis gyroflexa* β *elegans.* — *Cal. citer. al M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

3016 (7) *P. palustris.* — *Istria nella valle infer. del Quieto* (*Calegari*).

3022 (13) *P. recutita.* — *C. Ticino in più luoghi* (*ex Chenev.*).

3023 * *P. roseo* × *rostrata.* — *Tir. mer. allo Schlern a circa 2400 m.* (*Sauter*).

Digitized by Google

OROBANCHACEAE.

3028 (4) *Kopsia lavandulacea.* — *Isola del Giglio* (*Doria ex Somm.*).
3031 (7) *K. arenaria.* — *Lago di Garda a Riva* (*Gelmi*).
3035 (4) *Orobanche Teucrii.* — *Veron. presso Avesa* (*Goir.*, *Massal.*), *Camposilvano* (*Gelmi*).
3038 (7) *O. variegata.* — *Veron. a Legnago* (*De Bonis*).
3047 (16) *O. Salviae.* — *Tir. mer. nel territ. di Bolzano ad Aldein sulla Salvia glutin.* (*Sauter*).
3053 (22) *O. minor* β *pumila.* — *Istria nel territ. di Parenzo sull'Helichrysum italicum* (*Calegari, fide Beck*).

LABIATAE.

3064 * **Ajuga reptans** × **genevensis Lasch** = A. hybrida A. Kern. — *Verona fuori porta Vescovo* (*Goir.*).
3066 (4) *A. genevensis* **f. ascapa Goir.** (1904). — Fusto subnullo; forse for. mostruosa. — *Veron. sui Lessini* (*Goir.*).
3068 (6) *A. Iva, c. asperifolia Nob.* = Moscharia Forskal = M. Forskalei Gmel. = A. Iva c. pinnatifida Bég. in Fl. An. III, p. 8 (pro err.) (non *Moscharia pinnatifida Ruiz. et Pav.* quae Composita Chilensis est).
3069 (7) *A. Chamaepitys* β *grandiflora.* — *Bresciano alla Croce di Vallio* (*Ugolini*), *Veron. in più luoghi* (*Goir.*).
3079 (10) *Teucrium Scordium.* — *Elba* (*Doria ex Somm.*).
3081 (12) *T. flavum b. glaucum Fouc. et Sim.* (1898), *Bég.* (1903) (*Bég.*, 1906) = Chamaedrys glauca Jord. et Fourr. (1866).
3088 (1) *Scutellaria alpina.* — *Appenn. marchig. al M. Pescolla* (*Cardinali*).
3091 (4) *S. galericulata* **c. glaberrima Benth.** — Fusto e fg. glabri; corolla più piccola — *C. Ticino attorno al lago Muzzano* (*Chenev.*).
3111 (3) *Nepeta italica.* — *Nelle Marche anche a Bolognola* (*Cardinali*).
3118 (2) *Glechoma hirsuta.* — *Cors. a S. Angelo* (*Romagnoli*) *ed a Poggiò di Mazza* (*Rotgès ex Fouc.*).
3120 * *Brunella bicolor.* — *C. Ticino sopra Losone* (*Chenev.*) *e Tir. mer.* (*Sauter*).
3126 (1) *Galeopsis Tetrahit* α *typ. a. arvensis.* — *C. Ticino* (*Chenev.*).
δ *pubescens* **for. Murriana (Borb. et Wettst.).** — *Tir. mer. presso Runkelstein* (*Sauter*), *Veron. in più luoghi* (*cfr. Goir.*).
for. tristis Briq. — *C. Ticino sotto Boggio* (*Freson ex Chenev.*).
3126 * **G. Eversi Murr** (1894) = *G. tridentina Evers hb.* — *Trentino* (*Evers*).
3128 (3) *G. Ladanum* α *angustif. b. orophyla.* — *C. Ticino* (*Chenev.*).
β *intermedia* **b. glabrescens Evers** (1896). — Fusti quasi glabri, con glandule sparse. Fg. glabre, intensam. verdi, ovali. Calice con glandule sparse. Corolla piccola. — *M. Baldo a S. Giacomo* (*Evers*).
3130 (2) *Lamium Galeobdolon.* — Sec. Béguinot (Bull. Soc. bot. it. 1903, p. 260) in Italia mancherebbe il tipo di questa spec. e si avrebbero solo la for. *montanum* e la for.:
c. apenninum Bég. (1903). — Distinto per le fg. largam. ovali in basso e quindi bruscam. acuminate, spesso pubescenti come tutta la pianta, a denti ottusi e mucronulati, e per i fi. più grandi. — *Appenn. centr. a M. Fortino ed Umito e mer. a Giffoni e M. Cataratte presso Castrovillari* (*ex Bég.*).
3136 (8) *L. album* **b. obtusifolium Bolzon** (1905). — Fg. non o brevem. acuminate, con denti a lati fortem. convessi e quindi ottusi, non od appena mucronulati. — *Polesine a Bagnolo di Po* (*De Bonis*).
c. acutifolium Bolzon (1905). — Fg. bruscam. e lungam. acuminate, con denti a lato

Digitized by Google

esterno convesso e l'interno diritto o quasi, con breve mucrone per lo più rivolto all'innanzi. — *Presso Castelfranco veneto* (*Bolzon*).

3137 (9) *L. maculatum* **for. roseum Goir.** (1904). — Corolla roseo-pallida. — *Veron.* (*Goir.*).

3142 (2) *Ballota nigra* α *typ.* **c. alba** (L.) = var. β Pollini = for. b. Goir. — Corolla bianca. — *Veron. presso Avesa* (*Goir.*).

3146 (2) *Stachys officinalis* α *typ.* **e. latifolia Koch,** *sub Beton.* = B. incana Rchb. — Pianta più robusta, a fg. più larghe e spiga densa. — *C. Ticino ecc.*

γ *serotina.* — *C. Ticino a Reazzino e sotto Mergoscia* (*Chenev.*), *Veron.* (*Goir.*).

3147 *S. Alopecurus* β *Jacquinii.* — *Veronese* (*cfr. Goir.*).

3149 (5) *S. italica.* — *C. Ticino sulle rive del lago di Muralto* (*Chenev.*).

3156 (12) *S. arvensis.* — *In Cal. anche a Gioja Tauro* (*Adr. Fiori*).

3159 (15) *S. hirta.* — *Cors. in Val di Fango* (*E. Petit*).

3161 (17) *S. recta* δ *subcrenata.* — *Dune del Polesine* (*Bolzon*).

3163 (19) *S. pubescens.* — *Salernit. a Cava dei Tirreni alla Pietra Santa* (*L. Marcello*).

3165 (1) *Salvia officinalis b. confusa* (*Benth.*) = S. offic. b. auriculata Bég. in Fl. An. III, p. 48. — Il Béguinot (l. c.) fa la *S. auriculata Mill.* uguale a *S. confusa Benth.* ed anche a *S. triloba L. f.* Il Bentham (in DC. Prodr. XII, p. 265) è incerto infatti se riferire detta spec. del Miller all'una od all'altra delle spec. nominate; ma gli Autori posteriori (Boissier, Jackson in Index Kewensis) la mettono come sinonimo di *S. triloba.*

3168 (4) *S. Horminum* β *viridis* **b. longiflora N. Terr.** (1889). — Brattee più brevi dei fi. Corolla lunga il doppio del calice. — *Cal. alle falde del M. Pollino ed alla Dirupata di Morano* (*N. Terr.*).

c. pumila N. Terr. (1889). — Fusti semplici, alti 2-3 cm. Fg. piccole. — *Colla for. longiflora.*

3171 (7) *S. argentea* β *Gussonei.* — *Abr. al Piano di 5 miglia* (*Ten.*), *presso Colle Armeno* (*Guss.*) *e nel territ. di Collelongo in località Tristeri e Villavallelonga a Parata a 927 m.* (*Grande in litt.*), *Basil.* (*ex Ten.*).

3175 (11) *S. pratensis* α *typ.* **for. grandiflora Goir.** (1904). — Fi. grandi, a corolla 2-3 volte più lunga del calice, ermafroditi. — *È la for. normale.*

for. micrantha Goir. (1904). — Fi. del doppio più piccoli, ginodioici. — *Nell'area della spec.*

for. verticillata Bolzon. — Fg. cauline verticillate a 4. — *Polesine* (*De Bonis ex Bolzon*).

for. xerophila Bég. (1904). — Pianta ridotta (3-4 dm.), a fusti robusti, pubescenti o villosi (mai glandulosi). Fg. radicali piccole (4-6 per 3-4 cm.), appressate al terreno, ovali od ovali-oblunghe, a seno basale per lo più chiuso, a picciuolo mollem. villoso, glabre e fortem. rugose di sopra, pubescenti di sotto, crenate o lobulate. Spicastro breve, mai ramoso. Calice vischioso-glanduloso, lungo 8-10 mm. Portam. della var. *Bertolonii*, ma corolla più grande, come nel tipo. — *Colli Euganei in stazioni aride tanto calcaree che silicee* (*Bég.*).

β¹ **Saccardiana Pamp.** (1904) = S. viscosa Rchb., Caruel (non Jacq., nec Allior.) (cfr. R. Pampanini in N. Giorn. bot. it. 1904, p. 153). — Distinguesi dalla *f. vulgaris* pel portamento robusto (4-11 dm.), per la pubescenza lanosa brunastra della base del fusto e picciuoli, per essere abbondantem. glanduloso-vischiosa in alto ed emanante un profumo penetrante, per le fg. grandi (10-13 per 5-9 $^1/_2$ cm.), non o debolm. rugose e crenate o bicrenate, infine pei fi. grandi (lunghi $2^1/_2$-$3^1/_2$ cm.), a corolla superante la fauce del calice sino di 28 mm. Avvicinasi maggiorm. alla *f. nicaeensis* dalla quale distinguesi per le fg. più larghe, non rugose, più debolm. e regolarm. crenate e soprattuto per l'infiorescenza glanduloso-viscosa e per la frequenza delle glandule sulle foglie. Dalla v. *haematodes* alla quale pure avvicinasi, differisce per le fg. piane, debolm. pubescenti, cordato-ovate od oblunghe e mai slargate alla base nè quasi triangolari

Digitized by Google

come in quella, per il tomento meno abbondante e meno rigido e per il portamento più slanciato. — Varia per la corolla violacea o raram. rosea (*b. rosea Pamp.*) o bianca (*c. albiflora Pam.*) ovvero azzurro-violacea col lobo mediano del labbro infer. bianco (*d. variegata Pamp.*). — *Praterie e radure dei boschi fra i 400 ed i 1200 m. nelle Prealpi bellunesi e vicentine* (*probalm. in tutte le Prealpi venete*) *e nei Colli Euganei.*

3177 (13) *S. verticillata* **b. grandifolia Bolzon** (1905). — Fg. cauline (comprese le super.) a lembo misurante 10-16 per 9-11 cm., profondam. e spesso doppiam. crenato. — *Friuli in Val del Natisone presso Stupizza* (*Minio*).

3192 (14) *Satureja Calamintha* α *typ.* **for. Moschatella Nob.** = Thymus Pollini = Cal. officin. β Moscatella Goir. — Pianta più piccola, ad odore più soave. Fg. cordate, bollose, leggerm. dentate, più verdi. Peduncoli a 3 fi., i laterali subsessili (Poll.). — *Colt. negli orti a Verona* (*Poll., Goir.*).

3193 (15) *S. Nepeta* γ *nepetoides* **c. albiflora Evers,** sub Calam. nepetoid. (1896) (sine descriptio). — *Trent. a Magré presso Salorno* (*Evers*).

3202 (3) *Thymus vulgaris.* — *Rimini* (*Matteini ex Del Testa*) (?).

3203 (4) *Th. Serpyllum.* — Vedi, intorno alle forme che si trovano nel Veneto, Béguinot in « Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 86 ».

α *communis* **for. euganeus Bég.** (Bég.) = Th. Trachselianus Auct. al. (non Opiz). — Differisce dalla *for. Trachselianus* per le fg. più sottili e mai marginate e per le nervature meno evidenti. — *Colli Euganii sulle colline calcaree delle Frassenelle* (*Bég.*).

η *lanuginosus* **for. Montinii Bég.** (Bég.) l. c. p. 93. — Differisce dalla *for. pannonicus* per l'infiorescenza a capolino e per il calice più grande (lungo 5 mm.). — *Vicent. a Romano nel m. Costalunga* (*Montini ex Bég.*).

ζ *polytrichus b. carniolicus.* — *C. Ticino in Val Pontirone* (*R. Keller*).

for. venetus Bég. (Bég.) l. c. p. 94. — Differisce dalla *for. genuina* per le fg. meno spesse, più piccole, ovali-lanceolate, pelose soltanto di sopra od anche glabre, soltanto cigliate nella metà infer. e per essere in genere pianta meno pelosa e più piccola. — *Prealpi vicent. e trevig.* (*ex Bég.*).

Sono ancora citate le seg. forme:

for. benacensis (Braun). — *Trent. a Riva* (*Braun*).

for. bracteosus (Vis.). — *Istria ad Albona* (*Pospichal*).

for. collinus (M. B.). — *Trent. e Tir. mer.* (*Braun*).

for. concolor (Opiz). — *Trento, Rovereto e Merano in Tir.* (*Braun*).

for. Danaënii Briq. — *C. Ticino a Frasco ed Arcegno* (*Chenev.*).

for. Froehlichianus (Opiz). — *Tir. mer.* (*Braun*).

for. Hausmannii (Braun). — *Trent. a Riva* (*Braun*).

for. Marschallianus (W.) — *Tir. mer. a Bolzano* (*Sauter*).

for. oenipontanus (Braun). — *Trent. a Riva ed Ala e Tir. a Bolzano* (*Braun*).

for. reptabundus Briq. in Chenev. (Bull. hb. Boiss. 1904, p. 793). — Affine alle for. *ligusticus* ed *alpestris.* — *C. Ticino in più luoghi* (*Chenev.*).

for. ticinensis Briq. ex Chenev. (Bull. herb. Boiss. 1902, p. 777). — *C. Ticino* (*Chenev.*).

3207 (1) *Lycopus europaeus* **for. giganteus Evers** (1896). — Alto più di un uomo. Fg. infer. lunghe sino a 14 cm. e larghe 6, le infime pennatifide, le seguenti pennatifide alla base, le medie dentato-lobate alla base, le super. grossam. dentate. — *Trento* (*Evers*).

3210 (2) *Mentha longifolia.* — *Is. del Giglio* (*Doria ex Somm.*).

var. leptostachya Sacc. (1864) (sub M. silvestr.). — Spighe più gracili. Fg. più piccole, con pochi e profondi denti. — *Trevigiano in luoghi aridissimi* (*Sacc.*).

3211 * *M. suavis.* — *Cors. a Serraggio e Brando* (*E. Petit*).

3213 (5) *M. arvensis* **for. fontana (Weihe).** — *Tir. mer. a Bolzano* (*Sauter*).

Digitized by Google

LENTIBULARIACEAE.

3226 (1) *Utricularia minor.* — *Istria al lago d'Albona* (*Posp.*) *e Valle infer. del Quieto* (*Calegari*).

PLANTAGINACEAE.

3234 (1) *Plantago major* α *typ.* **g. vivipara Sacc.** (1864). — Forma teratologica a spiga vivipara, virescente (ex Sacc. in litt.). — *Trevigiano* (*Sacc.*), *Veron.* (*Goir*), *Polesine* (*De Bonis ex Bolz.*).

3236 (3) *P. media* α *typ.* **c. pallidiflora Ugolini** (1904). — Stami a filamenti lilacino-chiari o bianchi, antere bianche. — *Nell'area della spec.*

for. sublanceolata Murr. — *Verona in Borgo Trento* (*Murr. ex Goir.*).

3238 (5) *P. montana.* — *M. Serino in Basil. e M. Pollino in Cal.* (*Adr. Fiori*).

3241 (8) *P. argentea.* — *Cal. citer. al M. Cozzo del Pellegrino in territ. di S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

3242 (9) *P. lanceolata* α *typ.* **for. alpestris Goir.** (1904). — Pianta piccola, a scapo peloso e fg. quasi glabre, spesso radam. cigliate. Spiga quasi sferica, nerastra. — *Veron.* (*Goir.*).

for. angustifolia Goir. (1904). — Fg. lineari-lanceolate, larghe 1-2 $^1/_2$ mm., irsute. Spiga ovale. — *Veron. sui Lessini* (*Goir.*).

γ *lanuginosa* **for. gossypina Clementi.** — *Veron.* (*Goir.*).

for. hungarica (W. et K.). — *Veron.* (*Goir.*).

3244 (11) *P. albicans.* — *Isole Maltesi* (*Duthie*).

RUBIACEAE.

3259 (2) *Galium vernum* **d. turficolum R. Maire in Rouy** (1904). — Pianta piccola, gracile e lassa, a fg. molli ed infiorescenza lassa. — *Cors. sul fondo disseccato del lago del Coscione* (*Maire*).

3260 (3) *G. pedemontanum* γ *retrorsum* (*DC.*) = G. pedem. v. pseudoretrorsum Nic. = G. reflexum v. glabrescens Bég. (Fl. An. III, p. 105) = G. pedem. α aspericaule Rouy. — È la forma a fusti con aculei riflessi e frutto glabro o glabrescente.

3263 (6) *G. ellipticum* **b. glabellum Lojac.**, Fl. Sic. — *Sic. alle Madonie* (*Ross. ex Lojac.*).

NB. – Probabilm. sarà questo il *G. rotundifolium* indicato da alcuni Autori di Sic., ma non menzionato dal Lojacono.

3265 (8) *G. verum* α *typ.* **for. muscoides Goir.** (1904). — Forma ridotta, alta 5-10 cm., a fusto per lo più semplice. — *Nei luoghi secchi.*

3265* G. Mollugo × verum. — *C. Ticino a Vogorno* (*Chenev.*) *ed in Val Blenio a Buzza di Biasca* (*R. Keller*).

3266 (9) *G. purpureum* **b. flaviflorum Goir.** (1904). Corolla giallastra. — **c. longifolium Goir.** (1904). Fg. lunghe 15-20 mm. — **d. brevifollum Goir.** (1904). Fg. esilissime, lunghe 1-6 mm. — **e. tricophyllum Goir.** (1904). Fg. brevi, setacee, densissime, in pianta umile, cespugliosa. — *Tutte nel Veron.* (*Goir.*).

3268 (11) *G. aristatum* α *typ.* **b. linifolium (Lam.)** = var. levigatum Koch. — Fg. glabre o quasi al margine. — *Veron.* (*Goir.*).

3270 (13) *G. lucidum* δ *venustum.* — *Sic. sulle Nebrodi* (*Lojac.*).

ε *Bernardi* **b. roseolum (Mab.)** (Fl. An. III, p. 109, nota). — Sec. Briquet (Ann. du Conserv. et Jard. de Genève 1901, p. 103) è una for. più evoluta, a fi. roseo-pallidi, ricordante il *G. cinereum All.*

3270* G. Terraccianoi Lojac., Fl. Sic. — Pare sia una var. a fi. rosei di *G. lucidum.* — *Presso Messina* (*Citarda ex Lojac.*).

Digitized by Google

3272 (15) *G. rubrum* α *typ. c. Leyboldii* **subfor. purpureum Evers** (1896). — Corolla rosso-scura, a lacinie obtuse. — *M. Baldo a S. Giacomo* (*Evers*).

3273 (16) *G. pyrenaicum.* — *Cal. citer. al M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea* (*B. Longo*).

3274 (17) *G. pusillum.* — *La pianta di Cors. a Calvi* (*Fouc. et Sim.*) *va riferita a G. rubrum* α (*cfr. Rouy Fl. de France VIII, p. 385*).

3275 (18) *G. silvestre* α *asperum* **fòr. rhodanthum Briq. in Chenev.** (1902). — Portam. della var. δ *argenteum b. tenue*, ma corolla biancastra di sotto e roseo viva di sopra, a lacinie ottuse o debolm. apicolate all' apice. — *C. Ticino al Camoghè* (*Chenev.*).

δ *argenteum b. tenue.* — *C. Ticino al M. Generoso* (*Chenev.*).

3276 * **G. Villarsii Req. in Guer.** = G. megalospermum Vill., non All. — *Alpi mar. presso la frontiera francese* (*ex Rouy Fl. de France VIII, p. 39*).

3277 * (20 *bis*) **G. cometorhizon Lap.** = G. megalospermum Lap., non All. = G. suaveolens Lap., non Whlnb. — *Cors. al M. Cinto verso 2500 m.* (*Soulié ex Coste, Rouy Fl. de France IX, p. 465*); *noto finora solo dei Pirenei.*

3280 (23) *G. uliginosum.* — *Verona* (*Goir.*), *ai confini del Veron. col Mantov. e col Polesine* (*Masè*).

3281-82 (24 e 25) *G. palustre.* — A questa spec., secondo lo stesso Béguinot che le aveva prima ritenute specificam. distinte, deve essere riunito anche il *G. constrictum* (cfr. Béguinot in Bull. soc. bot. it. 1903, p. 220). Di conseguenza avremo:

γ *constrictum* (*Chaub.*) **for. roseum Lojac.** Fl. sic. (sub G. debile). — *Sic. a Montaspro* (*Lojac.*).

δ *congestum* (*Jord.*) (Fl. An. III, p. 114).

3284 (27) *G. parisiense* β *divaricatum* **c. minutum Lojac.**, Fl. sic. — *Sic. nei M. di Palermo* (*Tod. ex Lojac.*).

γ **decipiens (Jord.)** (*non Ehrh.*). — *Sic. a Polizzi* (*Strobl*), *Ustica e Lipari* (*hb. Tod. ex Lojac. Fl. sic.*).

3285 (28) *G. Aparine* δ *Vaillantii.* — *C. Ticino a Mendrisio* (*Chenev.*), *Veron.* (*Goir.*).

3288 (31) *G. verticillatum.* — *Abr. a Villavallelonga alla Grotta* (*Grande!*).

3289 ** **G. recurvum Req. in DC.** β **pauciflorum** (**Kotsch.**) = G. micranthum D' Urv. — *Sic. nei M. della Piana alla Pizzuta* (*Tin. ex Lojac. Fl. Sic.*).

3289 * **G. messanense Tin. in Lojac.** Fl. Sic. — Pare una var. di *G. murale.* — *Sic. a Catania* (*Guss. ex Lojac.*) *ed a Messina* (*Tin. ex Lojac.*).

3290 (1) *Vaillantia muralis* **for. intricata** (**Lojac.** Fl. sic.). — *Isola di Linosa.*

3292 *Sherardia arvensis* α *typ.* **e. imbricata Goir.** (1904). — Pianta ridotta, irsutissima, alta 5-20 mm., coi verticilli delle fg. avvicinati, quasi ricoprentisi a vicenda. — *Presso Verona* (*Goir.*).

3304 (12) *Asperula cynanchica* ε *neglecta.* — *Cal. citer. sul M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea e sul M. Montea* (*B. Longo*).

3305 (1) *Crucianella latifolia.* — *Nel Lojacono* (*Fl. sic.*) *questa spec. non figura di Sicilia.*

3206 (2) *C. angustifolia.* – *Istria al Cul di Leme* (*Marchesetti ex Calegari in litt.*) *e presso Docastelli* (*Calegari*), *Sic. tra Isnello e Pizzo di Pilo* (*Tin. ex Lojac.*), *Madonie e Canalicchio* (*Ross*).

CAPRIFOLIACEAE.

3314 (2) *Viburnum Lantana* **b. mespilifolia Murr.** (Deut. Bot. Monatsschrift, 1898). — *Veron.* (*Goir.*).

3318 (3) *Lonicera etrusca.* — *Colli del Cesenate* (*Del Testa*).

3319 * **L. japonica Thunb.** — *Origin. dell' Himal., Cina e Giapp., è frequentem. colt. nei giardini pei suoi fi. odorosi ed è quasi inselvat. nelle siepi di alcune ville presso Torino* (*A. Tonelli!*) *e nei colli sotto Fiesole a Firenze* (*Fiori*).

Digitized by Google

VALERIANACEAE.

3326 (1) *Valeriana officinalis.* — *Sec. Lojac.* (*Fl. sic.*) *non sarebbe più stata raccolta in Sic. dopo Gussone.*

3330 (5) *V. tripteris* α *typ.* **b. minor Goir.** (1904). — Pianta ridotta in ogni parte. — *Veron. a Giazza* (*Goir.*).

3347 (7) *Valerianella dentata.* — *Cal. occ. nel territ. di Mormanno e S. Agata d'Esaro* (*B. Longo*).

3349 (9) *V. microcarpa* **a. lejocarpa Lojac.**, Fl. sic. = V. mixta b. lejocarpa Guss.

3350 (10) *V. truncata* **for. muricata** (Stev.). — *Sic.* (*Tod. ex Lojac.*).

3351 (11) *V. eriocarpa* **for. scorpioidea Lojac.**, Fl. sic. — *Sic. a Catalfano* (*Riccobono ex Lojac.*).

DIPSACEAE

3363 (2) *Cephalaria syriaca.* — *Sic. a Palagonia* (*Lojac.*).

3364 (3) *C. transylvanica* **c. albiflora Goir.** (1904). — Corolla bianco-lattea. — *Veron.* (*Goir.*).

3367 (1) *Succisa pratensis* **e. flore-albo Goir.** (1904) = Scab. Succisa δ flore-albo Pollini. — Corolla bianca. — *Nell'area della spec. qua e là.*

Gen. Knautia. — Vedi: Borbás, Revisio Knautiarum, in « Delectus seminum Hort. bot. Univ. Francisco-Josephinae, 1904, p. 5-94 ». — Briquet, Les Knautia du sud-ovest de la Suisse, du Jura et de la Savoie. Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève 1902, p. 60.

3369 (1) *K. integrifolia* β *amplexicaulis* (*Borb.* l. c., p. 84) = Scabiosa L. (1771) = Sc. hybrida All. (1789) = Sc. lyrata Lam. (non Forsk.) = K. hybrida α lyrata Koch = K. hybrida Coult. (Cfr. Fl. An. III, p. 146).

b. bidens (Boiss.) = Scabiosa S. et S. = Trichera diodon Presl. — Involucretto (calice esterno) con due soli denti bene sviluppati, gli altri abortiti.

3370 (2) *K. arvensis* α *typ. b. persicina.* — *Veron. nel M. Pastello a Campegno* (*Rigo ex Borb.*) *ed in parecchi altri luoghi* (*Goir.*), *Comasco a Campione verso Bellagio* (*Degen ex Borb.*) — Affine a questa forma che (sec. Borbàs) non ha una posizione ben definita, è la:

for. rimosa (Borb., l. c. p. 65). — *Comasco alla Grigna sopra Mandello* (*Degen ex Borb.*).

e. carpathica. — *La località di Lugano non è riportata dal Borbás il quale limita l'area di questa for. alla Pen. Balcanica.*

for. decipiens Kras. — *Friuli nei monti di Gemona* (*Tommasini ex Borb.*).

for. glandulosa Froel (1801) = Succisa diversifolia Spr. (1820). — *Tir. mer. a Merano e Bolzano* (*ex Borb.*).

for. Heuffelii Borb., l. c., p. 69. — *Tir. mer. a Bolzano* (*Hausm. ex Borb.*).

γ *rigidiuscula c. Fleischmanni Borb.* (*Borb.*) = Scabiosa Hladn. et Rchb. in Rchb. = for. c. indivisa Bég. in Fl. An. III, p. 147, excl. syn. Vis. — Fg. tutte indivise. — *Friuli nei monti di Gemona* (*Tommasini ex Borb.*) *e Reg. Illirica sul M. Nanos* (*Borb.*).

δ *purpurea* (*Borb.*) = Scabiosa Vill. (1787) = Sc. collina Req. in Guér. (1813), non Schm. (1794) = K. arv. δ collina Duby, Wohlf. (cfr. Fl. An. III, p. 147 [var. δ]).

b. foliosa Borb., l. c., p. 53 = Trichera collina v. foliosa Freyn = K. arv. δ collina b. foliosa Bég. in Fl. An. III, p. 147. — *Istria e Friuli presso Cimolais* (*Huter exs. sub Kn. rigidiusc.*).

for. dissecta Borb., l. c., p. 54. — *Reg. Illirica sul M. Nanos* (*ex Borb.*) *ed Abr. sul M. Morrone* (*Huter P. et R. exsicc. 529, ex Borb.*)

for. hirsuta Borb. = Scabiosa hirs. Lap. — *Sic. alle Madonie* (*Todaro ex Borb.*).

Digitized by Google

for. meridionalis Borb. = K. collina α mer. Briq. — *Istria e Triest. in più luoghi, C. Ticino a Lugano* (*Degen*), *Nizz. a Drap* (*Barla*), *Sic. alle Madonie* (*Todaro*). (Cfr. Borb. l. c. p. 53).

for. odontophylla Borb., l. c., p. 54. — *Presso Lugano a M. Bré* (*Degen ex Borb.*).

ε *mollis*. — *Alpi Mar. ital.* (*ex Briq.*).

ζ **transalpina (Briq.)** = K. silvatica v. transalp. Christ in Gremli (1882) = K. Fleischmanni et K. Fleischeri Reut. hb. ex Briq. — *Comasco alla Grigna* (*Reuter*, *Luret ecc.*), *C. Ticino a Gandria* (*Ducommun ex Briq.*).

for. nudiuscula Briq. (Briq. exs.). — *Col tipo nel Comasco alla Grigna* (*Ducommun ex Briq.*).

var. pseudo-collina Briq., l. c., p. 80 = Scab. arv. β collina Gaud., non Dub. = Sc. collina Heg., non Req. — *C. Ticino* (*Schleich. ex Briq.*).

3371 (3) *K. longifolia α typ. b. feminascens Borb., l. c.* = K. longif. b. eradiata Wolff. (cfr. Fl. An. III, p. 147 [for. α b]). — *Tir. mer.*

for. stenolepis Borb., l. c., p. 40. — *Tir. mer. presso Schluderbach alla Forcella alta a 1850 m.* (*Freyn ex Borb.*).

for. nudicaulis Borb., l. c. — *Tir. mer. nelle Alpi di Bolzano* (*Hausm. ex Borb.*).

β *magnifica* = K. baldensis. — *M. Baldo in val Fredda* (*G. Rigo ex Borb.*) *ed altrove* (*Goir.*) *e sui Lessini* (*Goir.*).

for. indivisa Borb. (Borb.) = Scab. arven. v. indiv. Vis. — *Presso Trieste al Boschetto e nei monti di Gemona* (*Tommasini ex Borb.*).

for. transalpina (*Briq.*) *Borb.*, l. c. = K. silvat. v. transalp. Christ in Gremli. — *Comasco al M. Grigna sopra Mandello a 1880 m.* (*Degen ex Borb.*) *ed ai Corni di Canzo* (*Rainer ex Borb.*).

var. brachytricha (Briq., l. c., p. 125). — *Alpi bellun. a S. Vito del Cadore* (*Pampanini ex Briq.*).

var. decalvata (*Borb.*, l. c., p. 42) = K. baldensis × longifolia Borb., l. c. — *M. Baldo in Val Fredda* (*G. Rigo ex Borb.*).

3371 * K. Breindlii G. Beck (1894) = K. pratorum v. decipiens Kras.? — *Presso Peschiera nel Veron.* (*Breindl*), *Trent. in Val di Ledro a 1800-2300 m.* (*Porta*) *e M. Brè presso Lugano* (*Degen*). (Cfr. *Borb.* l. c. p. 45-46).

3372 (4) *K. silvatica α typ. c. mollis Hausm.* — Sec. Borb. (l. c., p. 43) sarebbe un sinonimo di *K. magnifica a. baldensis*.

for. Sendtneri (Bruegg.). — *Tir. mer. a Bolzano* (*Hausm. ex Borb.*).

β *drymeia* (*Heuff.*) = Scabiosa pannonica Scop. = K. silv. β pann. Bég. in Fl. An. III, p. 148 = K. pann. Borb. l. c. (non Heuff., quae, sec. Borb. l. c. p. 70 = K. arvens. for. tomentosa Wimm. et Grab.). — *C. Ticino in più luoghi* (*ex Briq.*).

b. tergestina Nob. = K. silv. β pann. b. terg. Bég. in Fl. An. III, p. 148 = K. pann. var. terg. Borb., l. c. — *M. S. Primo sopra Bellagio* (*Degen ex Borb.*), *M. Pastello nel Veron.* (*Bracht ex Borb.*).

γ *dipsaciformis Borb.*, l. c., p. 26 (Borb., l. c., p. 27) = K. dipsacifolia Heuff., non Schott. (ex Borb.).

var. Brandzai (Porcius) = K. dipsacifolia v. praesignis et v. glandulifera G. Beck. — *C. Ticino presso Fusio* (*Chenev. ex Briq.*).

3372 * K. centrifrons Borb., l. c., p. 18 = K. drymeia Briq. p. p. — *Comasco al M. Resegone sopra Lecco a 1500 m. e C. Ticino al M. Generoso sopra Capolago a 1800 m.* (*Degen. ex Borb.*).

3372 ** K. subcanescens Jord. var. delphinensis Briq. — *Svizz. italiana* (*Scheicber ex Borb.*).

3375 (3) *Scabiosa canescens*. — *M. Baldo a Pravazar* (*Goir.*).

3375 * S. affinis Gr. et Godr. — *M. Baldo all' Altissimo di Nago* (*Goir.*).

3377 (5) *S. gramuntia*. — Il carattere della lunghezza delle setole del calice che dovrebbe servire a distinguere questa spec. dalla *Sc. Columbaria*, perde all' atto pratico del suo

Digitized by Google

valore, essendo la lunghezza di tali setole variabilissima negli individui della stessa forma. Riteniamo perciò che *Sc. gramuntia* e *Sc. Columbaria* colle loro numerose var. costituiscano una sola specie.

δ *pyrenaica b. magellensis* (*Parl.* in hb. flor.!, ex Arc. comp. Ed. I, 1882, Tanf. in Parl. VII, 1887). — A questa forma deve riferirsi la *Sc. Portae Kern.* in Huter P. et R. exs., 1875. Le fg. cauline non sono tutte semplici o solo le ultime un po' pennatifide, com'è detto nel testo, ma più spesso lirate, cioè con lobo terminale grandissimo e laciniette laterali assai piccole, che però in alcuni individui diventano grandi quasi quanto il lobo terminale. L'indumento in questa forma è meno denso e meno sericeo-argentino che nella *pyrenaica typica* ed il portam. di tutta la pianta ricorda assai la *Sc. Columbaria.*

3378 (6) *S. Columbaria c. pachyphylla Gaud.* = Sc. patens Jord. — Fg. più finam. divise. Capolini più piccoli, sopra peduncoli più allungati e più divaricati. Reste del calice brunastre (non nerastre come nel tipo), un po' più brevi. — *C. Ticino a Frasco, Val d'Efra, Cima di Cagnone ed alpe di Redorta* (*Chenev.*), *Veron.* (*Goir.*).

δ *ochroleuca.* — *Veron. al M. Zovo sopra Grezzana, una sola volta* (*Goir.*).

3379 (7) *S. atropurpurea* β *maritima* **for. subglabra, humilis, elata et prolifera Lojac.**, Fl. sic. — *Tutte in Sic.* (*Lojac.*).

3382 (10) *S. graminifolia* **e. intermedia Ugolini** (1904). — Intermedia per la pelosità e colore tra la *for. genuina* e la *for. glabra.* — *Bresciano* (*Ugol.*).

d. chlorophylla Sauter (1899). — Fg. verdi (non glauche). — *Tir. mer. a Bolzano tra Magrè e Fennberg* (*Sauter*).

e. rosiflora Evers, sub Succisa gram. (1896) (sine descript.). — *Trento a m. Colisio* (*Evers.*).

f. elatior Goir. (1904). Fusti alti 40 cm. e più. — **g. humilior Goir.** (1904). Fusti alti 10-20 cm., spesso densam. cespugliosi. — **h. latifolia Goir.** (1904). Fg. piane, larghe 3-5 mm. — **i. angustifolia Goir.** Fg. piane o convolte, larghe 1-2 mm. — *Tutte nel Veron.* (*Goir.*).

3385 (13) *S. crenata* α *typ.* **c. nana** (**L. Marcello**, 1903) = S. crenata var. C Ten. — Pianta nana, sdraiata. — *Nap., Capri, Salernit. e Gargano* (*Ten., L. Marcello*).

3386 * **S. cephalarioides Lojac.**, Fl. sic. = Sc. angulata Raf.? — *Sic. a Carini, Monte Lungo* (*Riccobono ex Lojac.*).

CUCURBITACEAE

3399 (2) *Cucurbita maxima a. neapolitana Tod.* (*1857*), *Bég.* (*1903*).

b. Ohiensis Bég. = C. Farinae v. macrocarpa Tod. (1858) p. p.

d. messanensis Tod. (1858), *Bég.* (1903).

3400 (3) *C. Pepo c. cucurbitella Bég.* in Fl. An. III, p. 163 (1903), si sostituisca col nome anteriore di *C. Pepo c. italica Tod.* (*1857*).

CAMPANULACEAE

3402 (1) *Jasione montana* **for. gracilis Wk. et Lge.** — Pianta gracile, glabra, verde, a fg. intere, lungam. cigliate. Peduncoli allungati, filiformi; capolini del diam. di 8-10 mm. — *Sic. a Messina, Nicolosi, Sciare e Lipari* (*ex Lojac.*).

for. aetnensis Lojac., Fl. sic. = J. montana var. sicula Tod. exs. — *Sic. sull'Etna e Val Demone* (*ex Lojac.*).

3404 (1) *Phyteuma pauciflorum* α *typ.* — *C. Ticino in più luoghi* (*ex Chenev.*).

3406 (3) *Ph. humile.* — *C. Ticino in più luoghi* (*ex Chenev.*).

3412 (9) *Ph. Michelii c. betonicaefolium* **subfor. sessilifolium DC.** — *C. Ticino.*

3419 (1) *Campanula Erinus.* — *Riviera del lago di Garda a Renzano e Fasano* (*Ugolini*) *e sulla Riviera veron.* (*Goir., Rigo*) *e colli di Bassano* (*ex Bert.*).

Digitized by Google

3422 *C. alpina.* — *Sul M. Baldo non si è più potuta rintracciare* (*Goir.*).

3423 (5) *C. barbata* **d. albiflora Goir.** (1904). — Fi. bianchi. — *Nell'area della spec.*

3427 (9) *C. petraea* β **albicans (Harms.)** = Tracheliopsis Buser (1904) = C. petraea Auct. gall. — *Indicata del Nizz. a Faliconet* (*Risso ex Ard.*), *ma non più ritrovata; è propria della Provenza.*

3429 (11) *C. glomerata c. elliptica, f. aggregata, g. farinosa, h. cervicarioides.* — *Tutte nel Veron.* (*Goir.*).

for. uniflora Goir. (1904). — Fi. unico all'apice del fusto. — *Veron.* (*Goir.*).

3432 (14) *C. spicata.* — *Colli Euganei sui M. Rusta e Cinto a circa 100 m.* (*Bég.*) *e M. Calaone* (*Bizz. ex Bég.*).

d. pseudo-thyrsoides Goir. (1904). — Spiga densa, abbreviata. — *M. Baldo nella Valfredda* (*Goir.*).

e. flore-albo Pollini. — Corolla bianca. — *Nell'area della spec.*

3433 * **C. primulaefolia Brot.** = C. peregrina Hoffm. et Lk. (non L.). — *Sic.* (*hb. Tod. ex Lojac.*); *propria del Portogallo.*

3436 (18) *C. persicaefolia* **i. albiflora Goir.** (1904). — Corolla bianca. — *Nell'area della specie.*

3451 (33) *C. rotundifolia* α *typ.* **for. latifolia Ugolini?** — Fg. come nella *var. lancifolia*, ma pianta glabra. — *Bresc. nel territorio dolomitico della Croce di Vallio* (*Ugol.*).

× *stenocodon.* — *M. Baldo?* (*Goir.*).

3453 (35) *C. bononiensis* α *typ.* **d. parviflora Goir.** (1904). — Pannocchia a molti fi. avvicinati, con corolla 2-3 volte più piccola del normale. — *Veron.* (*Goir.*).

3455 (37) *C. Trachelium* **for. racemosa Zersi.** — Fg. fiorali piccole, bratteiformi e quindi fi. racemosi. — *Bresciano* (*Zersi*), *Veron.* (*Goir.*).

for. denticulata Zersi. — Fg. col margine ineguale, appena denticolato. — *Come la prec.*

Gen. Adenophora. — Vedi: Borbás, Recensio Adenophorarum (Magyar Bot. Lapok 1904, p. 189).

3457 *Adenophora liliifolia* α *typ.* **c. angustifolia Pampanini.** — Fg. strettam. lanceolate, larghe 6-12 mm. — *Presso Vittorio al Passo di S. Uboldo nelle Prealpi Bellunesi* (*Pampan.*).

β **Alpini (Borb.,** *l. c.*) = Campanula L. — Sec. Borbás (l. c., p. 194) si distingue dalla *A. liliifolia* per le fg. infer. ovate od ovato-lanceolate, le altre bruscam. decrescenti nella parte super. del fusto, tutte un po' grasse e più brevem. picciolate. — *Veron. sul M. Summano* (*Porta ex Borb.*).

3459 (2) *Specularia hybrida* **var. calycina Lojac.**, Fl. sic. — *Sic. a Licata.*

3460 (3) *Sp. falcata* **var. casteliana (Lge.)** = Sp. falcata β hirta Tin. ex Guss., Syn. add., p. 795. — *Sic. a Russomanno* (*Tin. ex Guss.*) (*cfr. Lojac. Fl. Sic.*).

3462 (2) *Hedraeanthus graminifolius* α *typ.* — *Sic. a Busambra ed alle Madonie* (*ex Lojac. Fl. sic.*).

d. albiflorus N. Terr., 1878 (sub Campanula). — Fi. più piccoli, bianchi; stigma bilobo. — *Camp. sul M. Mutria* (*N. Terr.*).

β *siculus.* — *Cal. al M. Pollino al Pollinello a 2248 m.* (*N. Terr.*).

COMPOSITAE

3468 *Eupatorium cannabinum* α *typ. b. indivisum DC. p. p., Neilr.* — Fg. tutte o quasi indivise.

c. heterophyllum Goir. (1904). — Fg. super. indivise, le altre palmatopartite. — *Nell'area del tipo; Veron.* (*Goir.*).

β *syriacum b. integrifolium Nob.* = E. can. v. indivisum DC. p. p. (Fl. An. III, p. 204, for. β *b*).

Digitized by Google

3469 *Adenostyles alpina* ζ *leucophylla*. — *C. Ticino a Cima di Broglio a 2300 m.* (*Chenevard*).

3476 *Tussilago Farfara* **c. micrantha Goir.** (1904). — Capolini 2-3 volte più piccoli del normale. — *Veron.* (*Goir.*).

3478 (2) *Senecio lividus b. foeniculaceus*. — *Isole Maltesi* (*Duthie*).

3478 * S. sonchoides Lojac., Fl. sic. — Deve ritenersi come una forma lussureggiante di *S. lividus b. foeniculaceus*. — *Sic. alle macchie di Calatubo tra Balestrate e Castellamare del Golfo* (*Reina ex Lojac.*).

3478 ** S. livido-vulgaris Lojac., l. c. — *Boschi della Sic. sett. nel Valdemone* (*Citarda e Riccobono ex Lojac.*), *boschi di Castelbuono* (*Guss. sub S. vulgaris* β *radiatus, ex loco, sec. Lojac.*).

3478 * S. aegyptius L. var. discoideus Boiss.** = S. pseudo-silvaticus Lojac. in sched. — *Forse in Sic.; ma da ulteriorm. studiarsi* (*cfr. Lojac., l. c.*).

3483 (7) *S. coronopifolius* **b. minutus Lojac.**, l. c. — *Sic. nei sepolcreti della Madonna del Piano* (*Tin. ex Lojac.*).

3484 *S. leucanthemifolius* ζ *vernus* **b. chamaedrioides Lojac.**, l. c. — *Forse nella Sic. mer.* (*ex Lojac.*).

γ *incrassatus*. — *Lampedusa* (*Lojac.*).

3485 (9) *S. nebrodensis* δ *rupestris* **b. paradoxus (Hpe.)**. — Fi. del raggio mancanti. — *Veron.* (*Goir.*).

3488 (12) *S. Jacobaea* β *barbareaefolius* (*Krock.*). — Sopra questa pianta in confronto col *S. erraticus Bert.* cfr. «Scholz in Oest. Bot. Zeitschr. 1899, p. 284 e 327».

γ *aquaticus b. pratensis*. — *Colli Euganei a Montegrotto* (*Bég.*).

3490 (14) *S. Cineraria* δ *ambiguus* **b. glabratus Nob.** = Cin. ambigua v. glabrata Lojac., Fl. Sic. — Fg. e fusto più glabri. — *Sic.* (*Lojac.*).

3494 (18) *S. Doria* **b. angustifolius Pirona** (1855) (sine descript.). — *Friuli presso Virco* (*Pirona*).

3495 (19) *S. nemorensis*. — La pianta dei Colli Euganei è la var. Fuchsii (ex Bég.).

α *typ.* **f. humilis Goir.** (1904). — Pianta bassa, a corimbo di pochi capolini. — *Veron.* (*Goir.*).

β *Fuchsii* **f. valesiacus Beck ex Chenev.** (1904) (sub S. sarracenicus). — Fg. largam. ellittico-romboidali, tutte attenuato-picciolate, le infer. e medie misuranti 10 per $3^1/_2$-$4^1/_2$ cm., le super. lungam. acuminate. — *C. Ticino al piano d'Agno* (*Chenev.*).

3496 (20) *S. Doronicum* α *typ.* **a. glabrum Evers** (1896).

d. Jaeggianus Chenev. (Bull. hb. Boiss. 1904, p. 644). — Differisce dalla for. genuina per le fg. basali ovali-oblunghe (10-13 per 6 cm.), meno consistenti, debolm. ragnatelose sulla lamina, lanose nel picciuolo largam. alato. Fusto di 30 cm., ramoso-corimboso, un po' fioccoso all'apice. — *C. Ticino in Val Vigornesso all'Alpe Barone* (*Jaeggli*).

e. rotundifolius (Lap.). – Differisce dal prec. (sec. Chenev., l. c.) pel fusto semplice e per la glabrezza. — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Keller*).

γ *tomentosus*. — *C. Ticino all'Alpe Cagnone* (*Chenev.*).

3499 (23) *S. campester*. — Da quanto può arguirsi dalla descrizione, sembrerebbe che il *S. magellensis Ten.* (Ind. Sem. Hort. Neap. 1857 e 1859; Ann. Sc. Nat. Ser. IV, vol. XII, p. 78 [1859]) fosse una forma ridotta, monocefala e discoidea di questa spec.; esso è indicato «*dei pascoli montani dell'Abruzzo*».

3499 * S. ficoides (L.) Sch. Bip. = Cacalia L. = Kleinia Haw. = Kl. Mandraliscae Tin. — Pare che fosse un tempo inselvatichito a Vulcano nelle isole Eolie, da dove il Mandralisca l'inviò a Tineo ed anche al Parlatore; il Lojacono dice di averlo visto subspont. a Lipari a Piano di Conte. Il Tineo descrisse questa pianta come spec. nuova, ma non troviamo alcuna differenza tra essa e la *Kl. ficoides*, originaria del Capo di B. Speranza. Cfr. anche Zodda in «Atti Accad. Peloritana XIX, 1904, p. 23 (estratto)».

Digitized by Google

3505 (6) *Doronicum grandiflorum* α *typ.* — *In Cors. anche al M. Renoso a 2100 m.* (*Rotgès ex Fouc.*, *Briq.*).

3508 (1) *Bellis annua.* — *Pineta di Cervia in Romagna* (*Del Testa*).

3509 (2) *B. perennis* α *typ.* **f. pusilla N. Terr.** (1878). — Pianta umile, gracile, a fg. 1-nervie, obovato-spatolate, intere. Squame invol. ottuse, nude all'apice. — *Camp. al M. Settefratti* (*N. Terr.*).

δ **margaritaefolia (Huter P. et R.,** 1879) = B. perenn. β Margarita-Sabaudiae Micheletti (1904) (cfr. Fiori in N. Giorn. bot. it. 1906, p. 331). — Pianta glabra o poco pelosa. Capolini più grandi, a squame invol. piuttosto ottuse. Fg. a forma obovato-rotonda generalm. assai manifesta, spesso almeno le primordiali più grandi ed a denti più marcati, acuti od arrotondati. — *Presso Messina sotto il forte Gonzaga* (*Michel.*) *ed altrove* (*Seguenza*, *Nicotra*), *a Novara* (*Munafò*) *ed a Taormina* (*Adr. Fiori*), *Lipari* (*Zodda*) *e Cal. presso Reggio* (*Huter Porta e Rigo*), *tra Bagnara e S. Eufemia d'Aspromonte ed a Gioia Tauro* (*Adr. Fiori*); *probabilm. sono da riferirsi qui molte località del mezzogiorno e delle isole.*

3510 (3) *B. silvestris* β *verna N. Terr.* (1896) (Fl. An. I, p. 225 [for. b.]). — I peduncoli sono brevi sul principio della fioritura, ma poi si allungano sino a raggiungere persino i 30 cm.; essi sono più robusti di quello che nel tipo (benchè anche qui si trovino talora altrettanto robusti) e maggiorm. pelosi. Le ligule sono bianche o leggerm. rosee all'esterno (nel tipo spessissimo roseo-porporine). La fioritura avviene dall'Aprile al Giugno (nel tipo incomincia nell'autunno protraendosi sino a Febbraio o Marzo o rarissimam. sino al Maggio (esemplare di Monteponi presso Iglesias [Biondi]). — *Tosc. nel Mugello a Petrognano* (*Somm.*), *Vallombrosa e Pratomagno tra 1000 e 1400 m.* (*Solla*, *Cavara*, *Fiori*), *Casentino all'Oja* (*Siemoni*), *Gargano a M. Nero* (*Martelli*), *Avellino* (*Trotter*) *e Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*).

3513 (3) *Bellium crassifolium.* — *Isola S. Pietro al Spalmadore grande* (*Martelli in hb. flor.!*).

3518 (4) *Aster salicifolius* = A. salignus W. — Il prof. Goiran ci ha comunicati parecchi esemplari di *Aster* inselvat. presso Verona: di essi uno solo raccolto dal Tognini fuori porta del Pellegrino (in una stazione ora andata distrutta, corrispondente a quella indicata dal Seguier), corrisponde a questa spec., tutti gli altri sono di *A. Novi-Belgii* tipico e della sua *for. adulterinus* (*W.*).

3520 (6) *A. Tripolium* **a. glaber Bolzon.** — Fg. e squame invol. non cigliate; si può ritenere come la for. genuina.

d. pannonicus. — *Litor. veneto* (*ex Poll. et Bég.*), *Valli di Sermide nel Mantov.* (*ex Bég.*).

3520 * A. Sorrentini Lojac., fl. Sic. = Galatella Sorrentini Tod. (1857). — Pare una var. di *A. Tripolium.* — *Sic. a Palazzo Adriano* (*Tod.*) *ed a Sutera* (*Lojac.*).

3522 (8) *A. Linosyris* α *vulgaris* **e. monocephalus Goir.** — Pianta generalm. bassa, monocefala. — *Veron.* (*Goir.*).

3523 (1) *Solidago canadensis.* — *Inselvat. nel Veron. in Campomarzio, alla Chiusa, a S. Vito del Mantico e sul Pastello presso M. a Cavalo* (*Goir.*).

3525 (3) *S. Virga-aurea* δ *minuta.* — *C. Ticino.*

3527 (2) *Erigeron canadensis* **b. perramosus Schur** = for. pusillus Uechtritz. — Fusto di 4-20 cm., ramoso dalla base, densam. foglioso, ma con pochi capolini. — *Nei luoghi aridi.*

3530 (5) *E. acer* α *typ.* **e. alpestris Rikli** (Ber. schweiz. Bot. Ges. 1904, p. 129). — Pianta di 6-20 cm., con 4-10 capolini. — *Nelle Alpi tra 1100 e 2000 m.*

for. elongatus Ledeb. – *Veronese* (*Goir.*).

3530 * E. acer × canadensis = E. Huelsenii Vatke (Oest. Bot. Zeitschr. XXI [1871] p. 346). — *Porto Valtravaglia sul Lago Maggiore* (*De Notaris hb.*, *ex Chiovenda* in litt.).

3531 (6) *E. alpinus* α *typ.* — *Abr. nella Marsica a Fossa Romana ecc.* (*Grande!*).

Digitized by Google

e. **gracilis Tavel. in Rikli** (Ber. schweiz. Bot. Ges. 1904, p. 132) = for. elongatus Rikli in Chenev. — Pianta tenera, smilza (8-15 cm.), a fg. radicali bislungo-lanceolate, lungam. attenuato-picciolate in basso e le cauline ridotte. Capolino spesso unico e piccolo (largo 12-16 mm.). — *Grigioni a Poschiavo* (*Brockmann*), *C. Ticino in più luoghi* (*Chenev.*).

β′ **neglectus** (**Kern.**, 1872). — Portam. della *var. uniflorus*, ma con fusto più rigido ed eretto (non ascendente), fg. un po' carnose, involucro un po' meno peloso (più peloso però che nel tipo) e fi. interni del raggio tubuloso-filiformi. — *Alpi Retiche al Brennero e nel gruppo della Bernina.*

η *uniflorus* b. **nanus Rikli** (l. c., p. 130) = for. pumilus Auct. = for. minimus Rikli in Chenev. — Pianta nana (1-3 cm.), a fusto più breve od eguagliante le fg. basali. — *Val d'Aosta al passo del Teodulo* (*Coaz*), *C. Ticino sulla Corona di Redorta a 2770-2800 m.* (*Chenev.*) *e certam. altrove.*

c. **glabrescens Rikli** (l. c.). — Involucro poco peloso o quasi affatto glabro (dalla *var. glabratus* si distingue, sec. Rikli, per le fg. ottuse, non acute o terminate da un apice cartilagineo). — *S. Gottardo ecc.*

d. **neglectiformis Rikli** (l. c.). — Portam. della *var. neglectus*, ma fi. del raggio tutti ligulati. — *Alpi ticinesi ecc.*

Altre forme di *E. alpinus* (sensu lato) ritenute ibride, ma che per noi sono dei meticci o delle for. intermedie, sono:

E. Christii J. O. Wolff = E. unifloro × Schleicheri. — *C. Ticino sulla Cima di Cagnone a 2000 m.* (*Chenev.*).

E. rhaeticus Bruegg. (1880) = E. alpino × uniflorus. — Spesso confuso colla *var. neglectus.* — *Alpi Retiche e ticinesi.*

3533 (1) *Matricaria aurea.* — *Isole Maltesi a Rabbato* (*Duthie*).

3534 (2) *M. Chamomilla* e. **gracilis Chenev.** — Fusto semplice di 10-15 cm., ad 1 solo capolino. Pianta ridotta in ogni parte. — *C. Ticino sui muri a Cerra* (*Chenev.*).

3541 (6) *Chrysanthemum Leucanthemum* α *typ.* **for. lobatum Briq.** — *C. Ticino sopra Mergoscia ed a Ponte Brolla* (*Chenev.*).

β *amplifolium.* — *Bresciano alle falde del M. Maddalena* (*Ugolini*).

δ *pallens.* — *Veronese* (*Goir.*).

ε *laciniatum.* — *Avellinese a M. Pergolo, alla base del M. Terminio e tra Bagnoli ed il Laceno* (*Trotter!*), *Cal. occ. sul m. La Mula* (*B. Longo*).

3542 (7) *Ch. ceratophylloides* β *tridactylites.* — Gli acheni centrali sono sprovvisti di corona (almeno in parecchi esemplari da noi esaminati), quindi tale var. non rimane distinta da *Ch. Leucanthemum* altro che per la forma e carnosità delle fg. e per l'habitus diverso, che la fanno rientrare nel ciclo delle forme del *Ch. ceratophylloides.*

3543 (8) *Ch. alpinum* β *minimum.* — *C. Ticino in Val Piora* (*Chenev.*) *ed altrove.*

3545 (10) *Ch. indicum* α *typ.* b. **rusticanum Goir.** (1904). — Capolini assai piccoli, gialli, per lo più senza fi. ligulati. — *Coltivato.*

3546 (11) *Ch. Parthenium.* — *Eolie a Stromboli, probabilm. inselv.* (*Zodda*), *raro in Sic.* (*ex Lojac.*).

d. **microcephalum Goir.** (1904). — Capolini 2 volte più piccoli dell'ordinario. — *Veron.* (*Goir.*).

3547 * (12 *bis*) **Ch. cinerariaefolium** (**Trev.**) **Vis.** = Pyrethrum Trev. = Ch. rigidum et Turreanum Vis. — *Istria presso Pola in più luoghi* (*Heimerl in Oest. Bot. Zeitschr. 1899, p. 336, Untchy in Fiori Bég. e Pamp. Fl. It. exs. n. 179*).

3551 (1) *Artemisia camphorata* β *saxatilis b. achilleaefolia.* — *Salernit. sui M. S. Angelo e Finestra* (*L. Marcello*).

3553 (3) *Art. Absinthium* b. **calcigena Rehm.** (ubi?). — *Tir. mer. presso Bolzano* (*Sauter*).

3557 (7) *Art. vulgaris* a. **procerior Goir.** (1904). Fusto eretto di 1-2 m. o più, a pannocchia assai grande e capolini grandetti. — e. **humilior Goir.** (1904). Fusto basso, ascendente, a pannocchia contratta e capolini grandetti. Fg. increspate, densam. tomen-

Digitized by Google

tose di sotto. — **f. umbrosa Goir.** (1904). Fusto diffuso-prostrato, ramosissimo, verde, a pannocchia ampia e capolini piccoli, avvicinati. Fg. a lacinie strette. — **g. serotina Goir.** (1904). Fusto flaccido, prostrato-ascendente, racemoso-pannocchiuto, a capolini giallognoli, grandetti. Fg. e lacinie lungam. e largam. lanceolate, verdi-scure di sopra, cenerognole di sotto. — **h. colorata Goir.** (1904). Rami e squame violaceo-scure. — **i. crispa Rchb.** Fg. a lacinie increspate. — *Tutte nel Veron.* (*Goir.*).

3565 (15) *Art. campestris* α *typ.* **c. serotina Goir.** (1904). — Pianta bassa, prostrata, densam. cespugliosa, di color rosso intenso. — *Veron.* (*Goir.*).

3566 (16) *Art. caerulescens* δ *densiflora.* — *Isola Maddalena presso la Sard.* (*A. Vaccari!*).

3568 (1) *Anthemis mixta* **for. adonidifolia Lojac.**, Fl. sic. — *Sic. a Capo d' Orlando* (*hb. Tod.*) *ed a S. Michele* (*ex Lojac.*)

for. coronopifolia (Less.). — *Sic. nel Messinese* (*ex Lojac.*).

3569 (2) *Anth. Cotula* **for. arbuscula Lojac.**, l. c. — *Nell' Erb. dell' Orto Bot. di Palermo senza località* (*Lojac.*).

3570 (3) *Anth. fuscata* **for. uniflora Lojac.**, l. c. = A. fuscata β Bory et Ch. — *Sic. nei luoghi montani* (*Lojac.*).

3573 (6) *Anth. arvensis* α *typ.* **for. parviflora Tin. ex Lojac.**, Fl. sic. — *Sic. a Catania* (*Tin. ex Lojac.*).

γ *incrassata.* — *Colli Euganei* (*Bég.*).

for. aeolica Lojac., l. c. — *Lipari* (*Tin. ex Lojac.*).

3573* Anth. brevifolia Lojac., Fl. sic. — Sec. Lojacono sarebbe molto affine ad *Anth. sphacelata.* — *Sic. nel Val Demone* (*hb. Tod.*).

3574 (7) *Anth. secundiramea* α *typ.* **d. lopadusana** (**Lojac.**, Fl. sic.). — Intermedia tra il tipo e la *var. intermedia.* — *Lampedusa.*

for. pectinata Lojac., l. c. — *Sic.* (*hb. Tod. sine loco*).

β *intermedia.* — Il Lojac. (l. c.) distingue le tre forme seguenti: **b. canescens, c. tenuisecta** e **d. nitida.** — *Tutte in Sic.* (*ex Lojac.*).

var. discoidea Guss. — Sec. Lojac. (l. c.) sarebbe diversa dalla *Anth. muricata*, alla quale fu riferita dal Gay ed anche nella Fl. An. (III, p. 255).

3574* Anth. concolor Lojac., l. c. — *Isola d' Ustica* (*Tin. ex Lojac.*).

3576 (9) *Anth. cretica.* — *In Sic. anche nell' interno a Villarosa* (*Tin. ex Lojac.*).

3578 (11) *Anth. alpina.* — Sec. Pampanini (Mém. Soc. Frib. Sc. Nat., sér. Géol. et Géogr. VIII, fasc. 1, p. 98) tale spec. non sarebbe più stata trovata in Piem. dopo l' Allioni; la località citata di *Antaret* (Fl. An. III, p. 256) dovrebbe essere il *M. Antaret* del Delfinato.

3579 (12) *Anth. mucronulata.* — *Cal. citer. al M. Cozzo del Pellegrino nel territ. di S. Donato di Ninea* (*B. longo*).

3580 (13) *Anth. montana* β *grandiflora Ten.* (1826) = var. Columnae Ten. (1831) (Fl. An. III, p. 257 [var. β]).

γ *aetnensis.* — *In Sic. nel m. di Cammarata* (*Schouw in DC. Prodr. VI, p. 7*), *ma forse potrebbe essere l' A. punctata v. incana* (*vedi sotto*).

a. rosea Guss. (pro var. b.) (for. b. Fl. An. III, p. 257). — È la genuina *A. aetnensis* descritta dallo Schouw. — *Etna, frequente nei luoghi più elevati.*

b. albiflora Strobl (1882) (pro var. α). — Linguette bianche. — *Etna.*

3581 (14) *Anth. punctata* α *typ. b. Lojaconi Fiori* (1903 Majo) = A. Ismelia Lojac. (1903 Novem.).

β *incana.* — *Sic. anche nel m. di Cammarata* (*Guss.*).

3582 (15) *Anth. hydruntina.* — É molto simile alle for. discoidee di *A. montana* dell' Oriente e specialm. all' *A. mont. v. pentelica Boiss.* Secondo Boissier (Fl. or. III, p. 292) non si osserverebbe però nell' Oriente un passaggio manifesto dalle forme raggiate alle discoidee, ciò che invece verificasi per le forme italiane (*A. mont. v. alpina* e *v. flosculosa*); si può quindi ritenere che *A. hydruntina* assieme alle var. discoidee *di A. mont.* dell' Or. possa ancora costituire una spec. distinta,

Digitized by Google

3583 * Anth. aeolica Lojac., l. c. — È una var. di *Anth. maritima* e potrebbe anche essere (sec. Lojac.) la for. *bipinnatipartita J. Gay.* — *Eolie nelle isolette di Bottaro, Basiluzzo e Dattero.*

3587 (20) *Anth. Triumfetti* δ *rigescens.* — *Sic. nelle Nebrodi a Vallata reale a 1600 m.* (*Lojac.*).

3587 * Anth. Palumbi Lojac., l. c. — L'Autore la paragona con *Anth. canescens Brot.*, ma non è certo che sia essa. — *Sic. senza indicazione di luogo* (*hb. Tod.*).

3588 (21) *Anth. tinctoria* β *discoidea* = v. flosculosa Goir. (1904). — *Veron.* (*Goir.*).

3590 * *Anacyclus pedunculatus Pers.* = Anthemis Desf. — *Sic. nei pascoli elevatissimi delle Madonie* (*Minà ex Lojac. Fl. sic.*).

var. tenuisectus Lojac. (sub Anthemis). — *Sic. nel Val Demone nei M. di Cannata e ad Acquasanta* (*Citarda ex Lojac. l. c.*).

3593 * *Achillea atrato* × *nana.* — *C. Ticino a Campolungo* (*Zahn ex Chenev.*).

3595 (5) *Ach. moschata* β *calcarea.* — *Cal. occ. sui monti Montea, Serra della Cersa e La Mula e Basil. tra il M. La Spina ed il Campo del Galdo* (*B. Longo*).

3600 (9) *Ach. tomentosa* **b. albiflora Goir.** (1904). — Fi. bianchi — *Veron. al Bosco Mantico* (*Seg. ex Goir.*).

3601 (10) *Ach. Millefolium* θ *dentifera.* — *Colli Euganei sul M. Ricco* (*Bég.*) *e M. Cero* (*Bizz. ex Bég.*).

η *tanacetifolia b. distans* (*W. et K.?*) **subfor. alpestris Evers** (Verh. zool.-bot. Ges. in Wien. 1896, p. 77). — *Trent. a m. Paganella* (*Evers*).

3609 (1) *Evax pygmaea* **var. mucronulata Pomel.** — *Sic.* (*ex Lojac.*).

3609 * E. carpetana Lge. — *Presso Palermo alle falde di M. Pellegrino presso la polveriera; però da studiarsi ulteriorm.* (*Lojac.*).

3612 (4) *E. exigua* **var. longibracteata Lojac.**, Fl. sic. — *Sic.* (*hb. Tod. sine loco*).

3613 (1) *Filago germanica* ε *Gussonei.* — *Malta* (*ex Lojac.*).

3613 * F. cuneata Lojac., Fl. sic. — È da porsi tra le altre numerose var. di *F. germanica.* — *Sic. a Palermo alla Favorita ed a Marsala* (*Herb. Panor. ex Lojac.*).

3613 ** F. micropodioides Lge. = F. leontopodioides Lojac. hb. — Sec. Lojac. (l. c.) sarebbe forma distinta da *F. prostrata Parl.* — *Nell'Erb. di Palermo senza località* (*ex Lojac.*).

var.? subulata Lojac., l. c. = F. sicula Lojac. olim. — *Sic. a Dingoli presso Piana?* (*Lojac.*).

3614 (2) *F. arvensis* β *Lagopus.* — *In Cal. anche nel territ. di Mormanno sul M. Palanuda* (*B. Longo*).

3615 (3) *F. heterantha* **for. fulvescens Lojac.**, l. c. — *Sic. a M. Salvatore* (*Ross ex Lojac.*).

3617 (5) *F. gallica* **var. Tinei (Sorrent. hb.) Lojac.**, l. c. = F. gallica var. crassa Lojac. olim. — *Sic. in vari luoghi* (*Lojac.*).

3620 *Leontopodium alpinum* α *typ.* **c. dentatum Pampanini** (1903). — Fg. fiorali dentate nella metà super. — *Col tipo presso Vittorio sul Col Vicentin; raro* (*Pamp.*).

3623 (3) *Gnaphalium uliginosum* β *ramosum b. prostratum.* — *Cal. occ. nel territ. di Saracena al Piano di Caramolo* (*B. Longo*).

3635 * *Inula germanica L.* — *Veron. presso Tregnago a Figarolo, forse accidentalmente* (*Goir.*).

3638 (5) *I. spiraeifolia* **c. latifolia Goir.** (1904), sub I. squarrosa. — Fg. più larghe. — *Veron.* (*Goir.*).

3640 (7) *I. britannica* **e. Oetteliana (Rchb.).** — Fg. quasi glabre. Brattee involucrali più larghe. — *Presso Verona* (*Goir.*).

3643 (10) *I. Oculus-Christi.* — Sec. Bolzon (Bull. soc. bot. it. 1905, p. 16) nell'erb. dell'Orto bot. di Parma esistono realm. esemplari del «*Piacentino*» raccolti dallo Jan da riferirsi a questa spec.

3644 (11) *I. Conyza* **b. umbrosa Goir.** (1904). — Fusto pubescente. Fg. infer. ellittico-

Digitized by Google

lanceolate, larghe 6-7 cm., densam. cigliate, con denti radi ed ottusi, scabrosette sulle due pag. — *Veron. a Castelletto di Brenzone ed a Castione* (*Goir.*)

3645 (**12**) *I. bifrons.* — *Camp. a Spigno al Montone* (*N. Terr.*).

3652 (**3**) *Pulicaria dysenterica* α *typ. b. lanata Fiori* (Fl. An. III, p. 292).

β *microcephala Boiss.* (*Bég. pr. sp.*) = P. uliginosa Stev. in DC. (1836), non Hoffgg. et Lk. (1820), nec S. F. Gray (1821) = P. dysent. b. uliginosa Fiori in Fl. Anal. l. c. — È una razza geografica che merita di essere elevata al rango di var.

3654 (**1**) *Carpesium cernuum.* — **b. macranthum Goir.** (1904). Capolini grandi il doppio del normale. — **c. micranthum Goir.** (1904). Capolini molto piccoli. — **d. comatum Goir.** (1904). Squame invol. esterne lunghissime. — **e. pumilum Goir.** (1904). Pianta di 10-15 cm., ridotta in ogni parte. — *Tutte nel Veron.* (*Goir.*).

3662 (**3**) *Asteriscus spinosus* **for. gracilis** et **for. latifolius Lojac.**, Fl. sic. (sub Buphthalmo). — *La prima in Sic. alle Madonie* (*hb. Tod.*), *la seconda a Busambra* (*Lojac.*).

3663 *Calendula officinalis* θ *hymenocarpa.* — *Palermo al Ponte di S. Erasmo* (*Tin. ex Lojac.*).

ι *sicula.* — *Lampedusa* (*Lojac.*).

3663 * C. ceratosperma Viv. = C. ceratocarpa Lojac. Fl. sic. (pro err.). — Pare debba essere avvicinata piuttosto alla *C. arvensis* che alla *C. fulgida*, come avevamo precedentem. sospettato (Fl. An. III, p. 298). — *Sic. a Cefalù e Marsala ed a Lampedusa* (*ex Lojac.*).

3663 ** *Osteospermum moniliferum DC.* — *Inselvat. presso Palermo a Mondello ed alla Favorita; però ora quasi distrutto* (*Lojac.*).

3665 *Eclipta alba.* — La figura data nella Iconografia rappresenta la pianta dell'Egitto e differisce dalla *var. neapolitana* per la forma delle fg. e per gli acheni che nella pianta nap. sono più decisam. tetragoni, con gli angoli lisci ed affilati (N. Terr. in litt.).

3675 (**6**) *Bidens heterophyllus* β *Wrigtii.* — *Inselvatichito da molti anni a Cozzuolo presso Vittorio nel Trevigiano* (*Pampanini*), *nelle Marche anche nei seminati a Jesi* (*Grilli!*).

3676 *Galinsoga parviflora.* — *Prov. di Torino nei campi a Pancalieri* (*Vignolo-Lutati in litt.*), *C. Ticino.*

3680 (**3**) *Xanthium italicum* α *typ.* **b. pusillum Goir.** (1904) (sub X. macrocarpum). — Fusto semplicissimo, eretto, monocefalo, alto pochi cm. — *Nell'area del tipo.*

3680 * X. italico × strumarium Nob. = X. macrocarpo × strum. Goir. — *Veron. a S. Vito del Mantico e presso S. Michele* (*Goir.*).

3680 ** X. ambrosioides Hook. et Arn. — *Genova nell'alveo della Polcevera a Fegino presso la conceria* (*Canneva ex Somm.*); *importato dall'Argentina colle pelli.*

3683 (**3**) *Echinops Ritro* α *vulgaris.* — *Parmig. al M. della Guardiola sopra Traversetolo* (*Bolzon*).

3690 (**3**) *Carlina acaulis* β *alpina* **c. ramosa Nob.** = β caulescens b. ramosa B. Longo (1906). — Caule molto ramoso. — *Basil. alle falde del M. La Spina* (*B. Longo*).

3691 (**4**) *C. vulgaris* α *typ.* **for. tomentosa Vis. et Sacc.** (1869). — Fg. ed involucri più fortem. aracnoideo-tomentosi che nel tipo (ex Sacc. in litt.). — *Trevig.* (*Sacc.*), *Veron.* (*Goir.*).

β *longifolia.* — *C. Ticino presso Vogorno* (*Chenev.*).

3694 (**7**) *C. corymbosa* β *graeca.* — *Sic. a Mirto* (*Citarda ex Lojac.*).

3704 *Arctium Lappa* ε *pubens.* — *C. Ticino a Frasco* (*Chenev.*), *Cors. alla marina di Sisco, sulla strada da Bastia al Capo Corso.* (*Briq.*).

3707 (**1**) *Serratula tinctoria* **for. leucantha Goir.** (1904). — Fi. bianchi. — *Veron.* (*Goir.*).

3712 (**1**) *Crupina vulgaris.* — *Cal. occ. sul m. Serra della Cersa* (*B. Longo*).

b. major Goir. (1904). — Fusto ramosissimo, alto 1 m. e più. — *Veron.* (*Goir.*).

c. minor Goir. (1904). — Fusto semplice, alto 10-30 cm., per lo più monocefalo. — *Veron.* (*Goir.*).

3713 (**2**) *C. Crupinastrum* **for. fasciculata Lojac.**, Fl. sic. — *Sic. ad Avola* (*Bianca ex Lojac.*).

Digitized by Google

3714 (1) *Centaurea Lippii.* — La *for. subdiscolor Lojac.* va soppressa, avendo l'Autore confuso il colore del tubo staminale con quello dei fioretti centrali (cfr. Lojac. Fl. sic.).

3715 (2) *C. salmantica* α **typica.** — *In Sic., sec. Lojac., sarebbe stata raccolta solo a Villafrati.*

β **Durieui Nob.** = Microlonchus Spach = M. salman. var. siculus Guss. p. p. — *Diffuso in Sic. (ex Lojac.).*

γ **Iserniana (Graells.)** = Microlonchus Gay et Webb = Cent. Janerii Graells. — *Sic. mer. (ex Lojac.).*

3718 (5) *C. alba.* — *Sic. presso Roccapalumba (Lojac.).*

3719 (6) *C. Jacea* δ *neapolitana.* — *Avellino (Trotter!).*

3724 (11) *C. phrygia* β *pseudo-phrygia* **b. melanolepis Briq. in Chenev.** (Bull. Herb. Boiss. 1902, p. 772.) — *C. Ticino (ubi?) (Chenev.).*

3726 (13) *C. Cyanus* **e. humilis Goir.** (1904). — Fusto ramosissimo, prostrato, quasi cespuglioso, abbreviato. Capolini più piccoli. Fior. tardiva. — *Veron. specialm. nei luoghi elevati (Goir.).*

for. linifolia Lojac., Fl. sic. — *Sicilia?*

3726 * **C. depressa M. B.** = C. anatolica Griseb. — *Sic. alle Madonie e Palermo nella Valle di S. Martino (cfr. Lojac. Fl. sic.).*

3727 * *C. montana* β *Triumfetti* v. **rubiflora Evers** (1896), sub C. axillaris — Fi. rossi. Fg. tomentose. — *Trento (Evers).*

3730 * **C. soluntina Tin. ex Lojac.,** Fl. sic. — Sec. Lojac. sta in mezzo tra *C. Cineraria typica* e la *var. cinerea.* — *Sic. nel versante nord-est del M. Catalfano (Tin. ex Lojac.).*

3730 (17) *C. Cineraria* **var. sicula Lacaita** (in litt. 5-V-1906). — Sec. Lacaita con tale nome deve chiamarsi la pianta dei dintorni di Palermo, diversa da quella del Laz. e Nap.

3731 (18) *C. dissecta* η *intermedia Fiori* (1904) = C. maculosa v. intermedia Micheletti (1891) (ambigua pro err. in Fl. An. l. c.) = C. dissecta η pseudo-maculosa Fiori in Fl. An. III, p. 334 (cfr. Fiori in Bull. Soc. bot. it. 1904, p. 98).

ι *maritima* = C. ursina Lacaita hb. — Si avvicina molto nel portamento alla *var. ilvensis.* Il pappo è subeguale all'achenio. — *Costiera di Amalfi dal mare sino a 500 m. e specialm. al Capo d'Orso (Lacaita!) ed a Sorrento (Groves!).*

b. cinerarioides Lacaita = C. ursina v. cinerarioides Lacaita hb. — Pianta bianco-tomentosa, con tomento fioccoso, denso e persistente alla base del fusto e lungo le rachidi delle fg., nel resto meno copioso e detersile. — *Amalfi al Pontone (Lacaita!).*

c. alata Lacaita = C. ursina v. alata Lacaita hb. — Appendici delle squame invol. largam. espansa ai lati in ala scariosa, rosicchiato-denticolata. Il resto come nella for. genuina. (Forma omologa alla *Grovesii* della *var. ascendens*). — *Colla for. prec. (Lacaita!).*

d. hyalina Lacaita = C. ursina v. hyalina Lacaita hb. — Appendice delle squame colle ciglia e spesso anche la membrana laterale scolorate, ialine (nella for. genuina nere). — *Col tipo.*

e. montaltensis Lacaita = C. Tenorii v. montalt. Lacaita hb. — Simile alla for. *hyalina* ma squame invol. ad appendice con mucrone terminale più robusto che le ciglia laterali (carattere che l'avvicina alla *v. glabrata*). — *M. S. Angelo sul Montalto a circa 830 m.*

ι' **glabrata Ten.** (1842) = C. paniculata Ten. = C. Tenorii Guss. hb. (fide Lacaita). — Simile alla var. prec. e massime alla sua *for. hyalina* per la forma delle appendici delle squame invol., le quali sono munite ai lati (sotto le ciglia) di una membrana lacera e ialina assai vistosa; ne differisce per le fg. radicali pennate, a segmenti ovati o lanceolati, dentati o (nel lato infer.) incisi, mentre nella *var. maritima* tali fg. sono (eccett. talora le primordiali) bipennate ed a lacinie lineari o lineari-lanceolate. Tutta la pianta è glabra, appena scabra in alto. — *Nap. sul M. S. Angelo di Castellamare*

Digitized by Google

sulle rocce calcaree tra 1000 e 1443 m. (*Ten.*, *Huet*, *Lacaita! ecc.*). (*Tenore indica Gargano per errore in luogo di Gragnano*).

3731 * **C. panormitana Lojac.**, Fl. sic. — *Presso Palermo a S. Martino nella via della Portella di S. Anna, Lugl.* (*Lojac.*).

3732 (19) *C. paniculata* o *aplolepa* **d. integrans (Naggi,** 1905). — Fg. tutte interissime; capolini più grossi. — *Luoghi incolti a Genova* (*Naggi*).

3734 (21) *C. scabiosa* ε *badensis.* — Sec. Kerner (Oest. bot. Zeitsch. 1874, p. 106) deve riferirsi qui la *C. sordida Hausm.* e relative località. — *Assai diffusa sulle rupi calcari nella Valle del Sarca e Val d'Adige presso Salorno e Magrè* (*ex Hausm. et Kern.*) *e nel Veron.* (*Goir.*).

ι *alpina* **b. subacaulis Heg.** — *C. Ticino.*

var. cinereocephala Evers (1896). — Involucro tomentoso-biancastro; squame bislunghe (le infer. spesso porporine), con ciglia brunastre o giallo-pallide. Fg. coriacee, verdi-chiare, lucide, a lacinie lineari o lineari-lanceolate, semplici o pennate. — *Sulla dolomia in Val d'Adige da Magrè a Mezzotedesco* (*Evers*).

3736 (23) *C. rupestris.* — Riferendoci a quanto fu pubblicato nelle «Schedae ad Floram italicam exsiccatam (in N. Giorn. bot. it. 1905, p. 209)» la chiave delle entità subordinate a questa specie va così modificata:

A Fi. gialli od aranciati.

a Fusti eretti ecc. (vedi Fl. An. III, p. 342).

I Fg. bi-tripennatifide ecc. (vedi Fl. An. l. c.). α *typica*

1 Piante munite di solo tomento-ragnateloso.

† Pappo lungo $^1/_2$ dell'achenio o meno.

* Squame invol. tutte inermi o con spina assai breve. — *Triest.*, *Goriz.*, *Friuli*, *Tosc.*, *Appenn. centr.* *a. subinermis Koch*

** Squame invol. intermedie con una spina eretta o patente, rigida, lunga. — C. rupestris Rchb. (1830) — C. rup. β armata Koch (1845). *b. aculeosa DC.* (1837)

†† Pappo subeguale all'achenio od un po' più lungo.

Δ Fusto e picciuolo delle fg. con leggero tomento ragnateloso-fioccoso. Pianta gracile. — *Triest.*, *Friuli* — C. dichroantha A. Kern. p. p. **c. adonidifolia (Rchb.)**

ΔΔ Fusto, picciuolo e rachide delle fg. con denso tomento ragnateloso-lanuginoso (talora scomparente). Pianta robusta. — *Alpi Apuane.* — C. dichroantha A. Kern. p. p. (quoad pl. ex Alp. Apuanis). *d. arachnoidea* (*Viv.*)

2 Pianta munita oltre del tomento fioccoso anche di peli brevi in parte glandolosi. Fi. giallo-cedrini. Pappo . . . . . *e. hirtella Posp.*

II Fg. pennato-inciso-lobate ecc. (vedi Fl. An. l. c.). β *inermis Groves*

b Fusti eretti od ascendenti ecc. (vedi Fl. An. l. c.). γ *ceratophylla* (*Ten.*)

B Fi. giallo-sporchi, porporino-chiari o porporino-sporchi. — *Carso*, *Friuli.* — C. sordida W., Koch (non Hausm.) — C. dichroantha A. Kern. p. p.

C. rupestri × *Scabiosa*

3742 (29) *C. Centaurium.* — Il Bertoloni (Fl. it. IX, p. 428) dubita che i vecchi botanici piemontesi (All., Balb., Re) abbiano confusa con questa spec. la *C. alpina* e che tale pianta non sia quindi mai esistita in Piem.; come non esiste nel M. Baldo ove fu pure indicata (Goir.).

3743 (30) *C. crassifolia.* — La pianta dell'isola Gozo differisce, sec. Duthie, da quella di Malta per avere le fg. decisam. seghettate e può quindi chiamarsi: **for. serratifolia Nob.**

3745 (32) *C. solstitialis* **var. adunca Lojac.**, Fl. sic. (sub C. lappacea). — *Sic.* (*Philippi ex Lojac.*).

var. hastaefolia Lojac., l. c. — *Sic. a Mirto e Tortorici* (*ex Lojac.*).

γ *Schouwii* **for. lorata** et **for. rhombea Lojac.**, l. c. — *Sic.*

3745 * **C. Damanti Lojac.**, l. c. — Deve essere una forma accidentale di *C. solstitialis* o sue var. — *Sic. alla Ficuzza* (*Lojac.*).

Digitized by Google

3745 ** **C. filaginoides Lojac.**, l. c. — Ha tutto l'aspetto di essere una forma mostruosa di *C. solstitialis* o sue var. — *Sic. alla Ficuzza e forse a Castelbuono* (*ex Lojac.*).

3746 * **C. Durieui Lojac.**, l. c. = C. nicaeensis var. Ricaeana Rchb. = C. aemula Lojac. hb. — Sec. Lojac. potrebbe essere un ibrido tra *C. nicaeensis* e *C. napifolia*. — *Sic. a Palermo e Marsala* (*ex Lojac.*).

3747 (34) *C. Calcitrapa* β *macroacantha* **b. autumnalis Lojac.**, Fl. sic. — Rappresenta una for. anormale corrispondente alla *for. monstrosa* del tipo.

3749 (36) *C. sphaerocephala* α *typ. b. flaviflora*. — *Sic. a Castellamare* (*Tin. ex Lojac.*).
γ *Seridis*. — *Sic.* (*hb. Tod. ex Lojac.*).

3750 * *C. hyalolepis Boiss.* — *Lig. a Sestri pon. e nel letto del Rio Zemignano affluente della Polcevera* (*Canneva ex Somm.*) *e nel letto del Bisagno* (*Canneva in hb. Doria!*). — A questa specie deve riferirsi pure (sec. Somm.) la *C. pallescens* indicata dall' Arcangeli presso Vorno nel Lucchese.

3750 ** *C. iberica*. — *Avventizia presso Palermo a Malaspina, ov' è scomparsa* (*Reina ex Lojac.*) *ed in Cors. tra Ajaccio e la Torre della Parata* (*Briq.*).

3750 *** *C. Urvillei DC.* = C. raphanina D' Urv., non S. et S. — *Sic. a Marsala; ma da ristudiarsi* (*Ross ex Lojac.*).

3752 (1) *Carthamus lanatus* α *typ.* **c. nanus Goir.** (1904). — Pianta alta 15-20 cm., monocefala. — *Veron. al M. Novesago* (*Goir.*).
for. depressus Lojac., Fl. sic. (sub Kentrophyllo). — *Sic.*
β *elatus*. — *Presso Palermo* (*Reina ex Lojac.*).

3752 * **C. dentatus Vahl** = Kentrophyllum DC. — *Palermo ai Petrazzi ed a Malaspina* (*ex Lojac.*).

3754 *C. caeruleus* **for. acaulis** et **integer Lojac.**, l. c. (sub Carduncello). — *Sic.* (*ex Lojac.*).

3754 * **C. gracilis Lojac.**, l. c. (sub Carduncello). — L' Autore stesso dubita sia una for. anormale di *C. caeruleus*. — *Sic.* (*ex Lojac.*).

3754 ** **C. multifidus Desf.** = Onobroma Spr. = Carduncellus Lojac. — *Sic. nei campi presso Palermo a Malaspina e via dell' Olivuzza alla Casina Ugo* (*Tin.*) *e Foresta?* (*Tod.*). (Cfr. Lojac., Fl. sic.).

3757 (1) *Carduus nutans* α *typ.* **for. minor Goir.** (1904). — Pianta di 15-20 cm., monocefala, con una densa rosetta di fg. basali ed a fg. cauline lineari-lanceolate, strettissime. — *Verona* (*Goir.*).
β *macrocephalus* **for. longilepis, polycephalus** et **chrysacanthus Lojac.**, Fl. sic. — *Tutte in Sic.* (*Lojac.*).

3757 * *C. pernutanti* × *pycnocephalus*. — *A Verona anche in Borgo Trento e nella Valdonega* (*Goir.*).

3759 (3) *C. defloratus* η *rhaeticus b. Barrelieri*. — *Parmig. al M. Penna* (*Bolzon*), *Camp. sul M. Mutria* (*N. Terr.*).
ι *carlinaefolius* **b. albiflorus Goir.** (1904). — Fi. bianchi. — *Veron. sui Lessini* (*Goir.*).

3761 (5) *C. affinis b. pollinensis*. — *Cal. occ. nel territ. d'Ajeta sul m. Ciagola* (*B. Longo*).

3762 * *C. Personata* × *defloratus*. — *C. Ticino a Fusio* (*Chenev.*) *ed altrove*.

3765 (9) *C. acanthoides*. — *Dintorni di Parma* (*Bolzon*).

3766 (10) *C. litigiosus*. — *Piacentino a Ferriere e Parmig. al passo delle Cento Croci e lungo il Taro presso Fornovo* (*Bolzon*).

3769 (13) *C. pycnocephalus* α *typ.* **b. Gussoneanus Lojac.** — Forma più robusta e più spinosa, a capolini affastellati, fusto alato fino sotto i capolini e fg. più profondam. divise. — *Lampedusa* (*Lojac.*, *Somm.*).
γ *tenuiflorus*. — *Veronese* (*Rchb.*), *Rovigo* (*Poll.*), *Cors. a Bastia* (*Sal.-Marschl.*, *E. Petit*).
var. intermedius Tin. hb. (Lojac.). — *Palermo a Castellaccio e Pantelleria* (*cfr. Lojac. Fl. sic.*).

Digitized by Google

3769 * C. membranaceus Lojac., Fl. sic. — *Sic. nel bosco di Colobria, Verdura ed Etna* (*ex Lojac.*).

3769 ** C. rugulosus Guss., Syn. add. p. 863, Lojac. Fl. sic. — *Sic. nei boschi di Mistretta* (*Guss.*) *e Caronia* (*Gasp., Tin.*).

3771 * C. glaberrimus Lojac., Fl. sic. — *Sic. a Campi ed a Foresta presso Capaci* (*Lojac.*).

3772 * C. Reuterianus Boiss. = C. Bourgeanus Boiss. et Reut. = C. myriacanthus Boiss. (non Salzm.). — *Sic. a Misilmeri* (*Tod., sub C. corymbosus*). (Cfr. Lojac. Fl. sic.).

3773 (17) *C. acicularis.* — *Salernit. nel territ. di Cava dei Tirreni* (*L. Marcello*).

3776 (2) *Cirsium stellatum All.* (1785), *Spr.* (1826).

3780 (6) *Cirs. afrum* β *niveum.* — *Nella Cal. occ. anche al Piano di Novacco e ad Acqua Fredda* (*B. Longo*).

3781 (7) *Cirs. syriacum* **for. mite Lojac.**, Fl. sic. (sub Notobasis). — *Sic.*

3783 * (9 *bis*) Cirs. crinitum Boiss. in DC. — *Questa spec. della Spa. e Provenza è stata scoperta in Corsica tra il ponte della Restonica e la masseria di Timozzo a 1300 m.* (*Briq.*) *ed in Sic. nel Val Demone* (*Tod. ex Lojac.*).

3784 (10) *Cirs. lanceolatum* α *vulgare* **b. humile Goir.** (1904). — Pianta alta 2-3 dm., a fusto semplicissimo e capolini più piccoli. — *Verona* (*Goir.*).

for. tenuispinus et subbipinnatum Lojac., Fl. sic. — *Ambedue in Sic.*

3784 * Cirs. Cardo-Leonis Lojac., l. c. — *Sic. a S. Cristina-Gela presso Piana-Greci* (*Reina ex Lojac.*).

3784 ** Cirs. dubium Lojac., l. c. — È una var. di *C. lanceolatum.* — *Sic. a Misilmeri* (*Tin. ex Lojac.*) *ed a Regalmuto* (*Tod. ex Lojac.*).

3785 (11) *Cirs. eriophorum* δ *Morisianum.* — Varia per le squame involucrali prolungate in spina più o meno lunga, le infer. riflesse o più raram. erette. Inoltre per le fg. bianco-tomentose di sotto in pianta ad involucro più o meno densam. ragnateloso od anche (**b. intermedium Nob.**) glabro o quasi, ovvero (**c. denudatum Nob.**) glabre o quasi di sotto in pianta ad involucro meno ragnateloso od anche glabro. — *Tanto la for. genuina quanto le b. e c. nell' Appenn. tosc.-em. tra Boscolungo e Fiumalbo* (*Somm. hb.*).

3786 (12) *Cirs. echinatum.* — *Sic. nelle Nebrodi a Polizzi alla Colla e Serre di Cavalli* (*Lojac.*).

3787 (13) *Cirs. scabrum* **for. macrocephalus Lojac.**, Fl. sic. (sub Cirs. giganteum). — Il Lojac. (l. c.) distingue da questa spec. il **C. gigas Lojac.** (= Carduus Ucria, Tin.), che sarebbe in Sic. più comune del tipo. Di questo ne descrive anche due for., cioè: **spinis aureo-fulvis** ed **eriophorum.**

3788 * Cirs. argenteo × palustre = *C. argentoides Porta* (Accad. Sc. Rovereto 1905). — *Trent. in Val di Sole sul M. Tonale a 1700-1800 m.* (*Porta*).

3789 (15) *Cirs. palustre* α *typ.* **c. congestum Goir.** (1904). — Fusto semplicissimo, coi capolini sessili, densam. agglomerati all' apice. — *Veron.* (*Goir.*).

d. Chailleti (Gaud.). — Forma anomala, crescente dopo il taglio del fieno, con più fusti nascenti presso il punto di amputazione, a fg. semidecorrenti e nudi in alto.

3789 * Cirs. palustri × monspessulanum Gr. et Godr. — *Presso Cuneo* (*Gresino hb.!*).

3789 ** Cirs. palustri × tuberosum. — *Veron. a Vigasio* (*Goir.*).

3789 * Cirs. palustri × helenoides** = *C. rigidum Porta* (Accad. Sc. Rovereto 1905) = Cirs. Wankelii Reichr.? — *Trent. in Val di Sole sul M. Tonale a 1800-1900 m.* (*Porta*).

3789 ** Cirs. palustri × tricephalodes Nob.** = C. pal. × montanum Porta = C. Concilii Porta (l. c.). — *Trent. nel territ. Leutrense in Val Concilio, a 700-800 m.* (*Porta*).

3789 *** Cirs. tricephalodes × palustre Nob.** = C. montano × palustre Porta = C. brachiatum Porta (l. c.). — *Trent. nelle Giudicarie sul M. Gavardina a 900-1000 m.* (*Porta*).

Digitized by Google

3789 ****** *Cirs. palustri* × *Erisithales* = *C. variabile Porta* (l. c.). — *Trent. in Val di Sole al M. Tonale a 1800-1850 m.* (*Porta*).

3790 (16) *Cirs. polyanthemum* **for. longispinum Lojac.**, Fl. Sic. — *Sic.* — Non sappiamo se sia la stessa cosa della *for. longispinum* (*Pichler*) (Fl. An. III, p. 370).

3793 * *Cirs. pannonico* × *acaule* **for. pinnatifidum Celak.** – *Ai Piai presso Vittorio* (*Pampan.*).

3793 ** **Cirs. pannonico** × **oleraceum Porta** (an Schur?) = C. elatum Porta (Accad. Sc. Rovereto 1905). — *Bellunese alle falde del M. Alpagi presso Tamber, a 700-800 m.* (*Porta*).

3794 * **Cirs. helenoides** × **acaule** = *C. Scolopendron Porta* (Accad. Sc. di Rovereto 1905). — *Trent. in Val di Sole nei prati del M. Tonale a 1800-1900 m.* (*Porta*).

3794 ** **Cirs. Erisithali** × **acaule** = *C. solanum Porta* (l. c.). — *Col prec.*

3795 (21) *Cirs. tuberosum* β *anglicum.* — *Comasco sul m. Baro* (*Ardissone*).

3795 * **Cirs. tuberoso** × **oleraceum F. Sz.** = Cnicus tub. × oler. Schiede = Cnicus Lachenalii Gm. = Cirs. Lachenalii Koch = C. inerme Rchb. = C. pallens DC. = C. oleraceo × bulbosum Naeg. = C. bulb. × olerac. Goir. — *Veronese a Vigasio* (*Goir.*).

3796 (22) *Cirs. heterophyllum.* — Sec. Porta (Accad. Sc. Rovereto 1905, p. 7 [estratto]) soltanto la *for. indivisum DC.* (= C. helenioides All.) sarebbe una forma pura, tutte le altre a fg. più o meno divise sarebbero degli ibridi di vario grado tra questa ed il *C. Erisithales*, almeno per quello ch' egli ha osservato nel Trentino.

3796 * **Cirs. heterophyllo** × **oleraceum Koch** = C. affine Tausch. = C. Mielichoferi Saut. — *Tir. mer. a Bolzano presso Weissenbach nella valle del Sarn* (*Sauter*).

3797 (23) *Cirs. tricephalodes.* — *Parmig. nelle faggete del M. Penna* (*Bolzon*).

3798 * *Cirs. Erisithali* × *pannonicum* — *Nelle Prealpi venete presso Vittorio, in varie forme* (*Pampan.*).

3800 * **Cirs. carniolico** × **tricephalodes Nob.** = Cirs. carn. × montanum Porta = Cirs. brixiense Porta (Accad. Sc. di Rovereto 1905). — *Trent. nel territ. di Bressanone a Campei a 900-1000 m.* (*Porta*).

3801 * *Cirs. oleraceo* × *canum Bolzon* (Bull. Soc. bot. it. 1896, p. 134; Fl. Anal. III, p. 379). — Da quanto ci ha riferito il Pampanini, non si tratta di un ibrido ma di una forma tardiva di *C. oleraceum.*

3803 * **Silybum eburneum Coss. var. hispanicum Wk.** — *Luoghi erbosi calcarei presso Palermo a M. Gallo e a Catalfano* (*Tod. ex Lojac.*).

Gen. Onopordon. Vedi: Rouy, Rev. gen. Onopordon, in Bull. Soc. bot. de France 1896, p. 577.

3806 (2) *O. tauricum* δ *horridum.* — A questa var. è da riferirsi come sinonimo l' *O. Mandraliscae Lojac.*, Fl. sic., descritto di Lipari.

3806 * **O. ferox Rouy**, l. c. = O. horrido × illyricum v. spinosissimum? Rouy = O. horridum Kralik Pl. cors. exs. n. 667 (p. p.). — *Cors. a Bonifacio* (*Kralik ex Rouy*).

3807 (3) *O. Sibthorpianum.* — *Malta* (*Tin. et Schlumberger ex Lojac.*).

3808 (4) *O. illyricum* α *typ.* **b. spinosissimum Rouy**, l. c. = O. illyricum Kralik Pl. cors. exs. n. 666. — Differisce per le spine delle ali più robuste e più numerose e per le fg. pennatopartite. — *Cors. mer. e Sard.* (*ex Rouy*).

γ *arabicum.* — Il Rouy (Rev. Onop. l. c.) pone *O. illyricum* ed *O. arabicum* (= O. nervosum) in due sez. diverse, distinte specialm. pel carattere delle setole del pappo denticolate nella prima e piumose nella seconda; ma negli esemplari di Sard. di *O. arabicum* alcuna differenza esiste a tale riguardo con *O. illyricum*, in ambedue le setole del pappo hanno denti prolungati che le rendono subpiumose.

var. carduncelus Boiss. — *Sic. nel Valdemone* (*ex Lojac.*).

var. macranthum Boiss. — *Sic.* (*hb. Tod. ex Lojac*).

var. minus Moris (Fl. Sard. II, p. 472). — Pianta a fusto breve, fg. più finam. pen-

Digitized by Google

natifide, ali cauline più strette, capolini più piccoli, con minor numero di squame. — *Sard. a Torralba* (*Moris*).

3817 *Lapsana communis* γ *hirta Guss.* — *Cal. occ. al m. Ciagola nel territ. d'Ajeta* (*B. Longo*). — Esiste anche una var. B **hirta Ten.** (Syll. app. et emend. altera p. 625) che il Tenore così descrive: «pianta a fusto e fg. ovunque coperte di peli rigidi, annerente colla disseccazione (*M. di Castellamare di Stabia al pizzo del Belvedere*)». É poco probabile però (come osserva il Longo, in Annali di Bot. II, 1904, p. 183) che sia la stessa var. del Gussone, giacchè il Tenore non parla di peli glandulosi.

3820 *Aposeris foetida.* — *C. Ticino ai Denti della Vecchia* (*Chenev.*). — Il Rouy (Rev. de bot. syst. 1903), fa delle riserve sulla presenza in Cors. di questa specie, indicatavi dal Foucaud.

3823 *Hedypnois polymorpha* δ *tubaeformis* **for. glabra Lojac.**, Fl. sic. — Pianta glabra ovunque — *Sic. a Palermo, Marsala, Capaci ed Ustica* (*ex Lojac.*).

3826 (1) *Hypochaeris glabra* γ *arachnoides.* — Le indicazioni pel «*C. Ticino*» date dal Chenevard (Bull. herb. Boiss. 1902, p. 773) sono da radiarsi (cfr. Chenev. ibid. 1903, p. 439).

3831 (6) *H. Achyrophorus* **for. media Lojac.**, Fl. sic. (sub Seriola levigata) = Piptopogon glaucum Tod. exs. VII, 663. — *Sic. nei monti di Palermo* (*ex Lojac.*).

3835 (2) *Leontodon hirtus* (*L.*) *L.* (1759) = Crepis L. (1753).

3838 (5) *L. autumnalis.* — *Sic. a Busambra* (*hb. Tod. ex Lojac*). — Forse per equivoco (N. d. A.).

β *pratensis* **d. tenuisectus Nob.** = L. aut. v. alpinus f. tenuisectus Chenev. (1902). — Pianta come nella for. c., a scapo di 8-13 cm., con fg. pennatosette, a segmenti larghi 1-2 mm. — *C. Ticino in Val Piora* (*Chenev.*).

3839 (6) *L. Taraxaci* β *breviscapus.* — *Camp. anche al M. Settefrati e M. Maro* (*N. Terr.*).

3840 (7) *L. pyrenaicus* **for. hirtellus Arv. T.** — *C. Ticino in Val Blenio* (*R. Keller*).

3841 (8) *L. hispidus* α *typ.* **g. ramosus Goir.** (1904). — Scapo ramoso. — *Qua e là accidentalm.*

3843 * *L. crispo* × *incanus.* — *Tir. mer.* (*Kern. ex Focke*).

3844 * **L. tenuifloro × hastilis.** — *Lago di Como a Tremezzina* (*Christ*).

3844 ** **L. incano × tergestinus** = *L. subincanus Fiori* (Bull. Soc. Bot. it. 1905, p. 290) et **b. croceus Fiori** (l. c.). — *Carnia presso Tolmezzo* (*L. et M. Gortani*).

3845 * **L. Berinii × tergestinus** = L. tulmetinus (em. pro tulmentinus) Fiori (l. c.). — *Carnia presso Tolmezzo e sulle rive del Meduna presso Sequals; la var. presso Tolmezzo* (*L. et M. Gortani*).

3845 ** *L. Gortanii Fiori* (Bull. Soc. Bot. it. 1905, p. 293) = L. incanus γ anomalus b. Gortanii Fiori (cfr. Fl. An. III, p. 401). — Forse è un ibrido tra il *L. hispidus* ed i *L. incanus* o *Berinii*.

3846 (1) *Picris hieracioides* **var. Kelleriana (Arv. T.**, ap. Keller in Bull. herb. Boiss. 1903, p. 483). — Distinguesi dal tipo per essere pianta bassa, poco setolosa e ad infiorescenza raccorciata, per l'involucro non ristretto nel mezzo, glabro o quasi, per le ligule dei fi. giallo-chiare e senza strie violette sul dorso e per gli acheni debolm. rugosi per traverso. — *C. Ticino ad Olivone, Toira ed Aquila presso Brenno* (*R. Keller*).

3856 (3) *Tragopogon porrifolius* **for. pusillus N. Terr.** (1878). — Fusti gracili, alti 10-15 cm.; peduncoli non ingrossati in alto; involucro a 7 squame molto più lunghe dei fi. — *Camp. a Pennito presso Formia* (*N. Terr.*).

3857 (4) *T. crocifolius* β *nebrodensis.* — *Avellino a Salza* (*Trotter hb. f.*).

3858 (1) *Scorzonera laciniata* ζ *calcitrapifolia.* — *Sic. nella salina di Trapani* (*Lojac.*).

3867 *Taraxacum officinale* ζ *tenuifolium.* — *Comasco sul m. Baro* (*Ardissone*).

θ *minimum.* — Il Lojac. (Fl. sic.) ritiene la *Caramanica taraxacoides Tin.* come entità distinta, assegnandogli il nome di **T. Caramanicae Lojac.** e per habitat: *Sic. a Militello di Val di Noto a S. Barbara* (*Tin.*).

Digitized by Google

3867 * **T. Gasparrinii Tin. ex Lojac.**, Fl. sic. = T. corniculatum Strobl Fl. Aetn. — *Sic. sull'Etna e nel Val Demone* (*ex Lojac.*).

3872 (2) *Sonchus oleraceus* β *asper d. decipiens.* — Crediamo che sia da riferire a questa for. il *S. asper var. pinnatisectus Lojac.*, Fl. sic.

3874 (4) *S. arvensis* α *typ.* **for. major Neilr.** et **for. minor Neilr.** — *Ambedue nel Veronese* (*Goir.*) *ecc.*

γ glaucescens (Fl. An. III, p. 418 [β e]). — *Corsica presso Sagone* (*Burnat ex Briq.*).

3876 *Prenanthes purpurea.* — *Cors. a Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*) *e nella foresta di Aitone* (*C. Mars.*).

3877 (1) *Lactuca perennis* α *typ.* — *Lungo il Ticino in territ. di Abbiategrasso* (*Cozzi*).

b. cichoriifolia (DC.) — Fg. a lacinie ricurve. — *Veronese* (*Goir.*).

3884 (8) *L. muralis* **c. microcephala Goir.** — Capolini quasi il doppio più piccoli del tipo, in pannocchia ramosissima. — *Veron. nella Valpantena* (*Goir.*).

3886 (1) *Reichardia picroides* γ *intermedia* **for. gracilis Sch. Bip.** (sub Picridio). — *Sic.* (*ex Lojac.*).

3887 (2) *R. tingitana.* — *È indicata di Lipari* e la **var. subacaulis Wk.** (sub Picridio) *di Sic. a Mondello e Messina*, dal Lojac. (Fl. sic.), però egli dice tale pianta perenne e quindi dubitiamo si tratti di qualche var. di *R. picroides.*

3889 (1) *Andryala integrifolia* ε *dentata* **for. minuta** (**Lojac.**, Fl. sic.). — È una forma ridottissima della microflora mediterranea. — *Sic.* (*ex Lojac.*).

var. longipes E. Petit. — Fusto sublegnoso alla base, perennante, ramoso dalla base (3-4 dm.), a rami lungam. nudi in alto e *monocefali.* Fg. infer. picciolate, obovato-spatolate, poco dentate, indivise. Pianta tutta densam. ma brevem. stellato-pubescente, *poco* tomentosa. — *Cors. lungo il fiume Prunelli* (*E. Petit*).

3899 (7) *Crepis vesicaria* α *typ.* **d. integrifolia Goir.** (1904). — Fg. ovato-oblunghe, spatolate, quasi intere. — *Veron. nella Valdonega* (*Goir.*).

γ *taraxacifolia* **e. intybacea Koch** = Barkh. intyb. DC. — Fg. super. dilatato-orecchiute. Involucro glabro. — *Veron.* (*Goir.*).

3900 (8) *C. bursifolia* **for. lacinulosa Lojac.**, Fl. sic. — *Sic. in vari luoghi* (*ex Lojac.*).

3905 (13) *C. neglecta.* — *Sul lago di Como al m. Baro* (*Ardissone*). — Potrebbe essere invece *C. virens* (N. d. A.).

β *corymbosa.* — *Palermo nei pressi del Mezzagno* (*Lojac.*). — Si può ritenere come importata (N. d. A.)

3910 (18) *C. pulcra* **d. pumila Goir.** (1904). — Pianta di 15-20 cm., per lo più gregaria. — *Verona* (*Goir.*).

3919 (27) *C. conyzaefolia* **var. Degeniana Borb.** (**Borb.**) (Magyar bot. Lapok 1902, p. 85). — Differisce dalla for. genuina pel fusto più rigido, con setole giallognole, con sino a 20 capolini, per le fg. setolose e meno glandulose, ad orecchiette laciniate, pei capolini cinti da brattee lineari e per l'involucro giallognolo-biancheggiante (non nero-villosissimo). — *C. Ticino a Camoghè verso Isone* (*Degen ex Borb.*).

3924 (32) *C. aurea* β *Columnae c. hispidula.* — Qui deve riferirsi, sec. Bolzon (Bull. soc. bot. it. 1905, p. 442), la *C. alpestris* citata da Avetta e Casoni «*dell'Alpe di Rigoso nel Parmig.*».

Gen. Hieracium. Vedi: Zahn, in Hallier et Wolfarth, Koch's ed. III. — Käser, Beiträge zur Kenntnis der Hieracienflora der Schweiz. (Ber. Schweiz. Bot. Ges. 1903, p. 138-150).

3929 (4) *H. Pilosella* **var. calabrum N. Terr.** (1889). — *Cal. al l iano di Pollino* (*N. Terr.*).

var. subcaulescens, inalpestre, trichadenium, ermineum et **transalpinum N. et P.** — *Tutte nel C. Ticino* (*Chen. e Braun*).

var. stolonosissimum Arv. T. for. subcanescens Arv. T. — *Cors. nella foresta di Marmano* (*Rotgès ex Fouc.*).

var. velutinum Heg. et Heer. — *Sempione, Gr. S. Bernardo* (*ex Zahn*).

3929 * **H. poliocephalum = tardans × glaciale N. et P.** — *Sempione e Piem.* (*ex Zahn*).

Digitized by Google

3930 (5) *H. Hoppeanum.* — *Istria* (*ex Zahn, sub v. macranthum*).

β *stenolepis Belli* (1904). — Pare che sia la stessa cosa del *H. macranthum b. pollinense N. Terr.* (1889) indicato delle: *Alte Murge di M. Pollino.*

var. virentisquamum N. et P. — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

3930 * H. hypeurium N. et P. = H. Hoppeano × Pilosella. — *C. Ticino all'Alpe Cadonighino* (*Zahn ex Chenev.*).

var. lasiothrix et lamprocomum N. et P. — *Ambedue nel C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

3930 ** H. latisquamum = **Hoppeano × Auricula N. et P.** = H. spurium Bruegg. — *C. Ticino* (*Chenev.*).

3930 * H. lathraeum** = **Hoppeano × brachycomum N. et P.** — *Tir. al Brennero* (*ex Zahn*).

3932 (7) *H. Auricula* **var. subvittatum Arv. T.** — *Cors. nella valle della Restonica* (*Mand. e Fouc.*).

var. tricheilema N. et P. — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

3932 * H. xystolepium = **Peleteriano × Auricula N. et P.** — *Gr. S. Bernardo, Sempione* (*ex Zahn*).

3933 (8) *H. serpyllifolium.* — *Cors. ai M. Cinto e Rotondo* (*Briq.*) *e M. Renoso* (*Mand., Rotgès e Fouc.*).

3933 * H. Soleirolianum Arv. T. et Briq. (Ann. Conserv. et Jard. Genève, 1901, p. 108). — *Cors. tra il ponte della Restonica e la masseria Timozzo a 1200-1500 m.* (*Briq.*).

3933 ** H. Kralikii Rouy. — *Cors. ai m. Coscione, Renoso ed Incudine* (*Kralik ex Rouy*).

3936 * *H. niphobium N. et P.* **var. niphostribes N. et P.** et **capillatum N. et P.** — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

3937 (12) *H. glaciale* **var. subglaciale N. et P.** — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

3937 * H. densicapillum N. et P. = H. sabinum × glaciale N. et P. **var. orthorrizon N. et P.** — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

3937 ** H. pumilum Lap. — *Cors. al M. d'Oro* (*Soulié ex Coste*); *noto finora solo dei Pirenei.*

3938 (13) *H. corymbuliferum.* — *M. Cenisio al nord del Lago* (*Vignolo-Lutati in litt., determ. Belli*).

3939 (14) *H. Faurei.* — *C. Ticino a Camperio, val S. Maria* (*Chenev.*).

3940 * H. brachycomum = **furcato × Auricula N. et P.** — *C. Ticino* (*Chenev.*).

3941 * H. Chaberti = **alpicolo × Laggeri F. O. Wolf** (1894). — *Sempione a 2000 m.* (*F. O. Wolf*).

3942 (17) *H. cymosum* **var. meizocephalum N. et P.** — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun.*

3942 * H. sciadophorum = **cymoso × Auricula N. et P.** — *Trento, M. Baldo e Gr. S. Bernardo* (*ex Zahn*).

3942 ** H. cruentum = **cymoso × aurantiacum N. et P.** = H. multiflorum Schleich, Gaud. = H. sabinum β rubellum Koch. — *Gr. S. Bernardo, Sempione e Brennero* (*ex Zahn*).

for. Guthnickianum N. et P. = H. aurant. v. bicolor Koch — *Spluga, Trento* (*ex Zahn*).

3943 * H. tendinum N. et P. = H. sabino × Smithii Zahn = H. sabino × niphobium N. et P. — *Trent. al M. Bondone* (*Gelmi ex Zahn*) *ed Alpi Mar. al Col di Tenda* (*ex Zahn*).

3944 H. *florentinum* **var. cuneense N. et P.** — *Sempione, Lugano, M. Baldo* (*ex Zahn*).

var. lancifolium N. et P. — *Lugano, Tir. mer., Trento, M. Baldo* (*ex Zahn*).

var. Michelii N. et P. — *Tir. mer., Istria* (*ex Zahn*).

var. poliocladum N. et P. — *Tir. mer. sulla dolomite* (*ex Zahn*).

3944 * H. tephrodes = **florentino × tardans N. et P.** — *Sempione* (*ex Zahn*).

Digitized by Google

var. citrinum Zahn et Besse. — *Sempione* (*Besse*).

3944 ** **H. sulphureum Doell** = H. florentino × Auricula N. et P. **for. brevicaule N. et P.** — *Trento* (*ex Zahn*).

3944 *** **H. calodon Tausch** = H. florentino × echioides N. et P. = H. collinum v. dentatum Tausch = H. praealt. ε hirsutum Koch = H. mutabile v. hisutissimum F. Schultz. – *Istria a Pola* (*ex Zahn*).

3944 **** **H. sclerotrichum Arv. T.** = H. praealtum × cymosum Rouy. — *Corsica presso Ajaccio al castello Pozzo di Borgo a 600 m. e presso la cantoniera d'Aitone a 1000 m.* (*Burnat ex Briq.*).

3948 (23) *H. aurantiacum* **var. flammans N. et P.** — *C. Ticino all'Alpe Sevinera* (*Chen. e Braun*).

3948 * **H. stoloniflorum W. et K.** = H. aurantiaco × Pilosella Asch. — *M. Spluga, Bolzano* (*ex Zahn*).

3948 ** **H. substoloniflorum = aurantiaco × Hoppeanum N. et P.** — *Tir. a Paneveggio, M. Spluga* (*ex Zahn*).

3948 *** **H. pyrrhanthes = aurantiaco × Auricula N. et P.** — *Gr. S. Bernardo e Tir. al Brennero* (*ex Zahn*).

3948 **** **H. aurantellum = aurantiaco × glaciale N. et P.** — *Gr. S. Bernardo* (*ex Zahn*).

3948 ***** **H. fulgens = aurantiaco × furcatum N. et P.** — *Spluga* (*ex Zahn*).

3948 ****** **H. fuscum Vill.** = H. aurantiaco × Smithii = H. tiroliense A. Kern. — *M. Spluga* (*ex Zahn*).

for. atropurpureum N. et P. — *Tir. al Brennero ed in Fassa* (*ex Zahn*).

for. chrysanthes N. et P. — *M. Spluga e Brennero* (*ex Zahn*).

for. laxum N. et P. — *Sempione* (*ex Zahn*).

3948 ******* **H. Moritzianum Heg.** — *Tir. mer. al Seiseralpe* (*Sauter*).

3952 (27) *H. squalidum* = H. Cotteti v. subhumile Zanh. — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

3954 (29) *H. humile* **var. Pseudo-Cotteti Zahn.** — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

3954 * **H. Kaeserianum = humili × glaucum Zahn.** — *C. Ticino al passo di Campolungo* (*Correns*).

3954 ** **H. caerulaceum Arv. T.** = H. humili × Schmidtii Zahn. — *Italia mer.* (*ex Zahn*).

3954 *** **H. bernense Christen.** — *C. Ticino a Colla ed alpe di Fontanalba sopra Fusio* (*Chenev.*) *ed al passo di Campolungo* (*ex Zahn*).

for. filicaule Murr ex Zahn = H. humili × glabratum. — *Abruzzi alla Majella* (*ex Zahn*).

3955 (30) *H. Bocconei* = H. alpino × vulgatum Zahn, **for. glandulosissimum Zahn.** — *Sempione, Brennero* (*ex Zahn*).

var. Simia Huter. — *Sempione* (*ex Zahn*).

3955 * **H. Vollmannii = alpino × vulgat. × silvaticum Zahn.** — *Val di Breguzzo, Tir. mer.* (*ex Zahn*).

3956 (31) *H. alpinum* α *typ.* **for. melanocephalum Tausch.** *Brennero* (*ex Zahn*), *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*). — **for. pseudo-capnoides Zahn.** *Spluga.* — **for. intermedium Arv. T.** *Brennero, Trent. in Val di Ledro* (*ex Zahn*).

γ *Halleri* **for. uniflorum Gaud.** *Tir. mer.* — **for. milleglandulum Zahn.** *Sempione.* — **for. odontoglossum Arv. T.** *Tir. mer. a M. Bagolino, Brennero* (*ex Zahn*), *Gr. S. Bernardo, Sempione* (*ex Kaeser*).

var. pumilum (Hpe.) — *C. Ticino* (*Chenev.*).

var. stenophyllum Rota (1853). — Fg. radicali e cauline infer. lanceolato-allungate, inciso-dentate alla base. Squame invol. più lunghe. — *Bergam. al Lago Moro in Val Brembana* (*Rota*).

Digitized by Google

3956 * H. rhaeticum Rota (Prosp. Fl. prov. di Bergamo p. 101 [1853]). — *Rupi gneissine delle prealpi Brembane* (*Rota*).

3956 ** H. cochlearifolium Zahn = H. alpino × glanduliferum N. et P. = H. cochleare Kern. (non Huter). — *Sempione, Spluga, Brennero, Tir. mer.* (*ex Zahn*).

for. pseudo-alpinum (N. et P.). — *Sempione.*

for. Cimarollii Zahn. — *Tir. mer. sul M. Bagolino* (*ex Zahn*).

3956 * H. arolae Murr.** = H. alpino × silvat. × villosum Zahn. — *C. Ticino a Pianascio presso Fusio e Pizzo Padella* (*ex Zahn*).

3956 ** H. dolichaetum Arv. T.** = H. alpino × vulgatum Zahn. — *Valtellina a Rezzolungo presso Bormio* (*ex Zahn*).

3957 (32) *H. cochleare.* — *C. Ticino alla Bocchetta di Porcareccio* (*Chenev.*).

2957 * H. nigrescens W. = H. alpino × silvaticum Zahn **var. decipiens (Tausch) for. Pseudo-Halleri Zahn.** — *Brennero* (*ex Zahn*).

for. nigrescentiforme Zahn. — *Passo dello Spluga ed Alpe Martella e Tamona* (*ex Zahn*).

for. pseudo-rhaeticum Zahn. — *Sempione* (*ex Zahn*).

3960 (35) *H. neglectum.* — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

3961 (36) *H. pseudo-cerinthe* **var. corsicum Le Grand** (1890). — Differisce dal tipo per le glandule poco numerose, anche sui peduncoli. — *Cors. a Vizzavona lungo l'Arghione* (*Le Grand*).

3962 (37) *H. Berardianum.* — *Cors. al colle di Sorba sul versante di Vivario, al ponte della Restonica ed al M. Renoso* (*Briq.*), *M. Rotondo* (*Mand. e Fouc.*).

for. depressum Arv. T. — *C. Ticino* (*Chen. e Braun*).

var. petraeum (Hpe.). — *Tir. al Brennero, Ampezzo, Val Daone* (*ex Zahn.*).

var. subamplexicaule Arv. T. — *Trento* (*ex Zahn*), *Cors. nella foresta di Marmano* (*Rotgès ex Fouc.*).

3963 * H. cadinense Evers (1896) = H. amplexic. × porrifolium Zahn = H. amplexic. × saxatile Gelmi. — *Trento a m. Terlago, Cadine e Buco di Vela* (*Evers*), *Salorno e M. Baldo* (*ex Zahn*).

3963 ** H. auriculifolium Arv. T. et Briq. (Bull. Herb. Boiss. 1894, p. 626). — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

3964 (39) *H. pulmonarioides* **for. glaucescens Gremli.** — *C. Ticino.*

for. colognense (Murr) — *Tir. mer. nelle Giudicarie* (*Murr, Zahn*).

for. pygmaeum Arv. T. — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

for. subvulgatum Arv. T. — *Val di Cogne nell'alpe Chavanis* (*ex Zahn.*).

for. trichocalathium Zahn. — *Tir. mer. nelle Giudicarie in Val Bono* (*ex Zahn*).

3965 * H. Garidelianum Arv. T. et Gaut. (Hier. gall. n. 592 et 593) = H. pedemontanum v. inciso-dentatum Arv. T. = ? H. amplexic. × caesium Rouy. — *Alpi Mar. a M. Monnier alle gole di Cians* (*Ferrari e Valbusa*), *Corsica al M. d'Oro nel vallone dell'Anghione a 1200 m.* (*Burnat ex Briq.*).

3968 (43) *H. pseudo-picris.* — *C. Ticino nella cima del Cagnone a 1700 m., Alpe Starlarescio e val Pertusio* (*Chenev.*).

var. cinereum Arv. T. — *Gr. S. Bernardo, Spluga.*

var. fuscum Arv. T. — *Gr. S. Bernardo, Sempione.*

3971 (46) *H. ochroleucum* **var. subepilosum Zahn.** — *Gr. S. Bernardo.*

var. piliferum Griseb. = H. mycelioides Griseb. — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

3972 (47) *H. picroides.* — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

3972 * H. Christii = jurano × picroides Arv. T. — *Sempione* (*ex Zahn*).

3975 (50) *H. viscosum.* — *Cors. nella foresta di Marmano* (*Rotgès ex Fouc.*)

var. subhirsutum Arv. T. et Gaut. — *Cors. tra il ponte della Restonica e la masseria Timozzo a 1200-1500 m.* (*Briq.*).

3984 (59) *H. Jordani.* — *Val d'Aosta a Cogne* (*Vignolo-Lutati in litt., determ. Belli*).

Digitized by Google

3985 (60) *H. lanatum.* — *Appenn. di Reggio-emil. alla Pietra di Bismantova* (*Adr. Fiori*).

3985 * **H. pogonites = tomentoso × piliferum N. et P.** — *Val d'Aosta in Val di Cogne* (*ex Zahn*).

3986 (61) *H. Liottardi.* — *M. Cenisio presso il Crin* (*Vignolo-Lutati in litt., determ. Belli*).

4009 * **H. pulchellum Gr. et Godr.** = H. picto × tomentosum N. et P., **for. pleioscapum Zahn.** — *Val d'Aosta in Val di Cogne* (*ex Zahn*).

4013 (88) *H. villosum* **for. villosissimum Naeg.** — *Trento* (*ex Zahn*).

for. eurybasis N. et P. = for. elatius Fr. — *Tir. al Brennero* (*ex Zahn*).

for. undulifolium N. et P. — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

4015 (90) *H. dentatum* = H. sivatico × villosum N. et P. **for. aechmetes N. et P.** *Brennero* (*ex Zahn*). — **for. basifoliatum N. et P.** *M. Spluga e Brennero.* — **for. dentatiforme N. et P.** *Brennero.* — **for. hoettingense Murr.** *Brennero.* — **for. lonchites N. et P.** *Brennero.* — **for. marmoratum N. et P.** *M. Spluga.* — **for. prionodes N. et P.** *Tir. al Brennero.* — **for. pseudo-villosum N. et P.** *C. Ticino al M. Generoso.* — **for. tigrinum N. et P.** *Spluga e Brennero.* — **for. turritiforme N. et P.** *M. Spluga* (*cfr. Zahn*).

var. asterinum (Arv.-T. et Briq.) (Bull. Herb. Boiss. 1894, p. 622). — *C. Ticino all'Alpe di Fontanalba sopra Fusio* (*Chenev.*).

var. expallens (Fr.). *Reg. Illirica.* — **for. decorum N. et P.** *Spluga.* — **for. dentifolium N. et P.** *Spluga.* — **for. oblongifolium N. et P.** *Brennero* (*cfr. Zahn*).

var. misaucinum (N. et P.). — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

4015 * **H. Gremlii Arv. T.** — *C. Ticino in Val Bavona e Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

var. glabrescens Chenev. — *C. Ticino all'Alpe di Fontanalba sopra Fusio* (*Chenev.*).

4015 ** **H. Braunianum Zahn et Chen.** (1905). — *C. Ticino all'Alpe Robiei ed in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

4016 (91) *H. elongatum* **var. pseudo-elongatum (N. et P.).** — *Tir. mer. al Brennero e Trent. a M. Vasone* (*ex Zahn*).

4017 (92) *H. sixtinum.* — *C. Ticino a Colla sopra Fusio* (*Chenev.*).

4018 (93) *H. chloraefolium* **var. leoninum (N. et P.)** — *Sempione* (*ex Zahn*).

4019 * **H. subspeciosum N. et P. for. melanophaeum N. et P.** — *Brennero, Spluga e Sempione* (*ex Zahn*).

for. calcicolum N. et P. = H. plantagineum Arv. T. p. p. — *M. Spluga* (*ex Zahn*).

4019 ** **H. crinisquamum N. et P. for. megalocladum N. et P.** — *Brennero* (*ex Zahn*).

4022 (97) *H. scorzonerifolium* β *glabratum* **for. pseudo-flexuosum N. et P.** — *Sempione* (*ex Zahn*).

δ *divaricatum* = H. scorz. b. schizocladum Zahn. — *Reg. Illirica sul M. Nanos* (*ex Zahn*).

var. brutium N. Terr. (1889). — *Cal. al M. Pollino alla Traboccata* (*N. Terr.*).

var. macracladium N. et P. — *Sempione* (*ex Zahn*).

4023 (98) *H. piliferum* **for. multiglandulum N. et P.** — *C. Ticino all'Alpe di Nassa* (*Chen. e Braun*).

4026 (101) *H. glanduliferum* **for. hololeptum N. et P.** — *Alpi ven. ad Ampezzo* (*ex Zahn*).

for. vestitum et gracilentum Arv. T. — *Ambedue nel C. Ticino* (*Chen. e Braun*).

4028 (103) *H. leucochlorum.* — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

4029 (104) *H. armerioides* **for. phalacrophyllum N. et P.** et **for. crispulum N. et P.** — *Ambedue al Sempione* (*ex Zahn*).

4036 (111) *H. lasiophyllum* = H. cinerescens Jord. (non Gr. et Godr.) = H. elbanum Belli ap. Baroni. — *Cors. tra Vivario e Ghisoni alla punta di Muro* (*Briq.*).

4036 * **H. ilvanum Arv. T.** (ex Somm. in N. Giorn. bot. it. 1902, p. 330). — *Elba presso Marciana a S. Andrea* (*Somm.*).

4038 (113) *H. brunellaeforme* β **subrupicolum Arv. T.** — *Cors. ai M. Rotondo e Renoso a 1800 m.* (*Briq.*).

Digitized by Google

4039 * *H. graniticum* **var. pseudo-cyaneum Zahn.** — *Gr. S. Bernardo e C. Ticino a Fusio in Val Maggia* (*ex Zahn*).

4042 (117) *H. Naegelianum Pancic* = H. undulatum Boiss. (non W.) (Fl. An. III, p. 484) **var. andreae Reg. et Zahn** (1906) — Fusto sparso sino alla base di peli lunghi sino a 3 mm. Fg. sparsam. pelose al margine verso la base. Involucro coperto di peli bianchi, oscuri alla base, discretam. numerosi. — *Abr. alla Majella alla Rapina e Valle Andrea* (*Rigo ex Degen*).

4044 * **H. illyricum Fr.** — *Trent., Goriz. e Triestino* (*ex Zahn*).

for. crinopodum N. et P. — *M. Baldo, Trento, Gorizia* (*ex Zahn*).

subfor. trilacense (Murr). — *Presso Trento a Terlago* (*Murr*).

for. baldense N. et P. — *Tir. mer., M. Baldo, Valle dell'Isonzo* (*ex Zahn*).

for. saxatile (Jacq.) = H. porrifol. γ Froelichii Koch — *Valle dell'Isonzo* (*ex Zahn*).

4046 (121) *H. falcatum.* — *C. Ticino a Colla-Zaria sopra Fusio* (*Zahn ex Chenev.*).

4049 (124) *H. bupleuroides* **var. leviceps et scabriceps N. et P.** — *Ambedue nel C. Ticino* (*Chen. e Braun*).

4050 (125) *H. lucidum* **for. mucronatum Fr.** (1862). — *It. bor.* (*Link*).

4050 * **H. Garibaldianum Fr.** (1862). — *Nel regno Napoletano* (*Schlanbusch in hb. Petropolitano*).

4052 (127) *H. crinitum.* — *Cors. nella valle della Restonica ad 800-1200 m.* (*Briq.*).

4053 (128) *H. Virga-aurea* **var. Rotgesianum (Arv. T. et Gaut.).** — *Cors. nelle foreste di Casamente e Marmano* (*Rotgès ex Fouc.*).

4054 (129) *H. cirritum* **var. elisum Arv. T.** — *Gr. S. Bernardo, Tir. al Brennero, Trent. al Colle di Rolle e Cimon della Pala* (*ex Zahn*).

4054 * **H. Thomasianum Zahn.** — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chen. e Braun*).

4056 (131) *H. Longanum.* — *C. Ticino sopra Fusio e sopra Meride al M. S. Giorgio* (*Chenev.*).

4057 (132) *H. Trachselianum* **var. oxyodon (Fr.).** — *C. Ticino a Colla-Zaria* (*Zahn ex Chenev.*) *e Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

var. rhoeadifolium Kern. — *Tir. al Brennero* (*ex Zahn*).

4057 * **H. patulum N. et P. for. dolichocephalum N. et P.** = H. Jaborneggi Pach. — *M. Spluga* (*ex Zahn*).

4058 * **H. Dollineri Sch.-Bip.** = H. vulgato × glaucum F. Schultz, **a. sublevigatum G. Beck** = H. styrense Wiesb. hb. — *M. Baldo* (*ex Zahn*).

b. subpallescens G. Beck. — *Alpi ven. a Boita presso Ampezzo* (*ex Zahn*).

var. eriopodum (Kern.) = H. trachypodum Kern. — *Tir. a Bolzano e M. Roen* (*ex Zahn*).

for. gadense (Wiesb.) = H. apricorum Wiesb. — *Lago di Garda a Torbole* (*Murr ex Zahn*).

for. tridentinum (Evers) (1896) colle **subfor. celvae (Evers), lagarinum (Evers), oligocephalum Evers, rivulare Evers, rupestre Evers e pseudo-baldense Murr et Zahn.** — *Tutte nel Trentino* (Evers, Zahn l. c. p. 1816).

subfor. glaucescens Murr et Zahn. — *Tir. mer., Vigo di Fassa e M. Roen* (*ex Zahn*).

subfor. horrens Murr ex Zahn. — *Bolzano.*

4058 ** **H. ramosum W. et K. for. brennerianum Arv. T.** *Brennero.* — **for. argutidens Fr. ex Zahn.** *Reg. Illirica.* — **for. subramosum Arv. T.** *Tir. mer. a Vigo di Fassa* (*ex Zahn*).

4058 *** **H. carnosum Wiesb.** = H. vulgato × silvatico × glaucum Zahn **var. Pseudo-Dollineri Murr. et Zahn.** — *Friuli nella valle del Celline* (*ex Zahn*).

for. eriopodoides Zahn. — *Trento, Lavini di S. Marco e tra Nago e Torbole* (*ex Zahn*).

subfor. delicatulum (Arv. T.). — *Tir. mer. in Val di Non e presso Bressanone* (*ex Zahn*).

Digitized by Google

4058 ** H. tephropogon Zahn** = H. Dollineri × incisum Zahn = H. subincis. Arv. T. **for. pseudo-tridentinum Zahn.** — *Trento a M. Celva* (*Evers*).

for. subintermedium Zahn. — *Bellun. al M. Serva sopra Sevignano* (*ex Zahn*).

4058 *** H. ctenodon** = **vulgato** × **villosum N. et P.** — *Spluga, Bolzano* (*ex Zahn*).

4058 **** H. Ausserdorferi Hausm.** = H. vulgato × incisum Zahn **for. pseudo-senile Zahn** et **for. vulgatiflorum Zahn.** — *Ambedue al Brennero* (*ex Zahn*).

4060 (135) *H. incisum* **for. Gelmianum Sarnth.** (1894) = H. nivale Gelmi (non Froel.). *Brennero, M. Bondone di Trento.* — **for. humiliforme Murr ap. Zahn.** — *Brennero.* — **for. laceridens Murr ap. Zahn.** *Brennero.* — **for. macranthoides Zahn.** *Brennero.* — **for. muroriforme Zahn.** *Alpi* (cfr. Zahn). — **for. subincisum (Arv. T.).** *C. Ticino a S. Martino e Ciona* (*Chenev.*) *e Val Bavona* (*Chen. e Braun.*).

4064 (139) *H. atratum.* — *Tir. mer. al Brennero, Rittener Horn presso Bolzano e Sexten* (*ex Zahn*).

4065 ** H. Mureti Gremli = H. politum Christen. — *Valtellina a Bormio e Val Federia* (*ex Zahn*).

for. Ganderi (Hausm.). — *Tir., Val del Celline* (*ex Zahn*).

4065 * H. caesium Fr. = H. silvatico × glaucum Zahn. — *Sempione, Bernina, Goriziano* (*ex Zahn*).

var. Vaccarii Besse et Zahn. — *Val d'Aosta* (*Besse e Vacc.*).

4066 (141) *H. murorum* η *subcaesium* **for. psammogenes Zahn.** — *C. Ticino* (*Chenev.*).

for. pseudo-praecox Zahn (l. c., p. 1793). — *Alpi alla Bernina, Brennero, Trent. in Val di Ledro e Bellun. sul M. Serva* (*ex Zahn*).

θ *silvaticum* **for. atropaniculatum Zahn** (l. c., p. 1782). — *Sempione* (*ex Zahn*).

for. pleiotrichum Zahn (l. c., p. 1781). — *Tir. al Brennero ed Abruzzi* (*ex Zahn*).

var. cirritoides Zahn = H. Vernantianum Arv. T. et Briq. — *Val d'Aosta* (*Besse*).

var. crepidifolium Polaki. — *Val d'Aosta* (*Besse*).

var. crystallinum Arv. T. et Briq. (1901). — Fg. più o meno stellato-farinose di sotto, specialm. sulla nervatura dorsale. Stili gialli. Ligule a denti più o meno cigliolati. — *Cors. al M. Rotondo a 1500 m.* (*Briq.*).

var. flavescens Evers (1896). — *Trento a Scanuppia* (*Evers.*).

var. nervulosum (Arv. T. et Gremli) for. subpubens Arv. T. — *C. Ticino presso Olivone* (*R. Keller*).

var. subcaulescens Arv. T. — *C. Ticino a Brusino-Arsizio* (*Chenev.*).

var. subpraecox Arv. T. — *C. Ticino sotto Mergoscia* (*Chenev.*).

4066 * H. prediliense = **silvatico** × **porrifolium N. et P. for. pseudo-eriopodum Zahn** (l. c., p. 1787) = H. oxyodon Arv. T. hb. — *Trent. in Fassa e presso Riva* (*ex Zahn*).

for. crucimontis Zahn (l. c., p. 1788). — *Tra M. Croce e Sappada nel Friuli* (*ex Zahn*).

4066 ** H. Paicheanum Arv. T. ap. Briq. (1897) = H. (silvat. × piliferum) × villosum Zahn. — *Trent. tra il Col di Rolle ed il Cimon della Pala* (*Briq.*).

4066 * H. aphyllum N. et P.** = H. (pilifero × villosum) × silvaticum Zahn. — *C. Ticino al passo di Naret* (*Zahn ex Chenev.*).

4066 ** H. Wiesbaurianum Uechtr. var. pseudo-graniticum Besse et Zahn.** — *Val d'Aosta* (*Besse, L. Vacc.*).

4069 (144) *H. vulgatum* **var. subramosum Arv. T.** — *C. Ticino a Melide-Morcote* (*Chenev.*).

var. haematodes Vill. hb., Fr. for. maculatum Sm. — *Tir. mer., Trento* (*ex Zahn*).

4070 (145) *H. subalpinum.* — *Corsica presso Evisa al col del Salto a 1300 m.* (*Burnat ex Briq.*).

β *exilentum.* — *Cors. nella foresta di Vizzavona* (*Mand. e Fouc.*).

4070 * H. subtilissimum = **prenanthoidi** × **Schmidtii Zahn.** — *Gr. S. Bernardo* (*ex Zahn*).

Digitized by Google

4072 (147) *H. jurassicum* ζ *pseudo-juranum* **for. prenanthopsis Murr et Zahn.** — *Sempione* (*ex Zahn*).

4075 (150) *H. valdepilosum* = H. prenanthoidi × villosum F. Sch. — *Goriziano, Abruzzi* (*ex Zahn*).

var. kalsianum = H. elongato × mycelioides Zahn. — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

for. raphiolepium N. et P. — *Spluga* (*ex Zahn*).

4075 * H. subelongatum = valdepiloso × silvaticum N. et P. — *C. Ticino* (*Chenev.*).

4076 * H. Lemanianum Arv. T. v. ciliolatum Arv. T. — *C. Ticino in Val Blenio a Croce Portera a 1900 m.* (*R. Keller*).

4077 * H. mespilifolium Arv. T. — *Gr. S. Bernardo alle Combes* (*ex Zahn*).

4078 (153) *H. prenanthoides* **var. bupleurifolium (Tausch).** — *M. Spluga, Tione, Trento, Val di Ledro* (*ex Zahn*).

4078 * H. glaucocephalum N. et P. = H. prenanthoidi × glaucum Zahn — *Piemonte* (*ex Zahn*).

4078 ** H. salassorum = prenanthoidi × silvaticum Zahn et Besse. — *Val d'Aosta nella valle di Champdepraz sul serpentino* (*L. Vaccari*).

4078 * H. praetensum Arv. T. et Briq.** — *C. Ticino a Toira in Val Blenio* (*R. Keller*).

4082 (157) *H. lanceolatum.* — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

for. praeruptorum (Gr. et Godr.). — *Trent. a Gavanello presso Borgo di Valsugana* (*ex Zahn*).

for. strictissimum (Froel.) — *Sempione* (*ex Zahn*).

for. strictum (Fr.) = H. ephemeridifolium Arv. T. — *C. Ticino* (*ex Zahn*).

4084 (159) *H. umbellatum* **var. limonium Griseb.** — *Bolzano, Reg. Illirica?* (*ex Zahn*).

for. lactaris (Bert.). — *Goriziano a Tolmino, Trevig., Vicent., Mantov., Sarzana, Lucchese, Napoli e Pozzuoli* (*ex Bert.*), *Tir. mer., Friuli e Reg. Illirica sul M. Slavnik* (*ex Zahn*).

4084 * H. lejosoma = umbellato × porrifolium N. et P. = H. Calisii Evers. — *Presso Trento* (*Evers*), *Valle dell'Isonzo e Gorizia* (*ex Zahn*).

4089 (164) *H. boreale* ε *pseudo-boreale.* — *Tir. mer. a Bolzano, Friuli a Forni-Avoltri e Rigolato ed Istria* (*ex Zahn*).

for. maranzae Murr et Zahn. — *Trento al M. Maranza* (*ex Zahn*).

for. obscurum et fuliginosum Posp. — *Reg. Illirica* (*Posp.*).

var. subglaucescens Arv. T. — *Cors. a Caniccia presso Ghisoni* (*Rotgès ex Fouc.*).

4089 * H. lactescens Rouy (1905) α **insulare Rouy** = H. virosum Gr. et Godr. (non Pall.) = H. lactucaceum Fr. p. p. — *Cors. a Tavignano presso Corte* (*Bernard*).

4089 ** H. Notarisii Rchb. f. (1860). — *Colli di Genova* (*De Not.*).

4089 * H. trichodes Griseb.** in Rchb. f. — *Tir. mer. presso Merano* (*Bamberger*).

4091 (166) *H. australe.* — *Comune nella Carnia lungo gli argini dei torrenti, sui muri e luoghi ghiaiosi ad Udine, Tolmezzo ecc.* (*Gortani, determ. Belli*), *Pontebba, Valle dell'Isonzo, Gorizia e Carso* (*ex Zahn*).

4091 * H. sanctum N. et P. — *Goriz. al M. Santo e Valle dell'Isonzo a Tolmein* (*ex Zahn*).

4093 (168) *H. heterospermum* β **insulicolum Arv. T. et Briq.** (1901). — Pianta subglabra, notevole per l'involucro assai grande, rotondato-ovoideo, a squame larghe ed ottuse. Fg. ellittico-lanceolate, poco dentate o quasi intere, le cauline distanziate, poco numerose. — *Cors. presso il ponte della Restonica a 1000 m.* (*Briq.*).

4093 * H. racemosiforme = racemoso × porrifolium Zahn. — *Istria* (*ex Zahn*).

4093 ** H. Hellwegeri Murr et Zahn = H. racemoso × latifolium Zahn. — *Tir. mer. nel territ. di Bolzano* (*ex Zahn*).

4093 * H. lactucaceum Froel** (non Schrank). — *Italia* (*ex Froel in DC.*).

Digitized by Google

Aggiungiamo le seguenti entità, di cui non conosciamo la posizione sistematica:

H. alpigenum Evers (1896). — *Trento a m. Gaza* (*Evers*).

var. angustifolium Evers. — *Riva di Trento* (*Evers*).

H. Balbisianum Arv.-T. et Briq. (Nouv. not. flor. Alp. Léman. p. 92 [1899]). — *C. Ticino al M. Generoso* (*Chenev.*), *a Colla-Zaria* (*Zahn ex Chenev.*) *ed in Val Bavona* (*Chen. e Braun*).

H. coriifolioides Evers (1896). — *Trento a Calliano* (*Evers*).

H. Flahaultianum Arv. T. et Gaut. (Hier. gall. n. 935-942). — *Corsica al M. d'Oro* (*Gysperger ex Briq.*).

H. glauciforme N. et P. — *Trentino, M. Baldo.*

H. Knollense Evers (1896). — *Trent. a Trafoi* (*Evers*).

H. mixtum Rota (Prosp. Fl. prov. di Bergamo p. 101, 1853). — *Ghiaie lungo il Serio, il Brembo e la Galavesa* (*Rota*).

H. praealpinum Arv. T. — *C. Ticino in Val Blenio a Furca delle Donne a 1900 m.* (*R. Keller*).

H. praetenue Besse et Zahn. — *Val d'Aosta* (*L. Vacc. et Besse*).

H. roveretanum Evers (1896). — *Trent. a m. Brugino di Rovereto* (*Evers*).

H. tesinense Evers (1896). — *Trent. in Valsugana a Pieve di Tesino e M. Baldo presso S. Giacomo* (*Evers*).

H. trafoiense Evers (1896). — *Trent. a Trafoi* (*Evers*).

Sono poi da escludersi dalla nostra flora:

H. Cerinthoides L. — *Indicato di Corsica* (*Fries*).

H. stelligerum Froel. — *Indicato del Piem.* (*ex Arc.*).

H. Kochianum Jord. = H. Liottardi Koch (non Vill.). — *Indicato dubitativam. del Piem.* (*ex Arc.*).

ULTERIORI AGGIUNTE E CORREZIONI [1]

3 (2) *Notholaena vellea.* — *Basilicata a Fiumefreddo tra Sapri e Maratea sulle rupi calcaree* (*Lacaita in litt.*); *secondo quanto ci scrive lo stesso Lacaita questa pianta vive egualmente bene sulle rocce vulcaniche che sul calcare, egli la possiede di sette località d'Italia, Grecia e Spagna tutte di distretti calcarei.*

4 (1) *Polypodium vulgare* β *serratum b. pumilum Goir. et Tonini* (1875), *Hausm. in Luers.* (1884) (sub P. vulgare). (Cfr. Fl. An. A, p. 1).

12 (2) *Aspidium aculeatum* β *lobatum* **for. microlobum Milde.** — *C. Ticino in Val Bavona a S. Carlo* (*Chenev. e Braun*).

13 (1) *Nephrodium Thelypteris* **b. Rogaetzianum Bolle,** sub Aspidio. — Fg. fertili a segmenti dilatati, piani, coi sori ricoprenti solo una linea tra la nervatura mediana ed il margine. — *Veronese* (*Goir.*) *ecc.*

---

(1) Per comodità degli studiosi furono aggiunte nell'ultima parte dell'«Appendice» ed in queste «Ulteriori aggiunte» anche le scoperte più importanti dell'anno 1906, però tanto per questo anno quanto pel 1905 non si poterono compiere ricerche bibliografiche complete e quindi parecchie saranno le omissioni incorse.

Digitized by Google

15 (3) *N. Filix-mas e. glandulosum.* — *Cors. e Sard.* (*ex Asch. et Graebn. Syn. I, p. 28*).

17 (5) *N. rigidum α typ.* **c. nevadense** (**Boiss.**, sub Aspidio). — Pinnule soltanto pennato-lobate. — *Sardegna* (*ex Asch. et Graebn. l. c.*, p. 30).

d. pusillum Goir., sub Aspidio. — Pianta piccola, a fg. con lamina misurante 5-7 per 2-3 cm. — *M. Baldo presso le nevi fondenti* (*Goir.*).

20 (2) *Cystopteris fragilis α typ. for. stenoloba* (cfr. Fl. An. A, p. 4). — *M. Baldo a Costabella* (*Goir.*).

for. pumila Vis. et Sacc. (Cat., p. 11 [1869]); Goir. in N. Giorn. bot. it. 1882, p. 49 = Polypodium asplenioides Scop. (riferito come sinonimo di *Ceterach officinarum* dal Milde, ma evidentem. per errore, come può rilevarsi anche dalla fig. dello Scopoli) = Aspid. frag. γ Pollini = Cystopt. fragil. γ Bert. — Affine alla *for. dentata;* piccola (5-8 cm.), a segmenti larghi, gl' infer. pinnatifidi, i super. ovali, ottusi, dentati (ex Bert.). — *Veron. sul M. Baldo* (*Poll.*, *Goir.*) *e sui Lessini* (*Goir.*).

27 (7) *Asplenium Ruta-muraria* **a'. glandulosum Goir.** (1882). — Fg. come nella *for. Brunfelsii*, ma biancastre per peli glandulosi. — *M. Baldo alla Corona* (*Goir.*).

for. pulchellum Goir. (N. Giorn. bot. it. 1882, p. 39). — *M. Baldo alla Corona* (*Goir.*).

for. depauperatum Rosenstock. — *Tir. mer. fra Seis e Castelruth* (*Rosenstock ex Christ*), *Ven. nelle Prealpi Bellunesi al Passo di S. Uboldo* (*Pampanini, in N. Giorn. bot. it. 1906, p. 229, tav. II*).

30 (10) *A. viride c. incisi-crenatum* (cfr. Fl. An. A, p. 7). — *Veron. lungo la salita del Vò* (*Goir.*).

f. pusillum Goir. (1882). — Pianta piccola, a fg. lunghe 3 $^1/_2$-6 cm., a segmenti distintam. picciolettati, romboidali, irregolarm. crenati. — *M. Baldo a 2100-2200 m.* (*Goir.*).

31 (11) *A. Trichomanes* **h. alpestre Goir.** (App. bot. in cron. alp. p. 69 et in N. Giorn. bot. it. 1882, p. 37). – Pianta assai ridotta. — *Alti monti del Veron.* (*Goir.*).

i. dentatum Goir. et Tonini in Goir. (1882). — Fg. flaccide, prostrate, a segmenti romboidali, cuneati alla base, troncati all' apice, elegantem. e profondam. dentati, eccett. la base. — *Verona nel colle di S. Leonardo* (*Goir.*).

35 (1) *Scolopendrium vulgare* **h. minus** (**Fée**). — Fg. a lamina lunga 4-10 cm. e larga 9-25 mm. (Goir.). — *Veronese* (*Goir.*).

i. platyphyllum Goir. et Tonini in Goir. (1875). — Fg. a lamina lunga 40 cm. e larga 9-10 cm., contratta alla base, bruscam. acuminata all' apice, con lobi patentissimi alla base. — *Veron. ad Avesa* (*Goir.*).

41 (1) *Cheilanthes fragrans.* — *Piem. presso Civiasco in Val Sesia* (*Gola in litt.*).

42 (2) *Ch. Szovitsii* β **nudiuscula Hook.** — *È l' unica forma che riscontrasi in Italia nel Faentino al M. Mauro, mentre la stazione del M. Baldo è da radiarsi* (*cfr. Pampanini, in N. Giorn. bot. it. 1906*).

53 * (2) **Azolla filiculoides Lam.** = A. caroliniana Bég. in Fl. It. exs. n. 208; cfr. Béguinot e Traverso in Bull. Soc. bot. it. 1906, p. 143. — Differisce da *A. caroliniana* pei fusticini rilevati dall' acqua, talora eretti, con ramificazione per gemme laterali (non per falsa dicotomia), pel lobo super. delle fg. più largo (0,9-1,4, in luogo di 0,7-1,1 mm.), con orlo membrannceo molto largo (150-200, in luogo di 60-90 μ) e con peli unicellulari (non bicellulari), per la colorazione delle stesse fg. di un verde-chiaro quasi glauco (non verde-cupo), per avere radici laterali in tutti i punti di ramificazione del fusto, per i peli glochidiati delle massule delle microspore senza setti o con 2-3 setti solo in vicinanza dell' apice (non uniformemente 3-5-settati per tutta la lunghezza), infine per la parte inferiore dell' episporio dell' oospora con ispessimenti anuliformi quasi regolari (non irregolari, fitti, minuti e granuliformi). — *Nelle acque stagnanti dei fossi presso Chioggia ed a Padova* (*Béguinot*), *Polesine in diversi luoghi* (*De Bonis, Lorenzi*) *e Ferrarese a Mesola* (*Briosi e Farneti*); *originaria dell' America e di introduzione recente, giacchè non fu raccolta od avvertita prima del 1900, ma tendente ad espandersi rapidamente, come avvenne già in Francia* (*cfr. Beguinot e Traverso l. c.*).

Digitized by Google

59 (1) *Equisetum arvense for. alpestre* (cfr. A, p. 8). — *M. Baldo* (*Goir.*).

for. arenicolum Goir. (1882). — Rz. densam. coperto di peli rossastri. Fusti densam. cespugliosi, ramosi dalla base, arcuati, prostrati in cerchio. — *Verona al Pestrino lungo l'Adige* (*Goir.*).

for. varium (cfr. A, p. 8). — *Verona lungo l'Adige* (*Goir.*).

60 (2) *E. maximum* **d. comosum Milde.** — Fusti di 4-5 dm., sprovvisti di rami nella metà infer.; rami eretto-patenti. — *Veron. ad Avesa* (*Goir.*).

63 (5) *E. palustre* **d. arcuatum Milde.** — Fusto ramoso dalla base, piramidato. — *Veron.* (*Goir.*).

e. tenue Doell. — Fusto debole, eretto, nudo o quasi. — *M. Baldo* (*Goir.*).

64 (6) **E. arvensi × limosum Lasch** = E. litorale Kuehl. — E. inundatum Lasch = E. arvense × heleocharis Asch. — *C. Ticino a Foroglio in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

91 (2) *Abies excelsa. — Indicato erroneam. di Corsica al M. Renoso dal Briquet per scambio coll'A. alba* (*ex Briq. ipse*).

Gen. 33 *bis* **Callitris Vent.**

92 C. quadrivalvis Vent. (1808) = Thuya articulata Vahl (1791). — *Scoperta a Malta a Makluba presso Ueb Babu* (*Caruano-Gatto*). [*Afr. bor. Spa. presso Cartagena*]. (Cfr. Sommier in Bull. Soc. bot. it. 1906, p. 115).

135 (8) *Panicum Crus-Galli* **c. oryzoides (Ard.,** 1764) = P. stagninum Retz.? (1789), Host (1805) = P. Hostii M. B. (1819) = Echinochloa commutata Schult (1824). — Pannocchia poco o punto ramificata. Spgtt. più grosse. — *Qua e là nell'area del tipo.*

147 (4) *Phalaris caerulescens* **b. ovata Asch. et Graebn.** = for. b. Parl. — Pannocchia ovata. — *Colla specie.*

c. villosula (DNtrs. in Parl.). — Glume pelose. — *Presso Genova* (*De Notaris*).

170 (5) *Milium multiflorum* β **Thomasii (Duby)** = Piptatherum Kth. = Oryzopsis miliacea β Thomasii Richter (1890), Asch. et Graebn. (1898). — Pianta più robusta, a pannocchia più lunga, con 20-50 rami per ogni verticillo; rami nei verticilli infer. d'ordinario sterili e formanti una specie d'involucro. — *Costa occ. della Pen., Sic. e Cors.* (*ex Parl. Fl. it. I, p. 160*).

181 (8) *Phleum Boehmeri* **b. blepharodes Asch. et Graebn.** = Ph. serrulatum Lev. et Somm. (non Boiss. et Heldr.). — Glume manifestam. cigliate. — *Golfo di Spezia al M. Brausi e presso Lucca* (*Levier e Somm., ex Asch. et Graebn. Syn. II 1, p. 150*).

202 (6) *Agrostis alba* δ *vulgaris* **for. flavescens Parl.** (Fl. it. I, p. 184, sine descr.). — *M. Bianco* (*Parl.*).

for. vivipara Rchb. (1834), Parl. (1848) = A. silvatica Pollich. — Spgtt. vivipare. — *Lig. or. alle Giarre* (*Bert.*).

205 (3) *Calamagrostis Halleriana* **for. mutica Koch** = C. villosa f. mutica Torges. — *C. Ticino in Val Calneggia* (*Natoli in Chenev. e Braun*).

for. hypathera Torges, sub C. villosa. — *C. Ticino in Val Bavona e Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

for. nutans (Sauter) = C. villosa var. hypacrathera Torges. — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

206 (4) *C. Epigejos.* — Si aggiunga nella descriz. « Rami della pannocchia lungam. nudi alla base ».

224 (1) *Corynephorus canescens* **b. minimus Parl.** (Fl. it. I, p. 248). — Culmo nano, di 2-3 cm., portante 1-2 spgtt. — *Ad Ajaccio in Corsica* (*Req.*).

235 (7) *Trisetum flavescens* α *typ.* **b. depauperatum Uechtritz** = Avena flav. v. depaup. M. et K. — Pannocchia povera, stretta e lassa, con rami portanti 1-2 spgtt. — *Ferrara* (*Revedin!*).

295 (1) *Poa alpina* α *typ.* **for. glaucescens Beck.** — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

Digitized by Google

ε *exigua* (*Fouc. et Mand.*, 1899) (non Dum., nec Hook. f.) (cfr. A, p. 23) = P. Foucaudii Hack. in Briq. (1905).

299 (5) *P. violacea* β *breunia*. — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

300 (6) *P. nemoralis* α *typ.* **for. glaucantha** (**Gaud.**). — *Corsica presso Vizzavona* (*Burnat ex Briq.*).

γ *capitata b. depauperata Nob.* = P. nemor. γ Balbisii b. depauperata Fiori in Fl. An. I, p. 87.

306 (12) *P. trivialis* β *silvicola*. — *Corsica presso Ajaccio ed a Vizzavona* (*Burnat ex Briq.*).

307 (1) *Glyceria fluitans* β *plicata* **for. minor Lang.** — *C. Ticino in Val Bavona e Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

310 (1) *Festuca ovina* ξ *Halleri* **for. intermedia Stebl. et Schr.** — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

311 (2) *F. rubra* ζ *violacea* **for. macrathera Hack.** — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

326 (5) *Vulpia myurus* α *typ.* **c. pubescens Somm.**, sub Festuca (1902). — Glume glabre o quasi, glumtt. infer. densam. pubescente-irta. — *Isola di Montecristo* (*Somm.*).

β *dertonensis c. panormitana* (sciuroides b. panorm. Fl. An. I, p. 95). — Sec. Sommier (N. Giorn. bot. it. 1902, p. 337) differisce dalla for. seg. (*pubescens*) per la pannocchia allungata e pel portamento della *V. myurus* tipica. — *Sicilia*.

d. pubescens Nob. = V. myur. v. sciur. f. pubesc. Bég. ex Somm. (1902) = Fest. myur. v. bromoides f. pubesc. Somm. (1902). — Glume e glumtt. infer. pubescenti-irte. — *Isola di Gorgona* (*Somm.*), *isole Ponziane* (*Bég.*).

e. Broteri Nob. = V. myur. β sciur. c. Broteri Fl. An. I, p. 95.

329 (1) *Nardurus maritimus Nob.* = Festuca L. (1753) = N. unilateralis in Fl. An. I, p. 96.

a. hispanicus Nob. = Triticum Reich. (1797), non Viv. = Festuca tenuiflora Schrad. (1806) = N. tenuiflorus Boiss. (Fl. An. I, p. 95 [for. c.]).

b. biuncialis Nob. = Triticum Vill. (1787) (Fl. An. l. c. [for. b.]).

c. unilateralis (*Boiss.* [1845], *Fr.* [1857-58]) (Fl. An. l. c. [for. a]) = Triticum L.?, DC.

338 (5) *Sclerochloa rigida* α *typ.* **c. glaucescens Guss.** = S. Zwierleinii Lojac. — Pianta bassa (5-8 cm.), glauca, a fg. strette e pannocchia contratta, spiciforme, con brevi rami. — *Nei luoghi aridi*.

d. patens (**Presl**) = var. umbrosa Bal. exs. — Pianta di 3 dm. o più, verde-chiara, a fg. larghe e flaccide e pannocchia lassa, slargata, piramidale. — *Nei luoghi ombrosi*.

e. robusta Nob. = Scleropoa rig. β rob. Duv.-Jouv. (1876). — Pianta alla fine per lo più rosso-porporina, a fusti più grossi e pannocchia con rami allontanati, con spgtt. verdi, strettam. appressate. — *Istria nell'isola Sansego* (*Marches.*).

341 (3) *Bromus erectus* α *typ.* — *Corsica tra Ajaccio ed il Castello della Punta* (*Burnat ex Briq.*).

ε *condensatus* **b. microtrichus Borb.** (1901) = B. erectus v. microtr. Borb. (1844). — Guaine basali grosse, pubescenti per brevi peli. — *Istria e Litorale* (*Posp.*).

348 (10) *B. hordeaceus* α *mollis* **for. microstachys Duv.-Jouve**, sub B. mollis. — *Corsica tra Ajaccio e Mezzavia* (*Burnat ex Briq.*).

355 (3) *Brachypodium pinnatum* α *typ. f. rupestre* (cfr. A, p. 31). — *Corsica al M. d'Oro a 1200 m.* (*Burnat ex Briq.*).

357 *Psilurus aristatus* **b. erythrostachys Asch. et Graebn.** = P. nard. b. erythr. Goir. — Spighe rosse. — *Verona* (*Goir.*).

362 (3) *Lolium perenne* γ *multiflorum b. muticum DC.* = L. italicum b. mutic. Parl. (Fl. An. I, p. 104), — *d. ramosum Nob.* = L. italic. b. ramos. Cocc. (Fl. An. l. c.).

363 (1) *Agropyrum caninum* α *typ.* **b. majus Baumg.?** (1816), **Parl.!** (1848) = Trit. caninum Nocc. et Balb., Guss. p. p. = Trit. can. B. majus Asch. et Graebn.? — Spgtt. a 5-7 fi., a glume per lo più 5-nervie. Fg. scabre in ambedue le pag. o solo supe-

Digitized by Google

riorm. ed al margine. — *Presso Pavia ed in Sic. nei boschi di Caronia e Mistretta e nelle Madonie* (*ex Parl.*).

c. **subtriflorum Parl.** = Trit. can. v. subtrifl. Asch. et Graebn. — Spgtt. per lo più a 3 fi., colle reste uguali o più lunghe della rispettiva glumtt. — *A preferenza nell'Appenn.* (*Parl.*).

398 (10) *Cyperus glaber.* — *Piem. lungo il Tanaro tra Mussotto ed Alba* (*Vignolo-Lutati in litt.*); *indicato vagamente del Piem. e Novarese* (*All. Biroli*).

420 (12) *Scirpus setaceus* β *cernuus* c. **campanus Nob.** = S. nervosus Boeck. v. camp. A. Terr. (Malpighia II, p. 422 [1888]). — Acheni minutissimam. punteggiati sotto la lente, quasi lisci. — *Litorale del Lazio e Camp.* (*ex A. Terr.*) *e probabilm. altrove.*

428 (3) *Heleocharis palustris* δ *multicaulis* d. **Mariana A. Terr.** (Malpighia II [1888], p. 309). — *Laz. al Lago di Paola* (*A. Terr.*).

460 (18) *Carex muricata* α *typ. b. Pairaei* (cfr. A, p. 35). — *Corsica presso Sagone* (*Burnat ex Briq.*).

465 (23) *C. elongata.* — *Corsica nei castagneti presso Calcatoggio a 330 m. e presso Appietto a 500 m.* (*Burnat ex Briq.*).

492 (50) *C. atrofusca Schk.* (1801) = C. ustulata Whlnb. (1803) (Fl. An. I, p. 137).

503 (61) *C. silvatica* β **Tommasinii Rchb.** = C. laxula Tin. in Boott. — Pianta verde-glauca. Spgt. femm. erette, lunghe 4 cm. o meno, assai lasse. Otricelli frutt. bruscam. ristretti in rostro assai sottile. — *Probabilm. nell'It. mer. e Sic.*

529 (2) *Arum maculatum* β **cylindraceum (Gasp.,** 1844) = A. alpinum Schott (1851); cfr. E. Paglia in Malp. 1905, p. 395. — Spadice superiorm. lineare-cilindrico. — *Abr. al M. dei Fiori e Molise* (*cfr. Paglia, l. c.*), *Cal. al M. Pollino* (*N. Terr.*) *e Sic. alle Madonie al Piano della Battaglia di Petralia* (*Gasp.*).

551 (9) *Potamogeton densa* α *typ. b. stipulata Arc.* — *Lago di Avigliana in Piem.* — Sec. Asch. e Graebn. (Syn. I, p. 355) potrebbe essere invece il *P. perfoliata v. pseudo-densa Asch.* et *Graebn.*

587 (8) *Juncus articulatus* α *lamprocarpus* g. **virens Goir.** (1886) = J. lampr. v. virescens Asch. et Graebn. (1904). — Fusti flaccidi, sdraiati. Antela allungata, con glomeruli a pochi fi. Tepali e cassule verdi. — *Col tipo qua e là.*

h. **oligocephalus Goir.** (1886). — Antela ridotta ad 1-2 glomeruli, uno sessile ed uno peduncolato (an *J. olympicus Schott?*). — *Col tipo.*

i. **alpicola Goir.** (1886), **Asch.** et **Graebn.** (1904). — Pianta bassa, ad antela semplice o quasi, eretta, contratta, a glomeruli poveri e con fi. più piccoli, brunastri. — *Luoghi elevati alpini.*

j. **viviparus Gaud.** = v. prolifer Parl. — Antele sostituite da gemme fogliacee. È un cecidio prodotto dalla *Livia juncorum.*

β *acutiflorus b. pallescens Nob.* = J. silvat. c. pallesc. Parl. — Nella Fl. Anal. vol. I, p. 167 fu erroneamente scritto *pallens.*

c. **multiflorus Weihe** (1822) = J. brevirostris Nees (1822) = J. silvat. b. major Parl. (1852). — Capolini meno numerosi, del diam. di 6-8 mm. e con 8-20 fi. più grandi. Cassula spesso ottusam. rostrata, uguale al perigonio. — *Più comune del tipo* (*Parl.*).

β' **Gussonii (Parl.)** = J. acutiflorus Guss. = J. silvaticus Parl. — Distinto dal tipo pei tepali interni un po' più lunghi degli esterni, pei fi. più grandi (lunghi colle capsule sino a $5\,^1/_2$ mm.), per le antere grandi, un po' più lunghe dei filamenti e per le capsule lungam. attenuate all'apice. Varia pei capolini più densi con sino a 12 fi. con capsule più brevi (*b. Gussoneanus* [*Tod.*] = J. acutiflorus b. Guss. = J. Castellii Tin.?) — *In Sicilia e probabilm. in Sardegna.*

δ *striatus* b. **pauciflorus Tin. ex Parl.** = J. nebrodensis Tod. exs. — Capolini a pochi fi. — *Sic. sulle Madonie* (*Tineo*).

c. **prolifer Parl.** — Tepali trasformati in fg. — *Sic. presso Lercara* (*Sorrentino*).

594 (15) *J. trifidus* β *monanthos* (*Jacq.*, 1762) = J. Hostii Tausch (1834) (Fl. An. I, p. 168 [var. β]).

Digitized by Google

601 (22) *J. bufonius* α *typ.* **d. subcongestus Goir.** (1886). — Antela a raggi più brevi, contratta. Fusti densam. cespugliosi e più robusti. — *Nei luoghi pingui del piano.*

e. exaltatus Tausch exs. ex Goir. (1886) = v. giganteus Asch. et Graebn. (1904). — Pianta di 4-5 dm., con antela grande, lunga 20 cm. o più, a fi. allontanati, solitari o raram. appaiati ed in tal caso uno sessile e l'altro peduncolato. — *Col tipo qua e là.*

f. alpinus Goir. (1886) (an Schur?, 1866). — Pianta spesso di 2-3 cm., cespugliosa, a fusti rigidi e fg. sottilissime. Fi. avvicinati. Cassule piccole, nerastre, subeguali ai tepali. — *M. Baldo* (*Goir.*).

g. proliferus Goir. (1886) = v. viviparus Asch. et Graebn. (1904). — Fi. in parte convertiti in gemme fiorifere. — *Veronese, rarissimo* (*Goir.*).

602 (23) *J. Tenageja.* — A questa spec. è da riferirsi sec. Buchenau (cfr. Engler, Pflanzenreich IV-36, p. 109) il *J. ambiguus Guss.*, da noi posto tra i sinonimi di *J. bufon.* γ *hybridus* (cfr. Vol. I, p. 169).

603 (1) *Luzula pilosa* β *Forsteri* **b. pallida Rota in Parl.** — Fi. giallo-pallidi. — *Presso Bergamo* (*Rota*), *Veronese raram* (*Goir.*).

c. atrifusca Asch. et Graebn. — Fi. scuri, quasi neri. — *Italia* (*ex Asch. et Graebn.*).

607 (5) *L. silvatica* α *typ.* **b. glabrescens Goir.** (1886) (sub L. maxima). — Spesso a fusto più basso ed antela abbreviata. Fg. quasi interam. glabre. Fi. pallidi. — *Veron. nel M. Baldo e nei Lessini* (*Goir.*).

β *Sieberi b. sicula.* — *Veron. nei Lessini* (*Goir.*).

γ **conglobata Goir.** (1886) (sub L. maxima) = L. silvat. v. congesta Bouvier. — Pianta di 4 dm., a fg. lunghe 10-12 cm. e larghe 2-4 mm., lungam. cigliate. Antela contratta quasi come nella *L. campestris v. congesta*, a raggi lunghi 3-12 mm., terminati da capolini di 2-7 fi. — *M. Baldo ai Lavaci* (*Goir.*).

608 (6) *L. nivea* α *typ.* **c. Toniniana (Goir., 1886).** — Fusti di 3-4 dm. Fg. lunghe 15-20 cm. o più, lungam. cigliate e con peli lunghissimi alla fauce delle guaine. Antela contratta, assai più breve delle fg. involucranti. Tepali bianchissimi, subeguali, lunghi 3-4 mm. Antere più lunghe dei filamenti. — *Veron. sul M. Tondo sopra la Bocca d'Alcenago* (*Goir.*).

610 (8) *L. spicata c. compacta E. Mey.* (1823) = L. glomerata Mielich. (1839) = L. spic. β conglomerata Koch (1844) (Fl. An. A, p. 44).

d. laxa R. et S. (1829) = v. vaginata Rchb. (1847) = v. subpediformis Schur (1866). — Pianta più robusta (2-4 dm.). Antela racemosa, sopradecomposta, piramidata, suberetta. — *M. Baldo* (*Goir.*).

613 (1) *Tofieldia calyculata* α *collina* = α typ. Fl. An. I, p. 176 = γ collina Fl. An. A, p. 44 = var. α spicaeformis Ambrosi.

β **capitata Rchb.** = T. palustris γ capitata Hpe. (1821). — Spiga densa, globosa o quasi (lunga 1 cm. o meno). Pianta più gracile ed a fg. più strette, nei luoghi alpini (*b. glacialis* [*Gaud.*, 1828]; Fl. An. I, p. 176 [var. β] = var. pygmaea Ambrosi) assai piccola (5-10 cm.) col portam. della *T. palustris.* — *Nelle Alpi; la for. b. nella zona alpina.*

620 (4) *Colchicum autumnale* α *typ.* **b. longiflorum Goir.** (1885). — Tepali lunghi 40-52 mm. e larghi 7-9 mm., lanceolati, ottusetti o subacuminati. — *Verona* (*Goir.*).

c. albiflorum Nob. = var. γ Goir. (1885). — Fi. bianco. — *Sul Garda a Lazise* (*Fontana*).

d. tenuifolium Goir. (1904). – Fg. strettam. lineari. — *Veronese* (*Goir.*).

623 *Erythronium Dens-canis* **b. longifolium (Mill., Sweet).** — Fg. più lunghe bislungo-lanceolate. — *Col tipo nel Veronese* (*Goir.*) *ecc.*

c. decoloratum Nob. — Perigonio bianco o porporino-chiaro. — *Col tipo qua e là; Veron.* (*Goir.*).

637 (3) *Lilium Martagon* α *typ.* **b. albiflorum Goir.** (1884) = var. γ Pollini. — Perigonio bianco. — *Veronese sui Lessini* (*Poll.*).

647 * (7 *bis*) *Gagea foliosa b. chrysantha* (cfr. Fl. An. I, p. 185, sub G. arven. var. γ b).

Digitized by Google

665 (6) *Scilla bifolia* **c. albiflora Nob.** = var. β Pollini, Goir. — *Veron. nei M. Lessini* (*Seguier*) *e M. Baldo* (*Goir.*).

d. pleniflora Nob. = var. γ Goir. (1884). — Perigonio doppio. — *Veron. nel M. Baldo in Ime e nei Lessini presso i Trachi* (*Goir.*).

675 (1) *Muscari moschatum* β *flavum Sims* (1813) = Hyacinthus Muscari β Lam. (1789).

685 (3) *Allium Ampeloprasum* γ *commutatum* (*Guss.*) = A. rotundum Guss. = A. rubellum Presl? (non M. B.) = A. Preslianum Schult. f.? = A. rotundum δ Preslianum Fiori in Fl. An. I, p. 196. — Secondo Sommier va meglio riferito ad *A. Ampeloprasum*, dal quale differisce per la spata più lungam. cuspidata, per l'ombrella quasi globosa (non ovata), per gli stami e per la cassula più lungam. sporgenti e pel bulbo meno prolifero. — *Anche a Lampedusa.*

δ **hemisphaericum Somm.** (ined.). — Differisce dalla *var. commutatum* per l'ombrella meno densa, a peduncoli tutti eretti, ascendenti od orizzontali e quindi emisferica e per le cassule più piccole. — *Isola di Lampedusa* (*Somm.*).

689 (7) *A. sphaerocephalum* α *typ.* **b. viridi-purpureum Parl.** — Fi. esterni verdognoli, gl'interni porporini. — *Ascoli* (*Parl.*).

c. laxiflorum Guss. — Fi. roseo-pallidi, un po' lassi. — *Col tipo.*

β *arvense* = var. β Goir. — *Veron. presso Lazize* (*Fontana*).

690 (8) *A. margaritaceum* **c. Tenorei Parl.** = A. lineare Ten. (non L.). — Fi. interni porporini. — *Sannio, Abruzzi e Cal. alla Sila* (*ex Ten.*).

691 (9) *A. carinatum* ζ *cirrosum* (= A. pulchellum Don) **d. comosum Goir.** (1884) (sub A. pulchell.). — Ombrella a molti fi., di cui i centrali fertili e con peduncoli eretti, strettam. avvicinati dopo l'antesi, i periferici sterili e con peduncoli ricurvi in basso o riflessi. — *Veron. col tipo* (*Goir.*).

e. effusum Goir. (1884) (sub A. pulchell.). — Ombrella a molti fi. fertili e sterili frammisti ed a peduncoli ricurvi in fuori in ogni senso. — *Colla for. prec.* (*Goir.*).

f. pauciflorum Goir. (1884) (sub A, pulchell.). — Ombrella a pochi fi. — *Colle due for. prec.* (*Goir.*).

h. valdensium (cfr. Fl. An. A, p. 49) = A. pulchell. ε pallescens Goir. (ex ipso). — Bulbo piccolo, allungato. Fusti delicati (2-3 dm.), fogliosi solo nel terzo infer. Fg. tenui, larghe 1 mm. circa. Spata assai stretta, lunga il doppio dell'ombrella. Peduncoli sottili, lunghi circa 6 volte i fi. Tepali bislunghi, lunghi circa 5 mm., ottusi, di un bel roseo. — *Anche sul M. Baldo nei pascoli di Novezina e Noveza* (*Goir.*).

703 (21) *A. angulosum* α *acutangulum* **b. albiflorum Parl.** = A. angulos. β Pollini. — Fi. bianchi. — *Veronese* (*Poll.*, *Goir.*).

β *montanum* **b. niveum Nob.** = A. fallax β Goir. — Fi. bianco-nivei. — *Veron. lungo le rive del Garda* (*Goir.*).

708 (26) *A. subhirsutum.* — Secondo Palanza questa spec. fiorirebbe in Terra di Bari dall'*Apr. al Maggio*, ed invece la *var. trifoliatum* dal *Marzo all'Aprile*, quest'ultimo si distinguerebbe dal tipo anche per l'ombrella *fastigiata* e *non patente.*

α *typ.* **b. glaberrimum Moris et DNtrs.** — Fg. affatto glabre. — *Isola di Capraia* (*Moris et DNtrs.*).

722 (1) *Anthericum ramosum* **c. humile Goir.** (1884). — Pianta alpina, bassa, a pannocchia povera, quasi racemosa. - *M. Baldo a 1200-1400 m.* (*Goir.*).

728 *Convallaria majalis* **b. stenophylla Goir.** (1885). - Fg. più strette (14 per 2 cm.). — *Veron. nel M. Pastello* (*Goir.*).

736 (3) *Asparagus acutifolius c. commutatus* (cfr. Fl. An. A, p. 49). — Cladodi lunghi 4-12 cm. (ex Goir.), ora più grossi ed ora (**subfor. ambiguus** [**DNtrs.**]) più gracili, quasi capillari. — *Tanto il tipo quanto la subfor. nel Veron.* (*Goir.*).

740 (1) *Ruscus aculeatus* **d. loricatus Goir.** (1885). — Cladodi ovato-lanceolati, acuminati, assai contorti, piegati su loro stessi lungo il nervo mediano. — *Col tipo, ma raro.*

e. microclados Goir. (1885). — Cladodi ovati come nel tipo, ma più piccoli (6-15 per 3-7 mm.). — *Col tipo.*

Digitized by Google

f. macroclados Goir. (1885). — Rami allungati, a cladodi distanti, strettam. lanceolati (18-37 per 3-9 mm.). — *Veronese verso la Valpantena, rarissimo* (*Goir.*).

g. minutissimus Goir. (1885). — Pianta alta 13-17 cm., ramosissima, a rami affastellati, con cladodi piccolissimi, densam. avvicinati. — *Veron. nel Bosco Mantico, nel Vaio di Quinzano ecc.* (*Goir.*).

744 *Galanthus nivalis b. majus* (cfr. Fl. An. A, p. 50). — *Veronese nei luoghi più soleggiati* (*Goir.*).

c. minor Goir. (1884). — Pianta nana, alta 8-12 cm. — *Veron. nei luoghi secchi ed aridi* (*Goir.*).

var. reflexus (Herbert). — Il Richter (Pl. eur. I, p. 234) gli attribuisce per habitat «Mons Garganus», ma l'Herbert (Bot. Reg. 1845, misc. p. 35, n. 44) dice di averlo avuto dal Lauder del «M. Gargarus», se non si tratta di errore tipografico, sarebbe quindi un monte dell'Asia Minore.

745 (1) *Leucojum aestivum α typ.* **b. uniflorum Goir.** (1884). — Scapo 1-floro. — *Col tipo.*

746 (2) *L. vernum* **b. dianthum Goir.** (1884) (sub Erinosma) = L. vern. B biscapum Asch. et Graebn. (1906). — Bulbi con due scapi fioriferi. — *Veronese* (*Goir.*).

757 (6) *N. poëticus β angustifolius* (*Curt.*, 1792) = N. radiiflorus Salisb. (1796) (Fl. An. I, p. 217 [var. β]).

760 (2) *Pancratium illyricum.* — Si tolga dall'habitat di questa pianta l'isola di Gorgona (cfr. Sommier in N. Giorn. bot. it. 1902, p. 337).

762 (1) *Crocus biflorus d. argenteus* (Fl. An. A, p. 50). — Distinguesi dal tipo per il perigonio violaceo.

e. estriatus Tchihatch. (1860) = C. annulatus var. estriatus Herb. (1841). — Perigonio senza strie di colore più carico. — *Nell'area della spec.*

764 (3) *C. vernus* (*L.*) *All.* (1770-73), *Wulf.* (1778) = C. sativus β vernus L. (1753).

α typ. **g. dianthus Goir.** (1883). — Bulbi portanti 2 scapi. — *Col tipo.*

h. prolifer Goir. (1883). — Bulbo munito alla base di un bulbillo fiorifero. — *Veron. nei monti Lessini* (*Goir.*).

i. controversus Goir. (1883). — Stami uguaglianti le lacinie del perigonio. — *Cime più elevate del M. Baldo* (*Goir.*).

771 (1) *Romulea Columnae α typ.* **d. angustifolia Bég.** (1906). — Differisce dalla for. genuina per le fg. più sottili, più lunghe e meno ricurve, per la spata a valva super. meno largam. membranacea e per il perigonio un po' più grande; dalla *for. discreta*, colla quale corrisponde per le fg., differisce pel perigonio più breve e per la spata con valva super. non completam. membranacea. — *Savona alla Villetta presso S. Giacomo* (*Mezzana*).

776 (2) *Iris pallida* **b. anomala Rigo in Goir.** (1883). — Acaule, 1-flora, con peduncolo breve, strisciante tra le fg. Perigonio azzurro-carico. — *Veron. a Torri* (*Rigo*).

780 (6) *I. Chamaeiris β olbiensis* **b. alba Asch. et Graebn.** = var. b. Parl. — Perigonio bianco. — *Col tipo.*

781 (7) *I. pumila β pseudo-pumila* (Fl. An. I, p. 225 [for. b]) **a. genuina.** — Perigonio porporino-scuro, concolore. — *Gargano e Sicilia.*

b. violacea Parl. — Perigonio violaceo, concolore. — *Sicilia.*

c. discolor Guss. (sub I. pumila) (Fl. An. l. c. [for. c]). — Perigonio violaceo-porporino, colle lacinie marginate di giallo. — *Sicilia.*

d. lutescens Nob. = I. lutesc. Guss. (non Lam.). — Perigonio bianco-giallognolo. — *Sicilia.*

e. lutea Biv. (1806), *Guss.* (1827) (sub I. pumila) (Fl. An. l. c. [for. d]) = I. panormitana Tod. — Perigonio giallo. — *Sicilia.*

818 (3) *Orchis Morio α typ.* **d. rosea Goir.** (1883) = var. c. Parl. — Fi. rosei. — *Col tipo qua e là.*

e. alba Arc. (1882), **Goir.** (1883) = var. b. Parl. — Fi. bianchi. — *Col tipo qua e là.*

Digitized by Google

f. maculifolia Nob. = var. e. Parl. — Fg. macchiate. — *Veron. a Tregnago sul M. Barbara* (*Mass. ex Goir.*) *e Cors. ad Ajaccio e Porta* (*Req. ex Parl.*).

821 (6) *O. coriophora* α *fragrans* (Fl. An. I, p. 241 [for. a]) *a. genuina.* — Spiga densissima, a fi. rosso-scuri.

b. cassidea (M. B.). — Spiga lassa, a fi. più pallidi. — *Veron. lungo l' Adige* (*Goir.*).

c. grandiflora Rchb. — Spiga densa, a fi. più grandi, roseo-pallidi. — *Colla prec.* (*Goir.*).

d. albiflora Goir. (sub O. fragrans). — Spiga lassa, a fi. bianchi. — *Colla prec.* (*Goir.*).

e. cornuta Rigo in Goir. (1904) (sub O. fragrans, sine descr.). — *Veron. sopra Torri* (*Rigo*).

β *cimicina* (*Crantz*) (Fl. An. l. c. [for. b.]).

822 (7) *O. ustulata* **b. pauciflora Goir.** (1883). — Spiga povera. — *Veron. sul m. Trezzolan* (*Goir.*).

c. albiflora Thieleus. — Fi. bianco-nivei. — *Da ricercarsi.*

823 (8) *O. tridentata* α *typ.* **b. sulcata Goir.** (1883). — Sperone percorso da un lieve solco. Spiga densa, intensam. porporina. — *M. Baldo* (*Goir.*).

c. candidissima Goir. (1883). — Fi. bianco-nivei. — *Veron. tra Villafranca e Valeggio* (*Goir.*).

824 (8) *O. purpurea* α *typ.* **b. alba Goir.** (1883) = var. β Pollini. — Fi. bianchi. — *Sul lago di Garda a Lasize* (*Fontana*).

828 (13) *O. pyramidalis* **b. albiflora Nob.** = Anacamptis pyram. b. Parl. — Fi. bianchi. — *Col tipo qua e là.*

829 (14) *O. globosa* **b. humilis Goir.** (1883) (sub Traunsteinera glob.) — Pianta ridotta in ogni parte, alta 16-17 cm. — *Veron. nei Lessini sul Maléra* (*Goir.*).

831 (16) *O. laxiflora* α *typ.* **d. bifida Goir.** (1883). — Sperone dilatato all' apice, bifido, a lobi ricurvi in fuori. — *Nel Veron. col tipo* (*Goir.*).

833 (18) *O. mascula* **g. rosea Goir.** (1883) (sub O. speciosa). — Fi. rosei. — *Qua e là col tipo.*

h. immaculata Goir. (1883) (sub O. speciosa). — Fg. senza macchie. — *Col tipo.*

i. macrostachya Goir. (1883) (sub O. speciosa). — Pianta grande, con spiga lunga 25-30 cm. — *Col tipo.*

j. brachystachya Goir. (1883) (sub O. speciosa). — Pianta piccola, a spiga breve e povera. — *Col tipo.*

833 * (18 *bis*) *O. Spitzelii Saut.* — Ulteriori ricerche (cfr. Pampanini, in N. Giorn. bot. it. 1906, p. 300) hanno dimostrato che questa pianta non è un ibrido tra *O. mascula* ed *O. maculata*, come aveva sospettato Halácsy e come avevamo anche noi riportato (Fl. An. I, p. 245), ma una specie autonoma.

838 (23) *O. pseudo-sambucina* **c. lutea Nob.** = var. b. Parl. — Fi. gialli. — *Nell' area della spec.*

842 (2) *Gymnadenia odoratissima* **d. roseiflora Nob.** = var. b. Parl. — Fi. rosei (nel tipo porporini). — *Colla specie qua e là.*

e. albiflora Nob. = var. c. Parl. — Fi. bianchi. — *Colla specie qua e là.*

843 (3) *G. conopsea* **b. ornithis (Rich.)** = Orchis Jacq. = v. albiflora Goir. (1883). — Fi. bianchi. — *Col tipo.*

845 *Platanthera bifolia* α *typ.* **a. laxiflora Goir.** (1904) = P. solstitialis α laxiflora Drej., Rchb. — Pianta gracile, a spiga lassa e labello con sperone lungo e gracile. — *Nei luoghi secchi.*

b. densiflora M. Schulze (1894) = P. solstitialis β densiflora Drej. — Pianta robusta, a spiga densa e labello con sperone più grosso e più breve. — *Nei luoghi umidi, ombrosi.*

861 (1) *Cephalanthera rubra* **d. oligantha Goir.** (1883). — Pianta di 20 cm., a circa 3 fi. più piccoli e fg. più strette, — *M. Baldo* (*Goir.*).

Digitized by Google

862 (2) *C. ensifolia* **b. longifolia Goir.** (1883). — Fg. super. e spesso anche le brattee infer. uguaglianti o superanti la spiga, ch' è breve. — *Col tipo nel Veron.* (*Goir.*).

863 (3) *C. pallens* **b. uniflora Goir.** (1883). — Pianta piccola, 1-flora. — *M. Baldo alla Lonza* (*Goir.*).

864 (1) *Epipactis palustris* **c. humilis Goir.** (1883). — Pianta di 15-18 cm., a pochi fi. — *Nel Veron. col tipo* (*Goir.*).

865 (2) *E. latifolia α typ.* **b. varians Richter** = E. Helleborine b. varians Crantz = E. viridiflora Rchb. — Fusti lunghi, squamosi, con 3-5 fg. percorse da nervi violacei. — *Col tipo.*

889 * *Populus canescens* β **lobata Parl.** — Fg. a 3-5 lobi. — *Grumone lungo la via di Cremona* (*Parl.*).

892 (2) *Alnus Alnobetula* β' **Foucaudii Briq.** (1905) = A. brembana Fouc. (non Rota). — Fg. ovali-ellittiche od ellittiche, ottusam. subattenuate alla base, subacute all' apice, glabre e lucide come nella *v. suaveolens* ma più piccole (3-4 $^1/_2$ per 2-3 cm.). — *Corsica nella foresta di Vizzavona* (*Mand. e Fouc.*).

γ *brembana.* — *La località di Corsica va riferita alla var. prec.*

900 ** *Quercus Cerris* × *Suber for. Gussonei* (cfr. Fl. An. A, p. 60). — *Veron. sui m. Lessini* (*Goir.*).

911 (3) *Ulmus montana* **b. major (Sm.).** — Rami con corteccia suberosa. — *Da ricercarsi.*

946 (3) *Thesium alpinum α typ.* = Th. Orsinii Narducci in hb. Florent. — *Abr. al M. Vettore* (*Orsini*), *M. di Frosolone presso Picinisco* (*Ten. et Guss.*).

γ *pratense.* — Si tolga il sinonimo *Th. ambiguum Ten.*, che, secondo un esemplare autotipo da noi visto nell' Erb. centr. di Firenze, è il tipico *Th. intermedium;* si tolga perciò dall' habitat della *v. pratense* l' Abruzzo.

947 (4) *Thesium linophyllum* β *Parnassi* = Th. intermedium Guss., Ten. — *Abr. nel gruppo del Gran Sasso ed al Morrone* (*Guss. e Ten.*).

β' *ramosum* (*Hayne*) (Fl. An. I, p. 286 [α c]) **b. leve Somm.** (N. Giorn. bot. it. 1894, p. 26) = Th. humile Caruel (non Vahl) = Th. intermedium Caruel p. p. (non Schrad) = Th. italicum A. DC. (quod ad pl. ex Alp. Apuanis). — Differisce dal tipo pei fusti più gracili, obliquam. ascendenti e meno ramosi, per le fg. 1-nervie, pei rami fioriferi più brevi e per le brattee generalm. liscie; dalla *v. intermedium* per la rd. non stolonifera, per le fg. 1-nervie, pei racemi semplici, a rametti non divaricati, per la brattea mediana più lunga e pel frutto a nervi più salienti. — *Alpi Apuane ed Appenn. lucchese e pistoiese* (*cfr. Somm. l. c.*).

γ *intermedium.* — *La pianta di Sard. ed in parte o forse totalm. quella di Cors. vanno riferite alla for. italicum.*

c. italicum (*A. DC.*) (Fl. An. A, p. 62) = Th. linophyllum et intermedium Moris. — Secondo Moris (Fl. Sard. III, p. 436) differisce dal tipo pel perigonio 1 $^1/_2$-2 volte più breve, con nessuna lacinia orecchiuta, pel frutto non od appena stipitato e per la maggior gracilità di tutta la pianta. — *Sard. ad Oliena, Dorgali, Tonneri d' Irgini ed isola Tavolara* (*Moris*) *ed in Cors.* (*ex Gürke in Richter*); *sec. Moris* (*l. c.*) *sono da escludersi i sinonimi di Th. intermedium Guss. ed altri* (*citati da A. DC.*) *e perciò anche le località delle Alpi Apuane ed Abr.*

958 (5) *Aristolochia longa* γ *pallida* **b. istriaca Pamp.** (N. Giorn. bot. it. 1905, p. 363) = A. longa Scop. = A. pallida S. et S.?, Koch p. p. — Perigonio verde-porporino, più grande che nel tipo, a tubo lungo sino a 5 $^1/_2$ cm. (in luogo di 20-25 mm.), notevolm. ampliato, subventricoso, colla fauce più o meno ristretta, a labbro lungo $^1/_3$ del tubo (nel tipo lungo $^1/_2$ od anche uguale ad esso). — *Istria presso Trieste* (*Scop.*, *Marches.*) *e precisam. a Lippiza* (*Tommas.*) *ed a Docastelli presso Parenzo* (*Calegari*).

985 (8) *Rumex obtusifolius α* **silvester (Wallr.)** = Lapathum silv. Lam. = R. obtusifol. b. microcarpus Doell. — Valve perigoniali interne lunghe 2 $^1/_2$-3 mm., ovali-oblunghe, minutam. dentate o quasi intere. — *Più comune nei luoghi ombrosi.*

Digitized by Google

β **agrestis Fr.** (1832) = R. Friesii Gr. et Godr. — Valve perigoniali interne lunghe 3-4 mm., ovali-triangolari, acutam. dentate. — *È la forma più comune dei prati, campi ecc.*

986 (9) *R. pulcher* γ *divaricatus* **c. hirsutus (Ten.)** (Fl. nap. Prodr. p. 23) = R. divaricatus B Ten., Syll. p. 183. — Valve perigoniali quasi intere. — *Basilicata* (*Ten.*).

991 (14) *R. Acetosa* β *arifolius for. amplexicaulis* (cfr. Fl. An. A, p. 64). — *Indicato anche della Majella a S. Nicola, Monte S. Angiolo e Montevergine* (*Ten.*); *ma dubitiamo che sia invece il tipico arifolius.*

1015 (10) *Chenopodium album* δ *opulifolium* **b. obtusatum G. Beck** (1890). — Fg. assai ottuse, le super. con 1 o 2 denti per lato, del resto intere. Pianta in generale più farinosa. — *Italia* (*ex Gürke*).

1094 (1) *Spergula arvensis* **var. Chieuseana (Pomel).** — *Cors. a Biguglia, Ajaccio e Bonifacio* (*ex Rouy, Fl. de France VIII, p. 379*).

1106 (7) *Alsine graminifolia* **b. dalmatica G. Beck** (1891) = Aren. Arduini γ dalmatica Vis. (1826) = Ar. Rosani B subglabra Ten. (1831) = Als. Rosani b. dalmatica Guss. (1842). — Pianta glabra inferiorm. — *Abruzzo* (*Guss. ex Ten.*) *e Sic.*

1140 (6) *Cerastium semidecandrum* δ *pumilum b. tetrandrum* **subfor. majus Moris.** — — Pianta più alta (25-35 cm.), dicotomo-ramosissima e meno pelosa. — *Sard. ad Arizzo* (*Moris*).

1145 (11) *C. arvense* δ *stenopetalum* **a. polyadenum Briq.** (1905). — Pianta glanduloso-viscosa. — **b. oligadenum Briq.** (1905). Pianta pubescente, ma senza o con pochissime glandule. — *Ambedue in Corsica* (*ex Briq.*).

η *Thomasii.* — Oltre agli altri caratteri si distingue anche per le fg. pettinato-cigliate al margine.

c. Rigoi (Huter) (N. Giorn. bot. it. 1877, p. 314 [nomen]) = C. rigidum × tomentosum Huter in sched. — *Abruzzo alla Majella a Scrimacavallo* (*Porta et Rigo exs. n. 571* [*1875*]).

ι *Boissieri b. Cavillieri Briq.* (1905) = C. arvense var. Cavillieri Briq. (1901) (Fl. An. A, p. 73).

1155 (7) *Lychnis laeta* β *corsica* (Fl. An. I, p. 357 [for. b.]) **b. elatior Nob.** = Silene laeta v. Loiseleurii subv. elatior Briq. (1905). — Pianta più robusta, di 60 cm. e più, a fg. misuranti 4-5 cm. per 5-7 mm. — *Corsica nell'estuario di Chioni presso Cargese* (*Burnat ex Briq.*).

1211 (5) *Saponaria lutea.* — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

1231 (10) *Dianthus alpester var. Gyspergerae* (*Rouy*, Rev. de Bot. 1903; Fl. de France IX p. 461) (cfr. Fl. An. A, p. 78; Burnat in Briq., Ann. Conserv. et Jard. Bot. de Genève 1905, p. 127). — Differisce dalla *for. furcatus* per le fg. liscie o quasi al margine ed un po' più larghe (2-3 mm. in luogo di 1-2 1/2), a guaina un po' più breve (1-2 mm. in luogo di 1 1/2-3). Squame calicine ricoprenti quasi tutto il tubo del calice e questo più breve (11-14 mm. in luogo di 11-18). — *Corsica nelle Calanche tra Porto e Diana a 350-450 m.* (*Gysperger, Burnat*).

1245 (2) *Elatine Hydropiper* α' **Gussonei Somm.** (1906) = E. macropoda Solla, Lojac. = E. campylosperma Ross. — Differisce dal tipo specialm. pei fi. peduncolati, a peduncoli più brevi o poco più lunghi delle fg.; dalla *v. macropoda* per i petali uguali al calice e di un bel roseo (nella *macropoda* invece sono bianchi e lunghi 1/2 del calice) e pei semi più incurvati; dalla *v. pedunculata* per questi stessi caratteri dei petali e per i peduncoli più brevi. — *Isola di Lampedusa* (*Solla, Ross, Lojac., Somm.*).

1287 * *Cistus laurifolius.* — Per lapsus calami fu scritto (A, p. 83) « **b. angustifolius Rouy** » in luogo di « **b. lanceolatus Rouy et Fouc.** ».

1292 (1) *Viola canina* × *arenaria* **c. alba Parl.** — Fi. bianchi. — *Col tipo.*

1300 (8) *V. calcarata* γ *nebrodensis.* — *Va tolto dall'habitat il M. Gennargentu in Sard., dovendosi la pianta di tale località riferire invece alla v. corsica.*

Digitized by Google

1305 (4) *Reseda Phyteuma var. aragonensis* (*Loscos et Pardo*) = R. Phyt. v. glaucescens A. Terr. in Parl. (Fl. An. A, p. 87) (ex Rouy et Fouc.) = R. Phyt. v. fragrans Texid.

1329 (5) *Arabis hirsuta* γ *arcuata* (*Shuttl.*) = A. ciliata DC., Koch et Auct. fl. it. (Fl. An. I, p. 328 [var. γ]), non R. Br. — Cfr. Béguinot in «N. Giorn. bot. it. 1906, p. 309». (La vera *A. ciliata A. Br.* è propria dell' Inghilterra).

1331 (7) *A. caerulea All.* (1770-73), *Haenke in Jacq.* (1788) = Turritis All. (1785).

1336 (12) *A. pumila Jacq.* (1775), non *Wulf. in Jacq.* (cfr. Caruel in Parl. Fl. it. IX, p. 869). *b. stellulata* (*Bert. in Desv.*) (non Desv. e Barthol, come per errore fu scritto nel vol. I, p. 429).

1341 (17) *A. Thaliana* **c. Burnatii Briq.** (1905), sub Stenophragma. — Pianta ridotta (4-18 cm.), a fusto e rachide del racemo flessuosi, a fg. basali piccole ($1\frac{1}{2}$-5 per $1\frac{1}{2}$-4 mm.), a picciuolo lungo 2-6 mm., a peduncoli frutt. lunghi 3-7 mm. e silique mature lunghe 11-15 mm. — *Corsica presso Vizzavona alla Punta Grado a 1400 m.* (*Burnat ex Briq.*).

1356 (12) *Sisymbrium officinale* **b. lejocarpum DC. (Jord.).** — Silique glabre. Fg. pubescenti o quasi glabre. — *Colla spec.: Sic.* (*Guss.*), *Eolie* (*Lojac.*), *Cors.* (*ex Rouy et Fouc.*).

c. ruderale (Jord.). — Fg. più grandi che nel tipo, a lobi più lunghi e meno dentati. Silique più grosse, lunghe 16-18 mm. — *Isole Eolie* (*Lojac.*).

1359 (1) *Barbarea vulgaris* β *rupicola* **b. brevicaulis (Jord.).** — Pianta bienne, di 3-12 cm., a fi. circa metà più piccoli. Stilo allungato; silique più brevi. — *Cors. sul M. Coscione* (*Jord.*) *e nei monti di Calvi* (*Soleir.*).

1372 (5) *Cardamine amara* β *grandifolia* (cfr. Fl. An. A, p. 93). — Le fg. super. sono quasi sempre minutam. cigliate al margine, mentre nella *c. flexuosa v. glaberrima* (colla quale facilmente può scambiarsi) sono glabre o con poche ciglia sparse. — *Tosc. presso Vallombrosa* (*Fiori*), *Patria, Castel di Sangro e Reggio Cal.* (*Guss. hb., sub C. uliginosa*).

1373 * (6 *bis*) *C. flexuosa* β *glaberrima* (cfr. Fl. An. A, p. 94). — Dietro esame degli esemplari di *C. uliginosa* dell' Erbario gussoneano gentilmente comunicatici dal prof. Cavara, abbiamo potuto accertarci che essa va riferita qui come sinonimo, e di conseguenza anche la *C. dentata Guss.* (Prodr. II, p. 234) e la *C. dubia Nicotra* (Prodr. Fl. messan. p. 95 [1878]) fabbricata a spese della *C. uliginosa Guss.* (*non M. B.*). — *Cal. all' Aspromonte ed a Reggio* (*Guss. hb.*), *Sicilia nelle Madonie e nel Messinese* (*Guss., Nicotra, Lojac.*).

1401 (11) *Brassica oleracea var. nivea* (cfr. Fl. An. A, p. 96). — *Sec. Rouy* (*Fl. de France IX, p. 459*) *la pianta di Corsica indicata con questo nome* (*Fouc.*) *è la var. insularis.*

1415 (6) *Diplotaxis fruticulosa.* — È una spec. incerta, che deve essere studiata su altro materiale; sembrerebbe una var. della *D. tenuifolia.* Ad ogni modo il quesito 5 della chiave va modificato, non essendo il carattere della lunghezza dello stilo abbastanza evidente.

1422 (2) *Rapistrum rugosum* α *typ. a. scabrum Rouy et Fouc.* et etiam *Paol.* (Fl. An. I, p. 451) si sostituisca con: *a. hirsutum* (*Host*).

γ *orientale* **b. microcarpum Rouy et Fouc.** — Siliquette ad articolo super. del diam di $1\frac{1}{2}$ mm. (nel tipo 2-$2\frac{1}{2}$ mm.). — *Cors. a Rogliano* (*Revél.*).

1439 (3) *Alyssum argenteum All.* (1774), *Vitm.* (1790) = Lunaria All. (1785).

1468 (9) *Draba verna* β *macrophylla* **for. curtipes Rouy et Fouc.** = Erophila Jord. — *Cors. a Portovecchio* (*Revél.*).

γ *praecox* **for. subrotunda Fouc. et Rouy** = Erophila Jord. — et **for. Revelieri Rouy et Fouc.** = Erophila Jord. — *Ambedue in Cors.* (*ex Rouy et Fouc.*).

1521 * **Fumaria pia Nicotra** (Atti e Rendic. Acc. Dafnica di Acireale, Ser. 2ª vol. I [1905]) — Affine a *F. muralis.* — *Sic. ad Acireale* (*Nicotra*).

1522 (2) *F. officinalis* α *typ.* **e. minor Koch** = v. albiflora Parl. — Pianta più gracile e

Digitized by Google

più glauca, a fi. più piccoli, bianco-rosei. — *Trieste* (*Tomm.*), *Siena* (*Parl.*), *Sassari* (*Nic.*).

1560 (9) *Anemone baldensis*. — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

1595 * **Ranunculus Schowii Tin.** (in Guss. Syn. II, p. 889). — *Sic. nei campi tra Vittoria e Terranova* (*Tin.*). — Forse uguale a *R. Agerii Bert.?*

1599 (29) *R. repens f. degeneratus Schur* (1866) = R. hortensis Schur (non Pers.) = R. repens f. pleniflorus Vis. et Sacc. (1869) (Fl. An. A, p. 106).

1602 (32) *R. geraniifolius* β' **aurimontanus Briq.** (1905). — Differisce dalla *v. montanus* per le fg. basali più piccole, a segmenti meno profondam. divisi, per le fg. cauline assai più ridotte e pei fusti gracili. Per questo carattere avvicinasi alla forma *gracilis*, ma i fi. sono assai più grandi (22-30 mm. diam.). — *Corsica al M. d'Oro a 2200 m.* (*Burnat ex Briq.*).

1648 (2) *Saxifraga rotundifolia* **d. chrysosplenifolia (Boiss.).** — Fusti irsuti in basso, sparsam. glanduloso-pelosi in alto. Fg. basali lassam. pubescenti nelle due pag., appena cartilaginee al margine, con crenature uguali ed ottusissime, non o brevem. mucronate, le cauline subsessili. Sepali ovali-oblunghi, ottusi. Petali più larghi, senza punteggiature rosse. Cassula più breve, ovoide. — *Monti di Cors.* (*ex Rouy et Cam.*),

1661 (15) *S. pedemontana a. genuina*. — *Corsica al M. d'Oro a 2000 m.* (*Burnat ex Briq.*).

1675 (29) *S. Aizoon* α *brevifolia* **c. brachyphylla (Schuttlew. in Rouy et Cam.).** — Fg. larghe $^1/_3$-$^1/_2$ della loro larghezza. Fusti di 8-20 cm., con pannocchia lassa, povera. — *Cors. nei monti di Corte* (*Burnouf*).

1731 (25) *Sedum heptapetalum*. — Benchè il Caruel (in Parl. Fl. it. IX, p. 85) dica che i fusti sono minutam. glanduloso-pelosi, all'ispezione degli esemplari tale pelosità non è evidente.

1739 (2) *Prunus Persica* β *Nucipersica C. K. Schneider* = Amygdal. Persica β L. (1753) = Persica Nuci-pers. Borckh. (1790) = Pers. levis DC. (1805) = Prun. Persica β levis Arc. (1882) (Fl. An. I, p. 557).

1740 (3) *P. Armeniaca* β *dasycarpa* (cfr. A, p. 116). — Sec. C. K. Schneider (Handb. Laubholzk. I, p. 633 [1906]) è un ibrido, cioè: *P. myrobolana* × *Armeniaca C. K. Schneider* = P. cerasifera × Armeniaca Asch. et Graebn. (Syn. VI, 2, p. 134).

1744 (7) *P. spinosa e. macrocarpa Wallr.* = P. fruticans Weihe. — Sec. Focke (Pflanz.-Mischl. p. 114) e C. K. Schneider (l. c.) è un ibrido, cioè: *P. spinosa* × *insititia Focke* = P. insit. × spinosa Rchb. (cfr. etiam Asch. et Graebn. l. c., p. 125).

1753 * (1 *bis*) **Spiraea cana W. et K.** — *Friuli sul M. Cavallo presso Sacile* (*G. v. Martens in Asch. et Graebn. Syn. VI, 1, p. 14*).

1779 (12) *Potentilla erecta* β *procumbens* **b. Mandonii (Fouc.).** — Il Briquet (Ann. Conserv. et Jard. Bot. de Genève 1905, p. 136) riferisce come var. di *P. procumbens* questa entità, da noi già riferita a *P. reptans* β *italica* (cfr. Fl. An. A, p. 118); essa non differirebbe dalla *v. procumbens* altro che per l'abbondante villosità sericea.

var. Herminii Ficalho (sub P. Tormentilla). — *Alpi Mar. e Cors.* (*ex Briq., in Ann. Conserv. et Jard. bot. de Genève 1901, p. 67*).

1780 (13) *P. reptans* α *typ.* **for. adscendens Buddens.** (1850) = for. suberecta Beckh. (1879) = for. recta Penzig in Bizzoz. (1883). — Fusti ascendenti. — *Col tipo.*

1785 (18) *P. aurea c. latiloba Nob.* = P. Halleri β latiloba Ser. in DC. = P. aurea β latifolia Rouy et Cam. (cfr. Fl. An. A, p. 119).

1802 (3) *Rubus fruticosus* ρ *sulcatus* **c. Vestii (Focke).** — *Tir. mer. e Liguria, ma in forme quasi simili al tipico R. sulcatus* (*ex Focke in Asch. et Graebn.*).

1820 (8) *Rosa Pouzini*. — *Corsica presso Tattone, tra Vico e Sagone e sopra Omessa* (*Burnat ex Briq.*).

1852 * *Pirus Aria* × *torminalis*. — *Boschi dell'Abruzzo e della Basilicata* (*Ten., sub P. intermedia A. latifolia*).

1885 (3) *Genista januensis Viv.* (1802) = G. triangularis W. (1803). — Sulla data di pub-

Digitized by Google

blicazione di «Willdenow, Spec. Pl. vol. III» ov' è descritta la *G. triangularis* cfr. Kuntze, Rev. Gen. Plant., p. CXXXIV.

1885 * **G. triquetra L'Herit., Lam.** (non W. et K.). — *Indicata per errore dell'isola Palmaria* (*L'Heritier*) *e poi della Corsica* (*Aiton*). — La *G. triquetra L'Herit.* è una pianta coltivata, probabilm. di origine ibrida (vedi Fiori in N. Giorn. bot. 1907).

1899 (17) *G. aspalathoides.* — Sui caratteri distintivi tra le var. α *typ.*, β *Lobelii* e γ *Salzmannii* di questa spec. cfr. Briquet, in Ann. Conserv. et Jard. Bot. Genève 1905, p. 139-44.

α *typica.* — *Sarebbe da riferirsi qui la pianta di Pantellaria* (*ex Briq. l. c.*).

β *Lobelii* (*DC.*) (sensu stricto) = G. aspalath. β confertior Moris = G. Lobelii β confertior Briq. — *Lig.*, *Tosc.*, *Sic.*, *Sard.*, *Cors. e Capraia* (?) (*ex Briq. l. c.*).

γ *Salzmannii* = G. aspalathoides Moris = G. umbellata Salzm., Lois. — *Lig.*, *Sard.*, *Cors. e Capraia* (?) (*ex Briq. l. c.*).

NB. Crediamo che il Briquet abbia erroneam. citato l'isola Capraia invece che l'Elba, perchè infatti solo di quest' ultima isola è citata la *G. aspalathoides* (cfr. Sommier, in N. Giorn. bot. it. 1903, p. 151).

1988 (18) *Trifolium Lagopus.* — *Corsica nella foresta di Vizzavona* (*Burnat ex Briq.*).

2084 (32) *Astragalus siculus.* — L'indicazione dell' isola d' Elba è da ritenersi errata (Sommier in N. Giorn. bot. it. 1902, p. 327).

2180 (31) *Vicia tetrasperma* δ *pubescens* **c. subuniflora Somm.**, sub Ervo (1902). — Pianta ridotta in ogni sua parte, a peduncoli spesso 1-flori. — *Isole di Gorgona e Capraia* (*Somm.*).

2205 (2) *Epilobium angustifolium b. albiflorum Dum.* (1827), Lej. et Court. (1831), Hausskn. (1884) (Fl. An. A, p. 147) = E. spicatum β leucanthemum Wender. (1826).

2206 (3) *E. montanum* β *collinum* **for. alpinum Hausskn.** et **for. elatior Hausskn.** — *Ambedue nel C. Ticino* (*Chenev. e Braun*).

2350 (2) *Heracleum alpinum.* — L' involucro non è sempre nullo (cfr. Fl. An. II, p. 183), ma può anche essere formato di poche brattee caduche.

2355 (1) *Daucus Carota* γ *commutatus* = D. mauritanicus Bert., Guss., Gr. et Godr. ecc. (an L. ?).

b. **minor Nob.** = D. mauritanicus for. lopadusanus Rouy (non Tin.) — Pianta ridotta (2-4 dm.), maggiorm. villoso-irsuta, con frutto ad aculei più brevi. — *Cors. a Bonifacio* (*ex Rouy*).

δ *maximus* (*Desf.*) = D. mauritanicus Lam. (an L.?) (Fl. An. II, p. 186). — Crediamo meglio abbandonare il nome di *D. mauritanicus*, variamente interpretato dagli Autori e dai più riferito alla var. prec.

2360 * *D. Daucorlaya Drude* (1898) (Fl. An. A, p. 153). — Distinto dal *D. grandiflorus* principalm. per avere le coste secondarie del frutto con aculei in una sola serie, mentre in fiore è ad esso quasi simile (cfr. etiam, Janchen in Mitt. Naturwiss. Ver. Univ. Wien 1907, p. 61).

2370 (8) *Laserpitium Panax* β *cynapifolium* (Fl. An. II, p. 192 [for. b]). — A questa pianta deve riferirsi come sinonimo il *Ligusticum cynapifolium Viv. ap. DC.* (cfr. Fl. An. A, p. 152). Esso differisce da *L. Panax*, sec. Briquet (Ann. Conserv. et Jard. Bot. Genève 1905, p. 152-59), oltre che per la glabrezza delle fg., anche pei frutti a mericarpi meno compressi, con ali dorsali e laterali meno eterogenee e per i fasci di stereoma costali assai più gracili. Per questi caratteri il Briquet non esita a considerarlo come spec. distinta.

2400 (1) *Physospermum aquilegifolium* = Coriandrum All. (1774) = Danaa All. (1785).

2466 (3) *Polygala vulgaris* γ *alpestris* **for. obtusata Chodat.** — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

2663 (2) *Primula elatior* (*L.*) *Hill* (1765), *Mill.* (1768), *Jacq.* (1778).

2741 (2) *Cynanchum nigrum.* — *Corsica nella foresta del vallone dell' Anghione presso Vizzavona a 1100 m.* (*Burnat ex Briq.*).

Digitized by Google

2742 (3) *C. Vincetoxicum* β' *Burnatii Briq.* (1905), *Fiori* (A, p. 163) (1907).

2755 (9) *Gentiana verna* **var. Favratii Rittn.** — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

2762 (16) *G. Amarella* **var. compacta (Heg.)** = G. Murbeckii Kern. — *C. Ticino in Val Bavona e Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

2762 * **G. solstitialis Wettst.** (Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat. LXIV, p. 337). — *C. Ticino in Val Bavona e Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

2796 (3) *Myosotis pyrenaica* η *Soleirolii.* — Su questa pianta vedi anche: Briquet, in Ann. Conserv. et Jard. Bot. Genève 1905, p. 161-64.

2829 *Eritrichium nanum* (*Amann in L.*) *Schrad.* = Myosotis Amann in L. (1759), All. (1774), Vill. (1779).

2885 (4) *Convolvulus sabatius.* — *Nella Lig. anche presso Alassio, racc. sino dal 1879* (*Burnat ex Briq., in Ann. Conserv. et Jard. bot. de Genève 1901, p. 57*), *a Varazze?* (*Carrega in hb. Flor.*) *ed a Portofino* (*Atti Congr. bot. internaz. di Genova del 1892, p. 126*).

2882 * *Salpichroa rhomboidea.* — *Inselvatichita anche nell' Orto Bot. di Firenze dal 1896 circa* (*Ajuti*).

2896 * *Verbascum nigro* × *Lychnitis.* — *Nell' habitat in luogo di « Tir. mer. a Mairengo » si legga « C. Ticino a Mairengo e Ronco a S. Martino ».*

2967 (28) *Veronica verna* **c. Revelieri Briq.** (1905). — Pianta nana, non più alta di 2 ½ cm., ridotta in ogni parte, a fg. intere o quasi, uni- o raram. biflora. — *Corsica al M. d' Oro a 1800-1900 m.* (*Burnat ex Briq.*).

2979 (3) *Digitalis purpurea* α *typ.* **a. latifolia Briq.** (1905). Fg. oblunghe. — **b. angustifolia Briq.** (1905). — Fg. strettam. lanceolate. — *Ambedue in Corsica* (*Burnat ex Briq.*).

γ *Gyspergerae* (*Rouy*) (Fl. An. A, p. 169). — Sec. Briquet (Ann. Conserv. et Jard. Bot. Genève 1905, p. 167-72) non rappresenta altro che una variazione estrema di *D. purpurea*, a brattee, sepali laterali ed anteriori generalm. più stretti e più decisam. acuminati dell' ordinario. — *Corsica nella vallata di Niolo tra Calacuccia ed il colle di Vergio* (*Gysperger*).

2992 (3) *Euphrasia officinalis* θ *hirtella* **for. eglandulosa Chab. in Chen. et Braun** (1905) (sine descript.). — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

δ *tatarica.* — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

3005 (1) *Rhinanthus Alectorolophus* β *patulus.* — *Nell' habitat in luogo di « Tir. mer. sul M. Generoso » si legga « C. Ticino sul M. Generoso ».*

3050 (19) *Orobanche rigens* **b. nigricans G. Beck in Briq.** (1905). — Pianta ridotta (12-18 cm.), a scapo assai ingrossato alla base e densam. coperto di squame bruno-nerastre nel secco. Spiga densissima, con brattee pure nerastre, un po' glandulose. Fi. lunghi 11-17 mm., a corolla violacea e stimma giallo-citrino. — *Corsica a Capo Ferolato sulla Genista Lobelii* (*Burnat ex Briq.*).

3128 (3) *Galeopsis Ladanum* β *intermedia* **for. abundantiaca Briq.** — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

3208 (4) *Thymus Serpyllum* ζ *polytrichus.* — *Qua e là in tutte le Alpi mer.* (*ex Bég.*).

3214 (6) *Mentha Pulegium* **var. tomentella (Hoffmgg. et Lk.).** — *Corsica tra Ajaccio e la Torre Parata* (*Burnat ex Briq.*).

3224 (1) *Pinguicula vulgaris* α *typ.* **d. sixtina Briq.** — Corolla bianco-rosea. — *Da ricercarsi.*

γ *grandiflora* **c. pallida Reut.** = P. Reuteri Genty. — Corolla bianco-rosea. — *Da ricercarsi.*

δ *corsica* **a. caerulescens Briq.** (1905). Corolla azzurro-chiara, quasi violacea nel secco. — **b. pallidula Briq.** (1905). Corolla biancastra o leggerm. rosea. — *Ambedue in Corsica* (*ex Briq.*).

Digitized by Google

3245 (12) *Plantago Coronopus* γ *Weldenii Rchb.* (1830-32) = var. pusilla Moris (1858-59) (Fl. An. III, p. 98).

3249 (16) *P. maritima* β *serpentina* (*All.* [1774], *Vill.* [1779]).

3259 (2) *Galium vernum* **d. hirsutissimum Briq.** (1905). — Pianta nana, ad internodi abbreviati e fg. piccole, grigiastre per un denso tomento di peli patenti. — *Corsica al col di Vergio a 1400 m. ed al col di Salto a 1300 m.* (*Burnat ex Briq.*).

3260 (3) *G. pedemontanum* β *reflexum* et γ *retrorsum.* — Sulla interpretazione e sinonimia di queste entità, cfr. Béguinot in « Bull. Soc. bot. it. 1903, p. 213 ».

3268 (11) *G. aristatum.* — *A questa spec. devono riferirsi la maggior parte delle località citate dagli Autori ital. pel G. silvaticum* (*cfr. Béguinot in Bull. Soc. bot. it. 1903, p. 216*).

3273 (16) *G. pyrenaicum.* — *È proprio della reg. subalp. ed alp.* (*non submont. e mont. come per svista trovasi scritto nel vol. III, p. 111*).

3371 (2) *Knautia arvensis* ζ *transalpina.* — Per svista nell' Appendice (p. 178) è stata ripetuta questa var. due volte, cioè sotto *K. arvensis* e sotto *K. longifolia*, seguendo il Briquet che la mette nel gruppo delle *arvenses* ed il Borbas che invece l' avvicina a *K. magnifica*, ma si tratta di una unica entità.

3372 *** **K. velutina Briq.** (Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève 1902). — *Trevigiano nel territ. di Vittorio* (*Pampanini*).

3377 (5) *Scabiosa gramuntia* α *affinis* (*Gr. et Godr.*). — Per una svista fu registrata nella Appendice (p. 178, n. 3375 *) come forma nuova.

3392 (3) *Bryonia dioica* β **angulosa Mab.** (1877) = B. sicula for. corsica R. Maire in Rouy (1904) = B. syriaca Auct. Fl. Cors. (non Boiss.). — Pianta ispido-biancastra (anche nei fusti), a fg. angolose ma quasi affatto lobate. — *Corsica a Castagnaccia* (*Mab.*) *ed a Calcatoggio* (*Bicknell ex Briq.*).

3405 (2) *Phyteuma hemisphaericum* α *typ.* **d. longibracteatum Bornm.** (1896) = Ph. hedraianthifolium R. Schulz (1904) = Ph. hemisph. v. carinthiacum R. Schulz (1904) = Ph. Carestiae Luiset (non Briq.). — Brattee allungate, formanti una specie d' involucro attorno al capolino. — *C. Ticino col tipo* (*Chenev.*) *ecc.*

3505 * **Doronicum Portae Chab.** (Bull. Soc. bot. de France 1906, p. 547). — Appartiene al ciclo delle forme del *D. grandiflorum*, dal quale si distingue principalm. pel rz. obliquo, squamoso, il fusto alto 5-6 dm., lungam. nudo in alto, glabro, soltanto in alto minutam. glanduloso, per le fg. basali e cauline infer. ovato-oblunghe, attenuate in lungo picciuolo non dilatato, le medie e super. cordato-ovate, sessili, amplessicauli ed infine pei capolini più piccoli (5 cm. diam.). Si avvicina al *D. plantagineum* pel portamento, ma ne differisce per gli acheni tutti muniti di pappo, pel rz. non strisciante nè rigonfio-tuberoso, per le fg. cauline infer. lungam. picciolate e per gli acheni irsuti. — *Luoghi ghiaiosi subalp. del Trent. nelle Giudicarie sul M. Valbona a 1300-1500 m. in terreno calcare* (*Porta*).

3510 (3) *Bellis silvestris* β *verna.* — *Sard. nei monti di Oliena a 1330 m.* (*Moris*).

3530 (5) *Erigeron acer* β *Droebachensis* **d. erectus Chenev.** (1905). — Fusti rigidi, di ritti, alti 50-55 cm. — *C. Ticino in Val Bavona a S. Carlo* (*Chenev. e Braun*).

3531 (6) *E. alpinus* α *typ.* **e. maximus Rikli in Chenev. et Braun** (1905). — Pianta di 40 cm., a 5 capolini e fg. 1,5 per 12 mm. — *C. Ticino tra Sevinera e Zotto* (*Chenev. e Braun*).

ε *Schleicheri* **b. dubius Chenev.** (1905). — Pianta a portam. più robusto (fusti alti sino a 30 cm.), ricordante la *var. atticus.* — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

η *uniflorus* **for. elongatus Rikli** (ubi?). — *C. Ticino in Val di Peccia* (*Chenev. e Braun*).

3591 * **Achillea macrophylla × atrata Tausch** = A. Thomasiana Hall. f. = A. atrato × macrophylla Chenev. et Braun. — *C. Ticino in Val Bavona verso il Lago bianco a 2050 m.* (*Chenev. e Braun*).

3613 (1) *Filago germanica* δ *prostrata.* — *Corsica presso la stazione d' Omessa* (*Burnat ex Briq.*).

Digitized by Google

3719 (6) *Centaurea Jacea* ζ *pratensis* **b. subacaulis Chenev. et Braun** (1905) (sine descriptio). — *C. Ticino in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

3762 * *Carduus personata* × *rhaeticus*. — *C. Ticino in Val di Peccia tra S. Carlo e S. Antonio* (*Chenev. e Braun*).

3774 (18) *C. leucographus* **c. Cavillieri Briq.** (1905), sub Tyrimno. — Pianta più alta (80 cm.), a rami lunghi e raddrizzati, a fg. più spinose (spine maggiori lunghe 2-5 mm.), a capolini più grandi (2 cm. diam.), con involucro emisferico, depresso alla base e corolla bianca. Portam. quasi del *Card. nutans*. — *Corsica tra Sagone e Cargese* (*Burnat ex Briq.*).

3776 (2) *Cirsium stellatum b. foliosum et c. tenuifolium Fiori* (Fl. An. III, p. 362) = Cnicus stell. v. foliosus et v. tenuifolius N. Terr.

3841 (8) *Leontodon hispidus* β *opimus* **c. alpicolus Chen.** (1905). — È la forma delle alte Alpi e di luoghi magri, ridotta (8-15 cm.) ed a scapo non ingrossato in alto. — *C. Ticino in Val Bavona a 2500 m., Ghiridone e Val Piora* (*Chenev.*).

3846 (1) *Picris hieracioides* **var. subalpina Arv. T. et Chen.** (1905). — Pianta meno ispida e più liscia. Involucro ovoide, non strozzato a metà, a brattee tutte appressate o le esterne patenti. Linguette giallo-dorate anche all' esterno (non porporine). Peduncoli non rigonfi sotto il capolino. — *C. Ticino a S. Carlo in Val Bavona* (*Chenev. e Braun*).

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Nota. — Nell'**Appendice** alla **Flora Analitica** sono aggiunte alle entità tassonomiche dei tre precedenti volumi, 1 genere *(Callitris)* e le seguenti altre:

Specie principali . . .	34
Varietà o piccole specie	552
Forme o variazioni . .	2513
Ibridi	221
Totale	3320

La Flora italiana, sino a tutto l'anno 1904, coll'aggiunta di gran parte delle scoperte del 1905 e del 1906 e tenuto calcolo delle modificazioni e correzioni apportate nell'*Appendice*, comprende adunque complessivamente le seguenti entità:

Specie principali . . .	4137
Varietà o piccole specie	3168
Forme o variazioni . .	6199
Ibridi	483
Totale	13987

Risulta quindi un aumento di 7420 entità in confronto di quelle comprese nel « Compendio del Prof. Arcangeli, II ed., anno 1894 ».

Indirizzare le richieste ed i pagamenti al Prof. **Adriano Fiori, presso il R. Istituto Forestale, Vallombrosa** (prov. di Firenze).

PREZZO DELLA PRESENTE PARTE

Lire 6.50

La stampa della presente parte fu incominciata nel Febbraio 1906 e terminata nel Marzo 1907.

Digitized by Google

FLORA ANALITICA D'ITALIA

OSSIA

DESCRIZIONE DELLE PIANTE VASCOLARI INDIGENE

INSELVATICHITE E LARGAMENTE COLTIVATE IN ITALIA

DISPOSTE PER QUADRI ANALITICI

DEI DOTTORI

ADRIANO FIORI E GIULIO PAOLETTI

VOLUME IV - PARTE IIª

INDICE GENERALE

PEL

Dott. ADRIANO FIORI

OPERA ENCOMIATA DALLA REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

PADOVA

TIPOGRAFIA DEL SEMINARIO

1908

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE GENERALE

dei 3 volumi della Flora Analitica e dell'Appendice

(I nomi in carattere **bastoncino** sono quelli delle specie, quelli in *corsivo* delle varietà e delle forme, gli altri sono quelli dei sinonimi. — La lettera A si riferisce all'Appendice, i numeri romani ed arabi fuori parentesi rispettivamente al vol. ed alla pag., quelli tra parentesi, unitamente alle lettere greche e romane, all'ordine progressivo dei generi, specie, varietà e forme).

ABACOSA = Vicia
dumetorum Alef. = V. dumet.
ABAMA = Narthecium
ossifraga DC. = N. ossifr.
ABIES I 29 (32)
alba Mill. 29 (1)
alpestris Bruegg. (*excelsa*) A 12 (2 β)
baldensis Nym. = tenuifolia
chlorocarpa Purk. = excelsa
crassifolia Ugolini (*excelsa*) A 11 (2 α a)
erythrocarpa Purk. = excelsa
excelsa Lk. = alba
excelsa Poir., DC. 29 (2), A 11, 203
Larix Lam. = Larix decidua
medioxima Heer (non Nyl.) (excelsa) = alpestris
minor Gilib. = alba
monocaulis Fiori (*excelsa*) A 12 (2 α c)
montana Nym. = excelsa
nobilis Dietr. (non Lindl.) = alba
pectinata DC. = alba
pectinata Gilib. = excelsa
Picea Bluff et Fing. = alba
Picea Mill. = excelsa
taxifolia Desf. = alba
tenuifolia Ugolini (*excelsa*) A 12 (2 α b)
virescens Hint. = alba
vulgaris Poir. in Lam. = alba
ABSINTHIUM = Artemisia
laciale Lam. = A. glacialis
xum Lam. = A. Mutellina
etrosum Baumg. = A. petrosa
anacetifolium Gaertn. = A. atrata
vulgare Lam. = A. Absinthium
ABUTILON II 268 (644)
Avicennæ Gaertn. 268
ACACIA = Albizzia
Julibrissin W. = A. Julibr.
ACALYPHA II 292 (652)
virginica L. 292
ACANTHUS III 86 (810)
longifolius Host 87 (3)
mollis Koch = longifolius
mollis L. 86 (2)
spinosissimus Pers., Rchb. 86 (1 β)
spinosus L. 86 (1)
spinosus S. et S. = spinosissimus
spinulosus Host, Rchb. 86 (1 α)
ACARNA = Atractylis
cancellata All. = A. cancell.
gummifera W. = Carlina gumm.
macrocephala W. = Carlina Fontanesii
ACER II 221 (618)
acutifolium S.-Lag. = platanoides
ætnense Hort. = Lobelii
ætnense Strobl (Opalus) = seg.
ætnense Tin. A 156 (4 ζ)
affine Opiz A 156 (2 β c)
ambiguum Fiori (*Opalus*) A 156 (4 γ)
ambiguo × monspessulanum Fiori = Peronaï
austriacum Tratt. 222 (2 β b)
campestre L. 221 (2), A 155
cassinense N. Terr. (*monspessul.*) A 155 (1 g)
collinum Ten. = seg.
collinum Wallr. (*camp.*) 222 (2 β), A 156
commutatum J. et C. Presl 221 (1 e), A 155
convergens Nicotra (Pseudo-Plat.) = villosum
cordifolium Mœnch = tataricum
cordifolium Uechtr. et Sint. (letum) = platanoides
crispum Lauth. A 156 (3 α c)
dentatum Rouy (monspess.) = commutatum
denticulatum Hort = liburnicum
Dobrudschæ Pax = platanoides
eriocarpum Opiz = hebecarpum
ACER II 221 (618)
erythrocarpum Opiz A 155 (2 α e)
gallicum Schwerin (monspess.) = microphyllum
hebecarpum DC. (*camp.*) 222 (2 α a)
hispanicum Pourr. = Opalus
integrifolium Tausch (platan.) = Lobelii
italicum Lauche = Opalus
italum Lauth. = Opalus
italo × monspessulan. Schwerin = ambiguo × monsp.
laciniatum Lauth. A 156 (3 α c)
lasiocarpum Wimm. et Grab. (camp.) = hebecarpum
latialatum Pax (*villosum*) A 156 (5 β a)
lejocarpum Opiz = collinum
liburnicum Pax (*monspessul.*) A 155 (1 f)
litorale Hort = liburnicum
Lobelii Ten. 222 (3 β), A 156
macrocarpum Opiz 222 (2 c)
macrocarpum Schur (camp.) = prec.
macrophyllum Rouy (*monspess.*) 221 (1 d)
macropterum Guss. exs. ex Pax = villosum
macropterum Guss ex Strobl = truncatum
macropterum Lojac. (Pseudo-Plat.) = prec.
marsicum Guss. = hebecarpum
marucum Walp. = hebecarpum
microcarpum Schur (camp.) = collinum
microphyllum Boiss. (*monspess.*) 221 (1 c)
molle Opiz 222 (2 b)
molle Rchb. (camp.) = prec.
mollissimum Tausch (camp.) = molle
monspessulanum L. 221 (1), A 155

Digitized by Google

ACER II 221 (618)
monspessul. β Parl. = macrophyllum Rouy
montanum Lam. = Pseudo-Plat.
neapolitanum Guss. = obtusatum
neapolitanum Ten. A 156 (4 ε)
nebrodense Tin. ex Strobl = truncatum
Negundo L. 223 (6)
obtusatum Guss. = ætnense
obtusatum Kit. 222, A 156 (4 δ)
opalifolium Ten. = opulifol.
Opalus Ait., Ten. = rotundifol.
Opalus Mill. 222 (4), A 156
Opalus Rchb. Ic. = opulifol.
opulifolium Thuill. = Pseudo-Plat.
opulifolium Vill. A 156 (4 α)
Opulus Auct. pl. = Opalus
Peronaï Schwerin A 156 (X)
platanifolium Stokes = platanoides
platanoides Scop. = Pseudo-Plat.
platanoides L. 222 (3), A 156
polycarpum Opiz = collinum
procerum Salisb. = Pseudo-Plat.
Pseudo-Platanus Falk = platanoides
Pseudo-Platanus L. 222 (5), A 156
purpurascens Legr. (campestr.) = erythrocarp.
quinquelobatum Masner et Opiz = molle
quinquelobum Borzì, Pau (monspessul.) 221 (1 b), A 155
quinquelobum Gilib. = Pseudo-Plat.
quinquelobum Schwerin (camp.) = affine
rectangulum Dulac = monspessul.
rotundifolium Lam. A 156 (4 β)
rotundum Dulac = platanoides
saxatile Goir. (campestr.) A 155 (2 α f)
serotinum Kit. (tomentosum) = molle
siculum Guss. (Pseudo-Plat.) = villosum
silvestre Wend. = campestre
suberosum Dum. 222 (2 d)
tataricum L. 223 (nota), A 156
Tenorei Pax (Lobelii subsp.) = Lobelii
tomentosum Koch (opulifol.) = obtusatum
trifolium Duham. = monspessul.
trilobatum Lam. = monspess.
trilobum Gilib. = campestre
trilobum Mœnch = monspess.
truncatum Tin. ex Strobl A 156 (5 β b)
variegatum Hort. (Negundo) 223 (6 b)
velutinum Boiss. (opulifol.) = obtusatum
vernum Reynier = Opulifolium

ACER II 221 (618)
villicarpum Láng. (camp.) = hebecarpum
villosum J. et C. Presl 223 (5 β), A 156
villosum Lojac. exs. (neapolit.) A 156 (4 ε b)
ACERAS I 239 (228)
anthropomorpha Sm., Steud. = seg.
anthropophora R. Br. 239, A 54
anthrop. X Orchis Simia Vayr. = Orchis tephros. X A. anthrop.
densiflora Boiss. = Orchis intacta
hircina Lindl. = Loroglossum hirc.
intacta Rchb. = Orchis int.
longibracteata Rchb. f. = Orchis longibract.
pyramidalis Rchb. = Orchis pyramid.
romana Morren (hircina) = Loroglossum - roman.
secundiflora Lindl. = Orchis intacta
Vayræ Richter = Orchis tephros. X A. anthrop.
Vayredæ Rouy = prec.
ACETOSA = Rumex
Acetosella Mill. = R. Acetos.
aculeata Chaz. in Mill. = R. acul.
agrestis Raf. = R. Acetosa
alpina Mill. = R. arifolius
alpina Mœnch. = R. alp.
amplexicaulis Raf. = R. Acetosa
angustata Raf. = R. Acetosa
arifolia Schur = R. arifol.
arvensis Montand. = R. Acetosella
bidentula Raf. = R. Acetosa
bucephalophora Fourr. = R. bucephal.
digyna Mill. = Oxyria dig.
hastata Mœnch = R. Acetosella
hastulata Raf. = R. Acetosa
intermedia Fourr. = R. intermed.
Lunaria Mill. = R. Lun.
magna Gilib. = R. Acetosa
multifida Chaz. in Mill. = R. multif.
officinalis Gueld. = R. Acetosa
olitoria Raf. = R. Acetosa
parva Gilib. = R. Acetosella
pratensis Mill. = R. Acetosa
repens S. F. Gray = R. - repens
scutata Mill. = R. scut.
sterilis Mill. = R. Acetosella
tuberosa Chaz. in Mill. = R. tuber.
ACETOSELLA = Rumex
vulgaris Fourr. = R. Acetosella
ACHARITHERIUM = Filago
arvense Bluff. et Fing. = F. arvensis
ACHILLEA III 261 (874)
absynthifolia Clairv. = capitata

ACHILLEA III 261 (874)
adulterina Lerresche = macroph. X mosch.
Ageratum L. 266 (8)
albiflora Goir. (toment.) A 185 (9 b)
alpestris Evers (distans) A 185 (10 η b subf.)
alpestris W. et Grab. (Millef.) = sudetica
alpina Koch et Auct. plur. (an L.?) = Ptarmico X macroph.
ambigua Heimerl (Herba-rota) 265 (6 α b)
ambigua Pollini 268 (nota) = stricta?
angustissima Heimerl (Ptarmica) = linearis
asperula Ces. P. et G. = Anthemis cretica
asplenifolia Lerresche = macroph. X mosch.
asplenifolia Vent. 267 (10 α)
argentea Vis. 263 (2 α)
atrata L. 264 (4)
atrato X macroph. Chen. et Braun = macroph. X atrata
atrato X macroph. Vatke = macroph. X Clavenæ
atrato X moschata 264
atrato X nana Wallr. A 185
Barrelieri Sch.-Bip. = Anthemis Barrel.
calcarea uter P. et R. (mosch.) 265 (5 β). A 185
canescens Vis. et Sacc. (Millefol.) = collina
capillaris Poir. = sudetica
capitata W. 263 (2 γ)
Chamæcyparissus Ces. P. et G. = Santolina Chamæc.
Clavenæ Jacq., Neilr. = intercedens
Clavenæ L. 263 (2)
collina Becker 267 (10 β)
commutata Heimerl = Ptarmico X macroph.
compacta Lam. 268 (10 ζ)
conferta Heimerl (nana) 263 (3 a)
crustata Koch (an Roch.?) (Millef.) = scabra
cuneifolia Lam. = Herba-Rota
decipiens Vest. = Millefol. (α)
dentifera DC. 268 (10 θ), A 185
dentifera Rchb. = sudetica
denudata Hpe. (Clavenæ) = glaberrima
distans Ten. = silvatica
distans W. et K. 268 (10 η b), A 185
Dumasiana Vatke = macroph X Clavenæ
elegans Posp. (Millefol.) 267 (10 α c)
Engleri Asch. (Clavenæ) = capitata
Erba-rotta All. = Herba-rota
eridania Bert. 268 (11 α d)
Eupatorium M. B. = filipendulina
filipendulina Lam. 269 (*nota*)

Digitized by Google

ACHILLEA III 261 (874)
fossicola Posp. (*Millef.*) 267 (10 α e)
Genipi Murr. = moschata
glaberrima Avè-Lall. (*Clavenæ*) 268 (2 δ)
glabrata Koch (Clavenæ) = glaberrima
graja Beyer = Morisiano × nana
Gussonii Ces. P. et G. = Anthemis cretica
Hænkeana Tausch = sudetica
Halleri Crantz. - atrata
Haussknechtiana Asch. (*non Boiss.*) 265 (5 γ)
helvetica Schleich. p. p. = macroph. × mosch.
Herba-rota All. 265 (6)
heterophylla N. Terr. (*moschata*) 264 (5 β b).
hybrida Gaud. (mosch.) = mosch. × nana
hybrida Koch. = mosch. × nana
impunctata Hpe. (mosch.) = seg.
impunctata Vest. = atrato × mosch.
intercedens Heimerl (*Clavenæ*) 268 (2 β)
intermedia Gaud. (atrata) = atrato × mosch.
intermedia Schleich. = mosch. × nana
Krættliana Bruegg. = atrato × mosch.
Laggeri Sch.-Bip. = atrato × nana
lanata Koch (Millefol.) = pannonica
lanata Lam. = nana
lanata Spr. = compacta
lanuginosa Fiori (*stricta*) 267 (10 ε c)
lanuginosa Gaud. (Millef.) = prec.
latifolia Heimerl (*Ptarmica*) 265 (7 a)
latisecta Fiori (*punctata*) 269 (11 δ c)
laxiuscula Heimerl (*nana*) 268 (3 b)
Lereschii Sch.-Bip. = macroph. × mosch.
ligustica All. 269 (12)
ligustica Barbieri = eridania
ligustica Posp. (*odorata*) 269 (nota)
linearis Fiori (*Ptarmica*) 265 (7 b)
Linnæana Heimerl (oxyloba) = Anthemis alpina
Livia Scop. = moschata
macrophylla L. 262 (1)
macrophyllo × atrata Tausch 262 (*nota*), A 216
macrophyllo × Clavenæ Asch. 262
macrophyllo × moschata 262
magna All. = dentifera
magna Hænke = sudetica
magna L. 267 (10 subspec. II)
magna Roch. = tanacetifolia
magna W., DC. = compacta

ACHILLEA III 261 (874)
majellensis Fiori (*stricta*) 267 (10 ε e)
microphylla W. = odorata
Millefolium Bolzon = ligustica
Millefolium L. 266 (10), A 185
Millefolium β Bert. = setacea
monocephala Heimerl (*atrata*) 264 (4 c)
Morisiana Rchb. 265 (5 β)
Morisiano × nana 264
moschata Ten. = calcarea
moschata Wulf. 264 (5), A 185
moschato × nana Focke 264
mucronulata Sch.-Bip. = Anthemis mucr.
multiflora Heimerl (*atrata*) 264 (4 a)
multiplex Ren. 266 (7 d)
muricata Ces. P. et G. = Anthemis muricata
nana Gib. et Pir. = setacea
nana Lam. = Herba-rota
nana L. 263 (8)
nano × atrata Lagger = atrato × nana
Neilreichii A. Kern. = ochroleuca
nobilis L. 268 (11)
obscura Nees = macroph. × mosch.
ochroleuca DC. = punctata
ochroleuca Ehrh. 268 (11 α c)
odorata Koch et Auct. it. p. p. = paucidentata
odorata L. 268 (11 β)
odorata Rchb. exs. = setacea
oligocephala Tausch (*atrata*) 264 (4 b)
oxyloba Heimerl = Anthemis alpina
pannonica Scheele 267 (10 β b)
paucidentata Ambrosi (*nobilis*) 269 (11 γ)
pectinata Lam. = odorata
pinnata Ces. P. et G. = Santolina pinn.
planifolia Fiori (*stricta*) 267 (10 ε b)
planifolia Posp. (magna) = prec.
platyrhachis Heimerl (*mosch.*) 264 (5 α b)
pollinensis N. Terr. (*punctata*) 269 (11 δ b)
polyphylla Schleich. = sudetica
Ptarmica L. 266 (7)
Ptarmico × macrophylla 266
punctata Ten. p. p. 269 (11 δ)
punctata Ten. p. p. = ochroleuca
punctata B Ten. = punctata
purpurea Koch (tanacetif.) = tanacetifolia
rosea Desf. = rubra
roseiflora Fiori (*stricta*) 267 (10 ε d)
rosmarinifolia Ces. P. et G. = Santolina rosmar.
rubra Sadler (*Millef.*) 267 (10 α b)
rubriflora Fiori (*collina*) 267 (10 β c)

ACHILLEA III 261 (874)
rupestris Huter P. et R. 265 (5 γ)
saccharata Posp. (*nobilis*) 268 (11 α b)
sambucifolia Desf. = Chrysanth. macrophyll.
scabra Host 267 (10 α f)
Seidlii Presl 267 (10 γ b)
senecioniflora Vest. = stricta
serrata Heimerl (*Ptarmica*) 265 (7 for.)
setacea W. et K. 267 (10 δ)
sicula Raf. = ligustica
silvatica Becker 267 (10 α d)
silvatica Ten. 269 (12 β)
sordida Koch (Millefol.) = collina
stenorhachis Heimerl (*mosch.*) 264 (5 α a)
stricta Schleich. 268 (10 ε)
subintegra Heimerl (*Ptarmica*) 265 (7 for.)
sudetica Opiz 267 (10 γ)
tanacetifolia All. 268 (10 η), A 185
tanacetifolia Rchb. f. = dentifera
tanacetifolia Ten. = filipendulina
Thomasiana Hall. f. = macroph. × atrata
Thomasiana Rchb. f. = macroph. × mosch.
Thomasii Thom. = macroph. × mosch.
tomentosa L. 266 (9), A 185
tyrolensis Wend. = capitata
valesiaca Koch (non Suter) = macroph. × mosch.
virescens Fenzl (odorata) = paucidentata
virescens Heimerl = prec.
ACHNATHERUM = Stipa
Calamagrostis P. B. = S. Calam.
ACHNODONTON = Phleum
arenarium Trin. = Ph. aren.
Bellardii PB. = Ph tenue
tenue PB. = Ph. tenue
ACHYRANTHES I 320 (303)
argentea Lam. 320 (b) = sicula cfr. A 66
aspera L. 320, A 66
crispa Poir. = indica
ellipticifolia Stokes = indica
excelsa Thou. = indica
indica L. (*aspera*) A 66 (β)
indica Mill. = prec.
mucronata Lam. = Alternanthera repens
nivea Lk. = Altern repens
obovata Pav. = Altern. rep.
obovatifolia Stokes = indica
obtusifolia Lam. = indica
radicans Cav. = Altern. rep.
repens L. = Altern. rep.
sicula L. (*aspera*) A 66 (α)
sicula All., Roth = prec.
virgata Poir. A 66 (α b)
ACHYROPHORUS = Hypochæris
ambiguus DC. = H. - ramosa?
helveticus Less. = H. uniflora
hispidus DC. = H. hispida

Digitized by Google

ACHYROPHORUS = Hypochæris
maculatus Scop. = H. macul.
monocephalus DC. (macul.) = H. — monoceph.
oblongifolius DC. (macul.) = H. tyrolensis
oxyodontus DC. = H. — oxyod.
pinnatifidus DC. = H. pinnat.
radicatus Scop. = H. radic.
serioloides DC. = H. — seriol.
uniflorus Sch.-Bip. = H. unifl.
ACINOS = Satureja
adscendens Mœnch = Calam. patavina
alpinus Mœnch = S. alpina
latior Schott (alpinus) = S. — latior
patavinus Pers. = Calam. pat.
thymoides Mœnch = S. Acinos
vulgaris Pers. = S. Acinos
ACIS = Leucojum
autumnalis Salisb. = L. autumn.
hiemalis Roem. = L. hiem.
longifolia Roem. = L. longif.
oporantha Jord. et Fourr. = L. autumnale
rosea Sweet = L. roseum
ACONITUM I 524 (438)
acuminatum Rchb. = eustachyum
acutum Rchb. 525 (2 d)
alatum Wend. = Napellus
alienum Rchb. = Lycocton.
alpinum Heg. (non Mill.) = tauricum
alpinum Schur (Anthora) = Jacquini
amplifiorum Rchb. = Napellus
angustifolium Bernh. 525 (2 b)
Anthora L. 526 (3), A 109
anthoræfolium Ser. = angustifol.
anthorum St.-Lag. = prec.
atlanticum Coss. = Lycocton.
austriacum Tratt. = Stœrkian.
Baumgarteni Schur = Napellus
Besserianum Andrz. = Lycocton.
bulbiferum Rchb. = variegat.
cæruleum Dulac = Napellus
callibotrys Rchb. = angustifol.
Cammarum Jacq. = variegat.
Cammarum L. 525 (1 β)
cernuum Wulf. 525 (1 γ b)
Clairvilleanum Bruegg. = panicul. × Napellus
commutatum Dalla Torre = Lycocton.
confertum Rchb. = Napellus
conicum Mey. (Lycoct.) = Thelyphonum
densiflorum Hpe. = tauricum
depauperatum Bouvier (*panicul.*) A 109 (1 γ for.)
dolomiticum Evers (*ranunculifol.*) A 109 (4 α d subfor.)
elatum Salisb. = pyramidale
eulophum Rchb. A 109 (3 for.)
eustachyum Rchb. A 109 (2 for.)
firmum Rchb. = acutum
flexicaule Hpe. et Hornsch. = cernuum
fornicatum Gilib. = Napellus
ACONITUM I 524 (438)
galeriflorum Stokes = Lycocton.
giganteum Host = Napellus
giganteum Zum. A 109
glabrum DC. = variegat.
grandiflorum Heg. = Napellus
hebegynum DC. A 109 (1 γ for.)
hortense Hpe. = Stœrkian.
humile Salisb. = cernuum
illinitum Rchb. = variegat.
intermedium DC. = Stœrkian.
Jacquinianum Ser. (Anthora) 525 (3 b) = seg., cfr. A 109
Jacquinii Rchb. A 109 (3 b)
lasiocarpum Rchb. = nasutum
laxiflorum DC. (*Lycoct.*) A 109 (4 α for.)
leiogynum Rchb. (panicul.) = paniculat.
leucanthum Andrz. = Lycocton.
Lobelianum Host = Napellus
Lupicida Rchb. = Lycocton.
Lycoctonum All. = laxiflorum
Lycoctonum L. 526 (4), A 109
macranthum Rchb. 525 (1 β b)
Matthioli Rchb. = cernuum
medium Schrad. = Stœrkian.
meloctonum Rchb. = laxiflorum
microstachyum Rchb. = Napellus
montanum Heg. = Napellus
Myoctonum Rchb. 526 (4 α a)
Napellus L. 525 (2), A 109
Napell. × variegatum Gürke = Stœrkian.?
nasutum Fisch. 525 (1 β c)
neapolitanum Ten. = pyrenaic.
neomontanum W. (non Kœlle) Stœrkian.
ochroleucum Neilr. (Lycoct.) = Lycocton. (α a)
ochroleucum Salisb. = Anthora
oligocarpum Rchb. = angustifol.
paniculatum Lam. 525 (1 γ), A 109
panicul. × *Napellus Bruegg.* A 109
parviflorum Rchb. A 109 (1 γ for.)
pauciflorum Bert. = Napellus
pauciflorum Bouvier (*Lycoct.*) A 109 (4 α for.)
penninum Ser. (*Lycoct.*) A 109 (4 α for.)
penninum Ser. (*panicul.*) A 109 (1 γ for.)
perniciosum Rchb. = Lycocton.
pubiflorum DC. (*Lycoct.*) A 109 (4 α for.)
pyramidale Mill. 525 (2 c)
pyrenaicum L. 526 (4 β)
ranunculifolium Rchb. 526 (4 α d), A 109
reflexum Rchb. = cernuum
rivale Heg. = Napellus
rostellatum Ser. (Napell.) = acutum
Sprengelii Rchb. = Napellus
Stœrkianum Rchb. 525 (1 β d)
strictissimum Rchb. = Lycocton.
ACONITUM I 524 (438)
tauricum Wulf. 525 (2 e)
tenuifolium Rchb. = angustifol.
tenuifolium Rchb. (Anthora) = Jacquinii
tenuisectum Reg. (Lycoct.) = ranunculifol.
tenuisectum Schur = Napellus
Thelyphonum Rchb. 526 (4 α b)
theriophonum Rchb. = prec.
toxicarium Salisb. = Lycocton.
toxicum Rchb. = variegat.
trichocarpum Rchb. = Napellus
tuberosum Host = variegat.
variegatum L., Koch 525 (1), A 109
vulgare DC. 525 (2 a)
Vulparia Rchb. 526 (4 α c)
Wulfenianum Rchb. = Napellus
ACORELLUS = Cyperus
distachyus Palla = C. distach.
ACORUS I 147 (147)
aromaticus Gilib. = seg.
Calamus L. 147, A 39
odoratus Lam. = prec.
ACROPTERIS = Asplenium
Seelosii Heufl. = A. Seelosii
septentrionalis Lk. = A. sept.
ACROSTICHUM
alpinum Bolton = Woodsia alp.
canariense W. = Notholæna Marantæ
catanense Cosent. = Nothol. vellea
hyperboreum Liljebl. = Woodsia alpina
ilvense L. = Woodsia ilvensis
Marantæ L. = Nothol. Marantæ
microphyllum Bert. = Cheilanthes Szovitsii
pulcrum L. = Asplenium Ad.-nigrum
septentrionale L. = Asplen. sept.
subcordatum Cav. = Nothol. Marantæ
Thelypteris L. = Nephrodium Thel.
velleum Ait. = Nothol. vellea
ACTÆA I 527 (440)
Christophoriana Gouan = spicata
corymbosa Stokes = spicata
melanocarpa Led. (spic.) = spicata
nigra Gærtn. = spicata
racemosa Gilib. = spicata
spicata L. 527
ACTINOCARPUS = Damasonium
Damasonium Guss. = D. Bourgæi
Damoson. Sm. = D. Alisma
europæus Spr. = prec.
ACTINOCYCLUS = Pirola
secundus Klotzsch = P. sec.
ADAMSIA = Geum
reptans Fisch. = G. reptans
ADENOCARPUS II 11 (481)
Bivonii Presl 11 (β)
cebennensis Del. = commutatus
commutatus Guss. 11 (γ)
complicatus J. Gay 11

Digitized by Google

ADENOCARPUS II 11 (481)
intermedius DC., Rouy = complicatus
parvifolius DC. 11 (α)
polyadenius Caruel (parvifol.) = complicatus (α)
telonensis DC. = commutatus
ADENOPHORA III 188 (847)
Alpinii Borb. A 180 (β)
angustifolia Pamp. (*liliifol.*) A 180 (α c)
communis Fisch. = liliifolia
infundibuliformis DC. f. (*liliifol.*) 188 (b)
liliifolia Bess. 188, A 180
suaveolens E. Meyer = liliifolia
ADENOSCILLA = Scilla
bifolia Gr. et Godr. = S. bif.
nivalis J. Gay = S. nival.
ADENOSTYLES III 204 (854)
abbreviata Fiori (*Alliar.*) 205 (γ c)
abbreviata Ugolini (albifr.) = prec.
albida Cass. = Alliariæ
albiflora Zersi (*alp.*) 204 (α b)
albifrons Auct. it. p. p. = auriculata
albifrons Rchb. = Alliariæ
alliariæ Kern 205 (γ)
alpina Bl. et Fing. 204, A 181
australis Nym. 205 (β)
auriculata Fiori (*austr.*) 205 (β d)
candidissima Cass. = leucophylla
fallax Gremli (*leucoph.*) 205 (ζ)
florida Bruegg. (albifr.) = Kerneri
glabra DC. 204 (α)
hybrida DC. 205 (ε)
hybrida DC. p. p., Guss. = australis
Kerneri Beck (*Alliar.*) 205 (γ d)
Kerneri Simonkai = prec.
leucophylla Rchb. 205 (ζ), A 181
lucida Fiori (*austr.*) 204 (β c)
macrocephala Huter P. et R. 205 (δ)
nebrodensis Strobl = australis
nuda DC (albifr.) = seg.
nuda Fiori (*Alliar.*) 205 (γ b)
Petasites Bl. et Fing. = Alliariæ
polyantha Kern. hb. = Kerneri
pubescens Boiss. et Reut. 204 (α c)
repanda Fiori (*austr.*) 204 (β b)
viridis Cass. = alpina (α)
ADENOSTYLIUM = Adenostyles
dubium Rchb. f. = A. leucophylla (cfr. III p. 205 ζ)
ADIANTUM I 15 (17)
Capillus-Veneris L. 15, A 8
trifidum W. 15 (b)
catinense Torn. = trifidum
Vaccarii Christ (*C.-ven.*) A 8 (c)
Visianii Schloss. et Vuk. (C.-ven.) = trifidum
ADONIS I 498 (426)
æstivalis L. 499 (3 δ)
æstivalis Presl = microcarpus
annuus L. 499 (3), A 104
apenninus L. p. p. = distortus
autumnalis L. 499 (3 α)
bœticus Lojac. (non Coss.) = microcarpus
citrinus DC. = pallidus
citrinus Guss. (Cupanian.) = lutescens
citrinus Hoffm. 499 (3 δ b)
Cupanianus Guss. = microcarpus
dentatus Auct. it. (non Del.) = intermedius
distortus Solla = Ranunculus millefoliatus, cfr. A 104
distortus Ten. 498 (2), A 104
flammeus Jacq. 499 (3 γ)
flammeus Lojac. = Preslii
flammeus Presl = microcarpus
flavus Vill. = citrinus
intermedius Webb et Berth. 499 (3 β b)
lutescens Fiori (*microcarp.*) 499 (3 β c)
microcarpus DC. 499 (3 β), A 104
miniatus Jacq. 499 (3 δ a)
pallidus Gr. et Godr. (*flamm.*) 499 (3 γ b)
polymorphus Zum. = annuus
Preslii Tod. 499 (3 α b)
vernalis L. 498 (1)
vernalis Torn. = quid?
ADOXA III 124 (823)
Moschatellina L. 124
ÆGIALINA = Ægialitis
ÆGIALITIS = Kœleria
tenuis Trin. = K. pubescens
ÆGILOPS I 108 (123)
Aucheri Boiss. 108, A 32 (1 α)
bicornis Boiss. p. p., Fiori 108 (1) = ligustica, cfr. A 33
bicornis Jaub. et Spach, cfr. A 33
biuncialis Vis. 109 (7 β)
callida Gdgr. = triaristata
caudata Balb. = ventricosa
caudata Bert. = speltoides
caudata L. 108 (3)
caudata Ten. = cylindrica
Crithodium Steud. = Tritic. monococcum
cylindrica Host 108 (4), A 33
cylindrica Moris = fragilis
cylindrica S. et S. = caudata
echinata Presl = triuncialis
elongata Lam. = triuncialis
fragilis Parl. 109 (5 β)
geniculata Roth = ovata
incurvata L. = Lepturus incurv.
intermedia Steud. = biuncialis
ligustica Fiori (*speltoides*) A 33 (1 β)
macrura Jaub. et Spach. = speltoides
mesantha Gdgr. = triaristata
neglecta Req. in Bert. = triaristata
Notarisii Clem. = biuncialis?
ÆGILOPS I 108 (123)
nova Winterl = cylindrica
ovata L. 109 (7)
quinquearistata N. Terr. (*ovata*) 109 (7 α b)
sicula Jord. et Fourr. = ovata
squarrosa Cav., W., Balb. (non L.) = ventricosa
squarrosa Ten. = fragilis
speltoides Jaub. et Spach = ligustica
speltoides Tausch A 32 (1)
triaristata Req. in Bert. = triuncialis
triaristata W. 109, A 33 (7 bis)
triticoides Lk. = ligustica
triticoides Req. = Trit. vulgare × Æg. ovata
triuncialis L. 109 (8)
triuncialis Guss. pl. rar. = Trit. vulgare × Æg. ovata
uniaristata Vis. 109 (6)
ventricosa Tausch 109 (5)
vulgari × ovata Lor. et Bar. = Trit. vulg. × Æg. ovata 109
ÆGOMARATHRUM = Hippomarathrum
siculum Moris = H. sicul.
ÆGOPODIUM II 165 (556)
baldense Evers (*Podagr.*) A 151 (b)
Podagraria L. 166, A 151
ÆLUROPUS I 84 (111)
levis Trin. = litoralis (α)
litoralis Parl. 84 (1)
niliacus Steud. = repens
villosus Trin. = repens
repens Parl. 84 (β)
ÆSCULUS II 223 (619)
Hippocastanum L. 223, A 157
ÆTHEORRHIZA = Crepis
bulbosa Cass. = C. bulb.
ÆTHIONEMA I 470 (408)
dentatum Guss. (*saxat.*) A 101 (1 c)
leptocarpum Ten. = saxatile
ovalifolium Boiss. = seg.
ovalifolium DC. (*saxat.*) 470 (1 b)
saxatile R. Br. 470 (1), A 101
Thomasianum J. Gay 470 (2)
ÆTHUSA II 174 (571)
agrestis Wallr. (*Cynap.*) 175 (b)
Bunium Murr. = Falcaria saxifraga
cynapioides M. B. 175 (c)
Cynapium L. 175, A 152
domestica Wallr. (Cynap.) = Cynapium (a)
leptophylla Spr. = Apium leptoph.
Meum Murr. = Meum athamanticum
montana Lam. = Falcaria saxifraga
Mutellina Lam. = Meum Mut.
pygmæa Koch (Cynap.) = agrestis
AGATHOPHYTUM = Chenopodium
acuminatum Schur = C. blitoides

Digitized by Google

AGATHOPHYTUM = Chenopodium
Bonus-Henricus Moq. = C. Bon.-Henr.
crassifolium Fuss = C. botyroides
glaucum Fuss = C. glauc.
rubrum Rchb. = C. rubrum
AGAVE I 218 (217)
altissima Zum. = americana
americana L. 218
europæa Vis. = americana
ramosa Mœnch = prec.
AGRAPHYS = Scilla
cernua Rchb. = S. non-scripta
nutans Lk. = S. non-scripta
campanulata Lk. = S. hispanica
patula Rchb. = S. patula
AGRAULUS = Agrostis
alpinus P. B. = A. rupestris
caninus P. B. = A. canina
AGRIMONIA I 582 (463)
agrimonioides L. 582 (2)
Eupatoria L. 582 (1). A 123
humilis Wallr. A 123 (1 α c)
minor C. Koch (*Eupat.*) A 123 (1 α b)
odorata Mill. 582 (1 β)
procera Wallr. = odorata
AGROPYRUM I 105 (126)
acutum R. et S. = repenti × junceum
affine Rchb. = prec.
aristatum Fiori (*glauc.*) A 32 (3 β d)
aristatum Parl. (*pungens*) A 32 (3 ε b)
Aucheri Boiss. = Savignonei
barbulatum Schur = Savignonei
biflorum R. et S. 105 (1 β)
Caldesii Goir. 106 (3 γ b)
campestre Gr. et Godr. 105 (3 β b)
caninum P. B. 105 (1), A 32, 204
concinnum DNtrs. = pungens c. majus
cristatum Gærtn. 106 (6), A 32
drepanense Ponzo A 32 (3 var.)
elongatum P. B. 106 (5), A 32
farctum Viv. = junceum
firmum Presl = repens (α a)
giganteum R. et S. = elongat.
glaucum R. et S. 105 (3 β), A 32
Goiranicum Vis. 106 (3 γ c)
Halleri Rchb. = Nardurus Halleri
hispanicum Presl = Nardurus — testucoides
intermedium Farneti (*acutum*) A 32 (×)
intermedium P. B. = glaucum
junceum P. B. 106 (4), A 32
junceo × litorale Fiori 106
lasiostachys Boiss. (repens) = Savignonei
latronum Richter (*glauc.*) A 32 (3 β c)
Leersianum Rchb. (*repens*) 105 (3 α b)
AGROPYRUM I 105 (126)
ligusticum Savignone = Ægilops — ligustica
litorale Dum. 106 (3 δ), A 32
longearistatum Fiori (*glauc.*) A 32 (3 β e)
majus Baumg.?, Parl.! (*can.*) A 204 (1 α b)
majus Parl. (*pungens*) A 32 (3 ε c)
majus Parl. (*repens*) A 32 (3 α c)
microstachyum Gr. et Godr. (rep.) = latronum
muricatum Eichw. = cristatum
muticum Schur (rep.) = repens (α a)
panormitanum Parl. 105 (2)
petræum Vis. = panormitan.
pilosum Schur = Savignonei
pungens R. et S. 106 (3 ε), A 32
pycnanthum Gr. et Godr. = litorale
repens P. B. 105 (3), A 32
repenti × junceum Fiori 103, A 32
rigidum Eichw., Rchb. = elongatum
rigidum Presl = glaucum
salinum Schur = Savignonei
Savignonei DNtrs. 105 (3 γ), A 32
scirpeum Presl 106 (5 β), A 32
strictum Kellner = junceo × litorale?
subtriflorum Parl. (*can.*) A 205 (1 α c)
Tenorei Nicotra (*junceum*) 106 (4 b)
Tournefortii Savignone = Ægilops speltoides
trichophorum Fiori (litorale) 106 (3 δ c) = seg.
trichophorum Richter 106 (3 δ c)
unilaterale P. B. = Nardurus unilat.
villosum Lk. = Triticum vill.
virescens Lge. (violaceum) = biflorum
viride Fiori (*litorale*) 106 (3 δ b)
AGROSTEMMA I 355 (337)
alpinum Forb. = Lychnis alp.
anomalum Porcius (Githago) = nicæense
baldense Porta 356 (nota)
Cœli-rosa L. = Lychnis Cœli-rosa
Coronaria L. = Lychnis Cor.
corsicum G. Don = Lychnis cors.
dioicum G. Don = Lychnis alba
Flos-cuculi G. Don. = Lychnis Flos-cuc.
Flos-Jovis L. = Lychnis Flos-Jov.
Flos-Jovis Pollich = Lychnis Coronaria
Githago L. 355, A 73
hirsutum Gilib. = Githago
humile Goir. (*Githago*) A 73 (c)
lætum G. Don = Lychnis læta
AGROSTEMMA I 355 (337)
lusitanicum G. Don = Lychnis Flos-cuc.
nicæense Pers. = seg.
nicæense W. (*Githago*) 355 (b)
parviflorum Cav. = Lychnis læta
pusillum Desf. = Lychnis Cœli-rosa?
silvestre G. Don = Lychnis rubra
AGROSTIS I 62 (74)
aculeata Scop. = Crypsis acul.
æmula Halin (non Kth.) = Spica-venti
alba L. 63 (6), A 16, 206
alba × alpina Bruegg. = patula
Allionii Richter (canina) = mutica
alopecuroides Lam. = Polypog. monspel.
alpina Bruegg. (stolonif.) = pauciflora
alpina Scop. 62 (3)
alpina W. = rupestris
Anemagrostis Syme = Spica-venti
anemagrostoides Trin. 62 (2), A 16
aquatica Pourr. = verticill.
arenaria Gouan = Sporobolus pungens
aristata Mad. (*alba*) A 16 (6 α for.)
aristata Tausch (vulgaris) = dubia
articulata Brot. = Chætturus fascicul.
arundinacea L. = Calamagr. arund.
aurata Gaud. (rupestris) = seg.
aurata Arc. (1882) (*alpina*) 62 (3 b)
australis L. = Gastridium lendiger.
brachystachys Schult = Crypsis — brach.
bromoides L. = Stipa Aristella
cærulescens DC. = Milium cær.
Calamagrostis L. = Stipa Calamagrost.
Candollei Parl. = alba (α)
canina L. 63 (5), A 16
capillaris All. (non L.) = mutica
capillaris Gouan, Pourr. = olivetorum
capillaris Lees., Vill. = vulgaris
capillaris Pollich = alba (α)
cenisia DNtrs. = aurata
coarctata Ehrh., Hoffm. A 16 (6 α for.)
compressa W. = vinealis
convoluta Asch. et Graebn. (*verticill.*) A 16 (6 ζ for.)
convol. Freyn (alba) = prec.
crinita Mœnch = Polypogon monspel.
decumbens Host 63 (6 α b)
densa M. B. = verticillata
densiflora Guss. (*alba*) 63 (6 ε)
diffusa Host = decumbens

Digitized by Google

AGROSTIS I 62 (74)
divaricata Hoffm. A 16 (6 δ for).
dubia Lam. et DC. A 16 (6 δ for.)
dubia Leers. = decumbens
effusa DC. = Milium effus.
effusa Spr. = anemagrostoides
elegans Thore A 16
festucoides Vill. = alpina
flagellaris Neilr. (stolonif.) = prorepens
flavescens Host = aurata
flavescens Parl. (*vulgaris*) A 208 (6 δ for.)
flavida Schur. = alba (α a)
frondosa Guss. = Gussonii
frondosa Ten. A 16 (6 ζ for.)
geniculata Lam. = canina
gigantea Roth = vinealis
glaucescens Spr. A 16 (6 α for.)
glaucina Bast. = vulgaris
Gussonii Richter (*vulgar.*) A 16 (6 δ for.)
hispida Heg. = alpina
hispida W. = vulgaris
hybrida Gaud. A 16 (5 for.)
incurvata Scop. = Lepturus incurvatus
intermedia Balb. = vulgaris
interrupta L. 62 (1 β)
lendigera Poir. = Gastridium lendigerum
lithuanica Bess. = vulgaris
litoralis With. = Polypog. lit.
lutosa Poir. = Polypog. litoralis
major Gaud. (alba) = vinealis
maritima Lam. 63 (6 β)
melanosperma Lam. = Milium paradox.
miliacea L. = Milium multiflorum
miliacea Sob. = Spica-venti
minima L. = Mibora min.
montana Krock. = rupestris
montana N. Terr. (*alba*) A 16 (6 α for.)
Muelleri Presl = anemagrostoides
mutica Gaud. (*canina*) 63 (5 c), A 16
mutica Hack. (castellana) = olivetorum
nitens Guss. = Triplachne nit.
nobilis DNtrs. A 16 (5 for.)
olivetorum Gr. et Godr. 63 (6 γ)
oseroënsis Seenus = Milium multiflor.
pallida DC. = anemagrostoides
pallida Hoffm., Schk. 63 (5 b)
pallida With. = alba
panicea Lam. = Gastridium lendigerum
panicea W. = Polypog. monspeliensis
paradoxa L. = Milium parad.
patula Gaud. A 16 (6 α for.)
pauciflora Schrad. 63 (6 α c)
pilosa Schleich. = Calamagr. tenella

AGROSTIS I 62 (74)
plumosa Ten. = Tricholæna Teneriffæ
polymorpha Huds. = alba, verticill., vulgaris
procumbens R. et S. = decumbens
prolifera Asch. et Graebn. (*silvat.*) A 16 (6 α subf.)
prorepens Asch. (*alba*) A 16 (6 α for.)
prorep. Koch (stolonif.) = prec.
pulchella Guss. = elegans
pumila L. = vulgaris
pungens Schreb., All. = Sporobolus pung.
purpurea Gaud. = Spica-venti
pyrenaica Pourr. = rupestris
refracta Mœnch = verticillata
rivularis Brot. = verticillata
rubra All. = canina
rubra Whlnb. (an L. p. p.?) = vulgaris
rupestris All. 63 (4)
rupestris W. = alpina
scabriglumis Boiss. et R. = densiflora
sepium Jacq. = Milium multiflorum
serotina L. = Diplachne ser.
setacea Curt. 63 (nota)
setacea Vill. = rupestris
sicula Kth. = glaucescens
signata Schur = alba (α)
silvatica Host A 16 (6 α for.)
silvatica Pollich = vivipara
Spica-venti L. 62 (1), A 16
Spica-venti β Lois. = anemagrostoides
stipata Kœl. = Stipa Calamagr.
stolonifera Koch = alba (α)
stolonifera L. = alba, verticill., vulgaris
stolonif. β L. Fl. Suec. = alba (α)
stolonif. Parl., Richter = verticillata
stolonif. Rchb. Ic. = prorepens
stricta DNtrs. = alba 63 (6 α oss.)
tarda Bartl. A 16 (6 δ for.)
tenella Hoffm. A 16 (6 δ for.)
tenella Poir. = Airopsis tenella
tenella R. et S. = Calamagr. tenella
triaristata Knapp = Polypog. monspeliensis
umbrosa Schur = tarda
varia Host = vinealis et decumbens
varians Thuill. = pallida
ventricosa Gouan. = Gastridium lendigerum
vernalis Poir. = Milium vern.
verticillata Vill. 63 (6 ζ), A 16
vinealis Schreb. 63 (6 α d.)
Villarsii Poir. = verticillata
villosa Chaix = Calamagr. Halleriana
vivipara Rchb., Parl. (*vulgaris*) A 208 (6 δ for.)
vulgaris With. 63 (6 δ), A 16, 208
Welwitschii Steud. = densiflora

AILANTHUS = Ailantus
AILANTUS II 258 (637)
excelsa Roxb. A 159
glandulosa Desf. 259
japonica Hort. = glandulosa
Pongelion J. F. Gmel. = prec.
procera Salisb. = prec.
rhodoptera J. Muell. = prec.
AIRA I 67 (82)
ætnensis Guss. = Corynephorus articulatus
agrostidea Guss. (non Lois.) = insularis
alba Wulf. = Sesleria autumnalis
alpina Roth. (non L.) = Deschamp. Gaudini
alpina Savi = Deschamp. media
alpina Sob. in Rupr. = Deschamp. montana
altissima DC. (an Mœnch?) = Deschamp. cæspitosa
ambigua DNtrs. 68 (3 b)
anceps Ces. (*caryophyllea*) 67 (2 α b)
Andræi Auersw. = Deschamp. Gaudinii
aquatica Guss. = Catabrosa ochroleuca
aquatica L. = Catabrosa aquat.
argentea Bellck. = Deschamp. Legei
articulata Desf. = Coryneph. articulatus
articul. var. A Desf. = Corynephorus — gracilis
atrovirens Thuill. = Molinia cærulea
biaristata Parl. (*Cupan.*) A 17 (2 γ b)
Borstii Prahl (flexuosa) = Deschamp. montana
breviaristata Gilib. = Deschamp. cæspitosa
cærulea L. = Molinia cær.
cæspitosa L. = Deschamp. cæsp.
canescens All., Savi = Corynephorus articulatus
canescens Host = caryophyllea
canescens L. = Corynephorus canesc.
capillaris Guss. Syn. = intermedia
capillaris Host 68 (3), A 17
caryophyllea Bourg. = Cupaniana
caryophyllea L. 67 (2), A 17
caryophyllea Savi = ambigua
clavata Gilib. = Corynephorus canescens
corsica Jord. A 17 (3 c)
corsica Tausch = Deschamp. — cors.
corymbosa Fauchè et Chaub. = intermedia
cristata L. = Kœleria crist.
Cupaniana Guss. 67 (2 γ), A 17
curta Jord. = caryophyllea
dactyloides Roch. = Kœleria glauca
discolor Thuill. = Deschamp. setacea
divaricata Pourr. A 17 (2 α c)

Digitized by Google

AIRA I 67 (82)
Edouardi Reut. = intermedia
elegans W. in Gaud. = capillaris
elegantissima Schur = capillaris
Elodes Brign. = Poa nemoralis (for.?)
fascicularis Steud. = Corynephorus — gracilis
festucoides Vill. = Agrostis alpina
firmula Wimm. et Grab. (cæspit.) = Deschamp. — altissima
flexuosa L. = Deschamp. flex.
glauca Schrad. = Kœleria glauca
globosa Thore = Airopsis tenella
gracilis Guss. (articulata) = Corynephorus — grac.
gracilis Trin. = Kœleria grac.
grandiflora Bert. = Kœleria splend.
hirsuta Hall. = Kœleria hirs.
Hostii Steud. = caryophyllea
hybrida Gaud. = Corynephorus articulatus
incerta Ces. P. et G. (Cupan.) 67 = biaristata, cfr. A 17
inflexa Lois. = Tenorei
insularis Boiss. 68 (5), A 18
intermedia Guss. 68 (4 β), A 18
intermedia Mut. (caryoph.) = Cupaniana
juncea Vill. = Deschamp. media
juncifolia Wulf. = Sesleria tenuifolia
lanata Vill. = Holcus lanat.
Legei Bor. = Deschamp. — Legei
Lenseei Lois. = caryophyllea
litoralis Gaud. (cæspit.) = seg.
litoralis God. = Deschamp. lit.
Magnagutii Asch. et Graebn. (*Cupan.*) A 17 (2 γ c)
media Gouan = Deschamp. media
microstachya Bourg. (caryoph.) = Cupaniana
minuta Loefl. apud L. 68 (6), A 18
mollis Schreb. = Holcus mollis
montana L. = Deschamp. mont.
natans Chiov. (*insularis*) A 18 (5 b)
Notarisiana Steud. = ambigua
nutans Weber = Melica nutans
ochroleuca Richt. in Rchb. (cæspit.) = Deschamp. - ochrol.
pallida Koch (cæspit.) = Deschamp. — altissima
paludosa Weihe = Deschamp. setacea
palustris Tod. = minuta
patulipes Jord. = divaricata
præcox L. 67 (1)
provincialis Jord. 67 (2 β)
provincialis Genn. = intermedia
pubescens Vahl = Kœleria pubesc.
pulchella Lk. = Tenorei

AIRA I 67 (82)
pulchella Nocc. et Balb. = capillaris
purpureo-argentea Gilib. = caryophyllea
suburralis Jan = caryophyllea
semiaristata Gr. et Godr. (Tenorei) = intermedia
setacea Huds. = Deschamp. setacea
sicula Spr. = Holcus tenuis Trin.
sicula Tod. = capillaris
spicata L. = Trisetum subspicat.
stolonifera Hsm. = Deschamp. cæspitosa
subaristata Faye = Deschamp. media
subspicata L. = Trisetum subsp.
Tenorei Guss 68 (4), A 18
uliginosa Rchb. = Deschamp. media
uliginosa Weihe = Deschamp. setacea
vallesiaca Sut. = seg.
vallesiana All. = Kœleria valles.
varia Jacq. = Sesleria cærulea?
variegata S.-Amm. = Corynephorus canescens
violacea Gilib. = Catabrosa aquatica
AIROCHLOA = Kœleria
caudata Lk. = K. caudata
cristata Lk. = K. cristata
hirsuta Lk. = K. hirsuta
pubescens Lk. = K. pubescens
vallesiaca Lk. = K. vallesiana
villosa Lk. = K. pubescens
AIROPSIS I 67 (81)
capillaris Schur = Aira capill.
caryophyllea Fr. = Aira caryoph.
globosa Desv. = tenella
insularis Nym. = Aira insul.
minuta Desv. = Aira min.
præcox Fr. = Aira præcox
pulchella Ten. = Aira Tenorei
tenella Coss. 67
AIZOON I 325 (308)
hispanicum L. 325
sessiliflorum Mœnch = prec.
AJAX = Narcissus
incomparabilis Caruel = N. Ps.-Narc. × poëticus
odorus Caruel = N. Ps.-Narc. × Jonquilla
Pseudo-Narcissus Harv. = N. Ps.-Narc.
AJUGA III 6 (776)
acaulis Brocchi 6 (1)
alba Rossi (reptans) = rept. c. albiflora
albiflora Goir. (*genevens.*) 7 (4 b)
albiflora Zersi (*reptans*) 7 (2 c)
alpestris Auct. (*reptans*) 8 (nota)
alpina L. et Auct. 8 (nota)
arida Fr. (*genevens.*) 7 (4 c)
ascapa Goir. (*genevens.*) A 172 (4 f)

AJUGA III 6 (776)
asperifolia Fiori (*Iva*) A 172 (6 c)
Chamæpitys Schreb. 8 (7), A 172
Chia Auct. (non Schreb.) = grandiflora
decumbens Ten. (non Thl.) = acaulis
elatior Fr. (*genevens.*) 7 (4 e)
genevensis L. 7 (4), A 172
genevensis Solla = reptans
glabra Presl 8 (7 α c)
glabrata Guss. (*orient.*) 7 (3 b)
grandiflora Vis. (*Chamæp.*) 8 (7 β), A 172
grossidens Briq. (*genevens.*) 7 (4 d)
hirta Freyn (*Chamæp.*) 8 (7 α for.)
hybrida A. Kern. = reptans × genevens.
Iva Schreb. 8 (6), A 172
longebracteata Bizz. (genev.) = elatior
media Freyn (*Chamæp.*) 8 (7 α b)
montana Ten. (reptans) = genevensis
moschata Schreb. = Iva
orientalis L. 7 (3)
parviflora Freyn (*Chamæp.*) 8 (7 α a)
pinnatifida Bég. (Iva) 8 (6 c) = asperifolia, cfr. A 172
Pseudo-Iva Rob. et Cast. 8 (6 b)
pyramidalis L. 7 (5)
reptans L. 7 (2)
reptans × genevensis Lasch A 172
rosea Fiori (*reptans*) 7 (2 b)
rosea Nic. (*orient.*) 7 (3 c)
rugosa Host = genevensis
semproniana Briq. (*pyramid.*) 7 (5 b)
Tenorii Presl = acaulis
vulgaris Lk. = Chamæpitys
ALATERNUS = Rhamnus
alpina Mœnch = Rh. alpina
angustifolia Mill. = Rh. — angustif.
latifolia Mill. = Rh. latif.
ALBERSIA = Amarantus
ascendens Fourr. = A. ascend.
Blitum Kth. = A. ascendens
caudata Boiss. = A. ascendens
deflexa Fourr. = A. deflex.
polygonoides Kth. = A. polygon.
prostrata Kth. = A. deflexus
viridis Montand. = A. ascendens
ALBIZZIA II 7 (474)
Julibrissin Durazz. 7
ALBUCA = Dipcadi
minor Gled. = D. serotinum
ALBUCEA = Ornithogalum
chlorantha Rchb. = O. Boucheanum
nutans Rchb. = O. nutans
ALCEA
pallida Bess. = Althæa pall.
palmata Gilib. = Malva Alcea

Digitized by Google

ALCEA
pinnatifida Gilib. = Malva moschata
rosea L. = Althæa rosea
ALCHEMILLA I 583 (464)
acutidens Buser A 123 (1 α c)
acutiloba Opiz = silvestris
alpestris F. W. Schm. 583 (1 α), A 123
alpina L. 584 (3), A 125
ambigens Verlot (an Jord.?) = flabellata
angustifolia Buser (Hoppeana) = Hoppeana (a)
Aphanes Leers = arvensis
arvensis Scop. 585 (4)
asterophylla Buser = seg.
asterophylla Tausch (alpina) = Hoppeana
Cavillieri Briq. (*vulgar.*) A 123 (1 α f)
cinerea Buser 584 (1 β c)
colorata Buser 584, A 124 (1 β e)
compta Buser A 124 (1 α for.)
conglomerata F. W. Schm. = alpestris
connivens Buser 583 (1 α d) = montana, cfr. A 124
coriacea Buser A 123 (1 α b)
cornucopioides R. et S. 585 (4 γ)
corsica Buser (saxatilis) = seg.
corsica Buser (*transiens*) A 125 (3 β b subf.)
crinita Buser = silvestris
decumbens Buser A 124 (1 α for.)
demissa Buser A 123 (1 α a)
effusa Buser A 124 (1 α for.)
exigua Buser A 125 (1 β for.)
fallax Buser A 125 (1 γ for.)
filicaulis Buser = minor
fissa Guenth et Schm. 584 (1 ζ) = glaberrima, cfr. A 125
fissa × pubescens Brügg. = intermedia
flabellata Buser 584 (1 β b)
flavicoma Buser A 125 (1 γ for.)
frigens Buser A 123 (1 α e)
frigida Buser (non Wedd.) = frigens
glaberrima F. W. Schm. A 125 (1 γ)
glabra Buser = glaberrima
glabra DC. (vulgar.) = glaberrima
glabra Poir. = prec.
glabra Suffr., Neyg. = alpestris
glabrata Tausch = alpestris
glaucescens Wallr. 584 (1 β d)
glomerata Tausch (alpina) = alpina (α)
glomerulans Buser A 124 (1 α for.)
gracilis Opiz = silvestris
grossidens Buser 584 (3 γ b)
helvetica Brügg. = intermedia
heteropoda Buser A 124 (1 α for.)
hirsuta Tausch (minor) = intermedia
ALCHEMILLA I 583 (464)
hirtipes Buser A 124 (1 α for.)
Hoppeana Buser = seg.
Hoppeana Rchb. (*alpina*) 584, (3 β), A 125
hybrida L., F. W. Schm. 584 A 124 (1 β)
hybrida L. (alpina) = prec.
impexa Buser A 124 (1 α for.)
incisa Buser A 125 (1 γ for.)
inconcinna Buser = coriacea
intermedia Clairv. = hybrida
intermedia Hall. f. 584, A 124 (1 β g)
Longana Buser A 124 (1 α for.)
longiuscula Buser A 124 (1 α for.)
major Asch. et Graebn. (*fallax*) A 125 (1 γ subf.)
major Schur (fissa) = prec.
micans Buser A 124 (1 α for.)
microcarpa Boiss. et Reut. 585 (4 β)
minor Buser = pubescens
minor Huds. A 123 (1 α h)
montana All. hb. = Vetteri
montana F. W. Schm. A 124 (1 α n)
montana W. = pubescens
monticola Opiz = silvestris
obtusa Buser A 123 (1 α g)
pallens Buser 584 (3 β c)
palmata Gilib. = vulgaris
pastoralis Buser = silvestris
pentaphyllea L. 584 (2)
pratensis F. W. Schm. A 124 (1 α j)
pseudo - grossidens Asch. et Graebn. (*subsericea*) A 125 (3 γ for.)
psilophylla Borb. = alpestris
pubescens Koch = flabellata
pubescens Lam 584 (1 β a), cfr. A 124
pusilla Buser (non Pomel) = exigua
pyrenaica Duf. = glaberrima
pyrenaica Reverch. = Vetteri
reniformis Buser = obtusa
saxatilis Buser A 125 (3 α')
semisecta Buser A 124 (1 α for.)
sericoneura Buser = major, cfr. A 125
silvestris F. W. Schm. A 124 (1 α m)
sinuata Buser A 124 (1 α for.)
straminea Buser A 124 (1 α for.)
strigosula Buser 583, A 124 (1 α i)
subcrenata Buser 583, A 124 (1 α l)
subsericea Gaud., Koch (vulg.) = pubescens
subsericea Reut. 584 (3 γ), A 125
tenuis Buser A 124 (1 α for.)
transiens Buser 584 (3 β b), A 125
truncata Tausch 583 (1 α e)
trunciloba Buser A 124 (1 α for.)
ALCHEMILLA I 583 (464)
undulata Buser A 124 (1 α for.)
venosula Buser A 125 (1 γ for.)
versipila Buser 583, A 124 (1 α o)
Vetteri Buser 584, A 124 (1 β f)
villosula Gremli (fissa) = intermedia
vulgaris Dum., Buser = pratensis
vulgaris L. 583 (1), A 123
vulgaris W. = alpestris
ALDROVANDA I 530 (444)
vesiculosa L. 530
ALECTOROLOPHUS = Rhinanthus
Alectorolophus Sterneck = R. Alector.
angustifolius Heyn., Sterneck = R. angust.
Beyeri Behrends. = R. - Beyeri
brevifolius Posp. (aristatus) = R. — brevifol.
demissus Behrends. (divaric.) = R. — demiss.
divaricatus Sterneck = R. — divaric.
Freynii Sterneck = R. Freynii
glaber All. = R. ovifugus?
glabratus Wallr. (grandiflor.) = R. major α
goniotrichus Sterneck = R. ovifugus, Burnatii, mediterr.
hirsutus All. = R. Alector. (α)
Kerneri Sterneck = R. — Kerneri
lanceolatus Sterneck = R. lanceol.
major Rchb. p. p. = R. major (α)
major Sterneck = R. major
mediterraneus Sterneck = R. — medit.
medius Rchb. (major) = R. — medius
minor Rchb. p. p. = R. stenophyll.
modestus Sterneck = R. — modest.
neapolitanus Behrends. (Wettstein.) = R. — neapol.
parviflorus Wallr. = R. minor
patulus Sterneck = R. patul.
ramosus Sterneck = R. — divaricatus, arvernensis
serotinus G. Beck, Sterneck = R. - serot.
simplex Sterneck = R. — brevifol.
stenophyllus Sterneck = R. stenoph.
Sterneckii Wettst. = R. Stern.
subalpinus Sterneck = R. subalp.
subalpinus Sterneck (lanceol.) = prec.
Wettsteinii Sterneck = R. Wettsteinii
ALEURITIA = Primula
farinosa Opiz = P. farin.
longiflora Opiz = P. longifl.
ALGA = Zostera
marina Lam. = Z. mar.

Digitized by Google

ALISMA I 160 (169)
angustifolium Gilib. = ranunculoid.
angustifolium Hpe. = stenophyllum?
angustifolium J. S. Presl in Opiz = angustissimum
angustissimum DC. (*Plant.*) A 41 (2 β b)
aquaticum Celak. (arcuat.) = angustissimum
arcuatum Michalet A 41 (2 β)
Bourgæi Nym. = Damason. Bourg.
Damasonium L. = Damason. Alisma
Damasonium W. = terrestre
decumbens Boiss. (Plantago) = arcuatum
diversifolium Gilib. = natans
dubium W. A 41 (1 b)
gramineum C. C. Gmel. = angustissimum
graminifolium Ehrh. in Steud. = seg.
graminifolium Whlnb. (Plant.) 161 (2 c) = angustissim., cfr. A 41
lanceolatum With. p. p., Auct. 161, A 41 (2 β a)
lanceolatum With. p. p. = stenophyllum
latifolium Gilib. A 41 (2 α a)
Læselii Gorsk. in Eichw. = angustissimum
longifolium J. S. Presl = angustissimum
major S. F. Gray = Michaletii
Michaletii Asch. et Graebn. (*Plant.*) A 41 (2 α)
minimum Nym. = Damason. polyspermum
natans L. 161 (nota), A 41 (1 bis)
natans Pollich = angustissimum
parnassifolium Bassi in L. 161 (1), A 41
Plantago L. 161 (2), A 41
Plantago-aquatica L. = prec.
Plantago Michalet = Michaletii
polyspermum Nym. = Damason. polysp.
ranunculoides All. = — stenophyllum
ranunculoides L. 161 (3)
ranunculoides W. (et all.) = natans
reniforme D. Don = parnassifolium
repens Lam., Cav. A 41 (3 b)
sparganiifolium Marss. (ranunc.) = zosterifol.
stellatum Lam. = Damason. Alisma
stenophyllum Asch. et Graebn. (*Plant.*) A 41 (2 α b)
terrestre Fiori (*parnass.*) A 41 (1 c)
zosterifolium Fr. in Koch (*ranunc.*) A 41 (3 c)
ALKANNA II 372 (721)
alba Boiss. = Nonnea alba
Lehmannii DC. f. = tinctoria
ALKANNA II 372 (721)
lutea Moris 372 (2)
tinctoria Tausch 372 (1)
ALLIARIA I 438 (367)
officinalis Andrz. 434, A 92
pumila Goir. (*offic.*) A 92 (b)
ALLIONIA = Oxybaphus nyctaginea Michx. = O. nyct.
ALLIUM I 194 (194)
acre Presl. 202 (nota)
acutangulum Schrad. 200 (21 α), A 207
acutiflorum Lois. = multiflor.
adscendens Ten. = Ampeloprasum
æstivum Tin. 196 (7 β b)
albescens Guss. = Ampeloprasum
albidum J. et C. Presl. (non Fisch.) = pallens
albiflorum Parl. (*acutangul.*) A 207 (21 α b)
albiflorum Vis. (sphæroceph.) = arvense
album Santi = neapolitan.
alpinum DC. (*Schœnopras.*) A 49 (18 b)
alpinum Kth., Parl. (Schœnopras.) = sibiricum
altaicum Pall. = fistulosum
ambiguum DC. = ochroleucum
ambiguum S. et S. = carneum
amblyopetalum Lk. = neapolitan.
amœnum G. Don = carneum
Ampeloprasum L. 195 (3), A 43, 207
Ampelopras. W. et K. = Waldsteinii
Andersonii G. Don = montanum
angulosum DC. = montanum
angulosum L. 200 (21), A 49, 207
angulos. β Pollini = albiflorum Parl.
apenninum Huet = tenuiflorum
appendiculatum Ram. = suaveolens
approximatum Gr. et Godr. = sphæroceph.
arenarium L. = Scorodoprasum (for.)
arvense Guss. 196 (7 β), A 207
Ascalonicum L. 199 (17)
asperum G. Don. 197 (9 γ), A 48
Bertolonii DNtrs. = Ampeloprasum
brachystemon Red. = permixtum
bulbiferum Kth. (roseum) = carneum
bulbilliferum Bicchi (pallens) = oleraceum
bulbilliferum Caruel (pulchellum) = violaceum
bulbilliferum Caruel (roseum) = carneum
bulbilliferum Lor. et Barr. (*sphæroc.*) A 48 (7 α b)
byzantinum C. Koch = Ampeloprasum (α)
calabrum Fiori (*carinat.*) 197 (9 θ)
ALLIUM I 194 (194)
calabrum N. Terr. (pulchell.) = prec.
calcareum M. et K. (acutangul.) = montanum
calcareum Wallr. = prec.
Cambiasii DNtrs. = rotundum (α)
candidissimum Cav. = neapolitan.
candidum Presl = pallens?
capillare Cav. = moschatum
capillare Desf. = maritimum
capsuliferum Koch (flexum) = cirrosum
capsuliferum Koch (*vineale*) 196 (6 c)
carinatum L. 197 (9), A 48, 207
carinatum Pollich etc. = complanatum
carneum Targ.-Tozz. 201 (27 α c)
caucasicum Ker-Gawl. = globosum
Cepa L. 199 (16)
ceratophyllum Bess. = fistulosum
Chamæmoly L. 201 (25)
ciliare Red. = subhirsutum
ciliatum Cyr. = subhirsutum
cirrosumRæusch. = carneum?
cirrosum Vand. A 48, 207 (9 ζ)
Clusianum Retz. = subvillosum
collinum Guss. in Ten. = pallens
coloratum Spr. = cirrosum
commutatum Guss. 196, A 207 (3 γ)
comosum Fiori (*cirrosum*) A 207 9 ζ d)
comosum Goir. (pulchell.) = prec.
compactum Thuill. 196 (6 b)
complanatum Bor. = seg.
complanatum Fr. (*oleracc.*) 197 (10 α b), A 49
confertum Jord. = roseum
consimile Jord. = carinatum
controversum Schrad. = Ophioscorodon (for.)
Coppoleri Tin. = pallens
corbariense Timb. = subhirsutum
cornutum Kit. = descendens
Cowani Lindl. = neapolitan.
crinitum Tausch = arvense
Cupani Guss. Pl. rar. = moschatum
Cupani Raf. 198 (13), A 49
Cyrilli Ten. 202 (31 β)
danubiale Spr. = angulosum (α)
densiflorum DNtrs. = sphæroceph.
dentiferum Webb = pallens (for.)
descendens Koch = capsuliferum
descendens L. 196 (7 δ), A 48
Deseglisei Bor. = sphæroceph.
Dregeanum Kth. = Scorodoprasum
Duriæanum Gay = Ampeloprasum

Digitized by Google

ALLIUM I 194 (194)
effusum Fiori (*cirrosum*) A 207 (9 ζ e)
effusum Goir. (pulchell.) = prec.
eminens Gren. exs. = descendens
ericetorum Thore = suaveolens
esculentum Salisb. = Cepa
fallax Schult. = montanum
fallax β Goir. = niveum
fistulosum L. 199 (15)
flavum L. 197 (9 δ)
flexifolium Jord. = violaceum
flexum Rchb. = violaceum
flexum W. et K. = carinatum (α)
flexuosum Host = carinatum (α)
fœtidum W. = carinatum
foliosum Clar. = sibiricum
Fontanesii Gay = cirrosum
fragrans Cyr. (non Vent.) = Cyrilli
Frivaldzkyanum Kze. = margaritaceum
fuscum W. et K. 198 (10 β c)
Gasparrinii Guss. = Ampeloprasum
Gherardi DNtrs. = sardoum
glaberrimum Moris et DNtrs. (*subhirsut.*) A 207 (26 α b)
glabrum Reg. (subhirsut.) = permixtum
glaucum Richter = montanum
globosum Red. 200 (24), A 49
Gouani G. Don = neapolitan.
gracile Fiori (*cirrosum*) A 48 (9 ζ b)
gracile Posp. (pulchell.) = prec.
græcum Urv. = trifoliatum
graminifolium Lois. = permixtum
graminifolium Pers. = ochroleucum
grandiflorum Lam. = narcissiflor.
guttatum Stev., Urv. = margaritaceum
hemisphæricum Somm. (*Ampelopras.*) A 207 (8 δ)
hirsutum Lam. = subhirsutum
hirto-vaginatum Kth. = Cupani
holmense Mill. = Ampelopras (α)
humile Somm. (*roseum*) A 49 (27 α d)
illyricum Jacq. = roseum
incarnatum Horn. = carneum
insubricum Boiss. et Reut. 199 (20 β)
inodorum W. = angulosum (α)
intermedium DC. = paniculat.
intermedium G. Don = oleraceum
lacteum S. et S. = neapolitan.
lætum Pollini = neapolitan.
latifolium Gilib. = ursinum
laxiflorum Guss. (*sphæroceph.*) A 207 (7 α c)
laxiflorum Tausch = vineale
laxum G. Don = angulosum (α)
leptophyllum Schur = montanum
lineare Ten. (non L.) = Tenorei
lineare β Ten. = margaritaceum
litoreum Bert. = vineale

ALLIUM I 194 (194)
ligusticum DNtrs. 197 (9 ε)
longispathum Red. 198 (10 β b)
lepidum Kth. = paniculat.
lusitanicum Red. = angulosum (α)
lusitanicum Welw. (non Brot.) = alpinum
macrocephalum Kit. = descendens
magicum L. 202 (31 α c)
majale Cyr. 201 (27 α b)
majus Trev. (angulos.) = angulosum (α)
margaritaceum Mœnch = Scorodoprasum
margaritaceum S. et S. 197 (8), A 207
maritimum Raf. 198 (11)
microcephalum Tausch = strictum
microcephalum W. = angulosum (α)
minus Trev. (angulos.) = montanum
mogadorense W. in Kth. = Ampelopras. (α)
Moly L. 202 (nota)
monspessulanum Gouan = multibulbosum
monspessulanum W. = capsuliferum
montanum Bert., Rchb., Vis. = cirrosum
montanum Guss. Pl. rar. = tenuiflorum
montanum Req. exs. = fuscum
montanum F. W. Schm. 200 (21 β), A 49, 207
moschatum L. 198 (14). A 49
moschatum Moris = parciflorum
multibulbosum Jacq. 202 (31 α b)
multiflorum Desf. 195 (4)
multiflorum Ten. = descendens
nanum Asch. et Graebn. (pulchell.) = seg.
nanum Fiori (*cirrosum*) A 48 (9 ζ c)
narcissiflorum Vill. 199 (20)
narcissifolium Lam. = prec.
narcissifolium Scop. = angulosum
neapolitanum Cyr. 201 (28), A 49
nebrodense Guss. 197 (9 θ)
neglectum Wend. = Scorodoprasum
nemorale Salisb. = ursinum
nigrum All. = narcissiflor.
nigrum L. 202 (30)
nitens Sauzè et Maill. = descendens
nivale Fouc. et Mand. (*Schœnopras.*) A 49 (18 d)
niveum Fiori (*montan.*) A 207 (21 β b)
niveum Roth = subhirsutum
oblitum Nym. = pallens
obtusiflorum DC. in Red. = maritim.
ochroleucum W. et K. (23 β)
odorum Kar. et Kir. (non L.) angulosum (α)

ALLIUM I 194 (194)
odorum Ten. = Cyrilli
oleraceum L. 197 (10), A 49
oliganthum Kar. et Kir. = alpinum
Ophioscorodon G. Don 195 (1 b)
oxypetalum G. Don = oleraceum
pallens L. 198 (10 γ)
pallens Rchb. = ligusticum
pallescens Goir. (pulchell.) = valdense
pallidiflorum Rota (*suaveol.*) A 49 (23 α b)
palustre Pourr. = Schœnoprasum
paniculatum All. etc. = cirrosum
paniculatum Host = carinatum
paniculatum L. 198 (10 β)
parciflorum Viv. 198 (12)
parviflorum Desf. = pallens
parviflorum Desv. = arvense
parviflorum Thuill. (non L.) = oleraceum
pauciflorum Fiori (*cirrosum*) A 207 (9 ζ f)
pauciflor. Goir. (pulchell.) = prec.
pauciflorum Gr. et Godr. = parciflorum
pedemontanum W. = narcissiflor.
pendulinum Ten. 202 (29 β)
permixtum Guss. 201 (27 β)
petiolatum Lam. = ursinum
petræum DC. (angulos.) = montanum
petræum Kirschl. = prec.
plantagineum Lam. = Victorialis
polyanthum Schult. et Auct. = scariosum
Porrum L. 195 (3 β)
pratense DC. (angulosum) = angulos. (α ?)
pratense N. Terr. (*sphæroc.*) A 48 (7 α for.)
Preslianum Fiori (rotund.) 196 (5 δ) = commutatum, cfr. A 207
Preslianum Schult. f. = prec.?
pulchellum G. Don 197 (9 ζ) = cirrosum, cfr. A 48
pulchrum Clarke = multibulbosum
pulchrum N. Terr. = seg.
pulchrum N. Terr. (*descendens*) A 48 (7 δ for.)
pumilum Bnge. (Schœnopr.) 199 (18 b) = alpinum, cfr. A 49
purpurascens M. et K. (flavum) = cirrosum
pusillum Cyr. = maritim.
Pylium DNtrs. = Ampeloprasum (for.)
reticulatum Presl = strictum
riparium Opiz = Schœnoprasum
Rollii A. Terr. 196 (7 δ b)
roseum Krock. = sibiricum
roseum L. 201 (27), A 49
roseum Reg. (olerac.) = complanatum

Digitized by Google

ALLIUM I 194 (194)
rotumdum Guss. = commutatum
rotundum L. 195 (5), A 48
rubellum Boiss. (*margaritac.*) 197 (8 b)
rubellum Presl. (non M. B.) = commutatum?
rubellum W. = globosum
sardoum Moris 196 (7 γ)
sativum L. 195 (1)
sativum Tausch (Schœnopras.) = alpinum
Savii Parl. = paniculatum
savranicum Bess. = globosum
saxatile M. B. 200 (24 b), A 49
saxatile Pall. = fistulosum
scabrum Gilib. = oleraceum
scariosum Jan 196 (5 γ)
schœnoprasoides Fr. (sibiric.) = Schœnoprasum
Schœnoprasum L. 199 (18)
Scorodoprasum L. 195 (2), A 48
Scorodoprasum β L. = Ophioscorodon
segetum Jan = descendens
senescens L. p. p. et Auct = angulosum
serotinum Lap. = suaveolens
serotinum Reg. (senescens) = montanum
serotinum Schleich. = montanum
setaceum W. et K. = moschatum
sibiricum L. 199 (18 c)
siculum Ucria 202 (32)
Sieberianum R. et S. = neapolitan.
speciosum Cyr. = multibulbosum
spectabile DNtrs. = Ampeloprasum
sphærocephaloides Fouc. = seg.
sphærocephalum L. 196 (7), A 48, 207
sphærocepb. β Goir. = arvense
spurium G. Don = montanum
stenopetalum Guss. = margaritaceum
Steveni W. in Led. = globosum
strictum Schrad. 200 (22)
suaveolens Duby, Ten. = ochroleucum
suaveolens Gaud. = strictum
suaveolens Jacq. 200 (23), A 49
subalbidum Jord. = majale
subhirsutum L. 201 (26), A 207
subrotundum Gr. et Godr. (sativum) = Ophioscorodon
subvillosum Salzm. 201 (26 γ)
sulcatum Red. = neapolitan.
syriacum Boiss. = Ampeloprasum
szurulense Lerch. = globosum
tauricum Reg. (non Rchb.) (flavum) = ligusticum
Tenorei Parl. (*margaritac.*) A 207 (8 c)
Tenorei Spr. = carneum
tenuiflorum Delastre = arvense

ALLIUM I 194 (194)
tenuiflorum Ten. 198 (10 δ), A 49
tenuifolium Pohl = Schœnoprasum
tenuissimum Habl. = moschatum
thessalum Boiss. = Ampeloprasum
Tinei Presl = permixtum
transsilvanicum Lerch. = montanum
trifoliatum Cyr. 201 (2 6 β)
triquetrum L. 201 (29)
tytthocephalum Schult. = angulosum (α)
uliginosum Kan. = angulosum (α)
univalve Ten. (montan.) = Cupani
ursinum L. 202 (30)
valdense Reut. A 49, 207 (9 ζ for.)
valdensium Nym. = prec.
vernale Tin. = subvillosum
veronense Pollini = sphæroceph.
verrucosum G. Don. = commutatum
Victorialis L. 199 (19)
vineale L. 196 (6)
violaceum Gilib. = Scorodoprasum
violaceum W. 197 (9 β)
virens Lam. = oleraceum (α a)
virescens DC. = prec.
virescens Guss. = margaritaceum
viridi-album Tin. = arvense
viridi-purpureum Parl. (*sphæroceph.*) A 207 (7 α b)
volhynicum Bess. = strictum
Waldsteinianum Schult. = seg.
Waldsteinii G. Don 196 (5 β), A 48
ALLOSORUS I 14 (13)
crispus Bernh. 14 (1), A 7
ALMYRA = Halmyra
ALNASTER = Alnus
fruticosa Ledeb. = A. Alnobetula
viridis Spach = A. Alnobetula
ALNOBETULA = Alnus
viridis Schur = A. Alnobetula
ALNUS I 263 (251)
Alnobetula Hartig A 58, 210 (2)
alpina Borkh. = Alnobetula
ambigua Beck A 58 (X)
argentata Norrlin (incana) = sericea
badensis Lang. = glutin. X incana
barbata C. A. Mey. A 58 (3 d)
Beckii Callier = glutin. X incana
brembana Fouc. = Foucaudii
brembana Rota A 58, 210 (2 γ)
cerifera Hart. = oblongata
communis Desf. = glutinosa
cordata Desf. 264 (1)
cordifolia Ten. = cordata
crispa Pursh = Alnobetula
denticulata C. A. Mey. = oblongata

ALNUS I 263 (251)
elliptica Req. 264 (X)
februaria Kze. = glutin. + incana
Foucaudii Briq. (*Alnobetula*) A 210 (2 β')
fruticosa Rupr. = Alnobetula
glabrescens Spach (incana) = glauca
glauca Ait. (incana) = seg.
glauca Michx. 264 (4 c)
glutinosa Gærtn. 264 (3)
glutinoso X incana 264, A 58
hirsuta Turcz. = incana
hybrida A. Br. = glutin. X incana
incana Medic. 265 (4), A 58
incano X glutinosa A 58
incano X viridis A 58
intermedia Schrad. = glauca
laciniata Regel (incana) = pinnata
laciniata W. (*glutinosa*) 264 (3 b)
lanuginosa Gilib. = incana
microphylla Ces. P. et G. (viridis) = brembana
minor Parl. (viridis) = brembana
Morisiana Bert. = oblongata
neapolitana Savi = cordata
nigra Gilib. = glutinosa
nitens C. Koch = oblongata
oblongata W. (*non Mill.*) 264 (3 c)
ovata Lodd. = Alnobetula
parvifolia Reg. (non Saut.) (viridis) 264 (2 γ) = brembana, cfr. A 58
pinnata Lund. (*incana*) A 58 (4 d)
pinnatifida Spach (glutin.) = laciniata
pinnatifida Whlnb., Spach (incana) 264 (4 d) = pinnata, cfr. A 58
pubescens Sartorelli = incana
pubescens Tausch = glutin. X incana
pumila Ces. (viridis) = brembana
rotundifolia Bert. = cordata
rotundifolia Mill., Stokes = glutinosa
sericea Christ (*incana*) 264 (4 b)
spuria Callier = glutin. X incana
suaveolens Moris = oblongata
suaveolens Req. 264 (2 β)
subargentata Callier (*incana*) A 58 (4 f)
subcordata C. A. Mey. = cordata
subrotunda Callier (*incana*) A 58 (4 e)
subrotunda Spach (glutin.) = oblongata
Tauschiana Callier = glutin. X incana
tirolensis Saut. in Rchb. = glauca
tomentosa Blytt (incana) = sericea

Digitized by Google

ALNUS I 263 (251)
undulata W. = Alnobetula
viridis DC. 264 (2) = Alnobetula, cfr. A 58
vulgaris Pers. = glutinosa
ALOË I 206 (202)
barbadensis Mill. = vera
vacillans Forsk. = vera?
vera L. 206
vulgaris Lam. = vera
ALOPECURUS I 59 (65)
æqualis Sob. = fulvus
agrestis L. 59 (3), A 15
agrestis Ucria = Polypog. monspeliensis
altissimus Schur = pratensis
aquaticus Dum. = pratensis
aristatus Huds. = Polypog. monspeliensis
brachyglossus Peterm. = pratensis
breviaristatus Marches. (*versicolor*) A 15 (3 β b)
bulbosus Gouan., L. 60 (5)
capitatus Lam. = Gerardi
ciliatus All. = Kœleria phleoides
creticus Rchb. (non Trin.) = versicolor
fulvus Sm. 60, A 15 (6 β)
geniculatus L. 60 (6), A 15
Gerardi Vill. 59 (1), A 15
litoreus All. = Kœleria pubescens
maritimus Poir. = Polypogon mar.
monspeliensis L. = Polypogon monspel.
myosuroides Huds. = agrestis
nigricans Auct. (non Horn.) = pratensis
obscurus Schur. = pratensis
pallidus Dum. = pratensis
paludosus Crantz = Polypog. monspeliensis
paludosus P. B. in M. et K. = fulvus
paniceus L. = Polypog. monspeliensis
phalaroides C. Koch = Gerardi
pratensis L. 60 (4)
pronus Mitt. = geniculatus
purpurascens Lk. = versicolor
ramosus Poir. = geniculatus
scaber Opiz = pratensis
sericeus Gærtn. = pratensis
splendens Ten. = Agrostis interrupta
subaristatus Pursh. = geniculatus
tonsus Dum. = pratensis
trivialis Seidl. = pratensis
utriculatus Sol., Pers. 59 (2)
versic lor Biasol. (*agrestis*) A 15 (3 β)
villosus Gilib. = pratensis
villosus Poir. = Gerardi
ALOYSIA = Lippia
citriodora Ortega = L. citriod.
ALSCHINGERA = Physospermum
verticillata Vis. = Ph. aquileg.
ALSINANTHE
biflora Rchb. = Alsine bifl.
ALSINANTHE
biflora Schur = Arenaria bifl.
trinervis Fourr. = Mœhringia trin.
ALSINE I 341 (330)
acutipetala Boiss. (verna) = attica
alpestris Mey. (verna) = Gerardi
alpina Boiss. (rubra) = Spergularia - alp.
alpina Koch (verna) = Gerardi
alpina Wk. = Spergularia - alp.
apetala Mey. = Sagina apet.
Arduini Fenzl = graminifol.
aretioides M. et K. 344 (8) = octandra, cfr. A 69
arvatica Guss. 342 (1 β), A 69
arvensis Crantz = Spergula arv.
attica Boiss. et Sprun. 343 (3 α f)
austriaca Whlnb. 343 (4), A 69
avicularum Lam. = Stellaria media
barbata Stokes = Stellaria media
Barrelieri Bor. = arvatica
Barrelieri Guss. (*tenuifol.*) A 69 (1 α b')
Bartollotti Lojac. (procumb.) = herniariæfol.
Bauhinorum J. Gay = liniflora
bavarica Crantz = Mœhringia Ponæ
biflora Whlnb. 343 (5), A 49
bipartita Gilib. = Stellaria media
brachypetala Fenzl (tenuifol.) = mediterranea
brachypetala Opiz = Stellaria brach.
breviflora Gilib. = viscosa
brevifolia Jord. A 69 (2 α for.)
cæspitosa Guss. (verna) 342 (3 α c) = semiglandulosa, cfr. A 69
cæspitosa Heg. = Gerardi
canaliculata Dulac = Cherleria
Cherleri Gr. et Godr. = seg.
Cherleria Peterm. 344 (9), A 69
Cherleriana St.-Lag. = prec.
cherlerioides Dalla Torre = octandra
cherlerioides Dalla Torre (rupestris) = seg.
cherlerioides Fiori (*lanceolata*) A 70 (10 b)
ciliata Crantz = Arenaria cil.
ciliata Gürke (sedoides) = ciliata Wohlf.
ciliata Mey. (procumb.) = Sagina cil.
ciliata Wohlf. (*Cherleria*) A 69 (9 c)
clandestina Kern. = dalmatica
condensata Fenzl A 69 (3 γ)
condensata Guss. (recurva) = prec.
condensata Koch (lanceolata) 344 (10 b) = cherlerioides, cfr. A 70
ALSINE I 341 (330)
conferta Jord. 342 (1 β b) = mediterr., cfr. A 69
confertiflora Fenzl, Wk. (*tenuif.*) 342 (1 β c)
corollata Fiori (*Cherleria*) 344 (9 b), A 69
corollata Gürke (sedoides) = prec.
Cupaniana Jord. et Fourr. = Stellaria grandiflora
dalmatica G. Beck (*graminifol.*) A 211 (7 b)
dalmatica Guss. (Rosani) = prec.
decandra Schur = Stellaria neglecta
Delastrei Bor. = arvatica
densiflora Posp. = seg.
densiflora Vis. (tenuif.) = confertiflora
diandra Guss. = Spergularia diandra
diffusa Bég. (verna) = latialis
Donii Mey. = Sagina marit.
erecta Crantz = Cerastium erect.
extensa Fiori (*geniculata*) A 70 (11 c)
extensa Gürke (procumb.) = prec.
Facchinii Hausm. 342 (3 α b)
fasciculata Whlnb. 342 (2 β)
fastigiata Bab. = fasciculata
geniculata Strobl 344 (11), A 70
Gerardi Whlnb. 343 (3 α e)
glabella Jord. et Fourr. = Stellaria glabella
glandulifera L. Vacc. (recurva) = rec. b. hispidula
glandulosa Koch (laricifol.) 343 (6 α b) = liniflora
glandulosa Mutel = liniflora
glanduloso-hirta Caudargy (tenuif.) = viscosa
graminifolia J. F. Gmel. 344 (7), A 211
grandiflora Crantz = Arenaria grand.
grandiflora Ten. = Stellaria grand.
grineensis Gr. et Godr. 343 (4 β c)
Helmii Fenzl = Villarsii
herniariæfolia Munby = seg.
herniariæfolia A. Terr. (*geniculata*) 344 (11 b)
herniaioides Rion 344 (8 b)
heterosperma Guss. = Spergularia media
hirsuta Ducomm. (*Villars.*) A 69 (4 β b)
hirsuta Vis. (graminifol.) = graminifol.
hispida Venetz (*recurva*) A 69 (3 β for.)
hispidula Gürke (*recurva*) A 69 (3 β b)
hybrida Jord. 342 (1 α c)
incana Gürke (*liniflora*) A 69 (6 β b)
intermedia Rouy et Fouc. (tenuif.) = hybrida

Digitized by Google

ALSINE I 341 (330)
intricata Martr.-Don. = Barrelieri
Jacquini Koch = fasciculata
Jacquiniana St.-Lag. = prec.
Kitaibelii Nym. 343 (6 α c)
lanceolata M. et K. 344 (10), A 70
Langii G. Reuss = laricifolia
laricifolia Crantz 343 (6), A 69
laricifolia Gren. = liniflora
latialis A. Terr. (*verna*) A 69 (3 α for.)
laxa Jord. A 69 (1 α for.)
laxa Koch (lanceolata) = lanceol. (a)
liniflora Heg. 343 (6 β), A 69
Linnæi Jessen = Sagina Linn.
macrocarpa G. Beck (verna) = verna (a)
macrocarpa Gürke (laricifol.) = Kitaibelii
macrocarpa Maly (non Fenzl) = Kitaibelii
marginata C. A. Mey. = Spergularia media
marginata Schreb. = Spergula pentandra
marina M. et K. = Spergularia mar.
maritima Boiss. et Heldr. (tenuif.) = mediterr.
maritima Jessen = Sagina mar.
media L. = Stellaria med.
mediterranea Maly A 69 (1 β b)
minor Koch (marina) = Spergularia mar.
Mœhringia Crantz = Mœhr. muscosa
montana Fenzl (verna) = verna (a)
mucronata Boiss. (tenuif.) = mediterr.
mucronata L. 242 (2), A 69
mucronata Maly etc. = arvatica
mucronata Mey. (saginoides) = Sagina sabulosa
mucronata Poir. = fasciculata
multicaulis Crantz = Arenaria mult.
nana Ducomm. (*recurva*) A 69 (3 β c)
neglecta Schur = Stellaria negl.
nemorum Schreb. = Stellaria nem.
nivalis Fenzl (verna) = subnivalis
nivalis Simonk. = prec.
nodosa Crantz = Sagina nod.
obesior Koch (marina) = Spergularia media
octandra Kern. A 69 (8)
pallida Dum. = Stellaria pall.
pentandra Crantz = Spergula pent.
petræa Jord. 342 (2 α b)
polycarpa Crantz = Polycarpon tetraphyllum
procumbens Crantz = Sagina proc
procumbens Fenzl = geniculata
puberula Neilr. (laricifol.) = laricifolia (α)

ALSINE I 341 (330)
pubescens Guss. (*verna*) 343 (3 α d)
radicans Guss. = Spergularia rad.
ramosa Beauverd (*recurva*) A 69 (3 β a (subf.)
recurva Whlnb. 343 (3 β), A 69
rhaetica Brügg. (*verna*) A 69 (3 α for.)
Rionii Gremli (aretioides) = herniarioides
Rosani Guss. = graminifol.
rostrata Fenzl, Koch = mucronata
rubra Crantz = Spergularia rubra
rubra C. A. Mey. = Spergularia diandra
rupestris Fenzl = lanceolata
saginoides Crantz = Sagina Linnæi
saxatilis Whlnb. = Gerardi
scabra Stokes = Stellaria holost.
sedoides Kit. (non Froel.) = Cherleria
segetalis L. = Spergularia seg.
Seguieri Turra ex Sacc. = quid?
semiglabra Vis. (graminifol.) = dalmatica
semiglandulosa Strobl (*verna*) A 69 (3 α c)
serpyllifolia Crantz = Arenaria serp.
setacea Auct. it. (non M. et K.) = verna
Skopili Vel. = liniflora
stenocarpa Fenzl (tenuif.) = laxa
striata Crantz = liniflora
striata Gren. = laricifolia
subnivalis Heg. A 69 (3 α g)
subulata Jessen = Sagina sub.
subulifolia Guss. 342 (1 α b)
succosior M. et K. (marina) = Spergularia media
tenella Fenzl (tenuif.) = viscosa
tenella Fuss = verna
tenuifolia Crantz 342 (1), A 69
trichocalycina Ces. P. et G. (non Heldr. et Sart.) = mucronata
trinervia Crantz = Mœhringia trin.
triquetra Sacc. (*tenuif.*) 342 (1 α e)
uliginosa Hoffm. = Stellaria ulig.
uliginosa Vill. = Malachium aquat.
umbellata Lam. = Holosteum umb.
uniflora Beauverd (*recurva*) A 69 (3 β c subf.)
unilateralis Mœnch = Spergularia segetal.
Valonii Burn. (*Villars.*) A 69 (4 β for.)
verna Whlnb. 342 (3), A 69
Villarsiana Rouy et Fouc. (laricifol.) = Kitaibelii

ALSINE I 341 (330)
Villarsiana St.-Lag. = prec.
Villarsii M. et K. 343 (4 β), A 69
villosula Koch (Villars.) 343 (4 β b) = hirsuta, cfr. A 69
viscida Gr. et Godr. (tenuif.) = viscosa et hybrida
viscidula Guss. (tenuif.) = hybrida
viscosa Boiss. (tenuif.) = hybrida
viscosa Schreb. 342 (1 α d)
vulgaris Mœnch = Stellaria media
ALSINELLA = Alsine et Arenaria
biflora Sw. = Als. bifl.
ciliata S. F. Gray = Aren. cil.
erecta Mœnch = Cerastium erect.
trinervis S. F. Gray = Mœhringia trin.
serpyllifolia S. F. Gray = Aren. serpyll.
viscosa Hartm. = Als. viscosa
Wallichiana Benth. = Stellaria media
ALTERNANTHERA A 66 (305 bis)
Achyrantha R. Br. = repens
repens Steud. A 66
ALTHÆA II 261 (641)
cannabina L. 262 (2), A 159
corsica Fouc. et Mand. (*offic.*) 262 (3 α b)
ficifolia S. et S. (non L.) = Sibthorpii
hirsuta L. 261 (1)
narbonensis Pourr. 262 (2 β)
officinalis L. 262 (3)
pallida W. et K. 262 (5)
rosea Cav. 262 (4)
Sibthorpii Boiss. (*rosea*) 262 (4 b)
taurinensis DC 262 (3 β)
ALTHENIA I 156 (159)
filiformis F. Petit 156
setacea Del. = filiform.
ALUS = Coris
mediterranea Bub. = C. monspeliensis
ALYSSUM I 455 (392)
affine Ten. 456 (2 α c)
alpestre Brot. = serpyllifol.
alpestre Gér. = Gerardi
alpestre L. 457 (6), A 98
alpestre Salis, Moris = Robertianum
alpestre Wulf. = Wulfenianum
alpinum Scop. = Cochlearia saxatil
alsinaefolium Host = calycinum
alyssoides L. = calycinum
arenarium Presl = maritimum
argenteum All., Vitm. 456 (3), A 212
atlanticum Ces. P. et G. (non Desf.) = Wulfenianum
Aucheri Boiss. = foliosum
Bertolonii Desv. = argenteum
brigantiacum Jord. et Fourr. 457 (7 b)
calycinum L. 457 (11)
campestre L. 457 (10), A 98

Digitized by Google

ALYSSUM I 455 (392)
cheiranthifolium W. = Farsetia clypeata
chrysanthum Boiss. = argenteum
ciliatum Lam. = Draba aizoides
clypeatum L. = Fibigia clyp.
collicolum Rouy et Fouc. (montan.) = collinum
collinum Brot. = campestre
collinum Jord. et Fourr. A 98 (7 e)
compactum DNtrs. = foliosum
corsicum Duby 456 (4)
corsicum Robert = Robertianum
cuneifolium Ten. 457 (8)
deltoideum L. = Aubrietia delt.
densiflorum Lge. (*marit.*) 458 (14 b)
dentatum W. = Chamælina dent.
diffusum Ten. 457 (7 d)
edentulum W. et K. 456 (2 β b)
flexicaule Jord. = cuneifolium
foliosum Batt. (montan.) = pedemontan.
foliosum Bory et Chaub. 457 (12)
fulvescens S. et S. 457 (9)
gemonense L. = petræum
gemonense M. et K., Ten. = saxatile
Gerardi Rouy et Fouc. (*alpestre*) 456 (6 d)
glemonense = gemonense L.
halimifolium L. = maritim.
halimifolium W.?, DC. 458 (16)
incanum Boiss. (alpestre) = serpyllifol.
incanum L. 458 (17)
Jonthlaspi Clairv. = Clypeola Jonthl.
lejocarpon Viv. hb. = fulvescens
leucadeum Guss. 456 (2 α b)
marginatum Timb. G. et J. (montan.) = diffusum
maritimum Lam. 458 (14)
medium Host = petræum
medium Posp. = saxatile
microcarpum Neilr. = petræum
minimum L. = maritimum
minimum W. 458 (13)
minutulum Schleich. = alpestre
montanum Brot. = campestre
montanum L. 457 (7), A 98
murale W. et K. = argenteum
mutabile Vent. 458 (18)
myagroides All. = Cochlearia saxatil.
Myagrum Wibel = Chamælina sativa
nebrodense Bert. p. p. = Robertianum
nebrodense Tin. = serpyllifol.
obliquum S. et S. 458 (1 8 b)
obtusifolium Stev. = argenteum
Œderi Durand = Vesicaria utric.
orientale Ard. 456 (2 α d)
orophilum Jord. et Fourr. = pedemontan.
ovirense Kern. = Wulfenianum

ALYSSUM I 455 (392)
paniculatum W. = Neslea panic.
parviflorum M. B. = campestre
parviflorum Schloss. = calycinum
pedemontanum Rupr. 457 (7 c)
petræum Ard. 456 (2 β)
repens Baumg. = montanum
Robertianum Bern. 456 (5)
rupestre Ten. 458 (15)
rupestre W. = Cochlearia saxatil.
sativum Scop. = Chamælina sat.
saxatile Crantz = petræum
saxatile L. 456 (2)
saxatile Paol. (*alpestre*) 456 (6 c)
saxicolum Rouy et Fouc. (alpestre) = prec.
serpyllifolium Desf. 456 (6 b)
siculum Jord. = campestre
sinuatum L. 455 (1), A 98
spinosum Re (non L.) = halimifol.
subtumidum Boiss. = foliosum
suffruticulosum N. Terr. (*campestre*) A 98 (10 b)
tortuosum W. et K. = serpyllifol.
utriculatum L. = Vesicaria utric.
Vesicaria L. = Vesic. utriculata
vesicarioides Andrz. = petræum
viride Tausch 458 (17 b)
Vivianii DNtrs. = fulvescens
Wulfenianum Bernh. 457 (8 b)
AMARANTUS I 320 (304)
albus L. 322 (8), A 66
arenarioides Goir. (*deflexus*) A 66 (11 b)
ascendens Lois. 322 (10)
Berchtoldi Seidl. = græcizans
blitonius St.-Lag. = ascendens
Blitum L. = ascendens et silvester
Blitum Moq. = græcizans
campanus N. Terr. = gangeticus
caudatus L. 321 (2)
chlorostachys W. 321 (3 β)
crispus N. Terr. 322 (9)
cruentus L. 321 (5 b)
cuspidatus Vis. = gangeticus
deflexus L. 323 (11), A 66
Delilei Richt. et Loret = patulus
diffusus Dulac = ascendens
emarginatus Salzm. = ascendens
flexuosus Ambrosi = ascendens
gangeticus L. 322 (6 β)
glomeratus Posp. 323 (nota)
græcizans L. 322 (7)
hypochondriacus L. 321 (4), A 66
incurvatus Gr. et Godr. 321 (3 γ b)
intermedius Guss. = chlorostachys
laxiflorus Comell. ex Pollini = patulus

AMARANTUS I 320 (304)
litoralis Bernh. = ascendens
litoralis Horn. = albus
mangostanus L. = gangeticus
maximus Mill. = caudatus
melancholichus L. 322 (6 α b)
morosus Rchb. = chlorostachys
pallidus M. B. = græcizans
paniculatus L. 321 (5), A 66
parviflorus Moq. (*albus*) A 66 (8 b)
patulus Bert. 321 (3 γ)
polygonoides L. 323 (12)
prostratus Bell. in Balb. = deflexus
proteus Zum. = græcizans
retroflexus L. 321 (3)
retroflexo × silvester Freyn = patulus, cfr. 321 (nota)
ruderalis Koch = ascendens
sanguineus L. 321 (5 c), A 66
silvester Desf. 322 (7 b)
spicatus Lam. = retroflexus
spicatus Rchb. = patulus
spinosus L. 320 (1
strictus Ten. = retroflexus
tenuifolius Roxb. = græcizans
Timeroyi Jord. = patulus
tricolor L. 321 (6)
trivialis Rota = patulus
viridis All. = græcizans
viridis L. = ascendens et silvester
AMARYLLIS A 50
ætnensis Raf. = Sternbergia ætn.
Belladonna L. A 50
citrina Ker-Gawl. = Sternbergia sicula
Clusiana Ker-Gawl. = Sternbergia colchiciflora
colchiciflora Ker-Gawl. = Sternbergia colch.
lutea L. = Sternbergia lutea
minor Ten. (lutea) = Sternbergia ætnensis
pudica Ker-Gawl. = Belladonna
rosea Lam. = Belladonna
AMBERBOA = Centaurea
Lippii DC. = C. Lippii
subdiscolor Lojac. (Lippii) = Lippii, cfr. A 187
AMBLOGYNA = Amarantus
polygonoides Raf. = A. polyg.
AMBRINA = Chenopodium
ambrosioides Spach = C. ambr.
Botrys Moq. = C. Botr.
pinnatisecta Spach = Roubiæva multif.
AMBROSIA III 304 (900)
maritima L. 304
AMBROSINIA I 150 (153)
angustifolia Guss. (*Bassii*) 150 (b)
Bassii L. 150
maculata Ucria 150 (c)
nervosa Lam. = Bassii
reticulata Tin. 150 (d)
AMELANCHIER I 597 (470)
Amelanchier Karsten = vulgaris
cretica DC. 597, A 134 (c)
floccosa Strobl (vulg.) = cretica

Digitized by Google

AMELANCHIER I 597 (470)
glabriuscula Strobl (*vulg.*) A 134 (a)
macrocarpa Goir. (*vulg.*) A 134 (d)
ovalis Medic. (non Lindl.) = vulgaris
rotundifolia C. Koch = vulgaris
tomentosa Goir. (*vulg.*) A 134 (b)
villosiuscula Strobl (vulg.) = tomentosa
vulgaris Mœnch 597, A 134
AMELIA = Pirola
media Alef. = P. media
minor Alef. = P. minor
AMMANNIA II 127 (525)
ægyptiaca Paol. (verticill.) 128 (β) = seg., cfr. A 145
ægyptiaca W. A 145 (bacc. β)
baccifera Arc. = ægyptiaca
baccifera L. A 145
baccifera Pollini = verticillata
Boræi Guép. = Peplis Boræi
borystenica DC. = Peplis borysth.
caspica M. B. = verticillata
elatior Goir. (*verticill.*) A 145 (b)
filiformis Baill. = Rotala filif.
pumila Goir. (*verticill.*) A 145 (c)
salicifolia Monti = verticillata
verticillata Lam. 128, A 145
AMMI II 159 (548)
crinitum Guss. 160 (2)
daucifolium Scop. = Seseli — daucifol.
diversifolium Noulet = majus
glaucifolium Lap. = intermedium
glaucifolium L. 159 (1 c)
intermedium DC. 159 (1 b)
majus L. 159 (1)
resiniferum N. Terr. (*Visnaga*) A 151 (2 b)
serratum Mutel (majus) = majus (a)
Visnaga Lam. 159 (2), A 151
AMMOPHILA = Psamma
arenaria Lk. = Ps. aren.
arundinacea Host = Ps. arenaria
australis Porta et Rigo = Ps. austr.
AMONIA = Agrimonia
agrimonioides Nestl. = A. agrim.
AMOREA = Cycloloma
platyphylla Del. = C. plat.
AMOREUXIA = Cycloloma
platyphylla Moq. = C. plat.
AMORIA = Trifolium
calycina C. Presl = T. Bivonæ
macropoda Presl = T. macrop.
Micheliana Presl = T. nigrescens
AMORPHA II 87 (501)
fruticosa L. 87
AMPELODESMA I 66 (79)
bicolor Kth. 66 (β), A 17
effusus Steud. A 17 (α b)
mauritanicus Durand et Schinz = tenax
AMPELODESMA I 66 (79)
tenax Lk. 66, A 17
AMPELOPSIS = Parthenocissus
hederacea DC. = P. quinquefolia
quinquefolia Michx. = prec.
AMYGDALUS = Prunus
amara Hayne = P. — amara
amygdalina Oker = P. Amygd.
Amygd.-Persica Spach. (comm.) = P. Amygd. × Pers.
Armeniaca Dum. = P. Armen.
communis L. = P. Amygd.
comm. β L. = P. — dulcis
comm. γ L. = P. — amara
dulcis Mill. = P. — dulcis
elata Salisb. = P. Amygd.
fragilis Borkh., Hell. = P. — fragil.
grata Salisb. = P. Persica
hybrida Dierb. = P. Amygd. × Persica
levis Dietr. = P. — Nuci-persica
nectarina Ait. (Persica) = P. — Nuci-persica
Nuci-persica Rchb. = P. — Nuci-pers.
Persica L. = P. Persica
Persica β L. = P. — Nuci-persica
Persico-amygdala Rchb. = P. Amygd. × Pers.
persicoides C. Koch = prec.
persicoides Ser. (comm.) = prec.
prostrata Sweet = P. prostr.
sativa Mill. = P. Amygdalus
ANACAMPSEROS = Sedum
Cepæa W. = S. Cepæa
corsica Jord. et Fourr. = S. — corsic.
maxima Haw. = S. max.
purpurea Haw. S. purpur.
sempervirens Haw. = S. Anacampseros
stellata Haw. = S. stellatum
triphylla Haw. = S. Telephium
vulgaris Haw. = S. Telephium
ANACAMPTIS = Orchis
Brancifortii Lindl. = O. Branc.
pyramidalis Rich. = O. pyr.
pyramid. b. Parl. = O. pyram. b. albiflora
quadripunctata Lindl. = O. quadr.
ANACHARIS I 158 = Helodea, cfr. A 40
Alsinastrum Bab. = H. canadensis
canadensis Planch. 158 = H. canad., cfr. A 40
Nuttalii Planch. = H. canad.
ANACYCLUS III 260 (873)
aureus Lam. = Matricaria aurea
Barrelieri Guss. = Anthemis Barr.
clavatus Pers. 261 (2)
creticus L = Anthemis cretica
discoideus Chiov. (*radiat.*) 261 (1 β)
discoideus Guss. (*clavatus*) 261 (2 γ)
glabrus Huter P. et R. (*toment.*) 261 (2 β b)
ANACYCLUS III 260 (873)
marginatus Guss. (toment.) = pubescens
mucronulatus Guss. = Anthemis mucr.
pallescens Guss. 261 (1 α b)
pedunculatus Pers. 261 (nota), A 185
pubescens Rchb. 261 (2 β c)
purpurascens DC. 261 (1 α c)
radiatus Groves hb. = tomentosus
radiatus Lois 261 (1)
tenuisectus Fiori (*pedunc.*) A 185
tomentosus DC. 261 (2 β)
valentinus L. 261 (*nota*)
ANAGALLIDASTRUM = Centunculus
exiguum Bub. = C. minimus
ANAGALLIS II 324 (684)
angustifolia Salisb. = linifolia
aquatica Erndl. = Samolus Valerandi
arabica Duby = phœnicea
arvensis L. 324 (1)
cærulea Schreb. 324 (1 β)
cærulea var. β Bert. = tenuifolia
carnea Schank = phœnicea
Centunculus Afzel. = Centunc. minimus
collina Schousb. 324 (2 b)
crassifolia Thore 325 (3)
erecta Mœnch = linifolia
fœminea Mill. = arvensis
fruticosa Vent. = collina
grandiflora Andr. = linifolia
hispanica Samp. = Monelli
indica Sweet = arvensis
latifolia L. 324 (1 γ)
linifolia L. 325 (2)
longicaulis Lazaro = Monelli
maritima J. G. Gmel. = Samolus Valerandi
mas Vill. = arvensis
micrantha Gr. et Godr. (*arvens.*) 324 (1 δ)
Monelli L. 325 (2 c)
palustris Man. = tenella
parviflora Hoffmgg. et Lk. 324 (1 ε)
parviflora Lois. = arvensis
parviflora Salzm. et Auct. it. = micrantha
Philipsii Hort. = linifolia
phœnicea Scop., All. 324 (1 α)
pulchella Salisb. = arvensis
punctifolia Stokes = arvensis
pusilla Salisb. = Centunculus minimus
repens DC. = phœnicea
repens Pomel = tenella
rubriflora Batt et Trab. (linifol.) = collina
serpyllifolia Dum. = tenella
tenella L. 325 (4), A 163
simplex Duby (parvifl.) = micrantha
tenuifolia Fiori (*cærul.*) 324 (1 β b)
verticillata All. 324 (1 β c)
Willmoreana Curtis (Monelli) = Monelli

Digitized by Google

ANAGYRIS II 9 (479)
fœtida L. 9
neapolitana Ten. 9 (b)
ANAGZANTHE = Lysimachia nemorum Baudo = L. nem.
ANARRHINUM = Simbuleta bellidifolium Desf. = S. bellid.
corsicum Jord. et Fourr. = S. laxiflora
laxiflorum Boiss. = S. laxifl.
Linnæanum Jord. et Fourr. = S. bellidifol.
ANASTATICA = Euclidium hierochuntica Crantz (non L.) = E. syriacum
syriaca L. = E. syriac.
ANCHUSA II 374 (724)
ægyptiaca Maly = Lycopsis variegata
aggregata Lehm. 376 (8)
amplexicaulis S. et S. = hybrida
angustata Fiori (*undul.*) 376 (6 α c)
angustifolia Guss. (*ital.*) 375 (3 b)
angustifolia L. 375 (5 b)
angustifolia S. et S. = ochroleuca
arvalis Rchb. = officinalis
arvensis M. B. = Lycopsis arv.
arvensis Moris = litorea
arvensis Tausch = officinalis
azurea Mill. = italica?
Barrelieri Vitm. 374 (2)
biceps Vest = officinalis
Capellii Moris 376 (6 α b)
Cesatiana Fenzl = Pulmonaria mollis
crispa Moris = litorea
crispa Viv. 376 (6 γ)
crispata Presl = undulata (α)
granatensis Lge. = hybrida
humilis Ten. (*ital.*) 375 (3 c)
hybrida Ten. 376 (6 β)
hybrida var. B Ten. = subintegrifolia
italica Retz. 375 (3)
laxiflora DC. = Borrago laxiflora
lejosperma Bory = Nonnea obtusifol.
leptophylla Koch (non R. et S.) = angustifol.
litorea Moris 376 (7)
longifolia Lam. 376 (nota)
lutea Bert. (non Alior.) = Alkanna lutea
nigricans Brot. = Nonnea vesicaria
obtusifolia Caruel = Nonnea obt.
ochroleuca M. B. 375 (4)
officinalis Brot. = italica
officinalis L. 375 (5), A 167
paniculata Ait. = italica
parviflora S. et S. (non W.) = aggregata
rosea Marches. (*ochroleuca*) 375 (4 b)
sempervirens L. 374 (1)
setosa Caruel = Nonnea set.
subintegrifolia Fiori (*hybrida*) 376 (6 β b)
ANCHUSA II 374 (724)
tinctoria Desf. (an L.?) = Alkanna tinct.
tinctoria L. = Cynoglossum cheirifolium?
undulata L. 376 (6)
undulata var. B Ten. = angustata
variegata Lehm. = Lycopsis varieg.
ventricosa S. et S. (non Viv.) = Nonnea ventr.
vesicaria Caruel = Nonnea vesicaria
verrucosa Rchb. = Lycopsis variegata
ANDRACHNE II 290 (649)
telephioides L. 290
ANDROMEDA II 303 (667)
cærulea L. = Phyllodoce cær.
polifolia L. 303
taxifolia Pall. = Phyllodoce cærulea
ANDROPOGON I 44 (42)
Allionei DC. = Heteropog. Allionei
ambiguus Genn. = pubescens
angustifolius Presl = panorm.
angustifolius Sm. = Ischæmon
Arduini Kœrn. (Sorghum) = Sorgh. vulgare (α)
arundinaceus Scop. = Sorghum halep.
avenaceus Humb. et Kth. = Sorgh. halepense
Bellardi Bub. = Heteropog. Allionei
campanus Asch. et Graebn. (Sorghum) = Sorgh. camp.
campanus Hack. (halep.) = prec.
cernuus Roxb. = Sorgh. cern.
compactus Brot. = Sorgh. cernuum
contortus L. p. p., All. = Heteropog. Allionei
distachyus L. 44 (1), A 13
Durrha Hack. (Sorghum) = Sorgh. — Durrha
giganteus Ten. = pubescens
Gryllus L. = Chrysopog. Gryl.
halepensis Brot., S. et S. = Sorgh. halep.
hermaphroditus Pourr. = Stipa Aristella
hirtus L. 44 (2), A 13
intermedius Genn. (non R. Br.) = quid?
ischæmon L. 44 (3), A 13
lejostachyus Hack. (halep.) = Sorgh. — lejost.
longearistatus Wk. (hirtus) = pubescens
messanensis Biv. = Heteropog. — secundus
muticus Hack. (halep.) = Sorgh. — muticum
niger Kœrn. (Sorghum) = Sorgh. nigrum
obovatus Hack. (Sorghum) = Sorgh. — obov.
paniculatus Lam. = Chrysopog. Gryllus
panormitanus Parl. 45 (4)
ANDROPOGON I 44 (42)
pertusus W. p. p. = panormitanus
podotrichus Hochst. 44 (2 γ), A 13
pubescens Vis. 44 (2 β)
Ravennæ L. = Sacchar. Raven.
rubens Hack. (Sorghum) = Sorgh. — rubrum
rubricinctus Gandgr. A 13 (3 for.)
saccharatus Kth. = Sorgh. sacchhar.
sativus Hack. (Sorghum) = Sorgh. vulgare
secundus W. = Heteropog. sec.
Sorghum Brot. = Sorgh. vulgare
technicus Kœrn. (Sorghum) = Sorgh. — techn.
strictus Host = Saccharum strict. Spr.
ANDROSACE II 317 (677)
affinis Bir. 319 (7 α b)
alpina Gaud. = pubescens
alpina Lam. 317 (1), A 162
apennina Huet = Mathildæ
Aretia Vill. = alpina
aretioides Gaud. (*obtusifol.*) 319 (7 α c)
aretioides Heer = prec.
argentea Lap. = imbricata (α)
articulata Schur = villosa
australis Fiori (*villosa*) 319 (4 α b)
Bocconei Hort. = nana
brevifolia Vill. = septentrionalis
brigantiaca Jord. et Fourr. = carnea (for.)
bryoides DC. = helvetica
capitata W. = villosa
carnea L. 319 (6)
Chaixii Gr. et Godr. 320 (8 β)
Chamæjasme W. 319 (4 β)
Chamæjasme Wulf. = obtusifolia
Charpentieri Heer 318 (1 γ)
Diapensia Vill. = helvetica
elongata L. 320 (8 γ)
farinosa Spr. = Primula farin.
glacialis Hpe. = alpina (α)
Hausmanni Leyb. 318 (1 ζ), A 162
Heerii Koch 318 (3 β)
helvetica All. = imbricata
helvetica Gaud. 318 (3)
heterophylla Ardissone A 162
imbricata Lam. 318 (2)
Lachenalii C. C. Gmel. = obtusifolia
lactea L. 319 (5), A 162
lactea Vill. = obtusifolia
lactiflora Kar. et Kir. (non Pallas) = septentr.
latifolia Ledeb. (villosa) = Chamæjasme
leucantha Coss. (carnea) = carnea (for.)
Lehmanniana Spr. = Chamæjasme
linearis Graham = septentr.
longiscapa C. Koch = Chamæjasme

Digitized by Google

ANDROSACE II 317 (677)
lutea Lam. = Douglasia Vitaliana
Mathildæ Levier 318 (1 η)
maxima L. 320 (9)
multiflora Lam. = septentr.
multiflora Steud. 318 (2 β)
nana Horn. 320 (8 γ)
obtusifolia All. 319 (7)
odoratissima Schreb. = villosa
Pacheri Leyb. = Wulfeniana
pauciflora Vill. = lactea
pedemontana Rchb. f. 319 (7 β)
penicillata Schott, Nym., Kotschy = villosa
pedunculata Clairv. 317 (1 β)
pennina Gaud. = alpina (α)
primuloides Mœnch = Cortusa Matthioli
puberula Jord. et Fourr. = carnea (for.)
pubescens DC. 318 (1 ε)
rosea Jord. et Fourr. = carnea
Reverchoni Jord. et Fourr. = carnea
septentrionalis L. 320 (8)
septentrionalis Vill. = Chaixi
Tauscheri Gaud. = maxima
tomentosa Schl. 318 (2 α b)
Turczaninowii Freyn = maxima
villosa Jacq. = Chamæjasme
villosa L. 319 (4), A 162
Vitaliana Lap. = Douglasia Vital.
Wulfeniana Koch 318 (1 δ)
ANDROSÆMUM = Hypericum
calycinum Presl = H. calyc.
fœtidum Spach ex Wk. et Lge. = H. hircinum
hircinum Spach = H. hirc.
officinale All. = H. Androsæm.
vulgare Gærtn. = H. Andros.
ANDRYALA III 426 (953)
angustifolia DC. (integrifol.) = tenuifol.
Carbonaria Genn. hb. (sinuata) = serotina
chondrilloides Scop. = Crepis chondr.
corymbosa Lam. 426 (1 α)
corymbosa Wk. (integrifol.) = prec.
cossyrensis Guss. 427 (1 ζ)
dentata Groves = undulata
dentata S. et S. 427 (1 ε), A 193
incana DC. 427 (2 β)
integrifolia Huter P. et R. = undulata
integrifolia L. 426 (1), A 193
integrifol. B Ten. = dentata
lanata L. = Hieracium lanat.
lanata Vill. = integrifolia (α?)
longipes E. Petit (integrifol.) A 193 (1 var.)
lyrata DC. (tenuifol.) = cossyrensis
minuta Lojac. A 193 (1 ε for.)
nemausensis Vill. = Pterotheca nemausens.
nudicaulis Lam. = Pterotheca nemausens.
parviflora Lam. p. p. = sinuata
ANDRYALA III 426 (953)
pontana Vill. = Crepis pont.
ragusina L. 427 (2)
serotina Huter P. et R. 426 (1 γ b)
sinuata Huter P. et R. = dentata
sinuata L. 426 (1 β)
sinuata Ten. = undulata?
tenuifolia DC. 426 (1 δ)
undulata Presl 426 (1 γ)
ANEMAGROSTIS = Agrostis
interrupta Tin. = A. interrupta
Spica-venti Trin. = A. Spica-venti
ANEMANTHUS = Anemone
nemorosus Fourr. = A. nemor.
ranunculoides Fourr. = A. ran.
ANEMONANTHEA = Anemone
apennina S. F. Gray = A. apenn.
nemorosa S. F. Gray = A. nemor.
ranunculoides S. F. Gray = A. ranunc.
ANEMONE I 494 (425)
aconitifolia Turcz. = narcissiflora
acutiflora Spach (hortens.) = pavonina
acutipetala Schleich. = Pulsatilla
acutiuscula Pritz. (Hepatica) = Hepatica (a)
alba Gilib. = nemorosa
alba Goaty et Pons = albiflora Rouy et Fouc.
alba Gürke (Hepatica) A 104 (14 d)
alba Kern. = seg.
alba Koch (alp.) = alpina (α)
albida Mariz = trifolia
albiflora Lenticchia (Hepatica) = Hepat. d. alba
albiflora Lojac. (hortens.) A 104 (12 α c)
albiflora Rouy et Fouc. 497 (13 e)
albiflora Strobl (apennina) A 103 (5 b)
alborosea Gilib. = vernalis
alpicola Rouy et Fouc. (alp.) = alpina (α)
alpina Lam. = Burseriana
alpina L. 494 (1), A 103
alpina β L. = Burseriana
alpina γ L. = alpina (α)
alpina Scop. = baldensis
alpina Val de Lièvre (baldens.) A 104 (9 for.)
angustifolia Bogenh. (Pulsat.) = Pulsat. (α)
apennina L. 496 (5), A 103
apiifolia Scop. 494 (1 β b)
asarifolia Blytt (Hepatica) = multiloba
baldensis Lam. = alpina (α)
baldensis L. 496 (9), A 104, 213
bicolor Bess. (Pulsat.) = Pulsat. (α)
biflora Gross (trifol.) A 104 (8 d)
biflora Peterm. (ranuncul.) A 103 (6 b)
ANEMONE I 494 (425)
bolzanensis Gürke = montano × vernalis
Burseriana Scop. 494 (1 α b)
cærulea Fisch. = Pulsatilla
cærulea Lam. = apennina
cærulea Post (coronaria) = cyanea
cærulescens Hausm. (trifol.) A 104 (8 c)
campaniflora Stokes = pratensis
coccinea Jord. 497 (13 a)
collina Salisb. = Pulsatilla
coronaria L. 497 (13), A 104
coronarioides Hanry = cyanea
cyanea Risso 497 (13 c)
cylindriflora Pritz. (pratens.) = pratensis
dubia Bell. 495 (4 b)
flava Gilib. = ranuncul.
flavescens DC. (alp.) = sulfurea
flemmensis Scop. = alpina?
fragifera Wulf. = baldensis
fulgens J. Gay 497 (12 β), A 104
glacialis Clairv. = Halleri
grandiflora Blytt, Rouy et Fouc. (nemor.) A 104 (7 c)
grandiflora Hpe. = Burseriana
grandiflora Pons (stellata) 497 (12 α b)
Halleri All. 495 (3 β)
Hepatica L. 498 (14), A 104
hirsuta Gilib. = silvestris
hirsuta Wierzb. (nemorosa) A 104 (7 d)
hortensis L. 497 (12), A 104
hortensis Thore = pavonina
humilis Gürke (mont.) A 103 (3 γ b subf.)
intermedia DC. (alp.) = sulfurea
intermedia Hpe. = montana
Janczewski Giraud. = Pulsatilla
latifolia Bell. = pavonina
lilacina DC. (Pulsat.) = montana
Linnæana Rouy et Fouc. (Pulsat.) = Pulsat. (α)
lobata Pers. = palmata
longipetala Schleich. = montana
lutea Kittel (alp.) = sulfurea
lutea Lam. = ranuncul.
macrantha Goir. (Hepatica) A 104 (14 a)
major DC. (alp.) = Burseriana
major Val de Lièvre (trifol.) A 104 (8 a)
malvifolia L. = palmata
marmorata T. Moore (Hepatica) A 104 (14 g)
micrantha DC. (alp.) = alpina (α)
micrantha Goir. (Hepatica) = Hepat. b. minor
millefoliata Bert. 495 (1 γ)
minor Andræ (alp.) = alpina (α)
minor Rouy et Fouc. (Hepatica) A 104 (14 b)
minor N. Terr. (coronaria) A 104 (13 i).
minor Val de Lièvre (trifol.) A 104 (8 b)

Digitized by Google

ANEMONE I 494 (425)
monantha DC. (narcissifl.) = dubia
montana Hpe. 495 (3 γ b), A 103
montano × vernalis Gürke A 103
Mouansii Hanry 497 (13 d)
multiloba C. Hartm. (*Hepatica*) A 104 (14 f)
myrrhidifolia Vill. = Burseriana
myrrhidifolia α Chaix = prec.
myrrhidifol. β Chaix = sulfurea
narcissiflora L. 495 (4), A 103
nemorosa L. 496 (7), A 104 a
nemorosa Mariz = trifolia
nemor. × trifolia Glow. A 104
nemorosa-alba Crantz = nemor.
nemorosa-lutea Crantz = ranunculi.
nemorum Val de Lièvre (trifol.) = trifol. a. major
nigricans Kern. A 103 (3 γ b subf.)
nivalis DC. (alp.) = sulfurea
nobilis Jord. = coronaria
nutans Gaud. (Pulsat.) = montana
obtusiflora Spach (hortens.) = stellata
ocellata Moggr. (hortens.) = Regina
Œnanthe Ucria = coronaria
officinalis Kittel (Pulsat.) = Pulsat. (α)
oligantha Huter (narcissifl.) = dubia
palmata L. 497 (11)
parviflora Pons (stellata) = stellata
patens Hpe. (non L.) = Pulsatilla
patula Pritz. (pratens.) = nigricans
pavonina Lam. 497 (12 β), A 104
pavonina Pons = Regina
pedata Raf. = nemorosa
pentaphylla Hook. = nemorosa
phœnicea Ard. (coronaria) = coccinea
pinnatifida Dulac = Halleri
pisciensis Sism. = Pulsatilla
Pittonii Glow. = nemor. × trifol.
plena Gürke (*Hepatica*) A 104 (14 e)
præcox Gaud. (Pulsat.) = Pulsat. (α)
præcox Salisb. = Hepatica
præstabilis Jord. = coronaria
pratensiflora Gürke (*mont.*) A 103 (3 γ b subf.)
pratensis C. Koch = montana
pratensis L., DC. 495 (3 γ), A 103
pratensis Sibth. = Pulsatilla
propera Rouy et Fouc. (*Pulsat.*) 495 (3 α b), A 103
Pulsatilla Koch in Sturm. = pratensis
Pulsatilla L. 495 (3), A 103

ANEMONE I 494 (425)
Pulsatilla Scop., M. B. = montana
pusatilliflora Gürke (*mont.*) A 103 (3 γ b subf.)
punica Sism. = Pulsatilla
purpurascens Val de Lièvre (trifol.) = trifol. b. minor
purpurea Ard. (*coronaria*) 497 (13 b)
purpurea DC. (*nemorosa*) A 104 (7 b)
pyrenaica Pall. = apennina
quinquefolia L. = nemorosa
ranunculiformis St.-Lag. = seg.
ranunculoides L. 496 (6), A 104
Regina Risso 497 (12 β b)
rhætica Bruegg. = multiloba
Rissoana Jord. 497 (13 g)
rosea Hanry A 104 (13 h)
rosea Neum. (*Hepatica*) A 104 (14 c)
rosea Peterm. (nemorosa) = purpurea
rubicunda Sacc. et Vis. (nemor.) 496 (7 b) = purpurea, cfr. A 104
rubra Pritz. (nemorosa) = purpurea
Scherfelii Ullep. = alpina (α)
serotina Coste = propera
silvestris L. 497 (10)
silvicola Schmid. (*nemorosa*) A 104 (7 e)
stellata Lam. 497 (12 α)
stellata Risso = Rissoana
striata Evers (Hepatica) = marmorata
subnivalis Val de Lièvre (*baldens.*) A 104 (9 for.)
sulfurea All. = vernalis
sulfurea L. 494 (1 β)
trifolia L. 496 (8), A 104
triloba Stokes = Hepatica
umbellata Lam. = narcissiflora
Ventreana Ard. (coronaria) = Rissoana, cor. e. albiflora
Ventreana Hanry 497 (13 f)
vernalis L. 495 (2)
versicolor Salisb. = hortensis

ANETHUM II 178 (575)
arvense Salisb. = graveol.
dulce DC. = Fœnic. dulce
Fœniculum L. = Fœnic. vulgare
graveolens Ucria, Ard. = Ridolfia segetum
graveolens L. 178
minus Gouan = graveolens
Pastinaca Wib. = Pastin. sativa
piperitum Ucria = Fœnic. pip.
segetum L. = Ridolfia seg.

ANGELICA II 175 (572)
angustifolia Hoffm. = Peuced. angustifol.
Archangelica L. 175 (2), A 152
Bertolonii Rchb. f. (silvestr.) = nemorosa
carvifolia Vill., Spr. = Selinum carvifol.
controversa Zum. = Peuced. venetum

ANGELICA II 175 (572)
decurrens Fisch. (silvestr.) = montana
elatior Whlnb. (silvestr.) = montana
Levisticum All. = Levist. officinale
montana Brot. 175 (1 b)
nemorosa Ten. 175 (1 c)
officinalis Mœnch = Archangelica
paludapifolia Lam. = Levisticum officinale
paniculata Lam. = Trochiscanthes nodiflorus
pratensis Presl (non M. B.) = silvestris (a)
Razulii All. (non Gouan) = montana
silvestris L. 175 (1)
verticillaris L. = Peuced. verticill.
villosa Lag. = nemorosa
vulgaris Fisch. (silvestr.) = silvestris (α)

ANIDRUM = Bifora
flosculosum Calestani = B. testiculata
radians Calestani = B. rad.

ANISACTIS = Petroselinum
segetalis Dulac = P. hortense

ANISODENS = Knautia
arvensis Dulac = K. arv.
longifolius Dulac = K. long.
silvaticus Dulac = K. silv.

ANISODERIS = Crepis
fœtida F. et M. = C. fœt.
rhœadifolia F. et M. = C. rhœadifol.
rubra Cass. = C. rubra

ANISOPHYLLUM = Euphorbia
Chamæsyce Haw. = E. Cham.
humifusum K. et G. = E. hum.
maculatum Haw. = E. mac.
Peplis Haw. = E. Peplis
prostratum Haw. = E. prostr.

ANISUM = Pimpinella
officinale DC. = seg.
officinarum Mœnch = seg.
vulgare Gærtn. = P. Anisum

ANKYLOBUS = Astragalus
hamosus Stev. = A. ham.

ANODONTEA = Alyssum
edentula Sweet = A. petræum
halimifolia Sweet = A. halim.
rupestris Sweet = A. rup.

ANONIS = ONONIS

ANSERINA = Chenopodium
betæfolia Montand. = C. polysperm.
Bonus-Henricus Dum. = C. Bon.-Henr.
candicans Montand. = C. album
ficifolia Montand. = C. ficifol.
fœtida Montand. = C. Vulvaria
muralis Montand. = C. mur.
opulifolia Montand. = C. opul.
stramonifolia Montand. = C. hybridum
urbica Montand. = C. urb.

ANTENNARIA III 276 (881)
borealis Camus (*dioica*) 276 (1 a)

Digitized by Google

ANTENNARIA III 276 (881)
carpathica R. Br. 276 (2)
dioica Gærtn. 276 (1)
gallica Camus (*dioica*) 276 (1 b)
Leontopodium Gærtn. = Leontop. alpinum
ANTHELIS = Helianthemum
albidus Raf. = Cistus albidus
glaucus Raf. = H. glauc.
glutinosus Raf. = H. glutin.
levipes Raf. = H. levip.
ANTHEMA = Lavatera
arborea Med. = L. arb.
cretica Med. = L. cret.
scabra Mœnch = L. cretica
Tenoreana Presl = L. cretica
ANTHEMIS III 252 (872)
abrotanifolia Guss. = cretica
absinthifolia Fiori (*punct.* β *incana*) 258 (14 β b)
absinthifolia Lojac. (Cupaniana) = prec.
acutiloba Fiori (*secundiramea*) 255 (7 α b)
adonidifolia Lojac. (*mixta*) A 184 (1 for.)
æolica Lojac. A 185
æolica Lojac. (*incrassata*) A 184 (6 γ for.)
ætnensis Schouw 257 (13 γ), A 184
albiflora Strobl (*ætnensis*) A 184 (13 γ b)
alpina J. Gay (*mont.*) 257 (13 ζ)
alpina Gouan = montana (α)
alpina L. 256 (11), A 184
alpina Moric. (mont.) = montana (α)
altissima Bell. = incrassata
altissima Guss., Bert. = brachycentros
altissima L. = Cota
angustisecta Porta et Rigo = tenuisecta
apennina Tausch = quid?
arbuscula Lojac. (*Cotula*) A 184 (2 for.)
artemisæfolia W. = Chrysanth. sinense
arvensis L. 254 (6), A 184
asperula Bert. = cretica
aurea Webb = Matricaria aurea
austriaca Jacq. 259 (19)
austriaca Ten., Bert. etc. = Triumfetti
Barrelieri Ten. 257 (12 β)
biaristata DC. = Anacycl. tomentosus
bipinnatipartita J. Gay (*marit.*) 258 (16 α b)
brachycentros Groves hb. = villosa
brachycentros J. Gay 259 (18)
brevifolia Lojac. A 184
calabrica Arc. (mont.) = flosculosa
canescens Lojac. (*intermedia*) A 184 (7 β b)
canescens Ten. = brachycentros
carpathica Arc. (non W.) = petræa
Chamomilla Ten. = brachycentros
chia L. 253 (4)
ANTHEMIS III 252 (872)
clavata Desf. = Anacycl. clavatus
clavata Guss. 255 (6 δ)
Columnæ Ten. (mont.) 257 (13 β) = grandiflora, cfr. A 184
concinna Guss. = intermedia
concolor Guss. (*fuscata*) 253 (3 b)
concolor Lojac. A 184
coronopifolia Less. A 184 (1 for.)
corymbosa Hæncke = Achillea atrata
corymbulosa Groves (*mucronul.*) 256 (12 α a subfor.)
cossyrensis Guss. (*secundiramea* 255 (7 α c)
cossyrensis Guss. = prec.
Cota Koch = brachycentros
Cota L. 259 (17)
cotæformis Fiori (*arven.*) 254 (6 β)
Cotula L. 253 (2), A 184
cretica Nym. 256 (9), A 184
Cupaniana Tod. = punct. β incana
diffusa Salzm. = incrassata
discoidea DC. etc. (tinctoria) = discoidea W.
discoidea Guss., J. Gay (*secundiramea*) A 184 (7 var.)
discoidea S. et S., Ten.? 260 (21 β), A 185
discoidea Ten. (tinct.) = prec.?
discoidea W. 260 (20 β)
drepanensis Huet 255 (7 β b)
elatior Fiori (*Guicciardii*) 254 (5 β b)
elegans Jan 256 (12 α b)
eremophila G. Beck (*tinct.*) 260 (21 α b)
fallax W. = fuscata
flosculosa DC. (*mont.*) 257 (13 ε)
flosculosa Goir. (tinctor.) = tinct. β discoidea
fœtida Lam. = Cotula
Fontanesii Fiori (*punctata*) 258 (14 α a)
fuscata Brot. 253 (3), A 184
fuscata β Bory et Chaub. = uniflora
Gemellari Huter P. et R., Lojac. (exs.) = sphacelata
Gemellari Tin. 254 (6 γ c)
Gerardiana Jord. = montana (α)
glabrata Guss. (punctata) = sicula
grandiflora Ramat. = Chrysanth. sinense
grandiflora Ten. (*mont.*) A 184 (13 β)
Guicciardii Heldr. et Sart. 254 (5 β)
gymnopoda J. Gay (secundiramea) = cretica
hirpina Guss. (mont.) = seg.
hirpina Ten. 257 (13 β b)
hydruntina Groves 258 (15), A 184
incana Guss. (*marit.*) 259 (16 β)
incana Guss. (*punctata*) 258 (14 β), A 184
ANTHEMIS III 252 (872)
incanescens Fiori (*arven.*) 254 (6 α c)
incanescens Jan = mar. β incana
incano-sericea Guss. (punctata) = punct. β incana
incrassata Lois. 254 (6 γ), A 184
intermedia Guss. 255 (7 β), A 184
Ismelia Lojac. = Lojaconi
libanotica DC. = chia
linearis J. Gay (mont.) = punct. β incana
Linneana Gr. et Godr. (mont.) = montana (α)
litoralis Clem. = maritima
litoralis DNtrs. (*arven.*) 254 (6 α d)
Lojaconi Fiori (*punctata*) 258 (14 α b), A 184
Lopadusana Lojac. A 184 (7 α d)
macrantha Heuff. = rigescens
major Guss. (mont.) = grandiflora
maritima Huter P. et R. exs. = elatior
maritima L. 258 (16)
maritima Urv. = Urvilleana
Micheliana Guss. = mont. ζ alpina
microcephala Goir. (*tinct.*) 260 (21 α d)
minor Guss. (mont.) = montana (α)
mixta L. 252 (1), A 184
monantha W. 260 (21 α c)
montana L. 257 (13), A 184
montana A Ten. = grandiflora
montana B Ten. = montana (α)
mucronulata Bert. 256 (12), A 184
multicaulis Janka (*arven.*) 254 (6 α b)
muricata Guss. 255 (8)
Neilreichii Ortm. = ruthenica
nicæensis W. = incrassata
nitida Lojac. (*intermedia*) A 184 (7 β d)
nobilis L. 256 (10)
odorata Lam. = nobilis
palæstina Reut. 260 (*nota*)
Palumbi Lojac. A 185
parviflora Tin. (*arvens.*) A 184 (6 α for.)
pectinata Lojac. (*secundiramea*) A 184 (7 α for.)
pedunculata Desf. = Anacycl. pedunc.
pentelica Boiss. (*mont.*) A 184 (15 oss.)
peregrina L. 254 (5)
petræa Bég. = Chrysanth. — tridactyl.
petræa Ten. 257 (13 δ)
platyglossa C. Koch = rigescens
polycephala Fiori (*alpina*) 256 (11 b)
præcox Lk. = fuscata
Pseudo-Cota Vis. = brachycentros

Digitized by Google

ANTHEMIS III 252 (872)
psorosperma Ten. 258 (2 b)
pubescens W. = Anacycl. pubesc.
punctata Lojac. exs. = Lojaconi
punctata Vahl, Desf. 258 (14), A 184
Pyrethrum Gouan (non L.) = grandiflora
retusa Lk. = ruthenica
retusa Ten. = brachycentros
rigescens W. 260 (20 δ), A 185
robustior Nym. (secundiramea) = Urvilleana
rosea Guss. (*ætnensis*) 257, A 184 (13 γ a)
ruthenica M. B. 260 (*nota*)
saxatilis DC. (*mont.*) 257 (13 α)
saxatilis DC. = prec.
Schouwii Fiori (*Barrelieri*) 257 (12 β b)
secundiramea Biv. 255 (7), A 184
secundiramea b. Guss. = acutiloba
segetalis Ten. 259 (18 b)
serotina Fiori (*marit.*) 258 (16 α c)
sicula Guss. (*incrassata*) 254 (6 γ b)
sicula Guss. = prec.
sicula Guss. (*punctata*) 258 (14 α c)
silensis Fiori (*hydruntina*) 258 (15 β)
sphacelata Presl 255 (6 ε)
stipulacea Mœnch = Chrysanth. sinense
tenella J. Gay (secundiramea) = cossyrensis
Tenorei Fiori (*Barrelieri*) 257 (12 β a)
tenuisecta Arc. (*mucronul.*) 256 (12 α a)
tenuisecta Fiori (*petræa*) 257 (13 δ b)
tenuisecta Fiori (tinct. v. discoidea) = silensis
tenuisecta Lojac. (*intermedia*) A 184 (7 β c)
tenuisecta Lojac. (pedunc.) = Anacyclus — tenuisect.
tinctoria Ard. = discoidea W.
tinctoria L. 260 (21), A 185
tomentosa Gouan = Anacycl. toment.
tomentosa L. hb. = montana (α)
tomentosa Ten., Griseb. = peregrina
Triumfetti All., DC. 259 (20), A 185
Triumfetti DC. (austriaca) = prec.
Triumfetti L. (tinctoria) = prec.
Triumfetti B. Ten. = discoidea W.
tubæformis Guss. = clavata?
uniflora Lojac. (*fuscata*) A 184 (3 for.)
Urvilleana DC. (*secundiramea*) 255 (7 γ)

ANTHEMIS III 252 (872)
valentina L. p. p. = Anacycl. radiatus
villosa Fiori (*Triumfetti*) 260 (20 γ)
villosiuscula J. Gay (marit.) = mar. β incana
virescens Guss. (*mont.*) 257 (13 α b)
virescens Guss. (punctata) = sicula
Visianii Weiss = chia
vulgaris Steud. = Matricaria Chamomilla

ANTHERICUM I 205 (200)
autumnale Scop. = Scilla autumn.
calycinum Braune = Tofieldia calyculata
calyculatum L. = Tofieldia calyc.
calyculatum β L. = Tofieldia palustris
bicolor Desf. = Simethis Mattiazzi
bifolium Scop. = Scilla bifolia
ericetorum Bory = Simethis Mattiazzi
fugax Moris = Urginea fug.
græcum L. = Lloydia græca
humile Goir. (*ramosum*) A 207 (1 c)
Liliago L. 205 (2)
Liliastrum L. = Paradisia Lil.
Mattiazzi Vand. = Simethis Matt.
non-ramosum Gilib. = Liliago
ossifragum L. = Narthecium ossifr.
planifolium L. - Simethis Mattiazzi
Pseudo-Asphodelus Jacq. = Tofieldia calyculata
ramosum L. 205 (1), A 207
scaberulum Beck (*ramosum*) A 49 (1 b)
serotinum L. = Lloydia ser.
sulphureum W. et K. = Ornithog. flavescens
trinervium Viv. = Lloydia græca

ANTHOCHYTRIUM = Crepis alpinum Rchb. f. = C. alp.

ANTHOLYZA *æthiopica L.* A 52

ANTHOPOGON = Gentiana ciliata Raf. = G. cil.

ANTHORA = Aconitum saxatilis Fourr. = A. Anthora

ANTHOXANTHUM I 53 (59)
aculeatum L. f. = Crypsis acul.
ætnense Tin. = nanum
alpinum Schur, Chenev. A 14 (2 α e)
amarum Brot. = glaucum
angustifolium Plan.-Gir. = aristatum
aristatum Boiss. 54 (2 δ)
Carrenianum Parl. = aristatum
glabrescens Celak. (odorat.) = odorat. (α)
glaucum Vahl A 14 (2 β *)
gracile Biv. 54 (1), A 14
laxiflorum St.-Am. (odorat.) = Puelii

ANTHOXANTHUM I 53 (59)
Lloydii Jord. = aristatum
majus Hack. (odorat.) = glaucum
montanum Asch. et Graebn. (*odorat.*) A 14 (2 α d)
myrthense Tod. = Puelii
nanum Guss. (*odorat.*) 54 (2 α b)
nanum Lloyd. (odorat.) = aristatum
odoratum L. 54 (2), A 14
odoratum β Gaud. = alpinum
ovatum Lag. 54 (3)
paniculatum L. = Festuca spadicea
pilosum Dœll (odorat.) = villosum
Puelii Lec. et Lam. 54 (2 ε)
Sommierianum Ricci 54 (2 γ)
strictum Asch. et Graebn. (*odorat.*) A 14 (2 α c)
subramosum Gilib. = odoratum
tenerum Asch. et Græbn. (*odorat.*) A 14 (2 α f)
villosum Dum. (1823) = seg.
villosum Lois. (*1810*) (*odorat.*) 54 (2 β)

ANTHRISCUS II 196 (587)
abortiva Garcke (non Jord.) = nitida
alpestris Wimm. et Grab. = nitida
Candollei Rouy et Cam. A 153 (1 γ)
Caucalis M. B. = vulgaris
Cerefolium Hoffm. 197 (4)
dubia Kabath = nitida
elatior Bess. = silvestris (α)
fumarioides Spr. 196 (2)
gymnocarpa Ces. P. et G. (sicula) = seg.
gymnocarpa Paol. (*nemorosa*) 196 (1 β b)
gymnocarpa Moris (*vulgaris*) 196 (3 b), A 153
Hladnikiana Koch (*silvestr.*) 196 (2 b)
longirostris Bert. = trichosperma
mollis Boiss. A 153 (1 β c)
nemorosa Spr. 196 (1 β), A 153
nitida Garke 196 (1 α b), A 153
nodosa Pers. = Physocaulis nod.
sativa Bess. = Cerefolium
Scandix Beck = vulgaris
Scandix M. B. = Physocaulis nodosus
sicula DC. = nemor. b. gymnocarpa
sicula β Bert. = prec.
sicula β DC. = nemorosa
sicula b. Guss. = nemorosa
silvestris Hoffm. 196 (1), A 153
torquata Duby (non Thomas) = Candollei
trichosperma Spr. 197 (4 b)
vulgaris Bernh. 197 (3)
vulgaris β Bert. = vulg. b. gymnocarpa

ANTHYLLIS II 67 (493)
affinis Britting. 68 (2 γ b)

Digitized by Google

ANTHYLLIS II 67 (493)
alba Fiori (*montana*) A 140 (3 α b)
alba L. (*Vulner.*) A 140 (2 α b)
albiflora Rota (Vulner.) = prec.
Allionii Ser. in DC. (Vulner.) = vulnerarioides
alpestris Kit. 68 (2 ε)
argentea Salisb. = Barba-Jovis
Aspalathi Ser. in DC. = cretica
australis Rouy 68 (2 ι)
baldensis A. Kern. = pallidiflora
Barba-Jovis L. 69 (4), A 140
bicolor Bert. 68 (2 α c)
coccinea L. (*Vulner.*) A 140 (2 δ c)
communis Rouy = Vulneraria
cretica Fiori (*Hermanniæ*) 69 (5 β)
cytisoides L. 69 (nota)
Dillenii Schult. = rubra
Erinacea L. = Erinacea pungens
erythrosepala Vuk. = tricolor
flava Gouan = Vulneraria (α)
Gerardi L. = Dorycnopsis Ger.
Hermanniæ L. 69 (5)
Kerneri Rouy (commun.) = vulgaris
hirsutissima Ten. = hispida?
hispida Boiss. et Reut. 68 (2 θ)
Jacquini A. Kern. 69 (3 β)
lutea L. (*Vulner.*) A 140 (2 α a)
macrophylla Rouy 68 (2 η)
montana Jacq. = Jacquini
montana L. 68 (3), A 140
pallidiflora Jord. 68 (2 ε b)
pauciflora Asch. et Hut. (Vulner.) = pulchella
polyphylla Kit. = seg.
polyphylla Ser. (*Vulner.*) 68 (2 β)
pulchella Vis. (*Vulner.*) A 140 (2 var.)
pyrenaica Fiori (*Vulner.*) 68 (2 ζ)
pyrenaica Rouy (alpestris) = prec.
rubida Lamotte (Vulner.) = tricolor
rubra Gouan = seg.
rubra L. (*Vulner.*) 68 (2 δ), A 140
rubriflora Ser. in DC. (Vulner.) = rubra
rustica Mill. 68 (2 α b) = alba, cfr. A 140.
spiniflora L' Hér. = cretica
splendens W. = Barba-Jovis
tetraphylla L. 67 (1)
tricolor Vukot 68 (2 δ b)
variegata Evers (Dillenii) = seg.
variegata Fiori (*rubra*) A 140 (2 δ d)
villosa Car. et S.-Lag. (Vulner.) = vulnerarioides
vulgaris A. Kern. = seg.
vulgaris Koch. p. p. (*Vulner.*) 68 (2 γ)
Vulneraria L. 67 (12), A 140
Vulner. β Bert. = bicolor
vulnerarioides Bonj. 68 (2 κ)

ANTINORIA = Aira insularis Parl. = A. insularis
ANTIPHYLLA = Saxifraga
biflora Haw. = S. biflora
cærulea Haw. = S. oppositifol.
oppositifolia Fourr. = prec.
retusa Haw. = S. purpurea
ANTIRRHINUM II 425 (752)
æquitrilobum Viv. = Linar. æquitr.
album Lam. = Linar. chalepensis
alpinum L. = Linar. alp.
alsinæfolium Viv. = Linar. alsin.
angustifolium Poir. = siculum
angustifolium Wk. et Lge. (*majus*) 426 (3 α b)
angustissimum Lois. = Linar. italica
aparinoides W. = Linar. heterophylla
arvense L. = Linar. arvens.
arvens. β, γ L. = Linar. simplex
assurgens Bianca = siculum
Bauhini Gaud. = Linar. italica
bellidifolium L. = Simbuleta bellid.
bipunctatum L. = Linar. bipunct.
bipunctatum Thuill. = Linar. supina
calycinum Vent. 426 (1 β)
capitatum Presl = tortuosum
caprarium Bert. = Linar. caprar.
chalepense L. = Linar. chalep.
cirrosum L. = Linar. cirr.
commune Lam. = Linar. vulgaris
compositum Lojac. 426 (3 β b)
Cymbalaria L. = Linar. Cymbal.
dalmaticum L. = Linar. dalmat.
Elatine L. = Linar. Elat.
elegans Ten. 426 (1 β b)
filiforme Poir. = Linar. rubrifolia
flavum Poir. = Linar. flava
genistifolium L. = Linar. genist
genistifol. Vill. = Linar. italica
glaberrimum Guss. (*sicul.*) 426 (4 b)
glandulosum Chav. (*sicul.*) 426 (4 a)
glaucum L. = Linar. bipunctata
gracile Pers. = Linar. — gracil.
græcum Bory et Chaub. = Linar. commutata
grandiflorum Chav. (Oront.) = calycinum
hepaticæfolium Poir. = Linar. hepat.
latifolium DC. 426 (2)
laxiflorum W. = Linar. laxiflrum
Linaria L. = Linar. vulgaris
linifolium L. Sp. (non L. hb.) = Linar. linifol.

ANTIRRHINUM II 425 (752)
linifol. Ucria = Linar. heterophylla
litorale Bernh. = Linar. litoralis W.
luteum Bég. (*tortuosum*) 426 (3 β c)
majus L. 426 (3)
majus α L. = latifolium
micranthum Cav. = Linar. micr.
minus L. = Linar. minor
monspessulanum L. = Linar. monsp.
nicæense Risso = latifolium
origanifolium L. = Linar. orig.
Orontium L. 426 (1)
Osyris Cyr. = Linar. chalepensis
pallidum Ten. = Linar. pall.
parviflorum W. = Linar. micrantha
Pelisserianum L. = Linar. Peliss.
pilosum L. = Linar. pilosa
purpureum L. = Linar. purp.
purpur. S. et S. = Linar. — litoralis
reflexum L. = Linar. reflexa
repens L. = Linar. monspessulana
rhodium Boiss. = majus
romanum Seb et Maur. = tortuosum
rubrifolium Poir. = Linar. rubrifol.
siculum Ucria 427 (4)
simplex W. = Linar. simpl.
spurium L. = Linar. spuria
striatum Lam. = Linar. monspessulana
supinum L. = Linar. supina
tortuosum Bosc. 426 (3 β)
tortuosum c. Guss. = luteum
triphyllum L. = Linar. triph.
ANTITRAGUS = Crypsis aculeatus Gærtn. = Cr. aculeata
ANURUS = Lathyrus
linifolius Presl = L. Nissolia
Nissolia Fourr. = prec.
APALANTHE = Helodea
Schweinitzii Planch. = H. canadensis
APARGIA = Leontodon
alpina Gaud. (autumn.) = L. autumn. f. Taraxaci
alpina W. = L. pyren.
arenaria Moretti = L. Berinii
aspera W. et K. = L. asper
aurantiaca Kit. = L. croceus
aurantiaca Ten., Bert. = L. — breviscapus
aurea Schmidt = Crepis aurea
autumnalis Hoffm., W. = L. autumn.
Berinii Bartl. = L. Berinii
Brumati Schiede = L. Brum. et hirtus
bulbosa Balb = L. tuberosus
canescens Sieb. = L. Berinii
cichoracea Ten. = L. cichor.
ciliata Presl = L. intermedius?
communis Spenn. = L. hispidus
crispa Ten. = L. — alpester

Digitized by Google

APARGIA = Leontodon
crispa W. = L. — pseudo-crispus
crocea Pollini = L. croceus
danubialis Scop. = L. danub.
dubia Hpe. in Sturm. = L. dubius
dubia Hpe. in W. = L. recognitus
ericetorum Richt. = L. — ericet.
fasciculata Biv. = L. cichoraceus
hastilis Hoffm. = L. danubialis
hieracioides W. = Picris hierac.
hirta Scop. = L. hirtus
hispida Bert. = L. hispid. et crispus
hispida Hoffm. = L. hispid.
hispida Ten. p. p. = L. — alpester
hyoseridiflora Saut. = L. hyoseroides
hyoseridifolia Less. = Crepis hyoseridifol.
incana Scop. = L. incanus
incana Ten. = L. — repandus?
longifolia Guss. (sicula) = L. — longifol.
longiscapa DC. (Tarax.) = L. — longisc.
lucida Ten. = Crepis — lucida, L. lucidus?
lucida Welw. = L. dubius
lyrata Ten. = L. — lyratus
macrorrhiza Ten. (crispa) = L. biscutellæfol.
magellensis Ten. hb. = Crepis leontodontoides
magellensis Ten. (*crispa*) 402 (*nota*)
pinnatifida Ten. = Hypochær. pinn.
pinnatifida Vest. = L. Brumati
pratensis Lk. = L. prat.
pyrenaica W. = L. pyren.
Rosani Ten = L. Rosani
salina Gaertn. M. et S. = Taraxac. salin.
saxatilis Ten. = L. saxat.
saxatilis B Ten. = L. — apulus
serotina Brum. = L. Brumati
serotina Jan = Hypochæris radicata
setosa Mœnch = Crepis set.
sicula Guss. = L. siculus
subglabrata Ambrosi (incana) = L. — subglabr.
sudetica Lk. = L. recognitus
Taraxaci Horn. = L. aut. f. Tarax.
Taraxaci Ten. = magellensis
Taraxaci W. = L. Tarax. Lois.
tenuiflora Gaud. = L. tenuifl.
tenuifolia Vis. = L. — glabriusculus
tergestina Hpe. = L. — tergest.
tuberosa W. = L. tuberos.
umbellata Schrank = Picris paleacea
Villarsii W. = L. Villars.
APARINANTHUS = Galium
muralis Fourr. = G. mur.
verticillatus Fourr. = G. vert.
APARINE = Galium
borealis Hill = G. bor.
hispida Mœnch = G. Aparine
latifolia Mœnch = G. Cruciata
minima All. = G. murale
parisiensis Hill = G. paris
spuria Fourr. = G. spur.
tenera Fourr. = G. spurium
tricornis Fourr. = G. tricor.
verrucosa Mœnch = G. Vaillantia
Vaillantii Fourr. = G. spurium
vulgaris Hill = G. Aparine
APARINELLA = Galium
divaricata Fourr. = G. divar.
litigiosa Fourr. = G. litig.
parisiensis Fourr. = G. paris.
setacea Fourr. = G. setac.
APATANTHUS = Hieracium
crinitus Viv. = H. crinitum
APERA = Agrostis
interrupta P. B. = A. interr.
purpurea P. B. = seg.
Spica-venti P. B. = A. Spica-venti
APHACA = Lathyrus
vulgaris C. Presl = L. Aphaca
APHANES = Alchemilla
arvensis L. = A. arvens.
cornucopioides Lag. = A. cornucop.
triloba Gilib. = A. arvensis
vulgaris Schur = A. arvensis
APHYLLANTHES I 203 (195)
juncea Salisb. = monspeliensis
monspeliensis L. 203, A 49
monspeliensium Vill. = prec.
APINELLA = Trinia
dioica Calestani = T. dioica
glauca Caruel = T. glauca
APIOS II 122 (518)
tuberosa Mœnch 123
APIUM II 160 (550)
alpinum Caruel = Bunium alp.
Ammi-majus Crantz = Ammi majus
Ammios Crantz = Petrosel. ammoides
ammoides Calestani = Petroselin. amm.
Amomum Stokes = Sison Amom.
anisoides Caruel = Pimpinella anis.
Anisum Crantz = Pimpinella Anis.
Berula Caruel = Sium erectum
Bulbocastanum Caruel = Bunium Bulboc.
Carvi Crantz = Carum Carvi
Celleri Gærtn. = dulce
crassipes Rchb. f. 162 (4 β)
crinitum Caruel = Ammi crin.
crispum Mill. = Petrosel. — crisp.
dulce Mill. A 151 (1 b)
ferulaceum Caruel = Bunium feral.
flexuosum Caruel = Carum carvifol.
glaucum Crantz = Trinia vulgaris
graveolens L. 161 (1), A 151
Gussonei Calestani = Pimpinella Gusson.
APIUM II 160 (550)
Gussonei Caruel (anisoides) = prec.
inundatum Rchb. f. 161 (4)
latifolium Mill. = Petrosel. — latifol.
leptophyllum F. Muell. 161 (2)
lobatum Gilib. = graveolens
lusitanicum Mill. = graveolens
luteum Caruel = Pimpinella lutea
montanum Caruel = Bunium mont.
nodiflorum Rchb. f. 161 (3), A 151
ochreatum Paol. (*nodiflor.*) 161 (3 b)
peregrinum Crantz = Pimpinella peregr.
petræum Crantz = Ammi majus
Petroselinum L. = Petrosel. hortense
phyllanthum Fiori (*nodiflor.*) A 151 (3 for.)
Pimpinella Caruel = Pimpin. major
Podagraria Caruel = Ægopodium Podagr.
pumilum Crantz = Trinia glauca
rapaceum Mill. A 151 (1 c)
repens Rchb. f. 161 (3 c)
rigidulum Caruel = Carum rigid.
saxifragum Calestani = Pimpinella saxifr.
segetum Dum. = Petrosel. seg.
silvestre Camb. (graveol.) = graveol. (a)
Sium Crantz = Sium erectum
stoloniferum Paol. (*nodifl.*) 161 (3 d)
Tragium Caruel = Pimpinella Trag.
Tragoselinum Caruel = Pimpinella saxifraga
Tragoselinum Crantz = Pimpinella major et saxifraga
verticillatum Caruel = Carum vert.
Visnaga Crantz = Ammi Visn.
vulgare Lam. = Petrosel. hortense
APLOPHYLLUM = Haplophyllum
APLOSTEMON = Scirpus
atropurpureum Raf. = Heleocharis atropurp.
compressum Raf. = S. Caricis
APLUDA = Andropogon
distachya P. B. = A. distach.
Gryllus Presl = Crhysop. Grill.
APOCYNUM II 343 (701)
compressum Mœnch = seg.
venetum L. 343
APOSERIS III 388 (930)
fœtida Less. 388, A 192
lucida Less. = Hyoseris bætica
APTERANTHES = Stapelia
Gussoneana Mik. = S. europæa
AQUIFOLIUM = Ilex
Ilex Scop. = I. Aquifolium
spinosum Lam. = prec.
vulgare St.-Lag. = prec.

Digitized by Google

AQUILEGIA I 520 (436)
albiflora Schur (vulg.) = nivea
alpina Lam. = pyrenaica (α)
alpina L. 520 (1)
alpina Sternb. = Einseleana
alpina β DC. = pyrenaica (α)
atrata Koch = atroviolacea
atroviolacea Avè-Lall. (*vulg.*) 522 (3 β)
atroviolacea G. Beck = prec.
Bauhini Schott = Einseleana
Bernardi Bak. (vulg.) = seg.
Bernardi Gr. et Godr. 520 (1 β)
Bertolonii Schott 521 (2 γ), A 108
confusa Rota 521 (2 δ b)
cornuta Gilib. = vulgaris
corsica Soleir. = Bernardi
dumeticola Jord. A 108 (3 α for.)
Einseleana F. Schultz 521 (2 δ), A 108
Facchinii Arc. (pr. err.) = Bauhini
glabra Heuff. (vulg.) = nivea
glaucophylla Steud. = vulgaris
Hœnkeana Koch 522 (3 α d)
Kitaibelii Arc. = Bertolonii
Kitaibelii Rouy et Fouc. = Magnolii
Kitaibelii Schott 521 (2 β)
magellensis Porta et Rigo A 108 (3 α c. subf.)
Magnolii Loret 521 (2 β b)
montana Sternb. = alpina
nigricans Rchb. (non Baumg.) = atroviolacea
nivea Baumg. 521 (3 α b)
ochroleuca Schur (vulg.) = nivea
Ottonis Orph. 522 (3 α c), A 108
platysepala Rchb. A 108 (3 α for.)
Portæ Huter A 108 (2 δ c)
pratensis Kitt. (vulg.) = vulgaris (α a)
pseudo-thalictrifolia Pamp. (*Einseleana*) A 108 (2 δ e)
pyrenaica Bert. p. p, Rchb. etc. = Bertolonii
pyrenaica DC. 521 (2), A 108
pyrenaica Gaud., Koch, Bert. p. p. = Einseleana
Reuteri Boiss. 521 (2 γ b), A 108
sicula Strobl (*vulg.*) A 108 (3 α for.)
silvestris Neck. = vulgaris
stellata Hort 521 (3 for. in text.)
Sternbergii Gr. et Godr. (alpina) = Bertolonii
Sternbergii Rchb. p. p. 520 (1 α b)
Sternbergii Rchb. p. p. = Hœnkeana
thalictrifolia Schott et Kchy. 521, A 108 (2 δ d)
unguisepala Borb. (Ottonis) = magellensis
versicolor Salisb. = vulgaris
viscosa All. = Reuteri

AQUILEGIA I 520 (436)
viscosa DC. p. p., Rchb. (non Gouan) = Einseleana
viscosa Ten. = Ottonis
viscosa W. et K. = Kitaibelii
vulgaris L. 521 (3), A 108
ARABIDOPSIS = Arabis
Thaliana Schur = A. Thal.
ARABIS I 426 (365)
albida Presl, Guss. = sicula
albida Stev. 427 (4 γ), A 90
Allionii DC. 428 (5 β)
alpestris Rchb. 428 (5 γ b), A 91
alpina Biv. = sicula
alpina L. 427 (4), A 90
anachoretica Porta (*alpina*) A 90 (4 α for.)
angustifolia Rota (*alpina*) A 90 (4 α g)
apennina Tausch = albida
arcuata Shuttl. A 212 (5 γ)
arenosa Scop. 430 (16)
aspera All. = auriculata
auriculata Lam. 430 (19), A 91
bellidifolia Jacq. 429 (13)
bellidioides Lam. = Cardamine resedifolia
brassicæformis Wallr. = pauciflora
Burnatii Fiori (*Thaliana*) A 212 (17 c)
bursifolia Caruel = Barbarea dentata
cærulea All. 428 (7), A 212
canescens Moretti = alpina (var.?)
caucasica W. = albida
cebennensis DC. 429 (14)
cenisia Reut. 428 (5 γ c)
ciliaris W. = pumila
ciliata Burn. (arcuata) = arcuata (a)
ciliata DC., Koch et Auct. fl. it. 428, A 91 = arcuata, cfr. A 212
ciliata R. Br. A 212 (in text.)
ciliata Strobl (*muralis*) A 91 (6 α d)
Clusiana Schrank 427 (4 α c)
collina Ten. 428 (6 α b)
contracta Spenn. = hirsuta
contracta c. Celak. = Gerardi
corsica Rouy et Fouc. (*alpina*) 427 (4 β)
Crantziana Ehrh. = petræa
crispata W. 427 (4 α e)
dasycarpa Andr. (*auriculata*) A 91 (19 b)
dasycarpa Godr. ex Rouy et Fouc. (*verna*) 430 (18 b)
declinata Tausch 427 (4 α d), A 90
dentata Clairv. (non Torr. et Gr.) = Sisymbr. dent.
elegans Tin. in Lojac. = sicula
Gerardi Bess. 428 (5 δ b)
glabra Bernh. 427 (1), A 90
glabrata Godet (arcuata) = arcuata (a)
glabrata Gremli (alpestris) = prec.
glabrata Koch (ciliata) = prec.
glastifolia Rchb. = Gerardi

ARABIS I 426 (365)
grandiflora Caruel (alpina) = albida
Halleri L. 430 (15)
hastulata Bert. ex DC. = Cardamine — integrifolia DC.
hirsuta Godet (arcuata) = alpestris
hirsuta Koch (ciliata) = alpestris
hirsuta Scop. 428 (5), A 91, 212
hispida Lam. = sagittata
hispida Murr. = petræa
integrifolia Lap. A 91 (5 δ for.)
intermedia Hpe. = bellidifolia
Kochii Jord. A 91 (5 δ for.)
lasiocarpa Uechtritz (*Turrita*) 427 (3 b)
longisiliqua J. et C. Presl = muralis (α)
madonia Presl A 91 (6 α e)
mollis Kern. = vochinensis
monticola Jord. = Clusiana
muralis Bert 428 (6), A 91
muralis Salis = Thaliana
muralis β Bert. = rosea
muricola Jord. = muralis (α a)
nana Baumg. (*alpina*) 427 (4 α b)
nivalis Guss. 429 (11 b)
nova Vill. = saxatilis
nutans Mœnch = pumila
nutans Sims = Allionii
ochroleuca Lojac. (non Boiss.) = glabra
ovirensis Wulf. 430 (15 c)
patula Wallr. = auriculata
pauciflora Garcke 427 (2)
pedemontana Boiss. 429 (14 β)
perfoliata Lam. = glabra
petiolata M. B. = Alliaria officinalis
planisiliqua Rchb. = Gerardi
petræa Lam. 429 (10)
pinnatifida Fiori (*Thaliana*) A 91 (17 for.)
pinnatifida Lam. = Sisymbr. dentatum
pumila Jacq. 429 (12), A 91, 212
purpurascens Guss. (collina) = seg.
purpurascens Presl = rosea
pusilla E. petit (*Thaliana*) 430 (17 b)
ramosa Lam. = Thaliana
recta Vill. = auriculata
rigida Wallr. = auriculata
rosea DC. 428 (6 β)
sagittata DC. 428 (5 δ), A 91
sagittifolia Moris (hirsuta) = sagittata
saxatilis All. 430 (20)
scabra All. = serpyllifolia
scabra Gilib. = Thaliana
Scopoliana Boiss. 429 (9)
serpyllifolia Pirona = pumila
serpyllifolia Vill. 429 (11), A 91
sicula Stev. A 90 (4 γ c)
silvestris Scop. = Brassica monensis?
Soyeri Reut. = bellidifolia
Soyeriana Gr. et Godr. (bellidifol.) = bellidifol.

Digitized by Google

ARABIS I 426 (365)
stellulata Bert. in Desv. 429 (12 b), A 91, 212
stolonifera Clairv. 430 (15 b)
stricta Gaud. (non Huds.) = Allionii
subnitens Jord. = arcuata
surculosa N. Terr. = serpyllifolia
tenella Ten. et Guss. 428 (6 α c)
Tenorei Huet 427 (4 γ b)
Thaliana L. 430 (17), A 91, 212
Turrita L. 427 (3)
umbrosa Crantz = Turrita
undulata Lk. = crispata
Verlotii Rouy et Fouc. (*alpina*) 427 (4 α f), A 90
verna R. Br. 430 (18)
vestita Gremli (alpestris) = alpestris
virescens Jord. A 91 (5 δ for.)
virescens Ten. (collina) = rosea
vochinensis Spr. 429 (8)
Zeyheriana Turcz. = Thaliana
ARACHIS II 97 (518)
africana Lour. 97 (b)
glabra DC. (hypogæa) = prec.
glabriuscula Poll. (hypogæa) = africana
hypogæa L. 97
ARACHNITES = Ophrys
alpina Schm. = Herminium alp.
ambigua Tod. (fuciflora) = O. fucifera
anthropophora Schm. = Aceras anthr.
apifera Hoffm. = O. apif.
atrata Tod. = O. atr.
Bertolonii Tod. = O. Bertol.
Biancæ Tod. = O. Scolopax?
bombylifera Tod. = O. bombyliflora
Bonoitiana Tod. (lunulata) = O. Bonoitii
exaltata Tod. (fuciflora) = O. exalt.
fuciflora Schm. = O. Arachnites
fuciflora Tod. = O. aranifera (α)
fusca Tod. = O. fusca
Inzengæ Tod. = O. Inzengæ
lunulata Tod. = O. lunulata
lutea Tod. = O. lutea
minor Tod. (lutea) = O. sicula
Monorchis Hoffm. = Herminium Monorch.
musciflora Schm. = O. myodes
oxyrhynchos Tod. = O. oxyrh.
pallida Tod. = O. pallida
panormitana Tod. (fuciflora) = O. fucifera
Speculum Tod. = O. Spec.
tenthredinifera Tod. = O. tenthredin.
ARACHUS = Vicia
vicioides Medic. = V. bithynica
ARACIUM = Crepis
alpinum Monn. = Mulgedium alpin.
chondrilloides D. Dietr. = C. Jaquini
paludosum Monn. = Crepis palud.
ARBUTUS II 303 (669)
alpina L. = Arctostaphylos alp.
angustifolia O. Debx. (*Unedo*) A 162 (c)
Doumeti Romagnoli hb. = angustifol.
turbinata Pers. 304 (b)
Unedo L. 304, A 162
Uva-Ursi L. = Arctostaphylos Uva-Ursi
ARCEUTHOBIUM I 287 (277)
Oxycedri M. B. 287
ARCHANGELICA = Angelica
officinalis Hoffm. = A. Archangelica
ARCTIO = Berardia
lanuginosa Lam. = B. lanuginosa
ARCTIUM III 316 (910)
album Christ (*minus*) 317 (γ b)
Bardana W. = tomentosum
campestris Lge. (Lappa) = nemorosum
canescens Fiori (*nemoros.*) 317 (δ b)
Carduelis Gren. = Carduus Carduelis
intermedium Lge. = nemorosum
lanuginosum Lam. = Berardia lanug.
Lappa L. 316, A 186
Lappa α L. = majus
Lappa β L. = tomentosum
majus Bernh. 317 (α)
minus Bernh. 317 (γ)
nemorosum Lej. 317 (δ)
Personata L. = Carduus Personata
pubens Bab. 317 (ε), A 186
tomentosum Fiori etc. = pubens
tomentosum Mill. 317 (β)
ARCTOSTAPHYLOS II 303 (668)
alpina Spr. 303 (2)
officinalis Wimm. et Grab. = Uva-Ursi
Uva-Ursi Spr. 303 (1)
AREMONIA = Agrimonia
agrimonioides Neck., DC. = A. agrim.
ARENARIA I 344 (331)
abietina J. et C. Presl 345 (2 b)
aggregata Lois. 345 (1)
alpina Gaud. (*serpyll.*) 345 (5 γ)
alpina Kern. = prec.
alpicola Ten. = Alsine graminifol.
apetala Vill. 346 (8 b)
Arduini Vis. = Alsine graminifol.
aretioides Portenschl. = Alsine octandra
aristata Raf. = Alsine tenuif.
arvatica Presl = Alsine arvat.
arvensis Wallr. = Spergula arv.
austriaca All. = Alsine Villarsii
austriaca Jacq. = Alsine austr.
baldensis Rchb. = Mœhringia Ponæ
balearica L. 346 (7), A 70
ARENARIA I 344 (331)
Barrelieri Vill. = Alsine — Barr.
Bartolotti Tin. = Alsine — herniariæfol.
bavarica L. = Mœhringia Ponæ
Bertolonii Fiori 346 (9)
biflora L. 346 (8)
Bocconii Soleir. = Spergularia marina
brachypetala J. Gay (balearica) = Gayana
brevicaulis Sternb. = Alsine — cherlerioides
breviflora Gilib. = serpyllifol.
cæspitosa Ehrh., cfr. A 69 (3 α c)
cæspitosa Salisb. = balearica
calycina Hænsel. = Sagina subulata
calycina Hort. = Alsine mediterranea
campestris All. = seg.
campestris L. (rubra) = Spergularia camp.
canadensis Pers. = Spergularia media
capillacea All. = Alsine liniflora
capitata Lam. = aggregata
Cherleria Ard. = Alsine Cherl.
cherlerioides Vill. = Alsine — cherler.
ciliata L. 346 (6), A 70
ciliata β et γ L. = multicaulis
cinerea DC. 345 (3)
clandestina Portenschl. = Alsine — dalmatica?
collina Turcz. = Alsine verna
condensata J. et C. Presl = Alsine cond.
corsica Steud. = balearica
corymbulosa Delastre = Alsine arvatica
costata Bunge = Alsine Gerardi et subnivalis
crassifolia Freyn (leptoclados) = seg.
crassifolia Freyn (serpyll.) = seg.
crassifolia Gürke (*tenuior*) A 70 (5 β d)
dalmatica Vis. (Arduini) = Alsine — dalm.
debilis Turcz. = Alsine Gerardi
densior Gremli (ciliata) = multicaulis
diandra Guss. = Spergularia di.
dichotoma Mœnch = Alsine tenuifolia
divaricata Adams = Alsine Gerardi
dubia Suter = Alsine hybrida
elongata Balb. = Alsine austriaca
emarginata Brot. A 70
erecta Wk. (serpyll.) = serpyllifol. (α)
eriocalycina Jan = Alsine liniflora
extensa Duf. = Alsine — extensa
fasciculata L. = Alsine fasc.

Digitized by Google

ARENARIA I 344 (331)
fastigiata Sm. = Alsine fasciculata
flaccida Clairv. = Alsine Villarsii
frigida M. et K. (ciliata) = multicaulis
frigida Rupr. = Sagina Linnæi
fugax J. Gay A 70 (6 c)
Gayana Williams A 70 (7 β)
geniculata Poir. = Alsine genic.
Gerardi W. = Alsine Ger.
glabra DC. (austriaca) = Alsine Villarsii
glandulosa Ball (tenuif.) = Alsine hybrida
glareosa Huter et Porta (*Huteri*) A 70 (10 for.)
glutinosa M. B. = Holosteum glut.
glutinosa M. et K. (serpyll.) = viscida
graminifolia Ard. = Alsine gram.
grandiflora L. 345 (2)
grandiflora Presl (verna) = Alsine verna d. pubescens
grineensis Thom. = Alsine grin.
halophila Bunge = Spergularia urbica
Helmii Fisch. = Alsine Villarsii
herniariæfolia Desf. = Alsine — hern.
heterosperma Guss. = Spergularia media
hirsuta Gaud. (Villars.) = Alsine Vill. b. hirs.
hirto-scabra Schur (serpyll.) = serpyllifol. (α)
hispidula Ser. (recurva) = Alsine rec. b. hispidula
Huteri Kern. 346 (10), A 70
hybrida Vill. = Alsine hybr.
italica Vis. (Arduini) = Alsine graminifol.
lanceolata All. = Alsine lanc.
laricifolia Lap. = grandiflora
laricifolia L. = Alsine lar.
laxa Fisch. = Alsine Villarsii
laxifolia Ser. (tetraquetra) = aggregata
legitima Gr. et Godr. (tetraquetra) = aggregata
leptoclados Guss. = seg.
leptoclados Rchb. (serpyll.) = tenuior
linearifolia Moris (procumb.) = Alsine — extensa
liniflora Jacq. = Alsine Gerardi et subnivalis
liniflora L. = Alsine lin.
liniflora W. = grandiflora
longipes Rouy et Fouc. (ciliata) A 70 (6 for.)
macrocarpa Kit. = Alsine Kitaibelii
macrorhiza Req. = Spergularia macr.
marginata DC. = Spergularia media
marina All. = Spergularia media

ARENARIA I 344 (331)
marina L. (rubra) = Spergularia mar.
marina Pall., Roth = prec.
Marschlinsii Koch = alpina
media L., DC. = Spergularia med.
media Pollich = Spergula arvensis
mediterranea Ledeb. = Alsine med.
minutiflora Losc. 345 (5 β b)
modesta Duf. 345 (4)
montana Auct. it. (non L.) = grandiflora
montana Sacc. et Bizz. = Huteri
mucronata L. = Alsine mucr.
mucronata S. et S. = Alsine mediterr.
multicaulis Gaud. (ciliata) = ciliata (a)
multicaulis L. 346 (6 b)
multiflora Neilr. (ciliata) = ciliata (a)
multiflora Ser. (laricifol.) = Alsine Kitaibelii
muscosa Med. = Mœhringia musc.
mutabilis Lap = Alsine mucronata
nana Gaud. (recurva) = Alsine nana
nana Goir. (*serpyll.*) A 70 (5 β for.)
nervosa Lam. = Mœhringia trinervia
nivalis Gr. et Godr. (serpyll.) = alpina
nodosa Wallr. = Sagina nod.
obtusa All. = Mœhringia — obtusa
occulta Fisch. = Alsine biflora
pauciflora Kit. = Alsine verna
pauciflora Neilr. (ciliata) = multicaulis
pentandra Ard. = Mœhringia pent.
pentandra Duf. = Alsine viscosa
pentandra Wallr. = Spergula Morisonii
peploides Lap. (non L.) = Polycarpon pepl.
peploides Ucria (non L.) = Alsine geniculata
plantaginea Lam. = Mœhringia trinervia
polygonoides Wulf. = Mœhringia ciliata
Ponæ Rchb. = Mœhringia Ponæ
prismatica Gaud. (lanceolata) = Alsine — cherlerioides
procumbens Vahl = Alsine geniculata
pubescens Presl ex Steud. = pubigera
pubescens Steud = Spergularia marina
pubigera Steud. = quid?
radicans Spr. = Spergularia radic.
recurva All. = Alsine rec.
Rosani Ten. = Alsine graminifol.

ARENARIA I 344 (331)
rosea Presl = Alsine geniculata
rostrata Pers. = Alsine mucronata
rostrata W. et K. = Alsine Kitaibelii?
rubra L. = Spergularia rubr.
rubra β Bert. = Sperg. diandra
rupestris Huter et Porta (*Huteri*) A 70 (10 for.)
salina Ser. = Spergularia marina
salsuginea Bunge = Spergularia diandra
Salzmannii Presl A 70 (e-marg. β)
saxatilis All., Roth = Alsine verna
saxatilis Vill. = Alsine mucronata
saxifraga Fenzl (non Friv.) = Bertolonii
scabra Fenzl (serpyll.) = serpyllifol. (α)
scandinavica Spr. = Alsine biflora
Scopolii Colla = Alsine — hirsuta
segetalis Lam. = Spergularia seg.
semiteres Kit. = Alsine verna
serpyllifolia L. 345 (5), A 70
Spergula Duf. = Spergularia marina
sperguloides Mutel = Mœhringia sperg.
sphærocarpa Ten. = viscida
sphagnoides Thom. = Alsine biflora
stenopetala Turcz. = Alsine biflora
striata All. = Alsine — nana
striata L. p. p. = Alsine laricifol.
striata Vill. = Alsine liniflora
subglabra Ten. (Rosani) = Alsine — dalmatica
subulata Kit. = Alsine tenuifol.?
subulifolia Presl = Alsine subul.
subuniflora Gaud. (ciliata) = multicaulis
tenella Kit. = multicaulis
tenella Mey. (serpyll.) = tenuior
tenuifolia L. = Alsine ten.
tenuior Gürke = seg.
tenuior Koch (*serpyll.*) 345 (5 β), A 70
tetraquetra L. Mant. (non L. Sp.), All. = aggregata
triandra Schrank = Alsine mediterr.?
trichocalycina Guss. et Ten. = Alsine mucronata
triflora L. 345 (2 c)
triflora Vill. = Alsine Villarsii
trinervia L. = Mœhringia trin.
umbellata Clairv. = Holosteum umb.
unilateralis Steud. = Spergularia segetalis
Vaillantiana DC. (tenuif.) = Alsine tenuifol. (α)

Digitized by Google

ARENARIA I 344 (331)
varia Dulac = serpyllifol.
verna L. = Alsine verna
Villarii Balb. = Alsine Villarsii
viscida DC. (serpyll.) = alpina et viscida
viscida Hall. f. = alpina
viscida Lois. 345 (5 α b)
viscida-maritima Ten. (serpyll.) = viscidula
viscidula Gürke (tenuior) A 70 (5 β c)
viscidula Roth (serpyll.) = viscida
viscidula Rouy et Fouc. (leptoclados) = viscidula
viscidula Thuill. = Alsine hybrida
vulgaris Bernh. = Stellaria media
Wallichiana Ser. = serpyllifol.
ARETIA = Androsace
alpina Bub. = A. pubescens
alpina L. = A. alpina
argentea Gærtn. = A. imbricata (α)
auriculata Lk. = Prim. Auricula
baldensis Turra = A. alpina (α)
brevis Heg. = A. Charpentieri
bryoides Lois. = A. helvet.
brutia Nym. = A. Mathildæ
carnea Bub. = A. carnea
carniolica Lk. = Prim. carniol.
Charpentieri Heer = A. Charpent.
ciliata Lk. = Prim. Balbisii
crenata Lk. = Prim. marginata
elongata Bub. = A. elong.
Flœrkeana Lk. = Prim. glutin. × minima
glacialis Schl. = A. alpina (α)
glaucescens Lk. = Prim. glauc.
glutinosa Lk. = Prim. glut.
Hausmannii Nym. = A. Hausm.
Heerii Heg. = A. Heerii
helvetica L. = A. helvet.
imbricata Cald. = A. imbric.
integrifolia Lk. = Prim. integr.
Mathildæ Cald. = A. Math.
maxima Bub. = A. max.
minima Lk. = Prim. min.
multiflora Vand. = A. multifl.
Palinuri Lk. = Prim. Palinuri
pennina Murith = A. alpina (α)
pubescens Lois. = A. pubesc.
rubra All. hb. ex Pax = Wulfeniana
spectabilis Lk. = Prim. spect.
tomentosa Bert. = A. imbricata
tomentosa Murr. = A. toment.
Vandelii Turra = quid?
villosa Bub. = A. vill.
villosa Lk. = Prim. vill.
Vitaliana Murr. = Douglasia Vital.
Wulfeniana Sieb. = A. Wulfen.
ARGELASIA = Genista
corsica Fourr. = G. cors.
Scorpius Fourr. = G. Scorp.
ARGENOPE = Narcissus
serotina Salisb. = N. serot.
ARGENTINA = Potentilla
anserina Rydb. = P. anser.
rubra Lam. = P. palustris
rupestris Lam. = P. rup.
supina Lam. = P. sup.
vulgaris Lam. = P. anserina
ARGORIPS = Salix
alba Raf. = S. alba
ARGYROLOBIUM = Cytisus
argenteum Wk. = C. argent.
Linnæanum Walp. = prec.
ARIA = Pirus
Chamæmespilus Host = P. Chamæm.
edulis Kœhne (nivea) = P. edulis
græca M. J. Rœm. = P. græca
Hostii Jacq. = P. Aria × Chamæmesp.
nivea Host = P. Aria
nivea × Chamæmesp. Beck = P. Aria × Cham.
nivea × Sorb. Aucup. Kœhne = P. Aria × Aucup.
nivea × Torminaria Clusii Kœhne = P. Aria × tormin.
thuringiaca G. Beck = P. Aria × Aucup.
torminalis Beck = P. tormin.
ARISARUM I 149 (152)
Arisarum Huth = vulgare
australe Rich. = vulgare
Balansanum Schott = vulgare
Clusii Schott 149 (1 b)
crassifolium Schott = vulgare
Forbesii Schott = vulgare
Jacquinii Schott = vulgare
proboscideum Savi 149 (2)
Sibthorpii Schott = vulgare
vulgare Targ.-Tozz. 149 (1)
ARISTELLA = Stipa
bromoides Bert. = S. Aristella
ARISTIDA I 54 (60)
Adscensionis L. 54
cærulescens Desf. = Adscens.
canariensis W. = Adscension.
elatior Cav. = Adscension.
gigantea L. f. = Adscension.
ARISTOLOCHIA I 289 (281)
altissima Desf. 290 (2)
bætica L. 290 (nota)
Clematitis L. 289 (1)
fasciculata Lam. = Pistolochia
Fontanesii Boiss. et Reut. = longa
infesta Salisb. = Clematitis
istriaca Pamp. (pallida) A 210 (5 γ b)
longa L. 290 (5), A 62, 210
longa Scop. = istriaca
longa Woodv. = bætica
lutea Desf. = pallida
microphylla Fiori (longa) 290 (5 β)
pallida Salzm. = longa
pallida S. et S.?, Koch p. p. = istriaca
pallida W. 290 (5 γ), A 62, 210
parvifolia Gürke (longa) = microphylla
parvifolia Nic. = microphylla
parvifolia S. et S. 290 (nota)
Pistolochia L. 290 (3)
rotunda L. 290 (4)
ARISTOLOCHIA I 289 (281)
sicula Tin. 290 (5 δ)
ARKOPODA = Reseda
Luteola Raf = R. Lut.
ARMENIACA = Prunus
atropurpurea Lois. = P. dasycarpa
berricoccia Delarb. = P. Armeniaca
briantiaca Pers. = P. briant.
dasycarpa Pers. (sibirica) = seg.
dasycarpa Borkh., Ser. = P. dasyc.
fusca Turp. et Poit. = P. dasycarpa
nigra Pers. = P. dasycarpa
persicifolia Lois. = P. dasycarpa
vulgaris Lam. = P. Armeniaca
ARMERIA II 332 (691)
albiflora Fiori (gracilis) 335 (4 ε e)
alliacea Lois. = leucantha Boiss.
alpina Lev. (majell.) = ambigua
alpina Ten. = ambigua
alpina W. 334 (4 β)
ambigua Fiori (majell.) 334 (4 δ c)
brachylepis Boiss. (plantag.) = seticeps
canescens Boiss. 334 (*nota*)
denticulata Bert. 334 (4 γ)
denticulata Portensch., Gasp. = gracilis
elatior Lev. (majell.) = gracilis
elongata Arc. p. p. = gracilis
elongata Hoffm. 334 (4 α)
fasciculata W. 333 (1)
gracilis Ten. 335 (4 ε)
gracilis B. Ten. = albiflora
Gussonei Boiss. 333 (2 β)
Hoffmanni Ten. (alp.) = villosa?
humilis Ten. (gracilis) = majellensis
Kochii Boiss. = multiceps
juniperifolia Koch (non Alior.) = multiceps
latifolia Moris (non W.) = Morisii (α)
leucantha Boiss. (plant.) 335 (4 κ b)
leucantha Nym. (majell.) 334 (4 δ e)
leucocephala Koch 333 (3)
linearifolia Ten. p. p. (vulg.) = gracilis
macropoda Boiss. 333 (2 γ)
majellensis Boiss. 334 (4 δ)
marginata Fiori (vulg.) 335 (4 ι), A 163
marginata Lev. (majell.) = prec.
maritima Ten. (non W.) = Tenorei
minor Ten. (vulg.) = leucantha Nym.
montana Wallr. = plantaginea
Morisii Boiss. 333 (2)
multiceps Wallr. 333 (3 δ)
nebrodensis Fiori = gracilis
nebrodensis Guss. 335 (4 ζ)
pallida Fiori (gracil.) 334 (4 ε d)

Digitized by Google

ARMERIA II 332 (691)
pallida Lev. (majell.) = prec.
plantaginea W. 335 (4 κ), A 163
pollinensis Fiori (majell.) 334 (4 δ b)
pollinensis N. Terr. (gracilis) = prec.
procera Boiss. (leucocephala) 333 (3 γ)
pungens Hoffgg. et Lk. 333 (1 b)
purpurea Koch 334 (4 α b)
purpureo-bracteata Fiori (majell.) 334 (4 δ d)
sardoa Spr. 335 (4 η)
scorzonerifolia Balb. et Nocca (non W.) = seticeps
scorzoneræfolia Ten. = macropoda
seticeps Rchb. 335 (4 θ)
Soleirolii Duby 333 (3 β)
subalpina Lev. (majell.) = majellensis
Tenorei Fiori (gracil.) 334 (4 ε c)
Thomasii Nym. = procera
villosa Ten. (gracil.) 334 (4 ε b)
undulata Boiss. 335 (*nota*)
vulgaris Moris = sardoa
vulgaris W. 334 (4), A 163
ARMOLA = Atriplex
campestris Montand. = A. oblongifol.
deltoidea Montand. = A. hastatum
mixta Montand. = A. patulum
ARMORACIA = Nasturtium
amphibia Peterm. = N. amphib.
aquatica Kostel. = prec.
austriaca Wimm. = N. austr.
lapathifolia Gilib. = N. Armoracia
rusticana Gaertn. M. et S. = N. Armoracia
sativa Bernh. = prec.
ARNICA III 224 (860)
alpina Auct. it. (non Olin) = angustifol.
angustifolia Duby (mont.) 224 (c)
austriaca Hpe. = Doronic. austr.
Bellidiastrum All. = Bellidiastrum Michelii
Clusii All. = Doronic. hirsutum
cordata Wulf. = Doronic. Columnæ
corsica Lois. = Doronic. corsicum
corymbosa Fiori (mont.) 224 (b)
Doronicum Jacq. = Doronic. hirsutum
floccosa Bert. = Senecio — floc.
glacialis Wulf. = Doronic. glaciale
lanigera Ten. = Senecio arachnoid.
montana L. 224
scorpioides L. = Doronic. grandiflor.
stiriaca Vill. = Doronic. hirsut. b. villosum
ARNOPOGON = Urospermum
asper W. = U. asperum
Dalechampii W. = U. Dalech.
litorale Guss. (picr.) = U. — litor.
picroides W. = U. picr.
ARNOSERIS III 387 (929)
fœtida Dum. = Crepis fœt.
minima Lk. 388
pusilla Gaertn. = minima
ARONIA = Amelanchier
Amelanchier Rchb. = A. vulgar.
Aria × Chamæmesp. Rchb. = Pirus Aria × Cham.
Chamæmespilus Pers. = Pirus Cham.
nebrodensis Ces. P. et G. = Cotoneaster nummularia
rotundifolia Pers. = A. vulgaris
rupestris Bluff. et Fing. = A. vulgar.
tomentosa Koch (rotundifol.) = A. — toment.
ARONICUM = Doronicum
Bauhini Rchb. = D. hirsut. b. villosum
Clusii Tausch = D. hirsutum
corsicum DC. = D. corsicum
Doronicum Rchb. = D. hirsutum
glaciale Rchb. = D. glaciale
latifolium Rchb. = D. — latifol.
scorpioides DC. = D. grandiflor.
scorpioides Rchb. = D. — medium
ARRHENATHERUM I 74 (88)
avenaceum P. B. = elatius
biaristatum Peterm. A 19 (c)
bulbosum Presl 74 (b) = tuberosum (cfr. A 19)
elatius Presl, M. et K. 74, A 19
nodosum Rchb. (avenac.) = tuberosum
precatorium P. B. = tuberosum
tuberosum Fiori (elatius) A 19 (b)
ARROSTIA = Gypsophila
dichotoma Raf = G. Arrostii
ARTEDIA = Daucus
muricata L. = D. muricat.
ARTEMISIA III 245 (871)
Abrotanum All., Savi = camphorata
Abrotanum L. 248 (9)
Absinthium L. 246 (3), A 183
achilleæfolia Ten. 246 (1 β b), A 183
alba Turra 246 (1 γ)
Allionii DC. (nana) 249 (14 β b)
alpina DC. (campestr.) 250 (15 α b)
angustifolia DC. (cærul.) = palmata
angustisecta Fiori (vulg.) 248 (7 c)
annua L. 249 (12)
arborescens L. 246 (2)
argentea DC. p. p., S. et M. (non L'Hér.) = arborescens
atrata Lam. 249 (10)
ARTEMISIA III 245 (871)
Baumgarteni Bess. = petrosa
Biasolettiana Vis. = alba
borealis Pallas 249 (14)
Bocconei All. = Genipi
Bocconei var. All. = Allionii
cærulescens L. 250 (16), A 184
calcigena Rehm. (Absinth.) A 183 (3 b)
campestris L. 250 (15), A 184
campestris Scop. = saxatilis
camphorata Vill. 246 (1), A 183
canescens Pollini (camph.) = alba
canescens Ten. (variab.) 250 (15 β b)
cernua Fiori (cærul.) 250 (16 α c)
chamæmelifolia Vill. 249 (11)
colorata Goir. (vulgar.) A 184 (7 h)
Columnæ A Ten. = camphorata (α)
Columnæ B Ten. = alba
corymbosa Lam. = camphorata (α)
cretacea Fiori (cærul.) 251 (16 γ)
crispa Rchb. (vulgar.) A 184 (7 i)
densiflora Viv. 251 (16 δ), A 184
Dracunculus L. 249 (13)
elegans Jan = intermedia
eriantha Guss. hb. (vulg.) 248 (7 d)
eriantha Ten. 247 (5 β b)
filaginoidea Stechm. = valesiaca
fragrans Zum. (non W.) = palmata?
gallica Gr. et Godr. p. p., Bert. = palmata, densiflora
garganica Ten. 246 (1 γ b)
Genipi Weber 247 (5)
glacialis L. 246 (4)
glacialis Wulf. = Mutellina
glutinosa J. Gay 250 (15 β c)
glutinosa Ten. (campestr.) = glutin.
helvetica Schleich. = nana
humilior Goir. (vulgar.) A 183 (7 e)
humilis Wulf. = saxatilis
incanescens Jord. = alba
inculta Salis = densiflora
intermedia Gaud. (glacial.) 246 (4 α b)
intermedia Gremli (nana) = alpina
intermedia Host = alba
lanata Koch = nitida
lanata W. p. p., Auct. ital. = pedemontana
latifolia DC. (cærul.) 251 (16 α)
Lobelii All. = camphorata
maritima Bert. = cretacea
maritima L. 251 (nota)
Mutellina Vill. 247 (4 β)
nana Gaud. 250 (14 β)
neapolitana Ten. = variabilis (a)
nitida Bert. 247 (4 γ)
norica Leyb. = Allionii

Digitized by Google

ARTEMISIA III 245 (871)
palmata Lam. 251 (16 β)
paniculata Lam. 251 (nota)
paniculata Ruch. = robustior
parviflora Gaud. (nana) = alpina
pedemontana Balb. 247 (6)
pedemontana Bourg. = Villarsii
pedemontana Comolli (lanata) = ramosa
pedemontana L. (tanacetif.) = Allionii
penduliflora Mab. (cærul.) = sipontina
petrosa Jan 247 (5 β)
petrosa Weiss (Mutellina) = prec.
pinnata Viv. hb. = densiflora
pontica L. 248 (8)
Portæ Huter = nitida
procera Lap, Ten. (non W.) = variabilis
procerior Goir. (*vulgar.*) A 183 (7 a)
racemulosa Rchb. (nana) = Allionii
ramosa Fiori (*nitida*) 247 (4 γ b)
robustior Koch (*campestr.*) 250 (15 α d)
rupestris All. = Mutellina
rupestris Scop. = camphorata
rupestris Vill. = Villarsii
saligna Ten. = canescens
Santonica Lam. = palmata
saxatilis W. et K. 246 (1 β), A 183
scoparia W. et K. 251 (nota)
sericea Fr. (*campestr.*) 250 (15 α c)
serotina Goir. (*campestr.*) A 184 (15 α c)
serotina Goir. (*vulgar.*) A 184 (7 g)
sipontina Ten. 251 (16 β b)
spicata Sang., Paoluc. = eriantha
spicata Wulf. = Genipi
subcanescens W. 246 (1 α)
umbrosa Goir. (*vulgar.*) A 184 (7 f)
tanacetifolia All. (non L.) = atrata
valesiaca All. 251 (17)
valesiaca Koch (marit.) = prec.
valesiana Lam. = valesiaca
variabilis Ten. 250 (15 β)
variabilis Tod. = saxatilis
vestita Bruegg. 248 (7 b)
Villarsii Gr. et Godr. 247 (5 β a)
virens Vis. (camphor.) = camphorata (α)
virescens Guss. (*cærul.*) 250 (16 α b)
virescens Ten. (*variab.*) 250 (15 β a)
vulgaris L. 248 (7), A 183
vulgaris β Bert. = vulg. d. eriantha
vulgaris B Ten. = vulg. d. eriantha
vulgatissima Bess. (vulg.) = vulgaris

ARTHROCHILIUM = Epipactis
palustre G. Beck. = E. palustris
ARTHROCNEMUM I 316 (297)
ambiguum Moq. = Salicornia frutic.
californicum Moq. (frutic.) = Salicornia frutic.
fruticosum Moq. = glaucum + Salicornia frut.
glaucescens Ces. P. et G. (macrostach.) = glaucum
glaucum Moq. (fruticosum) = seg.
glaucum Ung. 316, A 65
macrostachyum Moq. (frutic.) = glaucum + Salicornia frutic.
macrostachyum Moris et Delp. = glaucum
ARTHROLOBIUM = Coronilla et Ornithopus
creticum Desw. = C. cret.
ebracteatum Desv. = Ornithopus exstipulatus
repandum DC. = C. rep.
scorpioides Desv. = C. scorp.
ARTHROLOBUS = Rapistrum
perennis Andrz. = R. per.
rugosus Andrz. = R. rug.
ARUM I 148 (149)
alpinum Schott = cylindraceum
Arisarum L. = Arisarum vulgare
balearicum Buchoz = pictum
Colocasia L. = Colocasia antiquorum
corsicum Lois. = pictum
crinitum Ait. = Dracunc. muscivorus
cylindraceum Gasp. A 205 (2 β)
Dracunculus L. = Dracunc. vulgaris
gramineum Lam. = Biarum tenuifol.
immaculatum Schott 148 (2 b)
Italicum Mill. 148 (3)
maculatum All. = italicum
maculatum L. 148 (2), A 39, 205
muscivorum L. f. = Dracunc. muscivor.
numidicum Schott = italicum
peltatum α Lam. = Colocasia antiquor.
pictum L. f. 148 (1)
proboscideum L. = Arisarum prosoc.
proboscid. β L. = Ambrosinia Bassii
tenuifolium L. = Biarum ten.
vulgare Lam. = maculatum
Zelebori Schott = immaculatum
ARUNCUS = Spiræa
Aruncus Karsten = S. Aruncus
silvester Kostel = S. Aruncus
vulgaris Raf. = S. Aruncus
ARUNDO I 65 (77)
acutiflora Schrad. = Calamagr. arund. × Epig.
aggerum Kit. = Phragmites comm.
Agrostis Lap. = Molinia cærulea

ARUNDO I 65 (77)
Agrostis Scop. = Calamagr. arund. × Epig.?
alpina Vill. = Calamagr. Halleriana
altissima Benth. = Phragmites Isiaca
Ampelodesmos Cyr. = Ampelod. tenax
arenaria L. = Psamma aren.
bicolor Poir. = Ampelodesma bicolor
biflora Lam. = Ampelodesma tenax
Calamagrostis All. = Calamagr. Epigeios
Calamagrostis Hall. f. = Calamagr. Halleriana
Calamagrostis L. = Calamagr. lanceolata
canescens Weber in Wigg. = Calamagr. — canesc.
chrysantha Asch. et Græbn. (Isiaca) = Phragmit. chrys.
collina Ten. = mauritanica
colorata W. = Phalaris — picta
Donax L. 65 (1)
effusa Gmel. = Calamagr. litorea
Epigeios All. = Calamagr. litorea
Epigeios L. = Calamagr. Epig.
festucoides Desf. = Ampelodesma tenax
flavescens Asch. (Phragm.) = Phragmit. — flav.
glauca M. B. = Calamagr. litorea
græca Lk. = Phragmit. comm.
Halleri W. = Stipa Calamagr.
Halleriana Gaud. = Calamagr. Haller.
humilis Asch. et Graebn. (Phragm.) = Phragmit. hum.
Isiaca Del. = Phragmit. Isiaca
lanceolata R. et S. = Calamagr. lanc.
laxa R. et S. = Calamagr. laxa
Leersii Ett. = Calamagr. lanceolata
litorea Schrad. = Calamagr. lit.
mauritanica Desf. 65 (2 β)
mauritanica Poir. = Ampelodesma tenax
maxima Forsk. = Phragmit. Isiaca?
micrantha Lam. = Pliniana
montana R. et S., Gaud. = Calamagr. mont.
nigricans Mérat = Phragmit. — subuniflora
Phragmites L. = Phragmites comm.
Pliniana Turra 65 (2), A 17
Plinii Turra, Vitm. = Pliniana
Pseudo-phragmites Hall. f. = Calamagr. litorea
Pseudo-phragm. Lej. = Phragmit. — subuniflora
Pseudo-phragm. Schrader = Calamagr. Halleriana
pygmæa Spr., Moretti = Trisetum pygm.
sativa Lam. = Donax

Digitized by Google

ARUNDO I 65 (77)
silvatica Schrader = Calamagr. arundin.
speciosa Schrad. = Stipa Calamagr.
subulata Gay = Calamagr. arund. × Epigeios
subuniflora DC. (Phragm.) = Phragmit. = subunifl.
tenax Vahl. = Ampelodesma tenax
tenella Schrad. = Calamagr. tenella
varia Schrad. = Calamagr. varia
versicolor Mill. = Donax
vulgaris Lam. = Phragmit. comm.
vulnerans Gilib. = Phragmit. comm.
ASARUM I 289 (280)
europæum L. 289
Hypocistis L. = Cytinus Hypoc.
ibericum Stev. = europæum
lucidum Salisb. = europ.
officinale Mœnch = europ.
renifolium Stokes = europ.
reniforme Gilib. = europ.
ASCALEA
lanceolata Hill = Cirsium lanc.
nutans Hill = Carduus nut.
ASCALONICUM = Allium
sativum Ren. = A. Ascalonic.
Schœnoprasum Ren. = A. Schœnopr.
Scorodoprasum Ren. = A. Scor.
ASCLEPIAS II 316 (704)
Cornuti Dcne. = syriaca
fruticosa L. 346, A 164
nigra L. = Cynanchum nigr.
syriaca L. 346 (nota)
Vincetoxicum L. = Cynanchum Vinc.
ASPALATHUS = Anthyllis
cretica L. = A. cretica
ASPARAGOPSIS = Asparagus
alba Kth. = A. albus
ASPARAGUS I 208 (208)
acutifolius L. 209 (3), A 49, 207
ætnensis Torn. = officin.
albus L. 209 (5)
altilis Asch. = seg.
altilis L. (offic.) = officin.
amarus DC. = maritimus
ambiguus DNtrs. A 207 (3 c subf.)
aphyllus L. 209 (4), A 49
australis Tod. (acutifol.) = commutatus
brevifolius Tin. in Guss. (*acutifol.*) 209 (3 b)
brevifolius Torn. =prec.
Broussonetii Jacq. = stipularis
collinus Jan = tenuifol.
commutatus Ten. A 49 (3 c), 207
Corruda Scop. = acutifolius
horridus L. f. = stipularis
hortensis Mill. = officin.
inarimensis Guss. (acutifol.) = commutatus
inarimensis Torn. = prec.
marinus Rchb. = maritimus
maritimus L. (offic.) = seg.
maritimus Mill. 208 (2 β), A 49
ASPARAGUS I 208 (208)
medeoloides Thunb. 209 (6)
officinalis L. 208 (2), A 49
offic. β L. = tenuifolius
Pastorianus Webb et Berth. = albus
phyllacanthus Lam. = aphyllus
scaber Brign = maritimus
silvaticus W. et K. = tenuifol.
stipularis Forsk. 209 (4 β)
tenuifolius Lam. 208 (1), A 49
ASPERA = Galium
muralis Lowe = G. murale
nutans Mœnch = prec.
ASPERUGO II 381 (729)
procumbens L. 381
vulgaris Dum.-Cours. = prec.
ASPERULA III 118 (821)
alpina Wk. et Lge. (cynanch. = nitens
aristata L. f. 122 (12 ζ)
arvensis L. 118 (1)
breviflora Tanf. (*cynanch.*) 121 (12 α e)
calabrica L. f. = Putoria cal.
canescens Vis. 122 (12 ι)
canescens Vis. (cynanch.) = prec.
capillacea Wk. et Lge. (*cynanch.*) 121 (12 β)
commutata R. et S. (120 7 β)
cynanchica L. 121 (12), A 176
deficiens Viv. 120 (7 γ)
densiflora Gr. et Godr. (*cynanch.*) 121 (12 γ)
flaccida Ten. 122 (12 ζ b)
galioides Auct. (an M. B.?) = glauca
glaberrima Bég. (*rupestr.*) 120 (8 b)
glabrata Tanf. (toment.) = deficiens
glauca Bess. 119 (5)
Gussoneana Ces. P. et G. = seg.
Gussonei Boiss. 121 (11)
heteroclada Haussm. 121 (12 α b)
hexaphylla All. 120 (9)
incana Guss. (scabra) = canescens
incana Pasq. (non S. et S.) = tomentosa α et β commutata
Jordani Perr. et Song. 122 (12 ζ c)
lejantha Kern. 122 (12 η b)
levigata L. 119 (4)
longiflora W. et K. 122 (12 η)
lutea S. et S. 121 (11)
maritima Wk. et Lge. (cynanch.) = densiflora
meridionalis A. Terr. (arist.) = aristata
neglecta Guss. 122 (12 ε), A 176
neglecta Moris = lutea
nitens Guss. 122 (12 δ)
nitida Guss. (non S. et S.) = Gussonei
odorata L. 119 (3)
palustris Ten. 120 (6 β)
pulvinaris Boiss. (*lutea*) 121 (10 b)
pumila Moris = lutea
rotundifolia L. = levigata
rupestris Tin. 120 (8)
rupestris b Guss. = glaberrima
ASPERULA III 118 (821)
rupicola Jord. nitens
scabra Moris = lutea
scabra Presl 122 (12 θ)
scabrida Freyn (*cynanch.*) 121 (12 α c)
semiglabra DC. (toment.) = commutata
Sherardi Hœck. = Sherardia arvensis
suberosa Guss. (non S. et S.) = Gussonei
subulata Posp. (*cynanch.*) 121 (12 α d)
taurina L. 118 (2)
tinctoria L. 119 (6)
tomentosa Ten. 120 (7)
toment. B Ten. = commutata
vulgaris Gib. et Pir. (cynanch.) = nitens
ASPHALTIUM = Psoralea
bituminosum Medic. = P. bit.
frutescens Medic. = prec.
ASPHODELINE I 204 (197)
capillaris Kth. = liburnica
cretica Vis. = liburnica
liburnica Rchb. 204 (2)
lutea Rchb. 204 (1)
ASPHODELOIDES = Asphodelus
ramosa Mœnch = A. fistulosus
ASPHODELUS I 208 (196)
æstivus Brign. = Asphodeline liburnica
æstivus Brot. = microcarpus
æstivus Rchb. = tenuifolius
affinis Parl. = microcarpus
africanus Jord. = microcarpus
albus Mill. 208 (1 β), A 49
approximatus Gr. et Godr. = grandiflorus
Arrondeani Lloyd = albus
Audibertii Req. in Schult. = microcarpus
australis Jord. et Fourr. = cerasifer
capillaris Red. = Asphodeline liburnica
cerasifer J. Gay 208 (1 α)
corsicus Jord. = cerasifer (for.)
creticus Lam. = Asphodeline liburnica
Deseglisei Jord. et Fourr. = albus
fistulosus L. 208 (2), A 49
grandiflorus Gr. et Godr. (*fistulos.*) A 49 (2 α b)
grandiflorus Jord. et Fourr. = cerasifer
infestus Parl. = microcarpus
latifolius Chabert (*microcarp.*) 208 (1 γ b)
liburnicus Scop. = Asphodeline liburn.
luteus L. = Asphodeline lut.
macrocarpus Parl. = albus
microcarpus Rchb. = tenuifolius
microcarpus Viv. 208 (1 γ)
Morisianus Parl. = microcarpus (for.)
neglectus Schult. A 49 (1 β c)
pollinensis N. Terr. (*albus*) A 49 (1 β c)

Digitized by Google

ASPHODELUS I 208 (196)
pratensis Pourr. = microcarpus
procerus Jord. et Fourr. = cerasifer
ramosus Gouan = cerasifer
ramosus L. 203 (1), A 49
ramosus L. p. p. = microcarpus
racemosus Lk. = microcarpus
tenuifolius Cav. 204 (2 β)
tenuior Fisch. = Asphodeline liburnica
ASPIDIUM I 7 (6)
aculeatum Sw. 7 (2), A 2, 201
aculeatum Wimm. = lobatum
aculeolatum Dœll. = aculeatum
affine F. et M. = Nephrod. — affine
affine Rchb. = Nephrod. pallidum
alpestre Hpe. = Polyp. rhæticum
alpestre Pntck. = Nephrod. rigidum
alpinum Sw. = Cystopt. alpina
angulare Kit. A 2 (2 α)
aristatum Christ (*lobat*) A 2 (2 β b)
australe Ten. (rigidum) = Nephrod. pallidum
Bicknellii Christ A 2 (2 β c)
bosniacum Formanek (Braunii) = angulare
Braunii Pntck. = Nephrod. pallidum
Braunii Spenner 8 (2 γ), A 3
calcareum Baumg. = Polyp. Robertianum
caucasicum A. Br. = Nephrod. — affine
commune Christ (*aculeat.*) A 2 (2 α a)
Contarinianum Trevis. (*lobat.*) A 2 (2 β for.)
crenatum Milde (Fil-mas) = Nephrod. — crenat.
cristatum Sw. = Nephrod. crist.
cuneatum Schk. = Asplen. fissum
deltoideum Milde (dilat.) = Nephrod. — delt.
dentatum Sw. = Cystopt. — dent.
deorso-lobatum Milde (Fil.-mas) = Nephrod. — deorso-lob.
dilatatum Sw. = Nephrod. dilat
distans Viv. = Nephrod. dist.
Dryopteris Baumg. = Polyp. Dryopt.
dumetorum Milde (dilat.) = seg.
dumetorum Sm. = Nephrod. — dumet.
erosum Lasch (spinul.) = Nephrod. — eros.
Filix-fœmina Sw. = Asplen. Fil.-fœm.
Filix-mas Sw. = Nephrod. Fil.-mas
fontanum Sw. = Asplen. font.
fragile Sw. = Cystopt. frag.
fragile γ Pollini = Cystopt. — pumila
germanicum Milde (rigid.) = Nephrod. — germ.
ASPIDIUM I 7 (6)
Halleri W. = Asplen. fontanum
hastulatum Ten. A 2 (2 α b)
Heleopteris Milde (Fil.-mas) = Nephrod. — Heleopt.
incisum Doell (Fil.-mas) = Nephrod. — affine
incisum Milde (Fil.-mas) = Nephrod. — deorso-lobat.
intermedium Sadl. = lobatum
intermedium Trevis. (*lobat.*) A 2 (2 β for.)
lobatum Sw. 7 (2 β), A 2, 201
lobato × aculeat. Christ = Bicknellii
Lonchitis Sw. 7 (1), A 2
longilobum Milde (*lobat.*) A 2 (2 β for.)
meridionale Milde (rigid.) = Nephrod. — mer.
microlobum Milde (*lobatum*) A 201 (2 β for.)
microlobum Warnstorf (*angul.*) A 2 (2 α c)
Mildeanum Gœpp. = Nephrod. — deorso-lobat.
montanum Asch. = Nephrod. Oreopteris
montanum Sw. = Cystopt. mont.
munitum Sadl. = lobatum
nevadense Boiss. = Nephrod. — nevad.
nivale Bory = Nephrod. — Hypodematium
oblongum Milde (dilat.) = Nephrod. — delt.
Oreopteris Sw. = Nephrod. Oreopt.
paleaceum Don = Nephrod. — paleac.
pallidum Lk. = Nephrod. pall.
Phegopteris Baumg. = Polyp. Pheg.
pilosum Schur = Braunii
platylobum Milde (*lobat.*) A 2 (2 β for.)
Plukenetii Nym. = seg.
Plukenetii Trevis. (*lobat.*) A 2 (2 β for.)
Pontederæ W. = Cystopt. frag.
pusillum Goir. (rigid.) = Nephrod. — pusill.
regium Sw. = Cystopt. regia
rhæticum Sz. = Polyp. rhæticum
rigidum Bert. = Nephrod. — Bertolonii
rigidum Sw. = Nephrod. rigid.
Robertianum Luerss. = Polyp. Rob.
Rogætzianum Bolle (Thelypt.) = Nephrod. — Rogæt.
rotundatum Dœll (acul.) = seg.
rotundatum Trevis. (*lobat.*) A 2 (2 β for.)
rufidulum Sw. = Woodsia ilvensis (α)
spinulosum Sw. = Nephrod. spinul.
subintegrum Dœll (Fil.-mas) = Nephrod. — subint.
Swartianum Koch (acul.) = angulare
ASPIDIUM I 7 (6)
tenuifolium Ten. = Asplen. fissum
Thelypteris Sw. = Nephrod. Thel.
tripinnatisectum Milde (rigid.) Nephrod. pallidum
umbraticum Kunze A 2 (2 β d)
Veselskii Hazsl. (Fil.-mas) = Nephrod. — deorso-lobat.
viscosum Fr. Muell. = Nephrod. pallidum
vulgare Dœll (acul.) = lobatum
ASPLENIUM I 10 (9)
acutum Bory 11, A 5 (4 β a)
Adiantum-nigrum L. 11 (4), A 5
Ad.-nigr. × Trichom. Milde = Trichom. × Ad.-nigr.
alpestre Goir. (*Trichom.*) A 202 (11 h)
alpestre Mett. = Polyp. rhæticum
alternifolium Wulf. = Trichom. × septentr.
ananiense Loss = lepidum
anceps Trevis. (*Onopteris*) A 5 (4 β c)
angustatum Asch. (*fontan.*) A 5 (2 α b)
angustatum Koch (Halleri) = prec.
angustifolium Guss. = fissum
angustifolium Hall. f. (*R.-mur.*) A 6 (7 for.)
angustisectum Neilr. (Ad.-nigr.) = cuneifol.
argutum Kaulf. A 5 (4 α c)
auriculatum Milde (*Trichom.*) A 7 (11 d)
bifurcatum Opiz = septentrion.
Billotii F. Schultz = lanceolatum (α)
bipinnatum Clowes (*viride*) A 7 (10 e)
brachyphyllum Gasp. = lepidum
Breynii Pollini = fissum
Breynii Retz. = Trichom. × septentr.
Brunfelsii Heufl. (*R.-mur.*) A 6 (7 a)
calabrum N. Terr. (*R.-mur.*) A 6 (7 for.)
Ceterach L. = Ceterach offic.
corsicum Fiori (*Fil.-fœm.*) A 4 (1 for.)
crenatum Asch. (Ceterach) = Ceterach — cren.
cuneatum Moore (R.-mur.) = ps.-germanic.
cuneatum F. Schultz = lanceolat.
cuneifolium Celak (R.-mur.) = elatum
cuneifolium Viv. A 5 (4 β)
davallioides Tausch A 5 (4 β b)
dentatum Doell (*Fil.-fœm.*) A 4 (1 a)
dentatum Goir. et Tonini (*Trichom.*) A 202 (11 i)
depauperatum Rosenstock (*Ruta-mur.*) A 202 (7 for.)
dolosum Milde 12 (nota) = Trichom. × Ad.-nigr.

Digitized by Google

ASPLENIUM I 10 (9)
elatum Láng (*R.-mur.*) A 6 (7 e)
ellipticum Christ (*R.-mur.*) A 6 (7 for.)
Filix-fœmina Bernh. 10 (1), A 4
fissidens Doell (*Fil.-fœm.*) A 4 (1 b)
fissum Heufl., Tod. = lepidum
fissum Kit. 11 (5), A 6
fissum Wimm. = cuneifol.
fontanum Bernh. 10 (2), A 5
foresiacum Christ A 5 (2 β)
foresiac. A. Le Grand (Halleri) = prec.
forisiense A. Le Grand (Halleri) = prec.
Forsteri Sadl. = cuneifolium
germanicum Boeck. = ps.-germanic.
germanicum Weiss. 11 = Trichom. × septentr., cfr. A 7
glandulosum Goir. (*Ruta-mur.*) A 202 (7 a')
glandulosum Lois. = Petrarchæ
Halleri DC. = fontanum (α a)
Harovii Milde (*Trichom.*) A 7 (11 e)
Hauchecornei Asch. (*Trich.* × *R.-mur.*) A 7
Hemionitis L. = Scolopendr. Hem.
Heufleri Reichardt A 7 (×)
Heuffelii Wierzb. = Ad.-nigrum
incisi-crenatum Milde (*viride*) A 7 (10 c), 202
incisum Moore (*Trichom.*) A 7 (11 f)
italicum Christ (*foresiac.*) A 5 (2 β b)
lanceolatum Huds. 10 (8), A 5
lancifolium Heufl. (*Ad.-nigr.*) A 5 (4 α a)
latifolium Rabenh. p. p. (fissum) = lepidum
latisectum Neilr. (Ad.-nigr.) = nigrum
lepidum Presl 11 (6), A 6
leptophyllum Wallr. (*R.-mur.*) A 6 (7 d)
longipes Genn. (*obovat.*) A 5 (3 β b)
macrophyllum St.-Lag. (fontan.) = foresiacum
major Trevis. (fontanum) = pedicularifol.
marginatum N. Terr. (*R.-mur.*) A 6 (7 for.)
marinum L. 12 (9), A 7
Matthioli Gasp. A 6 (7 b)
microphyllum Tin. 12 (11 b)
minor Lk. (*marin.*) A 7 (9 b)
minor Trevis. (fontanum) = angustatum
molle Heldr. et Sart. (*Fil.-fœm.*) A 4 (1 for.)
multicaule Presl = elatum
multicaule Scholtz = cuneifolium
multicaule Trevis. (R.-mur.) = elatum
multidentatum Doell (*Fil.-fœm.*) A 4 (1 c)

ASPLENIUM I 10 (9)
nebrodense Fiori (*Fil.-fœm.*) A 4 (1 for.)
nigrum Heufl. (*Ad.-nigr.*) A 5 (4 α)
oblongum Christ (*viride*) A 7 (10 b)
obovatum Viv. 10 (8 β), A 5
obtusum Kit. A 5 (4 α b)
Onopteris L. A 5 (4 γ)
Pechnelii O. Kze. = microphyllum
pedicularifolium Asch. (*fontan.*) A 5 (2 α a)
Petrarchæ DC. 12 (12)
pilipes Trevis. (obovat.) = obovatum (a)
pilosum Guss. = Petrarchæ
plicatum Bruhin (Fil.-fœm.) = rhæticum
polyphyllum Sacc. (R.-mur.) = ps.-germanic
præmorsum Christ (R.-mur.) A 6 (7 for)
pseudo-fissum Heufl. (R.-mur.) = tenuifol.
pseudo-germanicum Heufl. (*R.-mur.*) A 6 (7 c)
pseudo-lanceolatum Christ (*fontan.*) A 5 (2 α c)
pseudo-lepidum Christ (*R.-mur.*) A 6 (7 for.)
pseudo-lepidum Trevis. (*R.-mur.*) A 6 (7 for.)
pseudo-nigrum Heufl. (*R.-mur.*) A 6 (7 f)
Pseudo-Serpentini Milde (R.-mur.) = elatum
pubescens Gr. et Godr. (Trichom.) = Petrarchæ
pulchellum Goir. (*Ruta-mur.*) A 202 (7 for.)
pusillum Goir. (*viride*) A 202 (10 f)
rhæticum Posp. (*Fil.-fœm.*) A 5 (1 for.)
rotundifolium Celak. (R.-mur.) = Matthioli
rotundatum Milde (*Trichom.*) A 7 (11 g)
Ruta-muraria L. 11 (7), A 6, 202
Scolopendrium L. = Scolop vulgare
sectum Milde (*viride*) A 7 (10 d)
Seelosii Leyb. 12 (14), A 7
septentrionale Hoffm. 12 (13), A 7
septentr. × Trichom. Murb. = Trichom. × sept.
Serpentini Tausch 11 = cuneifol., cfr. A 5
serpentinum Presl = prec.
silesiacum Milde = acutum
stenophyllum Christ (*R.-mur.*) A 7 (7 for.)
tabulare Trevis. (Ad.-nigr.) = argutum
tabulare Schrad. = argutum
tenuifolium Guss. = fissum
tenuifolium Nees (*R.-mur.*) A 6 (7 g)
trapeziforme Guss. (marin.) = minor
trapeziforme Huds. = marinum

ASPLENIUM I 10 (9)
Trettenerianum Jan = fissum
Trichomanes L. 12 (11), A 7, 202
Trichomanes β L. = viride
Trichom. × *Ad.-nigrum Asch.* A 7
Trichom. × germanic. 12 = Heufleri, cfr. A 7
Trichom. × *R.-muraria Asch.* A 7
Trichom. × *septentrionale Asch.* A 7
trichomanoides Houtt. = Trichomanes
tridactylites Bartl. = Seelosii
umbrosum Milde (*Trichom.*) A 7 (11 c)
umbrosum Vill. = viride
vallis-clausæ Req. = Petrarchæ
Virgilii Bory = Onopteris
viride Huds 12 (10), A 7, 202
vogesiacum F. Schultz = viride
Zoliense Kit., Heufl. (*R.-mur.*) A 7 (7 for.)
ASPRELLA = Oryza
flexuosa Dulac = O. clandestina
nardiformis Host = Psilurus aristatus
oryzoides Lam. = O. clandestina
ASTER III 227 (864)
acer L. 229 (7)
adulterinus W. 228 (3 α c)
albiflorus Fiori (*Tripol.*) 229 (6 e)
alpinus L. 227 (1)
amelloides Rchb. = Pseudo-Amellus
Amellus L. 228 (2)
anacamphthiphyllus Fiori (*Linosyr.*) 230 (8 γ)
angustifolius N. Terr. (*Tripol.*) 229 (6 b)
annuus L. = Erigeron annuus
artemisiæflorus Poir. = Tradescanti
australis Ten. (*Tripol.*) 229 (6 c)
Bellidiastrum Scop. = Bellidiastr. Michelii
bifrons All. = Inula bifrons
brachyglossus DC. (*alp.*) 227 (1 α d)
Breyninus G. Beck (*alp.*) 227 (1 α a)
britannicus All. = Inula brit.
brumalis Nees = levigatus
Bubonium Scop. = Inula spiræifolia
chinensis L. = Callistephus chin.
decurrens Mœnch = Inula bifrons
discoideus Rchb. f. (*Tripol.*) 229 (6 f)
dolomiticus G. Beck (*alp.*) 227 (1 α b)
dysentericus Scop. = Pulicaria dysenterica
ensifolius Scop. = Inula ensifol.
floribundus W. 228 (3 α b)

Digitized by Google

ASTER III 227 (864)
fragilis W. = Tradescanti
Garibaldii Bruegg. 227 (1 β)
glaber Bolzon (*Tripolium*) A 182 (6 a)
globulariæformis Arc. (salignus) = seg.
globulariæformis Goir. (*Amell.*) 228 (2 c)
Helenium Scop. = Inula Helen.
hirsutus Host 227 (1 α c)
hirtus Scop. = Inula hirta
hungarious Poir. = salicifolius
latifolius DC. (Amell.) = Pseudo-Amell.
leucanthemus Desf. = Tradescanti
leucastrum G. Beck (*alp.*) 227 (1 α e)
levigatus Lam. 228 (3 β)
Linosyris Bernh. 229 (8), A 182
macranthus Briq. (*Amell.*) 228 (2 d)
minor Weiss. (*Linosyr.*) 229 (8 α c)
miser Ait. (non L.) = Tradescanti
monocephalus Goir. (*Lynosyr.*) A 182 (8 α e)
montanus All. = Inula montana
mutabilis Ait. = levigatus
Novi-Belgii L. 228 (3)
odorus All. = Pulicaria odora
officinalis All. = Inula Helenium
paluster Fiori (*Linosyr.*) 230 (8 β)
paniculatus Lam. (an Mill.?) = salicifolius
pannonicus Jacq. 229 (6 d), A 182
parviflorus Nees = Tradescanti
patulus Weiss. (*Linosyr.*) 229 (8 α b)
polycephalus Anzi (alp.) = Garibaldii
Pseudo-Amellus DC. 228 (2 b)
Pulicarius Scop. = Pulicaria vulgaris
salicifolius Scholl 228 (4), A 182
salicinus Scop. = Inula salicina
salignus Bert. et Auct. it. = Novi-Belgii
salignus W. = salicifolius
Savii Arc. = paluster
serotinus W., Nees = Novi-Belgii
Sorrentinii Lojac. A 182
squarrosus All. = Inula spiræifolia
strictus Kittel (*Linosyr.*) 230 (8 α d)
Tradescanti L. p. p., A. Gray 229 (5)
Tradescanti L. p. p. = salicifolius
Tripolium L. 229 (6), A 182
undulatus Mœnch = Inula britannica
Vaillantii All. = Inula Vaillant.

ASTER III 227 (864)
vimineus Gib. et Pir. (non Lam.?) = Novi-Belgii?
vulgaris Fiori (*Linosyr.*) 230 (8 α), A 182
ASTERIAS = Gentiana
hybrida G. Don = G. lutea
lutea Borckh. = prec.
ASTERISCUS III 295 (891)
aquaticus Less. 296 (2)
aureus Lge. 296 (3 β)
gracilis Fiori (*spinos.*) A 186 (3 for.)
latifolius Fiori (*spinos.*) A 186 (3 for.)
maritimus Less. 296 (1)
nanus Boiss. (*aquat.*) 296 (2 b)
nanus Nym. = prec.
pallens Cicioni (*spin.*) 296 (2 α)
pygmæus DC. p. p. (aquat.) = nanus
sessilis Mœnch = maritimus
spinosus Gr. et Godr. 296 (3), A 186
tortuosus A. Terr. (*spin.*) 296 (2 α b)
ASTEROCEPHALUS = Scabiosa
agrestis Spr. = S. agr.
argenteus Spr. = S. arg.
atropurpureus Spr. = S. atropurp.
brachiatus Rchb. = S. brach.
canescens Lag. = S. can.
Columbaria Wallr. = S. Columb.
Columnæ Rchb. = S. holoseric.
crenatus Spr. = S. cren.
cretious Spr. = S. cret.
dichotomus Lag. = S. dich.
eburneus Spr. = S. eburn.
glabratus Wallr. = Succisa — glabrata
graminifolius Zum. = S. gram.
gramuntius Spr. = S. gram.
Hladnikianus Schur = S. Hlad.
holosericeus Spr. = S. holos.
limonifolius Spr. = S. lim.
lucidus Spr. = S. luc.
maritimus Spr. = S. mar.
ochroleucous Wallr. = S. ochr.
palæstinus Spr. = S. brachiata
pratensis Wallr. = Succisa prat.
pyrenaicus Sweet = S. pyren.
rutæfolius Sweet = Pycnocomon rutæfolium
Scopolii Rchb. = S. Scopol.
Sibthorpianus Gris. (brach.) = S. Sibthorpiana
siculus Spr. = S. sic.
silenifolius Spr. = S. silen.
stellatus Rchb. = S. stell.
suaveolens Wallr. = S. canescens
Succisa Wallr. = Succisa pratensis
uoranicus Spr. = S. argentea
urceolatus Spr. = Pycnocomon rutæfolium
vestinus Rchb. = S. vestina
Wulfenii R. et S. = S. Wulf.
ASTEROLINUM II 323 (683)
Linum-stellatum Duby 323
lysimachioideum St.-Lag. = Lin.-stell.

ASTEROLINUM II 323 (683)
serpyllifolium Ball = Lin.-stell.
stellatum Lk. et Hoffgg. = prec.
ASTEROPHYLLUM = Asperula
Aparine Schimp. et Spenn. = Galium Apar.
Asperula id. = A. odorata
galioides id. = A. gal.
Galium id. = Galium verum
Sherardianum id. = Sherardia arvensis
silvaticum id. A. odorata
tinctorium id. = A. tinct.
ASTEROTHRIX = Leontodon crispa Fourr. = L. crispus
ASTRAGALOIDES = Astragalus
Alopecurus Mœnch. = A. alopecuroides
alpina Medic. = A. alp.
australis Medic. = A. austr.
Cicera Mœnch = A. Cicer
frigida Medic. = A. frig.
syphilitica Mœnch = A. exscapus
ASTRAGALUS II 75 (498)
albidus W. et K. = vesicarius
alopecuroides L. 84 (29), A 142
alopterus DC. = austriacus
alpinus Fiori (*campester*) 81 (18 c), A 142
alpinus L. 79 (14)
arenarius Pall. (non L.) = danicus
argenteus Bert. = Muelleri
aristatus L'Hér. = sempervirens
australis Lam. 79 (13)
austriacus L. 82 (23)
bæticus L. 77 (4)
balmæus Beauverd (*Gerardi*) A 142 (13 β b)
bicolor Rouy (campestr.) = sordidus
Boissieri Fisch. = nebrodensis
Bonannii J. et C. Presl = leucophæus
brevipes Arc. (*sirinicus*) 84 (30 β c)
Buceras W. 77 (6 b)
calabricus Fisch. = seg.
calabrus Fisch. em. 85, A 142 (32 bis)
calabrus Ten. (siculus) 85 (32 β) = prec, cfr. A 142
campester L. 81 (18), A 142
canescens Fiori (*sempervir.*) 85 (31 b)
canescens Guss. (aristatus) = prec.
canescens L. Vacc. (*austral.*) A 141 (13 α b)
caprinus L. 78 (8)
Cicer L. 82 (21)
cicerinus St.-Lag. = Cicer
contortuplicatus L. 85 (nota)
cristatus Gouan = Pentaglottis
danicus Retz. 81 (20 α)
dasyglottis Pall. = Pentaglottis
densiflorus Fiori (*sempervir.*) 85 (31 c)
densiflorus Guss. (aristatus) = prec.

Digitized by Google

ASTRAGALUS II 75 (498)
depressus Guss. = leucophæus
depressus L. 78 (7)
dichopterus Pall. = austriacus
echinatus Lam. = Pentaglottis
Epiglottis L. 76 (1)
eriocephalus Ten. (non W.) = calabrus
exilis Chaix = microphyllus
exscapus L. 78 (9)
fœtidus Vill. 80 (17)
frigidus A. Gray 79 (11)
Gaudinii Burn. (Parvopassuæ) = neglectus
genargenteus Moris 84 (30 β b)
Gerardi Janka 79 (18 β), A 142
glaber DC. (*caprinus*) 78 (8 c)
glaucoides S. G. Gmel. = Coronilla varia
glaucus M. B. = vesicarius
Glaux Vill. (non L.) = purpureus
glycyphyllos L. 78 (10)
Gremlii Burn. 82 (20 β)
Gussonei Tod. = pentaglottis
Halleri All. = fœtidus
Halleri Fiori (*uralensis*) 81 (19 β)
hamosus L. 77 (6)
helminthocarpus Vill. 78 (7 α b)
Huetii Bge. 78 (8 b)
Huteri Fiori (*Parvopassuæ*) 80 (15 γ c)
Hypoglottis Brot. = Pentaglottis
Hypoglottis L., Bge. 81 (20), A 142
Hypoglottis Ten. = Epiglottis
hyposericeus Rouy (variabil.) = Halleri
illiryeus Bernh. 83 (24 β)
incanus Wulf. (non L.) = illiryeus
incurvus Rchb. (non Desf.) = illiryeus
Jacquinii Rouy 80 (15 α b)
lapponicus Burn. 80 (15 β), A 142
leucophæus Sm. 78 (7 β)
leontinus All. = danicus
leontinus Wulf. 83 (27)
leontinus β Bert. = Gremlii
longidentatus Rouy (Parvopassuæ) = Huteri
lunatus Gilib. = glycyphyllos
major Rouy (*Onobrychis*) A 142 (26 c)
maritimus Moris 85 (nota)
massiliensis DC. = peduncularis
massiliensis Lam. 84 (30 α)
microphyllus Bess. 83 (26 b)
minor Rouy (*austral.*) A 142 (13 α c)
monspessulanus L. 83 (24)
montanus Jacq. = Jacquinii
montanus Lap. = pyrenaicus
montanus L. 79 (15), A 142
montanus Salis (massiliensis) = genargenteus
Muelleri Steud. et Hochs. 83 (25)
nebrodensis Guss. (*siculus*) = 5 (32 β)

ASTRAGALUS II 75 (498)
nebrod. Presl = prec.
neglectus Fiori (*Parvopassuæ*) 80 (15 γ b)
odoratus Lam. 82 (22)
Onobrychis L. 83 (26), A 142
Parvopassuæ Burn. 80 (15 γ)
pastellianus Pollini 84 (28 b)
peduncularis Rouy (*massiliensis*) 84 (30 α b)
penduliflorus Lam. 79 (12)
Pentaglottis L. 76 (2)
Pseudo-tragacantha Ten. (non Pall.) = sempervirens
pilosus L. 80 (16), A 142
purpureus Auct. it. p. p. = Gremlii
purpureus Lam. 82 (20 γ), A 142
pyrenaicus Rouy 80 (15 δ)
sempervirens Lam. 85 (31)
sericeus Fiori (*uralensis*) 81 19 γ)
sericeus Rouy (variabilis) = prec.
sesameus L. 77 (3), A 141
setiger Guss. (*glycyph.*) 78 (10 b)
siculus Biv. 85 (32), A 142, 214
siculus Ten. = calabrus
sirinicus Ten. 84 (30 β)
sirinicus β Bert. = brevipes
sordidus W. 81 (18 b)
tenuifolius L. = Onobrychis
tenuifol. Vill. = microphyllus
tomentosus Guss. (non Boiss.) (plumosus) = nebrodensis
Tragacantha L. 84 (30)
Tragac. β Bert. = peduncularis
Tragac. Vill. = sempervirens
triflorus Burn. (*Parvopassuæ*) 80 (15 γ a)
tuberculosus DC. 77 (5)
uncinatus Bert. 85 (nota)
uralensis L. 81 (19)
uralensis Vill. = sordidus
uralensis Wulf. = Halleri
variabilis Rouy = Halleri
verrucosus Moris = tuberculosus
vesicarius Lam. = Cicer
vesicarius L. 84 (28)
virgatus Pallas 85 (nota)
viscosus Chaix = fœtidus
vulnerarioides All. = Anthyllis vulnerarioid.
Wulfenii Koch = illiryeus

ASTRANTIA II 150 (540)
alpina Clairv. = minor
alpina Schultz = gracilis
carinthiaca Hpe. 150 (1 c)
carniolica Wulf. 150 (2 β)
caucasica W. 150 (1 d)
Diapensia Scop. = Sanicula europæa
digitata Mœnch = minor
elatior Friv. = caucasica
Epipactis Scop., L. f. = Hacquetia Epip.
gracilis Baril. 150 (2 β b)
intermedia M. B. = caucasica
involucrata Koch (major) = pallida
major L. 150 (1)

ASTRANTIA II 150 (540)
minor L. 150 (2)
minor Vitm., Ten. = pauciflora
nigra Scop. = major
pauciflora Bert. 150 (2 α b)
pallida Presl 150 (1 b)
saniculæfolia Salisb. = major
vulgaris Koch (major) = major (a)

ASTROCARPUS I 412 (357)
alpinus Salis (*sesam.*) 442 (δ)
Clusii J. Gay = purpurascens
cochlearifolius Nym. = spathulatus
erectus Boiss. (Clusii) = purpurascens
firmus Muell. (*sesam.*) 442 (γ)
interruptus Bor. = alpinus
oblongifolius Fiori (*sesam.*) A 87 (α b)
purpurascens Duby (*sesam.*) 412 (α), A 87
purpurasc. Raf. = prec.
sesamoides DC. 412, A 87
sesamoides Rchb. = firmus
sesamoides Salis = spathulatus
spathulæfolius Gr. et Godr. (Clusii) = seg.
spathulæfolius Revell. ex Bor. = seg.
spathulatus Muell. (*sesam.*) 412 (β)

ASTROLINON = Asterolinum
pusillum Bub. = A. Lin.-stellatum

ASTROLOBIUM = Coronilla et Ornithopus
creticum DC. = C. cretica
ebracteatum DC. = O. exstipulatus
repandum DC. = C. repanda
scorpioides DC. = C. scorp.

ATHAMANTA II 200 (592)
alpina Stokes = cretensis
annua L. = cretensis
athamantoides Ces. P. et G. (Libanotis) = Seseli — daucifolium
capillacea Lam. = cretensis
Cervaria L. = Peuced. Cerv.
condensata Wulf. (non L.) = Seseli Libanotis
cretensis L. 200 (3)
cretensis Uoria = sicula
daucifolia Host = Seseli — daucifol.
decussata Gilib. = Peuced. Cervaria
divaricata Gilib. = Peuced. Oreoselinum
flavescens Vis. = Seseli ramosiss.
glabra Gren. (cretensis) = mutellinoides
Golaka Hacq. = Hladnikia Golaka
hirsuta Briq. = cretensis (α a)
latifolia Viv. = Peuced. — latifol.
Libanotis Guss. = Seseli — samniticum
Libanotis L. = Seseli Liban.
Lobelii Caruel = cretensis
macedonica Spr. 200 (1), A 154

Digitized by Google

ATHAMANTA II 200 (592)
Matthioli Pucc., Caruel = Bifora radians
Matthioli Sut., DC. = mutellinoides
Matthioli Wulf. 201 (3 β)
media Nym. = Seseli — daucifolium
Meum L. = Meum athamanticum
multiflora S. et S. = Ligusticum cyprium
mutellinoides Lam. 200 (3 α b)
Oreoselinum L. = Peuced. Oreosel.
panacifolia Spr., Guss. = Magydaris pastinacea
pisana Savi = Peuced. palustre
pyrenaica Jacq. = Seseli - daucifolium
ramosissima Portenschl. = Seseli ramosiss.
rupestris Suffr. = Matthioli
rupestris Vill. = mutellinoides
sicula L. 200 (2)
sicula Ucria = Kundmannia sicula.
silvestris Wigg. = Angelica silv.
Turbith Brot. = Seseli tortuosum
vestina Kern. 200 (3 α c)
verticillata Portenschl. = Seseli ramosiss.
ATHANASIA = Diotis
maritima L. = D. marit.
ATHYRIUM = Asplenium
alpestre Rylands, Nyl. = Polyp. rhæticum
corsicum Fée = A. — corsic.
cuneatum Heufl. = A. fissum
dentatum Milde (Fil.-fœm.) = A. — dent.
fontanum Roth = A. — angustatum
Filix-fœmina Roth = A. Fil. - fœm.
fissidens Milde (Fil.-fœm.) = A. — fissid.
Halleri Roth = A. fontanum (α a)
lanceolatum = A. lanc.
lepidum Heufl. (cuneat.) = A. lepid.
molle Roth = A. Fil.-fœm.
multidentatum Milde (Fil.-fœm.) = A. — multiden.
nebrodense Tod. (Fil.-fœm.) = A. — nebrod.
obovatum Fée = A. obov.
ovatum Roth = A. Fil.-fœm.
polypodioides Schur = Polyp. rhæticum
recurvum Warnst. (Fil-fœm.) = A. — rhæticum
rhæticum Dalla Torre = Polyp. rhæt.
rhæticum Moore (Fil.-fœm) = seg.
rhæticum Roth = A. — rhætic.
trifidum Roth = A. Fil.-fœm.
ATOCION = Silene
Armeria Fourr. = S. Arm.
ATOSSA = Vicia
Clusii Alef. = V. Oroboides
sepium Alef. = V. sepium
ATRACTYLIS III 308 (904)
cancellata L. 309
canescens Rouy (cancell.) 309 (c)
canescens Salzm. =cancellata
Fusus-agrestis Gærtn. = Carthamus lanatus
gummifera L. = Carlina gumm.
lanata Scop. = Carthamus lanat.
leucocephala Mœnch = prec.
macrocephala Desf. = Carlina Fontanesii
pubescens Rouy (cancell.) 308 (b)
ATRAGENE = Clematis
alpina L. = C. alp.
austriaca Scop. = prec.
balearica Pers. = C. bal.
cirrosa Pers. = C. cirrosa
Clematides Crantz = C. alpina
europæa Spach (alpina) = C. alpina
speciosa Weinm. = C. alpina
ATREMA = Bifora
testiculatum Miq. = B. test.
ATRIPLEX I 305 (286)
abbreviatum Opiz = tataric.
acuminatum M. B. = hortense
acuminatum W. et K. = nitens
agrestis Schur = patulum
albicans Bess. (non Ait.) = roseum
albicans W. = laciniat.
album Crantz = Chenopod. alb.
album Scop. = roseum
ambrosioides Crantz = Chenop. ambr.
angustifolium Coss. et Germ. (polymorph.) = patulum
angustifolium Guss. (portulacoid.) A 64 (4 c)
angustifolium Sm. = patulum
angustissimum W. Gr. (patulum) 306 (2 ζ b)
angustissimum Wallr. (angustifol.) = prec.
appendiculatum Moq. (litor.) = litorale (a)
appendiculatum Neilr. (patul.) = erectum
arenarium Tin. = Tornabenii
arenarium Woods. = laciniat. (α)
argenteum Pall. = nitens
argenteum Schrad. = roseum
aristatum Crantz = Chenopod. arist.
astracanicum Balb. = tataric.
Aucheri Moq. = nitens
australasicum Moq. = patulum
axillare Ten. = roseum
benghalense Lam. = hortense
Besserianum R. et S. = roseum
Bocconei Guss. 307 (3 γ d)
Bonus-Henricus Crantz = Chenopod. Bon.-Henr.
Botrys Crantz = Chenopod. Botr.
campestre Koch et Ziz = oblongif.
ATRIPLEX I 305 (286)
campestre Mérat = erectum
confusum Lor. et Barr. (patal.) = macrodirum
crassifolium Gr. et Godr. etc. (non C. A. Mey.) = laciniat. (α)
denticulatum Fenzl (patul.) = patulum
depressum Hartm. = prostratum
diffusum Ten. 307 (3 γ c)
elongatum Guss. 306 (2 δ)
erectum Huds. 306 (2 ζ d)
farinosum DC. (patul.) = salinum
farinosum Dum. = laciniat.
farinosum Fr. (patul.) = oblongifol.
foliosum Guss. = roseum
giganteum Poir. = hastatum
glaucum Crantz = Chenopod. glauc.
Græci Tin. 307 (3 δ for., in obs.)
græcum Lois. (= Obione græca) 307 (nota)
græcum W. = hastatum et salinum
halimoides Raf. = hastatum
halimoides Tin. = Halimus
Halimus L. 307 (6), A 64
halolepis Fenzl (patul.) = oblongifol.
hastatum L. 305 (2). A 64
hastæfolium Salisb. = hastatum
hastifolium C. Koch (laciniat.) = diffusum
hastifolium Rchb. = patulum
Hermannii Willem. = nitens
heteranthum Wight. = hortense
hortense L. 305 (1)
hybridum Crantz = Chenopod. hybr.
inappendiculatum Moq. (litoral.) = patulum
inappendiculat. Moq. (patul.) = prostratum
incanum Dietr. = laciniat.
incanum Neilr. (hastat.) = oppositifol.
incisum M. B. = tataricum
integrifolium Fenzl (litor.) = litorale (a)
intermedium Guss. (portulacoid.) A 64 (4 b)
laciniatum Koch etc. = tataricum
laciniatum L. 306 (3), A 64
laciniatum M. B. = roseum
lasianthum Boiss. = tataric.
latifolium Guss. (Halimus) 307 (5 b)
latifolium Whlnb. = hastatum (α)
lejocarpum Gaud. (angustifol.) = patulum
limosum Schur = patulum
litorale L. 306 (2 Θ), A 64
lucidum Desf. = nitens
lunulatum Del. = molle
macrodirum Guss. 306 (2 ζ c)
marinum L. = litorale

Digitized by Google

ATRIPLEX I 305 (286)
maritimum Crantz = Suæda mar.
maritimum Hallier = laciniat.
maritimum Pall. = litorale
micranthum Kar. et Kir. = nitens
micranthum C. A. Mey. = hastatum
microcarpum Koch (patul.) = erectum
microspermum W. et K. 305 (2 β)
mixtum Moq. (littoral.) = erectum
molle Desf. 307 (5)
monoicum Mœnch = roseum
multifidum Crantz = Roubiæva mult.
murale Crantz = Chenopod. mur.
muricatum Fenzl (patul.) = erectum
nemorensis Schur = patulum
nitens Schk., Reb. 305 (1 c)
oblongifolium Host = microsperm.
oblongifolium W. et K. 306 (2 η)
Olivieri Moq. = tataric.
oppositifolium DC. 306 (2 ε a)
parvifolium Moq. (*roseum*) 307 (3 δ b)
patulum L. 306 (2 ζ)
patulum Sm. = hastatum (α)
phyllothecum Fr. (patul.) = oblongifol.
Piqueres Lag. = tataric.
platysepalum Guss. 305 (2 γ b)
polymorphum Coss. et Germ. = hastatum et patulum
polyspermum Crantz = Chenopod. pol.
polyspermum Ten. = roseum
portulacoides L. 307 (4), A 64
procumbens Jundz. = patulum
prostratum Bouch. 306 (2 ε b)
prostratum Guss. = triangulare
pruinosum Sieb. = tataric.
pseudo-nitens Schur = nitens
roseum L. 307 (3 δ)
rubrum Crantz = Chenopod. rubr.
rubrum L. (*hortense*) 305 (1 b)
ruderale Wallr. = microsperm.
sabulosum Rouy = laciniat.
Sackii Rost. et Schum. = prostratum
sagittatum Borckh. = nitens ?
salicinum Pall. = litorale
salinum Desv. = litorale
salinum Gr. et Godr. (*hastat.*) 306 (2 ε)
salinum Wallr. (patul.) = prec.
salinum Asch. (hortense) = hortense (α)
scoparium Crantz = Kochia scop.
serratum Huds. A 64 (2 θ b)
siculum Ucria = hastatum
sinuatum Hoffm. = tataric.
sinuatum Moq. (laciniat.) = venetum
Smithii Syme = hastatum

ATRIPLEX I 305 (286)
Sommieri E. Pons (*laciniat.*) A 64 (3 α for.)
spinacifolium Stokes = hastatum
suboppositum Schur = patulum
sulcatum Mich. = litorale
tataricum L. hb. 306 (3 γ)
tataricum Schk., Koch etc. = oblongifol.
tenuifolium Mey. (patulum) = angustissim.
Tornabenii Tin 306 (3 β), A 64
transsilvanicum Schur = salinum
triangulare W. 306 (2 γ)
turcomanicum Turcz. = tataric.
urbicum Crantz = Chenopod. urb.
venetum W. 307 (3 γ b)
verruculosum Guss. (*Halimus*) 307 (5 c)
verticillatum Lag. = roseum
virgatum Roth = hortense
virgatum Scop. = erectum
viride Crantz = Chenopod. vir.
Vulvaria Crantz = Chenopod. Vulv.
ATROPA II 404 (747)
Belladonna L. 404
physaloides L. = Nicandra physal.
Mandragora L. = Mandr. autumn. et vernalis
ATROPIS = Glyceria
Borreri Richter = G. Borreri
convoluta Griseb. = G. convol.
distans Griseb. = G. distans
festucæformis Richter = G. festuc.
maritima Griseb. = G. mar.
permixta Richter = G. permixta
procumbens Richter = Sclerochloa proc
pseudo-distans Richter (distans) = G. ps.-dist.
AUBRIETIA I 459 (393)
Columnæ Guss. 459 (β)
deltoidea Auct. pl. = italica
deltoidea DC. 459, A 98
deltoidea Guss. = sicula
italica Boiss. 459 (β b)
minor Ten. (deltoid.) = Columnæ
sicula Strobl (*deltoidea*) A 98
AUCUPARIA = Pirus
pinnata Fourr. = P. Aucup.
silvestris Medic. = P. Aucup.
AUDIBERTIA = Mentha
parviflora Nym. = M. Requienii
pusilla Benth. = prec.
AURICULA = Primula
crenata Spach = P. marginata
hortensis Spach = P. Auricula
lutea Opiz = P. Auricula
AURINIA = Alyssum
edentula F. M. et T. = A. edent.
gemonensis Griseb. = A. petræum
media Schur = A. petræum
orientalis Griseb. = A. orient.
petræa Fuss. = A. petr.
saxatilis Desv. = A. saxat.
sinuata Griseb. = A. sinuat.

AVELLINIA I 80 (103)
Michelii Parl. 80
AVENA I 71 (86)
adsurgens Schur = alpina
agraria Brot. = strigosa
agrostoides Griseb. = Triset. myrianthum
airoides Kœl. = Triset. subspic.
alba Vahl = Arrhenather. elatius
alpestris Host. = Triset. alpestr.
alpina Schleich (flavesc.) = Triset. — depauperatum
alpina Sm. 73 (3 β)
amethystina Clarion in DC. = sesquitertia
argentea W. = Triset. argent.
aristata DC. (odorata) = Hierochloë austral.
atherantha Presl = hirsuta
aurata All. = Agrostis — aurata
australis Parl. 73 = compressa (cfr. A 19)
barbata Brot. = hirsuta
biaristata Asch. (elatior) = Arrhenather. biarist.
brevifolia Host. = Triset. distichophyl.
brevis Roth 72 (1 β)
bromoides Gouan 73 (3 δ), A 19
bromoides M. et K. = pratensis
bulbosa W. = Arrhenather. — tuberosum
Burnoufii Nym. = Triset. Burn.
byzantina C. Koch = sativa × fatua
cæspitosa Griess. = Deschamp. cæsp.
calycina Vill. (non Lam.) = Danthonia provincialis
Candollei Serres = Triset. — purpurascens
capillaris M. et K. = Aira capil.
caryophyllea Weber = Aira caryoph.
Cavanillesii Koch = Triset. Cavan.
chlorantha Lk. = Triset. aureum
compressa Heuff. A 19 (2 δ b)
condensata Lk. = Triset. aureum
convoluta Presl = filifolia
corymbosa Nym. = Aira intermedia
Cupaniana Nym. = Aira Cup.
depauperata M. et K. (flavesc.) = Triset. — depaup.
diffusa Neilr. (sativa) = sativa (α a)
disticha Lam. = Triset. distichophyll.
distichophylla Host = Triset. argenteum
distichophylla Vill. = Triset. distich.
divaricata Tod. exs. = Aira divar.
dubia Leers. = Ventenata dub.
elatior L. = Arrhenather. elat.
fallax DNtrs. = Notarisii
fallax R. et S. = montana

Digitized by Google

AVENA I 71 (86)
fallax Ten. = filifolia
fatua L. 72 (2), A 18
fatua × sativa Hausskn. = sativa × fatua
fertilis All. = Ventenata dubia
filifolia Lag. 74 (8 γ)
flavescens Guss. = Triset. splendens
flavescens L. = Triset. flav.
flexuosa Leers, M. et K. = Deschamp. flex.
fragilis L. = Gaudinia frag.
glabra Boiss. (filifolia) = filifol. (a)
glabrata Peterm. (*fatua*) 72 (2 α c.)
glauca Lap. = versicolor
gracilis Moris = Triset. gracile
heteromalla Mœnch = orientalis
hirsuta Mœnch, Roth 72 (2 γ), A 19
hispanica Ard. = strigosa
Hoppeana Scheele A 19 (2 γ b)
Hostii Boiss. et Reut. = Parlatorei
Hugueninii DNtrs. = sesquitertia
hybrida Koch = glabrata
hybrida Peterm. = sativa × fatua
insubrica Asch. et Græbn. (*levigata*) A 19 (5 γ b)
intermedia Lindgr. = sativa × fatua
intermedia Nym. = Aira interm.
læta Salisb. = Brachyp. pinnat.
lanata DC. = Holcus lanat.
lanuginosa Gilib. = fatua
lasiantha Lk. = Bromus intermedius
levigata Schur A 19 (5 γ)
Lœflingiana Cav., Balb. = Triset. Cavanillesii
longifolia Req. et DC. in Duby = pratensis
lucida Bert. 73 (5 α b) = sesquitertia, cfr. A 19
Ludoviciana Dur. 72 (2 β b)
macilenta Guss. = Avellinia Michelii
macrocarpa Mœnch = sterilis
mediolanensis Balsamo et DNtrs. = Triset. myrianthum
Michelii Guss. = Avellinia Mich.
minor Lge. (barbata) = Hoppeana
mollis DC. = Holcus mollis
montana Vill. 73 (7), A 19
myriantha Bert. = Triset. myr.
neglecta Savi = Triset. paniceum
nervosa Lam. = strigosa
nigra Wallr. = fatua
Noëana Nym. = Triset. aureum
Notarisii Parl. 74 (8 β)
nuda L. 72 (1 α c)
odorata Pers. = Hierochloë boreal.
orientalis Schreb. 72 (1 α b), A 18
panicea Lam. = Triset. pan.

AVENA I 71 (86)
paradensis Kit. = Danthonia provincialis
Parlatorei Woods. 73 (b), A 19
parviflora Desf. = Triset. parv.
patens Posp. (*sterilis*) A 18 (2 β c)
patulipes Nym. = Aira divaricata
paniculmis Pirona (an L. ?) = alpina ?
præcox P. B. = Aira præcox
prætutiana Parl. 73 (4 b)
præusta Rchb. = alpina
pratensis Auct. = bromoides
pratensis L. 72 (3), A 19
pratensis Presl = compressa
precatoria Thuill. = Arrhenather. — tuberos.
provincialis Nym. = Aira provinc.
provincialis Poir. = Danthonia prov.
pseudovilis Hausskn. (*sterilis*) A 18 (2 β d)
puberula Guss. = Avellinia Michelii
pubescens L. 73 (5)
pulchella P. B. = Aira Tenorei
pumila Urv. = Triset. aureum
purpurascens DC. = Triset. — purpur.
pusilla Weber = Aira præcox
racemosa Thuill. = orientalis
Requienii Mutel = pratensis
Rotæ DNtrs. = Triset. — Rotæ
sativa L. 72 (1), A 18
sativa × fatua Asch. et Græbn. A 18
Scheuchzeri All. = versicolor
secunda Hausskn. (sativa) = orientalis
sedenensis Clarion in DC. A 19 (7 b)
segetalis Bianca = Ludoviciana
sempervirens Host, Parl., Arc. etc. = Parlatorei
sempervirens Lap. = montana
sempervirens Vill. 73 (8)
sesquitertia Host. = Triset. purpurascens
sesquitertia Krause = brevis
sesquitertia L. 73 (5 β)
sesquitertia W. = Triset. argenteum
setacea Vill. 74 (8 δ)
Sibthorpii Nym. = compressa
sicula Spr. = Triset. aureum
solida Fiori (*hirsuta*) A 19 (2 γ c)
solida Hausskn. (barbata) = prec.
spicata All., Bell. = Danthonia provincialis
spicata Gilib. = pratensis
splendens Guss. = Triset. splendens
sterilis L. 72 (2 β), A 18
striata Lam. = sempervir. (α)
striata Vis. = filifolia
stricta Host = Danthonia provincialis
strigosa Nocca = hirsuta
strigosa Schreb. 72 (1 γ)

AVENA I 71 (86)
subsecunda Uechtr. (*fatua*) 72 (2 α b)
subspicata Clairv. = Triset. subsp.
subulata Lam. = setacea
taurinensis Belli (paniculmis) = seg.
taurinensis Fiori (*pratensis*) 73 (3 γ)
Tenorei Nym. = Aira Tenor.
tenuis Mœnch = Ventenata dubia
Todari Tin. = Aira divaricata
triaristata Vill. = Ventenata dubia
triflora Wk. (barbata) = Hoppeana
tuberosa Gilib. = Arrhenather. tuber.
vallesiaca Nym. = Triset. Cavanillesii
versicolor Vill. 73 (4)
villosa Bert. = Triset. vill.
Wiestii Steud. A 19 (2 γ d)
AVENASTRUM = Avena
alpinum Fritsch = A. alpina
filifolium Fritsch = A. filifolia
Parlatorei Beck = A. Parlat.
pratense Jessen = A. pratensis
pubescens Jessen = A. pubesc.
versicolor Fritsch = A. versic.
AVENELLA = Deschampsia
cuprina Schur = D. montana
flexuosa Parl. = D. flexuosa
rubra Jord. = prec.
uliginosa Parl. = D. setacea
AVICULARIA = Polygonum
maritima Didr. = P. mar.
vulgaris Didr. = P. aviculare
AXOLOPHA = Althæa
hirsuta Alef. = A. hirs.
maritima Alef. = Lavatera mar.
AZALEA = Loiseleuria
procumbens L. = L. procumb.
AZAROLUS = Pirus
Aria Borkh. = P. Aria
Chamæmespilus Borkh. = P. Cham.
cratægoides Borkh. = Cratæg. Azarolus
maroccana M. Rœm. = Crat. Azarolus
torminalis Borkh. = P. torm.
AZOLLA I 17 (22)
caroliniana Bég. exs. = filiculoides
caroliniana W. 18 (1), A 8
bonariensis Bert. = caroliniana
densa Desv. = carol.
filiculoides Lam. A 202 (2)
magellanica Bert. = carol.
mexicana Schlecht. = carol.
microphylla Kaufl. = carol.
portoricensis Spr. = carol.

BÆOTRYON = Scirpus
cæspitosum Dietr. = S. cæsp.
Halleri Nees = S. pauciflorus
nanum Dietr. = S. parvulus
pauciflorum Dietr. = S. paucifl.
BALDELLIA = Alisma
ranunculoides Parl. = A. ranunc.

Digitized by Google

BALDINGERA = Phalaris
arundinacea Dum. = Ph. arund.
colorata Gærtn. = Ph. — picta
Rotgesii Fouc. et Mand. = seg.
Rotgesii Husnot (arund.) = Ph. — Rotges.
BALLOTA III 38 (794)
acuta Briq. = rupestris
alba L. A 173 (2 α c)
alpina Mill. = Stachys. offic. (α)
borealis Schweigg. 39 (2 α b)
cinerea Briq. = hirsuta
fœtida Auct. al. (an Lam.?) = meridionalis
frutescens Woods 39 (1)
hirsuta Benth. 40 (nota)
inodora Bég. (*rupestris*) 40 (3 b)
inodora Guss. (saxatilis) = prec.
italica Benth. = rupestris
meridionalis Bég. (*nigra*) 39 (2 β)
nigra L. 39 (2), A 173
nigra β Poll., b. Goir. = alba
nummularia Briq. (*frutesc.*) 38 (1 b)
parcepubens Briq. (*frutesc.*) 39 (1 c)
Pseudo-dictamnus Benth. 40 (4)
ruderalis Koch (nigra) = seg.
ruderalis Swartz 39 (2 γ)
rupestris Vis. 40 (3)
saxatilis Guss. (non Sieb.) = rupestris
spinosa Lk. = frutescens
uncinata Bég. (*meridionalis*) 39 (2 β b)
urticifolia Ortm. = ruderalis
velutina Briq. (*frutesc.*) 38 (1 a)
velutina Posp. 39 (2 β c)
vulgaris Hoffg. et Lk. = ruderalis
BALMISA = Arisarum
vulgaris Lag. = A. vulg.
BALSAMITA = Chrysanthemum
ageratifolia Desf. = Ch. flosculosum
annua DC. = Ch. annuum
Audibertii Req. = Ch. — Audib.
corymbosa Salzm. = Ch. flosculosum
major Desf. = Ch. — tanacetoides
multifida Clem. = Ch. annuum
suaveolens Pers. = Ch. — tanacetoides
virgata Desf. = Ch. discoideum
vulgaris W. = Ch. — tanacetoides
BARBA-JOVIS = Anthyllis
argyrophylla Mœnch = A. Barba-Jovis
montana Mœnch = A. mont.
BARBAREA I 434 (368)
arcuata Rchb. 434 (1 α c)
augustana Boiss. = intermedia
australis Jord. A 92 (1 γ b)
bracteosa Guss. 434 (1 ζ)
brevicaulis Jord. A 212 (1 β b)
dentata Paol. 434 (2)
humilis Presl = arcuata ?
iberica DC. = arcuata
intermedia Bor. 434 (1 δ), A 92
BARBAREA I 434 (368)
lippizensis Carnel = Nasturtium lippiz.
parviflora Fr. = stricta
patula Fr. = verna
præcox R. Br. = verna
rupicola Moris 434 (1 β), A 212
sicula Gr. et Godr. = intermedia
sicula Presl 434 (1 ε)
silvestris Jord. = vulgaris (α)
stricta Andrz. 434 (1 α b)
taurica DC. = arcuata
verna Asch. 434 (1 γ), A 92
vulgaris R. Br. 434 (1), A 92, 212
vulgaris β Bert. = stricta
BARDANA = Arctium
Arctium Mill. = A. majus
Lappa Hill. = A. majus
minor Hill. = A. minus
BARKHAUSIA = Crepis
albida Cass. = C. alb.
alpina DC. = C. alp.
apargioides Spr. = Willemetia stipitata
aspera Rchb. = C. asp.
Balbisiana DC. = C. Balb.
bellidifolia DC. = C. bellid.
bursifolia Spr., DC. = C. burs. β hirticalyx
cæspitosa Moris = C. cæsp.
caulescens Ten. (rubra) = C. rubra α caul.
cernua Rchb. = C. cern.
decumbens Gr. et Godr. = C. dec.
erucæfolia Gr. et Godr. = C. bursifol. (α)
fœtida F. W. Schm. = C. fœt.
fœtida C Ten. = C. — ambigua
glandulosa Presl = C. gland.
hiemalis Biv. = C. hiem..
hirta C. Koch = C. fœtida
hispida Lk. = C. hisp.
incarnata Host = C. incarn.
intybacea DC. = C. — intybac.
Leontodon DC. = seg.
leontodontoides Spr. = C. leont.
mucronata Bert. = C. mucr.
nicæensis Lk. = C. nic.
nuda Presl = C. — Preslii
pinnatipartita DC. (glandul.) = C. — pinnat.
præcox Rchb. = C. præc.
purpurea Biv. = C. purp.
reflexa Presl = C. reflexa
reflexa J. et C. Presl. = C. hiemalis
rhœadifolia M. B. = C. rhœad.
rubra Mœnch = C. rubra
sardoa Spr. = C. bellidifol. (α)
scariosa Mœnch = C. alpina
scariosa Rchb. = C. scar.
scapigera Ten. (rubra) = C. — scapig.
setosa DC. = C. set.
spathulata Spr. = C. spath.
subintegrifolia DC. (setosa) = C. — subint.
Suffreniana DC. = C. Suffr.
taraxacifolia DC. = C. tarax.
taraxacifolia Ten. = C. leontodont.
BARKAUSIA = Crepis
tenerrima Ten. = C. tenerr.
tenerrima Ten. (taraxacifol.) = prec.
tenuis Ten. (rubra) = C. — tenuis
vesicaria Spr. = C. vesic.
BARLIA = Orchis
longibracteata Parl. = O. long.
BARTSIA II 453 (766)
alpina L. 453 (1)
bicolor DC. = versicolor
lanceolata Bert. = Odontit. lanc.
latifolia S. et S. 454 (3)
lutea Rchb. f. = Odontit. lutea
lutea Wk. et Lge. (*Trixago*) 454 (2 a)
ochroleuca Genn. (*latifol.*) 454 (3 b)
Odontites Bert. = Odont. verna
Odontites Sm. = Odontit. serotina
parviflora Rchb. (*alpina*) 453 (1 b)
parviflora Thom. = prec.
purpurea Duby = latifolia
serotina Bert. = Odontit. serot.
Trixago L. 454 (2)
verna Rchb. f. = Odontit. verna
versicolor Pers. 454 (2 b)
viscosa L. 454 (4)
BASALTOGETON = Scilla
peruvianum Salisb. = S. peruv.
BASILIMA = Spiræa
sorbifolia Raf. = S. sorbifolia
BASSIA = Kochia
hirsuta Asch. = K. hirs.
hyssopifolia Volk. = K. hyss.
BATATAS = Ipomœa
edulis Choisy = I. Batatas
littoralis Choisy = I. stolonifera
platanifolia Choisy (edulis) = I. — platanif.
sinuata Guss. = I. stolonifera
BATRACHIUM = Ranunculus
aquatile Wimm. = R. aquat.
Bachii Wirtg. = R. Bachii
Baudotii F. Schultz = R. Band.
bipontinum F. Schultz = R. trichophyll.
cæspitosum S. F. Gray = R. fœniculaceus
cæspitosum F. Schultz = R. trichophyll.
capillaceum Bercht. et Presl = R. trichophyllus
cœnosum Nym. = R. homœophyllus
confervoides Fr. = R. conferv.
confusum Le Jolis = R. conf.
divaricatum Wimm. = R. fœniculaceus
diversifolium Nym. = R. diversifol.
Drouetii Nym. = R. Drouetii
elongatum F. Schultz = R. — elong.
floribundum Dum. = R. florib.
fluitans Wimm. = R. fluit.
Godronii Nym. = R. Godronii
hederaceum S. F. Gray = R. heder.

Digitized by Google

BATRACHIUM = Ranunculus
heterophyllum S. F. Gray = R. peltatus
hololeucum Garcke = R. holol.
lutulentum Nym. = R. confervoides
marinum Fr. = R. Baudotii
obtusiflorum S. F. Gray = R. hololeucos
ololeucos, vedi hololeucum
omoiophyllum Nym. = R. homœophyllus
pantothrix S. F. Gray = R. trichophyllus
paucistamineum F. Schultz = R. paucistam.
pectinatum Nym. = R. capillaceus
peltatum Bercht. et Presl = R. pelt.
penicillatum Dum. = R. — penic.
peucedanifolium Dum. = R. fluitans
rhipiphyllum Dum. = R. ripiph.
rigidum Dum. = R. trichophyll.
trichophyllum Bossch = R. trichoph.
trinacrium Nym. = R. tripartitus
tripartitum S. F. Gray = R. tripart.
triphyllos Dum. = R. triph.
truncatum Dum. = R. — trunc.
villosum F. Schultz = R. trichophyll.
BECCABUNGA = Veronica
Anagallis Fourr. = V. Anag.
vulgaris Fourr. = V. Beccabunga
BECKERIA = Melica
montana Bernh. = M. ciliata
BECKMANNIA I 75 (93)
diffusa Welw. = Panicum eruciforme
erucæformis Host 76
erucoides P. B. = erucæform.
BEHEN = Silene
angustifolius Schott = S. angustifol. Guss.
glareosus Fourr. = S. alp. f. minor
puberulus Fourr. = S. — pubescens
trachiatus Fourr. = S. vulgaris
vesicarius Fourr. = S. vesic.
vulgaris Mœnch = S. vulg.
BEHENANTHA = Silene
inflata Schur = S. vulgaris
BELLADONNA = Atropa
baccifera Lam. = A. Belladonna
trichotoma Scop. = A. Belladonna
BELLARDIA = Bartsia
Trixago All. = B. Trixago
viscosa F. et M. = B. visc.
BELLEVALIA = Hyacinthus
appendiculata Lap. = H. romanus
Calandriniana Nym. = Muscari Cal.
ciliata T. Nees. = H. ciliatus
BELLEVALIA = Hyacinthus
Clusiana Griseb. = Muscari Clus.
comosa Kth. = Muscari com.
Cupaniana Nym. = Muscari marit.?
dubia Rchb. = Musc. com. × Hyac. romanus
dubia Schult = H. dubius
Fontanesii Nym. = Muscari marit.
graminifolia Nym. = Muscari comosum
Gussoneana Griseb. = H. dubius
Hackelii Freyn = H. dubius
Holzmannii Heldr. = Muscari Holzm.
maritima Kth. = Muscari mar.
operculata Lap. = H. romanus
pendulina Chiov. = H. pendul.
romana Sweet, Rchb. = H. romanus
tenuiflora Nym. = Muscari tenuifl.
trifoliata Kth. = H. trifol.
Webbiana Parl. = Muscari comos. × Hyac. romanus
BELLIDIASTRUM III 226 (863)
Michelii Cass. 227
Michelii B Ten. = roseolum
ovatum Fiori (*Mich.*) 226 (b)
roseolum Fiori (*Mich.*) 226 (c)
subalpinum Schrank = Michelii
BELLIDIUM = Bellis
pappulosum Bert. = B. pappulosa
BELLIS III 225 (861)
alpina Heer (*perenn.*) 225 (2 α c)
annua L. 225 (1)
Bernardi Boiss. et Reut. 225 (2 β)
caulescens Lge (perenn.) = hybrida
caulescens Lojac. (annua) = dentata
dentata DC. 225 (1 c)
discoidea Fiori (*perenn.*) 225 (2 α e)
droseræfolia Gouan = Bellium bellidioides
hybrida Ten. 225 (2 γ)
margaritæfolia Huter P. et R. A 182 (2 δ)
Margarita-Sabaudiæ Micheletti (perenn.) = prec.
meridionalis Favrat (*perenn.*) 225 (2 α b)
micrantha Guss. (*hybrida*) 225 (2 γ b)
pappulosa Boiss. 225 (3 c)
monocephala Nicotra (*annua*) 225 (1 b)
perennis L. 225 (2), A 182
plena Vis. et Sacc. (*perenn.*) 225 (2 α d)
pusilla N. Terr. (*perenn.*) A 182 (2 α f)
ramosa Lam. = annua
repens Lam. = annua
silvestris Cyr. 226 (3), A 182, 216
verna N. Terr. (*silv.*) 225, A 182, 216 (3 β)
BELLIUM III 226 (862)
bellidioides Desf. = Bellis annua
bellidioides L. 226 (2)
bellidioides Urv. = minutum
canescens Gennari (*crassifol.*) 226 (3 b)
crassifolium Moris 226 (3), A 182
dentatum Viv. = Bellis dentata
minutum L. 226 (1)
nivale Req. 226 (2 b)
pappulosum Kze. = Bellis pappul.
Sommieri Parl. = minutum
BELOVIA = Suæda
paradoxa Bunge = S. splendens
BELVALIA = Althenia
australis Del. = A. filiformis
BENEDICTA = Cnicus
officinalis Bernh. = C. benedictus
BENNETTIA = Saussurea
alpina S. F. Gray = S. alpina
BERARDIA III 316 (909)
lanuginosa Fiori 316
subacaulis Vill. = lanuginosa
BERBERIS I 528 (442)
ætnensis Moris = Boissieri
ætnensis R. et S. 529 (β), A 110
Boissieri C. K. Schneider A 110 (β d)
brachyacantha Strobl (*ætnens.*) A 110 (β b)
calabrica C. K. Schneider (*ætnens.*) A 110 (β c)
cretica Viv., Lois. (non L.) = Boissieri
dumetorum Gouan = vulgaris
heterophylla Wierzb. (vulg.) = vulgaris (α)
irritabilis Salisb. = vulgaris
macroacantha Guss. (vulg.) = seg.
macroacantha Strobl (*ætnens.*) A 110 (β a)
rupestris Goir. (*vulg.*) A 110 (α b)
sicula Jan = ætnensis
vulgaris L. 528, A 110
vulgaris α Guss. = brachyacantha
BERENICE = Allium
Victorialis Salisb. = A. Vict.
BERINGERIA = Ballota
frutescens Rchb. = B. frutesc.
Pseudo-dictamnus Neck. = B. Pseudo-dict.
BERINIA = Crepis
alpestris Sch. Bip. = C. alp.
andryaloides Brign. = C. chondrill.
aurea Sch. Bip. = C. aur.
biennis Sch. Bip. = C. bienn.
chondrilloides Sieb. = C. chondrill.
fœtida Sch. Bip. = C. fœt.
grandiflora Sch. Bip. = C. conyzæfol.
jubata Sch. Bip. = C. jub.
lacera Sch. Bip. = C. lac.
nicœensis Sch. Bip. = C. nic.
BERTEROA = Alyssum
incana DC. = A. incan.

Digitized by Google

BERTEROA = Alyssum
mutabilis DC. = A. mutab.
obliqua DC. = A. obliq.
procumbens Portsch. = A. mutabile
BERULA = Sium
angustifolia Koch = S. erectum
BERYLLIS = Ornithogalum
pyrenaica Salisb. = O. pyren.
stachyoides Salisb. = O. narbonense
BETA I 308 (288)
campestris Lge. (vulgar.) = esculenta
carnulosa Gr. et Godr. = marit. (for.)
Cicla L. 308 (1 β)
crispa Tratt. 308 (1 β b)
decumbens Mœnch = marit.
erecta Gr. et Godr. (marit.) = carnulosa
esculenta Salisb. A 64 (1 γ)
foliosa Ehrenb. = vulgaris
hirsuta Gr. et Godr. (vulgar.) = pilosa
hortensis Mill. = Cicla
macrocarpa Guss. 308 (1 α)
marina Crantz = marit.
maritima L. 308 (1 δ)
Noëana Bunge = marit.
perennis L. (vulgaris) = marit.
pilosa Del. (*vulgar.*) 308 (1 δ b)
Rapa Dum. 308 (1 γ) = esculenta, cfr. A 64
rapacea Heg. = seg.
rapacea Koch (vulgar.) = esculenta
rubra L. (vulgaris) = Cicla
sativa Bernh. = esculenta
sicla Bert. = Cicla
stricta C. Koch = vulgaris
sulcata Gasp. 308 (1 β c)
triflora Salisb. = marit.
trigyna W. et K. 309 (2)
vulgaris L. 308 (1), A 64
vulg. b. Guss. = pilosa
BETONICA = Stachys
Alopecurus L. = S. Alop.
annua L. = S. annua
danica Mill. (1759) = S. — danica
danica Mill. (1768) = S. densiflora
decumbens Mœnch = S. recta (α)
divulsa Ten. = S. offic.
foliosa Presl = S. offic. (α)
glabrata Koch (offic.) = S. — glabrata
hirsuta L. = S. densiflora
hirta L., Gouan = Sideritis hirsuta et Stachys recta
hirta Rchb. (non Leyss.) = S. offic. c. hirta
incana Mill., Ait. = S. densiflora
incana Rchb. = S. — latifolia
Jacquinii Gr. et Godr. = S. — Jacq.
latifolia Koch (offic.) = S. — latifol.
legitima Lk. = S. offic. (α)
lutea Lam. = S. Alopecurus
Monieri Gouan = S. densiflora
BETONICA = Stachys
officinalis L. = S. offic.
purpurea Gilib. = S. offic.
serotina Host = S. — serot.
stricta Ait. = S. — danica
velebitica Kern. = S. velebit.
vulgaris Rota = S. offic.
BETULA I 263 (250)
ætnensis Raf. = verrucosa
alba L. 263
Alnobetula Ehrh. = Alnus Alnobet.
Alnus L. = Alnus glutin. et incana
cordata Lois. = Alnus cord.
crispa Dryand = Alnus Alnobet.
glutinosa L. (Alnus) = Alnus glut.
glutinosa Vill. = prec.
gummifera Bert. = verrucosa
incana L. f. = seg.
incana L. (Alnus) = Alnus inc.
laciniata Arc. (*alba*) 263 (d)
nana L. 263 (nota)
oblongata Ait. = Alnus oblongata
odorata Bechst. = pubescens
ovata Schrank = Alnus Alnobet.
palustris Salisb. = Alnus glutin.
pendula Roth = verrucosa
pubescens Ehrh. 263 (b)
tomentosa Reith. = pubescens?
verrucosa Ehrh. 263 (c)
vestita Gr. et Godr. (pubesc.) = pubescens
viridis Chaix = Alnus Alnobet.
BIARUM I 149 (151)
Anguillaræ Schott = tenuifol.
arundanum Boiss. = tenuifol.
Bovei Decaisn. 149 (2)
constrictum C. Koch = tenuifol.
gramineum Schott = tenuifol.
tenuifolium Schott 149 (1)
BIASOLETTIA = Bunium
cynapioides Drude = B. cynap.
nodosa Bert. = Physocaul. nod.
tuberosa Koch = B. — tuber.
BICCHIA = Gymnadenia
albida Parl. = G. albida
BIDENS III 301 (898)
argutus H. B. et K. = heterophyll.
bipinnatus L. 303 (5)
bullatus L. 302 (2)
cannabinus Lam. 302 (3 α c)
cannabinus Tausch (tripart.) = prec.
cernuus L. 301 (1)
cernuus B Ten. = radiatus DC.
chrysanthemoides Michx. 303 (nota)
discoideus DC. (cern.) = cernuus (α)
frondosus L. 302 (4)
glabrescens Fiori (*bull.*) 302 (2 γ)
heterophyllus Ortega 303 (6), A 186
hirtus Jord. 302 (2 β)
BIDENS III 301 (898)
hybridus Thuill. 302 (3 α b)
integer C. Koch (*tenuis*) 302 (3 β b)
leucanthus W. 303 (nota)
longifolius DC. = heterophyll.
minimus L. 301 (1 α b)
minimus W. et G. (tripart.) = tenuis
mixtus Kittel (*radiatus*) 302 (1 β b)
nanus Neilr. (cern.) = minimus
monocephalus Zersi (cern.) = minimus
pilosus L. 303 (nota)
pinnatifidus Turcz. (*tripart.*) 302 (3 α d)
pumilus Fiori (*bipinn.*) 302 (5 b)
pumilus Goir. (tripart.) = pumilus Fiori
pumilus Roth (tripart.) = tenuis
pygmæus Kittel (tripart.) = tenuis
radians G. Beck (cern.) = radiatus DC.
radiatus DC. (*cern.*) 302 (1 β)
radiatus Thuill. = tripartitus
reptans Caldesi (*tripart.*) 302 (3 α e)
tenuis DC. (*tripart.*) 302 (3 β)
tripartitus L. 302 (3)
Wrightii A. Gray (*heteroph.*) 303 (6 β), A 186.
BIFOLIUM = Majanthemum
cordatum Gærtn. = M. bifolium
BIFORA II 204 (601)
dicocca Hoffm. = testicul. et radians
flosculosa M. B. = testiculata
radians M. B. 204 (1)
testiculata DC. 205 (2)
BIFORIS = Bifora
testiculata Spr. = B. test. et radians
BIGNONIA
Catalpa L. = Catalpa bignonioides
radicans P. = Tecoma radic.
tomentosa Thunb. = Paulownia toment.
BILDERDYKIA = Polygonum
Convolvulus Dum. = P. Convolv.
dumetorum Dum. = P. dumet.
BILLOTIA = Crepis
alpina Sch. Bip. = C. alp.
BIOTA = Thuya
orientalis Endl. = Th. orient.
BIPONTINIA = Psoralea
bituminosa Alef. = P. bit.
BIROLIA = Elatine
paludosa Bell. = E. hexandra
BISCUTELLA I 475 (412)
alpestris W. et K. = levigata (α)
ambigua DC. 476 (4 α b)
anchusæfolia Marz. = levigata
apetala Walt. = Coronopus didymus
apula L. 476 (3 α c), A 101
auriculata L. 476 (2)

Digitized by Google

BISCUTELLA I 475 (412)
auriculata Ten. = saxatilis
balearica L'Hér. = Succowia bal.
Burseri Jord. = dilatata
cichoriifolia Lois. 476 (1), A 101
ciliata DC. = didyma
Columnæ Ten. 476 (3 α b)
coronopifolia DC. = didyma
coronopifolia L. 477 (4 β)
coronopifolia Rchb. = Lima
corsica Rouy A 102 (4 δ)
depressa Thomas = intermedia
didyma L. 476 (3), A 101
didyma β L. = apula
didyma Scop., All. = levigata
dilatata Vis. 476 (1 c)
glabra Gaud. (levigata) = lucida
glareosa Jord. = coronopifolia
hispida DC. 476 (1 b)
hispidissima Koch (levig.) = ambigua
incana Ten. 477 (4 α h)
intermedia Gouan 477 (4 α f)
intermedia Strobl (lyrata) A 101 (3 β b')
laxiflora Presl = raphanifolia
levigata L. 476 (4), A 101
Lima Rchb. 477 (4 β b)
longifolia Vill. = saxatilis
lucida DC. 476 (4 α d)
lyrata L. 476 (3 β), A 101
macrocarpa Groves = dilatata
marginata Ten. = lyrata
maritima Ten. 476 (3 β b)
mollis Lois. 477 (4 α g)
nicæensis Jord. = levigata (for.)
perennis Spach = levigata
picridifolia Lap. = cichoriifolia
raphanifolia Poir. 476 (3 β c)
Rotgesii Fouc. A 101 (4 γ)
saxatilis Schleich. 476 (4 α e)
scabra Salisb. = didyma
subspathulata Lam. 476 (4 α c)
subspathulata Suter = saxatilis
superalpina Payot (levigata) A 101 (4 α for.)
tergestina Jord. = levigata (for.)
variabilis Lois. = levigata
BISERRULA II 75 (497)
albiflora Fiori (Pelecin.) 75 (b)
denticulata Arc. (Pelec.) 75 (c)
Pelecinus L. 75
BISMALVA = Malva
Alcea Medic. = M. Alcea
fastigiata Fourr. = M. fast.
laciniata Fourr. = M. moschata
moschata Medic. = M. mosch.
BISTORTA = Polygonum
major S. F. Gray = P. Bistorta
officinalis Raf. = P. Bistorta
vivipara S. F. Gray = P. vivip.
BIVONÆA I 469 (407)
albiflora Prantl 469 (1)
lutea DC. 469 (3)
præcox Bert. = albiflora
Prolongi Prantl 469 (2 oss.)
Saviana Caruel 469 (2)
BLAIRIA = Lippia
nodiflora Gærtn. = L. nodiflora
BLACKSTONIA = Chlora
perfoliata Huds. = C. perf.
BLATTARIA = Verbascum
alba Medic. = V. Lychnitis
virgata Fourr. = V. virg.
vulgaris Fourr. = V. Blattaria
BLECHNUM I 13 (12)
boreale Sw. = Spicant
radicans L. = Woodwardia rad.
Spicant With. 13 (2), A 7
BLITUM = Chenopodium
acuminatum Koch (rubrum) = C. blitoides
acuminatum Schur = prec
Bonus-Henricus C. A. Mey. = C. Bon.-Henr.
botryoides Drej = C. botr.
capitatum L. = C. capit.
chenopodioides Lam. = C. capitatum
crassifolium Rchb. = C. botryoides
exsuccum Losc. = C. foliosum
gangeticum Mœnch = Amarant. gang.
glaucum Koch = C. glauc.
græcizans Mœnch = Amarant. græc.
maritimum Nutt. = C. rubrum
majus Scop. = Amarant. græcizans
melancholicum Mœnch = Amarant. mel.
paucidentatum Koch (rubrum) = C. botryoides
polymorphum C. A. Mey. = C. rubrum
rubrum C. A. Mey. = C. rubrum
spathulatum Cogs. et Germ. (rubrum) = C. blitoides
tataricum Mill. = C. capitatum
tenue Moq. = Roubieva multif.
terminale Stokes = C. capitatum
virgatum L. = C. foliosum
viride Mœnch = C. viride
BLUMENBACHIA = Sorghum
halepensis Kœl. = S. halep.
BLYSMUS = Scirpus
compressus Panz. = S. Caricis
BOHADSCHIA = Peltaria
alliacea Crantz, All. = P. all.
BONA = Vicia
narbonensis Medic. = V. narb.
BONANNIA II 174 (569)
græca Hal. A 152
resinifera Guss. = græca
resinosa Strobl 174 = græca, cfr. A 152
BONANNIA = Sinapis
dissecta Presl = S. diss.
officinalis Presl = S. alba
BONAROTA = Veronica
chamædrifolia Scop. = V. lutea
rotundifolia Caruel = V. Bonarota
BONAVERIA II 94 (510)
Securidaca Desv. 94
Securigera Endl. = prec.
BONJEANIA = Dorycnium
cinerescens Jord. = D. — italicum
hirsuta Rchb. = D. hirsut.
BONJEANIA = Dorycnium
hirta Jord. et Fourr. = D. hirtum
incana Rouy = D. — incan.
italica Jord. et Fourr. = D. — ital.
prostrata Jord. et Fourr. = D. prostr.
recta Rchb. = D. rectum
retusa Rouy (hirsuta) = D. — retus.
venusta Jord. = D. — italicum
BOOTIA = Saponaria
ocymoides Neck. = S. ocym.
Saponaria Neck. = S. officinalis
vulgaris Neck. = S. offic.
BORCKHAUSENIA = Corydalis
capnoides Fuss. = C. capn.
cava Gærtn. M. et S. = C. cava
lutea Gærtn. M. et S. = C. lutea
ochroleuca Fuss. = C. ochr.
solida Gærtn. M. et S. = C. sol.
BORISSA = Asterolinum
Linum-stellatum Raf. = A. Lin.-stell.
BORRAGO II 376 (725)
advena Gilib. = offic.
aspera Gilib. = offic.
laxiflora W. 377 (2)
officinalis L. 377 (1)
BOTRYANTHUS = Muscari
albo-virens Tod. = M. albo-vir.
atlanticus Nym. = M. neglectum
commutatus Kth. = M. commut.
Gussonei Tod. = M. racemosum
Kerneri Marches. = M. Kern.
latifolius Parl., Tod. (commut.) = M. La-Farinæ
Lelievrii Nym. = M. Lelievr.
neglectus Kth. = M. neglect.
odorus Kth. = M. racemosum
parviflorus Kth. = M. parvifl.
Sauli Jaub. et Spach = M. moschatum
speciosus Marches. = M. — specios.
Strangwaysii Kth. = M. botryoides
vulgaris Kth. = M. botryoides
BOTRYCHIUM I 16 (19)
ambiguum Reut. = matricariæfol.
anthemoides Presl = virginianum
Breynii Fr. = Matricariæ
europæum Milde (ternatum) = Matricariæ
incisum Rœper (Lunar.) = matricariæfol.
lanceolatum Angstr. 16 (2 β), A 8
Lunaria Sw. 16 (1)
Matricariæ Spr. 16 (3 β)
matricariæfolium A. Br. 16 (2), A 8
matricariæfol. Fr. = lanceolat.
matricarioides W. = Matricariæ
multifidum Trevis. (1874) = Matricariæ
palmatum Presl = lanceolat.
ramosum Asch. = matricariæfol.

Digitized by Google

BOTRYCHIUM I 16 (19)
Reuteri Payot = matricariæfol.
rutaceum Sw. = Matricariæ
rutaceum W. p. p., Hook = matricariæfol.
rutæfolium A. Br. = Matricariæ
silesiacum Kirschl. = Matricariæ
subincisum Ræper (*Lunar.*) 16 (1 b)
tenellum Angstr. = matricariæfol.
ternatum Sw. 16 (3)
virginianum Sw. A 8 (4 *)
virginicum W. = prec.
BOTRYDIUM = Chenopodium
aromaticum Spach = C. Botrys
Schraderi Spach = C. Vulvaria
BOTRYOCARPUM = Ribes
nigrum A. Rich. = R. nigr.
petræum Opiz = R. petr.
BOTRYS = Teucrium
chamædryoides Fourr. = T. Botrys
BOUCEROSIA = Stapelia
europæa Caruel = S. europ.
Gussoneana Hook. f. = S. europæa
BRACHIARIA = Panicum
eruciformis Griseb. = P. erucif.
BRACHYASTER = Bellidiastrum
Bellidiastrum Ambrosi = B. Michelii
BRACHYDEREA = Crepis
alpestris Sch. Bip. = C. alp.
aurea Sch. Bip. = C. aur.
biennis Sch. Bip. = C. bienn.
chondrilloides Sch. Bip. = C. Chondr.
grandiflora Sch. Bip. = C. conyzæfol.
jubata Sch. Bip. = C. jub.
Jacquinii Sch. Bip. = C. Jacquinii
nicæensis Sch. Bip. = C. nic.
BRACHYOLOBOS = Nasturtium
amphibius All. = N. amphib.
armoracioides Schur = N. arm.
anceps Lk. = N. amph. × silv.
austriacus Schur = N. austr.
lippizensis Lk. = N. lipp.
palustris Clairv. = N. pal.
pyrenaicus All. = N. pyren.
silvestris All. = N. silv.
BRACHYPODIUM I 101 (121)
Allionii Presl = ramosum
angustifolium Goir. (pinnat.) = setifolium
asperum R. et *S.* 102 (1 β), A 30
australe Gr. et Godr. (pinnat.) = phœnicoides
australe Posp. = prec.
Barrelieri R. et S. A 31 (3 α b)
cæspitosum Posp. (distach.) = pentastach.
cæspitosum R. et S. 102 (3 α b) = gracile, cfr. A 31
collinum Posp. (*pinnat.*) A 31 (3 α e subfor.)
BRACHYPODIUM I 101 (121)
collinum Rchb. (cæspitos.) = prec.
contractum Presl. = loliaceum
corniculatum Dum. = rupestre
distachyum P. B. 101 (1), A 30
divaricatum Presl = Sclerochloa divar.
dumosum Beck (*silvat.*) A 30 (2 α b)
festucoides Lk. = Nardurus marit. (a)
geniculatum C. Koch = distachyum
genuense R. et S. A 31 (3 α c)
glaucovirens Murbeck A 31 (2 β)
gracile P. B. = silvaticum
gracile Posp. (*pinnat.*) A 31 (3 α e)
Halleri P. B., R. et S. = Nardurus Halleri
hispanicum Rchb. = Nardurus — festucoides
Hostii Lk. = ramosum
intermedium Schur = gracile
loliaceum Fr. = Festuca elatior × Lolium perenne
loliaceum R. et S. (Syst. II p. 740) A 31 (3 α d)
loliaceum R. et S. (Syst. II p. 746) = Catapodium loliac.
longifolium P. B. A 31 (3 α h)
maritimum R. et S. = Sclerochloa mar.
monostachyum Guss. (*distach.*) 101 (1 α b)
mucronatum Wk. = phœnicoides
muticum Parl. (pinnat.) 102 (3 α c) = Barrelieri, cfr. A 31
Nardus Lk. = Nardurus — festucoides
pentastachyum Nym. A 30 (1 α c)
phœnicoides R. et S. 102 (3 β), A 31
pinnatum P. B. 102 (3), A 31, 204
Plukenetii P. B. A 31 (3 γ b)
Poa R. et S. = Nardurus Halleri
psilanthum Lk. = Nardurus marit. (a)
pubescens Peterm. (gracile) = dumosum
pubescens Posp. (silvat.) = prec.
pumilum Wk. (distach.) = monostachyum
ramosum R. et S. 102 (3 γ), A 31
rigidum Lk. = asperum
rupestre R. et S. A 31, 204 (3 α f)
setifolium Schur. A 31 (3 α g)
silvaticum P. B. 102 (2), A 30
subtile DNtr. = monostachyum
tenellum P. B., Rchb. = Nardurus marit. (a)
Tenorianum R. et S. = loliaceum
tenue Tin. = Vulpia tenuis
BRACHYPODIUM I 101 (121)
tenuiculum R. et S. = Nardurus — festucoides
tenuiflorum R. et S. = Nardurus marit. (a)
unilaterale R. et S. = Nardurus unilat.
unioloides Lk. = Catapodium sicul.
villosum Lej. et Mich. (silvat.) = dumosum
vulgare Koch (*pinnat.*) A 31 (3 α a)
BRACONOTIA = Agropyrum
acuta Godr. = A. repenti × junceum
elymoides Godr. = A. caninum
glauca Godr. = A. glaucum
juncea Godr. = A. junceum
officinarum Godr. = A. repens
pungens Godr. = A. pung.
BRASSICA I 448 (876)
acutifolia Fiori (*adpressa*) A 96 (2 d)
adpressa Boiss. 448 (2), A 96
alba Boiss. = Sinapis alba
alpina L. = Arabis pauciflora
annua Rchb. (Rapa) = campestris (a)
apenninica Cavara (*Robertiana*) 446 (11 β b)
acephala DC. (*olerac.*) 444 (11 α b)
asperifolia Lam. = campestris
amplexicaulis Pomel 445 (8)
austriaca Jacq. = Conringia austr.
arvensis L. = Moricandia arv.
balearica Lois. et Auct. it. (non Pers.) = Robertiana
balearica Presl = rupestris
bœtica Boiss. 448 (19)
Botrytis L. (*olerac.*) 444 (11 α g)
campestris L. 445 (9)
capitata L. (*olerac.*) 444 (11 α c)
Caulorapa DC. (olerac.) = gongylodes
cheiranthiflora DC. 444 (5 α d)
Cheiranthus Ten. = Gravinæ
Cheiranthus Vill. = monensis
circinata Paol. (*pubescens*) 448 (1 c)
corsica Jord. = insularis
crassifolia Fiori (*adpressa*) A 96 (2 e)
cretica Guss. (non Lam.) = rupestris
cretica Moris, Soleir. = insul.
dasycarpa Neilr. (Sinapistr.) = villosa Fiori
dissecta Boiss. = Sinapis diss.
drepanensis Paol. (*macrocarpa*) 447 (12 β), A 96
drepanensis Ponzo = prec.
elongata Ehrh. 445 (7), A 96
Eruca L. = Eruca sativa
Erucastrum L. 448 (18)
Erucastrum Moris = monensis
erucoides Boiss. = Diplotax. eruc.
esculenta DC. (Napus) = Napobrassica

Digitized by Google

BRASSICA I 443 (376)
exaltata Huter P. et R. A 96 (6 β)
fruticulosa Bagl. = persica
fruticulosa Cyr. 444 (6), A 96
gemmifera DC. (*olerac.*) 444 (11 α e)
geniculata Arc. (sinapoides) = seg.
geniculata Paol. (*adpressa*) 443 (2 b)
glabrata Fiori (*pubescens*) A 96 (1 d)
gongylodes L. (*olerac.*) 444 (11 α f)
Gravinæ Ten. 447 (16), A 97
hispida Ten. = Diplotax. hispidula
incana Dœll = adpressa
incana Ten. 446 (11 ζ), A 96
inflexa Fiori (*adpressa*) A 96 (2 c)
insularis Moris 446 (11 δ)
integrifolia Boiss. (elongata) = persica
lejocarpa Neilr. (*Sinapistr.*) A 96 (4 a)
levigata Gay (non Lag.) = fruticulosa
ligustica Burn. (Robertiana) = Robertiana (a)
longirostris Guss. (*rupestris*) A 96 (11 γ b)
macrocarpa Guss. 446 (12), A 96
maritima Coss. (olerac.) = silvestris
monensis Huds. 444 (5), A 96
montana DC. 444 (5 α c)
montana Raf. = rupestris
muralis Boiss. = Diplotax. mur.
muralis Huds. = Diplotax. mur. et tenuifol.
Napobrassica L. (oleracea) = seg.
Napobrassica Prantl (*Napus*) 445 (10 b)
Napus L. 445 (10)
nigra Koch 444 (3), A 96
nivea Fouc. (non Boiss. et Sprunn.) A 96 = insularis, cfr. A 212
obtusangula Rchb. = Erucastrum
ochroleuca Soy.-Will. 447 (17)
oleifera DC. (*campestr.*) 445 (9 a)
oleifera DC. (*Napus*) 445 (10 a)
oleracea Bert. = Robertiana
oleracea L. 445 (11), A 96, 212
orientalis Fiori (*Sinapistr.*) A 96 (4 b)
orientalis L. = Conringia or.
palustris Pirona A 96 (7 bis)
perfoliata Lam. = Conringia orient.
persica Boiss. 445, A 96 (7 β)
petrosa Jord. A 96 (5 α for.)
pilosa Caruel (olerac.) = incana et villosa Biv.
Pollichii Arc. (obtusang.) = ochroleuca
præcox W. et K. = Napus (a)

BRASSICA I 443 (376)
Preslii Nic. = bœtica
Pseudo-erucastrum Brot. = monensis
pubescens Ard. 443 (1), A 96
pyrenæa Jord. = montana
Rapa L. 445 (9 b)
rapifera Metzg. (Napus) = Napobrassica
rapifera Metzg. (Rapa) = Rapa
rectangularis Viv. 444 (5 β)
recurvata Jord. 444 (5 α b)
repanda DC. 447 (15)
Richerii Vill. 447 (13)
Robertiana J. Gay 446 (11 β)
rubra L. (*olerac.*) 446 (11 α b subfor.)
rupestris Raf. 446 (11 γ), A 96
sabauda L. (*olerac.*) 444 (11 α d)
sabellica L. (*olerac.*) 446 (11 α b subfor.)
sabularia Gr. et Godr. (non Brot.) = rectangularis
sabularia Moris = Tournefortii
saxatilis Paol. (*repanda*) 447 (5 b)
serrata Paol. (*pubescens*) 443 (1 b)
setulosa Caruel (campestr.) = campestris
sicula Arc. = bœtica
silvestris L. (*olerac.*) 446 (11 α a)
silvestris Mill. = prec.
sinapioides Roth = nigra
Sinapis Vis. = Sinapistrum
Sinapistrum Boiss. 444 (4), A 96
tenuifolia Fr. = Diplotax. ten.
Tinei Lojac. = incana
Tournefortii DC. = rectangularis
Tournefortii Gouan 447 (14)
Uechtriziana Janka = Eruca longirostris
valentina DC. A 96
villosa Biv. 446 (11 ε)
villosa Fiori (*Sinapistr.*) A 96 (4 c)
viminea Boiss. = Diplotax. vim.
viridis L. (*olerac.*) 446 (11 α b subfor.)
BRASSICASTRUM = Brassica
elongatum Lk. = B. elong.
BRASSICELLA = Brassica
Cheiranthos Fourr. = B. monensis
BRAYA I 426 (364)
alpina Sternb. et Hpe. 426
pinnatifida Koch = Sisymbr. dentatum
BREEA = Cirsium
dioica Less. = C. arvense
BREVIGLANDIUM = Hottonia
palustre Dulac. = H. pal.
BRIGNOLIA = Kundmannia
panacifolia Heynh. = seg.
pastinacæfolia Bert. = K. sicula
BRIZA I 84 (110)
aspera Knapp = minor

BRIZA I 84 (110)
Clusii Schult. = media
cynosuroides Scop. = Catapodium sicul.
disticha Mœnch = Catapodium sicul.
elatior S. et S. = media
Eragrostis L. = Eragrost. megastachya
lutescens Fouc. in Desv. A 22 (1 b)
major Presl. = maxima
maxima L. 84 (3), A 22
media L. 84 (1), A 22
minor L. 84 (2)
monspessulana Gouan = maxima
oblonga Mœnch = Eragrost. megastachya
pallescens Dœll (media) = lutescens
rubra Lam. A 22 (3 c)
tremula Kœl. = media
virens L. = minor.
BRIZOPYRUM = Catapodium
siculum Lk. = C. siculum
BROMOPSIS = Bromus
aspera Fourr. = B. ramosus
erecta Fourr. = B. erect.
BROMUS I 97 (120)
affinis Dum. = hordeaceus
agrarius Dum. = japonicus
agrestis All. = erectus
albidus M. B. 98 (3 ζ)
alopecuroides Lag. = Kœleria phleoides
alopecuroides Poir. = Alopecurus
alopecurus Poir., Pers. 101 (11 β)
altissimus Gilib. = arvensis
altissimus Weber = ramosus
ambiguus Cyr. = Vulpia — ambig.
amplus C. Koch = sterilis
angustifolius M. B. = stenophyllus
angustifolius Schrank = erectus
arundinaceus Roth = Festuca arund.
arvensis L. 100 (9), A 30
arvensis Pollich, Lam. = erectus
arvensis Weigel = secalinus
asper Benek. (Fl. An. 98 α) = Benekeni
asper Murr. 98 (2) = ramosus, cfr. A 29
asperipes Jord. = villosus (for.)
asperrimus Ten. = scaberrimus
avenaceus Pourr. = tectorum
barbatus Savi = Vulpia Alopecurus
Benekeni Syme A 29 (2 β)
Billotii F. Schultz A 30 (8 e)
bohemicus F. W. Schmidt = Vulpia myurus
Boræi Jord. = rigidus
Borbasii Hack. (*erectus*) A 29 (3 α a)
brachystachys Posp., Marches. (non Hornung.) = arvensis
brevisetus Dum. = secalinus

Digitized by Google

BROMUS I 97 (120)
cæspitosus Fiori (*arvensis*) A 30 (9 for.)
cæspitosus Host = Brachyp. gracile Posp.
canariensis Zucc. in Rœm. = macrostachys
caprearum Hack. = caprinus
caprinus Kern. ex Hack. 98 (3 d)
caudatus Brot. = Trisetum panicoeum
ciliatus Guss. (*madritensis*) 99 (6 γ b)
ciliatus Huds. = madritensis
ciliatus Lam. = Brachyp. distachyum
cincinnatus Ten. = Avena compressa
commutatus Schrad. 100 (10 β), A 30
compactus Asch. et Græbn. (*transsilvan.*) A 30 (3 β b)
condensatus Hack. 98 (3 ε), A 30, 204
confertus Bor. = molliformis
confertus M. B. = scoparius
confertus Noë = madritensis
contortus Desf. = scoparius
corniculatus Lam. = Brachyp. pinnat.
cristatus L. = Agrop. crist.
cylindraceus Brot. = Kœleria phleoides
Cyri Trin. = japonicus
dactyloides Roth = Kœleria phleoides
decumbens Kœl. = Triodia decumb.
dertonensis All. = Vulpia derton.
diandrus Curt. = madritensis
diffusus Neilr. (arvensis) = commutatus
dilatatus Lam. = madritensis
distachyus L. = Brachyp. dist.
distichus Mœnch = sterilis
divaricatus Kth. = lanuginosus
divaricatus Lloyd = molliformis
divaricatus Rohde = macrostachys
dumetorum DC. = ramosus
dumosus Vill. = Brachyp. — dumos.
Ehrhardtii Rœm. = secalinus
elatior Kœl. = Festuca pratensis
erectus Huds. 98 (β), A 29, 204
fascicularis Ten. = seg.
fasciculatus Presl 99 (7)
festucoides Lk. = Avellinia Michelii
flavescens Tausch = fasciculatus
Gaudinii R. et S. = commutatus
geniculatus L. = Vulpia gen.
geniculatus Ten. p. p. = Vulpia tenuis
giganteus L. = Festuca gig.
glaber Wk. et Lge. (erectus) = transilv. et Borbasii

BROMUS I 97 (120)
glabratus Doell (mollis) = leptostachys
glabrescens Freyn (*molliform.*) A 30 (10 α c subfor.)
glabriflorus Borb. (*erectus*) A 29 (3 α b)
glaucus Lap. = erectus
glomeratus Scop. = Dactylis glom.
glomeratus Tausch = mollis
gracilis Leyss. = Brachyp. — grac. Posp.
gracilis Weigel = Brachyp. silvat.
grandiflorus Weigel = sterilis
grossus DC., Pollini = velutinus Schrad.
grossus Desf. in DC. = multiflorus
Gussonei Parl. 99 (5 β b)
gynandrus Roth = madritensis
hirsutissimus Cir. in R. et S. = ramosus
hirsutus Cocc. (erectus) 98 (3 α b) = villosus, cfr. A 29
hirsutus Curt. = ramosus
hirsutus Schrank. = villosus Gmel.
hispidus Savi = Kœleria hisp.
hordeaceus Gmel. = Billotii
hordeac. Koch (secalin.) = prec.
hordeaceus L. A 30, 204 (10)
hordeiformis Lam. = Vulpia uniglumis
Hughi Nym. A 30 (12 c)
humilis Cav. = scoparius
incrassatus Lam. = Vulpia incrass.
inermis Leyss. 98 (1), A 29
insubricus Stebler (erectus) = condensatus
intermedius Guss. 101 (12), A 30
intermedius Zum. A 30
japonicus Thunb. A 30 (9 β)
jubatus Ten. (non Vill.) = Tenoreanus
Kochii Gmel. = japonicus
lanceolatus Roth = macrostachys
lanuginosus Poir. 101 (13 b)
lasiophyllum Beck (secalin.) = Billotii
laxus Griseb. (inermis) = longiflorus
laxus Horn. = erectus
lejostachys Fr. (mollis) 100 (10 α b) = seg.
leptostachys Pers. (*mollis*) 100 (10 α b)
ligusticus All. = Vulpia ligust.
litoreus Georgi = inermis
litoreus Retz = Festuca arundinacea
Lloydianus Nym. = molliformis
loliaceus Ten. = Brachyp. loliac.
longearistatus O. Kze. (erectus) = stenophyllus
longiflorus W., Spr. 98, A 29 (3 α f)

BROMUS I 97 (120)
longifolius Schousb. = Brachyp. longif.
macrocladus Boiss. = arvensis
macrostachys Desf. 101 (13), A 30
macrostachys Gr. et Godr. (erectus) = multiflorus
macrostachys Guss. = lanuginosus
madritensis DC. = Gussonei
madritensis L. 99 (6 γ)
maximus Desf. 99 (5 β) = villosus, cfr. A 30
maximus Gilib. = secalinus
Michelii Savi = Avellinia Michel.
microstachys Duv.-Jouve (*mollis*) A 204 (10 α for.)
microtrichus Borb. (*condensatus*) A 204 (3 ε b)
microtrichus Borb. (erectus) = prec.
minor Fiori (*macrostachys*) 101 (13 c)
modensis Steud. = intermedius?
molliformis Lloyd. 100 (10 α c), A 30
mollis L. 100, A 30, 204 (10 α)
monandrus Parl. (*madritensis*) 99 (6 γ c.)
montanus Gærtn. M. et S. = erectus
montanus Scop. = ramosus
multiflorus Cast. A 29 (3 α e)
multiflorus DC. = japon. b. velutinus
multiflorus Host = commutatus
multiflorus Roth = racemosus
multiflorus Sm. A 30 (8 d)
multiflorus Weigel = arvensis
multispicatus R. et S. = madritensis
murorum Bernh. = tectorum
mutabilis F. Schultz = secalinus
nanus Bolzon (*squarros.*) A 30 (14 c)
nanus Weigel 100 (10 α d)
neglectus Nym. 100 (10 β)
nemoralis Huds. = ramosus
nemorosus Vill. = ramosus
nitidus Dum. = multiflorus
Noëanus Boiss. = squarrosus
nudus Klett. (*tectorum*) A 30 (4 b)
odoratus Gouan = erectus
ovatus Gærtn. = scoparius
ovinus Scop. = Festuca ovina
pannonicus Kum. et S. 98 (3 γ), A 30
patulus M. et K. 100 (9 β) = japonicus, cfr. A 30
patulus β M. et K. = japon. b. velutinus
pauper Gmel. = Brachyp. distachyum
pendulus Schur = B. arven. v. patulus
pentastachyos Tin. = Brachyp. pentast.
perennis Vill. = erectus

Digitized by Google

BROMUS I 97 (120)
pinnatus L. = Brachyp. pinn.
pinnatus β L. = Brachyp. silvatic.
Plukenetii All. = Brachyp. Pluk.
polymorphus Hohenack. = japonicus
polymorphus Scop. = secalinus
polystachys Lam. = Brachyp. distachyum
polystachyus DC. = madritensis
polystachyus Vis. (*intermed.*) 101 (12 b)
pratensis Ehrh. = commut.
pratensis Spr. = Festuca prat.
propendens Jord. = villosus (for.)
pseudo-arvensis Kœl. = erectus
pseudo-asper Schur = ramosus?
pubescens Bicchi (madritensis) = madr. b. ciliatus
pubescens Caldesi (*arvensis*) 100 (9 α b)
pubiflorus Borb. (*erectus*) A 29 (3 α b)
purpurascens Del. = rubens
pycnotrichus Borb. (erectus) = pannonicus
racemosus L. 100 (10 γ)
ramosus Huds. A 29 (2)
ramosus L. = Brachyp. ramos.
Requienii Lois. = intermedius
retusus Pers. = Brachyp. ramosum
rigens L. = villosus?
rigidus Rchb. = rubens
rigidus Roth A 30 (5 β c)
Rochelianus Opiz = madritens.
rubens Host = rigidus
rubens L. 99 (5), A 30
rupestris Host = Brachyp. rup.
sabulosus Guss. = Vulpia tenuis
sardous Spr. = Vulpia tenuis
scaberrimus Ten. 99 (6 β)
scabratus Lk. A 30 (10 β b)
scabriflorus Opiz = tectorum
Schraderi Kth. = Ceratochloa unioloid.
scoparius Guss. = Alopecurus
scoparius L. 101 (11), A 30
scoparius Mauri = rubens
secalinus All. = secal. b. velutinus
secalinus L. 100 (8), A 30
secalinus Savi = arvensis
segetalis A. Br. = secalinus
sericeus Ten. = Alopecurus
serotinus Sol. in Benek. 98 (2 β) = ramosus (α), cfr. A 29
siculus Strobl (*sterilis*) 99 (6 α b)
silvaticus Pollich = Brachyp. silv.
simplex Gaud. = commutatus
simplicissimus Ces. = mollis (for.)
spiculitenuatus Knapp = arvensis
squarrosus Brot. = macrostachys

BROMUS I 97 (120)
squarrosus L. 101 (14), A 30
stenophyllus Lk. A 30 (3 β')
sterilis L. 99 (6)
sterilis × tectorum O. Kze. = tect. b. nudus
stipoides L. = Vulpia geniculat.
strictus Scop. = Diplachne serotina
submuticus Rchb. (*secalinus*) 100 (8 c)
tectorum L. 98 (4), A 30
temulentus Bernh. = Lolium temul.
tenuis Tin. = Vulpia tenuis
tigurinus Sut. = Brachyp. pinnat.
Tenoreanus R. et S. 99 (6 α c)
transsilvanicus Steud. 98 (3 β), A 29
triflorus Ehrh. = Festuca altissima
triflorus L. = Festuca trifl.
triflorus Pollich = Ventenata dubia
trivialis Savi = Kœleria phleoides
truncatus Scop. = Agropyr. junceum
turgidus Pers. = lanuginosus?
unioloides H. B. et K. = Ceratochloa uniol.
varius Brot. = madritensis
velutinus Asch. et Græbn. (*japonicus*) 100 (9 β b), cfr. A 30
velutinus Duv.-Jouv. (arvensis) = pubescens
velutinus Guss. = neglectus
velutinus Koch (patulus) = japon. b. velutinus
velutinus Nocc. et Balb. = japon. b. velut.
velutinus Rchb. (squarrosus) = villosus Gmel.
velutinus Schrad. 100 (8 b), A 30
vernalis Pancic (erectus) = pannonicus
versicolor Pollich = B. arvensis
verticillatus Cav. = arvensis
vestitus Stapf (patulus) = japon. b. velutinus
villosus Forsk. A 30 (5 β)
villosus C. C. Gmel. 101 (14 b)
villosus Kth., Vis. (*erectus*) A 29 (3 α c)
vitiosus Weigel = secalinus
Willdenowii Kth. = Ceratochloa unioloid.
wolgensis Fisch. ex Jacq. f. = squarrosus
BROTERA = Cardopatium
corymbosa W. = C. corymb.
BROUSSONETIA I 275 (261)
papyrifera Vent. 276
BRUCHMANNIA = Beckmannia
erucæformis Nutt. = B. erucæformis
BRUNELLA III 27 (787)
alba Pall. = laciniata
alpina Timb. = grandiflora
bicolor Beck 28 (×), A 172

BRUNELLA III 27 (787)
cærulea Celak. (lacin.) = intermedia
grandiflora L., Jacq. 28 (2 γ)
grandiflora × laciniata Beck = bicolor
grandiflora × vulg. Stapf = spuria
hybrida Gelmi (alba) = intermedia
hyssopifolia L. 27 (1)
integrifolia Godr. (alba) = subintegra
intermedia Lk. 28 (×)
laciniata L. 27 (2 β)
laciniata × vulg. Stapf = intermedia
parviflora Poir. 27 (2 α b)
pinnatifida Briq. (*lacin.*) 27 (2 β c)
pinnatifida Gaud. (*grandifl.*) 28 (2 γ b)
pinnatifida Koch (alba) = lacin. c. pinnat.
pinnatifida Pers. = intermedia
pinnat. × vulg. typ. 27
spuria Stapf 28 (×)
subintegra Hausm. (*lacin.*) 27 (2 β b)
subintegra × vulg. typ. 27
variabilis Beck = pinnatifida Gaud.
vulgaris L. 27 (2)
BRUNIERA = Wolffia
vivipara Franch. = W. arrhiza
BRYANTHUS = Phyllodoce
taxifolius A. Gray = Ph. cærulea
BRYONIA III 158 (840)
acuta Desf. 159 (4)
alba Auct. al. = dioica
alba L. 158 (1)
angulosa Mab. (*dioica*) A 216 (3 β)
cretica L. 159 (nota)
corsica R. Maire (sicula) = angulosa
dioica Jacq. 159 (3), A 216
elongata Ten. (*dioica*) 159 (3 b)
marmorata Petit 159 (2 β)
micrantha Boiss. (non Hochst.) = syriaca
sicula Guss. 159 (4 β)
syriaca Auct. fl. Cors. = angulosa
syriaca Boiss. 159 (2)
Tinei Huet = acuta
BRYOPHTHALMUM = Pirola
uniflorum E. Mey. = P. unifl.
BUBANIA = Statice
monopetala Girard. = S. mon.
BUBON = Athamantha
garganicus Ten. = A. sicula
humilis Salisb. = A. macedon.
Libanotis Dum. = Seseli Lib.
macedonicus L. = A. mac.
multiflorus Mœnch = prec.
rigidior L. = Ferula communis
siculus Spr. = Seseli Bocconei
BUCCAFERREA = Ruppia
cirrhosa Petagna = R. mar.
Hornemannii Bubani = Potamoget. colorata

Digitized by Google

BUCEPHALOPHORA = Rumex
aculeata Pau = R. bucephalophorus
BUCERAS = Trigonella
corniculata All. = T. cornic.
elliptica Mœnch = T. monspel.
Fœnum-græcum All. = T. Fœn.-græc.
grandiflora Mœnch = T. cornicul.
monspeliaca All. = T. monsp.
mutica Mœnch = T. polycerata
odoratissima Medic. = T. Fœn.-græc.
polyceration All. = T. polycerata
BUCETUM = Festuca
elatius Parn. = F. arundinac.
giganteum Parn. = F. gig.
pratense Parn. = F. pratensis
BUCHINGERA = Cuscuta
suaveolens F. Schultz = C. racemosa
BUDA = Spergularia
marina Dum. = S. mar.
media Dum. = S. media
rubra Dum. = S. rubra
BUFFONIA I 341 (329)
annua DC. p. p., Colla = seg.
macrosperma J. Gay 341
perennis Ten., Ces. P. et G. (non Pourr.) = macrosp.
tenuifolia Vill., Gaud. etc. (non L.) = macrosp.
BUGLOSSITES = Borrago
laxiflora Moris = B. laxifl.
BUGLOSSUM = Anchusa
amœnum Gærtn. = A. italica
angustifolium All. = A. angustifolia L.
aspermum Gilib. = A. offic.
Barrelieri All. = A. Barrel.
cæruleum Pers. = A. italica
elatum Mœnch = A. ital.
italicum Tausch = A. ital.
officinale Lam. = A. offic.
paniculatum Tausch = A. ital.
sempervirens L. = A. semperv.
tinctorium Lam. = Alkanna tinctoria
vulgare Tausch = A. italica
BUGRANOPSIS = Ononis
alopecuroides Pomel = O. alop.
mitissima Pomel = O. mit.
variegata Pomel = O. var.
BUGULA = Ajuga
alpina All. = A. genevensis
arvensis S. F. Gray = seg.
Chamæpitys Scop. = A. Cham.
decumbens Mill. = A. genevensis
genevensis Crantz = A. genev.
nana Gilib. = A. pyramidal.
obliqua Mœnch = A. orient.
orientalis Crantz = A. or.
pyramidalis Crantz = A. pyr.
reptans Crantz = A. rept.
tomentosa Gilib. = A. genevens.
BULBINE = Simethis
planifolia Spr. = S. Mattiazzi
BULBOCAPNOS = Corydalis
cavus Bernh. = C. cava
digitatus Bernh. = C. dig.
BULBOCAPNOS = Corydalis
fabaceus Bernh. = C. intermedia
Halleri Spach = C. solida
tuberosus Spach = C. cava
BULBOCASTANUM = Bunium
capillifolium Tod. = B. capill.
denudatum Guss. = B. flexuosum
Linnæi Schur = B. Bulbocast.
majus Lag. = B. flexuosum
siculum Guss. (denudat.) = B. capillifol.
BULBOCODIUM I 178 (181)
alpinum Mill. = seg.
serotinum L. = Lloydia serot.
vernum L. 178, A 44
BULBOSTYLIS = Heleocharis
ovatus Stev. = H. ovata
palustris Stev. = H. pal.
BULLIARDA I 553 (454)
pedunculata St.-Lag. = Vaillant.
Vaillantii DC. 553, A 116
BUNIAS I 453 (385)
ægyptiaca L. = Ochthodium ægypt.
ambigua Rouy et Fouc. (*Erucago*) 453 (c)
arvensis Jord. 453 (d)
aspera Retz. = macroptera
balearica L. = Succowia bal.
brachyptera Jord. = Erucago (a)
Cakile L. = Cakile marit.
cochlearioides M. B. (non Murr). = Calepina Corv.
cristata Desv. = Erucago
edentula Bigel. = Cakile mar.
Erucago L. 453, A 98
glomerata Lap. = Coronopus procumbens
integrifolia Koch (*Erucago*) A 98 (e)
litoralis Salisb. = Cakile mar.
macroptera Rchb. 453 (b)
myagroides L. = Erucaria aleppica
paniculata L'Hér. = Neslea panic.
perennis S. et S. = Rapistrum perenne
raphanifolia S. et S. = Rapistrum orient.
rostrata L'Hér. = Euclidium syriacum
syriaca Gærtn. = Euclidium syr.
verrucosa Mœnch = Rapistrum orient.
virgata S. et S. = Ochthodium ægypt.
vulgaris Andrz. = Erucago
BUNIUM II 156 (546)
alpinum W. et K. 158 (6), A 151
ammoides Ces. = Petroselin. amm.
aphyllum Jan 157 (3 b)
Bulbocastanum L. 157 (3)
capillifolium Bert. 157 (1 β)
Carvi M. B. = Carum Carvi
carvifolium DC. = Carum carvifol.
BUNIUM II 156 (546)
corydalinum DC. = alpinum
cynapioides Bert. 157 (2)
denudatum DC. = flexuosum
divaricatum Bert. = montan.
divaricatum Ces. = ferulaceum
Falcaria M. B. = Falcaria vulgaris
ferulaceum S. et S. 158 (4)
feruläefolium Desf. = ferulac.
flexuosum With. 157 (1), A 151
magnum Sang. = alpinum
majus Gouan = flexuosum
montanum Koch 158 (5)
nivale Boiss. = alpinum?
petræum Ten. = alpinum
peucedanoides M. B. = Fœniculum peuc.
pyrenæum Lois. = flexuosum
rigidulum Caruel = Carum rigid.
tuberosum Paol. (*cynapioides*) 157 (2 b)
verticillatum Gr. et Godr. = Carum vert.
virescens DC. = Fœniculum peucedanoides
BUPHTHALMUM III 294 (890)
angustifolium Koch (salicif.) = grandiflor.
aquaticum L. = Asteriscus aquat.
asteroideum Viv. = Asteriscus spinosus
aureum Salzm. = Asteriscus aureus
bipinnatum Gilib. = Anthemis tinctoria
cordifolium W. et K. = speciosum
flexile Bert. 295 (3 γ)
gracile Lojac. (spinos.) = Asteriscus — grac.
grandiflorum L. 295 (3 β)
inuloides Moris 295 (4)
latifolius Lojac. (spinos.) = Asteriscus — latif.
maritimum L. = Asteriscus mar.
micranthum Goir. (*salicif.*) 295 (3 α b)
salicifolium L. 295 (3)
salicifolium β Bert. = flexile
sessile Mill. = Asteriscus marit.
speciosissimum Ard. 294 (2)
speciosum Schreb. 294 (1)
spinosum L. = Asteriscus spin.
BUPLEURUM II 151 (543)
actinoideum Briq. (*gramineum*) A 150 (9 β a)
acuminatum Briq. (*intermed.*) A 149 (1 β c)
affine Sadl. = virgatum
angulosum Schl. (ranuncul.) = Burserianum
angulosum Vill., All., Zum. (non L.) = ranunculoides
angustifolium Caruel (falcat.) = exaltatum
aristatum Bartl. = Odontites (α et β)
aristat. β Bert. = veronense
australe Jord. = patens
baldense Boiss. = exaltatum

Digitized by Google

BUPLEURUM II 151 (543)
baldense Host = ranunculoides
baldense Rouy et Cam. (tenuifol.) = exaltatum
baldense Turra = opacum
baldense W. et K. = junceum
bicalyculatum Bell. = petræum
Bicknellianum Briq. (ranuncul.) = proximum
breviinvolucratum St.-Lag. = veronense
breviradiatum Rchb. (Gerardi) = virgatum
Burserianum W. A 150 (9 α a)
canalense Wulf. = gramineum
caricifolium W. = gramineum
caricinum DC. (ranuncul.) = gramineum
cernuum Ten. = exaltatum
Columnæ Guss. 155 (13 c)
compactum Caruel (tenuiss.) 155 (13 b)
corsicum Coss. et Kral. 153 (7 α b)
dianthifolium Guss. 153 (4)
divaricatum Lam = Odontites (α et β)
dolichatum Briq. (petræum) A 149 (8 b)
elatius Gaud. (ranuncul.) A 150 (9 α e)
elatum Guss. 154 (10)
exaltatum M. B. 153 (7 β)
exiguum Timb. p. p. (ranuncul.) = humile
falcatum L. 153 (7), A 149
falcatum β Bert. = exaltatum
filicaule Brot. A 151
Fontanesii Guss. 155 (11 γ)
fruticescens Huet = telonense
fruticescens L. 155 (nota)
fruticosum L. 153 (6), A 149
Gerardi All., Jacq. 155 (14), A 150
glaucum Rob. et Cast. 155 (12 β)
globosum Briq. (petræum) A 150 (8 d)
gramineum Gr. et Godr., Ard. ecc. = exaltatum
gramineum Vill. 154 (8 β), A 150
graminifolium Vahl 154 (8) = petræum, cfr. A 149
granulatum Gaud. = intermedium
Gussonii Arc. (aristat.) = veronense
humile Gaud. (ranuncul.) A 150 (9 α c)
incurvum Bell. A 149 (8 c)
insulare Rouy et Cam. A 149 (6 β)
intermedium Ces. (Odont.) = veronense
intermedium Lois. (rotundif.) A 149 (1 β)
intermedium Steud. = prec.
Jacquinianum Jord. A 150 (14 α a)
junceum Lam. = Gerardi (α)
junceum L. 255 (15)
junceum Pollich = tenuissim.
latifolium Gaud. (ranuncul.) = Burserianum

BUPLEURUM II 151 (543)
leve A. Le Grand (glaucum) 155 (12 β b)
Linnæanum Ces. (Odont.) = Fontanesii
Lisæ Briq. = seg.
Lisæ Briq. (falcatum) A 149 (7 γ)
lonchophorum Briq. (petræum) A 149 (8 a)
longifolium Somm. (falcatum) 153 (7 α c)
longipedicellatum St.-Lag. = Fontanesii
nanum Koch (aristat.) = seg.
nanum Timb. (opacum) 154 (11 α b)
neglectum Ces. = exaltatum
obtusatum Lap. A 150 (9 α d)
obtusifolium Ten. = exaltatum
Odontites Bartl. etc. = Fontanesii
Odontites Desf. etc. = Fontanesii
Odontites L. 154 (11). A 150
Odontites Wettst. in Kern. = opacum
opacum Ces. (Odont.) A 150 (11 α)
opacum Lge. = prec.
patens Rchb. (Gerardi) A 150 (14 α b)
perfoliatum Lam. = rotundifol.
petræum L. A 149 (8)
petræum Paol. (stellat.) 152 (2 b) = stellatum, cfr. A 149
petræum Rchb. exc. = stellatum
petræum Wulf. etc. = graminif.
Pollichii Gmel. = tenuissim.
procumbens Bert. etc. (non Desf.) = compactum
protractum Hoffgg. et Lk. = intermedium
provinciale Huet = telonense
proximum Briq. (ranuncul.) A 150 (9 α b)
ramosum Gaut. et Timb. A 150 (9 β d)
ranunculoides L. 154 (9), A 150
rigidum Freyer = exaltatum
rigidum L. 153 (3)
Rissoni Rich. in DC. = virgatum
rotundifolium Brot. = intermedium
rotundifolium L. 152 (1), A 149
Savignonei DNtrs. 152 (1 β b), A 149
semicompositum L. 155 (12)
Sibthorpianum Sm. = exaltatum
Souliei Calestani = seg.
Souliei Coste (ranuncul.) A 150 (9 var.)
spinosum Gouan, L. f. 153 (5)
stellatum L. 152 (2), A 149
stenophyllum Rouy (falcat.) = exaltatum
subfalcatum Schur = exaltatum
subovatum Lk. 152 (1 β) = intermedium, cfr. A 149

BUPLEURUM II 151 (543)
syntonum Briq. (gramineum) A 150 (9 β b)
telonense Gren. A 150 (9 β c)
tenuifolium Pourr. ex Timb. = exaltatum
tenuissimum L. 155 (13)
trifidum Ten. = junceum
veronense Turra 154 (11 β)
virgatum Rchb. (Gerardi) 155, A 150 (14 β)
BUPRESTIS = Bupleurum
exaltata Spr. = B. exalt.
fruticosa Spr. = B. frut.
Gerardi Spr. = B. Ger.
juncea Spr. = B. junc.
BURGSDORFIA = Sideritis
montana Rchb. = S. mont.
rigida Mœnch = S. romana
romana Hoffg. et Lk. = S. rom.
BURSA = Capsella
bifida Borb. = C. — bifida
cameliniformis Borb. = C. — camel.
canescens Borb. = C. — canesc.
cuneata Borb. = C. — cuneata
drabiformis Borb. = C. — drabif.
Gelmii Borb. = C. Gelmii
gracilis Borb. = C. gracilis
grandiflora Borb. = C. grandifl.
major Borb. = C. major
major × rubella Borb. = C. — cuneata
nana Borb. = C. — nana
pastoris Weber = C. Bursa - pastoris
pastoris × rubella Borb. = C. gracilis
pinnatifida Borb. = C. — coronopifol.
rubella Borb. = C. rubella
Schrankii Borb. = C. — Schrankii
sinuata Borb. = C. — sinuata
stenocarpa Borb. = C. stenoc.
stylosa Borb. = C. — stylosa
BUTOMUS I 162 (171)
Cæsalpini Neck. = umbellatus
floridus Gærtn. = prec.
umbellatus L. 162
vulgaris Gueld. = umbellatus
BUXUS II 294 (655)
angustifolia Loud. (semperv.) 294 (1 d)
arborescens L. (semperv.) 294 (1 a)
arborescens Mill. = prec.
balearica W. 295 (2)
humilis Koch (semperv.) = suffruticosa
rotundifolia Baill. (semperv.) 294 (1 c)
sempervirens L. 295 (1)
suffruticosa L. (semperv.) 294 (1 b)
suffrutic. Mill. = prec.
BYSTROPOGON = Satureja
fruticosum Juss. = S. frutic.

CACALIA = Adenostyles
albifrons L. f. = A. Alliar.
Alliariæ Gouan = A. Alliar.
alliariifolia Lam. = A. alp. (α)

Digitized by Google

CACALIA = Adenostyles
alpina L. = A. alpina
alpina α L. = A. Alliariæ
alpina β L. = A. alp. (α)
australis Ten. (alp.) = A. austr.
decipiens Zum. = alpina
ficoides L. = Senecio ficoid.
glabra Vill. = A. alpina (α)
hirsuta Vill. = A. Alliar.
hybrida Vill. (toment.) = A. hybr.
leucophylla W. = A. leucoph.
macrophylla Ten. (non M. B.) = A. australis
Petasites Lam. = A. Alliar.
sarracenica L. = Senecio Cacaliaster
tomentosa All (alp.) = A. leucophyll.
tomentosa Jacq. = A. Alliar.
tomentosa Vill. = A. leucophyll.
CACHRYDIUM = Hippomarathrum
Libanotis Lk. = H. Liban.
CACHRYS II 206 (604)
alata Hoffm., M. B. = Prangos ferulacea
ambigua Salzm. = Magydaris pastinacea
cretica Lam. = Lecokia cret.
cristata DC. = Hippomarathr. crist.
cylindracea Guss. = Prangos cyl.
dichotoma Spr. = Krubera peregrina
echinophora Guss. = Hippomarathr. cristatum
ferulacea Calestani = Prangos ferul.
lejocarpa Guss. (echinoph.) = Hippomarathr. Libanotis (α)
levigata Lam. 206
Libanotis Gouan = levigata
Libanotis L. = Hippomarathr. Liban.
Linearia Mill. = prec.
longifolia Guss. (sicula) = Hippomarathr. pungens
maritima Spr = Crithmum mar.
Morisonii All. = levigata
panacifolia Vahl = seg.
pastinacea Lam. = Magydaris past.
peregrina Spr. = Krubera per.
pterochlæna DC. = Hippomarathr. siculum
pungens Jan = Hippomarathr. pung.
sicula L., Guss. = Hippomarathr. sic.
sphærocarpa Ten. = Hippomarathr. Liban.
tomentosa Desf. = Magydaris pastinacea
trifida Mill. = levigata
triquetra Ten = Colladonia angustifol.
CACTUS = Opuntia
Dillenii Ker-Gawl. = O. Dill.
Ficus-indica L. = O. Fic.-ind.
Opuntia L. = O. vulgaris
Tuna L. = O. Tuna
CÆNOTUS = Erigeron
canadensis Raf. = E. can.
pusillus Raf. = prec.
CAJANUS = Cytisus
argenteus Spr. = C. argent.
CAKILE I 452 (384)
ægyptiaca W. 452 (b)
æqualis L'Hér. = marit.
baltica Jord. 452 (d)
Bauhini Jord. A 97 (g)
crenata Jord. = ægyptiaca
edentula Jord. 452 (c)
latifolia Poir. = ægyptiaca
litoralis Jord. = pinnatifida
maritima Scop. 453, A 97
perennis L'Her. = Rapistrum per.
perfoliata L'Hér. = Myagrum perfol.
pinnatifida Paol. (mar.) 452 (e)
pinnatifida Stokes = prec.?
rugosa L'Hér. = Rapistrum rugos.
Serapionis Gærtn. = marit.
sinuatifolia DC. (marit.) = ægyptiaca
sinuatifolia Stokes = marit.
CALAMAGROSTIS I 63 (75)
abietina Schur = arundinacea
acutiflora DC. = varia
acutiflora Rchb. = arund. × Epigeios
argentea DC. = Stipa Calamagr.
agrostiflora Beck = tenella
alpina Host = Halleriana
altissima Host = Arundo mauritanica
arenaria Roth = Psamma aren.
arundinacea Roth 64 (1), A 16
arund. × Epig. Heidenr. A 17
arund. × varia Torges = Haussknechtiana
Arundo Roth = Deschampsia cæspitosa
bicolor Gmel. = Ampelodesma bicol.
Bihariensis Simonkai = Epig. × varia
Calamagrostis Karsten = lanceolata
canescens Asch. et Græbn. (Calam.) = seg.
canescens Fiori (lanceolat.) A 17 (6 β)
canescens Posp. (Epigeios) = Reichenbachiana
Clarionis Lois. = Halleriana
colorata DC. = Phalaris — picta
conspicua Berg. = Stipa Calamagr.
donaciformis Lois. = Arundo Pliniana
dubia Czetz = Halleriana
Epigeios Roth 64 (4), A 17, 203
Epig. × litorea Haussk. A 17
Epig. × ps.-phragmites Asch. et Græbn. = Epig. × litor.
Epig. × varia Simonkai A 17
Gaudiniana Rchb. = canescens
glauca Rchb. = Reichenbachiana
gracilis Schum. = lanceolata
gracilis Seen. = Stipa Aristella
CALAMAGROSTIS I 63 (75)
Halleriana P. B., DC. 64 (3), A 17, 203
Haussknechtiana Torges A 17
hypacrathera Torges (villosa) = nutans
hypathera Fiori (Halleriana) A 203 (3 for.)
hypathera Torges (villosa) = prec.
inclusa Torges (varia) A 16 (1 γ b)
lanceolata Roth 64 (6), A 17
laxa Host A 17 (5 b)
Leersii Kœl. = Deschampsia cæspitosa
litorea DC. 64 (5), A 17
mauritanica Spr. = Arundo maur.
montana DC., Koch. = varia
montana Host 64 (1 β)
mutica Koch (Halleriana) A 203 (3 for.)
mutica Torges (villosa) = prec.
nigricans Merat = Phragmit. — subuniflora
nutans Sauter A 203 (3 for.)
pallida Lge. (lanceol.) = canescens
Plinii Gmel. = Arundo Pliniana
pseudo-phragmites Baumg., Asch. = litorea
pseudo-phragmites Rchb. = Halleriana
pyramidalis Host = arundin.
ramosa Host = lanceolata
Reichenbachiana Grecescu (Epigeios) A 17 (4 β)
Schwabii Spr. = Gastridium lendig.
silvatica DC. = arundinacea
silvatica Host = varia
silvat. × Epigeios Heidenr. = arund. × Epig.
speciosa Host = Stipa Calamagr.
subulata Dum. = arund. × Epigeios
tenella Host = Halleriana
tenella Lk. 64 (2), A 17
tenella Marches. = tenerrima
tenerrima Torges (varia) A 16 (1 γ c)
varia P. B. 64 (1 γ), A 16
varia × arund. Asch. et Græbn. = Haussknechtiana
varia × Epig. Asch. et Græbn. = Epig. × varia
variegata With. = Phalaris — picta
villosa Mut. (non J. F. Gm.) = Halleriana
violacea Beck (Epigeios) A 17 (4 α b)
vulgaris Ten. = quid?
Wirtgeniana Haussk. = Epig. × litorea
CALAMINTHA = Satureja
acinifolia Posp. (Nepeta) = S. — acin.
acinoides Nym. = S. — suaveolens
Acinos Clairv. = S. Acin.

Digitized by Google

CALAMINTHA = Satureja
ætnensis Strobl. = S. — granatensis
albiflora Evers (nepetoides) = S. nepet. c. albifl.
albiflora Nic. (Clinopod.) = S. vulg. d. albifl.
alpina Lam. = S. alp.
arvensis Lam. = S. Acinos
ascendens Jord. = S. — ascend.
canescens Evers (parviflora) = S. Nepeta c. canesc.
canescens Presl = S. Nep. c canesc. ?
Clinopodium Benth. = S. vulgaris
corsica Benth. = S. cors.
cretica Lam = S. fruticosa
elliptica Billot (Acinos) = S. Acin. b ellipt.
Fenzlii Vis. = S. — subnuda
glandulosa Benth. = S. gland.
granatensis Boiss. et Reut. = S. — granat.
grandiflora Mœnch = S. grand.
graveolens Benth. = S. grav.
Gussonei Nic. (Clinop.) = S. vulg. b Gusson.
Gussonei Tod. = S. Nep. f micrantha
hederacea Scop. = Glechoma heder.
lancifolia Murb. (Acinos) = S. Acin. c lanc.
menthæfolia Gr. et Godr. = S. — ascendens
menthæfolia Host = S. Calamintha (α)
meridionalis Nym. = S. — granatensis
mollis Jord. = S. mollis
Moscatella Goir. (offic.) = S. — Moscat.
nebrodensis Kerner et Strobl = S. — nebrod.
Nepeta Rchb. (offic.) = seg.
Nepeta Savi = S. Nepeta
nepetoides Jord. = S. — nepetoid.
officinalis Mœnch = S. Calamintha (α)
parviflora Lam. = S. Nepeta
patavina Ces. P. et G. = S. — suaveolens
patavina Host 63 (*nota*)
rupestris Host = S. thymifolia
silvatica Bromf. = S. Calamintha (α)
suaveolens Arc. (patavina) = S. — suav.
suaveolens Boiss. = S. — suav.
subnuda Host. = S. — subnuda
tenuiflora Goir. (Nepeta) = S. Nep. b tenuifl.
thymifolia Host = S. Hostii
thymifolia Rchb. = S. thymif.
vulgaris Rchb. (offic.) = S. Calamintha (α)
CALAMUS = Acorus
aromaticus Güld. = A. Calamus
CALATHIANA = Gentiana
nivalis Delarb. = G. niv.
CALATHINUS = Narcissus
serotinus Raf. = N. ser.
CALCEOLUS = Cypripedium
marianus Crantz = C. Calceolus
CALCITRAPA = Centaurea
Adami Schur = C. Adami
altissima Lam. = C. salmantica
aspera Cass. = C. asp.
benedicta Sweet = Cnicus ben.
brevispina Mœnch = C. salmantica
Calcitrapa Hill. = Calc.
centauroides Sweet = C. cent.
cichoracea Lam. = C. Seridis
collina Lam. = C. coll.
conferta Mœnch = C. melitensis
fusca Mœnch = C. fuscata ?
Galactites Lam. = Lupsia Galact.
heterophylla Mœnch = C. aspera
Hypophæstum Gærtn. = C. Calcitrapa
iberica Trev. = C. iber.
lanuginosa Lam. = Cnicus benedictus
lutea Delarb. = C. solstitialis
myacantha Cass. = C. myac.
napifolia Mœnch = C. nap.
nudicaulis Lam. = Serratula nudic.
parviflora Lam. = C. aspera
rupestris Sweet = C. rup.
sessiliflora Lam = C. melitensis
solstitialis Lam. = C. solstit.
sonchifolia Lam. = C. sonchif.
sordida Sweet = C. sord.
stellata Lam. = C. Calcitrapa
vulgaris Bernh. = C. Calcitrapa
CALDESIA = Alisma
dubia Asch. et Græbn. (parnass.) = A. dubium
parnassifolia Parl. = A. parnass.
terrestris Asch. et Græbn. (parnass.) = A. — terrestre
CALENDULA III 297 (892)
ægyptiaca Desf. 297 (γ)
ambigua Guss. (micrantha) = arvensis
arvensis L. 297 (α)
arvensis b Guss. = crocea Nic.
atrata Lojac. exs. = seg.
atrata Paolucci (*margin.*) 298 (λ b)
bicolor Raf. 298 (ζ)
ceratocarpa Lojac. = seg.
ceratosperma Viv. A 186
Crista-galli Lojac. (an Viv.?) = lutea
crocea Guss. (stellata) = sicula et hymenocarpa ?
crocea Nic., *Strobl* (*arven.*) 297 (α b)
fulgida Bert. = sicula
fulgida Groves = hydruntina
fulgida Raf. 298 (κ)
fulgida b Guss. = undulata
Gussonei Fiori (*micrantha*) 297 (β b)
hortensis Fiori (*offic.*) 298 (η)
hydruntina Fiori (*offic.*) 298 (ε)
CALENDULA III 297 (892)
hymenocarpa Coss. (stellata) = seg.
hymenocarpa DC. (sicula) = seg.
hymenocarpa Fiori (*offic.*) 298 (θ), A 186
incana Ten. (non W.) = sicula
intermedia Fiori (*parvifl.*) 297 (δ b)
intermedia Nic. (stellata) = prec.
latifolia Nic. (*arven.*) 297 (α c)
lutea Fiori (*parvifl.*) 297 (δ c)
lutea Nic. (stellata) = prec.
marginata W. 298 (λ)
maritima Guss. 298 (μ)
maritima Ten. = sicula
micrantha Lojac. = ægyptiaca ?
micrantha Tin. 297 β
microcephala Guss. (arven.) = Gussonei
officinalis L. 297, A 186
parviflora Raf. 297 (δ)
parviflora b Guss. = intermedia
parviflora c Guss. = lutea
platycarpa Coss. = hymenocarpa
sicula Bert. = fulgida
sicula Cyr. 298 (ι). A 186
stellata Auct. it. = fulgida
stellata Cav. 298 (nota)
stellata Coss. p. p., Nic. = parviflora
sublanata Rchb. 297 (α d)
undulata Raf. 298 (κ b)
CALEPINA I 465 (402)
cochlearioides Dum. = Corvini
Corvini Desv. 465
CALLIANTHEMUM = Ranunculus
anemonoides Schott = R. anemon.
bipinnatum Dulac = R. rutæfolius
coriandrifolium Rchb. = R. rutæfolius
Kernerianum Freyn = R. Kerner.
rutæfolium C. A. Mey. = R. rut.
rutæfol. Rchb. = R. anemonoides
CALLICORE = Amaryllis
Belladonna Lk. = A. Bellad.
rosea Lk. = prec.
CALLIOPEA = Crepis
aurea D. Don. = C. aur.
CALLIOPSIS = Coreopsis
bicolor Rchb. = C. tinctoria
tinctoria DC. = C. tinctoria
CALLIPELTIS = Galium
muralis Moris = G. murale
CALLISTEMMA = Scabiosa
brachiata Boiss. = S. brach.
Sibthorpiana Boiss. (brach.) = S. Sibth.
CALLISTEPHUS III 230 (nota)
chinensis Cass. 230 (nota)
hortensis Cass. = chinensis
CALLITRICHE II 298 (654)
alpina Parl. (verna) = minima
angustifolia Ambr. (verna) = hamulata
autumnalis L. = bifida
autumnalis α Bert. = verna

Digitized by Google

CALLITRICHE II 298 (654)
bifida L. (*palustr.*) 294 (ζ)
bifida Morong = prec.
brutia Petagna = bifida
cæspitosa Schultz = minima
campana Fiori (*obtusangula*) A 161 (γ b)
campana N. Terr. (autumnal.) = prec.
capillaris Parl. 294 (θ)
cruciata Leb. = truncata
decussata Lk. = bifida
dioica Petagna = verna?
diversifolia Ambr. (verna) = verna
fontana Scop. = verna
hamulata Kuetz. 298 (δ)
intermedia W. = verna?
macrior Bert. (autumn.) = bifida
minima Bert. (verna) = pedunculata
minima Hpe. 293 (β b)
minima L. (palustr.) = prec.
natans L. (palustr.) = verna
obtusangula Le Gall. 293 (γ), A 161
palustris L. 293, A 161
pedunculata DC. 294 (ε)
platycarpa Kuetz. 293 (α b)
pusilla Bert. (autumn.) = truncata
sessilis DC. = palustris
stagnalis Scop. 293 (α)
stellata Hpe. = verna
tenuifolia Fr. 293 (δ b)
tenuifolia Genn. = capillaris
truncata Guss. 294 (η)
verna L. 293 (β)
vernalis Kuetz. = verna
virens Goldb. = bifida
CALLITRIS A 203 (33 bis)
quadrivalvis Vent A 203
CALLOTROPIS = Galega
tricolor G. Don = G. officinal.
CALLUNA II 302 (666)
albida Fiori (*vulgar.*) A 162 (d)
albida Goir. (Erica) = prec.
Erica DC. = vulgaris
puberula Fiori (*vulgar.*) A 162 (c)
puberula Goir. (Erica) = prec.
pubescens Koch (*vulg.*) 302 (b)
sagittæfolia S. F. Gray = seg.
vulgaris Salisb. 303, A 162
CALONNEA = Gaillardia
pulcherrima Buchoz = G. pulchella
CALOSCILLA = Scilla
Clusii Jord. et Fourr. = S. — glabra
Hughii Jord. et Fourr. = S. Hughii
CALOTHECA = Æluropus
litoralis Spr. = Æ. litor.
niliaca Spr. = Æ. repens
repens Spr. = Æ. repens
CALTHA I 516 (430)
biflora DC. = palustris
emodorum Spr. = pal.
glabra Gilib. = pal.
intermedia Schott = pal.
major Mill. = pal.
CALTHA I 516 (430)
pallidiflora Martr.-Don. = pal.
palustris L. 516
paniculata Wall = pal.
pedemontana Chiov. = pal.
Populago Gouan = pal.
pumila Schur = pal.
riparia G. Don = pal.
ucranica Racib. = pal.
vulgaris Schott = pal.
CALTHA = Calendula
arvensis Mœnch = C. arvens.
graveolens Gilib. = C. arvens.
officinalis Mœnch = C. offic.
stellata Mœnch = C. stell.
CALYCOCORSUS = Willemetia
hieracioides F. W. Schmidt = W. stipitata
CALYCOMORPHUM = Trifolium
subterraneum Presl = T. subt.
CALYCOTOME II 23 (436)
inermis Somm. (*villosa*) A 136 (δ b)
infesta Guss. 23 (β), A 136
ligustica Burn. = seg.
ligustica Burn. (*spin.*) 23 (γ)
macrantha Rouy (villosa) = rigida
pallidiflora Strobl (*infesta*) A 136 (β b)
rigida Fiori (*villosa*) 23 (δ b)
spinosa Lk. 23, A 136
spinosa Presl = infesta
villosa Lk. 23 (δ), A 136
vulcanica Lojac. (spin.) = ligustica?
CALYSTEGIA = Convolvulus
asarifolia S. F. Gray = C. Soldanella
inflata Strobl (non G. Don) = C. inflat.
lucana G. Don = C. inflatus
micrantha Goir. (sepium) = C. — micranthus
reniformis R. Br. = C. Soldanella
sepium R. Br. = C. sep.
silvatica Choisy = seg.
silvestris R. et S. = C. inflatus
Soldanella L. = C. Sold.
CAMELINA = Chamælina
CAMERARIA = Montia
fontana Mœnch = M. font.
CAMMARUM = Aconitum
paniculatum Fourr. = A. panic.
CAMPANULA III 172 (846)
abortiva DC. f. (*sibirica*) 174 (6 α b)
adenocarpa M. et K. (patula) = punctata
aggregata W., Rchb. 176 (11 f), A 180
albicans Harms. A 180 (9 β)
albiflora Goir. (*barbata*) A 180 (5 d)
albiflora Goir. (*persicæfol.*) A 180 (18 i)
albiflora N. Terr. (graminifol.) = Hedræanth. — albifl.
albiflora N. Terr. (*Trachel.*) 187 (37 f)
alburnica Briganti = Phyt. trichocalyc.
CAMPANULA III 172 (846)
Allionii Vill. = alpestris
alpestris All. 173 (3)
alpina Jacq. 173 (4), A 180
Alpini L. = Adenophora Alpinii
amygdalifolia Salisb. = persicæfolia
angustifolia DC. f. (*persicæfol.*) 178 (18 d)
angustifolia Tanf. (*macrorrhiza*) 185 (33 s b)
antirrhina Schleich. 183 (31 b)
arvensis Pers. = Specularia Specul.
atropyrpurea Sacc. (*Trachel.*) 187 (37 g)
baldensis Balbis = ramosissima
barbata L. 174 (5), A 180
barbata × *Phyt. hemisphæricum* 171 (*nota*)
Barbeyi Feer 182 (28 δ)
Barrelieri Marnock = quid?
Barrelieri Presl = fragilis
Bellardi All. 184 (32)
Bertolæ Colla = tenuifolia
betonicæfolia Gilib. = glomerata
Bocconi J. F. Gmel. = rhomboidalis
Bocconi Vill. = Bellardi
bononiensis L. 186 (35), A 180
bracteosa Wk. (*Rapunculus*) 177 (15 α e)
cæspitosa All. et Auct. al. = Bellardi
cæspitosa Ces. P. et G. p. p. = Scheuchzeri
cæspitosa Goir. (spicata) = ramosa
cæspitosa Scop. 183 (31)
calycina Boeb. 177 (15 α b)
canescens Ten. (fragilis) = hirta
carnica Schiede, DC. = linifolia
catinensis Torn. = dichotoma
caudata Vis. = Hedræanthus dalmaticus
Cavolini Ten. 181 (27 β)
cenisia L. 179 (19)
Cervicaria L. 175 (10)
cervicarioides R. et S. 176 (11 h), A 180
coarctata Gilib. = Rapunculus
cochlearifolia Vahl (non L.) = fragilis (α)
concolor Peterm. (*bononiensis*) 186 (35 α b)
cordata Peterm. 187 (37 b)
cordata Vis. = Specul. cord.
corniculata Rchb. (aggregata) = farinosa
corymbosa Ten. = versicolor
crenata Lk. = rapunculoides
cymbalariæfolia Ten. (fragilis) = hirsuta
dalmatica Bert. = Hedræanthus dalm.
dasycarpa Kit. 178 (18 f)
dasycarpa M. et K. (*patula*) 178 (16 d)
dasycarpa M. et K. (*Trachel.*) 187 (37 e)
Delpontei Chab. (*Bellardi*) 183 (32 d)

Digitized by Google

CAMPANULA III 172 (846)
denticulata Zersi (*Trachel.*) A 180 (37 for.)
dichotoma L. 174 (7)
dichotoma Presl (mollis) = prec.
diffusa Vahl = fragilis (α)
divergens W. 174 (6 β)
Elatines L. 182 (28)
Elatines Petagna = garganica
Elatines Pollini = elatinoides
elatinoides Moretti 182 (29)
elatior Bruegg. (*barbata*) 174 (5 b)
elliptica Kit., Rchb. 176 (11 c), A 180
Erinus L. 172 (1), A 179
eriocarpa M. et K. (*persicæfol.*) 178 (18 e)
esculenta Salisb. = Rapunculus
excisa Schleich. 188 (30)
falcata R. et S. = Specul. falc.
farinosa Andr., Rchb. 176 (11 g), A 180
farinosa Rchb. (aggregata) = prec.
filiformis Gilib. = rotundifol.
filiformis Moretti (non Ruiz. et Pav.) = Morettiana
Firmiana Vand. 174 (5 c)
Fischeri Schult. = Adenophora liliifolia
flaccida Wallr. (patula) = neglecta
flore-albo Pollini (*spicata*) A 180 (14 e)
floribunda Viv. = isophylla
florida Salisb. = Medium
foliosa Ten. 176 (12)
Forsythii Arc. (*rotundif.*) 185 (33 ζ)
fragilis Cyr. 181 (27)
Freyeri Rchb. (Waldstein.) = Tommasiniana
garganica Ten. 182 (28 γ)
garganica Vis., Rchb., Koch = istriaca
glaberrima DC. f. (*Elatines*) 182 (28 α b)
glabra Bluff. et Fing. (glomer.) = aggregata
glabra Peterm. (*rapunculoides*) 186 (36 c)
glabra Ten. (*Cavolini*) 181 (27 β)
glabra Ten. (*fragilis*) 181 (27 α a)
glacialis Mielich. (*rotundif.*) 184 (33 α b)
glareosa Huet = Scheuchzeri
glomerata L. 175 (11). A 180
glomerata Saut. (*thyrsoides*) 176 (13 b)
glomerata var. All. = nicæensis
gracilis Jord. = Bellardi
grandiflora Lam. = Medium
graminifolia Host = Hedræanth. tenuifol.
graminifol. L. = Hedræanthus gram.
graminifol. Presl, Guss. = Hedræanth. — siculus
grandiflora DC. f. (*patula*) 178 (16 f)
grandiflora DC. (*persicæf.*) 178 (18 g)

CAMPANULA III 172 (846)
Hausmanni Rchb. f. = Camp. barbata × Phyt. hemisph.
hederacea L. = Wahlenbergia heder.
Hermanni Ten. (glomer.) = aggregata
hirsuta Tanf. p. p. (Cavolini) = incana
hirsuta Guss. = Specularia — hirta
hirsuta Ten. (*fragilis*) 181 (27 α c)
hirsuta Terr. N. (fragilis) = fragilis b. hirta
hirta Gelmi (*linifol.*) 185 (33 ι c)
hirta M. et K. (*rotundif.*) 184 (33 α e)
hirta M. et K. (Scheuchzeri) = valdensis
hirta R. et S. = Specul. — hirta
hirta Ten. (Cavolini) = incana
hirta Ten. (*fragilis*) 181 (27 α b)
hirta Ten. (*Rapunculus*) 177 (15 α g)
hispanica W. 187 (*nota*)
hispida Lej. 178 (18 b)
Hoppeana Rupp. (*Bellardi*) 183 (32 c)
hortensis Meerb. = rapunculoides
hybrida All. et Auct. al. = Specul. falcata
hybrida L. = Specul. hybr.
incana Ten. (*Cavolini*) 181 (27 β a)
integra Chiov. et Rossi (rhomboid.) = rhomb. α b. lanceolata
intermedia Schult. = Adenophora liliifolia
interrupta DC. f. (*spicata*) 177 (14 c)
Isophylla Moretti 181 (26)
istriaca Feer 182 (28 β)
Lambertiana DC. f. 177 (15 β)
lanceolata DC. f. (*rhomboid.*) 185 (34 α b)
lanceolata Lap. 186 (34 β)
lancifolia M. et K. (*rotundif.*) 184 (33 γ)
lasiocalyx Gr. et Godr. (persicæf.) = eriocarpa
latifolia DC. f. (*patula*) 178 (16 b)
latifolia L. 187 (38)
latifolia Ugolini (*rotundifol.*) A 180 (33 α for.)
ligulata Pers. = lingulata
liliifolia Bir. p. p. = rhomboidalis
liliifolia L. = Adenophora lil.
limonifolia L. = Phyt. limon.
lingulata W. et K. 175 (8)
linifolia Auct. al. (rotundif.) = tenuifolia
linifolia Lam., DC. etc. = Scheuchzeri
linifolia Scop. 185 (33 ι)
longisepala Rossi et Chiov. (*ramosissima*) 178 (17 β)
Loreyi Pollini = ramosissima
Lostritti Ten. 187 (*nota*)

CAMPANULA III 172 (846)
macrantha DC. f. (persicæf.) = persic. g. grandiflora
macrophylla DC. f. (*rapunculoides*) 186 (36 d)
macrorrhiza Gay 185 (33 ε)
magellensis Ten. = pumila
major DC. f. (rotundif.) = lancifolia
Maroldiana Terr. N. (*Erinus*) 172 (1 b)
maxima Curt. (persicæf.) = persic. g grandiflora
Medium L. 178 (2)
micrantha Bert. 184 (33 δ)
Minæ Strobl = Phyt — Minæ
minuta Savi = rotundifol.
Molineri Colla = abortiva
mollis L. 187 (*nota*)
mollis Ten. p. p. = dichotoma
Morettiana Rchb. 180 (22)
nana DC. f. (*rapunculoides*) 186 (36 b)
nana Lam. = alpestris
neglecta R. et S. 178 (16 g)
nicæensis DC. f. (*glomer.*) 176 (11 d)
nicæensis Risso = macrorrhiza
nicæensis R. et S. = glomer.
nitidula Beck. (*Rapunculus*) 177 (15 α f)
nutabunda Guss. = Wahlenbergia nutab.
nutans Lam. = rapunculoides
nutans Vahl = divergens
obliquifolia Ten. 186 (35 β)
obliquifol. B Ten. = simplex Bég.
cœnipontana Moretti = rapunculoides
paniculata DC. f. (sibirica) = divergens
paniculata Nœg. (*Bellardi*) 183 (32 e)
paniculata Pasq. (*Rapunculus*) 177 (15 α d)
paniculata Peterm. (*Trachel.*) 187 (37 d)
parviflora Celak. (*Trachel.*) 187 (37 h)
parviflora Goir. (*bononiensis*) A 180 (35 α d)
parviflora Goir. (sibirica) = abortiva
parviflora Lam. = sibirica
parviflora Peterm. (*persicæf.*) 178 (18 h)
parviflora Uechtr. (*rapunculoides*) 186 (36 e)
patula L. 178 (16)
pauciflora DC. f. (*patula*) 178 (16 c)
peregrina Hoffmgg. et Lk. (non L.) = primulæfolia
Perpentiæ Moretti = Raineri
persicæfolia L. 179 (18), A 180
petræa All., Ten. = farinosa
petræa Auct. gall. = albicans
petræa L. 175 (9), A 180
Pichleri Vis. = Phyt. trichocalyc.
primulæfolia Brot. A 180

Digitized by Google

CAMPANULA III 172 (846)
pseudo-carnica Gelmi (*linifol.*) 185 (33 ι b)
pseudo-thyrsoides Goir. (*spicata*) A 180 (14 d)
pubescens DC. f. (*macrorrhiza*) 185 (33 ε c)
pubescens DC. f. p. p. (Portenschlagiana) = istriaca
pubescens Schim. 183 (32 b)
pulchella Salisb. = Specul. Spec.
pulla L. 187 (*nota*)
pulla Parol, Poll. = Morettiana
pumila Schmidt 178 (18 c)
pumila Ten. (persicæfol.) = prec.
punctata Wallr. (*patula*) 178 (16 e)
pusilla DC. f., Rchb. (*glomer.*) 176 (11 e)
pusilla Gaud. (barbata) = Firmiana
pusilla Haenk. = Bellardi
pygmæa Bég. (*cæspitosa*) 183 (31 c)
pygmæa Lam. hb., DC. = Borrago laxiflora
pyramidalis Gilib. = bononiensis
pyramidalis L. 180 (24)
pyramidalis Terr. N. = Trachelium
pyramidata Goir. (Trachel.) = paniculata Peterm.
pyrenaica Ten. (glomer.) = farinosa
racemosa Krasan (linifol.) = pseudo-carnica
racemosa Zersi (*Trachel.*) A 180 (37 for.)
Raineri Perpenti 180 (23)
ramosa DC. f. (*spicata*) 177 (14 b)
ramosissima Chenevard (barbata) = elatior
ramosissima DC. f. (*bononien.*) 85 (α b)
ramosissima S. et S. 178 (17)
rapunculoides L. 186 (36)
Rapunculus L. 177 (15)
Re Colla 187 (*nota*)
reflexa DC. f. (*rhomboid.*) 186 (34 α c)
reflexa Hausm. (*rotundif.*) 184 (33 α c)
rhomboidalis L. 185 (34)
rhomboidea L., W. etc. = prec.
rigida Gilib. = rapunculoides
Rosani Ten. = versicolor
rotundifolia All. = rhomboidal.
rotundifolia Auct. = Bellardi, Scheuchzeri
rotundifolia L. 184 (33), A 180
rupestris Risso = macrorrhiza
sabatia DNtrs. 185 (33 η)
salviifolia Wallr. (glomer.) = farinosa
sardoa Tanf. (macrorrhiza) = Forsythii
scabriuscula M. et K. (*rotundif.*) 184 (33 α d)
Scheuchzeri Vill. 185 (33 θ)
sibirica L. 174 (6)
CAMPANULA III 172 (846)
simplex Bég. (*obliquif.*) 186 (35 β b)
simplex DC. 186 (35 α a)
sparsiflora DC. (glomer.) = aggregata
spathulata DC. f. (*alpestris*) 173 (3 b)
spathulata W. et K. = divergens
speciosa Horn., Rchb. 176 (11 b)
Speculum L. = Specularia Specul.
spicata L. 177 (14), A 180
Staubii Uechtr. = pyramidalis 187 (nota)
stenocodon Boiss. et Reut. 185 (33 κ), A 180
stenosiphon Rchb. (non Boiss. et Heldr.) = stenocodon
suaveolens Gilib., W. = Adenophora liliifolia
subalpina Delp. et Gras = glaberrima
subramulosa Jord., Favre = Bellardi
subuniflora DC. f. (barbata) = Firmiana
Tenorii Moretti = versicolor
tenuiflora Ten. = lingulata
tenuifolia Hoffm. 184 (33 β)
tenuifolia W. et K. = Hedræanthus tenuif.
Thaliana Rchb. = simplex DC.
Thomasii Ten ex DC. f. = versicolor
thyrsoidea L., Jacq. = seg.
thyrsoides L. 177 (13)
Tommasiniana Koch, Reut. 179 (21)
trachelioides M. B. = rapunculoides
Trachelium L. 187 (37), A 180
trichocalycina Presl, Guss. = Phyteuma — Minæ
trichocal. Ten. = Phyteuma trichocal.
trilocularis Turra = alpestris
undulata Mœnch = sibirica
uniflora DC. (barbata) = Firmiana
uniflora Goir. (*glomerata*) A 180 (11 for.)
uniflora Schult (non L.) = cæspitosa
uniflora Vill. = valdensis
urticifolia All. = latifolia
urticifol. Gilib. = bononiensis
urticifolia Schm. 187 (37 c)
urticifol. Turra = rapunculoides
urticifolia W. = dasycarpa
valdensis All. 185 (33 θ b)
velutina DC. (*rotundif.*) 184 (33 α f)
verruculosa Lk. et Hoffg. 177 (15 α c)
versicolor S. et S. 181 (25)
verticillata Guss. = versicolor
vesula All. = persicæfolia
villosa M. et K. (*rhomboid.*) 186 (34 α d)
virgata Labill., Ten. = Phyteuma limonifolium
CAMPANULA III 172 (846)
viridis Rchb. (glomer.) = aggregata
Waldsteiniana Auct. al. (non R. et S.) = Tommasiniana
Zoysii Wulf. 179 (20)
CAMPDERIA = Kundmannia
sicula Lag. = K. sicula
CAMPELIA = Deschampsia
cæspitosa Lk. = D. cæspit.
media Lk. = D. media
CAMPHORATA = Camphorosma
hirsuta Mœnch = C. monspeliacum
monspeliensium Crantz = C. monspeliacum
CAMPHOROSMA I 315 (294)
canescens Moq. (*monsp.*) A 65 (β)
hirsutum Stokes = monspel.
monspeliacum L. 315, 609, A 65
monspeliacum Pollich = Kochia arenaria
monspeliensis Murr. = monspeliacum
Pteranthus L. = Pteranthus dichotomus
siculum Jan hb. = vigintimill.
siculum Moq. (monsp.) = prec.
vigintimilleis Tin. A 65 (γ)
villosum Guss. (monsp.) = canescens
CAMPYDORUM = Polygonatum
verticillatum Salisb. = P. vertic.
CANIDIA = Allium
magica Salisb. = A. magicum
CANNA I 229 (224)
indica L. 230
CANNABIS I 277 (265)
chinensis Del. = sativa
fœtens Gilib. = sativa
indica Lam. = sativa
Lupulus Scop. = Humulus Lup.
macrosperma Stokes = sativa
sativa L. 277
CANNACORUS = Canna
ovatus Mœnch = C. indica
indicus Medic. = C. indica
CAPNOIDES = Corydalis
albida Bernh. = C. lutea
cava Mœnch = C. cava
lutea Gærtn. = C. lutea
minor Schum. = C. intermedia
rigidula Bernh. = C. ochroleuca
solida Mœnch = C. solida
CAPNOPHYLLUM = Krubera
dichotomum Lag. = K. peregrina
peregrinum Lge. = K. peregr.
CAPPARIS I 412 (358)
canescens Coss. (spinosa) = sicula
Fontanesii Presl (non DC.) = sicula
herbacea Guss. (non W.) = sicula
inermis Pers. (spinosa) = rupestris
orientalis Duham. = rupestris
ovata Guss. (non Desf.) = sicula

Digitized by Google

CAPPARIS I 412 (858)
ovata Koch = spinosa (α)
peduncularis Presl = rupestris
rupestris S. et S. 413 (β)
sativa Pers. = spinosa
sicula Duham. 413 (γ)
spinosa L. 413
spinosa β L. = sicula
vulgaris Maratti = rupestris
CAPRAEA = Salix
aurita Opiz = S. aurita
cinerea Opiz = S. ciner.
grandifolia Opiz = S. grand.
vulgaris Opiz = S. caprea
CAPRIFICUS = Ficus
insectifera Gasp. = F. Caprificus
leucocarpa Gasp. = F. albescens
oblongata Gasp. = F. neapolitana
pedunculata Gasp. = F. pedunc.
rugosa Gasp. = F. rug.
sphærocarpa Gasp. = F. globosa
CAPRIFOLIUM = Lonicera
alpigenum Gærtn. = L. alpigena
alpinum Lam. = prec.
cæruleum Lam. = L. cærulea
distinctum Mœnch = L. Periclymenum
dumetorum Lam. = L. Xylosteum
etruscum R. et S. = L. etrusca
hortense Lam. = L. Caprifol.
implexum R. et S. = L. impl.
italicum R. et S. = L. Caprifol.
perfoliatum Rœhl. = L. Caprifol.
Periclymenum Delarb. = L. Periclym.
rotundifolium Mœnch = L. Caprifolium
silvaticum Lam. = prec.
vulgare Medic. = prec.
Xylosteum Gærtn. = L. Xylosteum
CAPSELLA I 468 (406)
acaulis Ugol. (*Burs.-past.*) A 101 (α for.)
agrestis Jord. = stenocarpa
alpina Ces. P. et G. = Hutchinsia alp.
alpina Goir. (Bursa - past.) = seg.
alpina Paol. (*rubella*) 469 (β b)
apetala Opiz 469 (α b), A 99
apetala Rchb. (Burs.-past.) = prec.
bifida Crép. (*Burs.-past.*) A 100 (α l)
Bursa-pastoris Mœnch 469, A 99
camelliniformis Murr. (*Burs.-past.*) A 100 (α i)
canescens Martr.-Don. (*Burs.-past.*) 469 (α d), A 100
coronopifolia DC. (*Burs.-past.*) 469, A 100 (α g)
cuneata Rouy et Fouc. (*rubella*) A 100 (β for.)
decandra Dœll (Burs.-past.) = apetala
CAPSELLA I 468 (406)
drabiformis Murr. (*Burs.-past.*) A 100 (α h)
elliptica C. A. Mey. = Hutchinsia procumbens
Gelmii Murr. A 100 (α j)
gracilis Gren. A 100 (γ)
grandiflora Boiss. 469, A 101 (δ)
humilior Hagenb. (Burs.-past.) = nana
humilis Rouy et Fouc. = alpina
integrifolia DC. (Burs.-past.) 469 (α e) = Schrankii, cfr. A 100
integrifolia Caruel (elliptica) = Hutchinsia pauciflora
macrocarpa Heldr., Albert (non Hobk.) (Burs.-past.) = major
major Bég. = seg.
major Hagenb. (*Burs.-past.*) A 100 (α m)
minor DC. (Burs.-past.) = nana
nana Baumg. (*Burs.-past.*) A 99 (α c)
parviflora Caruel (Burs.-past.) = rubella
parvula G. Beck (Burs.-past.) = nana
pauciflora Koch = Hutchinsia pauc.
petræa Fr. ex Koch = Hutchinsia petr.
pinnatifida Schlecht. (Burs.-past.) = coronopif.
præcox Jord. = Bursa-past. (α)
procumbens Fr. = Hutchinsia proc.
pygmæa Bænitz (Burs.-past.) = alpina
rubella Reut. 469 (β), A 100
rubella × Bursa-past. Rouy et Fouc. = gracilis
rubescens Personnat = rubella
ruderalis Jord. A 101 (α for.)
runcinata Kit. (Burs.-past.) = sinuata
sabulosa Jord. = bifida
Schrankii Fiori (*Burs.-past.*) A 100 (α e)
sicula Jord. = Hutchinsia procumbens
simplicifolia Pers. (Burs.-past.) = Schrankii
sinuata Schlecht. (*Burs.-past.*) A 100 (α f)
stenocarpa Crép. (*Burs.-past.*) A 100 (α n)
stenocarpa Timb. = prec.
stylosa Vis. (*Burs.-past.*) A 100 (α k)
subacaulis Rouy et Fouc. (Burs.-past.) 469 (α c) = nana, cfr. A 99
triangula G. Beck (Burs.-past.) = Bursa-past. (α)
virgata Jord. = Bursa-past. (α)
CAPSICUM II 402 (744)
abbreviatum Fing. (*ann.*) 402 (α f)
acuminatum Fing. (*ann.*) 402 (α c)
annuum L. 402
CAPSICUM II 402 (744)
brevipes Fing. (*longum*) 403 (ε c)
cerasiforme W. 402 (γ)
ceratoides Fing. (*longum*) 403 (ε a)
cordiforme Mill. 403 (ζ)
globosum Fing. (*cordifor.*) 403 (ζ e)
grossum W. 402 (δ)
incrassatum Fing. (*longum*) 403 (ε b)
longicorne Dun. (*pyramid.*) 402 (β b)
longum DC. 403 (ε)
luteum Fing. (*longum*) 403 (ε d)
majus Fing. (*cordifor.*) 403 (ζ c)
oblongum Fing. (*ann.*) 402 (α a)
olivæforme Fing. (*ann.*) 402 (α g)
olivæforme Fing. (*cordifor.*) 403 (ζ d)
ovoideum Fing. (*ann.*) 402 (α e)
pyramidale Mill. 402 (β)
rugosum Fing. (*ann.*) 402 (α b)
subangulatum Fing. (*ann.*) 402 (α d)
subangulosum Fing. (*cordifor.*) 403 (ζ b)
subculcatum Fing. (*cordifor.*) 403 (ζ a)
violaceum Fing. (*longum*) 403 (ε e)
CARALLUMA = Stapelia
europæa N. E. Br. = S. europæa
CARAMANICA = Taraxacum
taraxacoides Tin. = T. Caramanicæ
CARBENIA = Cnicus
benedicta Adans. = Cn. benedictus
CARDAMINE I 437 (370)
æquiloba C. Hartm. (*amara*) A 92 (5 α d)
alpina W. A 92 (2 β)
alpina × resedifolia Brügger = gelida
amara L. 438 (5), A 92, 212
amara Lam. = pratensis
apetala Gilib. A 94 (10 b)
asarifolia L. 437 (1), A 92
bellidifolia All. = alpina
bellidifolia L. 437 (2), A 92
Bergeriana Andrz. = glauca
bicolor Presl = umbrosa
Bocconi Viv. = Plumieri
brachycarpa Opiz = impatiens
brachystylis Schultz (*græca*) A 95 (13 c)
brutia Huter P. et R. (*Chelidon.*) A 95 (14 b)
bulbifera Crantz, R. Br. = Dentaria bulb.
calabrica Arc. 438, A 94 (6 bis β b)
calabrica DC., Ten. (latifol.) = seg.
calabrica Paol. p. p., Fiori (*amara*) A 93 (5 γ)
calabrica Paol. (amara) 438 (5 β) = calabr., grandifol. et macrophylla, cfr. A 93

Digitized by Google

CARDAMINE I 437 (370)
calabrica Schulz (raphanifol.) = calabr. et grandifol.
Chelidonia L. 440 (14), A 95
corsica Nym. = eriocarpa
corsica Sieb. = Plumieri
corydaloides Guss ex Spr. = glauca
cretica Nym. = eriocarpa
croatica Schott = glauca
Cupanii Nym. A 95 (13 d)
dacica Heuffel (resed.) = gelida
dalmatica Vis. ex Nym. = maritima
dentata Guss., Ten. = flex. v. glaberrima
diversifolia DC. (*asarifol.*) 437 (1 b)
Drymeia Schur = flexuosa
dubia Nicotra = flex. v. glaberrima
duraniensis Revel = flexuosa
enneaphyllos Crantz, R. Br. = Dentaria enn.
eriocarpa Fritsch (*græca*) 440 (13 b), A 95
erubescens Peterm. (*amara*) A 93 (5 α h)
fagetina Schur = umbrosa
Ferrarii Burnat = diversifolia
flexuosa With. A 93, 212 (6 bis)
fontana Lam. = Nasturt. offic.
fragilis Degl. = pratensis
gelida Schott A 95 (11 β c)
glaberrima Fiori (*flexuosa*) A 94, 212 (6 bis β)
glaberrima Sauter (*amara*) A 92 (5 α a)
glaberrima N. Terr. (silvat.) = flex. β glaberr.
glabra Schulz (digit.) = Dentaria — glabra
glauca Spr. 439 (9), A 94
glaucescens Reich. = Plumieri
græca L. 440 (13), A 95
grandifolia Bert. (*amara*) A 93, 212 (5 β)
grandiflora Schulz A 94 (9 c)
grandiflora Schulz (bulbif.) = Dentaria — grandifl.
granulosa All. 438 (6 α b)
hamulosa Bert. 439 (11 β) = integrifol., cfr. A 95
hastulata Bert. ex Steud. = integrifolia
hastulata Sm. = Arabis petræa
Hayneana Welw. 438 (6 β), A 93
hederacea DC. = Plumieri
hederacea DC. (*Plumieri*) 437 (8 b)
herbacea Ugol. (hamulosa) = integrifol.
herbivaga Jord. = pratensis
heterophylla Host = alpina et resedifolia
hirsuta L. 439 (7), A 94
hirsuta Schulz (*asarifol.*) A 92 (1 d)
hirta Wimm. et Grab. (amara) = umbrosa
homophylla Schur (amara) = æquiloba
CARDAMINE I 437 (370)
humilis Peterm. (*impatiens*) A 95 (10 d)
impatiens L. 439 (10), A 94
insularis Rouy et Fouc. (*resedifol.*) A 95 (11 β b)
integrifolia DC. (*resedifol.*) A 95 (11 β)
integrifolia Gilib. = pratensis
intermedia Horn. = hirsuta
investita Schur (amara) = minor
kopaonikensis Pancic A 94 (9 d)
lactea Schulz (digit.) = Dentaria dig. d. lactea
lactea Wirtgen (bulbif.) = Dentaria bulb. e. lactea
lasiocarpa Boiss. (græca) = eriocarpa
latifolia Caruel (non Vahl) = calabrica
latifolia Lej. = pilosa Beck
laurentina Andrz. = pratensis
laxa Rouy et Fouc. (hirsuta) = umbrosa Andrz.
Libertiana Lej. = umbrosa
lobata Mœnch = græca
macrophylla Wend. (*amara*) A 93 (5 α g)
major Ten. (hirsuta) = flexuosa
maritima Portenschl. 439, A 95
Matthioli Moretti = Hayneana
maxima Fischer (*hirsuta*) A 94 (7 d)
melanthera Stokes = amara
micrantha Caruel (pratens.) = calabrica Arc.
micrantha Spenn. = hirsuta
microphylla Presl = maritima
microphylla Schulz (*asarifol.*) A 92 (1 f)
minor Lge. (*amara*) A 93 (5 α f)
minor Ten. (hirsuta B) = hirsuta (a)
montana Schur (amara) = umbrosa
multicaulis Hpe. 438 (7 a)
muscosa Vahl = flexuosa
nana Schulz (*resedifol.*) A 95 (11 α c)
nasturtiana Thuill. = amara
nemorosa Wender. = pratensis
nivalis Schur (non Gillies) = gelida
obtusifolia Knaf (*impatiens*) A 95 (10 c)
parviflora All. = hirsuta
parviflora Fiori (amara) = calabrica Arc.
parviflora Lam. = amara
parviflora L. 439 (8), A 94
parviflora Schulz (*asarifol.*) A 92 (1 e)
parviflora Vill., Mœnch = flexuosa
pentaphyllos R. Br. = Dentaria pent.
petiolaris DC. = græca
petiolaris DC. (*bellidifol.*) A 92 (2 α)
petiolulata Schulz (*hirsuta*) A 94 (7 e)
petræa L. = Arabis petr.
CARDAMINE I 437 (370)
pilosa Beck (*pratensis*) A 93 (6 α c)
pilosa Schulz (*asarifol.*) A 92 (1 c)
pilosa Schulz (*hirsuta*) A 94 (7 b)
pinnata R. Br. = Dentaria pinn.
platyphylla Rouy et Fouc. (*resedifol.*) A 95 (11 α b)
Plumieri Vill. 437 (8)
polyphylla Schulz = Dentaria pol.
præcox Pall. = hirsuta
pratensis L. 438 (6), A 93
pubescens Lej. (amara) = umbrosa
pumila Hausskn. (*Hayneana*) A 93 (6 β b)
pumila Schulz (*glauca*) A 94 (9 b)
pusilla Schur A 94 (6 bis α d)
pygmæa Schulz (*alpina*) A 92 (2 β b)
resedifolia L. 439 (11), A 95
rigida Rouy et Fouc. (silvat.) = seg.
rigida Schulz (*flexuosa*) A 93 (6 bis α c)
saxatilis Salisb. = impatiens
silvatica Hartm. = umbrosa
silvatica Lk. 438 (7 b) = flexuosa, cfr. A 93
silvestris Fr. (hirsuta) = flexuosa
simensis Hochst. = hirsuta
Skorpili Velen. = Hayneana
spathulata Michx. 440 (nota)
stolonifera Scop. = Arabis stolon.
stricta Hayne = Hayneana
subglabra Schur (*amara*) A 92 (5 α b)
subintegrifolia Caruel (resedifol.) = integrifol.
subtriloba DC. (*alpina*) A 92 (2 β c)
tenella Clarke = hirsuta
tetrandra Heget. = hirsuta
thalictroides All. = Plumieri
thalictroides Presl = glauca
trifolia L. 438 (4)
trifolia Schulz (amara) = trisecta
trifolia Whlnb. = trisecta
trifoliolata Baumg. = trifolia
triphylla Whlnb. (amara) = trisecta
trisecta DC. (*amara*) A 93 (5 α e)
udicola Jord. = Hayneana
uliginosa Guss. (non M. B.) = flex. v. glaberrima
uliginosa Ten., N. Terr. = grandifol.
umbraticola Schur (amara) = subglabra
umbrosa Andrz. A 94 (7 f)
umbrosa Chiov. (hirsuta) = petiolulata
umbrosa Gr. et Godr. (silvat.) = flex. b. umbr.
umbrosa Lej. 438, A 92 (5 α c)
umbrosa Schulz (*flexuosa*) A 93 (6 bis α b)

Digitized by Google

CARDAMINE I 437 (870)
umbrosa Schur = flexuosa
unicaulis Schulz (*hirsuta*) A 94 (7 c)
Wiedemanniana Boiss. = amara
CARDAMINUM = Nasturtium
Nasturtium Mœnch = N. offic.
CARDARIA = Lepidium
brachypetala Opiz = L. Draba
cochlearia Spach = L. Draba
Draba Desv. = L. Draba
latifolia Spach = L. latif.
CARDIACA = Leonurus
arvensis Lam. = Stachys arven.
crispa Mœnch = L. Cardiaca
Marrubiastrum Medic = L. Marr.
pninquelobata Gilib. = prec.
silvatica Lam. = Lamium Galeobdolon
Stachys Medic. = L. Cardiaca
trilobata Lam = L. Cardiaca
vulgaris Mœnch = L. Cardiaca
CARDIOLEPIS = Lepidium
dentata Wallr. = L. Draba
CARDOPATIUM III 308 (903)
apulum Spach = corymbosum
Billardieri Spach = corymbos.
corymbosum Pers. 308
orientale Spach = corymbos.
CARDUNCELLUS III 351 (917)
acaulis Lojac. (cœrul.) = Carthamus — acaul.
acaulis Presl = prec.?
cœruleus DC. = Carthamus cœrul.
gracilis Lojac. = Carthamus grac.
incisus DC. (cœrul.) = Carthamus tingitanus
integer Lojac. (cœrul.) = Carthamus — integer
lanatus Moris = Carthamus lanat.
monspeliensium All. 351 (1)
multifidus Lojac. = Carthamus multif.
pinnatus DC. 351 (2)
tingitanus DC. = Carthamus tingit.
vulgaris Loud. = monspeliens.
CARDUUS III 351 (918)
acanthifolius DC. (tenuifl.) = tenuiflor.
acanthifolius Lam. = Cirs. oleraceum
Acanthium Baill. = Onopordon Acanth.
acanthoides All. p. p. = litigiosus Nocc. et Balb.
acanthoides L. 358 (9), A 189
acanthoides Lois. = hamulosus
acanth. × *deflorat. G. Beck* 355
Acarna L. = Cirs. Acarna
acaulis L. = Cirs. acaule
acaulis Opiz (*nutans*) 352 (1 α d)
acicularis Bert. 361 (17), A 190
afer Jacq. = Cirs. afrum
affinis Guss. 356 (5), A 189
affinis c N. Terr. = pollinensis
aff. × chrysacanthus Groves = longispino × chrysac.
CARDUUS III 351 (918)
aff. × *chrysacanthus Levier* 356
aggregatus Moris (*nutans*) 352 (1 γ b)
agrestis A. Kern. = multiform. b. litigiosus
agrestis Presl = corymbosus
albidus Lam. = pycnocephalus?
albiflorus Fiori (*leucograph.*) 361 (18 b)
albiflorus Goir. (*carlinæfol.*) A 189 (8 ι b)
alpestris DC. (*deflor.*) 354 (8 s)
alpestris Ten. = Bauhini
alpestris W. et K. = prec.?
altissimus Gilib. (non L.) = Cirs. palustre
ambiguus Pers. = Cirs. heterophyll.
anglicus Lam. = Cirs. anglicum
apenninus Jan = nutans
arabicus Guss. et Auct. it. (non Jacq.) = brevisquamus
arctioides Vill. = Personata
arctioides W. = Carduelis
arenarius DC. = litigiosus Nocc. et Balb.
arenarius Desf. 382 (nota)
Argemone Schleich. (*non Pourr.*) 354 (8 δ c)
argyroa Biv. 360 (15)
arvensis Robs., Sm. = Cirs. arvense
Ausserdorferi Huter = nutanti deflor.
autareticus Vill. = Cirs. heter. × spinosiss.
australis L. f. = pycnocephalus
Bambergeri Hausm. = Personata × rhæticus
Barrelieri Bert. 354 (8 η b), A 189
Bauhini Ten. (*deflor.*) 355 (8 θ)
benedictus Steud. = Cnicus bened.
Boujarti Savi = Cirs. Lobelii
Bourgæanus Boiss. et Reut. = Reuterianus
brevisquamus Fiori (*pycnoceph.*) 359 (18 β)
brevisquamus Somm. = prec.
Brunneri Dœll. = nutanti × deflor.
brutius Huter P. et R. 356 (5 γ)
bulbosus Lam. = Cirs. tuberosum
candicans W. et K. 357 (7)
Candollei DC. = litigiosus Nocc. et Balb.
canus L. = Cirs. canum
Carduelis Gren. 356 (4)
carlinæfolius Gaud., Koch = rhæticus
carlinæfolius Lam. 355 (8 ι), A 189
carlinæfolius Ten. = semiglaber
carlinæfolius β Arc. = chrysac. × carlinæfol.
carlinoides Ambr. (deflor.) = rhæticus
carlinoides Ten. (non Gouan) = chrysacanth.
CARDUUS III 351 (918)
carniolicus Pers. = Cirs. carniol.
Casabonæ L. = Cirsium Casab.
caulescens Pers. (acaul.) = Cirs. dubium
caulescens Steud. = prec.
Cavillieri Fiori (*leucographus*) A 217 (18 c)
centauroides Hpe. = Carduelis
cephalanthus Viv. 359 (12)
cerinthifolius Vill. = Serratula nudicaulis
cerinthoides W. = prec.
chrysacanthus Lojac. (*macroceph.*) A 189 (1 β for.)
chrysacanthus Rchb. f. 352 (nota) = longispinus?
chrysacanthus Ten. 358 (2)
chrysac. × *carlinæfol. Fiori* 355.
cichoraceus Cyr. = Serratula — Cyrilli
ciliatus Neilr. (deflor.) = glaucus
cirsioides DC. (deflor.) = medius?
cirsioides Vill. = defloratus
collinus W. et K. 357 (7 β)
comosus Lam. = Cirs. spinosissim.
confertus Moris 360 (15 γ)
congestus Guss. 359 (12 β)
corymbosus Ten. 361 (16)
crassifolius Horn. = glaucus
crassifolius W. = summanus
creticus Lam. = Cirs. creticum
crispus L. 357 (8)
Decandollei Moretti = litigiosus Nocc. et Balb.
defloratus L. 354 (8), A 189
digeneus G. Beck = Personata × deflor.
divaricatus Gilib. = Cirs. lanceolatum
dubius Balb. = acanthoides
echinatus Desf. = Cirs. echin.
elegans Salisb. = Cirs. Casabonæ
elongatus DC. (tenuiflor.) = seg.
elongatus Fiori (*pycnoceph.*) 359 (18 α b)
eriophorus L. = Cirs. erioph.
Erisithales Jacq. = Cirs. Eris.
Erisithales Vill. = Cirs. tricephalodes
fasciculiflorus Viv. 359 (11)
fastigiatus Moris 360 (15 β)
ferox Vill., Lam. = Cirs. ferox
flore-albo Zersi (*nutans*) 352 (1 α e)
Galactites Bory et Chaub. = Lupsia Galact.
Galactites Lam. = pycnocephalus
giganteus Desf. = Cirs. scabrum
gigas Ucria = Cirs. gigas
glaberrimus Lojac. A 190
glaucus Baumg. 354 (8 β)
glaucus Cav. (non Ledeb.) = = Serratula nudicaulis

Digitized by Google

CARDUUS III 351 (918)
gnaphaloides Cyr. = Cirsium gnaphal.
Gussoneanus Lojac. (*pycnoceph.*) A 189 (13 α b)
hamulosus Ehrh. 361 (*nota*)
hamulosus Ten. = macrocephalus
helenioides Huds. (non L.) = Cirs. heteroph. f. indivisum
heterophyllus L. = Cirs. heteroph.
Hippolyti Bory et Chaub. = Cirs. — Hippol.
humilis Desf. = Jurinea humil.
illyricus Baill. = Onopordon illyr.
integrifolius Celak. (crispus) = intermedius
intermedius Lojac. = seg.
intermedius Tin. (*pycnoceph.*) A 189 (13 var.)
intermedius Wimm. et Grab. (*crispus*) 357 (8 α b)
intricatus Rchb. f. 358 (10 β)
italicus Savi = Cirs. ital.
laciniatus Lam. = Cirs. palustre
lanceolatus L. = Cirs. lanc.
latilobus G. Beck (*nutans*) 352 (1 α b)
latisquamus Belli (*nutans*) 352 (1 β b)
laxus G. Beck = acanthoides × deflor.
leptophyllus Gaud. 355 (3 η c)
leucographus L. 361 (18), A 217
leucographus B Ten. = leuc. b. albiflorus
litigiosus Gr. et Godr. (*multiform.*) 358 (8 β b)
litigiosus Moris = sardous
litigiosus Nocc. et Balb. 358 (10), A 189
litoralis Borb. 358 (1 ζ)
longilepis Lojac. (*macroceph.*) A 189 (1 β for.)
longispinus Arc. = seg.
longispinus Moris (*nutans*) 352 (1 γ)
longispin. × *chrysacanth. Fiori* 358
lopadusanus Arc. (pycnoceph.) = marmoratus
lopadusanus Lojac. = prec.
lucidus Mœnch = pycnocephalus
lycopifolius Vill. = Serratula lycop.
macrocephalus Desf. 352 (1 β), A 189
Mariæ Crantz = seg.
Marianus L. = Silybum Mar.
marmoratus Boiss. et Heldr. 360 (14)
medius Gouan 354 (3 ζ)
medius Ten. 354 (*nota*)
membranaceus Lojac. A 190
Michaletii G. Beck = Personata × deflor.
microcephalus Ten. = collinus
minor Goir. (*nutans*) A 189 (1 α for.)

CARDUUS III 351 (918)
mollis Gouan. = Jurinea humilis (α)
mollis L. = Jurinea mollis
mollis Vill. = Cirs. acauli × heteroph.
monspessulanus L. = Cirs. monsp.
montanus Pers. = Cirs. tricephalodes
montosus Pollini = rhæticus et carlinæfol.
Morisii Balb. = fasciculiflorus
moschatus Guss. = seg.
moschatus Ten. (mollis) = Jurinea mosch.
multiformis Gaud. 358 (8 β)
myriacanthus Boiss. (non Salzm.) = Reuterianus
neglectus Ten. = acicularis
nicœensis Rchb. f. (*nigrescens*) 353 (1 δ b)
nigrescens Vill. 353 (1 δ)
nitidus W. et K. = Serratula lycopifol.
nudicaulis Pers. = Serratula nud.
nutans All. p. p. = nigrescens
nutans Guss. = macrocephalus
nutans L. 352 (1), A 189
nutans β Bert. = carlinæfolius
nutanti × *acanthoides Koch* 353
nutanti × *deflorat. Dœll.* 355
nutanti × *pycnoceph. C. Massal.* 353, A 189
obtusilobus Fiori (*Bauhini*) 355 (3 θ b)
oleraceus Vill. = Cirs. olerac.
orthocephalus Wallr. = nutanti × acanthoides
palustris L. = Cirs. palustre
palustris Savi = Cirs. — brachycentrum
pannonicus L. f. = Cirs. pann.
panormitanus Tod. = brevisquamus
peculiaris G. Beck = Personata × deflor.
pedemontanus Pers. = Cirs. tuberos.
peregrinus Ten. (an Retz.?) = brevisquamus
Personata Jacq. 356 (6)
Personata × *defloratus Gren.* 357, A 189
Personata × *rhæticus Huter* 357, A 217
perspinosus Fiori (*nutans*) 352 (1 α c)
platylepis Saut. 353 (1 ε)
pollinensis Fiori (*affinis*) 356 (5 α b), A 189
pollinensis N. Terr. (*nutans*) 352 (1 γ c)
polyacanthos Lam. = Cirs. Casabonæ
polyanthemus L. = Cirs. polyanth.
polyanthemus Schleich. = multiform.
polycephalus Lojac. (*macroceph.*) A 189 (1 β for.)

CARDUUS III 351 (918)
polymorphus Lap. = Cirs. heterophyllum
pratensis Huds. (non Lam.) = Cirs. anglicum
pseudo-acanthoides Ambrosi (crispus) = multiformis
pseudo-syriacus Lojac. = marmoratus
ptarmicæfolius Mill. = Cirs. stellat.
pycnocephalus Jacq. = pycnoceph. (α)
pycnocephalus L. 359 (13), A 189
pygmæus Jacq. = Saussurea pygmæa
radians Biasol. (nutans) = chrysacanth.
radiatus W. et K. = Serratula rad.
ramosissimus Lojac. (argyroa) = argyroa (α)
Reuterianus Boiss. A 190
rhæticus Dalla Torre = seg.
rhæticus DC. (*deflor*) 355 (3 η), A 189
rivularis Jacq. = Cirs. rivulare
Rosenii Vill. = Cirs. dubium
rugulosus Guss. A 190
samniticus Ten. = Cirs. italicum
Sanctæ-Balmæ Lois. = litigiosus Nocc. et Balb.
sardous Moris 360 (13 δ)
scaber Poir. = Cirs. scabrum
Scolymus Baill. = Cynara Scol.
semiglaber Fiori (*chrysacanth.*) 353 (2 β)
serratuloides Jacq. (non L.) = Cirs. pannonicum
simplicifolius Sang. 357 (6 β)
sinuatus Gilib. = acanthoides
spinigerus Jord. = hamulosus
spinosior Guss. (*corymb.*) 360 (16 b)
spinosior Presl (agrestis) = prec.
spinosissimus Gerbi = Cirs. lanceolat.
spinosissimus Vill. = Cirs. spinosiss.
spinulosus Bert. = nigrescens, platylepis et medius?
squarrosus Rchb. f. (*acanthoid.*) 358 (9 b)
stellatus L. = Cirsium stellat.
strictus Steud. = Cirs. strictum
styriacus G. Beck = Personata × deflor.
subdecurrens Bert. 354 (3 γ)
summanus Pollini 354 (3 α)
syriacus L. = Cirs. syriac.
taygeteus Boiss. = longispinus
tenuiflorus Curt. 360 (13 γ), A 189
tenuifolius Gaud. 354 (3 β b)
tinctorius Falk = Carthamus tinct.
tinctorius Scop. = Serratula tinct.
tinctorius B All. = Serratula — prealta
tomentosus Fiori (*argyroa*) 360 (15 α b)

Digitized by Google

CARDUUS III 351 (918)
tomentosus Gilib. = Cirs. eriophor.
transalpinus Suter 354 (3 δ)
tricephalodes Lam. = Cirs. triceph.
tridentinus Evers = transalpinus
tuberosus Jacq. = Cirs. canum
tuberosus β L. = Cirs. tuberosum
tuberosus Vill. = prec.
uncinatus Ces. P. et G., Arc. = collinus
uncinatus M. B. 361 (*nota*)
versicolor Salisb. = Silybum Marianum
viridis A. Kern. 354 (3 δ b)
vulgaris Savi = Cirs. lanceolat.
vulturius Fiori (*affinis*) 356 (5 β)
CAREX I 125 (142)
acroandra Schur = repens
acuminata Caldesi = cuspidata
acuminata W. 137 (52 α e)
acuta All. = riparia
acuta Curt. = acutiformis
acuta L. 132 (28 δ), A 36
acuta Sut. = glauca
acutiformis Ehrh. 142 (70 β), A 38
adulterina Chenev. = Œderi × punctata
æmulans Drejer = acutiformis
æthostachya Schk. = nigra
agastachys Ehrh. in L. f. = pendula
alba Bast. = pilulifera
alba Scop. 134 (33)
alopecurus Lap. = Eriophorum latifolium
alpestris All. = Halleriana
alpestris Gaud. = sempervirens
alpestris Lam. = nitida
alpicola Beck (nigra) = stolonifera
alpicola Schur (ericetor.) = approximata
alpicola Whlnb. (canesc.) = brunnescens
alpina Fiori (Goodenowii) 132 (28 ε b) = melæna Wimm., cfr. A 36
alpina Gaud. (cæspitosa) = stolonifera
alpina Gremli (ornithopoda) = subnivalis
alpina Hpe. = ferruginea
alpina Kuek. (ornithopoda) = ornith. b. elongata
alpina Schrank = sempervirens
alpina Sw. = Vahlii
ampullacea Good. = rostrata
androgyna Balb. = bicolor
androgyna Dœll (Davalliana) = Sieberiana
angustifolia Asch. et Græbn. (*caryophyll.*) A 37 (38 β b)
angustifolia Celak. (acuta) = Goodenowii
anomala Janka = caryophyllea
anomala Pall. = Halleriana
approximata All. A 37 (37 β)
approximata Hpe. = lagopina
CAREX I 125 (142)
approximata Schum. = paradoxa
aquatilis Ten. (non Whlnb.) = microcarpa
Ardoiniana DNtrs. = olbiensis
arenaria L. 128 (15), A 35
arenaria Vis. et Sacc. = divisa
aren. × Schreberi Richter = ligerica
argentea Chaix in Vill. = alba
argyroglochin Horn. 130 (21 b)
aristata Clairv. (non R. Br.) = microglochin
aristata Honck. = præcox
aspera W. = glauca
aterrima Hpe. 133 (31 α b)
atra Blytt (vulgar.) = melæna
atrata L. 133 (31), A 36
atrata × frigida A 36 (oss.)
atrofusca Christ (*leporina*) A 36 (21 e)
atrofusca Schk. A 205 (50)
austriaca Schk. = divisa
axillaris Koch = muricato × remota
badia Pers. = nitida
Balbisii Ten. = extensa
baldensis L. 127 (8)
baldensis Vill. = fœtida
banatica Heuff. = Buekii
basilaris Jord. 134 (35 β) = depressa, cfr. A 37
Bastardiana DC. = pilulifera
Bellardi All. = Kobresia myosuroides
Bertolonii Schk. = divisa
bicolor Bell. in All. 132 (27), A 36
bifurca Schrank = rostrata
biharica Simonk. = echinata × canesc.
binervis Sm. 141 (63 δ)
bipartita Bell. in All. = Kobresia bip.
Bœnninghauseniana Kth. = seg.
Bœnninghausiana Weihe = panicul. × remota
bohemica Schreb. = cyperoides
brachystachys Schrank 138 (56), A 38
bracteata Sut. = mucronata
brevifolia Host. = ferruginea
brevirostra Poir. = nitida
brizoides Huds. = canescens
brizoides L. 130 (20)
brizoidi × remota Asch. 131 (nota)
brunnea Celak. (brizoides) = præcox
brunnescens Pers. (curta) = seg.
brunnescens Poir. 131 (25 β), A 36
Buekii Vimm. 132 (28 γ), A 36
Buxbaumii Whlnb. 132 (29), A 36
cæsia Griseb. = tomentosa
cæspitosa J. Gay = stricta
cæspitosa Good. = Goodenowii
cæspitosa L. 132 (28), A 36
cæspitosa Ten. = frigida
Caflischii Bruegg. = echinata × canesc.
CAREX I 125 (142)
campestris Wimm. (brizoides) = præcox
canaliculata Calmé (*Œderi*) A 38 (66 β c)
canescens Host = paradoxa
canescens L. 131 (25), A 36
canescens Pollich = muricata
canescens × stellulata A 36 = echinata × canesc.
capillaris Leers = silvatica
capillaris L. 136 (44)
capitata Christ (*Pairæi*) A 36 (18 α b subfor.)
capitata L. 126 (4)
capitata Sonder (*leporina*) A 36 (21 d)
caryophyllata Gmel. = montana
caryophyllea Latour A 37 (38)
caryophyll. × ferruginea? Asch. et Græbn. A 37
castanea Mielich. = capillaris?
castanea Murb. (ornithopoda) = orn. b. elongata
caucasica Stev. = atrata
cenisia Balb. = bicolor
Chaberti F. Schultz A 36 (18 β b)
chætophylla Steud. (14 β).
chlorocarpa Farneti (*stricta*) A 36 (28 β b)
chlorocarpa Fiori (*glauca*) A 37 (52 α h)
chlorocarpa R. Kell. (flacca) = prec.
chlorocarpa Wimm. (vulgar.) = chlorostachya
chlorostachya Asch. et Græbn. (*Goodenowii*) A 36 (28 ε c)
chlorostach. Rchb. (vulgar.) = prec.
ciliata W. = ericetorum
cinerea Pollich = canescens
clandestina Good. = humilis
clavæformis Hpe. 137 (52 α b)
collina W. = montana
composita Camperio (*distans*) A 38 (63 α b)
compressa Gaud. = stricta
compressa Kit. in W. = brachystachys
conglobata All. = montana
conglomerata Neilr. (atrata) = nigra
contigua Hpe. = muricata (α)
corsica Degl. in Lois. = microcarpa
corsicana Lk. = punctata
crassa Ehrh., Host = riparia
cristata Clairv. = ferruginea
curta Good. = canescens
curvirostra Hartm. = sparsiflora
curvula All. 128 (13), A 35
curvula Lam. = præcox
cuspidata Bert. = divisa
cuspidata Host A 37 (52 α f)
Custoriana Heer = Sieberiana
cyperoides L. 127 (9)
Czetzii Janka = montana
Davalliana Sm. 126 (1), A 35
decumbens Ehrh. = pilulifera
depauperata Good. = ventricosa
depauperata Horn. = panicea

Digitized by Google

CAREX I 125 (142)
depressa Lk. A 37 (35 β)
diandra Schrank A 35 (16 γ)
digitata L. 133 (32), A 37
digitata β Lam. = ornithopoda
digitato × *ornithopoda Hausskn.* A 37
diluta Janka = distans
dioica L. 126 (2), A 35
dioica L. p. p., Vill. = Davalliana
distachya Desf. 130 (19), A 36
distans L. 140 (63), A 38
disticha Huds. 129 (15 γ), A 35
divaricata St.-Lag. = Œderi
divergens Thuill. = elongata
diversifolia Host = Halleriana
divisa Huds. 128 (14)
divulsa Good. 129 (18 β), A 36
Drejeri O. F. Lang = cæspitosa
Drymeia Ehrh. = silvatica
dubia Gaud. (atrata) = aterrima
Dufftii Hausskn. = digitato × ornithopoda
Dufourii Lap. = Kobresia myosuroides
Duriæi F. Schultz (non Steud.) = Chaberti
echinata Desf. = hispida
echinata Murr. 131 (24), A 36
echinato × *canescens Hausskn.* A 36
Ehrhartiana Hpe. = teretiuscula
elata All. = stricta
elatior Anderss. (*Œderi*) A 38 (66 β b)
elegans W. = limosa
elongata Asch. et Græbn. (*ornithopoda*) A 37 (32 γ b)
elongata Coss. et Germ. (Œderi) = Œd. b. elatior
elongata Leyb. (ornithopodioid.) = prec.
elongata L. 131 (23), A 205
emarcida Sut. = silvatica
emarginata W. = montana
erecta DC. = ferruginea vel sempervirens
ericetorum Pollich 134 (37), A 37
erythrostachys Hpe. 137 (52 α d)
extensa Good. 141 (64). A 38
fallax Heim. (Œderi) = Œd. b. elatior
Ferdinandi-Sauteri Asch. et Græbn. = nitido × caryoph.
ferruginea Schk. = sempervirens
ferruginea Scop. 139 (58), A 38
ferrug. × præcox Krause = caryophyll. × ferrug.
fertilis F. Schultz (biformis) = fulva
fibrosa Schur (polyrrhiza) = umbrosa
filiformis Leers = caryophyllea
filiformis L. hb., Good. et Auct. pl. 142 (72) = lasiocarpa, cfr. A 38
filiformis L. Sp., Thuill. = tomentosa
filiformis Pollich = pilulifera

CAREX I 125 (142)
fimbriata Schk. 139 (58 β)
firma Host 139 (58 γ)
flacca Schreb. = glauca
flava L. 141 (66), A 38
flavescens Baumg. = distans
flavo × *Hornschuchiana F. Schultz* A 38
fœtida All., Vill. 128 (11), A 35
fœtido × *brunnescens Asch. et Græbn.* A 35
fœtido × *lagopina Kneuck.* 128, A 35
fœtido × Persoonii Kneuck. = fœt. × brunnescens
fœtido × *stellulata Kuek.* A 35
foliosa All = flava ?, cæspitosa ?
Fontanesii Poir. = divisa
frigida All. 139 (57)
frigida Vill. = sempervirens
frigida Whlnb. = fuliginosa
fuliginosa A. Br. in Dœll (cæspit.) = melæna
fuliginosa Host = fimbriata
fuliginosa Schk. 139 (57 β)
fulva Good. 140 (63 γ)
furculata Peterm. = muricata (for.)
fusca All. = Buxbaumii
Gebhardi Hpe. = brunnescens
Gebhardi W. in Schk. = elongata (for.)
geniculata Host = frigida
genuensis DC. = glauca
Gesneri Sut. = humilis
glauca Murr. 137 (52), A 37
glauco × hispida Asch. et Græbn. = hisp. × serrulata
globularis Sut. = ericetorum
globularis W. (non L.) = montana
glomerata Gilib. = vulpina
glomerata Host = stenophylla
Godefrini Willem. = strigosa
Goodenowi J. Gay 132 (28 ε), A 36
gracilis Curt. = acuta
gracilis Ehrh., Schk. A 36 (25 β b)
gracilis Honck. = mucronata
gracilis Mœnch = montana
gracilis Posp. (*acutiformis*) A 38 (70 β e)
gracillima Steud. et Hochst. = ferruginea
Grassmanniana Rabenh. 135 (40 b)
Grioletii Rœm. 135, A 37 (40 bis)
grisea Viv. (non Whlnb.) = Grioletii
grypos Schk. 131 (24 β), A 36
grypos × fœtida Kuek. = fœt. × stellulata
gynomane Bert. = distachya
gynobasis Vill. = Halleriana
Halleriana Asso 134 (35), A 37
Halleri Gunn. = Vahlii
Hausmanni Dœll (ornithopoda) = ornithopodioides
heleonastes Ehrh. 130 (22)
helodes Lk. = levigata
helvetica Honck = frigida

CAREX I 125 (142)
helvetica Schleich. = punctata
hermaphroditica Gmel. = Kobresia myosuroides
heterophylla Krock. = præcox
hirta L. 142 (73)
hirtæformis Pers. 142 (73 b)
hispida W. in Schk. 133 (53), A 38
hispido × *serrulata Christ* A 38
hispidula Gaud. = fimbriata
hordeiformis Whlnb. = hordeistichos
hordeistichos Vill. 142 (74)
Hornschuchiana Hpe. 140 (63 β)
Hornschuchiano × flava Garcke = flavo × Hornsch.
Hosteana DC. = fulva
Hosteana Nym. = distans
Hostii Schk. = stenophylla
Hudsoni A. Benn. = stricta
humilis Leyss. 134 (34), A 37
hybrida Brot. = divisa
hybrida Schk. = Kobresia bipartita
Ilseana Ruhmer = leporino × remota
incrassata Crép. (muricata) = muricata (α)
incurva Lightf. 128 (10)
inflata Huds. = vesicaria
inflata Sut. = rostrata
insularis Christ (verna) 135 (38 β) = mollis, cfr. A 37
intermedia Good. = disticha
intermedia Lge. (divulsa) = Chaberti
intermedia Sut. = acutiformis
intermedia Urv. = arenaria
intricata Tin. 132 (28 ζ), A 36
irrigua Sm. = seg.
irrigua Whlnb. (limosa) 137 (51 β) = magellanica, cfr. A 37
juncifolia All. = incurva
juncifolia Gmel. = mucronata
juncifolia Host = stenophylla
Kochiana DC. = spadicea
Kochiana Kuek. = panormitana
Kuekenthalii Zahn = fœtido × lagopina
Lachenalii Schk. = lagopina
Laggeri Auct. = fœtido × lagopina
Laggeri Wimm. = fœtido × stellulata, cfr. A 35
lagopina Whlnb. 130 (22 β)
lagop. × fœtida Christ = fœt. × lagop.
Lamarckii Wood in Rees = nitida
lasiocarpa Ehrh. A 38 (72)
laxula Tin. = Tommasinii
lasiochlæna Kth. = hispida
Leersii W. = echinata
lepidocarpa Tausch. 141, A 38 (66 α b)
leporina Good., W., Kth. = lagopina
leporina L. 130 (21), A 36
leporino × *remota Ruhmer* 131 (nota)
leptostachys Ehrh. in L. f. = strigosa

Digitized by Google

CAREX I 125 (142)
levigata Duby = microcarpa
levigata Sm. 141 (63 ε)
levis Hpe. = dioica
levis Kit. in W. 139 (58 ε), A 38
leucocarpa Fr. (vulgar.) = chlorostachya
leucoglochin Ehrh. in L. f. = pauciflora
ligerica J. Gay 129 (15 β)
ligerina Bor. = prec.
limosa L. 137 (51), A 37
limosa Scop. = atrofusca
limosa β Leers. = glauca
linearis Clairv. = brachystachys
Linkii W., Schk. = distachya
Linnæana Host = dioica
Linnæi Degl. = dioica
liparicarpos Gaud. = nitida
lipsiensis Peterm. = lepidocarpa
litigosa Chaub. = Chaberti?
litoralis Krock. = acutiformis
livida Bell. (non W.) = limosa?
lobata Bell. = curvula
lobata Schleich. = microstyla
lobata Vill. = fœtida
loliacea Schk. = Pairæi
loliacea Wulf. (non L.) = divulsa
longearistata Biv. 138 (58 c)
longibracteata Beck (*vulpina*) A 35 (17 c)
longifolia Host 135 (38 γ) = umbrosa, cfr. A 37
longifolia St.-Lag. (tenuis) = tenax
longifolia Thuill. = rostrata
longirostris Krock. = levigata?
lusitanica Schk. = paniculata
macrolepis DC. 138 (55)
macrostachys Bert. = ferruginea
magellanica Lam. A 37 (51 β)
Mairiana St.-Lag. = seg.
Mairii Coss. et Germ. 507 (65)
major Boehk. (Œderi) = lepidocarpa
marginata Gort. = divisa
maxima Scop. = pendula
mediterranea Asch. et Græbn. (*Pairæi*) A 36 (18 α c)
melæna Farneti (*stricta*) A 36 (28 β c)
melæna Wimm. A 36 (28 ε b)
melanochloros Thuill. = stricta?
melanostachya W. = nutans
membranacea Hpe. = approximata
Michelii Host 139 (59)
microcarpa Bert. 136 (47), A 37
microglochin Whlnb. 127 (6), A 35
microlepis Fr. (vulgar.) = chlorostachya
microstyla J. Gay 123 (12) = fœtido × brunnesc., cfr. A 35
Mielichoferi Schk. = ferruginea
miliacea Krock. = acuta
minima Boullu 132 (28 ζ b)
minor Sw. (acuta) = Goodenowii
minuta Christ (nevadensis) = seg.
minuta Fouc. et Rotg. (*Œderi*) A 38 (66 β d)
mirabilis Host = Kobresia bipartita
mirabilis Schleich. 128 (13 b)
mollis Gilib. = leporina
mollis Host A 37 (38 β)
monilifera Thuill. = ventricosa
montana Leers = ericetorum
montana Lightf., Ten. = caryophyllea
montana L. 134 (36)
mucronata All. 138 (54)
mucronata Less. = panicea
Muelleri Steud. = distachya
multiceps Gaud. = elongata
multiculmis Ehrh. = elongata
multiformis Thuill. = disticha
muricata Huds. = echinata
muricata L. 129 (18), A 35, 205
muricata Tod. exs. = vulpina
muricato × remota Ritschl. 131, A 36
mutabilis W. = pendula
myosuroides Vill. = Kobresia myos.
nana Christ in Briq. (*grypos*) A 36 (24 β b)
naufragii Hochst. = illegitima Ces.
neglecta Degl. in Lois. = distans
nemoralis Wimm. (brizoides) = brizoides (α)
nemorensis Gmel. = pilosa
nemorosa Lumn. = Pairæi?
nemorosa Rebent. 129 (17 b)
nemorosa Schrank = alba
nervosa Desf. 141 (64 b)
Nicoloffi Pamp. = ramosa (rip.) × stricta
nigra Beck = Goodenowii
nigra Bell. in All. 133 (31 β), A 36
nigra L. (acuta) = Goodenowii
nigra Schk. = aterrima
nigro-lutea Gaud. = glauca
nitida Hpe. = mucronata
nitida Host 137 (48)
nitido × caryophyllea Asch. et Græbn. A 37
nitido × verna Saut. = prec.
nuda Lam. = leporina
nutans Host 142 (71), A 38
obæsa All. = Goodenowii?, nitida?
obæsa Auct. = nitida
obtusangula Ehrh. = rostrata
obtusangula Salzm = hispida
occultata Genn. (*Halleriana*) A 37 (35 α b)
Œderi Retz. in Ehrh. 141 (66 β), A 38
Œderi × punctata Bruegg. A 38
olbiensis Jord. 136 (43), A 37
ornithopoda W. 133 (32 γ), A 37
ornithopodioides Hausm. 133 (32 ε)
ornithopus Prantl = ornithopoda
Orsiniana Ten. = muricato × remota?
ovalis Good. = leporina
pacifica Drej = cæspitosa (α)
Pairæi F. Schultz A 35, 205 (18 α b)
pallens Rchb. (leporina) = argyroglochin
pallescens L. 135 (41)
pallida Asch. et Græbn. (*curvula*) A 35 (13 c)
pallidior Degl. in Lois. = punctata
paludosa Good. = acutiformis
paludosa Pucc. = stricta
palustris Sut. = acutiformis
panicea L. 137 (49), A 37
paniculata L. 129 (16), A 35
paniculato × remota Schw. et Wimm. 131 (nota)
panormitana Guss. 132 (28 δ b)
paradoxa W. 129 (16 β), A 35
Parlatoreana Ces. P. et G. (recurva) = seg.
Parlatoreana Fiori (*glauca*) 137 (52 α c)
parviflora Host = nigra
parviflora Gaud. = lagopina
patula Huds. = pauciflora
patula Schk. = levigata
patula Scop., All. = silvatica
pauciflora Lightf. 127 (7)
pedata All. (non L.) = ornithopoda
pediformis C. A. Meyer 133 (32 β)
pellucida Turcz. = pediformis
pendula Geners. = capillaris
pendula Huds. 136 (46)
perennis Krock. = montana
Persoonii Sieb. = brunnescens
petræa Whlnb. = rupestris
phæostachya Sm. = sparsiflora
pilosa Scop. 136 (42)
pilulifera L. sp. 135 (39)
pilulifera L. hb. = Vahlii
piriformis Tausch = flava
platystachya Ten. = macrolepis
plena Clairv. = capillaris
plumbea W. = riparia
Poireti Gmel. = Fuirena pubescens
polyandra Schk. = Goodenowii
polygama Schk. = Buxbaumii
polymorpha Læst. (cæspit.) = Goodenowii
polyrrhiza Wallr. = umbrosa
præcox Jacq. = caryophyllea
præcox Schreb. 130 (20 β)
prætutiana Parl. 157 (oss.), A 37 (52 α g)
Preslii Steud. = leporina
procerior Gaud. (præcox) = umbrosa
prolixa Fr. A 36 (28 δ c)
prostrata All. = humilis
provincialis Degl. in Lois. = hispida
pseudo-arenaria Pers. = disticha

Digitized by Google

CAREX I 125 (142)
pseudo-axillaris Richter = muricato × remota
Pseudo-cyperus L. 141 (67)
pseudo-nigra Rota A 36 (?)
psilostachya Kit. in W. = silvatica
psyllophora Ehrh. = pulicaris
ptychocarpa Lk. = Halleriana
pubescens Gilib. = montana
pubescens Poir. = Fuirena pub.
pulicaris All. = Davalliana
pulicaris L. 126 (3)
punctata Gaud. 140 (62), A 38
pusilla Arv. T. (non Pers.) = subnivalis
ramosa Pamp. (*riparia*) A 38 (70 α b)
ramoso × stricta Pamp. A 38
reclinata Facch. = ornithopodioides
recurva Huds. = glauca
recurva b. Parl. = Parlatoreana
reflexa Gaud. = Davalliana
refracta Roth = caryophyllea
refracta W., Schk. = tenax
remota L. 131 (26)
remoto × contigua Kneuck. = muricato × remota
repens Bell. 129 (15 γ b)
retusa Degl. in Lois. 138 (53 b), A 38
reversa Gilib. = Pseudo-cyperus
rhizantha Gmel. = Halleriana
rigens Thuill. = acutiformis
Richardi Thuill. = canescens
rigida Schrank (non Good.) = firma
riparia Curt. 142 (70), A 38
rostrata With. 141 (68)
Rotæ DNtrs. = paniculata
rotundifruga Fiori (*caryophyll.*) A 37 (38 α b)
rotundifruga Saut. (verna) = prec.
rufa Beck = acuta
rufa Lam. = riparia
rufa L. (acuta) = acuta
rupestris Bell. in All. 127 (5)
salina Posp. (*distans*) A 38 (63 α c)
sarda Lk. 130 (19 b)
saxatilis All. (non L.) = sempervirens
saxatilis Huds. = caryophyllea
saxatilis Kit. = stolonifera
saxatilis Scop. = nigra
scabra Hpe. = Davalliana
scariosa Vill. = humilis
Scheuchzeri Gaud. = brachystachys
Scheuchzeri Honck. = acutiformis
schœnoides Lasch = ligerica
schœnoides Thuill., Host. = divisa
Schraderi Schk. = levigata
Schreberi Schrank. = præcox
Schreberi × arenaria Lasch = ligerica
Scopoliana W. = ferruginea
Scopolii Gaud. = prec.
scotica Spr. = sparsiflora

CAREX I 125 (142)
sempervirens Vill. 139 (58 δ), A 38
serotina Mérat = Œderi b. elatior
serrulata Liv. 137 (52 β)
setifolia Godr. = chætophylla
sicula Presl = distans
sicula Tin. 130 (21 c)
sicyocarpa Leb. = caryophyllea
Siberi Rota A 36 (?)
Sieberiana Opiz 126 (1 b)
silvatica Huds. 140 (61), A 205
simpliciuscula Whlnb. = Kobresia myosuroides
Solerirolii Duby = retusa
spadicea Gilib. = arenaria
spadicea Gmel. = firma
spadicea Host = ferruginea
spadicea Roth A 38 (70 β b)
spadicea Schk. = frigida
spadicea Schur (stellulata) = grypos
sparsiflora Steud., Fr. = seg.
sparsiflora Whlnb. (*panicea*) 137 (49 β)
speirostachya Sm. = fulva
sphærica Lap. = frigida
sphærocarpa Ehrh. = tomentosa
spicata Brot. = curvula
spicata Huds. = muricata
spicata Pollich = disticha
spicata Spr. = Sieberiana
spicata Thuill. = vulpina
splendens Pers. = divisa
splendida W. = lasiocarpa
stellulata Good. = echinata
stellulato × canescens Asch. et Græbn. = echinata × canesc.
stenophylla Whlnb. 128 (14 γ)
sterilis F. Schultz (biformis) = flavo × Hornschuchiana
stolonifera Hpe. A 36 (28 ε d)
stricta Good. 132 (28 β) A 36
strictifolia Opiz = prolixa
strigosa All. = brachystachys
strigosa Huds. 136 (45)
subalpina Whlnb. (firma) = sempervirens
subnivalis Arv. T. 133 (32 δ), A 37
subramosa Kit. = divulsa
subulata Schum. = Buxbaumii
subvillosa M. B. = Grioletii
sudetica Opiz = aterrima
sudetica Presl = sparsiflora
sulcata Schur = nutans
tanyphylla Fiori (*glauca*) A 37 (52 var.)
tanyphylla Posp. (flacca) = prec.
tenax Reut. 138 (56 β)
tenella Sm. = remota
tenella Thuill. = præcox
Tenorii Kth. = macrolepis
tenuis Host (non Rudge) = brachystachys
teretiuscula Good. 129 (16 γ) = diandra, cfr. A 35
tetanica Rchb. = sparsiflora
tetrastachya Traunst. = echinato × canesc.
tomentosa L. 135 (40)

CAREX I 125 (142)
Tommasinii Rchb. (*silvat.*) A 205 (61 β)
trachyantha Dorner in Heuff. = caryophyllea
triflora W., Schk. = ventricosa
trigona All. = fulva?
tripartita All. = curvula
tuberosa Degl. in Lois. = distachya
tumida Beilschm. = cæspitosa (α)
turfacea Gmel. = vesicaria
turfacea Kit. = paniculata
uliginosa L. = Scirpus Caricis
uliginosa Sut. = disticha
umbrosa Host A 37 (38 γ)
undulata Kze. = pallescens
ustulata Whlnb. 137 (50) = atrofusca, cfr. A 205
vaginata Tausch = sparsiflora
Vahlii Schk. 133 (30)
vallesiaca Sut. (non Whlnb.) = brachystachys
varia Gaud. (atrata) = atrata (α)
varia Host = sempervirens
variegata Lam. = sempervirens
ventricosa Curt. 140 (60), A 38
verna Chaix in Vill. 135 (38) = caryophyllea, cfr. A 37
verna Schk. = nitida
verna γ Lam. = glauca
vesicaria Leers = riparia
vesicaria L. 142 (69)
vesicaria β L. = rostrata
Villarsii Schk. = fœtida
virens Dur. (divulsa) = Chaberti
virens Hpe. = Pairæi
virens Lam. = muricata, cfr. A 35, nota
virens Rchb., Fiori (muricata) 129 (18 α b) = Pairæi, cfr. A 35
virens Thuill. = acuta
viridis Honck. = flava
vitilis Fr. = gracilis
vulgaris Fr. = Goodenowii
vulpina L. 129 (17), A 35
vulpina β Lam. = echinata

CARLINA III 309 (905)
acanthifolia All. 310 (2)
Acarna M. B. = Cirs. Acarna
acaulis L. 311 (3), A 186
aggregata W. et K. 311 (3 β b)
alpina Jacq. (*acaul.*) 311 (3 β), A 186
alpina Jacq. = acaulis
bracteata J. et C. Presl = sicula
caulescens Lam. = alpina
Chamæleon Vill. = acaulis
Chardousse Vill. = acanthifolia
corymbosa L. 312 (7), A 186
corymbosa B Ten. = hispanica
Cynara Pourr. 310 (2 β)
discolor Soleir. = macrocephala
elata Ambrosi (acaul.) = alpina
elatior Wallr. = alpina
Fontanesii DC. 310 (1 β)
glabriuscula DC. (*nebrod.*) 312 (5 β b)
globosa Arc. (*corymb.*) 313 (7 δ)

Digitized by Google

CARLINA III 309 (905)
græca Heldr. et Sart. 312 (7 β), A 186
grandiflora Mœnch = alpina
gummifera Less. 309 (1)
gummifera Moris, Gr. et Godr. = Fontanesii
hispanica Lam. 312 (7 α c)
involucrata Guss. = globosa
involucrata Poir. 312 (7 γ)
lanata L. 313 (9)
Lobeliana Tausch = corymbosa (α)
longifolia Rchb. 311 (4 β), A 186
longifolia Viv. = corymbosa (α)
macrocephala Less. = Fontanesii
macrocephala Moris 311 (5)
major Lge. (corymb.) = involucrata
monocephala DC. (lanata) = Pola
nebrodensis Guss. 312 (5 β)
nebrodensis Koch, Gr. et Godr. = longifolia
nigrescens Formán. (*vulgar.*) 311 (4 α d)
pinnatifida Fiori (*acanth.*) 310 (2 α b)
planifolia Schur (*vulgar.*) 311 (4 α b)
Pola Hacq. 313 (9 b)
purpurascens DC. (sicula) = nebrodensis?
pusilla N. Terr. (*vulgar.*) 311 (4 α e)
racemosa L. 313 (8)
radiata Viv. = racemosa
ramosa B. Longo (caulescens) = seg.
ramosa Fiori (*alpina*) A 186 (3 β c)
Rothii Heldr. et Sart. 312 (7 α b)
semiamplexicaulis Formán. (*vulgar.*) 311 (4 α c)
sicula Ten. 312 (6)
simplex W. et K. = alpina
stenophylla Rota = longifolia
stricta Rouy = longifolia
subacaulis DC. = acaulis
sulfurea Desf. = racemosa
tomentosa Vis. et Sacc. (*vulgar.*), A 186 (4 α for.)
transsilvanica Schur = acanthifol.
tristis Salisb. = vulgaris
Utzka Hacq. = acanthifolia
vulgaris L. 311 (4), A 186
CAROLI-GMELINA = Nasturtium
lancifolia Gærtn. M. et S. = N. amphibium
palustris Gærtn. M. et S. = N. palustre
silvestris Gærtn. M. et S. = N. silv.
CAROSELINUM = Peucedanum
Chabræi Griseb. = P. carvifol.
CAROTA = Daucus
sativa Rupr. = D. sativ.
silvestris Rupr. = D. Carota
CARPESIUM III 293 (889)
abrotanoides L. 293 (2)
cernuum L. 293 (1), A 186
comatum Goir. (*cern.*) A 186 (1 d)
macranthum Goir. (*cern.*) A 186 (1 b)
micranthum Goir. (*cern.*) A 186 (1 c)
pumilum Goir. (*cern.*) A 186 (1 e)
Wulfenianum Bert. = seg.
Wulfianum Schreb. = abrotanoides
CARPINUS I 266 (252)
Betulus L. 266 (1)
compressa Gilib. = Betulus
duinensis Scop. = orientalis
edentula W. et K. = orientalis
nervata Dulac = Betulus
nigra Mœnch = orientalis
orientalis Mill. 266 (2)
Ostrya L. = Ostrya carpinifol.
sepium Lam. = Betulus
triflora Mœnch = Ostrya carpinifol.
ulmifolia Salisb. = Betulus
ulmoides S. F. Gray = Betulus
vulgaris Mill. = Betulus
CARRADORIA = Globularia
incanescens A. DC. = G. incan.
CARRICHTERA I 441 (373)
annua Pranti 442
Vella DC. = annua
CARTHAMUS III 349 (916)
acaulis Fiori (*cærul.*) A 189 (3 for.)
cæruleus L. 350 (3), A 189
cancellatus Lam. = Atractylis cancell.
canescens Savi = Cirsium Acarna
Carduncellus L. = Carduncell. monspeliensium
corymbosus Guss. (*tingitan.*) 351 (3 β c)
corymbosus L. = Cardopatium corymb.
dentatus Vahl A 189
depressus Fiori (*lanatus*) A 189 (1 α for.)
elatus Nym. 350 (1 β), A 189
ferox Lam. = Cirs. ferox
gracilis Fiori A 189
gummiferus Lam. = Carlina gumm.
integer Fiori (*cærul.*) A 189 (3 for.)
involucratus Lam. = Cirs. spinosissim.
lanatus L. 350 (1), A 189
maculatus Lam. = Silybum Marianum
multifidus Desf. A 189
nanus Goir. (*lanatus*) A 189 (1 α c)
pinnatus Desf. = Carduncell. pinnatus
pinnatifidus Sang. (*tingitan.*) 351 (3 β b)
tinctorius L. 350 (2)
tingitanus L. 351 (3 β)
tingitanus x Bert. = pinnatifidus
turbinatus Nym. 350 (1 α b)
CARUELIA = Ornithogalum
arabica Parl. = O. arabicum
CARUM II 158 (547)
alpinum Arc. = Bunium alp.
ammoides Arc. = Petrosel. amm.
Anisum Baill. = Pimpinella Anis.
aromaticum Salisb. = Carvi
Bulbocastanum Koch = Bunium Bulboc.
Bunius L. = Falcaria saxifraga
Carvi L. 158 (1)
carvifolium Arc. 159 (2)
carvifolium Jacks. = Ptychotis carvifolia
decussatum Gilib. = Carvi
dissectum Baill. = Pimpinella dissecta
divaricatum Koch = Bunium ferulaceum
ferulaceum Arc. = Bunium ferul.
flexuosum Fr. = Bunium flex.
flexuosum Nym. = carvifolium
latifolium Jacks. = Falcaria latifol.
magnum Baill. = Pimpinella magna
Meum Stockes = Meum atham.
montanum Arc. = Bunium mont.
multiflorum Boiss. = Ligusticum cyprium
nigrum Baill. = Pimpinella nigra
officinale S. F. Gray = Carvi
Petroselinum B. et H. = Petrosel. hortense
Podagraria Roth = Ægopod. Pod.
Ridolfia B. et H. = Ridolfia segetum
rigidulum Koch 159 (3)
rigidum Steud. = prec.
saxifraga Baill. = Pimpinella sax.
saxifraga B. et H. = Falcaria sax.
segetum Arc. = Petrosel. seg.
sulcatum Steud. = Selinum carvifolia
verticillatum Koch 159 (nota)
CARVI = Selinum
sulcatum Bernh. = S. carvifolia
CARYOLOPHA = Anchusa
sempervirens Fisch. et Trautv. = A. semp.
CARYOPHYLLATA = Geum
aquatica Lam. = G. rivale
montana Scop. = G. mont.
nutans Mœnch = G. rivale
officinalis Mœnch = G. urbanum
reptans Lam. = G. reptans
rivalis Scop. = G. rivale
urbana Scop. = G. urban.
vulgaris Lam. = G. urbanum
CARYOPHYLLEA = Aira
airoides Opiz = A. caryophyllea
præcox Opiz = A. præc.
CARYOPHYLLUS = Dianthus
aridus Mœnch = Tunica prolifera
Armerius Mœnch = D. Armeria

Digitized by Google

CARYOPHYLLUS = Dianthus
atrorubens Mœnch = D. atror.
barbatus Mœnch = D. barb.
carthusianorum Mœnch = D. carth.
deltoides Mœnch = D. delt.
glaucus Mœnch = D. glauc.
Plumarius Mœnch = D. Plum.
superbus Mœnch = D. sup.
CASSIDA = Scutellaria
alpina Mœnch = S. alp.
altissima Mœnch = S. altiss.
galericulata Mœnch = S. galeric.
hastifolia Scop. = S. hast.
major Gilib. = S. galericul.
minor Gilib. = S. minor
racemosa Mœnch = S. peregrina
CASSUTHA = Cuscuta
suaveolens Des Moul. = C. racemosa
CASTALIA = Nymphæa
alba Woodv. et Wood = N. alba
speciosa Salisb. = N. alba
CASTANEA I 271 (256)
androgyna Ugolini (*sativa*) A 60 (b)
Fagus Scop. = Fagus silvat.
sativa Mill. 271, A 60
vesca Gærtn. = sativa
vulgaris Lam. = sativa
CASTELLIA = Catapodium
tuberculata Tin. = seg.
tuberculosa Somm = C. tuberculosum
CATABROSA I 81 (107)
agrostidea Presl = Aira insularis
aquatica P. B. 81
Elodes R. et S. = Poa nemoralis (for.?)
minuta Trin. = Aira min.
ochroleuca Dum. 82 (β)
CATALPA II 487 (774)
bignonioides Walt. 487
Catalpa Karst. = prec.
syringifolia Sims. = prec.
CATANANCHE III 384 (925)
armerioides O. Debeaux (*cærul.*) 384 (1 β)
cærulea L. 384 (1)
lutea L. 384 (2)
CATAPODIUM I 96 (118)
aquaticum Wk. = Catabrosa aquat.
durum Lk. = Sclerochloa dura
Halleri Rchb. = Nardurus Halleri
loliaceum Lk. 96 (3)
siculum Lk. 96 (2), A 29
triticeum Fiori (*sicul.*) A 29 (2 β)
tuberculosum Moris 96 (1)
unilaterale Griseb. = Nardurus unilat.
CATARIA = Nepeta
Nepetella Mœnch = N. Nepet.
nuda Mœnch = N. nuda
tomentosa Gilib. = N. Cataria
violacea Mœnch = N. viol.
vulgaris Mœnch = N. Cataria
CATHARTOLINUM = Linum
agreste Rchb. = L. angustifolium
alternum Rchb. = L. altern.
corymbulosum Rchb. = L. corymb.
gallicum Rchb. = L. gallic.
pratense Rchb. = L. catharticum
salsoloides Rchb. = L salsol.
sardoum Rchb. = L. Muelleri
spicatum Rchb. = L. spicat.
strictum Rchb. = L. strict.
tenuifolium Rchb. = L. tenuifol.
CAUCALIS II 195 (585)
æquicolorum All. = Anthriscus vulgaris
Anthriscus Huds. = Torilis Anthr.
arvensis Huds. = Torilis arvens.
aspera Lam. = Torilis Anthriscus
aspera Savi = Torilis arvensis
capitata Stokes = Sanicula europ.
carnosa Roth = seg.
Carota Huds. = Daucus Carota
daucoides L. 195, A 153
Daucus Crantz = Dauc. Carota
Gingidium Crantz = Daucus Ging.
grandiflora L. = Dauc. grand.
helvetica Jacq. = Torilis arvensis
heterophylla Arc. = Torilis heteroph.
humilis Jacq. = Torilis leptophylla
infesta Curt. = Torilis — anthriscoides
infesta Vest = Torilis arvensis
latifolia L. = Turgenia lat.
leptophylla L. = Torilis lept.
leptophylla Viv. = Torilis nodosa
linearifolia Req. = Torilis heterophylla
maritima Gouan = Dauc. pumilus
muricata Crantz = daucoides
muricata Bisch. 195 (b)
neglecta Arc. (infesta) = Torilis negl.
nodiflora Lam., All. = seg.
nodosa Scop. = Torilis nod.
orientalis L. 195 (nota)
parviflora Lam. = Torilis leptophylla
peduncularis Ten. (nodosa) = Torilis — peduncl.
platycarpa L. = Dauc. platyc.
procumbens Ingegn. = Torilis arvensis?
pulcherrima W. = orientalis
pumila L., Gouan = Dauc. pum.
purpurea Ten. = Torilis purp.
Sanicula Crantz = Sanicula europ.
scandicina Roth = seg.
Scandix Scop. = Anthrisc. vulgaris
CAUCALIS II 195 (585)
segetum Thuill. = Torilis arvensis
tuberculata Poir. = Pimpinella peregrina
CAULINIA = Najas
alagnensis Pollini = N. graminea
fragilis W. = N. minor
intermedia Balb. (1818) = N. graminea
intermedia Nocc. et Balb. = N. — interm.
microphylla Nocc. et Balb. = Ceratophyllum demersum ?, cfr. A 40
minor Coss. et Germ. = N. minor
muricata Spr. = N. muric.
oceanica DC. = Posidonia ocean.
CELOSIA I 323 (305)
castrensis L. 323 (d)
cernua Roxb. = comosa
coccinea L. 323 (c)
comosa Retz 323 (b)
cristata L. 323
CELSIA II 417 (750)
cretica L. f. 417
orientalis L. 417 (nota)
CELTIS I 275 (260)
ætnensis Strobl = seg.
ætnensis Torn. (*Tournefortii*) 275 (2 β)
acuta Buch. Ham. = australis
aspera Stev. = Tournefortii
australis L. 275 (1), A 61
eriocarpa Done. = australis
excelsa Salisb. = australis
lutea Pers. = australis
lutescens Guss. (australis) = ætnensis
microphylla Goir. (austral.) 275 (1 β) = occidentalis, cfr. A 61
occidentalis L. A 61
orientalis Mill. (non L.) = Tournefortii
Tournefortii Lam. 275 (2)
CENCHRUS = Tragus
capitatus L. = Echinaria capitatus
ciliaris L. = Penniset. ciliare
linearis Lam. = Tr. racemosus
racemosus L. = Tr. racem.
CENOCLINE = Matricaria
aurea C. Koch = M. aurea
pauciflora C. Koch = M. discoidea
CENOLOPHIUM = Hladnikia
Golaka Caruel = H. Golaka
CENTAUREA III 321 (914)
aculeata Ces. P. et G., Arc. (rupestr.) = aculeosa
aculeosa DC. (*rupestris*) 342, A 188 (28 α b)
acuta Lam. = Crupina vulgar.
acutiloba DC. = cristata
Adami W. 345 (32 β)
adonidifolia Rchb. A 188 (28 α c)
adscendens Briq. (*uniflora*) 329 (10 ζ)
adscendens Moritzi (phrygia) = prec.
adulterina Moretti = Calcitrapo × panicul.

Digitized by Google

CENTAUREA III 321 (914)
adunca Fiori (*solstit.*) A 188 (32 var.)
adunca Lojac. (lappacea) = prec.
æmula Lojac. hb. = Durieui Lojac.
æolica Guss. 334 (17 θ)
ætaliæ Somm. (*panicul.*) 339 (19 π)
alata Lacaita (*maritima*) A 187 (18 ι c)
alata Lacaita (ursina) = prec.
alba L. 324 (5), A 187
albescens Briq. (*vochin.*) 326 (6 γ b)
albiflora Goir. (*maculosa*) 336 (19 α f)
albiflora Strobl (*Calcitrapa*) 346 (34 α d)
albiflora Zersi (*Cyanus*) 330 (13 d)
alpestris Heg. et Heer = Scab. v. alpina
alpina Gaud. (*Scabiosa*) 341 (21 ι)
alpina L. 344 (28)
amaculosa Micheletti (maculosa) = vallesiaca
amara L. 326 (6 β)
ambigua DC. (austriaca) = Thomasiana
ambigua Fiori (maculosa) = intermedia, cfr. A 187
ambigua Guss. 336 (18 μ)
ambigua Thom. = Thomasiana
anatolica Griseb. = depressa
anguloso-maculata Micheletti (*maculosa*) 336 (19 α a)
angustifolia Ambrosi (Scabiosa) = Scab. v. tenuifolia
angustifolia DC. (*alba*) 324 (5 γ)
angustifolia Guss. (deusta) = angustifol. DC.
angustifolia Schrank = amara, cfr. oss. p. 326
angustisecta Fiori (*Tenoreana*) 325 (5 ι b)
aplolepa Moretti 339 (19 ο), A 188
aplolepis DC. = prec.
aplolepis Guss. = æolica
approximata Gren. = amara
apula Lam. = melitensis
arachnoidea Viv. 342, A 188 (23 α d)
argyrocoma Wallr. (Jacea) = virescens
armata Koch (rupestr.) = aculeosa
arrectispina Bert. 347 (X)
ascendens Fiori (*dissecta*) 335 (18 β)
ascendens Somm. (*Ciner.*) 333 (17 α a)
ascendens Ten. (cinerea) = diss. v. ascendens
aspera L. 347 (35)
aspero X Calcitrapa Gr. et Godr. 347
aterrima Christ (Jacea) = transalpina
Athoa DC. = rupestris (α)
augustana Rchb. f. = Pestalotii

CENTAUREA III 321 (914)
auriculata DC. (aspera) = aspera (α)
austriaca Caruel = nigra, Thomasiana
austriaca Guss. = stenolepis
austriaca Koch p. p., Auct. it. p. p. = rhætica
austriaca Koch p. p. = phrygia
austriaca Roch. = nervosa
austriaca W. 330 (*nota*)
autumnalis DC. (Calcitrapa) = horrida Ten.
autumnalis Lojac. (*macroac.*) A 189 (34 β b)
axillaris Lois. = variegata
axillaris W. = Triumfetti
badensis Tratt. 341 (21 ε), A 188
baldensis Pers. = alpina L.
Bellardi Colla 326 (6 β b)
benedicta L. = Cnicus bened.
Berini Sieb. = nervosa
Bertolonii Hausskn. = aplolepa
Bertol. X Pouzini Hausskn. = genuensis
Bicknellii Briq. (*Rhapont.*) 323 (3 γ)
Brachtii Rchb. f. 336 (19 α d)
bracteata Scop. = amara (cfr. oss. p. 326)
breviciliata Fiori (*Scabiosa*) 340 (21 α c)
brevispina Strobl (*Schouwii*) 345 (32 γ c)
brunnescens Gelmi, Briq. (*leucophæa*) 337 (19 γ c)
Burnati F. O. Wolf 331 (*nota*)
busambarensis Guss. 334 (17 ζ)
cæspitosa Cyr., Vahl = sphæroceph. (α)
calabra N. Terr. (alba) = stabiana?
calabra N. Terr. (amara) = virescens
calabra N. Terr. (*Cyanus*) 330 (13 c)
calcarea Jord. 341 (21 θ)
Calcitrapa L. 346 (34), A 189
Calcitrapa var. Groves = monstrosa
Calc. X aspera Gr. et Godr. 347
Calc. X panicul. Moretti 347
calcitrapoides Gouan = Calcitrapo X aspera
calcitrapoides Ten. (an. L.?) = Torreana
calcitrapoides Ucria (an. L?) = macroacantha Guss.
calolepis Boiss. = diffusa
calva Reut. 324 (5 α b)
calvescens Briq. (*Triumf.*) 331 (14 β c)
cana S. et S. = variegata
candicans Briq. (*Triumf.*) 331 (14 β h)
candidissima Lam. = Cineraria (α)
Candollei Koch (nigresc.) = transalpina
canescens DNtrs. (*Jacea*) 326 (6 α b)

CENTAUREA III 321 (914)
capitata Koch (*nervosa*) 329 (10 δ d)
carniolica Host 331 (14 β e)
carsiana Auct. = Kartschiana
Carueliana Micheletti (*panicul.*) 338 (19 ζ)
Centaurium All., Balb., Re, cfr. A 188 = alpina?
Centaurium L. 344 (29), A 188
centauroides Gouan = collina
centauroides L. 343 (25)
ceratophylla Moris = filiformis
ceratophylla Ten. 342, A 188 (23 γ)
ceratophylla B Ten. = pumila
ceratophylla C Ten. = crocea
ceratophylla β Bert. = pumila
Chaixii Mut. = menteyerica
Chaubardi Rchb. f. = maculosa
cichoracea Guss. = Serratula mucronata
cichoracea L. = Serratula cichor.
Cineraria All. = cinerea?
Cineraria DNtrs., Briq. etc. = Pseudo-cinerar.
Cineraria L. 333 (17), A 187
Cineraria b Guss. = busambarensis
cinerarioides Lacaita (*marit.*) A 187 (18 ι b)
cinerarioid. Lacaita (ursina) = prec.
cinerea Ard. = Pseudo-Cinerar.
cinerea Lam. 334 (17 γ)
cinerea Raf. = Parlatoris
cinerocephala Evers (*Scabiosa*) A 188 (21 var.)
Circæ Somm. (*Ciner.*) 333 (17 β)
cirrhata A. Kern. = rhætica
cirrhata Rchb. 328 (nota) = adscendens?
cirrhata Rchb. f. (austriaca) = stenolepis
collina L. 343 (24)
collina Scop. = aculeosa
commutata Koch (Jacea) = pratensis
concolor DC. (*alba*) 324 (5 α)
congesta W. = melitensis
conifera L. 324 (4)
conocephala Fiori (*alba*) 325 (5 ζ)
coriacea W. et K. 341 (21 δ)
Cornuti Rchb. = alpina L.
corymbosa Pourr. 349 (*nota*)
cosana Fiori (*panicul.*) 338 (19 θ)
cottia Fiori (*menteyerica*) 341 (21 λ b)
crassifolia Bert. 344 (30), A 188
cristata Arch. p. p. = Tommasinii
cristata Bartl. 339 (19 λ)
cristata α Vis. = Tommasinii
cristata β Vis. = cristata
cristata γ Vis. = spinoso-ciliata
crocea Fiori (*ceratoph.*) 342 (23 γ d)
Crupina L. = Crupina vulgar.

Digitized by Google

CENTAUREA III 321 (914)
Crupina S. et S., Guss. etc. = Crupina Crupinastr.
Crupinastrum Moris = Crupina Crupin.
Cupanii Guss. = Schouwii
cyanea DC. (*mont.*) 331 (14 α a)
Cyanus L. 331 (13), A 187
Damanti Lojac. A 188
decipiens Rchb. = lacera
decipiens Thuill. 327 (*nota*)
depressa M. B. A 187
deusta Ten. 325 (5 δ)
deusta B Ten. = splendens
deusta C Ten. = stabiana
deusta D Ten. = conocephala
dichroantha A. Kern. = adonidifolia, rupestri × Scabiosa, arachnoidea
diffusa Lam. 340 (20)
diomedea Gasp. 325 (5 λ)
discoidea Balb. (pectinata) = flosculosa
dissecta Ten. 334 (18), A 187
divaricata Guss. (*deusta*) 324 (5 δ b)
dubia Suter = transalpina
Durieui Fiori (*Salmantica*) A 187 (2 β)
Durieui Lojac. A 189
elata Poir. (*tagana*) 344 (27 b)
elata Ten. (cinerea) = melanocephala?
elegans All. = Lupsia — elegans
Endressi Hochst. 327 (*nota*)
ensifolia Fiori (*rhætica*) 328 (9 β)
ensifolia Rota (austriaca) = prec.
erecta Somm. (*Ciner.*) 333 (17 α b)
eriophora Guss. (*Schouwii*) 345 (32 γ b)
fastigiata Fiori (*maculosa*) 336 (19 α c)
fastigiata Moretti (tenuiflora) = prec.
Ferdinandi Gren. = adscendens
ferulacea Martelli 333 (16 β)
filaginoides Lojac. A 189
filiformis Viv. 332 (16)
filiform. × *horrida Levier* 332
Fischeri Rchb. f. (an W.?) (axillaris) = Triumf. f. candicans
flaviflora Fiori (*sphæroceph.*) 348 (36 α b), A 189
flosculosa Ard. = adscendens
flosculosa Balb. 329 (10 η)
Friderici Vis. 334 (17 η)
fuliginosa Doll. = Scab. v. alpina
fulvo-maculata Micheletti (*maculosa*) 336 (19 α b)
fuscata Desf. 346 (33 b)
Galactites L. = Lupsia Galact.
Gaudini Boiss. et Reut. 326 (6 β e)
Gelmii Briq. (Scabiosa) = integrifolia Gaud.
genuensis Hausskn. 349 (nota)
glabrata Ten. (*dissecta*) A 187 (18 ι')
glomerata Vahl 349 (nota)
CENTAUREA III 321 (914)
Goirani Fiori (*stricta*) 331 (14 β *d subf.*)
gracilis Reut. = amara
Grafiana DC. 348 (×)
graminifolia Pourr. = variegata
granitica Mart. = Triumfetti
Grillii Paolucci (*Scabiosa*) 340 (21 α b)
grinensis Reut. 341 (21 γ)
Grovesii Fiori (*dissecta v. adscend.*) 334 (18 β b)
Gussonei Fiori (*sonchifol.*) 348 (36 β b)
gymnocarpa Moris et DNtrs. 334 (17 ε)
Hackelii Tin. = busambarensis
hastæfolia Lojac. (*solstit.*) A 188 (32 var.)
hastilis Briq. (*panicul.*) 337 (nota)
heleniifolia Arc. (*Rhapont.*) 323 (3 β b)
heterophylla Beck (Scabiosa) = variifolia
hirtella Posp. (*rupestris*) 342, A 188 (23 α e)
humilis Arc. (aplolepa) = subciliata
humilis Goir. (*Cyanus*) A 187 (13 e)
horrida Bad. 332 (15)
horrida Ten. 346 (34 α b)
horrido × *filiformis Levier* 332
humilis Huet (*dissecta*) 334 (18 α b)
humilis Groves (dissecta) = melanocephala
humilis Ten. (cinerea) = dissecta v. nigra?
hyalina Lacaita (*marit.*) A 187 (18 ι d)
hyalina Lacaita (ursina) = prec.
hyalolepis Boiss. 349 (nota), A 189
hybrida All. = maculoso × solstit.
hybrida Chaix = Calcitrapo × aspera
iberica Trevir. 349 (nota), A 189
ilvensis Somm. (*dissecta*) 335 (18 θ)
incana Levier, Groves etc = Grovesii
incana Rchb. f. = neapolitana
incana Ten. (non Desf.) = Tenoreana
incana Ten. (*dissecta*) 334 (18 α)
incisa Arc. (maculosa) = seg.
incisa Fiori (*dissecta v. intermedia*) (18 η c), cfr. A 187
incisa Fiori (dissecta v. pseudomacul.) 335 (18 η c) = prec.
incoronata DC. (phrygia) = nerv. v. capitata
inermis Fiori 342 (nota) = seg.
inermis Groves (*rupestr.*) 342 (23 β), A 188
integrans Naggi A 188 (19 o d)
integrifolia Gaud. (*variifol.*) 341 (21 η b)
CENTAUREA III 321 (914)
integrifolia Rota (*nervosa*) 329 (10 δ b)
intermedia Cariot = Triumfetti
intermedia Fiori (*dissecta*) A 187 (18 η)
intermedia Micheletti (maculosa) = prec.
intybacea Lam. 349 (nota)
Iserniana Graells A 187 (2 γ)
Isnardi L. = aspera
italica DC. (Scabiosa) = seg.
italica Pers. 341 (nota)
italica Ten. = variifolia
Jacea L. 325 (6), A 187, 217
Jacea Ten. = pratensis
Jaceo × *nigrescens Hausskn.* 326 (nota)
jaceoides Léveillé = pratensis
Janerii Graells = Iserniana
Kartschiana Scop. 338 (19 ι)
Kochii F. Schultz = transalpina
Kotschyana Koch (non Heuff.) = Scab. v. alpina
lacera Koch (*Jacea*) 326 (nota)
laciniata Guss. 336 (18 μ b)
lanata DC. = Carthamus lanatus
Langii Friv. = variegata
lappacea Ten. = Adami
latifolia Fiori (*ensifolia*) 328 (9 β b)
latisecta Fiori (*ceratoph.*) 342 (23 γ c)
latisecta Fiori (*dissecta v. intermedia*) (18 η b), cfr. A 187
latisecta Fiori (dissecta v. pseudo-macul.) = prec.
latisecta Fiori (*dissecta v. melanocephala*) 335 (18 δ b)
leucophæa Jord. 337 (19 γ)
leucolepis DC. = splendens
ligustica Gremli 339 (19 o c)
lingulata Lag. = variegata
linifolia Lojac. (*Cyanus*) A 187 (13 for.)
Lippii L. 323 (1), A 187
Lippii Ten. = conocephala
litigiosa Fiori (*cosana*) 338 (19 θ b)
lobata Briq. (*Triumf.*) 331 (14 β g)
longifolia Posp. (*sordida*) 343 (×)
lorata Lojac. (*Schouwii*) A 188 (32 γ for.)
lunensis Fiori (*panicul.*) 338 (19 η)
lutescens Koch (*sordida*) 343 (×)
lyrata Bell. 323 (3 β)
lyrata Pers. = melitensis
macracantha DC. (centauroid.) = centauroides
macracantha DC. (*collina*) 343 (24 b)
macroacantha Guss. 346 (34 β), A 189
macrocephala Groves (*dissecta*) 335 (18 ε)
maculosa Caruel = intermedia
maculosa Lam. 337 (19 α)
maculoso × *solstitialis* 340

Digitized by Google

CENTAUREA III 321 (914)
maremmana Fiori (*cæliæ*) 339 (19 π b)
marginata Ten. = nicæensis
maritima Lacaita (*dissecta*) 335 (18 ι), A 187
mathiolæfolia Boiss. = mont. v. nana
melanocephala Fiori (*dissecta*) 335 (18 δ)
melanolepis Briq. (*pseudo-phrygia*) A 187 (11 β b)
melitensis L. 345 (31)
menteyerica Chaix 341 (21 λ)
monstrosa Fiori (*Calcitrapa*) 346 (34 α c)
montaltensis Lacaita (*marit.*) A 187 (18 ι e)
montaltens. Lacaita (Tenorii) = prec.
montana L. 331 (14), A 187
mollis W. et K. 331 (14 β b)
Moritziana Heg. = rhætica
Mureti Jord. = maculosa
myacantha DC. 346 (34 δ)
nana Chesn. = seg.
nana Duby (amara) = Bellardi
nana Ten. (*mont.*) 332 (14 δ)
napifolia L. 349 (37)
neapolitana Boiss. 326 (6 δ), A 187
nemoralis Jord. 327 (6 η b)
nervosa W. 329 (10 δ)
nervoso × *Jacea Gelmi* 329 (nota)
nicæensis All. 346 (33)
nigra All. = vochinensis
nigra Fiori (*dissecta*) 335 (18 γ)
nigra L. 327 (6 η)
nigrescens Gr. et Godr. = pratensis
nigrescens Ten. = neapolitana
nigrescens W. = vochinensis et transalpina
nobilis Groves (*alba*) 325 (5 ε)
nudicaulis L. = Serratula nudic.
obscura Jord. 327 (6 η a)
orientalis L. 349 (nota)
pallescens Arc. = hyalolepis, cfr. A 189
pallescens Del. 349 (nota)
pallida Fiori (*mollis*) 331 (14 β b for.)
pallida Koch (austriaca) = stenolepis
pandataria Bég. (1905) = seg.
pandataria Bég. hb. (aplolepa) = seg.
pandataria Fiori et Bég. (*Ciner*) 334 (17 ι)
paniculata Biv. = Parlatoris
panicul. DNtrs. = Reuteri
panicul. Gaud. = vallesiaca
paniculata L. 336 (19), A 188
panicul. Pollich, Koch = maculosa
panicul. Ten. = glabrata
panicul. β Bert. = intermedia et Parlatoris
panicul. × *Calcitrapa Ces.* 347
panormitana Lojac. A 188
Parlatoris Heldr. 336 (18 λ)
parviflora Lam. = aspera
parviflora S. et S. (non Desf.) = diffusa
pectinata All. = adscendens
pectinata L. 328 (8)
pedemontana Boiss. (rhætica) = adscendens
pedemontana Jord. = maculosa
Pestalottii DNtrs. 325 (5 θ)
petrophila Reut. (Scabiosa) = calcarea
Petteri Goir. (an Rchb.?) = fastigiata
phrygia All. = adscendens
phrygia L. 330 (11), A 187
phrygia L. p. p., Pollini, DC. = nervosa
phrygia Koch = pseudo-phrygia
phrygia Ten., Bert. p. p. = stenolepis
phrygia β Bert. = rhætica
phrygia γ Bert. = flosculosa
phrygioides Briq. (uniflora) = flosculosa
pinnatifida Fiori (*vochin.*) 326 (6 γ c)
plumosa Kern. = nervosa
pluricephala Fiori (*uniflora*) 329 (10 γ)
Pouzini DC. = Calcitrapo × aspera
prætermissa Martr. Don. = subinermis
prætoria Rchb. f. 337 (19 β b)
pratensis Thuill. 327 (6 ζ), A 217
praticola Beck (nigresc.) = transalpina
procumbens Balb. 328 (7)
prostrata Huet 336 (18 κ b)
pseudo-cærulescens Briq. (*leucophæa*) 337 (19 γ a)
Pseudo-Cineraria Fiori (*panicul.*) 338 (19 ε)
Pseudo-Cineraria Rouy (1904) = prec.
pseudo-maculosa Fiori (dissecta) 334 (18 ι) = intermedia, cfr. A 187
pseudo-phrygia C. A. Meyer 330 (11 β), A 187
pseudo-solstitialis O. Debeaux 345 (32 α b)
pubescens W. (non DC.) = sordida (a)
pumila Arc. (*ceratoph.*) 342 (23 γ b)
purpurascens DC. (*mont.*) 331 (14 α b)
purpurascens Koch (sordida) = Grafiana
Rabenhorstiana Sch. Bip. 349 (nota)
radiata Fiori (*flosculosa*) 329 (10 β b)
radiata Wk. (nigra) = Endressi
ragusina L. 342 (22)
ramosa Gib. et Pir. (*nervosa*) 329 (10 δ c)
raphanina Urv. (non S. et S.) = Urvillei
Reuteri Rchb. f. 337 (19 γ d)
rhætica Levier = Thomasiana
rhætica Moritzi 328 (9)
Rhapontica L. 328 (3)
rhenana Bor. 336 (19 α e)
rhombea Lojac. (*Schouwii*) A 188 (32 γ for.)
Riccsana Rchb. (nicæensis) = Durieui Lojac.
Rieai Rchb. (nicæensis) = prec.
rigidifolia Bess. = orientalis
romana L. = napifolia
rubriflora Evers (axillaris) = seg.
rubriflora Fiori (*Triumfetti*) A 187 (14 β for.)
rupestris L. 342 (23), A 188
rupestris Rchb. = aculeosa
rupestris β Bert. = aculeosa
rupestri × *Scabiosa* A 188
rupicola Bad. = aplolepa
salmantica L. 328 (2), A 187
Saratoi Briq. = seg.
Saratoi Briq. (Ciner.) = seg.
Saratoi Fiori (*Pseudo-Ciner.*) 338 (19 ε b)
saxicola Rouy (non Lag.) = amara
Scabiosa L. 340 (21), A 188
Scabiosa β Bert. = integrifolia Gaud.
Scabiosa β Lam. = italica
scabra Presl = Schouwii?
Schouwii DC. 345 (32 γ), A 188
Scopolii Vest. = cristata
sempervirens L. 330 (12)
Seridis L. 348 (36 γ), A 189
Seridis Lois. = aspera
serotina Bor. = decipiens
serotina Coss. et Germ. (Jacea) = amara
serratifolia Fiori (*crassifol.*) A 188 (30 for.)
sessiliflora Lam. = melitensis
seusana Chaix = variegata
seusana Gaud. = carniolica
sicula Lacaita (*Cineraria*) A 187 (17 var.)
sicula Lam., Ten. etc. = nicæensis
sicula L. = Schouwii?
solstitialis Biv. = Schouwii
solstitialis L. 345 (32), A 188
solst. × panicul. Schiede = maculoso × solstit.
soluntina Tin. A 187
sonchifolia Guss. = Gussonei
sonchifolia L. 348 (36 β)
sonchifolia Lojac. = sphæroceph. (α)
sordida Hausm. = badensis
sordida Huter et Porta = adonidifolia et rupestri × Scabiosa
sordida W., Koch 343 (×) = rupestri × Scabiosa
spathulata Ten. 327 (6 ε b)
spathulata Zeraph. = crassifolia
sphærocephala L. 348 (36), A 189
sphærocephala b Guss. = flaviflora
spinoso-ciliata Bernh. 338 (19 κ)

Digitized by Google

CENTAUREA III 321 (914)
spinoso-ciliata Rchb. f. (cristata) = cristata
spinulosa Roch. 341 (21 ζ)
splendens L. p. p., Ten. 324 (5 β)
splendens Pollini = deusta
stabiana Fiori (*deusta*) 325 (5 δ c)
stenolepis A. Kern. 330 (11 γ)
stenoloba Briq. (*Triumf.*) 331 (14 β f)
Stœbe Ten. (non L.) = subtilis
stricta W. et K. 331 (14 β d)
subacaulis Chen. et Braun. (*pratens.*) A 217 (6 ζ b)
subacaulis Heg. (*Scab. v. alpina*) A 188 (21 ι b)
subalpina Ces. (nigresc.) = vochinensis
subciliata DC. (*aplolepa*) 339 (19 o b)
subdiscolor Fiori (Lippii) = Lippii, cfr. A 187
subinermis DC. (*aspera*) 348 (35 β)
subinermis DC. (rupestr.) = arachnoidea
subinermis Koch (*rupestris*) A 188 (23 α a)
subtilis Bert. 339 (19 ν)
tauromenitana Guss. 343 (26)
tenacissima Fiori (*conocephala*) 325 (5 ζ b)
tenacissima Groves (deusta) = prec.
Tenoreana Wk. 325 (5 ι)
Tenorii Guss. hb. = glabrata
tenuifolia Groves (deusta) = angustifol. DC.
tenuifolia Schleich. (*Scabiosa*) 341 (21 β)
tenuisecta Arc. (deusta) = angustifolia DC.
tenuisecta Jord. = maculosa
Thomasiana Dalla Torre 329 (10 ε)
Thomasiana Gremli (nervosa) = prec.
Timbali Mart. Don. = amara
tineana Gremli (*uniflora*) 329 (10 β)
tomentosa Fiori (*dissecta*) 336 (18 κ)
tomentosa Guss. (Parlator.) = prec.
tomentosa Rchb. (vochin.) = albescens
Tommasinii A. Kern. 339 (19 μ)
Torreana Ten. 346 (34 γ)
transalpina Schleich. 327 (6 ε)
tridentina Fiori (*rhætica*) 328 (9 α b)
Triumfetti All. 331 (14 β), A 187
umbrosa Huet 330 (13 b)
undulata Ricci (*nana*) 332 (14 δ b)
uniflora L. 328 (10)
ursina Lacaita = maritima
Urvillei DC. A 189
vallesiaca DC. (*panicul.*) 337 (19 β)
vallesiaca Jord. = prec.

CENTAUREA III 321 (914)
variabilis Léveillé = Jacea
variegata Lam. 332 (14 β)
variifolia Lois. 341 (21 η)
veneris Somm. (*Ciner.*) 334 (17 δ)
virens Paolucci (amara) = amara v. virescens
virescens Arc. p. p. (dissecta) = intermedia
virescens Caldesi (*amara*) 326 (6 β d)
virescens Fiori (*aplolepa f. subciliata*) 339 (19 o b subf.)
virescens Guss. (*Parlat.*) 336 (18 λ c)
virescens Ten. (*dissecta*) 335 (18 ζ)
viretorum Jord. = amara
virgata Lam. 349 (nota)
virgata Lojac. (*Parlator.*) 336 (18 λ b)
vochinensis Bernh. 326 (6 γ)
vulgaris Coss. et Germ. (*Jacea*) 326 (6 α)
vulgaris Godr. = Jacea
vulgaris Koch (*Scabiosa*) 340 (21 α)
Weldeniana Rchb. 326 (6 β c)
Zannoni Seb. et Maur. = napifolia
CENTAURELLA = Erythræa
dichotoma Delarb. = E. Centaurium
CENTAURIUM = Erythræa
Erythræa Rafn = E. Centaurium
minus Mœnch = prec.
umbellatum Gilib. = prec.
vulgare Rafn = prec.
CENTAURIUM = Centaurea
officinale Cass. = C. Centaur.
taganum Pomel = C. tagana
CENTINODIUM = Polygonum
axillare Montand. = P. aviculare
CENTOPODIUM = Emex
spinosum Burch. = E. spin.
CENTRANTHUS III 134 (829)
albiflorus Bég. (*angustifol.*) 135 (2 b)
albiflorus Guss. (*ruber*) 134 (1 d)
angustifolius DC. 135 (2)
Calcitrapa Dufr. 135 (4)
lanceolatus Bég. (*ruber*) 134 (1 b)
nervosus Moris = trinervis
orbiculatus Dufr. 135 (4 β)
ruber DC. 135 (1)
ruber bb. Guss. = lanceolatus
trinervis Bég. 135 (3)
verticillatus Guss. (*ruber*) 134 (1 c)
CENTROSIS = Limodorum
abortiva Sw. = L. abort.
CENTUNCULUS II 325 (685)
lanceolatus Michx. = minimus
minimus L. 325
simplex Horn. = minimus
stellatus Chod. et Hassl. (pentandrus) = Asterol. Lin.-stell.
CENTUNCULUS = Cerastium
alpinus Scop. = C. alp.

CENTUNCULUS = Cerastium
angustifolius Scop. = C. strictum
arvensis Scop. = C. arv.
rigidus Scop. = C. suffruticosum
semidecandrus Scop. = C. semidec.
CEPA = Allium
angulosa Bernh. = A. angul.
ascalonica Noronha = A. ascal.
carinata S. F. Gray = A. carin.
esculenta S. F. Gray = A. Cepa
fistulosa S. F. Gray = A. fist.
flava Mœnch = A. flavum
flexuosa Mœnch = A. roseum
oleracea Bernh. = A. olerac.
paniculata Mœnch = A. panic.
prolifera Mœnch = A. Cepa
Schœnoprasa Mœnch = A. Schœn.
ursina Bernh. = A. urs.
ventricosa Mœnch = A. fistulosum
Victorialis Mœnch = A. Victor.
vulgaris Ren. = A. Cepa
CEPHALANTHERA I 252 (245)
alba Simk. = pallens
angustifolia Simk. = ensifolia
comosa Tin. 252 (1 b)
ensifolia Rich. 252 (2), A 210
grandiflora S. F. Gray, Bab. = pallens
lancifolia Tod. = pallens
Lonchophyllum Rchb. f. = pallens
longifolia Fritsch. = ensifolia
longifolia Goir. (*ensifolia*) A 210 (2 b)
Maravignæ Tin. 252 (1 c)
oligantha Goir. (*rubra*) A 209 (1 d)
ochroleuca Rchb. = pallens
pallens Rich. 252 (3), A 210
rubra Rich. 252 (1), A 209
uniflora Goir. (*pallens*) A 210 (3 b)
Xiphophyllum Rchb. = ensifolia
CEPHALARIA III 143 (833)
albiflora Goir. (*transylv.*) A 177 (3 c)
Allioni Kern. = transylvanica
alpina Schrad. 144 (1)
angustifolia DC. (leuc.) = leucantha (α)
appendiculata Schrad. = Dipsacus pilosus
incisa DC. (leuc.) = leucanthema
integrifolia Bég. (*transylv.*) 144 (3 b)
joppensis Coult. = seg.
joppica Bég. 144 (4)
latifolia Moris (leuc.) = leucanthema
latisecta Posp. (leuc.) = leucanthema
leucantha Schrad. 145 (5)
leucanthema R. et S. 145 (5 β)
pilosa Gr. et Godr. = Dipsacus pilos.
setulosa Lev. (*leuc.*) 145 (5 α b)
syriaca Schrad. 144 (2), A 177

Digitized by Google

CEPHALARIA III 143 (333)
transylvanica Schrad. 144 (3), A 177
transylv. b Zersi = integrifolia
CEPHALOCERATON = Isoëtes
gymnocarpum Genn. = I. — subinermis
Hystrix Genn. = I. Hystrix
pseudo-Hystrix Genn. = I. — subinermis
subinerme Genn. (Hystrix) = I. subinermis
CERAMANTHE = Scrophularia
vernalis Dum. = S. vernalis
CERASTIUM I 350 (336)
acutifolium Schur = glabrum
ætnæum Gürke (tomentos.) A 73 (12 α c)
ætnæum Jan (arvense) = prec.
ætnæum Strobl (repens) = prec.
aggregatum Dur. = siculum
album Presl = Columnæ
alpicolum Fenzl (arvense) A 72 (11 α c)
alpigenum Schur = lanatum
alpinum All. = arvense
alpinum L. 353 (10), A 72
alpin. β M. et K. = lanatum
alpinum Schur (arvense) = strictum
alsinoides Pers. 352 (6 δ a)
ambiguum Fisch. = arvense (α)
androsaceum Ser. = pilosum
angustatum Gren. (mutabile) = arvense (α)
angustifolium Fenzl (arvense) = arvense (α)
angustifolium Moris (alpin.) = lanuginosum
angustifolium Pacher (carinthiac.) = lanceolatum
angustifolium Strobl (repens) = samnianum
anomalum W. et K. 350 (2)
apenninum Parl. ex Duthie, Groves hb. = apuanum
apetalum Dum. 351 (5 b)
apuanum Parl. 354 (11 ζ)
aquaticum L. = Malachium aq.
arenarium Ten. = semidecandrum
argenteum M. B. = grandiflor.
arvense L. 353 (11), A 72, 211
arvense Moris = lanuginosum
atratum Lap. A 72 (10 α for.)
atrovirens Bab. = glutinos.
atticum B. et H. = tauricum
barbatum Ducros = brachypet.
barbulatum Whlnb. = brachyp.
beeringianum Cham. et Schl. = alpin. (α)
biflorum Crantz = Alsine bifl.
Boissieri Gren. 354 (11 ι), A 73, 211
bombycinum Schur = lanatum
brachycarpum Schur = ciliatum
brachypetalum Desp. 351 (4), A 71
bracteatum West. (glutin.) = alsinoides
breviflorum Gilib. = semidecandr.
CERASTIUM I 350 (336)
busambarense Lojac. = hirsutum
cæspitosum Goir. (triv.) A 72 (8 for.)
cæspitosum Gürke (an Gilib.?) = triviale, cfr. A 72
calcicolum Schur (arvense) = arvense (α)
campanulatum Coss. et Germ. (pumil.) = litigiosum
campanulatum Viv. 352 (7), A 72
canescens L. Vacc. (suffruticos.) A 72 (11 β c)
carinthiacum Vest 353 (10 δ)
carnosulum Turcz. = arvense (α)
Cavillieri Briq. (arvense) A 73 = seg.
Cavillieri Briq. (Boissieri) A 73, 211 (11 ι b)
ciliatum W. et K. A 73 (11 var.)
collinum Salisb. = arvense
Columnæ Ten. 354 (12 α b)
comatum Desv. = pilosum
corollinum Fenzl (viscos.) = glomerat.
coronense Schur = carinthiacum
corsicum Soleir. = Soleirolii
costantinopolitanum Stev. = glomeratum
decalvans Schloss. et Vuk. = lanigerum
deflexum Ser. = Malachium aquat.
densiflorum Guss. 352 (6 γ b)
dichotomum L. 355 (nota)
distans Gren. (pumil.) = alsinoides
divaricatum Gren. (pumil.) = tetrandrum
divaricatum Herbich A 72
dubium Fiori (semidec.) A 71 (6 α b)
dubium Guss. (arenar.) = prec.
eglandulosum M. et K. (glomerat.) A 71 (5 c)
elatum Strobl (repens) = repens
elatum Ten. A 73 (12 α for.)
elegans Fisch. = trigynum
elongatum Pursh = arvense (α)
elongatum Rouy et Fouc. (glomerat.) A 71 (5 for.)
erectum Coss. et Germ. 355 (13 γ)
eriophorum Kit. = lanatum
fallax Guss. 352 (6 β b)
filiforme Schleich. = pedunculatum, cfr. A 72
Fischerianum Ser. = alpin. (α)
flexuosum Heg. = intermedium
glaberrimum Koch (semidec.) = macilentum
glaberrimum Lap. 353 (10 α d) = glabrum, cfr. A 72
glabratum Fenzl (ovatum) = carinthiacum
glabratum Hartm. = glabrum
glabratum Neilr. (triviale) = holosteoides
CERASTIUM I 350 (336)
glabratum Whlnb. (alpin.) = glabrum
glabrescens Gren. (vulgatum) = holosteoides
glabrescens L. Marcello (tomentos.) A 73 (12 var.)
glabrescens Mey. (viscosum) = holosteoides
glabrescens Schur (alpin.) = glabrum
glabriusculum M. et K. (latifol.) 353 (10 β b)
glabrum W. (alpin) A 72 (10 α d)
glaciale Gaud. = uniflorum
glanduliferum Koch (alpin.) 353 (10 α b)
glandulifer. L. Vacc. (alpicolum) A 72 (11 α c subf.)
glandulifer. L. Vacc. (strictum) A 72 (11 α b subf.)
glandulifer. L. Vacc. (suffruticos.) A 72 (11 β b)
glandulosum Bœnn. (viscos.) = triv. b. glandul.
glandulos. Koch (brachypet.) = tauricum
glandulos. Koch (semidec.) = glutinos.
glandulos. Rchb. Koch (triviale) 352 (8 α b), A 72
glandulos. Schur = triv. b. glandul.
glanduloso-pilosum Schur (brachypet.) = tauricum
glaucum Gren. = manticum
glomeratum Thuill. 351 (5), A 71
glutinosum Fr. 352 (6 β)
gracile Duf. = alsinoides
gracile Wallr. = brachypet.
gramineum Crantz = Stellaria gram.
grandiflorum Coss. et Germ. (varians) = litigiosum
grandiflorum Pourr. = Boissieri
grandiflorum W. et K. 354 (12 γ)
grandifolium Koch (latifol.) = intermedium
granulatum Huter P. et R. (campan.) A 72 (7 d)
Grenieri F. W. Schultz = glutinos.
Gussonei Tod. ex Lojac. = siculum
herbaceo-bracteatum Fenzl (semidec.) = glutinosum
heterophyllum Schur = carinthiacum
heterophyllum Viv. = pilosum?
hirsutum Fenzl (alpin.) = alpinum (α)
hirsutum Ten. 354 (11 ε), A 73
hirtum Neilr. (arvense) = arvense (α)
holosteiforme Schur = semidec.
holosteoides Fr. A 72 (8 c)
holosteum Crantz = Stellaria holost.
humile Rouy (pumilum) = campanulatum

Digitized by Google

CERASTIUM I 350 (336)
illyricum Ard. 351 (3)
insubricum Moretti A 73 (11 var.)
intermedium Heg. (*latifol.*) A 72 (10 β d)
Lamyi F. W. Schultz. = glutinos.
lanatum Lam. 353 (10 α c)
lanceolatum Britting. in Rchb. (*carinthiac.*) 353 (10 δ b)
laniferum Schur = lanatum
lanigerum Clem. 354 (11 κ)
lanuginosum Gren. (*Boissieri*) A 72 (11 ι b)
lanuginosum W. = lanatum
lapponicum Crantz = trigynum
laricifolium Vill. = suffruticosum
latifolium L. 353 (10 β), A 72
laxum Gr. et Godr. (pumil.) = alsinoides
Lensii F. W. Schultz = glutinos.
Lerchenfeldianum Schur = carinthiacum
ligusticum Viv. = campanulat.
lineare All. 354 (11 θ), A 73
litigiosum De Lens 352 (6 β c)
longifolium S. G. Gmel. = grandiflor.
longifolium Ten. = samnianum
longipedicellatum Mey. (semidec.) = dubium
longipedunculatum Ten. ex Marcello A 72 (7 c)
lucorum Schur = triviale
luridum Guss. = tauricum
macilentum Aspegren A 72 (6 α c)
macranthum Boiss. hb. (grandiflor.) = lanigerum
macranthum Schur = latifolium
macropetalum Rouy (pumilum) = campanulatum
majus Moris (*tetrandrum*) A 211 (6 δ b subf.)
malachiforme Schur = triviale
manticum L. 354 (13), A 73
matrense Kit. = ciliatum
mauritanicum Pomel = anomalum
maximum Gilib. = Malachium aquat.
medium Crantz = Stellaria med.
microcarpum Kit. = silvaticum
microphyllum Schur = atratum
minus Moris (campanul.) = palustre
minus Presl (tomentos.) = ætnæum
murale Salisb. = Holosteum umbell.
murale Schur = pallens
mutabile Gren. = alpinum et arvense
mutabile Spenn. = brachypet., glomer., semidec., triviale
nemorum Crantz = Stellaria nem.
nivale D. Don = trigynum
nudum Gren. (mutabile) = glabrum
obscurum Chaub. = glutinosum

CERASTIUM I 350 (336)
octandrum Arc. (*manticum*) A 73 (13 β)
octandrum Gren. (glaucum) = prec.
oligadenum Briq. (*stenopetal.*) A 211 (11 δ b)
Opizii Seidl. = glutinos.
ovale Bess. = glutinosum
ovale Pers. = glomeratum
ovatum Hpe. = carinthiacum
pallens F. Schultz 352 (6 β d)
pallidum Schur = semidec.
pallidum Schur (glutinos.) = pallens
palustre Moris 352 (7 b)
pauciflorum Kit. = triviale
pedunculatum Gaud. 353 (10 γ), A 72
pellucidum Chaub. = semidecandrum
pentandrum Krock., M. B. (non L.) = semidec.
pentandrum Guss., Moris = pumilum Curt.
pentandrum Ten. = densiflorum
petaloideum Gren. (brachypet.) = Tenoreanum
petrosum Schur = glabrum
physospermum J. Gay = lanuginosum
pilosum Rouy et Fouc. (brachypetal. = Tenoreanum
pilosum S. et S. 351 (3 b)
pilosum Ten. = Tenoreanum
polyadenum Briq. (*stenopetal.*) A 211 (11 δ a)
polyphyllum Stev. = arvense (α)
præcox Ten. = campanulat.
pratense Celak (triviale) = triviale (α)
prostratum Jan = campanulat.
pseudo-viscosum Schur = triviale
pumilum Curt. 352 (6 δ), A 211
pumitum N. Terr. (*alpin.*) A 72 (10 α for.)
quaternellum Fenzl = erectum
radians Crantz = trigynum?
refractum All. = trigynum
repens Bert. etc. = silvaticum
repens Boiss. = Boissieri
repens L. 354 (12 β)
repens Pollini = arvense
rigidum Ten. (strictum) = suffruticosum
rigido × tomentos. Huter exs. = Rigoi
Rigoi Huter A 211 (11 η c)
Rœseri B. et H. 351 (4 β b)
rotundatum Schur = semidec.
rotundifolium Fisch. = apetalum
rotundifolium Schur = lanatum
rupestre Fisch. = trigynum
salassarum Beyer (*alpin.*) A 72 (10 α for.)
samnianum Ser. in DC. 354 (12 β b)
saxigenum Schur = pallens
scandens Lej. = Malachium — scand.

CERASTIUM I 350 (336)
Scarani Ten. 354 (11 ε b)
scariosum Celak. (semidec.) = semidec. (α)
scariosum Dœll (triviale) = triviale (α)
scarioso-bracteatum Fenzl (semidec.) = semidec. (α)
semidecandrum L. 351 (6), A 71, 211
serpyllifolium W. = strictum
siculum Guss. 352 (6 γ), A 72
silvaticum W. et K. 353 (9), A 72
Soleirolii Sardagna = lanuginosum
Soleirolii Schur = atratum
Soleirolii Ser. ex Duby 354 (11 η b)
spurium Posp. 352 (8 β), A 72
squalidum Ram. = atratum
stellarioides Hartm. = trigynum
stenopetalum Fenzl 353 (11 δ), A 211
strictum All. = lineare
strictum L., Hænke 353 (11 α b), A 72
subherbaceum Celak. (semidec.) = glutinos.
strigosum Fr. = brachypet.
subtetrandrum Murb. = alsinoides
subulatum Huter P. et R. 353 (11 γ), A 73
subviscosum Rchb. (vulgat.) = glomerat.
suffruticosum L. 353 (11 β), A 72
szalaberense Kit. = arvense
tauricum Spr. 351 (4 β), A 71
Tenoreanum Ser. A 71 (4 α b)
tenue Viv. 354 (13 β) = octandrum, cfr. A 73
tenuifolium Pursh = arvense (α)
tenuifolium Vis. = grandiflor.
tenuissimum Jan = suffruticosum
tetrandrum Curt. 352 (6 δ b), A 211
Thomasianum Ser. (lanatum) = glabrum
Thomasii Ten. 354 (11 η), A 211
tomentosum Cav. = Boissieri
tomentosum L. 354 (12), A 73
tomentos. b. Guss. = ætnæum
toment. c Guss. = Columnæ
toment. d Guss. = repens
trigynum Vill. 350 (1)
triviale Lk. 352 (8), A 72
umbellatum Crantz = Holosteum umb.
uniflorum Murith 353 (10 β c)
varians Coss. et Germ. = semidecandrum
Villarsii Verlot (arvense) = strictum
villosum Baumg. = lanatum
viridescens Huter P. et R. (*tomentos.*) A 73 (12 var.)
viscarium Rchb. (pumil.) = glutinos.

Digitized by Google

CERASTIUM I 350 (336)
viscarium Schur = prec.
viscidulum Gremli (*arvense*) A 78 (11 var.)
viscidum Gren. (brachypet.) = tauricum
viscidum Lk. = semidec.
viscosissimum Schur = atratum
viscosum Guss. (brachypet.) = tauricum
viscosum L. hb., DC. = triviale
viscosum L. sp. et Auct. pl. = glomeratum
viscosum M. et K. (triv.) = triv. b. gland.
viscosum Pollich = brachypetal.
vulgare Hartm. = triviale
vulgatum L. hb. = glomeratum
vulgatum L. sp. = triviale
vulgatum β Bert. = siculum
CERASUS = Prunus
acida Borkh. = P. acida
austera Borkh. = P. aust.
avium Mœnch = P. avium
Caproniana DC., Ser. = P. Cerasus
Chamæcerasus Lois. = P. Cer. γ pumila
concolor Boiss. (prostrata) = P. humilis
dulcis Borkh. = P. avium
duracina DC. = P. durac.
griotta Ser. (Caproniana) = P. austera
hortensis Mill. = P. Cerasus
humilis Host = P. Cer. γ pumila
humilis Moris = P. humil.
Juliana DC. = P. — Jul.
Laurocerasus Lois. = P. Laur.
lusitanica Lois. = P. lusit.
macrocarpa Ser. (avium) = P. av. b. macroc.
Mahaleb Mill. = P. Mahal.
Marasca Host = P. Marasca
nigra Mill. = P. avium
Padus Delarb., DC. = P. Padus
pallescens Ser. (Caproniana) = P. — palleso.
prostrata Ser. = P. prostr.
racemosa Gilib. = P. Padus
recta Liegel = P. Cerasus
rubra Gilib. = P. Cerasus
tridentina M. Rœm. = P. Cerasus
silvestris Ser. (avium) = P. — arctiana
vulgaris Mill. = P. Cerasus
CERATOCEPHALUS I 500 (428)
falcatus Pers. 500
spicatus Mœnch = prec.
CERATOCHLOA A 30
festucoides P. B. = seg.
pendula Schrader = seg.
unioloides DC., P. B. A 30
CERATONIA II 8 (476)
coriacea Salisb. = seg.
inermis Stokes = seg.
Siliqua L. 8.
CERATOPHYLLUM I 487 (422)
asperum Lam. = demersum
cornutum Rich. = demersum
CERATOPHYLLUM I 487 (422)
demersum L. 488
demersum β L. = submersum
granulosum Schur = submers.
inerme Dum. = submersum
leve Lam. = submersum
muticum Cham. = submersum
oxyacanthum Cham. = demers.
polyacanthum Schur = demers.
submersum L. 488 (β)
triacanthum Schur = demersum
tricorne Dum. = demersum
tricuspidatum Dum. = demers.
unicorne Dum. = demersum
verruculosum Rich. = submers.
verticillatum Borb. = demersum
CERATOSANTHUS = Delphinium
Ajacis Schur = D. Ajacis
Consolida Schur = D. Consol.
divaricatus Schur = D. paniculat.
paniculatus Schur = D. panic.
CERCIS II 8 (477)
florida Salisb. = seg.
Siliquastrum L. 8
CEREFOLIUM = Anthriscus
nitidum Celak. = A. nitida
sativum Bess. = A. Cerefol.
silvestre Bess. = A. silvestris
trichospermum Bess. = A. trich.
CERINTHE II 362 (715)
acuta Mœnch = major
Allionei Fiori (*minor*) 362 (α b), A 165
alpina Kit. = glabra (α)
alpina Salis = longiflora
alpina Solla = maculata
alpina Vis. = Smithiæ
aperta Clairv. = major
aspera Roth 363 (3 β)
auriculata Ten. 362 (1 γ)
carthusianorum Gandog. = auriculata
ciliaris M. Gortani (*minor*) A 165 (1 α c)
concolor Ces. P. et G. (aspera) = pallida
connivens Clairv. = minor
echioides L. = Onosma echioides
glabra Mill. 362 (2)
glauca Mœnch 363 (3 α)
gymnandra Gasp. 363 (3 β f)
longiflora Viv. 363 (2 β)
lurida Salisb. = minor
maculata L. p. p., Caruel = glabra
maculata L. p. p., All., M. B. 362 (1 β), A 165
major L. 363 (3)
minor Fiori = maculata
minor L. 362 (1), A 165
pallida Guss. (*aspera*) 363 (3 β c)
purpurascens Boiss. (*aspera*) 363 (3 β e)
quinquemaculata Whlnb. = glabra
semipurpurea Strobl (*aspera*) 363 (3 β d)
Smithiæ A. Kern. 363 (2 α b)
strigosa Rchb. 363 (3 β b)
tenuiflora Bert. 363 (2 β b)
CERINTHE II 362 (715)
tenuior Caruel (maculata) = longiflora
CERVARIA = Peucedanum
albiflora Gaud. (alsatica) = P. venetum
glauca Gaud. = P. Cervaria
nigra Bernh. = prec.
Oreoselinum Gaud. = P. Oreosel.
rigida Mœnch = P. Cervaria
Rivini Gærtn. = P. Cervaria
CERVISPINA = Rhamnus
cathartica Mœnch = Rh. cathart.
infectoria Fourr. = Rh. inf.
saxatilis Fourr. = Rh. sax.
CESTRUM II 397 (741)
Parqui L'Her. 397
CETERACH I 5 (1)
alpinum DC. = Woodsia alpina
crenatum Moore (*offic.*) A 1 (b)
Marantæ DC. = Nothol. Mar.
officinarum W. 5; A 1
CHÆNORRHINUM = Linaria
minor Lge. = L. minor
origanifolium Fourr. = L. orig.
rubrifolium Lge. = L. rubrifol.
CHÆROPHYLLUM II 198 (591)
alpestre Jord. = magellense
alpinum Vill. = Anthriscus silvestris
Anthriscus Lam. = Anthrisc. vulgaris
aromaticum L. 198 (1)
aureum L. 199 (4)
australe Crantz = Scandix austr.
Briqueti Chenev. (*Villarsii*) A 154 (3 β b)
bulbosum L. 199 (2)
calabricum Guss. 199 (3 δ)
Cerefolium Crantz = Anthrisc. Ceref.
Cicutaria Vill. 199 (3 α b)
coloratum L. 200 (nota)
cynapioides Arc. = Bunium cynap.
elegans Gaud. 199 (3 γ)
eriocarpum Guss. (*temul.*) 199 (5 b)
geniculatum Gilib. = temulum
glabriusculum Koch (aur.) = hybridum
grandiflorum Crantz = Scandix grandiflora
hirsutum L. 199 (3), A 154
hirsutum β L. = Cicutaria
hirsutum Vill. = Villarsii
Hladnikianum Rchb. = Anthrisc. — Hladn.
hybridum Ten. 199 (4 b)
infestum Salisb. = Anthriscus silvestris
levigatum Vis. 200 (nota)
lucidum Desf. = Anthriscus nemorosa
lucidum Moretti A 154 (3 α c)
maculatum W. 199 (4 c)
magellense Ten. 199 (3 ε), A 154
minimum Vand. 200 (nota), A 154 (3 α e)
nemorosum Hoffm., M. B. = Anthrisc. nemor.

Digitized by Google

CHÆROPHYLLUM II 198(591)
nitidum Whlnb. = Anthrisc. nitida
nodosum Crantz = Physocaulis nodosa
odoratum Crantz = Myrrhis odorata
palustre Lam. = hirsutum
Pecten-Veneris Crantz = Scandix Pect.-Ven.
peucedanifolium Penzig 200 (nota)
pipnatifidum Poir. = Scandix pinnatif.
rigidum Huet = magellense
roseum Goir. (*hirsut.*) A 154 (3 α d)
rostratum Lam. = Scandix Pecten-Veneris
sativum Lam. = Anthrisc. Cerefol.
siculum Guss. = Anthrisc. nemorosa b. gymnocarpa
silvestre L. = Anthrisc. silv.
temulentum L. = seg.
temulum L. 200 (5)
torquatum DC. = Anthrisc. Candollei
tumidum Gilib. = Anthriscus silvestris
Villarsii Koch 199 (3 β), A 154
CHÆTARIA = Aristida
Adscensionis P. B. = A. Adscens.
cærulescens P. B. = prec.
canariensis Nees = A. Adscens.
elatior P. B. = A. Adscens.
CHÆTONYCHIA = Paronychia
cymosa Sweet = P. cym.
CHÆTOSPORA = Schœnus
ferruginea Rchb. = S. ferrug.
nigricans Kth. = S. nigric.
CHÆTURUS I 60 (69)
divaricatus DC. = fascicul.
fasciculatus Lk. 60, A 16
CHAITURUS = Leonurus
leonuroides W. = seg.
Marrubiastrum Rchb. = L. Marrub.
CHAMÆBUXUS II 227 (623)
alpestris Spach 228
coriacea Opiz = prec.
grandiflora Rouy et Fouc. (*alpestris*) 227 (b)
vulgaris Schur = alpestris
CHAMÆCERASUS = Lonicera
alpigena Medic. = L. alpig.
cærulea Delarb. = L. cærul.
dumetorum Delarb. = L. Xylosteum
nigra Medic. = L. nigra
Xylosteum Medic. = L. Xylosteum
CHAMÆCISTUS = Loiseleuria
austriacus Regel = Rhodothamnus Chamæcistus
serpyllifolius S. F. Gray = L. procumbens
CHAMÆCLEMA = Glechoma
hederacea Mœnch = G. heder.
CHAMÆCYTISUS = Cytisus
dalmaticus Vis. = C. argenteus
elongatus Lk. = C. elongatus
hirsutus Lk. = C. hirsutus
CHAMÆCYTISUS = Cytisus
purpureus Lk. = C. purp.
supinus Lk. = C. supin.
CHAMÆDACTYLIS = Æluropus
maritima Nees. = Æ. litoralis
CHAMÆDRYS = Teucrium
Botrys Mœnch = T. Botrys
capitata Raf. = T. capit.
cretica Raf. = T. cretic.
flava Mœnch = T. flav.
glauca Jord. et Fourr. = T. glauc.
laciniata S. F. Gray = T. Botrys
latifolia Raf. = T. fruticans
lucida Mœnch = T. lucid.
Marum Mœnch = T. Marum
montana Raf. = T. mont.
officinalis Mœnch = T. Chamædrys
palustris S. F. Gray = T. Scordium
Polium Raf. = T. Polium
Scordium Mœnch = T. Scordium
CHAMÆIRIS = Iris
angustifolia Medic. = I. pumila
fœtida Medic. = I. fœt.
graminea Medic. = I. gram.
spuria Medic. = I. spuria
CHAMÆLEA = Cneorum
tricoccos Lam. = C. tricocc.
CHAMÆLEDON = Loiseleuria
procumbens Lk. = L. proc.
CHAMÆLEON = Carlina
gummifer Cass. = C. gumm.
megacephalus Cass. = C. Fontanesii
CHAMÆLINA I 464 (400)
albiflora Kotschy = silvestris
aquatica Brot. = Nasturt. amphibium
armeniaca Desv. = silvestris
austriaca Pers. = Nasturt. austr.
campestris Spenn. = silvestris
dentata Pers. 464 (γ c)
fluviatilis Guss. = Nasturt. fluv.
fœtida Fr. 464 (γ), A 99
glabra DC. (sativa) = sativa (α)
integrifolia Fr. (fœtida) = fœtida (α)
integrifolia Rouy et Fouc. (sativa) = sativa (α)
linicola Spenn. = fœtida
macrocarpa Wierzb. = sativa (α)
microcarpa Andrz. 464 (β b)
myagrodes Moretti = Cochlearia saxatil.
pilosa DC. (sativa) = silvestris
pinnatifida Horn. 464 (γ b)
sagittata Mœnch = sativa
sativa Brot., Boiss. = silvestris
sativa Crantz 464, A 99
saxatilis Pers. = Cochlearia sax.
silvestris Wallr. 464 (β)
CHAMÆLINUM = Chamælina
austriacum Host = Nasturt. austr.
paniculatum Host = Neslia pan.
sativum Host = Ch. sativa
CHAMÆMELUM = Anthemis
alpinum All. = A. alpina
arvense Schreb., All. = A. arv.
austriacum J. et C. Presl = A. austr.
Cota All. = A. Cota
Cotula All. = A. Cotula
discoideum All. = A. disc. W.
fœtidum Baumg. = A. Cotula
incrassatum Hoffg. = Anacyclus clavatus
inodorum Vis. = Matricaria inod.
maritimum All. = A. marit.
mixtum All. = A. mixta
montanum All. = A. mont.
nobile All. = A. fuscata
pinnatifidum Mœnch = A. mixta
tinctorium Schreb., All. = A. tinctoria
tomentosum All. = Anacyclus tomentos.
Triumfetti All. = A. Triumf.
valentinum All. = Anac. val.
CHAMÆMESPILUS = Pirus
Aria Rœm. = P. Aria
humilis Rœm. = P. Chamæmesp.
CHAMÆNERION = Epilobium
angustifolium Scop. = E. angustifol.
crassifolium Nym. = E. Dodon. v. alpin.
denticulatum Spach. = E. Dodon. v. alpin.
Dodonæi Wimm. = E. Dodon.
grandiflorum Mœnch = E. hirsutum
hirsutum Scop. = E. hirsut.
montanum Scop. = E. mont.
multiflorum Spach = E. angustifol.
obscurum Schreb. = E. obscur.
palustre Mœnch = E. pal.
palustre Scop. = E. Dodon. (α)
parviflorum Schreb. = E. parvifl.
pubescens Mœnch = E. parviflor.
ramosissimum Mœnch = E. obscurum
roseum Schreb. = E. roseum
rosmarinifolium Mœnch = E. Dodonæi (α)
spicatum A. Gray = E. angustifol.
tetragonum Scop. = E. tetr.
CHAMÆORCHIS = Herminium
albida Dum. = Gymnadenia albida
alpina Rich. = H. alpinum
viridis Dum. = Cœloglossum viride
CHAMÆPEUCE = Cirsium
afra DC. = C. afrum
Casabonæ DC. = C. Casabonæ
firma DC. = C. firmum
gnaphaloides DC. = C. gnaph.
nivea DC. = C. niveum
stellata DC. = C. stellat.
stricta DC. = C. strictum
CHAMÆPITYS = Ajuga
arvensis Schur = A. Chamæpit.
Iva Fourr. = A. Iva

Digitized by Google

CHAMÆPITYS = Ajuga
trifida Dum. = A. Chamæpitys
vulgaris Lk. = prec.
CHAMÆPLIUM = Sisymbrium
officinale Wallr. = S. offic.
polyceratium Wallr. = S. polycerat.
CHAMÆREPES = Herminium
alpina Spr. = H. alpinum
CHAMÆRIPHES = Chamærops
major Gærtn. = Ch. humilis
minor Gærtn. = prec.
CHAMÆROPS I 143 (144)
arborescens Pers. (*humilis*) 141 (β)
arborescens Steud. = prec.
elatior Guss. (humilis) = macrocarpa
humilis L. 144, A 39
macrocarpa Tin. in Guss. 144 (α b)
CHAMAGROSTIS = Mibora
minima Borkh. = M. min.
CHAMITEA = Salix
reticulata Kern. = S. retic.
CHAMOMILLA = Matricaria
aurea J. Gay = M. aurea
Courrantiana C. Koch = M. Courr.
discoidea J. Gay = M. disc.
fuscata Gr. et Godr. = Anthemis fuscata
inodora C. Koch = M. inodora
meridionalis C. Koch = M. Courrantiana
mixta Gr. et Godr. = Anthem. mixta
nobilis Gr. et Godr. = Anthemis nobil.
officinalis C. Koch = M. Chamomilla
patens Gilib. = prec.
præcox C. Koch = M. inod.
vulgaris S. F. Gray = prec.
CHARISTEMMA = Hyacinthus
fastigiata Janka = H. fastig.
CHASMONE = Cytisus
argentea E. Mey. = C. argent.
CHEILANTHES I 14 (15)
acrosticha Tod. = fragrans
commutata Trevis. (*fragr.*) A 8 (1 β b)
fimbriata Vis. = Szovitsii
fragrans W. et B. 14 (1), A 7, 202
hispanica Metten., cfr. A 8 (α b)
maderensis Lowe A 8 (1 β)
nudiuscula Hook. (*Szovitsii*) A 202 (2 β)
odora Sw. = fragrans
persica Mett. = Szovitsii
Szovitsii F. et M. 14 (2), A 202
suaveolens Sw. = fragrans
Tinæi Tod. 14 (1 b), A 8
CHEIRANTHUS I 424 (362)
albus Mill. = Matth. incana
alpinus All. (non L.) = Erysim. pumilum
angustifolius Gilib. = Erysim. hieracifol.
angustifol. Mill. = Erysim. lanceolat.
annuus L. = Matth. incana
CHEIRANTHUS I 424 (362)
aquaticus Lej. = Erysim. cheiranthoides
arvensis Bernh. = Erysim. hieracifol.
Boccone All. = Erysim. canescens
Cheiri L. 424
coccineus Mill. = Matth. incana
erysimoides Huds. = Erysim. cheiranthoides
erysimoides Jacq. = Erysim. lanceolat.
erysimoides L. = Erysim. pannonic.
fenestralis L. f. = Matth. incana
firmus W. = Erysim. hieracifol. (α)
fruticosus L'Hér. = Cheiri
fruticulosus L. Mant. 424 (b)
fruticulosus L. Sp. = Matth. tristis
glaber Mill. = Matth. glabra
glaberrimus Colla = Matth. glabra
græcus Pers. = Matth. incana
helveticus Jacq. = Erysimum helvet.
helveticus Raf. = Erysimum Bonannian.
hieracifolius Lam. = Erysim. hier.
hilaris W. = Matth. tristis
hortensis Lam. = Matth. incana
ibericus W. = Barbarea arcuata
incanus L. = Matthiola inc.
integrifolius Mill. = Erysim. canescens
integerrimus Steud. = Erysim. canescens
lacerus Gouan. = Malcolmia parviflora
laciniatus Poir. = Hesperis lac.
levigatus W. = Barbarea arcuata
litoreus L. = Malcolmia litor.
litoreus Santi = Malcolmia parviflora ?
longisiliquus Steud. = Erysim. longis.
luteus Dulac = Cheiri
maritimus L. = Malcolmia mar.
mollis Horn. = Arabis albida
muralis Salisb. = Cheiri
muricatus Lam. = Matth. sinuata
nodosus Lam. = Malcolmia litorea
paniculatus Lam. = Erysim. repandum
pumilus Horn. = Erysim. pumilum
ramosissimus Lam. = Erysim. repandum
rhæticus Schleich. = Erysim. rhæt.
sabaudus All. (tristis) = Matth. sabauda
scaber Mœnch = Malcolmia africana
CHEIRANTHUS I 424 (362)
scapigerus W. = Erysim. cheiranthoides
silvestris Crantz = Erysim. lanceolat.
sinuatus L. = Matthiola sin.
syriacus DC. = Conringia oriental.
tricuspidatus Huds. = Matth. sinuata
tricuspidatus L. = Matthiola tricusp.
trilobus L. = Malcolmia litorea
tristis L. = Matthiola trist.
turritoides Lam. = Erysim. cheiranthoides
unguiculatus W. = Malcolmia litorea
valesiacus J. Gay = Matthiola vales.
villosus Forsk. = Matth. tricuspidata
villosus Spr. = Hesperis vill.
viridifolius Steud. = Matth. glabra
viridis Ehrh. = Matth. incana
CHEIRI = Cheiranthus
hieracifolium Clairv. = Erysim. hier.
montanum Clairv. = Ch. Cheiri
vulgare Clairv. = Ch. Cheiri
CHEIRINIA = Erysimum
altissima Lk. = E. hieracifol.
canescens Lk. = E. canesc.
cheiranthoides Lk. = E. cheir.
erysimoides Dum. = E. lanceolat.
helvetica Lk. = E. helvet.
hieracifolia Lk. = E. hierac.
lanceolata Lk. = E. lanc.
longifolia Lk. = E. canescens
odorata Lk. = E. pannonicum
repanda Lk. = E. repand.
stricta Lk. = E. hieracifol. (α)
strictissima Lk. = Sisymbr. strictiss.
CHEIROLOPHUS = Centaurea
lanceolatus Cass. = C. sempervirens
sempervirens Pomel = C. semperv.
CHEIROPSIS = Clematis
balearica Bercht. et Presl. = C. bal.
cirrosa id. = C. cirr.
CHELIDONIUM I 483 (416)
aurantiacum Salisb. = Glaucium aurant.
corniculatum L. = Glauc. corn.
crenatum Lge (majus) = quercifolium
fulvum Poir. = Glauc. flavum
glabrum Mill. = Glauc. corniculat.
Glaucium L. = Glauc. flavum
glaucum Hill. = Glauc. flavum
hæmatodes Mœnch = majus
hybridum L. = Rœmeria hybr.
laciniatum Mill. 483 (β)
litorale Salisb. = Glauc. flavum
luteum Gilib. = majus
majus L. 483
majus β L. = laciniatum
murale Ren. = majus

Digitized by Google

CHELIDONIUM I 483 (416)
phœnicoeum Lam. = Glauc. phœn.
quercifolium Thuill. 483 (α b)
rubrum Poir. = Glauc. rubr.
ruderale Salisb. = majus
umbelliferum Stokes = majus
violaceum Lam. = Rœmeria hybrida
CHENOLEA = Kochia
hirsuta Arc. = K. hirs.
lanata Jacq. ex Moq. = K. prostrata
CHENOPODINA = Suæda
æstuaria Dum. = S. marit.
bacciformis Dum. = S. marit.
filiformis Moq. = S. marit.
Hostii Moq. = S. marit.
indica Wight = S. marit.
maritima Moq. S. marit.
setigera Moq. = S. splendens
splendens Gr. et Godr. = S. splend.
CHENOPODIUM I 309 (289)
acuminatum Schur (non W.) 311 (8 α c) = blitoides, cfr. A 65
acutifolium Sm. = polyspermum (α)
acutum Kitt. (polysperm.) = polysperm. (α)
albescens Moq. (*murale*) A 64 (6 b)
album L. 312 (10), A 65, 211
ambrosioides L. 312 (11), A 65
angulatum Curt. = hybridum
angulosum Lam. = hybridum
angustifolium Gilib. = polysperm.
arenarium Gærtn. = Kochia aren.
aristatum L. 312 (13)
arrectum Desmaz. = polysperm. (a)
astracanicum Ledeb. = rubrum
augustanum All. = Kochia prostrata
bisseriale Menyh. = cymosum
Blitum F. Muell. = foliosum
Bonus-Henricus L. 310 (2), A 64
Borbasii Murr. p. m. p. = Pseudo-Borbasii
botrydium St.-Lag. = Botrys
botryoides Sm. 311 (8 β), A 65
Botrys L. 312 (12)
camphoratæfolium Pourr. = Kochia prostrata
candicans Lam. A 65 (10 var.)
capitatum Asch. 309 (1)
carthagenense Zuccagni = murale
catenulatum Schleich. = viride
Chamrium Buch.-Ham. = murale.
chrysomelanospermum Zuccagni = urbicum
Clemente Spr. = Suæda splendens
concatenatum Thuill. A 65 (10 var.)
crassifolium Horn. = botryoides
CHENOPODIUM I 309 (289)
cymigerum Koch (album) = viride
cymosum Chev. (*polysperm.*) 310 (3 b)
cymoso-racemosum Koch. (polysperm.) = prec.
cymoso-spicatum Koch (polysperm.) = polysperm. (α)
deltoideum Lam. = urbicum
elatum Shuttlew. = viridescens
erectum Sond. (polysperm.) = polysperm. (α)
erosum Bast. = opulifol.
esculentum Salisb. = Bonus-Henr.
farinosum C. Koch (urbic) = microsperm.
ficifolium Sm. 312 (10 γ)
filiforme Dum. = Suæda marit.
flavescens R. et S. = Salsola vermicul.
flavum Forsk. = murale
fœtidum Lam. = Vulvaria
foliosum Asch. 309 (1 β)
fruticosum L. = Suæda frut.
Ghandium Buch.-Ham. = murale
glaucum L. 311 (9)
grandidentatum Dietr. (urbic.) = microsperm.
guineense Jacq. = murale
Halimus Thunb. = Atriplex Hal.
hastatum Dum. = Atriplex hast.
heterophyllum Fenzl (*album*) A 65 (10 var.)
heterophyllum Murr = prec.
hirsutum L. = Kochia hirs.
hybridum L. 310 (5)
incanum Moq. (album) = candicans
integrifolium Gib. et Pir. (*rubrum*) 311 (8 α b)
intermedium W. et K. 311 (7 β) = microsperm., cfr. A 65
Jacquini Ten. = Suæda Jacq.
Kitaibelianum Lindem. = polysperm. (a)
lanuginosum Mœnch = Kochia hyssopifol.
laterale Soland. = murale
lejospermum DC. = album
Linnæanum Lindem. (polysperm.) = cymosum
litorale Thunb. = Atriplex lit.
lucidum Gilib. = murale
marginatum Spr. = polysperm. (a)
maritimum L. = Suæda mar.
Matthioli Bert. = botryoides
melanospermum Wallr., Spr. = urbicum
microphyllum Fouc. et Mand. (*Bonus-Henric.*) A 64 (2 b)
microphyllum Moq., Goir. (*Vulvaria*) A 64 (4 b)
microspermum Wallr. A 65 (7 γ)
multifidum L. = Roubiæva mult.
murale L. 311 (6)
obtusatum G. Beck (*opulifol.*) A 211 (10 δ b)
CHENOPODIUM I 309 (289)
obtusifolium Gaud. (polysperm.) = cymosum
oleraceum Schur = polysperm.
olidum Curt. = Vulvaria
opulifolium Schrad. 312 (10 δ), A 211
paganum Rchb. A 65 (10 var.)
Pallasianum R. et S. = Kochia hirsuta
patulum Mérat = botryoides
Payco Molina = Roubiæva multifida
pedunculare Bert. 312 (10 β b)
polyspermum L. 310 (3)
portulacoides Thunb. = Atriplex port.
prostratum Sond. (polysperm.) = cymosum
pruinosum Guss. (murale) 311 (6 b) = albescens, cfr. A 64
Pseudo-Borbasii Murr A 65 (10 var.)
pseudo-ficifolium Murr A 65 (10 for.)
pumilum Goir. (*hybridum*) A 64 (5 b)
radiatum Schrad. = Cycloloma platyphyll.
rhombifolium Muehl. A 64 (7 β)
rhombifolium Schrad. A 65 (10 var.)
riparium Bœnn. = viridescens
rubrum L. 311 (8), A 65
ruderale St.-Lag. = Bonus-Henric.
saggittatum Lam. = Bonus-Henric.
salsum Guss., Rchb. = Suæda Jacquini
scoparium L. = Kochia scop.
secundiflorum Viv. = aristatum.
sericeum Vitm. = Kochia prostrata
serotinum Huds. = ficifolium
serotinum Ledeb. = album
serotinum Moq. (non L.) = ficifol.
serotinum Suter = hybridum
setigerum DC. = Suæda splendens
spicatum Koch (*album*) A 65 (10 α)
spicatum Moq. (polysperm.) = polysperm. (a)
spicatum Murr. = prec.
spinacifolium Stokes = Bonus-Henr.
stramoniifolium Chevall. = hybridum
striatiforme Murr A 65 (10 for.)
striatum Kras. (*album*) A 65 (10 var.)
striatum Murr = prec.
subglabrum Sond. (album) = viride
subintegrum Moq. (*hybridum*) A 64 (5 c)
subspicatum Nutt. = Atriplex hastat.
suffruticosum W. = ambrosioides

Digitized by Google

CHENOPODIUM I 309 (289)
triangulare Dulac = Bonus-Henr.
triangulare Forsk. = murale
triangularifolium Gilib. = Bonus-Henr.
trilobum Schult. = ficifolium
urbicum L. 311 (7), A 64
villosum Lam. = Kochia hyssopifol.
virgatum Jessen., Arc. (non Thunb.) = foliosum
virginicum L. = aristatum
viride Curt. = ficifolium
viride L. 312 (10 β)
viride Lois. = opulifolium
viridescens St.-Am. (*album*) A 65 (10 var.)
viridescens Murr. = prec.
vulgare Gueld. = album
Vulvaria L. 310 (4), A 64
CHERLERIA = Alsine
cæspitosa Lam. = A. Cherleria
ciliata Huter (sedoides) = A. Cherleria c. ciliata
corollata St.-Lag. (sediformis) = seg.
corollata Schur (sedoides) = A. — coroll.
imbricata Ser. = A. octandra
octandra Sieb. = A. oct.
sediformis St.-Lag = seg.
sedoides L. = A. Cherleria
CHILIADENUS = Jasonia
camphoratus Cass. = J. glutinosa
glutinosus Fourr. = prec.
CHILOCHLOA = Phleum
arenaria P. B. = Ph. arenarium
aspera P. B. = Ph. asperum
Boehmeri P. B. = Ph. Boehmeri
Gerardi Trin. = Alopecurus Gerardi
Michelii Tin. = Ph. Michelii
CHIRONIA = Hypericum
uliginosa Lap. = H. Helodes
CHLAMYDANTHUS = Thymelæa
hirsutus Griseb. = Th. hirs.
Tartonraira C. A. Mey. = Th. Tartonr.
Thymelæa C. A. Mey. = Th. Sanamunda
CHLORA II 357 (710)
acuminata Koch et Zis A 165 (2 γ d)
dubia Lam. = imperfoliata
exilis Goir. (*perfol.*) A 165 (2 d)
grandiflora Viv. 358 (2 β), A 165
imperfoliata L. f. 357 (1)
inarimensis Guss. (*perfol.*) 358 (2 γ c)
intermedia Ten. 358 (2 γ b)
lanceolata Koch et Zis. = imperfoliata
perfoliata L. 357 (2), A 165
perfol. var. β Bert. = ternata
serotina Koch 358 (2 γ), A 165
sessilifolia Desv. = imperfoliata
CHLORA II 357 (710)
sicula Tin. 357 (2 α b)
ternata B. Longo (*perfol.*) 257 (2 α c)
triphylla Badaro = quid?
CHLORIS = Cynodon
Cynodon C. A. Mey. = C. Dactylon
mucronata Mchx. = Dactyloct. ægyptiac.
CHLOROCHARIS = Heleocharis
palustris Rikli = H. pal.
CHLOROCREPIS = Hieracium staticæfolia Griseb. = H. static.
CHLOROCYPERUS = Cyperus
ægyptiacus Rikli = C. ægypt.
aureus Palla = C. aureus
badius Palla = C. badius
flavescens Rikli = C. flavesc.
glaber Palla = C. glaber
glomeratus Palla = C. glomer.
junciformis Rikli = C. distachyus
longus Palla = C. longus
Papyrus Rikli = C. Papyrus
rotundus Palla = C. rotund.
serotinus Palla = C. serot.
CHONDRILLA III 415 (944)
acanthophylla Borkh. 415 (1 β b)
angustifolia Doell (*junc.*) 415 (1 α)
angustissima Heg. = prec.
erysimifolia Poir. = Lactuca muralis
Gaudini Heg. = juncea
glabra Kit. (*junc.*) 415 (1 α b)
hispida Desf. = seg.
juncea L. 415 (1)
latifolia M. B. 415 (1 β)
muralis Lam. = Lactuca mur.
paniculata Lam. = prenanth.
Peltidium Moritz = Willemetia stipitata
Prenanthes Steud. = seg.
prenantholdes Vill. 416 (2)
pulcra Lam. = Crepis pulcra
purpurea Lam. = Prenanthes purp.
rigens Rchb. = latifolia
ruderalis Gærtn. = Lactuca muralis
sessiliflora Lam. = Lactuca viminea
spinulosa Koch (junc.) = acanthophylla
stipitata Sch. Bip. = Willemetia stip.
tenuifolia Lam. = Prenanthes tenuifol.
viminea Lam. = Lactuca vim.
virgata J. et C. Presl = juncea
viscosa Gilib. = juncea
CHONDROSEA = Saxifraga
Aizoon Haw. = S. robusta
aretioides Haw. = S. aret.
Beugesiaca Jord. et Fourr. = S. Aizoon (α)
Burseriana Haw. = S. Burser.
cæsia Haw. = S. cæsia
calyciflora Haw. = S. media
diapensoides Haw. = S. diap.
gracilescens Jord. et Fourr. = S. Aizoon (α)
CHONDROSEA = Saxifraga
mutata Haw. = S. mut.
orophila Jord. et Fourr. = S. brachyphylla
patens Haw. = S. pat.
petrophila Jord. et Fourr. = S. Aizoon (α)
punctillata Jord. et Fourr. = S. recta
pyramidalis Haw. = S. Cotyledon
rosularis Haw. = S. Aizoon (α)
tenella Haw. = S. ten.
valida Jord. et Fourr. = S. robusta
Vandellii Haw. = S. Vand.
viridula Jord. et Fourr. = S. recta
CHRISTOPHORIANA = Actæa
spicata Mœnch = A. spic.
vulgaris Rupr. = A. spicata
CHROZOPHORA II 290 (650) = Tournesolia, cfr. A 161
tinctoria A. Juss. 290 = T. tinct.
CHRYSANTHEMUM III 237 (869)
Achilleæ L. 244 (12 β)
adustum Koch (*montan.*) 241 (6 θ a)
affine Peterm. 239 (6 α e)
albidum DC. (*hybrid.*) 237 (1 β b)
alboradiatum Welw. (*coron.*) 238 (3 b)
album Savi (*sinense*) 243 (10 α d)
alpinum L. 242 (8), A 183
amplifolium Fiori (*Leuc.*) 240 (6 β), A 183
annuum Fiori 244 (nota)
asperulum Fiori (*Leuc.*) 240 (6 α i)
atratum Gaud. = Gaudini
atratum Jacq. = coronopifolium
atratum Koch (Leuc.) = Gaudini
atratum L. = heterophyll., montan. (a)
Audiberti Fiori (*vulg.*) 244 (14 γ)
auriculatum Peterm. = Leucanthem. (α)
baldense Fiori (*heteroph.*) 241 (6 η b)
Balsamita L. 242 (9)
balsamitellum G. Beck (Balsam.) = tanacetoides
barbatum Fiori (*sinense*) 243 (10 α e)
Bertolonii Jan = montanum
bertricense Wirt. (*Leuc.*) 239 (6 α d subf.)
bicolor Micheletti (*coron.*) 238 (3 c)
ceratophylloides All. 241 (7), A 183
ceratophylloides B Ten. = tenuifolium
cinerariæfolium Vis. A 183 (12 bis)
Clusii Fiori (*corymb.*) 243 (12 α d)
coronarium L. 238 (3)

Digitized by Google

CHRYSANTHEMUM III 237 (869)
coronopifolium DNtrs. (*Leuc.*) 239 (6 α d)
coronopifolium Vill. 242 (7 δ)
corsicum Sieb. = ceratophyll. (α)
corymbosum L. 243 (12)
crispum Fiori (*vulg.*) 244 (14 α b)
dentatum Gilib. = Leucanth.
denudatum Bœnn. (*Leuc.*) 239 (6 α a)
discoideum All. 238 (4)
discoideum Koch (*Leuc.*) 240 (6 α l)
discolor Guss. (hybrid.) = albidum
discolor Lojac. (coronar.) = bicolor
eradiatum Ambrosi (Leuc.) = Leuc. l. discoideum
flavum Savi (*sinense*) 243 (10 α c)
flosculosum Fiori (*Parthen.*) 243 (11 b)
flosculosum L. 238 (4)
Gaudini Dalla Torre 239 (6 α f)
glabrescens Fiori (*Leuc. d. coronop.*) 239 (6 α d subf.)
glabrum Fiori (*pallens*) 240 (6 δ b)
graminifolium L. 241 (nota)
graminifolium Ten., Bert. = tridactyl.
grandiflorum Lap. = maximum, heterophyllum, cfr. 340 (nota)
Halleri Sut. = coronopifolium
heterophyllum W. 241 (6 η)
hispidum Bœnn. (*Leuc.*) 239 (6 α b)
hortense G. Beck (*Parthen.*) 243 (11 c)
hybridum Guss. 237 (1 β)
indicum L. 243 (10), A 183
indicum Thunb. = sinense
inodorum L. = Matricaria inod.
italicum L. = Achilleæ?
japonicum Thunb. = indicum
laciniatum Fiori (*Leuc.*) 240 (6 ε), A 183
laciniatum Gilib. = segetum
lanceolatum Pers. = heterophyll.
lanuginosum Geners. 243 (12 α c)
latifolium Fiori (*Leuc.*) 240 (6 ζ)
Leucanthemum L 239 (6), A 183
Leucanthemum x Bert. = Leuc. d. coronopifol.
lobatum Briq. (*Leuc.*) A 183 (6 α subf.)
lobulatum Fiori (*heteroph.*) 241 (6 η c)
macranthum A. Terr. (*Leuc.*) 239 (6 α c)
macrophyllum W. et K. 244 (13)
maximum Ram. 240 (6 γ)
meridionale Legrand. 249 (6 α g)
CHRYSANTHEMUM III 237 (869)
microcephalum Goir. (*Parthen.*) A 183 (11 d)
minimum Vill. 242 (8 β), A 183
monocephalum Fiori (*corymb.*) 243 (12 α e)
montanum L. 241 (6 θ)
Myconis L. 237 (1)
pallens Fiori (*tridactyl.*) 241 (7 β b)
pallens Gay 240 (6 δ), A 183
pallidum Fiori (*Leuc.*) 240 (6 α h)
paludosum Ten. (non Poir.) = hybridum
paludosum B Ten. = albidum
Parthenium Bernh. 243 (11), A 183
perpusillum Lois. = Nananthea perpus.
pratense Salisb. = Leucanth.
pseudo-tomentosum Fiori (*minim.*) 242 (8 β b)
purpureum Pers. (*sinense*) 243 (10 α b)
radiatum Bicknell (*discoid.*) 238 (4 b)
rigidum Vis. = cinerariæfol.
rollensis Briq. (*alpin.*) 242 (8 α b)
rupestre Fiori (*Achill.*) 243 (12 β b)
rusticanum Goir. (*indicum*) A 183 (10 α b)
Saratoi Fiori (*discoid.*) 238 (4 c)
saxicolum Koch (*montan.*) 241 (6 θ b)
segetum L. 238 (2)
siculum Fiori (*vulg.*) 244 (14 β)
silvaticum Jauvy = pallens
sinense Sabine 243 (10 β)
subcorymbosum Schur = Clusii
tanacetoides Fiori (*Balsam.*) 242 (9 β)
Tanacetum Vis. = tanacetoides
tenuifolium Fiori (*ceratoph.*) 241 (7 γ)
tenuifolium Fiori (*corymb.*) 243 (12 α b)
tenuifol. Ten. ex Steud. = Achilleæ
tomentosum Lois. 242 (8 γ)
Trattinikii G. Beck (*corymb.*) 243 (12 α f)
tridactylites Fiori (*ceratoph.*) 241 (7 β), A 183
tripartitum Sweet = indicum
Turreanum Vis. = cinerariæfol.
Vallisumbrosæ Fiori (*Leuc. h. pallidum*) 240 (6 α h subf.)
variabile Roch. = Leucanthem.
variabile Ten. p. p. = montanum
vulgare Bernh. 244 (14)
vulgare Fiori (*Leuc.*) 239 (6 α)
CHRYSEIS = Centaurea
Centaurium Kostel. = C. Cent.
CHRYSION = Viola
biflorum Spach = V. biflora
CHRYSOCOMA = Aster
camphorata Rob. et Cass. = Jasonia glutinosa
CHRYSOCOMA = Aster
denticulata Jacq. = Chrysanthem. discoideum
graminifolia Bœber = A. Linosyris
liburnica Spr. = Aster — palustris
Linosyris L. = Aster Linos.
nupera S. F. Gray = prec.
palustris Savi = A. — palustr.
saxatilis DC. = Jasonia glutinosa
tenuifolia Salisb. = A. Linosyris
verticalis Lag. = Jasonia glutinosa
vulgaris Gueld. = A. Linosyr.
CHRYSOPOGON I 45 (44)
Gryllus Trin. 45
CHRYSOSPLENIUM I 542 (448)
alpinum Schur = oppositifol.
alternans Thunb. = seg.
alternifolium L. 542 (1)
auriculatum Crantz = oppositifol.
dubium DC. = macrocarp.
macrocarpum Cham. 542 (3), A 114
oppositifolium L. 542 (2)
oppositif. C Ten. = macrocarp.
ovalifolium Bert. = macrocarp.
repens Lk. = oppositifol.
tetrandrum Fr. = alternifol.
CHRYSURUS = Cynosurus
aureus Spr. = Lamarkia aurea
cynosuroides Pers. = Lamarkia aurea
echinatus P. B. = C. echin.
effusus P. B. = C. elegans
elegans R. et S. = C. elegans
giganteus Ten. = C. echinatus
gracilis Moris = C. gracil.
paradoxus Somm. = C. paradox.
CHULUSIUM = Polygonum
amphibium Raf. = P. amph.
CICENDIA II 357 (709)
campestris Raf. = Gentiana camp.
Candollei Griseb. = pusilla
filiformis Delarb. 357 (2)
pulchella Griseb. = Erythræa pulch.
pusilla Griseb. 357 (1)
tenella Raf. = Gentiana ten.
CICER II 98 (514)
arietinum L. 98
ervoides Brign. = Vicia Lenticula
grossum Salisb. = arietin.
Lens W. = Vicia Lens
physodes Rchb. = arietin.
sativum Schk. = prec.
CICERBITA = Mulgedium
alpina Wallr. = M. alpinum
corymbosa Wallr. = Lactuca quercina
leucophæa Wallr. = M. alpin.
muralis Wallr. = Lactuca mur.
quercina Wallr. = Lactuca querc.
CICERCULA = Lathyrus
alata Mœnch = L. sativus
alba Medic. = prec.
anceps Mœnch = L. Cicera
cærulea Medic. = L. sativus

Digitized by Google

CICERCULA = Lathyrus
Cicera Alef. = L. Cicera
sativa Medic. = L. sativ.
CICHORIUM III 885 (926)
albiflorum Rod. et Ven. (*Intyb.*) 885 (2 α e)
apulum Fiori (*Intyb.*) 886 (2 δ)
cæruleum Gilib. = Intybus
Cicorea Dum. = prec.
commune Guss. (*Endivia*) 886 (3 a)
commune Pall. = Intybus
crispum Mill. 886 (3 c)
divaricatum Fiori = apulum
divaricatum Schousb. 886 (2 ε b)
domesticum Pollini (Intyb.) = indivisum
Endivia L. 886 (3)
esculentum Salisb. = prec.
glabratum Presl 885 (2 β)
glanduliferum Fiori (*apulum*) 886 (2 δ b)
hortense Blachw, Goir. (Intyb.) = indivisum
indivisum Vis. (*Intyb.*) 886 (2 γ)
intermedium Rota (*Intyb.*) 885 (2 α b)
Intybus L. 885 (2)
latifolium Guss. (*Endivia*) 886 (3 b)
latifolium Guss. (*Intyb.*) 885 (2 γ b)
maritimum Freyn (*Intyb.*) 885 (2 α d)
minimum Portenschl. = pumilum
officinale Gueld. = Intybus
perenne Stokes = prec.
pumilum Jacq. 886 (2 ε)
rigidum Salisb. = Intybus
sativum Bischoff (Intyb.) = indivisum
silvestre Bischoff (Intyb.) = Intybus (α)
silvestre Lam. = prec.
spinosum Groves = glanduliferum
spinosum L. 885 (1)
subspicatum Vechtr. (*Intyb.*) 885 (2 α c)
CICUTA II 162 (552)
Amomum Crantz = Sison Amom.
angustifolia Kit. = virosa
cellulosa Gilib. = virosa
Cynapium Crantz, Targ. = Æthusa Cynap.
dichotoma Poir. = Krubera peregrina
latifolia Crantz = Sium latifol.
maculata Lam. (non L.) = Conium macul.
major Lam. = Conium maculatum
nodiflora Crantz = Apium nodifl.
officinalis Crantz = Conium maculatum
sicula Crantz = Kundmannia sic.
virosa L. 163, A 151
CICUTA II 162 (552)
virosa Solla = Chærophyll. hirsutum
CICUTARIA = Cicuta
aquatica Lam. = C. virosa
dioica Mœnch = Trinia vulgaris
verticillata Mœnch = Molopo-sperm. peloponnesiacum
virosa Clairv. = C. vir.
CILIARIA = Saxifraga
aspera Haw. = S. aspera
bryoides Haw. = S. bryoid.
CINCINALIS = Notholæna
aquilina Trevis. = Pteris aquil.
Marantæ Desv. = N. Mar.
subcordata Desv. = N. Marantæ
CINERARIA = Senecio
alata L. (alpina) = S. alp. v. auricul.
alata L. (alpina) = S. lyratifolius
alpestris Hpe. = S. alpestris
alpina All. = S. aur. b. tomentosus
alpina Huds. = S. campester
alpina Jacq. (integrif.) = S. — Hoppeanus
alpina L. = S. alpinus
alpina α L. = S. alpin. (α)
ambigua Biv. = S. ambig.
anthemoides Lam. = S. exsquameus
arachnoidea Rchb. = S. arachn.
aurantiaca Hpe. = S. aur.
auriculata Jacq. (cordifol.) = S. alp. v. auricul.
bicolor W. = S. bicolor
calvescens Nym. = S. Ciner. × erraticus
campestris Retz. = S. camp.
candida Presl = S. Ciner. v. nebrod.
capitata Whlnb. = S. — capitatus
ceratophylla Ten. = S. — ceratoph.
cernua Thore = Arnica — angustifolia
Clusiana Host = S. ovirensis
cordifolia Gouan = S. alpinus (α)
crassifolia Kit. = S. — crassif.
crispa Jacq. = S. crispatus
discoidea Koch (aurant.) = S. — capitatus
discoidea Koch (longifol.) = S. — calvus
Farfara Bernh. = Tussilago Farf.
glabrata Lojac. (ambigua) = S. amb. b. glabr.
gibbosa Guss. = S. gibbosus
humilis Rchb. (camp.) = S. — humil.
humilis Ten. (camp.) = S. — Tenorei
integrifolia L. (alp.) = S. campester
integrifolia Vill. = S. aur. b tomentosus
integrifolia W. = S. — Hoppeanus
integrifolia With., Sm. = S. campester
CINERARIA = Senecio
lanata Koch (aurant.) = S. aur. b tomentosus
lanceolata Lam. = S. spathulæfol.
longifolia All. = S. Balbisianus
longifolia Bess. = S. papposus
longifolia Jacq. = S. alpester
longifolia Koch = S. brachychætus
longifolia β Bert. = S. — subcordatus
lyrata Koch (cordifol.) = S. lyratifol.
maritima L. = S. Cineraria
nebrodensis Guss. = S. Ciner. v. nebrod.
nebrod. b Guss. = S. — Cupani
ovirensis Koch = S. oviren.
papposa Koch (campestr.) = S. papp.
pedemontana DC. (longif.) = S. Balbisianus
pratensis Hpe. = S. prat.
pratensis Jacq. (integrifol.) = S. campester
procera Rchb. (camp.) = S. — procer.
radiata Rchb. (capitata) = S. aur. b tomentosus
rivularis W. et K. = S. rivul.
spathulæfolia C. C. Gm. = S. spath.
tenuifolia Gaud. = S. Gaudini
uliginosa Lk. = S. exsquameus
vulgaris DC. (camp.) = S. — procerus
Zahlbruckneri Host = S. lyratifol.
CIRCÆA II 134 (531)
alpestris Wallr. = seg.
alpina L. 134 (1)
cordifolia Stokes = prec.
decumbens Gilib. = alpina
erecta Gilib. = lutetiana
glabra Soy.-Will. (lutet.) = lutet. × alp.
intermedia Ehrh. = lutet. × alp.
lutetiana L. 135 (2)
lutet. × *alpina Mey.* 135
major Lam. = lutetiana
major Spenn. (alpina) = lutet. × alp.
mediterranea Asch. et Magn. (*lutet.*) 135 (2 b)
minima Lam. = alpina
nemoralis Salisb. = lutetiana
ovatifolia Stokes = prec.
pubescens Mart. = lutetiana
sterilis Dœll (alpina) = lutet. × alp.
vulgaris Mœnch = lutetiana
CIRCINUS II 66 (492)
circinnatus O. Ktze. 66
vulnerarioides Medic. = prec.
CIRSELLIUM = Atractylis
cancellatum Gærtn. = A. canc.
gummiferum Brot. = Carlina gumm.
CIRSIUM III 361 (919)
acanthifolium Arv. T. = tricephalodes
Acarna Mœnch 364 (8)
acaule Scop., All. 372 (20)

Digitized by Google

CIRSIUM III 361 (919)
acaule var. Cocc. = acaul. f. albiflorus
acauli × *Erisithales Treuinf.* 372
acauli × *heteroph. Treuinf.* 372
acauli × montanum Eichenf. = triceph. × acaule
acauli × *oleraceum Næg.* 373
acauli × *palustre Gelmi* 372
acauli × *spinosiss. Næg.* 373
acauli × *tricephalodes Fiori* 372
acaulos Scop. = acaule
affine Tausch. = heteroph. × olerac.
afrum DC. 368 (6), A 190
albidum DC. (ambiguum) = heter. × spinosiss.
albiflorum Fiori (*acaule*) 372 (20 α b)
albiflorum Goir. (*erioph.*) 366 (11 α d)
albiflorum Maur. (*syriac.*) 364 (7 b)
albiflorum Zersi (*palustre*) 369 (15 α b)
aleutrense Porta = triceph. × spinosiss.
Allionii Spenn. = acaule
Allionii Thur. = tricephalodes
alpestre Næg. = heter. × acaule
alpinum All. = Saussurea alp.
ambiguum All. 374 (×)
ambiguum Koch. = Tappeineri
anglicum DC. 373 (21 β), A 191
anglicum Hausm. = pannonicum
arctioides Scop. = Carduus Carduelis
argenteum Vest. 368 (14 δ)
argent. × *palustre Porta* A 190
argentoides Porta = prec.
armeniacum Fiori (*polyanth.*) 370 (16 α c)
armeniacum Ten. (pungens) = prec.
arvense Scop. 368 (14)
arvensi × *palustre Næg.* 368
Ausserdorferi Hausm. = Eris. × palustre
autareticum Mutel = heter. × spinosiss.
benacense Treuinf. = carniol. × Erisith.
Bertolonii Spr. 377 (25 β)
bifrons Arv. T. 374 (×)
Boujarti Savi (non Alior.) = Lobelii
brachyatum Porta = tricephalod. × palustre
brachycentrum DC. (*polyanth.*) 369 (16 α b)
brachycephalum Jur. = arvensi × palustre
breviscapum Eichenf. 372 (×)
brixiense Porta = carniol. × tricephal.
bulbosum DC. = tuberosum
bulbosum Lam. = monspessul.
bulb. × acaule Næg. = tuber. × acaule
bulb. × olerac. Goir. = tuber. × olerac.
calabrum Fiori (*Vallis-Dæmonii*) 367 (11 ζ b)
Candolleanum Næg. = Erisith. × olerac.
canum All. = monspessul. ?
canum Mœnch 370 (17)
cano × *palustre Winm.* 370
capitatum Arv. T. = spinosiss. × triceph.
carnicum Nic. = Carduus rhæticus
Cardo-Leonis Lojac. A 190
carniolicum All. = tricephalodes
carniolicum Scop. 378 (26)
carn. × *Erisithal. Treuinf.* 379
carn. × montan. Porta = seg.
carn. × *tricephalodes Fiori* A 191
Casabonæ DC. 363 (3)
caulescens DC. (acaule) = dubium
Celakovskianum Knaf. = arvensi × palustre
Cervini Koch = heter. × spinosiss.
Chailleti Gaud. A 190 (15 α d)
Chailleti Koch = arvensi × palustre
Chamæpeuce Ten. = gnaphaloides
cichoraceum Spr. = Serratula cichor.
coarctatum Fiori (*Bertol.*) 377 (25 β a)
compactum Lam. = monspessul.
complicatum Goir. (arvense) = mite Wimm. et Grab.
Concilii Porta = palustri × tricephalod.
congestum Goir. (*palustre*) A 190 (15 α c)
controversum DC. = heter. × spinosiss.
crinitum Boiss. A 190 (9 bis)
cynaroides Griseb. = afrum
decipiens Franchet = acauli × spinosiss.
decoloratum Koch = acauli × olerac.
decussatum Janka 367 (nota)
defloratum Scop. = Carduus deflor.
dentatum Fiori (*strictum*) 363 (4 c)
denudatum Fiori (*Morisian.*) A 190 (11 δ c)
digeneum Burn. = Erisith. × triceph.
dioicum Cass. = arvense (α)
discolor Neilr. (lanceol.) = silvaticum
dissectum Lam. 373 (21 α b)
Dollineri Sch. Bip. = Erisith. × pannon.
dubium Lojac. A 190
dubium Nic. = silvaticum
dubium W. 372 (20 β)
echinatum DC. 367 (12), A 190
elatum Næg. (*acauli* × *oler.*) 373 (×)
elatum Porta = pannon. × olerac.
elatum Saut. = Erisith. × olerac.
elatum Tod. = scabrum
eriocephalum Wallr. = platyonychinum
eriophorum Lojac. (*gigas*) A 190
eriophorum Scop. 366 (11), A 190
Erisithales Scop. 376 (24)
Eris. × *acaule Porta* A 191
Eris. × Allioni Burn. = Erisith × triceph.
Eris. × *heterophyll. Næg.* 374
Eris. × montan. Porta = Erisith. × triceph.
Eris. × *oleraceum Næg.* 377
Eris. × *palustre Neilr.* 369
Eris. × *pannonic. Heer* 376, A 191
Eris. × *spinosiss. Næg.* 378
Eris. × *tricephalod. Fiori* 377
Eris. × *tuberosum Bickn.* 376
erisithaloides Huter 376 (×)
erucagineum DC. Fl. Fr. = rivulari × olerac.
erucagineum DC. Prodr. = heter. × spinosiss.
extraneum G. Beck = cano × palustre
Fabium Porta = triceph. × Erisith.
ferox Auct. it. = Morisianum
ferox Caruel = Lobelii
ferox DC. 367 (11 η)
finissimum Rota 379 (nota)
firmum Arc. 365 (nota)
firmum Tod. (lanceol.) = prec.
fissibracteum Peterm. = acauli × spinosiss.
fissum Ausserd. 378 (nota)
flavescens Koch = Erisith. × spinosiss.
floccosum Posp. (*pannon.*) 371 (19 γ)
foliosum Fiori (*stellat.*) 362 (2 b), A 217
Freyerianum Koch = pann. × acaule
Ganderi Huter 378 (×)
Gerhardi Sch. Bip. = lanceol. × eriophor.
giganteum Spr. = scabrum
gigas Lojac. A 190
glabrum Gelmi (*erioph.*) 366 (11 α c)
glaucescens (*Treuinf.*) 372 (×)
glomeratum Fiori (*pannon.*) 371 (19 δ)
glutinosum Lam. = Erisithales
gnaphaloides Spr. 362 (1)
Gutnickianum Loehr 373 (×)
Hallerianum Gaud. = heter. × spinosiss.
Hausmanni Rchb. f. (heter. × Erisith.) = Eris. × heter.
helenioides All. = heter. f. indivisum
helenoid. × *acaule Porta* A 191

Digitized by Google

CIRSIUM III 361 (919)
hemipterum Borb. = pal. × pannonic.
heterophylloides Treuinf. = heter. × spinosiss.
heterophyllum Hill, All. 374 (22), A 191
heter. × *acaule Næg.* 372
heter. × *Erisithales Næg.* 374
heter. × montan. Gelmi = heter. × triceph.
heter. × *oleraceum* A 191
heter. × rivulari Auct. = heter. × triceph.
heter. × *spinosiss. Næg.* 375
heter. × *spinos.* × *tricephal. Fiori* 375
(*heter.* × *spinos.*) × *tricephal.* 375
heter. × *tricephalodes Fiori* 374
Hippolyti Fiori (*creticum*) 370 (16 β d)
horridum Posp. (*palustre*) 369 (15 β)
horridum Wimm. et Grab. (*arvense*) 368 (14 β)
humile Goir. (*lanceolat.*) A 190 (10 α b)
humile Næg. (*acauli* × *oler.*) 373 (×)
Huteri Hausm. = pal. × Eris.
hydrophylum G. Beck (*arvense*) 368 (14 ε)
hypoleucum DC. (lanceol.) = silvaticum
hypoleucum Rchb. (setosum) = incanum
incanum Fisch. 368 (14 γ)
incisum DC. (*heteroph.*) 374 (22 α)
indivisum DC. (*heteroph.*) 374 (22 b), A 191
indiv. × *Erisith. Gelmi* 374
indiv. × *tricephal. Gelmi* 374
inerme Rchb. = tuber. × olerac.
integrifolium Longo (*polyanth.*) 370 (16 α e)
integrifolium Wimm. et Grab. (arvense) = arvense (α)
intermedium Fiori (*Morisian.*) A 190 (11 δ b)
italicum DC. 365 (9)
Kochianum Loehr = pal. × tuberos.
Lachenalii Koch = acauli × olerac. et tuber. × olerac.
laciniatum Dœll. = pal. × tuberos.
lanatum Peterm. (lanceol.) = silvaticum
lanceolatum Scop. 365 (10), A 190
lanceol. × *acaule Næg.* 366
lanceol. × *arvense Wimm.* 365
lanceol. × *eriophor. Hegelm.* 365
lanigerum Næg. = silvaticum
lappaceum Lam. = Carduus Personata
Linkianum Loehr. = pannon. × Erisith.
Lobelii Lojac. exs. = Vallis-Dæmoni

CIRSIUM III 361 (919)
Lobelii Ten. 367 (11 ε)
Lobelii B Ten. = Morisianum
longispinosum Tod. ex Nym. = lanceolatus
longispina Vis. (palustre) = sec.
longispinum Lojac. (*polyanth.*) A 191 (16 for.)
longispinum Pichler 370 (16 α f)
lucanicum Lojac. 365 (nota)
macrocephalum Fiori (*scabrum*) A 190 (13 for.)
macrocephalum Lojac. (gigant.) = prec.
macrostylon Rchb. 368 (14 ζ)
maculatum Lam. = Carduus leucographus
maculatum Mœnch = syriacum
maculatum Scop. = Silybum Marianum
medium All. = tuber. × acaule
microcephalum Moris 363 (5)
microcephalum Sch. Bip. = creticum
Mielichoferi Saut. = heteroph. × olerac.
misilmerense Ces. P. et G. 365 (nota)
mite Fiori (*syriac.*) A 190 (7 for.)
mite Nic. (*polyanth.*) 370 (16 α d)
mite Wimm. et Grab. (*arvense*) 368 (14 α b)
molle Scop. = Jurinea mollis
monocephalum Bolzon (*olerac.*) 379 (27 c)
montanum Spr. = tricephalodes
mont. × Erisith. Eichenf. = triceph. × Erisith.
mont. × heteroph. Arv. T. = bifrons
mont. × palustre Porta = tricephalod. × pal.
mont. × spinosiss. Porta = triceph. × spinos.
monspessulanum All. 371 (18)
Morettianum Nym. = spathulatum
morinæfolium Arc. (non Boiss. et Heldr.) = Vallis-Dæmoni
Morisianum Rchb. f. 367 (11 δ), A 190
nemorale Rchb. = silvaticum
niveum Spr. 364 (6 β), A 190
nolitangere Borb. = lanceol. × eriophor.
Norrisii Bickn. = Erisith. × tuber.
nudatum Porta (erioph.) = glabrum
ochroleucum All. 376 (24 β)
ochroleucum Ten. et Auct. pl. = Erisithales (α)
oleraceum Scop. 379 (27)
oler. × acaule Hampe = acauli × olerac.
oler. × canum Bolzon 379 = = oleraceum, cfr. A 191
oler. × Erisith. Auct. = Eririsith. × olerac.
oler. × bulbos. Næg. = tuber. × olerac.

CIRSIUM III 361 (919)
oxyonychinum Wallr. (erioph.) = eriophorum (α)
pallens DC. = tuber. × olerac.
palustre Groves = creticum
palustre Scop. 369 (15), A 190
pal. × bulbosum = pal. × tuber.
pal. × *Erisith. Næg.* 369, A 191
pal. × *helenoides Porta* A 190
pal. × *monspessulan. Gr. et Godr.* A 190
pal. × montan. Porta = pal. × tricephal.
pal. × pannonicum = pann. × pal.
pal. × *tricephalodes Fiori* A 190
pal. × *tuberos. Weiss.* 369, A 190
paniculatum Fiori (*strictum*) 363 (4 b)
pannonicum Gaud. 371 (19)
pann. × *acaule Næg.* 371, A 191
pann. × *Erisith. Næg.* 376
pann. × *oleraceum Porta* (*an Schur?*) A 191
pann. × palustre Koch = arvensi × palustre
pann. × *palustre Neilr.* 371
pauciflorum Spr. 374 (nota)
pinnatifidum Celak. (*pann.* × *acaule*) A 191
platyonychinum Wallr. (*erioph.*) 366 (11 α b)
polyanthemum DC. 369 (16), A 191
polyanthos Urv. 370 (16 β c)
polymorphum Dollin. = Erisith. × pannon.
Portæ Hausm. 376 (×)
Portæ Huter et Porta = Carduus rhæticus
pratense W. = anglicum
pungens Spr. = polyanthem. (α)
purpureum All. = heter. × spinosiss.
pyrenaicum All. = tricephalodes
ramosum Næg. (*tuberos.*) 373 (21 α c)
rheginum Spr. = strictum
rigens Wallr. = acauli × olerac.
rigidum Porta = palustri × helenoid.
rivulare All. et Auct. it. = tricephalodes
rivulare Lk. 375 (*nota*)
rivulari × *arvense Ces.* 379 (nota)
rivulari × *oleraceum* 379 (nota)
Rosani Ten. 365 (10 α b)
Rosenii Nym. = dubium
rubrum Porta = erisithaloides
rubrum Porta (Erisith.) = prec.
sabaudum Ruhmer = lanceol. × acaule
scabrum Bonnet et Barr. 368 (13), A 190
Scolopendron Porta = helenoid. × acaule

Digitized by Google

CIRSIUM III 361 (919)
semidecurrens Richt. = pal. × tuberos.
Sennholzi Eichenf. 374 (×)
serratuloides Scop., All. (non DC.) = pannonicum
setosum M. B. 368 (14 α)
siculum DC. 370 (16 β b)
siculum Spr. = Lupsia Galactites
silesiacum Schultz = cano × palustre
silvaticum Tausch 365 (10 β)
sinuato-dentatum Holuby (pannon.) 371 (19 β)
solanum Porta = Erisith. × acaule
sonchifolius Kittel (olerac.) 379 (27 b)
spathulatum Gaud. 366 (11 β)
spinosissimoides Ausserd. 378 (nota)
spinosissimum Scop. 377 (25)
spin. × acaule Næg. = acauli × spinosiss.
spin. × Allioni Burn. = variegatum
spin. × Erisithal. Koch 378
spin. × heteroph. 378 (nota)
spin. × heter. × montan Gelmi = heter. × spinos. × triceph.
spin. × palustre Gelmi 377
spin. × palustre × Erisith. Gelmi 377
spin. × palustre × heteroph. Gelmi 378
spin. × tricephal. Fiori 378
spurium DC. (erioph.) 366 (11 γ)
stellatum All., Spr. 363 (2), A 190, 217
Stonum Porta 376 (×)
strictum Moris = microcephalum
strictum Ten. 368 (4)
subbipinnatum Lojac. (lanceol.) A 190 (10 α for.)
suspiciosum G. Beck. = pann. × palustre
syriacum Gærtn. 364 (7), A 190
Tappeineri Rchb. f. (heter. × Erisith.) 374
tataricum DC. = acauli × olerac.
tenuifolium Fiori (stellat.) 362 (2 c), A 217
tenuispinum Lojac. (lanceol.) A 190, (10 α subf.)
Thureti Burn. = variegatum
tirolense Treuinf. 372 (×)
tonalense Gelmi = triceph. × acaule
Treuinfelsianum Ausserd. = acauli × olerac.
tricephalodes DC 375 (23), A 191
triceph. × acaule Fiori A 372
triceph. × Erisith. Fiori 376
triceph. × palustre Fiori A 190
triceph. × spinosiss. Fiori 378
tuberosum All. 373 (21), A 191
tuber. × acaule Sch. Bip. 374
tuber. × oleraceum F. Sz. A 191
urbanum G. Beck = cano × palustre.
Vallis-Dæmonii Lojac. 367 (11 ζ)
Vallis-Dæmonii var. Lojac. = calabrum
variabile Porta = palustr. × Erisith.
variegatum Arv. T. 378 (×)
vestitum Wimm. et Grab. (arvense) = incanum
valgare Næg. (erioph.) 366 (11 α)
vulgare Næg. (lanceol.) 365 (10 α), A 190
vulgare Ten. = lanceolat.
Wankelii Reichr. = palustri × helenoid.
Wimmeri Celak. = cano × pal.
Zizianum Koch = tuber. × acaule
CISSUS = Parthenocissus
hederacea Pers. = P. quinquefolia
quinquefolia Desf. = prec
CISTOCARPIUM = Vesicaria
utriculatum Spach = V. utric.
CISTRUM = Centaurea
asperum Hill = C. aspera
Isnardi Hill = prec.
napifolium Hill = C. napifol.
CISTUS I 398 (354)
acuminatus Viv. = Hel. Viviani
ægyptiacus L. = Helianth. æg.
affinis Bert. in Guss. 399 (2 c)
albidus L. 401 (7), A 83
albido × crispus Del. 401 (nota)
alpestris Jacq., Crantz = Hel. alpestre
anglicus L. = Hel. italicum
angustifolius Fiori (laurifol.) A 83 = lanceolatus, cfr. A 211
angustifolius Jacq. = Hel. tomentosum
angustifolius Lag. = Hel. leptophyllum
apenninus L. = Helianth. apenn.
apricus Timb. = brevipedunculat.
arabicus L. = Helianth. arab.
arrigens Timb. A 83 (3 α f)
barbatus Lam. = Hel. barbatum
Barrelieri Steud. = Hel. Barr.
biflorus Wk. (salvifol.) 399, A 83 (3 α c)
brevipedunculatus Wk. (salvifol.) A 83 (3 α a)
calycinus L. = Hel. Fumana
canus All. = Hel. Allionii
canus L. = Helianth. canum
Clusii Dun. 398 (1), A 83
collinus Salisb. = monspeliensis
complicatus Lam. = parviflorus
corbariensis Rchb. (non Pourr.) = fruticans
corbariensis Vis. et Sacc. (salvifol.) = fruticans?
cordifolius Parl. (salvifol.) = grandifol.
coridifolius Vill. = Hel. ericoides
corsicus Lois. 400 (5 γ)
creticus L. 400 (5 δ), A 83
creticus Lois. = villosus
crispus L. 400 (6)
crispo × albidus Timb. = albido × crisp.
croceus Desf. = Helianth. croc.
Cupanianus Presl = villosus
cymosus Dun. = parviflorus
cymosus Wk. (salvifol.) 393, A 83 (3 α d)
Delilei Burn. = albido × crispus
elegans Timb. = cymosus
ericoides Cav. = Helianth. eric.
eriocephalus Viv. = villosus
fastigiatus Guss. = Clusii
feredjensis Batt. = monspel. × salvifol.
ferrugineus Lam. = Hel. arabicum
Flichei Fouc. et Sim. = monspel. × salvifol.
florentinus Lam. = monspel. × salvifol.
floribundus Tausch = laurifolius
fruticans Timb. A 83 (3 α e)
Fumana L. = Helianth. Fum.
Fumana β L. = Hel. ericoides
galactites Schmid. = Hel. Chamæcistus
garganicus Ten. 400 (5 δ b)
glaucophyllus Lam. = Hel. levipes
glaucus Cav. = Hel. glaucum
glaucus Salisb. = Hel. levipes
glutinosus L. = Hel. glutin.
grandiflorus Scop. = Helianth. grandifl.
grandifolius Wk. (salvifol.) 399 (3 β)
guttatus L. = Helianth. gutt.
halimifolius L. = Hel. halim.
helianthemoides Crantz = Hel. glabrum
Helianthemum L. = Hel. Chamæcistus
hirsutus Thuill. = Hel. obscurum
hirtus Gilib. = Hel. obscurum
hirtus L. = rosmarinifol.
humifusus DC. (salvifol.) A 83 (3 α g)
humilis Salisb. = Hel. tomentosum
humilis Timb. = longipedunculatus
incanus Gr. et Godr. = villosus
incanus L. 400 (5), A 83
incanus β Bert. = villosus
incanus β Guss. = Skanbergii
incanus S. et S. = parviflorus
italicus L. = Helianth. ital.
Jacquini Wk. (creticus) = creticus for.
ladaniferus L. 401 (nota)
lanceolatus Rouy et Fouc. (laurifol.) A 211 (3 bis b)

Digitized by Google

CISTUS I 398 (354)
lanceolatus Vahl = Hel. plantagin.
lanuginosus Viv. = Hel. ledifolium
laurifolius L. 401 (nota), A 83, 211 (8 bis)
lavandulæfolius Lam. = Hel. lavand.
ledifolius L. = Helianth. ledif.
Ledon Lam. 401 (nota)
lejocarpus Rouy et Fouc. (*corsicus*) 400 (5 γ b)
levipes L. = Helianth. lev.
levis Cav. = Hel. viride
Libanotis Lam. = Clusii?
lilacinus Hoffmgg. = parviflorus
Lippii L. = Helianth. Lippii
longipedunculatus Wk. (*salvifol.*) A 83 (8 α b)
lunulatus All. = Helianth. lun.
luteus Gilib. = Hel. tomentosum
marifolius L. p. p. = Hel. canum
major Lam. (guttat.) = Hel. plantagin.
micranthus Viv. = Hel. salicifolium
microphyllus Timb. = longipeduncul.
minor Wk. (*monspel.*) 399 (2b)
monspeliensis L. 399 (2)
monspel. × *salvifolius Lor. et Barr.* 399, A 88
Morisii Wk. (*creticus*) 400 (5 δ c)
niloticus L. = Hel. ledifolium
nummularius Cav. = Hel. rotundifol.
nummularius L. = Hel. ovatum
occidentalis Wk. (polymorphus) = incanus (α)
œlandicus Jacq. (non L.) = Hel. alpestre
olbiensis Huet et Hanry = monspel. × salvifol.
oleæfolius Mill. = monspeliensis
ovatus Viv. = Helianth. ovat.
parviflorus Lam. 399 (4), A 83
parvifloro × monspel. Lojac. = Skanbergii
perquerollensis Huet et Hanry = monspel. × salvifol.
piliferus Gmel. = Hel. apenninum (α et β)
pilosus All. = Hel. apenninum (α et β)
pilosus L. (1753) = Helianth. pilos.
pilosus L. (1762) = villosus
plantagineus W. = Helianth. plant.
platyphyllus Timb. = grandifol.
polifolius L. = Helianth. polif.
polymorphus Wk. = incanus
pulverulentus Thuill. = Hel. pulver.
punctatus W. = Hel guttatum
racemosus Cav. = Hel. lavandulæfolium
rhodanensis Timb. = biflorus
roseus All. = Helianth. ros.

CISTUS I 398 (354)
roseus Jacq. = Hel. roseum et acuminatum
rosmarinifolius All. 398 (nota)
rosmarinifolius Pourr. = Clusii
rotundifolius Sweet = virescens
salicifolius Cav. = Hel. intermedium
salicifolius L. = Helianth. salic.
salvifolius L. 399 (3), A 83
salvifol. × monspel. Timb. = monsp. × salv.
sampsuchifolius Sims = Hel. guttatum
sanguineus Lag. = Hel. retrofractum
serpyllifolius Crantz = Hel. glabrum
serpyllifolius L. = Hel. tomentosum?
serratus Cav. = Hel. guttatum
serratus Desf. = Hel. plantagineum
sessiliflorus Desf. = Hel. sessilifl.
sessiliflorus Spach (vulgaris) = albidus
sessilifolius Spach (vulgar.) = albidus
Sideritis Presl = salvifolius
Skanbergii Lojac. 400 (×)
splendens Lam. = Hel. apenninum (α et β)
strictus Cav. = Hel. pilosum
syrticus Viv. = Hel. thymifol.
tauricus Ledeb. (creticus) = villosus
Tenorei Wk. (creticus) = garganicus
thymifolius L. = Hel. thym.
tomentosus Lam. = villusus?
tomentosus Scop. = Helianth. tom. et Scopolii
Tuberaria L. = Helianth. Tuber.
umbellatus L. = Hel. umb.
undulatus Sweet = villosus
valentinus Pourr. ex Nym. = monspel. × salvifol.
velutinus Timb. = longipedunculat.
villosus L. 400 (5 β), A 83
villosus Moris p. p. = Morisii
vinealis W. = Helianth. vin.
virescens Dun. (*incanus*) 400 (5 α b)
virescens Dun. (villosus) = prec.
viscidus Wk. (polymorph.) = corsicus
vulgaris Spach = incanus
CITRULLUS = Cucumis
aquosus Schur = C. Citrullus
caffer Schrad. = prec.
Colocynthis Schrad. = C. Coloc.
edulis Spach = C. Citrullus
fistulosus Stocks = prec.
Pasteca Sageret = prec.
vulgaris Schrad. = prec.
CITRUS II 257 (636)
acida Pers. = medica
amara Lk. = Bigaradia
aurata Risso = seg.
Aurantium L. 257 (2)

CITRUS II 257 (636)
Bajoura Bonavia (medica) = medica (α)
Bergamia Risso 257 (2 γ)
Bergamota Raf. = prec.
Bigaradia 258 (2 ε)
Cedra Lk. = medica (α)
cedrata Raf. = prec.
decumanus L. (Auran.) = grandis
decumanus L. = prec.
deliciosa Ten. = nobilis
dulcis Pers. = Aurantium (α)
florida Salisb. = Aurantium
fragrans Salisb. = medica
grandis L. (*Aurant.*) 258 (2 ζ)
Limetta Risso 258 (2 δ)
Limon L. (*medica*) 257 (1 β)
Limonum Risso = prec.
medica L. 257 (1)
nobilis Lour. 257 (2 β)
tuberosa Mill. = medica
vulgaris Risso = Bigaradia
CLADIUM I 124 (139)
germanicum Schrad. = Mariscus
leptostachyum Nees = Mariscus
Mariscus R. Br. 124
occidentale R. et S. = Mariscus
palustre Poir. in Schult. = Mariscus
CLAIRVILLEA = Nuphar
lutea Heg. = N. luteum
CLANDESTINA = Lathræa
penduliflora Lam. = L. Squamaria
rectiflora Lam. = L. clandestina
CLAUDIA = Melica
ciliata Opiz = M. ciliata
CLAVULA = Scirpus et Heleocharis
acicularis Dum. = H. acic.
Bæothryon Dum. = S. pauciflorus
cæspitosa Dum. = S. cæspit.
comosa Dum. = H. acicularis
fluitans Dum. = S. fluit.
longicaulis Dum. (acicul.) = H. — fluitans
multicaulis Dum. = H. mult.
ovata Dum. = H. ovata
palustris Dum. = H. palustr.
uniglumis Dum. = H. unigl.
CLEMATIS I 490 (428)
acutisepala Kuntze (*Flammula*) 492 (6 e)
alpina Mill. 490 (1)
angustifolia Jacq. 492 (6 c)
Atragene Kittel = alpina
baccata Pers. = Viticella
balearica Rich. 491 (4 β)
cæspitosa Scop. = Flammula
cirrosa L. 491 (4)
concolor Guss. (cirrosa) = cirrosa (α)
contracta Bég. (*Flammula*) A 103 (6 f)
cordifolia DNtrs. (*recta*) 491 (5 b)
corymbosa Poir. = recta
crenata Jord. 492 (7 b)
diversifolia Gilib. = Flammula
dumosa Salisb. = Vitalba

Digitized by Google

CLEMATIS I 490 (423)
elata Bég. (*Flammula*) A 103 (6 a)
elongata Tratt. = integrifolia
erecta L., All. = recta
Flammula L. 492 (6), A 103
fragrans Ten. 492 (6 b)
hispanica Mill. = recta
hybrida Albert = fragrans
inclinata Scop. = integrifolia
integrata DC. (*Vitalba*) 492 (7 a)
integrifolia L. 491 (2)
italica Schnilz. = quid?
læta Salisb. = cirrosa
lugubris Salisb. = Viticella
macrophylla Goir. (*Vitalba*) A 103 (7 d)
maritima L. 492 (6 d)
nutans Crantz = integrifolia
pedicellata Sweet = cirrosa
pilosa Dulac = Vitalba
polymorpha Viv. = semitriloba
pulchella Pers. = Viticella
recta L. 491 (5), A 103
rubella Pers. = Flammula
scandens Borkh. = Vitalba
scandens Huter P. et R. 491 (8 b)
semitriloba Lag. 491 (4 α b)
sepium Lam. = Vitalba
stenophylla Heldr. (Flammula) = angustifolia
suaveolens Salisb. = Flammula
syriaca Boiss. (*Vitalba*) 492 (7 c)
taurica Bess. = syriaca
Vitalba L. 492 (7). A 103
Viticella L. 491 (3), A 103
CLEMATITIS = Clematis
erecta Steud. = C. recta
integrifolia Mœnch = C. integr.
Vitalba Mœnch = C. Vitalba
CLERODENDRON
fœtidum Bunge III 85 (nota)
CLINOPODIUM = Satureja
ægyptiacum Mill. = S. vulgar.
Acinos Kuntze = S. Acin.
Calamintha Kuntze = S. Calam.
humile Guss. (vulg.) = S. vulg. b Gussonei
Nepeta Kuntze = S. Nepeta
origanifacie Gilib. = S. vulgar.
plumosum Sieb. = S. vulgaris
vulgare L. = S. vulg.
CLYMENUM = Lathyrus
alatum Lk. = L. alatus
articulatum Medic. = L. artic.
bicolor Mœnch = L. articulatus
dolichoides Medic. = prec.
Ochrus Lk. = L. Ochrus
tenuifolius Lk. = L. articulat.
tingitanum Medic. = L. ting.
uncinatum Mœnch = L. Clymenum
CLYPEOLA I 454 (391)
alliacea Lam. = Peltaria alliac.
alyssoides L = Alyssum calycinum
auriculata Crantz = Biscutella auric.
calycina All. = Alyssum calyc.
CLYPEOLA I 454 (391)
didyma Crantz = Biscutella levigata
edentula Lk. = Alyssum edent.
Gaudini Trachsel A 98 (β)
glabra Boiss. = Gaudini
halimifolia Lk. = Alyssum halimifolium
Jonthlaspi Guss. p. p. = Gaudini
Jonthlaspi L. 455, A 98
lasiocarpa Guss (Jonthl.) = seg.
lasiocarpa Strobl. (*Gaudini*) A 98 (β b)
lejocarpa Strobl (*Gaudini*) A 98 (β a)
maritima L. = Alyssum mar.
messanensis Tin. = microcarpa
microcarpa Boiss., Lojac. = Gaudini
microcarpa Moris 455, A 98 (γ)
monosperma Lam. = Jonthlaspi
montana Crantz = Alyssum mont.
perennis Ard. = Peltaria alliacea
rupestris Lk. = Alyssum rup.
spathulifolia Jord. et Fourr. A 98 (γ b)
tomentosa L. = Alyssum orient
CNEORUM II 259 (688)
tricoccum L. 259
CNICUS III 349 (915)
Acarna L = Cirs. Acarna
acaulis W., Hoffm. = Cirs. acaule
afer S. et S. = Cirs. afrum
afer Ten. = Cirs. niveum
alpinus Lois. = Saussur. alp.
alsophilus Pollini = Cirs. tricephalodes
ambiguus Lois., Bert. = Cirs. ambig.
ambiguus Schleich. = Cirs. Tappeineri
arvensis Hoffm. = Cirs. arvense
autareticus Chaix = Cirs. heterophyll. × spinosiss.
benedictus L. 349
Bertolonii Bert. = Cirs. Bertol.
bracteatus Gilib. = Cirs. oleraceum
canus Roth, W. = Cirs. canum
carniolicus W. = Cirs. carniol.
Casabonæ Roth, W. = Cirs. Casab.
Cervini Thom. = Cirs. heterophyll. × spinosiss.
Chamæpeuce Ten. = Cirs. gnaphaloides
collinus Horn. = Carduus coll.
communis Lam. = Cynara Cardunculus
cynaroides S. et S. = Cirs. eriophorum
discolor Schult. = Saussur. lapathifolia
dubius W. = Cirs. dubium
echinatus W. = Cirs. echin.
eriophorus Roth, Hoffm. = Cirs. erioph.
Erisithales L. = Cirs. Erisith.
ferox L. = Cirs. ferox
firmus Presl = Cirs. firmum
CNICUS III 349 (915)
foliosus N. Terr. (stellatus) = Cirs. — folios.
Galactites Lois. = Lupsia Galact.
giganteus W. = Cirs. scabrum
glutinosus Gilib. = Cirs. Erisithales
gnaphaloides W. = Cirs. gnaph.
Gouani W. = Carduus medius
heterophyllus Roth, W. = Cirs. heter.
horridus Bert (non M. B.) = Cirs. Bertolonii
italicus Seb. et Maur. = Cirs. ital.
Lachenalii Gm. = Cirs. tuber. × olerac.
lanceolatus W. = Cirs. lanc.
leucographus Roth = Carduus leucographus
longifolius Lam. = Carduncellus monspeliensium
macrostylon Moretti = Cirs. macrostyl.
microcephalus Bert. = Cirs. microceph.
misilmerensis Tin. = Cirs. misilm.
mollis Roth = Jurinea moll.
montanus W. et K. = Cirs. tricephalodes
niveus Presl = Cirs. niveum
ochroleucus Spr. = Cirs. Erisithales
oleraceus L. = Cirs. olerac.
orientalis W. = Lupsia Galactites
palustris W. = Cirs. palustre
pal. × tuberos. Schiede = Cirs. pal. × tub.
pannonicus Host, Vest. = Cirs. pannonicum
pauciflorus W. et K. = Cirs. pauc.
pedemontanus W. = quid?
polyanthemus Bert. = Cirs. pol.
Pontederæ Pollini = Cirs. tricephalodes
pungens Biv. = Cirs. siculum
pungens Seb. = Cirs. polyanthem.
purpureus Bert. = Cirs. heterophyll. × spinosiss.
pygmæus L. = Saussur. pygmæa
rigens W., Ait. = Cirs. acauli × olerac.
rivularis W. = Cirs. rivul.
samniticus Ten. = Cirs. italic.
setosus Bess. = Cirs. setosum
siculus Guss. = Cirs. sicul.
spathulatus Moretti = Cirs. spathul.
spinosissimus L. = Cirs spinos.
spurius Hoffm. = Cirs. tuberos.
stellatus Roth, W. = Cirs. stell.
strictus Ten. = Cirs. strict.
syriacus Roth, W. = Cirs. syr.
tenuifolius N. Terr. (stellatus) = Cirs. — tenuifol.
tuberosus Roth, W. = Cirs. tub.
tuber. × oleraceum Schiede = Cirs. tub. × oler.

Digitized by Google

CNIDIUM II 170 (562)
apioides Spr. = silaifolium
athoum Griseb. = prec.
confertum Mœnch = Monnieri
cuneifolium Griseb. = Ligusticum pyrenæum (α)
Monnieri Cuss 170 (1)
orientale Boiss. = silaifolium
Petroselinum DC. = Petrosel. hortense
pyrenæum Spr. = Ligusticum pyrenæum (α)
silaifolium Paol. 170 (2)
Silaus Spr. = Silaus flavescens
COBRESIA, vedi Kobresia
COBURGIA = Amaryllis
Belladonna Herb. = A. Bellad.
COCCYGANTHE = Lychnis
Flos-cuculi Rchb. = L. Flos-cuc.
pratensis Rupr. = L. Flos-cuc.
Tragi Kostel. = L. Flos-cuculi
COCHLEARIA I 463 (399)
amphibia Ledeb. = Nasturt. amphib.
aquatica C. A. Mey. = Nasturt. amphib.
Armoracia L. = Nasturt. Armor.
auriculata Lam. 463 (1 b)
austriaca Vis = Nasturt. austr.
brevicaulis Facch. 463 (2), A 99
Coronopus L. = Coronop. procumbens
Draba L. = Lepidium Draba
flagrans Gilib. = officinalis
fœtida Schk. = Chamælina fœtida
glastifolia L. 464 (3), A 99
heterophylla Cav. = Chamælina pinnatif.
humifusa Michx. = Coronopus didymus
lancifolia Stokes = Nasturt. Armoracia
lapathifolia Gilib. = prec.
lyrata S. et S. = Calepina Corvini
officinalis L. 464 (4)
renifolia Stokes = officinalis
repens Lam. = Coronopus procumbens
rusticana Lam. = Nasturt. Armoracia
sagittata Crantz = Neslea paniculat.
sativa Cav. = Chamælina sat.
saxatilis L. 463 (1)
tenuifolia Salisb. = Coronopus procumb.
variifolia Salisb. = Nasturt. Armoracia
COCHLEATA = Medicago
intertexta Medic. = M. int.
scutellata Medic. = M. scut.
COCHLIOSPERMUM = Suæda
fruticosum Lag. = S. frut.
salsum Lag. = S. marit.
CODONOPRASUM = Allium
carinatum Rchb. = A. car.
flavum Rchb. = A. flav.
flexum Rchb. = A. violaceum
fuscum Rchb. = A. fusc.
CODONOPRASUM = Allium
longispathum Rchb. = A. longispath.
oleraceum Rchb. = A. oler.
pallens Rchb. = A. pall.
paniculatum Rchb. = A. panic.
pulchellum Fourr. = A pulch.
CŒLOGLOSSUM I 248 (234)
albidum Hartm. = Gymnad. albida
alpinum Schur = viride
bracteatum Parl. A 56 (1 b)
cordatum Nym. = diphyllum
densiflorum Hartm. = Orchis intacta
diphyllum Fiori 248 (2)
purpureum Schur = viride
tricuspis Chenev. (albidum) = Gymnad. — tricuspis
viride Hartm. 248 (1)
COIX I 43 (39)
arundinacea Lam. = Lacryma
Lacryma L. Syst. 43
Lacryma-Jobi L. Sp. = prec.
COLCHICUM I 177 (180)
ægyptiacum Boiss. = montanum
ætnense Tin. = parvulum?
albiflorum Fiori (autumn.) A 206 (4 α c)
alpinum DC. 177 (2)
angustifolium Parl. (Bertol.) = Valery
arenarium Gr. et Godr. (non W et K.) = longifol.
arenarium Koch = Kochii
arenarium Nocc. et Balb. = alpinum
autumnale L. 178 (4), A 44, 206
autumnale γ Goir. = albiflor.
autumnale κ Bert. = alpinum
Bertolonii Stev. = pusillum
Bisignani Ten. = Todaroi
Bivonæ Guss. 178 (5)
Bivonæ Ten. = Tenorei
byzanthinum Ten. (non Ker-Gawl.) = Tenorei
bulbocodioides M. B. = montan.
Bulbocodium Ker-Gawl. = Bulbocodium vernum
castrovillarense N. Terr. (autumn.) A 44 (4 for.)
Catacuzenium Heldr. = montanum
Clementei Graells = montan.
corsicum Baker 178 (3 δ)
crociflorum Anders. = autumnale
Cupanii Guss. 177 (1 γ)
hololophum Coss. et Dur. = montan.
hungaricum Janka = montan.
Jankæ Freyn. = neapolitan.
Kochii Parl. 178 (3 γ)
Levieri Janka = autumnale (for.?)
longiflorum Goir. (autumn.) A 206 (4 α b)
longifolium Cast. A 44 (3 bis)
lusitanum Brot. = Todaroi vel Bivonæ?
montanum All. = alpinum
montanum L. 177 (1)
COLCHICUM I 177 (180)
montanum L. hb., Bert. = pusillum
multiflorum Brot. = autumnale
neapolitanum Ten. (1826) 177 (3)
neapolitan. Ten. (1825) (autumn.) = prec.
neapolitan Tod. ex Parl. = Todaroi
nivale Boiss. et Huet = montan.
parviflorum Biv. = Valery
parvulum Ten. 177 (2 β)
patens Schultz = autumnale
polymorphum Orph. = Kochii
præcox Spenn. = vernum
provinciale Loret A 44 (3 bis β)
pusillum Sieb. 177 (1 β), A 44
Steveni Kth. = Cupanii
Tenorei Parl. 178 (4 β), A 44
tenuifolium Goir. (autumn.) A 206 (4 α d)
tessulatum Mill. = Bivonæ?
Todaroi Parl. 178 (4 δ)
triphyllum Kunze = montan.
Valery Tin. 177 (1 γ b)
variegatum Biv. (non L.) = Bivonæ
variopictum Janka 178 (3 β)
vernale Hoffm. 178 (4 γ) = seg. cfr. A 44
vernum Schrank A 44 (4 γ)
Visiani Parl. = Bivonæ
COLEANTHUS I 60 (67)
subtilis Seid. 60
COLEOSTEPHUS = Chrysanthemum
hybridus Strobl (non Lge.) = Ch. hybrid.
Myconis Coss. = Ch. Mycon.
COLLADONIA II 201 (595)
angustifolia Bert. 202
COLOBACHNE = Alopecurus
Gerardi Lk. = A. Gerardi
COLOBIUM = Leontodon
hirtum Roth = L. hirtus
COLOCASIA I 147 (148)
antiquorum Schott 148
COLOCYNTHIS = Cucumis
officinalis Schrad. = C. Colocynthis
officinarum Cogn. = prec.
vulgaris Schrad. = prec.
COLPODIUM = Catabrosa
aquaticum Trin. = C. aquatica
minutum Steud. = Aira minuta
COLUBRINA = Polygonum
intorta Montand. = P. Bistorta
vivipara Montand. = P. viviparum
COLUMBARIA = Scabiosa
canescens J. et C. Presl. = S. canesc.
crenata Presl = S. cren.
glabrescens Fourr. = S. lucida
ochroleuca J. et C. Presl = S. ochr.
suaveolens Fourr. = S. canescens
vulgaris J. et C. Presl = S. Columbaria

Digitized by Google

COLUTEA II 88 (505)
alpestris Bolzon (arbor.) = Astragalus penduliflorus, cfr. A 142
alpina Lam. = Astrag. penduliflorus
arborescens L. 88
astragalina Poir. = Astrag. alpinus
australis Lam. = Astrag. austr.
florida Salisb. = arboresc.
frigida Poir. = Astrag. frig.
vesicaria Seguier = arboresc.
COMANDRA
elegans Rchb. 286 (nota)
COMARUM = Potentilla
asgustifolium Raf. = P. palustr.
digitatum Raf. = P. palustris
flavum Buch.-Ham. = P. supina
fragarioides Roth = P. sterilis
palustre L. = P. palustris
rubrum Gilib. = prec.
supinum Alef. = P. supina
COMMELINA I 163 (174)
communis L. 164 (1), A 42
virginica L. 164 (2)
Wildenovii Kth. = communis
CONDYLOCARPUS = Tordylium
apulus Hoffm. = T. apulum
humilis Koch = prec.
officinalis Koch = T. offic.
CONIUM II 203 (599)
aromaticum Fouc. et Rotgès (macul.) A 154 (c)
Cicuta Neck. = maculatum
croaticum W. et K. = prec.
dichotomum Desf. = Krubera peregrina
leiocarpum Boiss. (mac.) 204 (b)
maculatum L. 204, A 154
strictum Tratt. = prec.
tenuifolium Mill. = prec.
CONOPODIUM = Bunium
capillifolium Boiss. = B. capill.
denudatum Koch = B. flexuosum
CONOPSIDIUM = Platanthera
platantherum Wallr. = P. montana
stenantherum Wallr. = P. bifolia
CONRINGIA I 450 (379)
austriaca Sweet 450 (β)
orientalis Andrz. 450, A 97
perfoliata Lk. = orientalis
Thaliana Rchb. = Arabis Thal.
CONSOLIDA = Delphinium
Ajacis Schur = D. Ajacis
arvensis Opiz = D. Consolida
paniculata Schur = D. panic.
regalis S. F. Gray = seg.
segetum Schur = D. Consol.
CONVALLARIA I 206 (204)
ætnea Torn. = Polygonat. ætn.
angulosa Lam. = Polygonat. officinale
bifolia L. = Majanthem. bifol.
bracteata Thom. = Polygonat. bract.
Broteri Guss. = Polygon. Brot.
dichotoma Pers. = Streptopus amplexifol.
CONVALLARIA I 206 (204)
Govaniana Wall. = Polygonat. multiflor.
hirta Bosc. in Lam. = Polygonat. latifol.
latifolia Jacq. = Polygon. latifol.
latifolia Lam. = Polygonat. multiflor.
Linnæi Gærtn. = majalis
majalis L. 206, A 49, 207
Mappi Gmel. = majalis
multiflora L. = Polygonat mult.
odorata Mill. = Polygonat. officinale
Polygonatum L. = Polygonat. officinale
quadrifida Lam. = Majanthemum bifolium
scaposa Gilib. = majalis
Sigillum Lep. = Polygonat. officinale
stenophylla Goir. (majalis) A 207 (b)
tetrapetala Gilib. = Majanth. bifol.
verticillata L. = Polygonatum vert.
CONVOLVULUS III 384 (733)
abbreviatus Fiori (elegantiss.) 386 (9 β c)
althæoides L. 386 (9)
arcuatus Presl = pentapetaloides
arenarius Vahl = Ipomœa stolonifera
argenteus Lam. = Cneorum
argyreus DC. 386 (9 β b)
arvensis L. 387 (11), A 167
asarifolius Salisb. = Soldanella
atriplicifolius Poir. = betonicifolius
auriculatus Desr. 387 (11 α c)
Batatas L. = Ipomœa Batat.
betonicifolius Mill. 387 (10)
bryoniæfolius Rchb. = italicus
Cantabrica L. 385 (2)
Cherleri Agardh 387 (11 β)
ciliatus Roth = humilis
Cneorum L. 384 (1)
corsicus R. et S. 387 (11 α b)
Cupanianus Tod. = tricolor (α)
decumbens Ort. = humilis
dorycnioides DNtrs. 384 (2 b)
dumetorum Posp. (sepium) 387 (12 α b)
edulis Thunb. = Ipomœa Batatas
elatior M. Gortani (arvens.) A 167 (11 α e)
elegantissimus Mill. 386 (9 β)
elongatus W. = pseudo-siculus
esculentus Salisb. = Ipomœa Batatas
evolvuloides Desf. = humilis
ferrugineus Choisy (althæoid.) 386 (9 α c)
hastatus Forsk. (non Thunb.) = seg.
hastifolius Poir. = arvensis
hirsutus M. B. = betonicifolius
hirsutus Ten. = italicus
humilis Jacq. 386 (6)
CONVOLVULUS III 384 (733)
Imperati Vahl = Ipomœa stolonifera
inflatus Desf. 387 (12 β)
intermedius Lois. = lineatus
italicus R. et S. 386 (9 α b)
lætus Salisb. = sepium
lancifolius Presl (arvens.) 387 (11 α d)
lanuginosus Vahl = betonicifol.
linearis Lam. = Cantabrica
lineatus L. 385 (3)
littoralis L. = Ipomœa stolonifera
lucanus Ten. 387 (12 β b)
meonanthus Hoffgg. et Lk. 386 (8 β)
micranthus Fiori (sepium) A 167 (12 α c)
minor Gilib. = arvensis
montanus N. Terr. (arvens.) 387 (11 β b)
multiflorus Choisy (pseudo-sicul.) = sabatius
nanus Choisy (althæoid.) 386 (9 α e)
obtusifolius Choisy (arvens.) = corsicus
ovatus Mœnch = siculus
parviflorus Salisb. (non Vahl) = siculus
pedatus Forsk. (non Roxb.) = elegantiss.
pentapetaloides L. 386 (7)
prostratus Forsk. = pentapetaloides
prostratus Schm. = arvensis
pseudo-siculus Cav. 385 (5 β)
pseudo-tricolor Bert. 386 (8 α b)
purpureus L = Ipomœa purp.
reniformis Poir. = Soldanella
repens L. = sepium
sabatius Viv. 385 (4), A 215
sagittifolius Michx = Ipomœa sagittata
sagittifolius S et S. = betonicifol.
sepincola St.-Lag. = seg.
sepium L. 387 (12). A 167
sericeus Choisy (althæoid.) 386 (9 α d)
Sibthorpii R. et S. = betonicifol.
siculus L. 385 (5)
silvaticus Spr. = seg.
silvestris W. et K. = inflatus
sinuatus Pet. = Ipomœa stolonifera
Soldanella L. 388 (13)
stoloniferus Cyr. = Ipomœa stolon.
tenuissimus S. et S. = elegantiss.
terminalis Salisb. = Cantabrica
terrestris L. = prec.
tricolor L. 386 (8), A 167
undulatus Cav. = humilis
versicolor Salisb. = tricolor
CONYZA
alata Baumg. = Inula bifrons
ambigua DC. = Erigeron crispus
asteroides Host = Inula bifrons

Digitized by Google

CONYZA
auriculata Mœnch = Phagnalon rupestre
bifrons L. = Inula bifrons
britannica Rupr. = Inula brit.
candida L. = Inula candida
crispa Rupr = Erigeron crisp.
geminiflora Ten. = Phagnalon rupestre (α)
geminiflora B Ten. = Phagnalon græcum
geminiflora C Ten = Phagnalon — fuscescens
græca Nym. = Phagnalon græc.
graveolens Steud. = Inula grav.
intermedia Lag. = Phagnalon intermed.
limonifolia Bert. (non S. et S.) = Inula — verbascifol.
rupestris L. = Phagnalon rupestre
rupestris Ten. = Phagnalon græcum
salicina Rupr. = Inula salic.
saxatilis L. = Phagnalon saxat.
saxatilis S. et S. = Phagnalon græcum
saxatilis B Ten. = Phagnalon intermedium
sicula W. = Pulicaria sicula
sordida L. = Phagnalon sordid.
squarrosa L. = Inula Conyza
Tenorii Spr. = Phagnalon rupestre (α)
Tenorii b Guss. = Phagnalon græcum
thapsoides M. B. = Inula thaps.
tomentosa Forsk. = Phagnalon rupestre
verbascifolia W. = Inula — verbasc.
viscosa Steud. = Inula visc.
vulgaris Lam. = Inula Conyza
Wulfenii Host = Inula bifrons
CONYZELLA = Erigeron
canadensis Rupr. = E. canad.
COPPOLERIA = Vicia
monantha Tod. = V. multifida
CORALLORHIZA I 249 (238)
dentata Host = Neottia
Halleri Rich. = Neottia
innata R. Br. = Neottia
intacta Cham. et Schl. = Neottia
nemoralis Sw. = Neottia
Neottia Scop. 250, A 56
verna Nutt. = Neottia
virescens Drej. = Neottia
CORDYLOCARPUS = Brassica
pubescens Sm. = B. adpressa
COREOPSIS
Bidens L. = Bidens — radiatus
leucantha L. = Bidens leucanth.
tinctoria Nutt. 303 (nota)
CORESANTHE = Iris
alata Klatt = I. planifolia
CORIANDRUM II 204 (600)
aquilegifolium All. = Physosperm. aquilegifol.
Cicuta Crantz = Conium maculatum
Cicuta Roth = Cicuta virosa
Cynapium Crantz = Æthusa Cyn.
CORIANDRUM II 204 (600)
didymum Stokes = Bifora testiculata
diversifolium Gilib. = sativ.
globosum Salisb. = sativ.
latifolium Crantz = Sium lat.
maculatum Roth = Conium macul.
majus Gouan. = sativ.
melphitense Ten. et Guss. 204 (b)
sativum L. 201, A 154
testiculatum L. = Bifora testic. et B. radians
CORIARIA II 295 (656)
myrtifolia L. 295
CORIDOTHYMUS = Thymus
capitatus Rchb. = Th. cap.
CORION = Bifora
testiculatum Hoffgg. et Lk. = B. testic
CORIS II 326 (687)
monspeliensis L. 326
CORISPERMUM I 314 (293)
bracteatum Viv. = Marschalii
declinatum Steph. = hyssopif.
elatum Host = Marschallii
hybridum Bess. = Marschallii
hyssopifolium L. 315, A 65
intermedium Rchb. (non Schw.) = Marschallii
laxiflorum Schrenk = seg.
marginatum Steph. = seg.
Marschalii Stev. 315 (β), A 65
pilosum Raf. = hyssopifol.
squarrosum L. = hyssopifol.
squarrosum M. B. = Marschalli
CORISTOSPERMUM = Ligusticum
cuneifolium Bert. = L. pyrenæum (α)
CORMUS = Pirus
domestica Spach = P. dom.
florentina Spach = P. tormin.
× Malus
CORNELIA = Ammannia
verticillata Ard. = A. vertic.
CORNICINA = Circinus
circinnata Boiss. = C. circinn.
CORNIOLA = Genista
anxanthica Presl = G. anx.
corsica Presl = G. cors.
mantica Presl = G. mant.
ovata Presl = G. ovata
scariosa Presl = G. januensis
Scorpius Presl = G. Scorp.
tinctoria Medic. = G. tinct.
triangularis Presl = G. januensis
CORNUCOPIÆ = Alopecurus
alopecuroides L. = A. utriculatus
CORNUS II 210 (609)
alba Lam. (non L.) = stolonifera
coetanea Goir. (mas) = serotina
fœminea Mill. = sanguinea
mas L. 211 (2)
mascula L. = prec.
nudiflora Dum. = mas
sanguinea L. 211 (1)
serotina Goir. (mas) 211 (2 b)
stolonifera Michx. 211 (nota)
CORODOTHAMNUS = Genista
diffusus Presl = G. diff.
Halleri Presl = G. pedunculata
procumbens Presl = G. proc.
CORONARIA = Lychnis
Agrostemma Lilja = L. Coronaria
Cœli-rosa Fr. = L. Cœli-rosa
Flos-cuculi A. Br. = L Fl.-cuc.
Flos-Jovis A. Br. = L. Fl.-Jov.
tomentosa A. Br. = L. Coronaria
CORONILLA II 90 (508)
australis Gr. et Godr. (minima) = fruticans, lotoides
austriaca Heim. (Emer.) = emeroides
Clusii Duf. = lotoides
coronata DC., Gaud. = lotoides
coronata L., Jacq. 91 (4)
coronata Ucria = glauca
cretica L. 91 (2), A 142
emeroides Boiss. et Sprun. 93 (8 β), A 142
Emerus L. 92 (8), A 142
Emerus S. et S., Guss. p. p. = emeroides
florida Salisb. = Emerus
fruticans Jord. A 142 (5 α c)
glauca All. = valentina
glauca Asso = fruticans
glauca L. 92 (7 β)
juncea L. 92 (6)
lotoides Koch 92 (5 α b)
minima Jacq. = vaginalis
minima L. 92 (5), A 142
montana Jacq.. Scop. = coronata
montana Schrank. = vaginalis
orbiculata Mœnch = valentina
pallida Salisb. = glauca
parviflora M. B. = Bonaveria Securidaca
parviflora Mœnch (non W.) = cretica
pauciflora Lam. = Emerus
pentaphylloides Rouy 92 (7 β b)
purpurea Fiori (varia) 91 (3 b)
repanda Boiss. (scorpioid.) = seg.
repanda Guss. 91 (1 β)
repens Chenev. (Emerus) A 142 (8 α b)
rupestris Miég. = fruticans
scorpioides Koch 91 (1)
Securidaca L. = Bonaveria Secur.
stipularis Lam. = valentina (α)
suaveolens Salisb. = prec.
vaginalis Lam. 92 (5 β)
valentina Biv. = pentaphyll.
valentina L. 92 (7)
valent. β Bert. = pentaphyll.
varia L. 91 (3), A 142
varia β Bert. = purpurea
violacea Briq. (varia) A 142 (3 c)
CORONOPUS I 465 (403)
coadunatus Stokes = procumbens
cristatus Clairv. = procumbens
depressus Mœnch = procumbens
didymus Sm. 465 (1)

Digitized by Google

CORONOPUS I 465 (408)
incisus Horn. = didymus
pinnatifidus Dulac = didymus
pinnatus Horn. = didymus
procumbens Gilib. 465 (2)
Ruellii All. = procumbens
squamatus Asch. = procumb.
vulgaris Desf. = procumbens
COROTHAMNUS = Genista
procumbens Presl = G. proc.
CORRIGIOLA I 333 (319)
glomerata Pœpp. = telephiifol.
imbricata Lap. 333 (2 b)
litoralis L. 333 (1)
telephiifolia Pourr. 333 (2)
CORTUSA II 320 (678)
glabrescens Schur = Matthioli
gradissima Schur = Matthioli
Matthioli L. 320
sibirica Andrz = Matthioli
CORVISARTIA = Inula
Helenium Mérat = I. Helen.
CORYDALIS I 481 (414)
acaulis Pers. 482 (2 γ)
albiflora Kit. 482 (4 b)
alpina J. Gay = intermedia
australis Hausm. (*solida*) 482 (3 α e)
bicaulis Rossi (*solida*) 482 (3 α b)
bulbosa DC. = solida (α)
bulbosa Pers. = cava
capnoides DC. = lutea
capnoides Pers., Whlnb. 481 (1), A 102
cava Schwgg. et Krt. 482 (4)
crenata F. Schultz (*solida*) 482 (3 α c)
densiflora J. et C. Presl 482 (3 α f)
digitata Gr. et Godr. (fabacea) = pumila
digitata Pers. 482 (3 α a)
fabacea Pers. = intermedia
Gebleri Led. = capnoides
integrata F. Schultz (*solida*) 482 (3 α d)
intermedia Mérat 482 (3 β)
lutea DC. 481 (2), A 102
ochroleuca Koch 482 (2 β), A 102
pumila Rchb. 482 (3 β b)
solida Sw. 482 (3), A 102
tuberosa DC. = cava
CORYLUS I 267 (254)
æstivalis Dochn. (*Avell.*) 267 (α e)
arborescens Muench. = Colurna
Avellana L. 267, A 58
Colurna L. 267 (nota), A 58
glandulosa Shuttlw. A 58 (α f)
glomerata Ait., Dochn. (*Avell.*) 267 (α c), A 58
grandis Lam., A. DC. (*Avell.*) A 58 (α d)
intermedia Fing. = Colurna
Jacquemontii Dcne. = Colurna
lacera Wall. = Colurna
maxima Mill. A 58 (β)
pedemontana Dochn. (Avell.) = grandis
rubra Borkh. = maxima
rubicunda Cocc. (*Avell.*) 267 (α b)
CORYLUS I 267 (254)
Serenyiana Plusk. = Avellana
silvestris Salisb. = Avellana
sphærocarpa Rchb. (Avell.) 267 (α d) = grandis, cfr. A 58
tiliacea Dcne. = Colurna
tubulosa W. 267 (β) = maxima, cfr. A 58
CORYNEPHORUS I 68 (83)
ætnensis Presl = articulatus
articulatus P. B. 68 (2)
canescens P. B. 68 (1), A 203
fasciculatus Boiss. et Reut. = gracilis
gracilis Parl., Coss. (*articul.*) 68 (2 b)
gracilis Richter = prec.
minimus Parl. (*canesc.*) A 203 (1 b)
COSENTINIA = Notholæna
lanuginosa Desv. = N. vellea
vellea Tod. = N. vellea
COSMOS
bipinnatus Cav. 303 (nota)
COSTIA = Agropyrum
cristata Wk. = A. cristat.
COSTIA = Iris
scorpioides Wk. = I. planifolia
COTA = Anthemis
altissima J. Gay = A. Cota
austriaca J. Gay = A austriaca
brachycentros J. Gay = A. brachyc.
tinctoria J. Gay = A. tinct.
Triumfetti J. Gay = A. Triumf.
COTINUS = Rhus
Coggyria Scop. = Rh. Cotinus
Coriaria Duham. = Rh. Coriar.
COTONEASTER I 596 (469)
coccinea Steud. = tomentosa
Cotoneaster Karsten = integerrima
integerrima Medic. 597 (2), A 134
nebrodensis C. Koch = nummularia
nummularia F. et M. 597 (2 γ)
Piracantha Spach 597 (1)
tomentosa Lindl. 597 (2 β), A 134
vulgaris Lindl. 597 (2 α)
COTULA = Matricaria
abrotanifolia W. = Anthemis cretica
alba L. = Eclipta alba
aurea Lœfl. = M. aurea
grandis Jacq. (non L.) = Chrysanthem. discoideum
latifolia Pers. = Dichrocephala latif.
matricarioides Bong. = M. suaveolens
perpusilla DC. = Nananthea perp.
pygmæa Poir. = prec.
sonchifolia M. B. = Dichrocephala sonchif.
COTULINA = Matricaria
aurea Pomel = M. aurea
COTYLEDON I 545 (451)
horizontalis Guss. 545 (2), A 114
ombilicus Lam. = Umbil.
orbiculata L. A 114
COTYLEDON I 545 (451)
peltata Wendl. = Umbil.
rupestris Salisb. = Umbil.
tuberosa L. (Umbilicus) = Umbil.
umbilicata Lam. = Umbil.
umbilicifolia Stokes = Umbil.
Umbilicus L. 545 (1)
COTYLIPHYLLUM = Cotyledon
horizontale Lk. C. horiz.
umbilicus Lk. = C. Umbil.
COURRANTIA = Matricaria
chamomilloides Sz. Bip. = M. Courrantiana
CRACCA = Vicia
agrigentina Alef. = V. leucantha
albicans Alef. = V. atropurp.
atropurpurea Gr. et Godr. = V. atropurpur.
Bertolonii Gr. et Godr. = V Pseudo-Cracca
Bivonea Alef. = V. Bivonea
Boissieri Alef. = V. villosa
Broteriana Alef. = V. atropurpurea
calcarata Gr. et Godr. = V. monantha
cassubica Opiz = V. cassub.
corsica Gr. et Godr. = V. corsica
dasycarpa Alef. = V. dasyc.
disperma Gr. et Godr. = V. disper.
Gerardi Gr. et Godr. = V. incana
Gerhardi Medic. = prec.
linifolia Alef. = V. atropurpurea
major Alef. = V. Cracca (α)
minor Gr. et Godr. = V. hirsuta
monanthos Gr. et Godr. = V. multifida
ochroleuca Alef. = V. ochrol.
pauciflora Genn. = V. paucifl.
pisiformis Opiz = V. pisiform.
Pseudo-Cracca Alef. = P. Ps.-Cracca
silvatica Opiz = V. silvat.
tenuifolia Opiz, Gr. et Godr. = V. tenuifol.
tenuissima Alef. = V. gracilis
varia Gr. et Godr. = V. dasycarpa
villosa Gr. et Godr. = V. vill.
vulgaris Opiz = V. Cracca
CRACCINA = Astragalus
austriaca Stev. = A. austr.
depressa Stev. = A. depress.
CRÆPELIA = Lolium
temulenta Schrank = L. temul.
CRAMBE I 451 (382)
amplexicaulis Sol. = Calepina Corvini
aspera M. B. = tartarica
bursæfolia L'Hér. = Calepina Corvini
Corvini All. = Calepina Corv.
gigantea Kit. = maritima
hispanica L. 452 (3)
laciniata Lam. = tartarica
maritima Barb. = hispanica
maritima L. 452 (1)

Digitized by Google

CRAMBE I 451 (382)
paniculata All. = Neslea panic.
reniformis Desf. = hispanica
tartarica Jacq. 452 (2)
CRANTZIA = Moricandia, Conringia
frutescens Lag. = M. arvensis
ochroleuca Lag = C. austriaca
CRASSULA = Sedum
andegavensis DC. = S. andeg.
cæspitosa Cav. = S. cæsp.
globulifolia Moris = S. andegavense
Magnolii DC. = S. cæspitosum
Magnolii N. Terr. = S. atratum
muscosa Roth (non L.) = Tillæa musc.
rubens L. = S. rubens
Vaillantii Roth = Bulliarda Vaill.
verticillaris L. = S. cæspitosum
CRATÆGUS I 595 (467)
alpina Mill. = Pirus Chamæmesp.
Amelanchier Desf. = Amel. vulgaris
apiifolia Medic. = monogyna
Aria L. = Pirus Aria
Aronia Bosc. 595 (2 b)
Azarolus L. 595 (2)
Bibas Lour. = Eriobotrya japonica
Chamæmespilus Jacq. = Pirus Cham.
chlorocarpos Moris (Azarolus) = Aronia
coccinea L. 596 (nota)
Cotoneaster Borkh. = Coton. integerrima
Crus-galli L. 595 (1)
cuneifolia Lodd. = Crus-galli
dentata Thuill. = Pirus Aria × torminal.
Destefani Lojac. 596 (3 ε for.)
florentina Zuccagni = Pirus tormin. × Malus
glabrata Strobl (*monogyna*) A 134 (3 β b)
græca Spach = Pirus græca
grandiflora C. Koch = Mespilus Smithii
humilis Lam. = Pirus Chamæmesp.
incisa Regel, Goir. (*Oxyac.*) A 134 (3 α for.)
inermis Sart. (*Oxyac.*) A 134 (3 α for.)
integrifolia Fiori (*Oxyac.*) 596 (3 α d)
intermedia Tausch A 134 (3 α for.)
intricata Nic. = quid?
Jnzengæ Bert 596 (3 γ)
laciniata DC. (Oxyac.) = incisa
laciniata Ucria 596 (3 ε)
latifolia Lam. = Pirus Aria × tormin.
laurifolia Medic. = Crus-galli
lobata Bosc = Mespilus Smithii
lucida Mill. = Crus-galli
macrocarpa Heg. 596 (3 α b)
macrophylla Goir. (*Oxyac.*) A 134 (3 α for.)
maroccana Pers. = Azarolus
CRATÆGUS I 595 (467)
Maura L. f. = Azarolus?
Mespilus Jessen = Mesp. german.
microphylla Fouc. et Sim., Goir. (*monog.*) A 134 (3 β for.)
monogyna Jacq. 596 (3 β), A 134
obtusata Ser. (Oxyac.) = oxyacanthoid., integrifol.
orientalis Jan. (non M. B.) = laciniata
Oxyacantha Bert. = monogyna
Oxyacantha L. 595 (3), A 134
oxyacanthoides Thuill. 596 (3 α c)
Piracantha Medic. = Coton. Pirac.
polyacantha Jan = triloba
Pseud-Aria Spach = Pirus Aria × Chamæmesp.
pubescens Presl (non Wlt.) = laciniata
rotundifolia Lam. = Amelanch. vulgar.
Subaria Spach = Pirus Aria × Chamæmesp.
Tauscheri Gandog. = intermedia
torminalis L. = Pirus torminalis
triloba Pers. 596 (3 δ)
umbellata Desf. = Pirus græca
vulgaris DC. (Oxyac.) = Oxyacantha (α)
Watsoniana Steud. = Crus-galli
CRATÆ-MESPILUS = Cratægus × Mespilus
grandiflora Camus = Mesp. Smithii
CREMOPYRUM = Agropyrum
pectinatum Schur = A. cristatum
CREPIDIUM = Crepis
asperum Tausch = C. asp.
Dioscoridis Tausch = C. Diosc.
CREPIS III 428 (955)
Adonis Spr. = chondrilloides
ætnensis Presl = Preslii
agrestis Sadl. = biennis (α)
agrestis W. et K. 435 (14 e)
albida All. = Allionii
albida Vill. 430 (5)
Allionii Frœl. (*alpestr.*) 439 (25 β)
alpestris Avetta et Casoni = hispidula
alpestris Tausch 439 (25)
alpina L. 431 (6)
altissima Balb. = Tolpis virgata
ambigua Balb. = Tolpis virg.
ambigua Fiori (*fœtida*) 430 (4 α b)
Apargia Pers. = seg.
apargioides W. = Willemetia stipitata
apula Fiori (*Suffren.*) 433 (12 β)
aspera Lam. = Picris Sprengeriana
aspera L. 429 (2)
aspera Suter = setosa
CREPIS III 428 (955)
aurea Auct. It. pen. = Columnæ
aurea Rchb. 442 (32), A 193
aurea b. N. Terr. = dentata Fiori
austriaca All. = blattarioides
austriaca Jacq. 440 (28 b)
bætica Mill. = Tolpis barbata
Balbisiana F. Schultz 432 (8 α b)
bannatica Roch (bienn.) = bienn. f. lacera
bannatica W. = setosa
barbata L. = Tolpis barb.
barbata Mill. = fœtida
Bauhiniana Tausch = virens
bellidifolia Lois. 432 (9)
bicolor Rchb. = quid?
biennis L. 436 (17)
biennis Seb. et Maur. = lacera
Bivoniana Rchb., Spr. = purpurea
blattarioides Vill. 440 (28)
bulbosa Tausch 442 (33)
bursifolia L. 432 (8), A 193
bursifolia b Guss = hirticalyx
cæspitosa Gr. et Godr. 432 (9 γ)
caulescens Fiori (*rubra*) 429 (3 α)
cernua Ten. 434 (13 α)
chondrilloides Frœl. = Jacquini
chondrilloides Jacq. 437 (20)
chrysantha Koch (non Frœl.) = jubata
chrysantha Montini et Ambr. hb. = mucronata
chrysocarpa N. Terr. (*fœtida*) 430 (4 β c)
chrysocarpa N. Terr. (*glandulosa*) 430 (4 β c)
cinerea Desf. = taraxacifolia
colorata Frœl. (*pygm.*) 438 (21 e)
Columnæ Frœl. 442 (32 β), A 193
conyzæfolia Dalla Torre 440 (27), A 193
corymbosa Ten. 435 (13 β), A 193
crispa N. Terr. (*fœtida*) 430 (4 α c)
croatica Asch. (*mollis*) 440 (29 α)
croatica Frœl. (hierac.) = prec.
croatica Horn. = Dioscoridis
De-Aquini Nic. (*bulbosa*) 442 (33 b)
decumbens Gr. et Godr. 432 (9 α b)
Degeniana Borb. = seg.
Degeniana Borb. (*conyzæfol.*) A 193 (27 *var*)
dentata Bischoff (*virens*) 435 (14 a)
dentata Fiori (*Columnæ*) 442 (32 β f)
dentata Koch (*bienn.*) 436 (17 c)
diffusa DC. 435 (14 d)
Dioscoridis L. 428 (1)
Dioscoridis Pollich = tectorum
echioides All. = Helminthia echioid.

Digitized by Google

CREPIS III 428 (955)
erucæfolia Gr. et Godr. = bursifolia (α)
erucæfolia Tausch = lacera
exaltata Frœl. (*paludosa*) 441 (30 b)
fœniculacea Frœl. = chondrilloides
fœtida L. 430 (4)
Frœlichiana DC. 441 (31 β)
Frœlichii Steud. = Jacquini
fuliginosa S. et S. = apula?
furcata Levier (*Columnæ*) 442 (32 β d)
glabra Sang. (*setosa*) 438 (11 b)
glabrata Frœl. (*præmorsa*) 441 (31 α c)
glabrescens Caruel (aurea) = Columnæ
glabrescens Fiori (*conyzæfol.*) 440 (27 γ)
glabrescens Frœl. (grandifl.) = prec.
glabrescens Frœl. (*paludosa*) 441 (30 c)
glabrifolia Fiori (*vesic.*) 431 (7 α c)
glabrifolia Frœl. (hierac.) = mollis γ succisæfol.
glandulifera Guss. (*taraxac.*) 431 (7 γ d)
glandulosa Frœl. (*pygm.*) 438 (21 d)
glandulosa Guss. 430 (4 β)
glandulosa Zersi (*pulcra*) 436 (18 b)
globifera Hall. f. = Dioscoridis
Gmelini Schultz (non Tausch) = biennis (a)
Gmeliniana Frœl. (alpestr.) = mucronata?
gracilis Frœl. (hierac.) = mollis β succisæfol.
gracilis Marchesetti (*neglecta*) 434 (13 α b)
gracilis Wallr. (*tector.*) 436 (16 c)
grandiflora Tausch 440 (27 α b)
grandiflora W. = albida
graveolens Schrad. = fœtida (α)
Gussonei Fiori (*bursifol.*) 432 (8 α c)
Halleriana Frœl. (*aurea*) 442 (32 α c)
hamata Vitm. = setosa
heterocarpa Nym. = taraxacifol.
heterogyna Frœl. = Hierac. stupposum
heterosperma Schrad. = Dioscoridis
hiemalis Spr. 431 (7 γ c)
hieracioides Lam. = Picris hierac.
hieracioides W. et K. = mollis β succisæfol.
hirsuta Fiori (*pappoleuca*) 440 (27 β b)
hirsuta Frœl. (chondrill.) = seg.
hirsuta Weiss. (*Jacquini*) 438 (23 c)
hirta L. = Leontodon hirtus
hirta Pers. = Balbisiana

CREPIS III 428 (955)
hirticalyx Fiori (*bursifol.*) 432 (8 β)
hispida W. et K. 433 (11 c)
hispidissima Bartl. = Picris hispidiss.
hispidula Fiori (*Columnæ*) 442 (32 β b), A 193
humilis Ten. (*corymb.*) 434 (13 β b)
hybrida A. Kern. = terglov. × Jacquini
hyoseridifolia Rchb. = terglovensis
hyoserid. × Jacquini Auct. = terglov. × Jacquini
incana Lap. = Andryala inc.
incanescens Frœl. (*pygm.*) 438 (21 c)
incarnata Tausch 441 (31 γ)
incarnata Vis. 429 (3 α b)
insularis Moris et DNtrs. 430 (4 γ)
integrifolia Fiori (*Jacquini*) 438 (23 d)
integrifolia Fiori (*nicæensis*) 435 (15 b)
integrifolia Frœl. (chondrill.) = Jacquini for. integrif.
integrifolia Frœl. (*pygm.*) 438 (21 b)
integrifolia Goir. (*vesicaria*) A 193 (7 α d)
integrifolia Koch (succisæfol.) = mollis β succisæfol.
intybacea Koch (*taraxacifol.*) A 193 (7 γ e)
Jacquini Tausch 438 (23)
Jacquiniana Frœl. (*alpestr.*) 439 (25 α a)
jubata Koch 439 (24)
Kerneri Fiori (*chondrill.*) 437 (20 β)
lacera Fiori = biennis
lacera Ten. 437 (19)
lacera Wimm. et Grab. (*bienn.*) 436 (17 b)
Lachenalii Gochn. = gracilis
Lachenalii Gm. = taraxacifolia
laciniata Schk. = Picris hispidissima
lacinulosa Lojac. (*bursifol.*) A 193 (3 for.)
lappacea Host = Picris hispidissima
lappacea W. = Picris pauciflora
lapsanifolia Rchb. 436 (18 c)
latialis Seb. = lacera
leiosperma Gaud. = virens
leontodontoides All. 433 (10)
leptophylla Wallr. (*bienn.*) 436 (17 a subf.)
lodomiriensis Bess. = biennis (a)
lucida Fiori (*Columnæ*) 442 (32 β a)
lutea Koch (incarnata) = Frœlichiana
major Caruel (neglecta) = corymbosa
microcalycina Guss. (*leontodont.*) 438 (10 β c)
mollis Asch. 440 (29)

CREPIS III 428 (955)
montana Dalla Torre = incarnata
montana Rchb., Tausch = pontana
montana N. Terr. (spathul.) = quid?
mucronata Nym. 439 (25 β)
multiflora Frœl. (*præmorsa*) 441 (31 α b)
Muretiana Bruegg. = terglov. × Jacquini
muricata Gilib. = biennis
muricata Vitm. = hispida
nemausensis Gouan., All. = Pterotheca nemaus.
nicæensis Balb. 435 (15)
neglecta L. 434 (13), A 193
nuda Gr. et Godr. (succisæfol.) = mollis β succisæfol.
nuda Lam. = Pterotheca nemausensis
paludosa Mœnch 441 (30)
paniculata Presl 442 (nota)
pappoleuca Fiori (*conyzæfol*) 440 (27 β)
pappoleuca Frœl. (grandifl.) = prec.
parviflora Arc, Palanza (virens) = seg.
parviflora Ces. Pass. Gib. (*polymorpha*) 435 (nota)
parviflora Desf. 435 (nota)
parviflora Mœnch = virens
patula Desf. = Dioscoridis
pauciflora Frœl. (*Frœlich.*) 441 (31 β b)
pectinata Bischoff (virens) = pinnatifida
pinnatipartita Fiori (*glandulosa*) 430 (4 β b)
pinnatifida W. 435 (14 c)
platyphylla Wallr. (*bienn.*) 436 (17 a subf.)
polymorpha DC. p p. = neglecta
polymorpha Gilib. = tector.
polymorpha Wallr. = virens
pontana Dalla Torre 439 (26)
præcox Balb 431 (7 γ b)
præmorsa Tausch 441 (31)
Preslii Nic. (*leontodont.*) 433 (10 β)
pubescens Arc, Frœl. p. p. (alpestr.) = Allionii
pulcra L. 436 (18), A 193
pulcra β L = lapsanifolia
pulmonariæfolia Frœl. 442 (nota)
pumila Fiori (*Columnæ*) 442 (32 β b)
pumila Goir. (*pulcra*) A 193 (18 d)
purpurea Guss. 431 (7 β)
pygmæa L. 437 (21)
racemosa Fiori (*incarnata*) 441 (31 γ b)
reflexa Guss. 442 (nota)
rhætica Frœl. (chondrill.) = seg.
rhætica Nym. = seg.
rhætica Weiss (*Jacquini*) 438 (23 b)
rhagadioloides L. = Picris Sprengeriana

Digitized by Google

CREPIS III 428 (955)
rhœadifolia M. B. 430 (4 δ)
robusta Marchesetti (*neglecta*) 434 (13 α c)
rubra L. 429 (3)
rubricaulis Pers = taraxacifolia
ruderalis Bonch. = taraxacifolia
runcinata Bischoff (*virens*) 435 (14 b)
runcinata Frœl. (*aurea*) 442 (32 α b)
runcinata Koch (*bienn.*) 436 (17 a)
sabauda Balb. = biennis
scabra DC. (non W.) = nicœensis
scanensis L. = biennis
scapigera Fiori (*rubra*) 429 (3 β)
scariosa W. 431 (7 α b)
segetalis Roth (*tector.*) 436 (16 b)
segetalis Steud. = prec.
setosa Hall. f. 433 (11)
sibirica Gouan. (non L.) = blattarioides
sicula Ucria in Rœm. = quid?
spathulata Guss. 431 (7 δ)
Sprengeriana All. = Picris pauciflora
Sprenger. W. = Picris Spreng.
Sternbergii Frœl. (hierac.) = mollis α croatica
stricta Schultz = segetalis
stricta Scop. = neglecta
subglabra Frœl. (*Frœlich.*) 441 (31 β c)
subintegrifolia Fiori (*setosa*) 433 (11 c)
subruncinata Fiori (*conyzæfol.*) 440 (27 α c)
subrunc. Frœl. (grandifl.) = prec.
succisæfolia Asch. (*mollis*) 441 (29 β)
succisæf. Frœl. (hierac.) = mollis α croatica
succisæf. Tausch = mollis
Suffreniana Gib. et Pir. = setosa
Suffreniana Groves = apula
Suffreniana Steud., Lloyd 433 (12)
taraxacifolia Fiori (*conyzæfol.*) 440 (27 α d)
taraxacifolia Thuill. 431 (7 γ), A 193
taraxacifolia W. = hiemalis?
taraxacoides Guss. (an Desf.?) = hiemalis
taraxacoides Pourr. = albida
Taraxacum Stokes = Tarax. offic.
taurinensis W. = taraxacifol.
tectorum L. 435 (16)
tectorum Pollich = virens
tectorum Vill. = taraxacifolia
tectorum β Bert. = gracilis
tenerrima Fiori (*leontodont.*) 433 (10 α c)
tenuis Fiori (*rubra*) 429 (3 γ)
terglovienſis A. Kern. 438 (22)
terglov. × *Jacquini Fiori* 433

CREPIS III 428 (955)
Thuretii Sarato 432 (9 β)
tomentosa Mœnch = Dioscoridis
triangula Presl 433 (10 α b)
trifurcata Levier (*Columnæ*) 442 (32 β e)
tuberculata Sch. Bip. = leontodontoides
umbellata Bernh. = Hierac. umbell.
umbellata Thuill. = virens
uniflora Comolli (blattar.) = austriaca
varia Mœnch = tectorum
variabilis Krock. = virens
vesicaria L. 431 (7), A 193
vesic. β L. = scariosa
villosa Fiori (*Preslii*) 433 (10 β b)
virens L., Vill. 435 (14)
virens Santi etc. = neglecta
virgata Desf. = Tolpis virg.
vulgaris Kit. (*Jacquini*) 438 (23 a)
Willdenowiana Frœl. (*alpestr.*) 439 (25 α b)
youngiformis C. Koch = lapsanifolia
CREPULA = Centaurea
centauroides Hill = C. cent.
CRESSA II 389 (735)
australis R. Br. = cretica
cretica L. 389
humifusa Lam. = cretica
indica Retz. = cretica
microphylla St.-Lag. = cretica
monosperma Stokes = cretica
villosa Hoffgg. et Lk. = cretica
CRINITARIA = Aster
Linosyris Less. = A. Linos.
punctata Cass. = A. acer
CRITAMUS = Falcaria
agrestis Bess. = F. vulgaris
Falcaria Rchb. = prec.
heterophyllus M. et K. = F. saxifraga
saxifragus Rchb. = prec.
CRITHMUM II 206 (606)
canariense Cav. = marit.
Libanotis Lk. = Hippomarathrum Liban.
maritimum L. 207
pyrenaicum L. = Seseli Libanotis
Silaus Wibel = Silaus flavescens
CRITHO = Hordeum
Ægiceras E. Mey = H. — trifurcatum
CRITHODIUM = Triticum
ægilopoides Lk. = T. monococcum
CROCODILIUM = Centaurea
Galactites Dum.-Cours. = Lupsia Galact.
salmanticum Sweet = C. salm.
CROCUS I 219 (218)
acutiflorus Seidl = albiflorus
albiflorus Kit. 220 (3 α c)
albifrons Rchb. (vernus) = prec.
annulatus Herb. = biflorus
argenteus Sabine A 50, 208 (1 d)
autumnalis M. B. (non Brot.) = Pallasii

CROCUS I 219 (218)
biflorus Mill. 219 (1), A 50, 208
biflorus A. Vaccari = minimus
Bulbocodium L. = Romulea Bulboc.
campestris Herb. = Pallasii
circumscissus Haw. = biflorus
Clusianus Pasq. = longiflorus
controversus Goir. (*vernus*) A 208 (3 α i)
corsicus J. Gay (*minimus*) 221 (6 γ), A 50
corsicus Vanucci = prec. (cfr. A 50)
dalmaticus Herb. (variegatus) = Pallasii
dianthus Goir. (*vernus*) A 208 (3 α g)
discolor Reuss = reticulatus?
estriatus Herb. (annulatus) = seg.
estriatus Tchihatch. (*biflor.*) A 208 (1 e)
etruscus Parl. 220 (3 β)
fragrans Haw. = versicolor
Fussianus J. Gay = biflorus
grandiflorus Gay (vernus) = neapolitanus
hybernus Friv. = Pallasii
Imperati Ten. 220 (5), A 50
Imperatonius Herb. = prec.
indivisus Richter = vernus
insularis J. Gay = minimus
intermedius Herb. = Orsinii
italicus Gaud. = biflorus
italicus J. Gay (minimus) = Imperati et suaveolens
lineatus Jan 219 (1 c)
longiflorus Raf. 221 (9), A 50
longifolius Fiori (*vernus*) 220 (3 α b)
longifolius N. Terr. (*biflorus*) 219 (1 b)
medius Balb. 221 (8)
medius Parl. (vernus) = neapolitanus
melitensis Herb. (odorus) = seg.
melitensis Richter (*longiflor.*) A 50 (9 b)
minimus Auct. = sardous
minimus Bot. Mag. = argenteus
minimus DC. 220 (6), A 50
minimus Ten. = biflorus
multifidus Ram. = nudiflorus
nanus DC. = minimus
neapolitanus Ker-Gawl. 220 (3 α e)
neapolitanus Ten. = Imperati
nervifolius Rchb. = vernus?
nudiflorus Sm. 221 (8 oss.)
obovatus Haw. 220 (3 α f)
odorus Biv. = longiflorus
officinalis L. (sativus) = sativus (α)
officinalis Martyn = prec.
Orsinii Parl. 221 (8 α b), A 50
Pallasianus Herb. = Pallasii
Pallasii M. B. 221 (8 β), A 50
parviflorus J. Gay (vernus) = siculus
præcox Haw. = argenteus
prolifer Goir. (*vernus*) A 208 (3 α h)

Digitized by Google

CROCUS I 219 (218)
pusillus Ten. = biflorus
pyrenaicus Herb. = nudiflorus
Reinwardtii Rchb. = versicolor
reticulatus Stev. 220 (2)
sardous Fiori (*minimus*) 221 (6 β)
sardous Martelli (Imperati) = prec.
sativus L. 221 (7), A 50
serotinus Bert. = longiflorus
siculus Tin. 220 (3 α d)
silvestris Huds. (officin.) = vernus
suaveolens Bert. (5 β), A 50
Thomasii Ten. = Pallasii
variegatus Hpe. et Hornsch. = reticulatus
vernus All., Wulf. 220 (3), A 50, 208
vernus Guss. = siculus
vernus L. (sativus) = vernus
vernus Moretti = biflorus
vernus Seb. et Maur. var. a = suaveolens
vernus var. B Ten. = neapolitanus
versicolor Ker-Gawl., 220 (4)
Visianicus Herb. = Pallasii
CROSSOPETALUM = Gentiana
ciliatum Fourr. = G. ciliata
Gentiana Andrz. = prec.
gentianoides Roth = prec.
CROTON = Tournesolia
angustifolium N. Terr. (tinctor.) = T. — angustifol.
tinctorium L. = T. tinct.
CRUCIANELLA III 122 (822)
angustifolia L. 123 (2), A 176
latifolia L. 122 (1), A 176
maritima L. 123 (3)
monspeliaca L. 122 (1 b)
monspeliensis Hill = latifol.
mucronata Roth = seg.
mucronata Ten. (*angustif.*) 123 (2 b)
purpurea Honck. = Galium purp.
rupestris Guss. 123 (4)
spicata Lam. = angustifol. et latifol.
vulgaris Gater. = latifol.
CRUCIATA = Gentiana
verticillata Gilib. = G. Cruciata
CRUPINA III 320 (913)
Crupinastrum Vis. 321 (2), A 186
etrusca Gdr. = prec.
fasciculata Lojac. (*Crupinastr.*) A 186 (2 for.)
insularis Gdr. = Crupinastr.
major Goir. (*vulgar.*) A 186 (1 b)
microcephala Fiori (*Crupinastr.*) 321 (2 b)
minor Goir. (*vulgar.*) A 186 (1 c)
Morisii Bor. = Crupinastrum
pauciflora Kar. et Kir. = vulgaris
villosa Gdr. = Crupinastr.
vulgaris Auct. it. pl. = Crupinastrum
vulgaris Cass. 321 (1), A 186
Zuccarinii Bge. = Crupinastr.
CRYPSIS I 57 (63)
aculeata All. 57 (3), A 15
ægyptiaca Tausch = alopecuroid.
alopecuroides Schrad. 57 (1), A 15
arenaria Desf. = Phleum aren.
brachystachys Batt. et Trab. (*alopec.*) 57 (1 β), A 15
cyperoides Asch. et Græbn. (*acul.*) A 15 (3 b)
geniculata R. et S. = alopecuroid.
macrostachya Brot. = alopecuroid.
minor Lge. (*schenoid.*) A 15 (2 b)
nigricans Guss. = brachystachys
phalaroides M. B. = alopecuroid.
schœnoides Lam. 57 (2), A 15
schœnoides P. B. = aculeata
sicula Jan. = brachystachys
CRYPTA = Elatine
triandra A. Br. = E. triandra
CRYPTOGLOCHIN = Carex
curvulus Heuff. = C. curv.
CRYPTOGRAMME = Allosorus
crispa R. Br. = A. crispus
CRYPTOTÆNIA II 166 (557)
Thomasii DC. 166
CRYPTURUS = Lolium
loliaceus Lk. = L. subulatum
CUCUBALUS I 357 (339)
acaulis L. = Silene acaul.
alpestris All. = Sil. Campanula
alpinus Lam. = Sil. alpina
angustifolius Mill. = Sil. angustifol. Guss.
angustissimus Nocc. et Balb. = Sil. angustiss.
antelopum Vest = Sil. antel.
baccatus Gueld. = seg.
baccifer L. 358, A 73
Behen L. = Sil. vulgaris
Behen β L. = Sil. maritima
catholicus Ficin. = Sil. — floccosa
catholicus L. = Sil. cathol.
clavæcarpus Schult. = Sil. — floccosa
conicus Lam. = Sil. conica
conoideus Lam. = Sil. conoid.
crassifolius Ten. = Sil. alpina
dichotomus Lam. = Sil. muscipula
dioicus Gilib. = Sil. Otites
divaricatus Clairv. = baccifer
dubrensis Mill. = Sil. viscosa
fasciculatus Lam. = Sil. Armeria
fimbriatus Balb. = quid?
floccosus Ficin. = Sil. — flocc.
glaucus W. = Sil. alpina
glutinosus Retz. = Sil. catholica
hermaphroditus Gilib. = Sil. Otites
horizontalis Mœnch = baccifer
inapertus Lam. = Sil. inap.
inflatus Salisb. = Sil. vulgaris
italicus L. = Sil. ital.
littoralis Pers. = Sil. marit.
CUCUBALUS I 357 (339)
littoralis Vis. = Sil. angustifol. Guss.
marginatus Kit. ex Schult. = Sil. marg.
maritimus Lam. = Sil. mar.
mollissimus L. = Sil. moliss.
mollissimus W. et K. = S. pilosa
montanus Vest. = Sil. alpina
muscosus Lam. = Sil. acaulis
noctiflorus Mill. = Sil. noct.
nutans Lam. = Sil. nut.
quadrifidus L. = Sil. quadr.
Otites L. = Sil. Otit.
paniculatus Mill. = quid?
parviflorus Lam. = Sil. Otites
parviflorus Ehrh. = Sil. parvifl.
Persoonii Spr. = Sil. alpina
pilosus W. = Sil. pilosa
Pumilio L. = Sil. Pum.
quadrifidus L. = Sil. quadr.
quadrif. Pollini = Sil. Pollinii
reflexus L. = Sil. neglecta?
rotundifolius Steud. = Sil. alpina?
Royeni M. B. = Sil. viscosa
rubens Roth = Sil. rubens
saponariæfolius Mœnch = Sil. vulgaris
saxatilis Lam. = Sil. rupestris
saxatilis β Lam. = Sil. alpestris
saxifragus Lam. = Sil. saxifr.
scaber Fisch. = Sil. — pubescens
silenoides Vill. = Sil. italica
silvestris Lam. = Sil. gallica
spicatus Lam. = Sil. nocturna
undulatus Kit. = Sil. pilosa
variegatus Lam. = Sil. quinquevulnera
venosus Gilib. = Sil. vulgaris
viscidus Krock. = seg.
viscosus L. = Sil. visc.
CUCULARIA = Lychnis
Flos-cuculi Schrank = L. Flos-cuc.
CUCUMIS III 160 (841)
agrestis Naud. (*Melo*) 161 (4 α)
albus Ser. (*sativ.*) 161 (3 c)
Cantalupo Rchb. = seg.
Cantalupo Ser. (*Melo*) 161 (4 β b)
Citrullus Ser. 160 (2)
Colocynthis L. 160 (1)
cultus Kurz. (*Melo*) 161 (4 β)
deliciosus Salisb. = Melo
edulis Steud. = Citrullus
esculentus Salisb. = sativus
flavus Ser. (*sativ.*) 161 (3 b)
flexuosus L. 161 (4 β d)
hybernus Pollini (*Melo*) 161 (4 β c)
lagenarius Dum. = Lagenaria vulgaris
maltensis Ser. (Melo) = hybern.
Melo L. 161 (4)
odoratissimis Mœnch = prec.
Pepo Dum. = Cucurbita Pepo
reticulatus Ser. (Melo) = scandens
sativus L. 161 (3)
scandens Pollini (*Melo*) 161 (4 β a)

Digitized by Google

CUCUMIS III 160 (841)
variegatus Ser. (*sativ.*) 161 (3 d)
viridis Ser. (*sativ.*) 161 (3 a)
CUCURBITA III 161 (842)
Anguria Duch. = Cucumis Citrullus
aurantia L. 163 (3 g)
Citrullus L. = Cucumis Citrull.
clodiensis Nacc. = moschata
clypeiformis Tod. (maxima) = pileiformis
Colocyntha Lk. = Cucumis Colocynthis
Courgero Ser. (*Pepo*) 162 (3 a)
cucurbitella Bég. (Pepo) 163 (3 c) = italica, cfr. A 179
Farinæ Mozz. 162 (2 c)
italica Tod. (*Pepo*) A 179 (3 c)
Lagenaria L. = Lagenaria vulgaris
macrocarpa Gasp. = moschata
macrocarpa Tod. p. p. (Farinæ) = Ohiensis
macrocarpa Tod. p. p. (max.) = Ohiensis
maxima Duch. 162 (2), A 179
Melopepo L. 163 (3 d)
messanensis Tod., Bég. (*max.*) 162 (2 d), A 179
moschata Duch. 162 (1)
neapolitana Tod., Bég. (*max.*) 162 (2 a), A 179
oblonga W. (*Pepo*) 163 (3 b)
Ohiensis Bég. (*max.*) 162 (2 b)
ovifera L. 163 (3 e)
Pepo L. 162 (3), A 179
pileiformis Rœm. (*max*) 162 (2 e)
pinnatifida Schrank = Cucumis Citrullus
piriformis Ser. (*ovifera*) 163 (3 e subf.)
verrucosa L. 163 (3 f)
CUJUNIA = Vicia
grandiflora Alef. = V. grand.
CUPRESSUS I 29 (34)
conoidea Spad. = semperv. (a)
fastigiata DC. = semperv. (a)
horizontalis Mill. 29 (1 b)
patula Spad. = horizontalis
pyramidalis Targ. Tozz. = semperv. (a)
sempervirens L. 29 (1)
sempervir. β L. = horizontalis
CUPULARIA = Inula
graveolens Gr. et Godr. = I. graveol.
viscosa Gr. et Godr. = I. visc.
CUSCUTA II 389 (786)
acutiflora Rota 390 (1 α b)
alba J. et C. Presl 390 (1 α f)
angustata Englm. (Epithym.) = subulata
approximata Bab. 390 (1 β b)
astyla Englm. = monogyna
aurantiaca Req. = australis (α)
australis R. Br. 391 (4)
bracteosa Gasp. = planiflora
breviflora Vis. 391 (4 α)
candicans Genn. = alba
Cesatiana Bert. 391 (4 β)
chiliana Englm. (racemosa) = racemosa
CUSCUTA II 389 (786)
conocarpa Englm. (*europ.*) 390 (2 b)
corymbosa Choisy (non Ruiz et Pav.) = racemosa
cupulata Englm. = approximata
densiflora Soy.-Will. = Epilinum
Epilinum Welhe 390 (3)
epispartos Boiss. = approximata
Epithymum L. (europ.) = seg.
Epithymum Murr. 389 (1), A 167
europæa L. 390 (2), A 167
globularis Bert. = palæstina
Gussonei Gasp. = subulata
hassiaca Pfeiff. = racemosa
Kotschyi Des Moul. 360 (1 α e)
leucosphæra Boiss. et Heldr. = approximata
major Gilib., DC. = europæa
micrantha Tin. (non Choisy) = palæstina
microcephala Welw. = subulata
minor Gilib., DC. = Epithymum
minor Guss. = planiflora
monogyna Vahl 391 (6)
Muelleri Strail = Trifolii
obtusiflora H. B. et K. = australis
palæstina Boiss. 390 (1 γ)
papillosa Englm. (*planiflora*) 390 (1 β c)
planiflora Koch = rubella
planiflora Ten. 390 (1 β)
Polygonorum DNtrs. (non Englm.) = Cesatiana
racemosa Mart. 391 (5)
rubella Englm. (*Epithym.*) 390 (1 α c)
Sarothamni Bruegg. A 167 (1 for.)
Schkuhriana Pfeiff. A 167 (2 c)
segetum Rota = europæa
sicula Tin. = planiflora
suaveolens Ser. = racemosa
subulata Tin. 390 (1 α g)
Tenorei Englm. (*planiflora*) 390 (1 β a)
tetrandra Mœnch = europ.
Tinei Inz. = australis (α)
Trifolii Bab. 390 (1 α d)
Ulicis Godr. = Epithymum
urceolata Kunz. = approximata
urceolata Stokes = europ.
vacua Gr. et Godr. (europ.) = Schkuhriana
vulgaris Englm. (*Epithym.*) 390 (1 α a)
vulgaris Pers. = europæa
CUSCUTINA = Cuscuta
suaveolens Pfeiff. = C. racemosa
CUSPIDOCARPUS = Satureja
rupestris Spenn. = S. thymifolia
CUTANDIA = Sclerochloa
divaricata Benth. = S. divar.
incrassata Benth. = Vulpia incr.
maritima Benth. = S. mar.
lanceolata Benth. = S. maritima
CUVIERA = Elymus
aspera Simonkai (Cap.-Med.) = E. — asper
Caput-Medusæ Simonkai = E. Cap.-Med.
europæa Kœl. = E. europæus
CYANOSERIS = Lactuca
perennis Schur = L. per.
CYANUS = Centaurea
alata Lam. = C. montana (α)
arvensis Mœnch = C. Cyanus
axillaris J. et C. Presl = C. Triumfetti
collinus Gærtn. M. et S. = C. Jacea
coriaceus Baumg. = C. cor.
Cyanus Hill. = C. Cyanus
dentato-folius Gilib. = prec.
flosculosus Baumg. = C. flosc.
hastatus Mœnch = C. sempervirens
Jacea Gærtn. M. et S. = C. Jacea (α)
laciniatus Gilib. = C. Scabiosa
lanceolatus Mœnch = Crupina vulg.
melitensis Gærtn. = C. mel.
mollis J. et C. Presl = C. moll.
montanus Hill = C. mont.
napifolius Gærtn. = C. nap.
niger Gærtn. = C. nigra
nigrescens J. et C. Presl = C. nigresc.
paniculatus Mœnch = C. pan.
phrygius Gærtn. M. et S. = C. phrygia
plumosus Gilib. = C. nervosa
ragusinus Gærtn. = C. rag.
rotundatus Mœnch = prec.
Sabiosa Mœnch = C. Scab.
segetum Hill. = C. Cyanus
solstitialis J. et C. Presl = C. solst.
variegatus Baumg. = C. Triumfetti
vulgaris Delarbre = C. Cyanus
CYATHEA = Cystopteris
alpina Roth = C. alpina
dentata Sm. = C. — dentata
fragilis Sm. = C. fragilis
montana Sm. = C. mont.
regia Forster = C. regia
regia Roth = C. — angustata
CYATHOSELINUM = Seseli
tomentosum Arc. = S. toment.
CYCLAMEN II 321 (680)
æstivum Rchb. = europæum
albiflorum Rod. et Ven. (*europ.*) 322 (3 b)
autumnale J. Boos = neapolit.
Bertolonii Fiori (*vernale*) 322 (2 β)
Clusii Lindl. = europæum
cordifolium Stokes = europæum
europæum L. 322 (3), A 162
europæum Savi = vernale
europæum Sm. = neapolit.
ficariæfolium Rchb. = neapolit.
floribundum Salisb. = europ.
hastatum Ten. (neapol.) = Poli
hederæfolium Ait. = neapol. vel vernale ?
hederæfolium Auct. = neapol.
hederæfol. Ten. = vernale

Digitized by Google

CYCLAMEN II 321 (680)
insulare Jord. = neapol.
linearifolium DC. = neapolit.
littorale Sadler = europæum
neapolitanum Ten. 321 (1), A 162
odorum Fiori (*vernale*) 322 (2 α b)
officinale Wender = europæum
orbiculatum Mill. = europæum
Poli Delle Chiaie 322 (1 β), A 162
præcox Ten. (*neapol.*) 321 (1 α b)
purpurascens Mill. = europæum
pusillum Goir. (*europ.*) A 162 (3 c)
repandum Bert. = Bertolonii
repandum S. et S. = vernale
repandum var. b Guss. = odorum
retroflexum Mœnch = europæum
romanum Griseb. = vernale
sabaudum Jord. = neapol
subhastatum Rchb. = neapolit.
vernale Mill. 322 (2)
vernum Rchb. = prec.
CYCLAMINUS = Cyclamen
europæus Scop. = C. europ.
neapolitanus Schinz et Kell. = C. neapolit.
vernum Bub. = C. vernale
CYCLOLEPIS = Cycloloma
platyphylla Moq. = C. plat.
CYCLOLOMA I 313 (291)
platyphyllum Moq. 313
CYCLOSPERMUM = Apium
Ammi Lag. = A. leptophyllum
CYDONIA = Pirus
communis Lois. = P. Cydonia
Cydonia Pers. = P. Cydon.
europæa Savi = P. Cydon.
lobata Bosc. = P. Cydon.
lusitanica Mill. = P. — lusit.
maliformis Mill. = P. Cyd. (for.)
oblonga Mill. = P. Cydon.
piriformis Medic. = P. Cydon.
silvestris Risso = P. Cyd. β silvestris
tomentosa C. Koch = P. Cyd.
Umbato M. Rœm. = P. Cydon.
vulgaris Pers. = P. Cydon.
CYLICHNANTHUS = Dianthus
barbatus Dulac = D. barb.
ciliatus Dulac = D. Seguieri
deltoides Dulac = D. delt.
maculatus Dulac = D. Armeria
neglectus Dulac = D. negl.
Plumarius Dulac = D. Plum.
prolifer Dulac = Tunica prol.
vaginatus Dulac = D. vagin.
CYMBALARIA = Linaria
Cymbalaria Wettst. = L. Cymb.
Elatine Gærtn. M. et S. = L. Elat.
hederacea S. F. Gray = seg.
muralis Baumg. = L. Cymbal.
spuria Gærtn. M. et S. = L. spur.
vulgaris Fourr. = L. Cymbal.
CYMBIDIUM
Corallorhiza Sw. = Corallorh. Neottia
CYMBIDIUM
cordatum Lond. = Listera cord.
latifolium Sw. = Epipactis lat.
Lœselii Sw. = Liparis Lœselii
palustre Sw. = Epipactis pal.
CYMODOCEA I 157 (162)
æquorea Freyn, Posp. ? = Zostera marina
æquorea Kœnig = nodosa
nodosa Asch. 157
CYNANCHUM II 345 (703)
acuminatum Moric. (non Alior.) = laxum
acutum L. 345 (1)
Burnatii Brig. (*Vincetoxic.*) A 163, 215 (3 β')
contiguum Koch 346 (3 γ)
cordatum Kral. (*Vincetoxic.*) A 163 (3 α c)
fuscatum Lk. 346 (3 δ)
laxum Bartl. 346 (3 β), A 163
medium Koch = laxum
minus C. Koch = fuscatum
monspeliacum L. 345 (1 b)
nigrum Pers. 345 (2), A 214
puberulum G. Beck (*Vincetoxic.*) A 163 (3 α b)
Vincetoxicum Pers. 345 (3), A 163, 215
vulgare Pers. = prec.
CYNARA III 380 (922)
altilis DC. (Cardunc.) = seg.
altilis Fiori (*Scolymus*) 380 (β c)
Cardunculus L 380
colorata Stokes = Cirsium olerac.
corsica Viv. = Cardunculus (α)
diversifolia Stokes = Cirs. heterophyll.
eriocephala Stokes = Cirs. eriophor.
esculenta Salisb. = Cardunc.
ferox Ten. ex Steud. = Cardunc. ?
horrida Ait. = Cardunculus (α)
hortensis Mill 381 (β d)
humilis Viv. (non L.) = Cardunculus (α)
inermis DC. (Cardunc.) = seg.
inermis Fiori (*Scolymus*) 380 (β b)
lanceata Stokes = Cirs. lanceolatus
mutica Vis. (*Scolymus*) 381 (β a)
palustris Stokes = Cirs. pal.
repens Stokes = Cirs. arvense
sativa Moris (Cardunc.) = Scolymus
Scolymus L. 381 (β)
silvestris Lam. = Cardunc. (α)
spinescens Fiori (*Scolymus*) 381 (β e)
spinosissima J. et C. Presl = Cardunculus (α)
tuberosa Stokes = Cirs. tub.
CYNOCRAMBE = Thelygonum
prostrata Gærtn. = T. Cynocrambe
CYNODON I 75 (92)
Dactylon Pers. 75
Phragmites Rasp. = Phragm. communis
CYNODON I 75 (92)
præcox R. et S. = Digitar. sanguinalis
repens Dulac = Dactylon
sarmentosus S. F. Gray = prec.
stellatus W. = prec.
CYNOGLOSSUM II 378 (727)
albiflorum Goir. (*creticum*) A 167 (3 b)
amplexicaule Lam. = cretic.
apenninum Gouan = prec.
apenninum L. 379 (1), A 167
argenteum Lam. = cheirifol.
bicolor W. 379 (2 α b)
cheirifolium Jacq. = creticum
cheirifolium L. 380 (6)
cheirifolium Sieb. = Columnæ
clandestinum Desf. 379 (4)
clavatum Viv. = cheirifol.
Clusii Lois. = Lappula Myosotis
Columnæ N. Terr. = officinale
Columnæ Ten., Biv. 380 (7)
creticum Mill. 379 (3), A 167
deflexum Roth = Lappula deflex.
Dioscoridis Vill. 379 (2 γ)
fœtens Gilib. = officin.
germanicum Jacq. = montan.
humile Ten. (offic.) = montan.
hybridum Tausch = bicolor
hybridum Thuill = offic.
Lappula Scop. = Lappula Myosotis
lineatum Risso = cheirifolium
linifolium L. = Omphalodes lin.
magellense Ten. 380 (5)
minor Ten. (offic.) = nebrodense
Mœnchii Nocca et Rœm. = Dioscoridis
montanum L., Lam. 379 (2 β)
nebrodense Guss. 379 (2 δ), A 167
officinale Brot. = clandestinum
officinale Desf. = creticum
officinale L. 379 (2), A 167
offic. γ L. = montanum
Omphalodes L. = Omphal. verna
parvifolium C. Koch = nebrodense
pictum Ait. = creticum
pustulatum Boiss. = nebrodense
ruderale Salisb. = officin.
siculum Guss. 380 (nota)
silvaticum Hænke = montan.
Tenorii Guss. ex Nym. = nebrodense
tomentosum Lehm. = clandestinum ?
umbrosum Caruel (offic.) = montanum
vernale Salisb = Omphal. verna
virens Schreb. = montan.
vulgare Gueld. = officin.
Xatarti Gay = Dioscoridis
CYNOMORBIUM = Ranunculus
heterophyllum Opiz = R. arvensis
CYNOMORIUM I 288 (278)
coccineum L. 288
purpureum F. C. Rupr. = coccineum
CYNOSURUS I 80 (104)
ægyptius L. = Dactyloctenium ægyptiac.

Digitized by Google

CYNOSURUS I 80 (101)
aureus L. = Lamarkia aurea
cæruleus L. = Sesleria cærulea
coracanus L. = Eleusine corac.
cristatus L. 81 (1), A 21
cylindricus Balb. = Sesleria argent.
distichus Hoffm. = Sesler. dist.
durus L. = Sclerochloa dura
echinatus L. 81 (2), A 21
effusus Lk. = elegans
elegans Desf. 81 (3), A 21
erucæformis Ait. = Beckmannia eruc.
fertilis De Lens = gracilis
foliosus Bolzon (*echinat.*) A 21 (2 c)
gracilis Viv. A 22 (3 β)
indicus L. = Eleusine indica
microcephalus Hoffm. = Sesleria ovata
obliquatus Lk. = elegans
ovatus Hpe. = Sesleria ovata
paniceus L. = Polypogon monspel.
paradoxus Fiori A 22 (3 bis)
phleoides Desf. = Kœleria hispida
polybracteatus Gr. et Godr. = elegans
Pouzolzii Req. = gracilis
purpurascens Ten. (*echinat.*) 81 (2 b)
retroflexus Vahl = Dinebra retr.
siculus Jacq. = Catapodium sic.
sphærocephalus Wulf. = Sesleria sphær.
tristachyus Lam. = Eleusine trist.
Wulfenianus Jacq. (sphæroceph.) = Sesleria — Wulfen.
CYPERUS I 113 (132)
acicularis With. = Heleochar. acic.
ægyptiacus Glox. 116 (15)
aristatus Rottb. 114 (6)
aureus Ten. 115, A 34 (11 b)
australis Schrad. = glomeratus
badius Desf. 116 (13 β)
banaticus Kit. = glaber
Bœckeleri Cavara 115 (6 β)
brachystachys Presl = badius
calidus Kern. A 34 (7 c)
capillaris Kön. = globosus
capitatus Vand. (non Burm.) = ægyptiacus
cinnamomeus Retz. = glomeratus
comosus S. et S. A 34 (12 e)
compressus Krock. = virescens
congestus Bœck. (non Vahl) = polystachyus
cossyrensis Tin. = levigatus (α)
diandrus Biv. = fuscus
difformis L. 115 (8)
distachyus All. 114 (1 β), A 33
elatior Sacc. (fuscus) = calidus
esculentus L. 115 (11), A 34
esculentus Savi = rotundus
fascicularis DC. = globosus
fascicularis Lam. = polystachyus
fastigiatus W. = longus
CYPERUS I 113 (132)
ferrugineus De Bonis (*flavesc.*) A 33 (3 c)
ferrugineus Forsk. = fuscus
flavescens L. 114 (3), A 33
Forskalii Dietr. = fuscus
fuscus L. 115 (7), A 34
glaber L. 115 (10), A 34, 205
globosus All. 114 (4)
glomeratus L. 115 (9), A 34
Gussonii Gasp. = flavescens
Heldreichianus Boiss. = longus
hexastachyos Rottb. A 34 (12 c)
humifusus Clem. = globosus
Hydra Michx., Ten. = rotundus
inconspicuus Genn. A 34 (12 b)
intermedius Guss. = Preslii?
junciformis Cav. = distachyus
lateralis Forsk. = levigatus
levigatus L. 114 (1), A 33
longus L. 116 (13)
macrostachyos Boiss. (rotund.) = comosus
major Parl. (rotundus) = prec.
melanorrhizus Del. = aureus
Michelianus Lk., Sadl. (non Del.) = Scirpus Mich.
monostachyus Lk. = levigatus
monostachyus Sacc. (*flavesc.*) 114 (3 b), A 33
Monti L. f. = serotinus
mucronatus Rottb. = levigatus (α)
mucronatus S. et S. = distachyus
myriostachys Ten. 116 (13 β b)
nanus Fiori (*ægyptiacus*) 116 (15 b)
neglectus Parl. = badius
olivaris Targ.-Tozz. = rotundus
pallidus Savi = aureus
Papyrus L. 116 (14)
patulus Kit. = glaber
pictus Bœckel. (levigat.) = distachyus
pictus Ten. = glaber
polystachyus Rottb. 114 (5)
Preslii Parl. 116 (13 β c)
procerus M. B. = longus
protractus Del. = fuscus
protractus Lk. = difformis
pygmæus Goir. (flavesc.) = monostachyus
racemosus Ten. = myriostachys
radicosus S. et S. = rotundus
rotundus L. 115 (12), A 34
rotundus B Ten. = comosus
sativus Bœckel. (*esculent.*) A 34 (11 a)
schœnoides Griseb. = ægyptiacus
serotinus Rottb. 114 (2), A 33
submonocephalus Bœckel. (globos.) = globosus
viridis Spr. = virescens
syriacus Parl. = Papyrus
Tenorianus Schult. = aureus
Tenorii Presl = aureus
tenuiflorus Presl, Guss., Ten. (non Rottb.) = Preslii
tenuiflorus W. = longus
tetrastachyos Desf. A 34 (12 d)
CYPERUS I 113 (132)
thermalis Dum. = badius
virescens Hoffm. 115 (7 b)
vulgaris Sieb. in Kth = globosus
CYPRIANTHE = Ranunculus
anemonoides Spach = seg.
asiatica Freyn = R. asiat.
CYPRIPEDIUM I 232 (225)
Calceolus L. 232
CYRSTOSTEMMA = Scabiosa
atropurpureum Spach = S. atr.
maritimum Fourr. = S. mar.
CYSTIUM = Astragalus
Cicer Stev. = A. Cicer
Pseudo-Cicer Opiz = prec.
CYSTOPTERIS I 9 (8)
acutidentata Dœll. (*frag.*) A 4 (2 α e)
alpina Desv. 9, A 4 (2 β b)
angustata Koch (*frag.*) A 4 (2 α d)
anthriscifolia Koch (*frag.*) A 4 (2 α b)
caucasica C. A. Mey. = fragilis
cynapiifolia Koch (*frag.*) A 4 (2 α c)
deltoidea Asch. (*regia*) A 4 (2 β b)
deltoidea Milde (alp.) = prec.
deltoidea Shuttlew. A 4 (2 α f)
dentata Desv., Hook. A 4 (2 α a)
Filix-fœmina Coss. et Germ. = Asplen. F.-fœm.
fragilis Bernh. 9 (2), A 4, 202
fragilis γ Bert. = pumila
fumariiformis Koch (*regia*) A 4 (2 β a)
Huteri Hausm. = seg.
Huteri Milde (*frag.*) A 4 (2 α g)
leptophylla Zum. A 4 (?)
lobulato-dentata Koch (frag.) = dentata, cfr. A 4
montana Lk., Bernh. 9 (1)
pinnatipartita Koch (frag.) = fragilis (α), cfr. A 4
pinnatisecta Guss. (*frag.*) A 4 (2 for.)
pollinensis N. Terr. (*frag.*) A 4 (2 for.)
pumila Vis. et Sacc. (*frag.*) A 202 (2 α for.)
regia Desv., Presl 9, A 4 (2 β)
regia × montana? = deltoidea
stenoloba A. Br. (*frag.*) A 4, 202 (2 α for.)
tenera Milde (*frag.*) A 4 (2 for.)
tenuis Gœrtn. M. et S. (*frag.*) A 4 (2 for.)
CYTINUS I 288 (279)
canariensis Webb (Hypocist.) = kermesinus
Clusii Nym. = kermesinus
Hypocistis L. 288
kermesinus Guss. (*Hypocist.*) 288 (b)
CYTISANTHUS = Genista
radiatus Lang = G. radiata
CYTISOPHYLLUM = Cytisus
sessilifolium Lang. = C. sessilif.
triflorus Webb. et Berth. = C. triflorus

Digitized by Google

CYTISUS II 12 (482)
æolicus Guss. 14 (7), A 135
affinis Presl = quid?
albidus Ten. (non DC.) = glabratus
albiflorus Gort. M., Goir. (*purpur.*) A 135 (10 b)
albus Lk. 16 (*nota*)
Alksungeri Just = Alschingeri
alpestris Bornet (non Schur) = prostratus
alpinus Lam. = Laburnum
alpinus Mill. 13 (2), A 135
Alschingeri Vis. 13 (1 β)
angustifolius Mœnch = alpin.
apulus Ten. et Guss. = ramosiss.
arboreus DC. 16 (*nota*)
arcuatus Vukot. = Genista silvestris
Ardoini Fourn. 14 (9)
argenteus L. 16 (14)
argyreius Rchb. = spinescens
angustifolius Mœnch = alpinus
australis Freyn (*nigricans*) 13 (3 b)
austral. Kern. = prec.
Bartolottæ Tod. A 135 (7 β)
biflorus Ten. (*non L' Hérit.*) A 136
bisflorens Host 15 (11 δ b)
calabrus Ten. (*biflorus*) A 136
candicans Lam. = monspessul.
candidus Presl = quid?
capitatus Scop. = supinus
ciliatus Koch (*hirsutus*) A 135 (11 α c)
cinereus Vukot. = Genista cin.
Colmeiroi Briq. (*monspessul.*) 16 (13 b)
Colmeiroi Wk. (candicans) = prec.
complicatus Rœusch., DC. = Adenocarpus compl. (α)
decumbens C. Koch = Genista diffusa
decumbens Spach = Genista pedunculata
diffusus Vis. = Genista diff.
divaricatus L' Hér. = Adenocarpus complicatus (α)
elongatus W. et K. 15 (11 γ)
emeriflorus Rchb. 14 (6)
falcatus W. et K. = supinus
gallicus A. Kern. = supinus
garganicus Bert. (*hirsut.*) 15 (11 α b)
germanicus Vis. = Genista germ.
glaber Lam. = nigric. et sessilifol.
glabratus Ten. (*ramosiss.*) 15 (12 β b)
glabrescens Sartorelli = emeriflorus
grandis Goir. (*supinus*) A 135 (11 δ c)
Halleri Rchb. (decumbens) = Genista pedunculata
heteracanthus Vukot. = Genista germanica
hirsutus L. 15 (11), A 135
hispanicus Vukot. = Genista hisp.

CYTISUS II 12 (482)
holopetalus Fleisch. = Genista holop.
humifusus Ces. P. et G. (decumb.) = Genista diffusa
humifusus Nym. = prec.
inermis Vis. (german.) = Genista — inerm.
infestus Guss. = Calycotome infesta
innocuus Vis. (silvestris) = Genista silvestris (α)
Kitaibelii Vis. = Genista procumbens
Laburnum L. 12 (1)
Lamarckii Ten. A 136
lanigerus DC. = Calycotome villosa
lateriflorus Neilr. (capitat.) = hirsutus
linifolius Lam. 16 (*nota*)
Linnæanus Wettst. (*Laburn.*) 12 (1 α)
Lobelii Tausch = sessilifol.
lotoides Pourr. (non. W.) = supinus
lucanus Ten. (*Lamarckii*) A 136
maritimus Fiori (*scopar.*) 13 (5 b)
microphyllus Goir. (*supinus*) A 135 (11 δ d)
monspessulanus L. 16 (13)
nanus Favrat (nigric.) = sericeus?
nigricans L (1771) = triflorus
nigricans L. (1753) 13 (3), A 135
ovatus Vukot. = Genista ovata
parvifolius Lam. = Adenocarpus complicatus (α)
penduliformis Stokes = Laburnum
pendulus Salisb. = prec.
pilosus Vukot. = Genista pil.
pilosus Wettst. (*alpin.*) 13 (2 b)
pollinensis N. Terr. (*spinescens*) 15 (12 γ)
polymorphus Pourr. = Adenocarpus complicatus
polytrichus M. B. = prostratus
Preslii Nym. = Calycotome villosa
procumbens Spr. = Genista proc.
prostratus Bert. = hirsutus (α)
prostratus Koch = bisflorens
prostratus Scop. 15 (11 β)
prostratus Simonkai = Genista pedunculata
proteus Zum. A 136
pubescens Gilib. = supinus
pubescens Mœnch = monspess.
pumilus DNtrs. 15 (11 β b)
pungens Vis. (silvestris) = Genista dalmat.
purgans Spach = Genista purg.
purpurascens Evers (*hirsutus*) A 135 (11 α d)
purpureus Scop. 14 (10), A 135
pygmæus Evers (hirsutus) = prostratus
radiatus Koch = Genista rad.
ramentaceus Sieb. 16 (*nota*)
ramosissimus Ten. 15 (12 β)

CYTISUS II 12 (482)
rigidus DC. (lanigerus) = Calycotome — rigida
rufulus J. et C. Presl = quid?
sagittalis Koch = Genista sag.
scariosus Vukot. = Genista januensis
scoparius Lk. 13 (5)
sericeus Rochel (*nigric.*) A 135 (3 for.)
sericeus Vis. = Genista seric.
sessilifolius L. 13 (4)
sessilis Mill. = sessilifol.
siculus Guss. (*triflor.*) 14 (8 b)
silvestris Vis. = Genista silv.
spinescens Presl = quid?
spinescens Sieb 15 (12)
spinosus Koch = Calycotome infesta
spinosus Lam. = Calycotome spin.
stabianus Ten. (*Lamarkii*) A 136
subspinescens DC. p. p, Ten. p. p. (biflorus) = calabrus
supinus L. 15 (11 δ), A 135
tener Jacq. = Genista virgata
terminalis Rchb. (capitat.) = supinus
tinctorius Vis. = Genista tinct.
triangularis Vis. = Genista januensis
triflorus Lam. = hirsutus
triflorus L' Hér. 14 (8), A 135
villosus Pourr. = triflorus
virescens Wimm. et Grab. (supin.) = hirsutus
virgatus Salisb. = nigricans
virgatus Vukot. = Genista virg.
virgulatus Rchb. = triflorus
Weldeni Vis. = ramentaceus
Zanonii Turra = argenteus

CYTTARIUM
dioicum Peterm. = Antennaria dioica
silvaticum Peterm. = Gnaphalium silvat.

CZACKIA = Paradisia
Liliastrum Andrz. = P. Lil.

CZERNYA = Phragmites
arundinacea Presl = Ph. communis

DACTYLIS I 84 (112)
abbreviata Bernh. A 22 (α c)
australis Wk. (glomer.) = hispanica
caudata Brot. = Trisetum paniceum
capitata Schult. = Poa capitata
cylindracea Brot. = Kœleria phleoides
cynosuroides Lœfl, L. p. p. = Spartina stricta
distichophylla Brign. = Æluropus litor.
flavescens Schröter (*glomer.*) A 22 (α b)
glaucescens W. = hispanica
glomerata L. 84, A 22
Hackelii Asch. et Græbn. (*glomer.*) A 22 (α d)
hispanica Roth 85 (β)

Digitized by Google

DACTYLIS I 84 (112)
litoralis Bert. = Æluropus repens
litoralis W. = Æluropus lit.
maritima Hack. (hispan.) = Hackelii
maritima Suffr. = Æluropus litor.
montana N. Terr. (*glomer.*) A 22 (α for.)
Noëana Steud. = hispanica
paspaloides W. = Dinebra retroflexa
repens Desf. = Æluropus rep.
Sibthorpii Boiss. (*glom.*) 85 (γ)
Sibthorpii Hack. (hispan.) = prec.
stricta Sol. in Ait. = Spartina stricta
subsessilis Peterm. (glomer.) = abbreviata
DACTYLOCTENIUM I 76 (96)
ægyptiacum W. 76, A 19
ægyptium Richter = prec.
meridionale Ham. = ægypt.
mucronatum W. = ægyptiac.
DACTYLON = Cynodon
officinale Vill. = C. Dactylon
sanguinale Vill. = Digitar. sang.
DACTYLOPHYLLUM = Potentilla
anserina Spenn. = P. anser.
Ehrharti Spenn. = Fragaria collina
Fragaria Spenn. = Fragar. vesca
Fragariastrum Spenn. = P. sterilis (α)
Sibbaldia Spenn. = P. Sibbaldii
DAHLIA III 301 (897)
pinnata Cav. 301
rosea Cav. = pinnata
superflua Ait. = pinnata
variabilis Desf. = pinnata
DAMASONIUM I 161 (170)
Alisma Mill. 161 (1), A 42
Bourgæi Coss. 161 (1 β)
compactum Mich. in DC. (Alisma) = Bourgæi
Dalechampii S. F. Gray = Alisma
Damasonium Asch. et Græbn. = Alisma
minimum Lge. = polysper.
polyspermum Coss. 162 (2)
stellatum Thuill., Rich. = Alisma
vulgare Coss. et Germ. = Alisma
DANAA = Physospermum
aquilegifolia All. = Ph. aquileg.
silvatica Lag. = prec.
DANTHONIA I 74 (90)
alpina Vest. = provinc.
breviaristata Beck (*provinc.*) A 19 (b)
calycina Rchb. = provinc.
decumbens DC. = Trioidia decumb.
provincialis DC. 75, A 19
strigosa P. B. = Avena strigosa
DANTIA = Ludwigia
palustris Des Moul. = L. pal.
DANUBIUNCULUS = Limosella
acaulis Sailer = L. aquatica
DAPHNE I 282 (271)
acuminata Stocks = oleoides
albiflora Wolf = Mezereum
alpina L. 283 (4)
alpina Savi = collina
alpina S. et S. = oleoides
angustifolia C. Koch = oleoides
argentea Clarke = sericea
argentea S et S. = Thymelæa Tartonraira
australis Cyr. = collina
Blagayana Freyer 283 (nota)
buxifolia Ledeb. = sericea
buxifolia Vahl = oleoides
calycina Berger = Thymelæa dioica
candicans Lam. = Thymelæa Tartonraira
candida Vitm. = alpina
Cneorum L. 282 (8)
collina Sm. 282 (2 β)
collina Urv. = oleoides
cretica Steud. = oleoides
dioica Gouan = Thymelæa dioica
Elisæ Vis. = sericea
florida Salisb. = Mezereum
glandulosa Bert. = oleoides
Gnidium L. 282 (1)
jasminea Griseb., Strobl (non S. et S.) = oleoides
lateriflora St.-Lag. = Mezereum
Laureola L. 283 (5)
Liottardi Vill. = Mezereum
lucida Lois. = oleoides
major Lam. = Laureola
Mezereum L 283 (6), A 61
neapolitana Lodd. 282 (2 β b)
odorata Lam. = Cneorum
oleæfolia Lam. = sericea
oleoides Schreb., L. 283 (4 β)
orthophylla St.-Lag. = Gnidium
paniculata Lam. = Gnidium
petræa Leyb. 283 (3 β)
prostrata Salisb. = Cneorum
rupestris Facch. = petræa
sempervirens Salisb. = Laureola
sericea Vahl 282 (2)
serotina Goir. (*Mezer.*) A 61 (6 b)
striata Tratt. 283 (3 γ)
Tartonraira L. = Thymelæa Tart.
Thymelæa L. = Thymel. Sanamunda
tomentosa Lam. = Thymelæa Tartonraira
DASIPHORA = Potentilla
fruticosa Raf. = P. frutic.
DASYSTEPHANA = Gentiana
Asclepiadea Borckh. = G. Ascl.
punctata Borckh. = G. punct.
DATISCA = Rhus
hirta L. = R hirta
DATURA II 393 (787)
Bertolonii Parl. = inermis
chalybea Koch (Stramon.) = Tatula
dubia Bianca A 168 (2 α b)
ferox L. 394 (3)
fruticosa Horn. = Metel
DATURA II 393 (787)
hybrida Ten. = inermis
inermis Jacq., Juss. 394 (nota)
levis L. f. = inermis
loricata Sieb. = Stramon.
lurida Salisb. = prec.
Metel L. 394 (1)
parviflora Salisb. = seg.
Stramonium L. 394 (2), A 168
Tatula L. 394 (2 β), A 168
DAUCUS II 185 (579)
agrestis Raf. = Carota
Allionii Lk. = Carota
Allionii Rouy et Cam. (*Carota*) A 153 (1 α f)
Anthriscus Baill. = Torilis Anthr.
aureus Desf. 188 (3)
australis Guss. (non Pœpp.) = rupester
Bertolonii Arc. (*Gingidium*) 186 (1 β b)
bicolor S. et S. 188 (2), A 153
Bocconei Guss. 186 (1 η), A 153
breviaculeatus Calestani = seg.
breviaculeatus Caruel (*Carota*) 187 (1 μ)
breviaculeatus Caruel (Gingidium) = dentatus et rupester
Broteri Ten. 188 (5), A 153
Broteri β Boiss. = bicolor
Carota L. 185 (1), A 153, 214
coadunatus Ten. 189 (nota)
communis Rouy et Cam. = Carota
commutatus Paol. (*Carota*) 186 (1 γ), A 214
Daucorlaya Drude A 153, 214
dentatus Bert. 186 (1 θ)
drepanensis Tod. 186 (1 β d)
esculentus Salisb. = sativus
Federicii Paolucci (Carota) = viviparus
foliosus Guss. 186 (1 ε)
gibbosus Bert. 186 (1 ζ)
Gingidium L. 186 (1 β)
grandiflorus Desf. = mauritan.
grandiflorus Scop. 188 (6)
gummifer Lam. 187 (1 ξ), A 153
gummifer Ten. = hispidus
hispanicus DC., Colla et alior. (non Gouan) = gummifer
hispidus Desf. 187 (1 ν)
hispidus Gilib. = Carota
hispidus Gr. et Godr. = lopadusanus
hispidus Ten. (non Desf.) = Bocconei
intermedius Corb. (*gummifer*) A 153 (1 ξ b)
leptophyllus Scop. = Torilis leptoph.
Lappula Weber = Caucal. daucoid.
latifolius Baill. = Turgenia lat.
leptophyllus Scop. = Torilis lept.
levis Salisb. = Ammi Visnaga
lopadusanus Tin. 187 (1 λ)
lopadusanus Rouy (mauritan.) = minor
lucidus L. f. 186 (1 β c)
lucidus Lois. = Bocconei

Digitized by Google

DAUCUS II 185 (579)
major Posp. = seg.
major Vis. (Carota) = mauritanicus
maritimus Gærtn = pumilus
maritimus Lam. 185 (1 α c)
maritimus L. (muricatus) = pumilus
Martellii Gandgr. = gummifer
mauritanicus All. = Allionii
mauritanicus Bert., Guss., Gr. et Godr. = commutatus
mauritanicus Lam. = maximus
mauritanicus L. = commutatus vel maximus
mauritanicus Paol. (Carota) 186 (1 δ), A 153 = maximus, cfr. A 214
maximus Desf. A 214 (1 δ)
meifolius Ten. (non Brot.) = Ammi crinitum
Michelii Caruel = Broteri
minor Fiori (*commutatus*) A 214 (1 γ b)
muricatus L. 188 (4)
muricatus L. Mant. = Broteri
nebrodensis Strobl = Gingidium ?
nitidus Gasp. 185 (1 α d)
officinalis Gueld. = Carota
parviflorus Bert. = breviaculeatus
parviflorus Desf. 187 (1 κ)
parviflorus Guss. = maritimus
platycarpos Scop. 189 (6 β)
polygamus Jacq. et Auct. it. (non Gouan.) = Carota (α)
pubescens DNtrs. (non Koch) = Broteri
pulcherrimus Koch = Caucal. pulcherr.
pumilus Ball 189 (7)
rupester Guss. 187 (1 ι)
sativus DC. (*Carota*) 185 (1 α b)
sativus Pass. = prec.
scabrosus Bert. = bicolor
serratus Moris 186 (1 θ b)
setulosus Guss. = bicolor
siculus Ten. = Bocconei
siculus Tin. 187 (1 ο)
silvestris Mill. = Carota
speciosus Ces. = bicolor
Visnaga L. = Ammi Visnaga
viviparus Federici (*Carota*) 185 (1 α e)
vulgaris Lam. = Gingidium
vulgaris Neck. = Carota
DECANDOLIA = Agrostis
alba Bast. = A. alba
effusa Bast. = Milium eff.
pumila Bast. = A. vulgar.
stolonifera Bast. = A. alba
vulgaris Bast. = A. vulg.
DECKERA = Helminthia
aculeata Sch. Bip. = H. acul.
DEINA = Triticum
polonica Alef. = T. polonic.
DEINOSMOS = Aster
siculus Raf = A. Linosyris
DELIA = Spergularia
segetalis Dum. = S. seg.
DELPHINASTRUM = Delphinium
elatum Spach = D. elatum
fissum Spach = D. fiss.
hybridum Spach = D. fissum
DELPHINIUM I 522 (437)
adenopodum Borb. = paniculat.
adenopodum Borb. (Consol.) = prec.
addendum Mc Nab = Ajacis
Ajacis Led. = orientale
Ajacis L. 523 (2), A 108
alpestre Gaud. (intermedium) = alpin.
alpinum W. et K. A 109 (8 β)
ambiguum Lois. = pubescens
ambiguum Mill. = Ajacis
amethystinum Gaud. (intermedium) = montan.
amœnum Bernh. = alpinum
bithynicum Griseb. = orientale
Bovei Decais. = peregrinum (α)
brevipes Rouy et Fouc. (*Ajacis*) 523 (2 b)
Cadetianum Heldr. (Consol.) = paniculat.
Cammarum Brandza = Aconit. variegat.
cardiopetalum DC. = verdunense
cernuum Brandza = Aconit. cernuum
cinerescens Friv. (junc.) = halterat.
Clusianum Host = elatum
commutatum Gay = Ajacis
confertum Guss. = halteratum
Consolida Gouan = pubescens
Consolida L. 522 (1), A 108
Consolida S. et S. = Ajacis
davuricum Georgi = fissum
diffusum Stokes = Consolida
divaricatum Dulac (non Led.) = Consolida
divaricatum Rchb. = paniculat.
dubium Rouy et Fouc. (*elatum*) 524 (8 α b)
elatum All. = montanum
elatum Auct. it. pl. = alpinum
elatum L. 524 (8), A 109
emarginatum Presl 524 (7 β), A 109
fissum Ten. = velutinum
fissum W. et K. 524 (6), A 108
Garumnæ Lap. = halteratum
gracile DC. 523 (4 γ b)
gratum Hoffgg. = elatum
halteratum S. et S. 523 (4 β)
Haynaldi Huth (*alpin.*) A 109 (8 β b)
heterophyllum N. Terr. (*pubescens*) A 109 (1 γ b)
hirsutum Pers. = fissum
hybridum L. = villosum, cfr. A 109
hybridum Steph. = fissum
intermedium DC. = elatum, alpinum, etc.
intermedium Fiori 524 (8 α) = alpinum, cfr. A 109
intermedium Sol. = elatum (α), cfr. A 109
junceum DC. = peregrin. (α)
DELPHINIUM I 522 (437)
leiocarpum Rouy et Fouc. (fissum) = narbonense
junceum Moris = gracile
longepedunculatum Guss. (*Ajacis*) A 108 (2 d)
longepedunculatum Scop. ex A. Terr. (*Consolida*) 522 (1 α b)
longipes Moris 523 (4 δ), A 108
Lycoctonum Brandza = Aconit. Lycoct.
maritimum Cav. ex Balb. = pictum
medium Halacsy (peregrin.) = longipes
micranthum Boiss. (Consol.) = paniculat.
micranthum Freyn et Bornm. = prec.
minus Huth (*Ajacis*) A 108 (2 c)
mixtum Lois. = narbonense
monophyllum Gilib. = Consolida
montanum DC. 524, A 109 (8 γ)
moschatum Soleir. = pictum
muscodorum Mut. (Requienii) = pictum
Napellus Brandza = Aconit. Nap.
narbonense Huth 524, A 109 (6 γ)
officinale Wend. = Staphysagria
Oliverianum DC. A 109
orientale J. Gay 523 (3)
ornatum Bouché = Ajacis
oxysepalum Borb. et Pax A 109 (8 δ)
palmatifidum DC. = elatum
paniculatum Brandza = Aconit. panic.
paniculatum Host 522, A 108 (1 β)
paphlagonicum Freyn et Sint. = halterat.
peloponnesiacum Halacsy (peregrin.) = longipes
pentagynum Lam., Desf. 524 (7), A 109
peregrinum Lam. = verdunense
peregrinum L. 523 (4), A 108
peregrinum Wk. = halteratum
pictum W. 523 (5 β)
pilosum Schur (fissum) = fissum
ponticum Hausskn. et Bornm. = fissum
productum Huth (alpin.) = Haynaldi
productum Huth (*oxysepal.*) A 109 (8 δ b)
pubescens DC. 522, A 108 (1 γ)
pubescens Freyn (Consol.) = paniculat.
pubescens Heuff. (fissum) = fissum
pyrenaicum Pourr. = montanum
Requienii Auct. it. (non DC.) = pictum
segetum Lam. = Consolida
simplex Salisb. = Ajacis
Sintenesii Uechtr. = orientale

Digitized by Google

DELPHINIUM I 522 (437)
sparsiflorum Vis. (Consol.) = paniculat.
speciosum Janka (non M. B.) = oxysepalum
Staphysagria L. 523 (5), A 108
subsaccatum Huth (peregrinum) A 108 (4 α b)
tauricum Pallas = fissum
thessalonicum Char. = fissum
trigynum Schott = halteratum
urceolatum Jacq. = elatum
velutinum Bert. 524, A 109 (6 β)
v rdunense Balb. 523 (4 γ)
versicolor Salisb. = Consolida
villosum Lam. (elatum) = montanum
villosum Stev. A 109 (in text.)
DEMAZERIA = Desmazeria
DEMIDOVIA = Tetragonia
tetragonoides Pall. = T. expansa
DENDRANTHEMA = Chrysanthemum
indicum Des Moul. = Ch. ind.
Parthenium Des Moul. = Ch. Parth.
sinensis Des. Moul. = Ch. sin.
DENDROSPARTUM = Genista
ætnense Spach = G. ætn.
sardoum Spach = prec.
DENTARIA I 440 (371)
alternifolia Dalla Torre = seg.
alternifolia Hausm. (enneaph.) 440 (1 b), A 95
angustifolia Ten. hb. A 95 (2 β b)
bulbifera L. 441 (3), A 95
canescens Ten. A 95 (2 β')
Clusiana Rchb. = digitata
digitata Lam. 441 (2 δ), A 95
enneaphyllos L. 440 (1), A 95
glabra Fiori (digit.) A 95 (2 δ b)
glabrescens A. Schmidely (digit.) A 95 (2 δ a)
grandiflora Fiori (bulbif.) A 95 (3 c)
heptaphylla Vill. = pinnata
intermedia Sonder 441 (2 γ)
lactea Fiori (bulbif.) A 95 (3 e)
lactea Fiori (digit.) A 95 (2 δ d)
ochroleuca Gaud. = polyphylla
pentaphyllos L. 440 (2), A 95
pentaphyll. β et γ L. = digitata
pentaphyll. α L. = pinnata
pentaphyllos Scop. = digitata
pilosa A. Waisb. (bulbif.) A 95 (3 b)
pilosula Gelmi (digit.) A 95 (2 δ c)
pinnata Lam. 440 (2 α)
polyphylla W. et K. 441 (2 β), A 95
ptarmicifolia D^. (bulbif.) A 95 (3 c)
remotifolia Beck (enneaphyll.) = alternifolia
trifolia Bert. (non W. et K. = alternifol.
DESCHAMPSIA I 69 (84)
alpigena Schur = Gaudini
alpina Gaud. (non R. et S.) = Gaudini
DESCHAMPSIA I 69 (84)
Andræi Schur = Gaudini
altissima Gremli (cæspit.) 69 (3 b)
cæspitosa P. B. 69 (3), A 18
corsica Richter (flexuosa) A 18 (1 α d)
discolor R. et S. = setacea
flexuosa Trin. 69 (1), A 18
Gaudini Richter (cæspit.) A 18 (3 d)
juncea P. B. = media
Legei Richter, Debeaux (flexuosa) A 18 (1 α c)
litoralis Gremli, Richter (cæspit.) = seg.
litoralis Reut. 69 (3 c)
media R. et S. 69 (2)
montana G. Don 69 (1 α b)
ochroleuca Fiori (cæspit.) A 18 (3 b subf.)
pallida Gr. et Godr. (cæspit.) = altissima
setacea Hack., Richter 69 (1 β)
Thuillieri Gr. et Godr. = setacea
DESCURAINIA = Sisymbrium
Irio Webb et Berth. = S. Irio
pinnatifida Webb = S. dentatum
DESMAZERIA = Catapodium
loliacea Nym. = C. lol.
sicula Dum. = C. sic.
triticea Wk. = C. — tritic.
DEYEUXIA = Calamagrostis
acutiflora P. B., Kth. = C. arund. × Epigeios
silvatica Kth. = C. arundinacea
varia Kth. = C. varia
DIANTHUS I 375 (346)
acaulis Tausch (glacialis) A 78 (9 c)
acuminatus Tausch = monspessulanus
adscendens Gaud. (cæsius) = cæsius
æolicus Lojac. A 78 (5 for.)
albidus Timb. (monspess.) 380 (16 α c)
albiflorus Guss. (longicaul.) A 79 (12 γ for.)
albiflorus Presl (rupicol.) A 78 (5 d)
albiflorus Schur (deltoides) = glaucus
albus Schk. = glaucus
Allionii Colla = atrorubens
alpester Balb. 378 (10), A 78, 211
alpester Hpe., Sternb. = Sternbergii
alpester Uechtr. (superbus) = speciosus
alpester F. N. Will. (monspess.) = Sternbergii
alpicola Koch (monspess.) = = Sternbergii
alpinus Herb. (superbus) = speciosus
alpinus L. 378 (8)
alpinus Neilr. (barbat.) = compactus
alpinus Sturm = glacialis
alpinus Vill., All. = neglectus
DIANTHUS I 375 (346)
ambiguus Nic. (non Panc.) = Tunica Nanteullii?
anisopodus Ser. (Carthus.) A 78 (3 α d)
arborescens Hoffgg. = rupicola
arenarius Pirona (non L.) = Sternbergii
Armeria L. 375 (1)
arrectus Dum. = Caryophyllus
Arrostii J. et C. Presl 379 (12 ζ), A 79
asper W. = Seguieri
atrorubens All. 376 (3 γ), A 78
atrorubens Tomm. = sanguineus
Balbisii Ser. 376 (3 e), A 78
Balbisii × inodorus Gürke = Levieri
Balbisii × monspessul., cfr. D. exilis
Barati Duv.-Jouv. = tripunctatus
barbatus L. 375 (2), A 78
Bertolonii Woods 377 (5 b)
biflorus Presl (Arrostii) A 79 (12 ζ for.)
Bisignani Ten. = rupicolus
brachycalyx Huet A 79 (12 δ for.)
brachycalyx F. N. Will. (silvestr.) = prec.
brevicalyx G. Beck (inodor.) = inod. d. uniflor.
brevifolius Marches. (tergest.) A 79 (12 e c)
Buchneri Dalla Torre (glacialis) A 78 (9 b)
cæsius Sm. 379 (13)
cæspitosus Kit. = tergestinus?
capitatus Baumg. = compactus
Carthusianorum All. = Seguieri
Carthusianorum L. 376 (3), A 78
caryophylloides Rchb. = inodorus et tergestinus
Caryophyllus L. 379 (12), A 78
chinensis L. p. p. = Seguieri
ciliatus Guss. 378 (11)
collinus Gaud. = Seguieri
collinus W. et K. A 78 (4 var.)
compactus Kit. A 78 (2 var.)
congestus Bor. = seg.
congestus Gr. et Godr. (Carthus.) = fasciculatus
contractus Jan A 79 (12 ζ for.)
controversus Gaud. 380, A 79
coronarius Lam. = seg.
coronarius L. (Caryoph.) = Caryophyllus (α)
Courtoisii Schur (non Rchb.) = collinus
crenatus Gilib. = deltoides
cyathophorus Moris = Arrostii
decrescens Borb. = deltoid. × Seguierii
deltoides L. 377 (7)
delt. × Seguieri Borb. A 78
diminutus L. = Tunica — dim.
dissimilis Burn. (furcatus) = seg.
dissimilis Fiori (alpester) 378 (10 γ)

Digitized by Google

DIANTHUS I 375 (346)
diutinus Rchb. (non Kit.) = fasciculatus
divaricatus Urv. = tripunctatus
elatior Chenev. (silvestris) = inodorus (a)
elatior Maly (silvestr.) = tergestinus
elongatus Rchb. (virgin.) = tergestinus
evolutus Lojac. (contractus) = biflorus
exilis Posp. 376 (X)
exuberans Gib. et Pir. (monspess.) = monspessul. (for.)
Faurei Arv. T. = furcatus
fasciculatus Gilib. 376 (3 α b)
ferrugineus Mill. 376 (3 η)
filiformis Lam. = Tunica saxifr.
fimbriatus α Lam. = superbus
Fischeri Spr. = Seguieri
flaccidus Marches. (*tergest.*) A 79 (12 ε b)
frigidus Koch A 79 (12 δ e)
furcatus Balb. 378 (10 α c)
garganicus Fiori (*longicaul.*) A 79 (12 γ for.)
garganicus Ten. (silvestr.) = prec.
Gasparrinii Guss. A 79 (12 η for.)
glacialis DC., Ser., Gaud. = neglectus
glacialis Hænke 378 (9), A 78
glaucophyllus Horn. = Balbisii
glaucus Huds. = cæsius
glaucus L. 377 (7 β)
glumaceus Bory et Chaub. = Tunica glum.
Godronianus Jord. A 79 (12 β for.)
gracilior Griess. (prolifer) = Tunica — diminuta
gracilis Fouc. et Mand. (*virgin.*) A 78 (12 β for.)
gracilis Martr.-Don. (prolifer) = Tunica — diminuta
graminifolius Presl A 79 (12 ζ for.)
grandiflorus Heg. (superbus) = speciosus
grandiflorus Reut. (rupicola) = juratensis
gratianopolitanus Vill. = cæsius
Guliæ Janka = ferrugineus
Gyspergeræ Rouy A 78, 211 (10 var.)
herbaceus Personnat (Carthus.) = fasciculatus
hirsutus Lam. = Armeria
hirtocaulis Kern. (*longicaul.*) A 79 (12 γ for.)
hortensis Schrad. = Plumarius
humilior Koch (silvestr.) = inod. d. uniflorus
humilis Evers (*inodor.*) A 79 (12 δ f)
hybridus Schm. = Armeria
hyssopifolius L. = superbus
inodorus Kern. = seg.
inodorus L. (*Caryoph.*) 379, A 79 (12 δ)
involucratus Poir. = rupicola
juratensis Jord. A 79 (12 δ g)
latifolius Lojac. (*Arrostii*) A 79 (12 ζ for.)
latifolius Ser. (barbat.) = barbatus
latifolius Ser. (glacialis) = alpinus?
Lereschii Burn. (furcatus) = seg.
Lereschii Fiori (*alpester*) 378 (10 β)
Levieri Borb. 376 (3 ε b), A 78
liburnicus Bartl. et Wendl. = Balbisii
liburnicus Porta et Rigo exs. = vulturius
liburn. X monspessul. Posp. = exilis
ligusticus W. ex Borb. = Balbisii
litoralis Host = ciliatus
litoralis Noë (silvestr.) = tergestinus
longicaulis Ard. = Godronianus
longicaulis Ten. 379, A 79 (12 γ)
longifolius Rouy (virgin.) = Godronianus
lucanus A. Terr. (neapol.) = seg.
lucanus N. Terr. (*longicaul.*) A 79 (12 γ for.)
marginatus Lacaita (non Poir.) = siculus
maritimus A. Terr. (*longicaul.*) A 79 (12 γ for.)
marsicus Ten. 380 (16 α b)
micropetalus Gürke (*inodor.*) A 79 (12 δ for.
micropet. Rchb. (silvestr.) = prec.
Mikii Reichard. 375 (X)
miniatus Huet A 79 (12 η for.)
minor Fiori (*Seguieri*) A 78 (4 c)
minor Gaud. (collinus) = prec.
minor Moris (Caryoph.) = maritim.
minor Ten. (*longicaul.*) A 79 (12 γ for.)
minor Ten. (prolifer) = Tunica velutina
monspeliacus L. = seg.
monspessulanus L. 380 (16)
monspess. X barbat. Reichard. = Mikii
monspess. X Seguieri Gr. et Godr. = controversus
moschatus Mayer = Plumarius
multifidus Gilib. = superbus
multinervis Ces. P. et G. (non Vis.) = siculus
Nanteuillii Burn. = Tunica Nant.
nanus Godr. (prolifer) = Tunica — diminuta
nanus Ser. (*Carthus.*) A 78 (3 α c)
nanus Sweet = Carthusianor.
neapolitanus A. Terr. = garganicus
neglectus Lois. 378 (10 δ), A 78
obcordatus Marg. et Reut. = Tunica obcord.
odoratissimus Vest = monspessul.
odoratus Vest. = Plumarius
oreades Ball = Sternbergii
orophilus Jord. 379 (12 δ b)
papillosus Vis. et Pano. = inodorus
paradoxus R. Kell. A 78 (X)
parviflorus Beyer (*inodor.*) A 79 (12 δ h)
parvifior. A. Terr. (longicaul.) = minor Ten.
pauciflorus Bruegg. A 78 (3 β b)
pavonius Tausch = neglectus?
pedemontanus Rouy = alpester
plumarius All., Gunn. = superbus
Plumarius L. 380 (15)
plumosus Spr. 380 (16 β b)
pollinensis Fiori (*longicaul.*) A 79 (12 γ for.)
pollin. A. Terr. (neapolit.) = prec.
Portæ Kern. = quid?
portensis Lib. = Plumarius
pratensis S. F. Gray = Armeria
prolifer L. = Tunica prol.
prolifer S. et S. = Tunica glumacea
prolifer Lenticchia (Carthus.) = anisopodus
pulcherrimus Lois. = barbatus
pumilus L. Vacc. (Carthus.) = Carth. c. nanus
pungens Gr. et Godr. (non L.) = furcatus
pygmæus Bert. (Caryoph.) = seg.
pygmæus Fiori (*inodor.*) 379, A 79 (12 δ c)
pygmæus Gaud. (Carthus.) = Carth. c. nanus
pygmæus N. Terr. (Arrostii) = contractus
racemosus Vis. = ciliatus
Reuteri Jord. = inodorus
revolutus Tausch = superbus
rigidus Pantk. (monspess.) = Sternbergii
roridus Schur (Carthus.) = atrorubens
rosulatus Borb. = vulturius
rupestris L. f. = virgineus?
rupicolus Biv. 377 (5), A 78
sanguineus Vis. 376 (3 δ)
Sartorii Frœl. = Tunica velut.
sassinianus Arc. (*Carthus.*) A 78 (3 ε c)
saxifragus L. = Tunica sax.
scaber Schl. = Seguieri
scabrifolius Clav. (prolifer) = Tunica prolif.
Scheuchzeri Rchb. = inod. d. uniflorus
schizopetalus Wallr. = superbus
Seguieri Chaix 376 (4)
Seguieri X monspessul. Rouy et Fouc. = controversus

Digitized by Google

DIANTHUS I 375 (346)
siculus J. et C. Presl 379 (12 η), A 79
silvaticus Hpe. 376 (4 b)
silvester N. Terr. = pollinensis
silvester Wulf. = inodorus
speciosus Rchb. = seg.
speciosus Rchb. (*superbus*) A 79 (14 b)
speciosus α et β Rchb. Ic. = Sternbergii
Sprengelii G. Don = monspess.
Sternbergii Schl. = controversus
Sternbergii Sieb. 380 (16 β)
strictus Tanf. (non S. et S.) = alpester
suavis W. = cæsius
subacaulis Koch (silvester) = frigidus
subacaulis Rouy = alpester et furcatus
subuniflorus Coss. et Germ. (prolifer) = Tunica-diminuta
suffruticosus W. = rupicola
superbus Eichw. = monspess.
superbus L. 380 (14), A 79
supinus Lam. = deltoides
tener Balb. 378 (10 α b)
tenuifolius Moris (Caryoph.) = seg.
tenuifolius A. Terr. (*longicaul.*) A 79 (12 γ for.)
tergestinus Rchb. 379 (12 ε), A 79
tripunctatus S. et S. 377 (6), A 78
umbellatus DC. = collinus
uniflorus Gaud. (prolifer) = Tunica — diminuta
uniflorus Gaud. (silvester) = seg.
uniflorus Gürke (*inodor.*) A 79 (12 δ d)
uniflorus Presl (Arrostii) = contractus
uniflorus N. Terr. (*atrorubens*) A 78 (3 γ b)
vaginatus Chaix 376 (3 β), A 78
vagin. × inodorus R. Kell. = paradoxus
velutinus Guss. = Tunica vel.
villosus Gilib. = Armeria
virescens Guss. (*rupicol.*) A 78 (5 c)
virgatus Pasq. A 79 (12 γ for.)
virgineus Jacq. = tergestinus
virgineus L. 379 (12 β), A 78
virgin. β L. = cæsius
virgin. Vis. (Caryoph.) = tergestinus
vulturius Guss. et Ten. 376 (3 ζ)
Waldsteinii Sternb. = plumosus
Wimmeri Wichura = speciosus
wolgensis Bernh. = seg.
wolgensis Fisch. (deltoides) = glaucus
Wulfenii Dietr. = inodorus
DIAPENSIA = Androsace
helvetica L. = A. helvet.
DIAPHANE = Iris
edulis Salisb. = I. Sisyrinchium
stylosa Salisb. = I. juncea
DIATROPA = Bupleurum
rotundifolia Dum. = B. rot.
DIBOTHROSPERMUM = Matricaria
agreste Knaf. = M. — agrestis
DICHODON = Cerastium
anomalum Rchb. = C. anom.
cerastioides Rchb. = C. trigynum
DICHOGLOTTIS = Gypsophila
muralis Jaub. et Spach = G. mur.
DICHOSTYLIS = Scirpus
Cenekii Opiz = Heleocharis — fluitans
fluitans P. B. in Rchb. = S. fluit.
Micheliana Nees = S. Michel.
DICHOTOPHYLLUM = Ceratophyllum
demersum Mœnch = C. demers.
DICHROCEPHALA III 235 (867)
latifolia DC. 235
sonchifolia DC. 235 (b)
DICTAMNUS II 256 (635)
albiflorus Paol. (*albus*) 256 (e)
albus DC. (albus) = prec.
albus L. 256, A 159
albus Lk. = albiflorus
angustifolius Don ap. Sweet 256 (b)
Fraxinella Pers. = albus
Fraxin. β Pirona = venosus
lanceolatus Pasq. (albus) = angustifol.
obtusiflorus Koch 256 (c)
odorus Salisb. = albus
purpureus DC. (*albus*) 256 (d)
sessilis Wallr. = albus
solitarius Stokes = albus
suffultus Wallr. = albus
venosus Fiori (*albus*) A 159 (b')
venosus Vis. et Sacc. (Fraxinella) = prec.
DIGITALIS II 443 (761)
acuta Mœnch = lutea
alba Schrank = purpurea
acutiloba Rchb. (ambigua) = ochroleuca
ambigua Murr. 444 (4)
ambiguo × lutea G. Mey. 445, A 170
angustifolia Briq. (*purpur.*) A 215 (3 α b)
angustisepala Bég. (*micrantha*) 445 (6 a)
aurea Lindl. = ferruginea
australis Ten. = micrantha
dubia Rodrig. A 170 (in text.)
ferruginea L. 444 (1)
ferruginea Wulf. = levigata
foliosa Wirtg. (*lutea*) 445 (5 c)
grandiflora Lam., All. = ambigua
Gyspergeræ Rouy A 170, 215 (3 γ)
integrifolia Seenus = levigata
intermedia Pers. = ambiguo × lutea
latifolia Briq. (*purpur.*) A 215 (3 α a)
latisepala Bég. (*micrantha*) 445 (6 b)
DIGITALIS II 443 (761)
levigata W. et K. 444 (2)
lutea Auct. it. pl. = micrantha
lutea L. 445 (5)
lutea Pollich = ambigua
lutea-major Gilib. = ambigua
luteo × micrantha Bég. 445
magniflora Mill. = ambigua
media Roth = ambiguo × lutea
micrantha Schrad., Roth 445 (6)
Milleri G. Don = ambigua
obtusa Mœnch = ambig. × lutea
obtusiloba Rchb. (*ambigua*) 444 (4 b)
ochroleuca Jacq. 444 (4 a)
parviflora Auct. al. = micrantha
parviflora Lam., All. (non Jacq.) = lutea
pubescens Levier (*lutea*) 445 (5 b)
purpurea L. 444 (3), A 215
speciosa Salisb. = purpur.
Thapsi Bert. (non L.) = purpurea
tomentosa Hoffgg. et Lk. 444 (3 β)
DIGITARIA I 50 (53)
ambigua Ces. (glabra) = seg.
ambigua Fiori (*filiform.*) 51 (3 α b)
ciliaris Kœl., Pers. 50 (2 b)
commutata Schult. = ciliaris
Dactylon Scop. = Cynodon Dact.
debilis W. 51 (4), A 14
disticha Fiori et Paol. (1895) 50 (1), A 14
eriantha Steud. = ciliaris
esculenta Goir. (*sanguin.*) A 14 (2 for.)
filiformis Kœl. 51 (3), A 14
glabra P. B., R. et S. = filiformis
gracilis Guss. 51 (3 β)
humifusa Rich. in Pers. = filiformis
linearis Crép. = filiformis
intermedia Genn. = gracilis
marginata Lk. = sanguinalis
paspalodes Michx. = disticha
paspaloides Duby = prec.
præcox W. = sanguinalis
sanguinalis Scop. 51 (2), A 14
stolonifera Schrad. = Cynodon Dactylon
DIGRAPHIS = Phalaris
arundinacea Trin. = Ph. arund.
DILIVARIA = Acanthus
longifolia Poir. = A. long.
DIMORPHANTHES = Erigeron
ambigua Presl = E. crispus
crispa Rupr. = prec.
linifolia Rupr. = prec.
sicula Cass. = Pulicaria sic.
DINEBA = Dinebra
DINEBRA I 76 (94)
ægyptiaca Jacq. = retroflexa
arabica P. B. = retroflexa
retroflexa Panz. 76
DIOCTIS = Polygonum
equisetifolia Raf. = P. equiset.
verna Raf. = P. lapathifolium

Digitized by Google

DIOPOGON = Sempervivum
Allionii Jord. et Fourr. = S. hirtum
DIOSANTHOS = Dianthus
Armerium St.-Lag. = D. Arm.
Carthusianorum St.-Lag. = D. Carth.
DIOSPYROS II 305 (672)
Lotus L. 305
DIOSTOMÆA = Listera
cordata Spenn. = L. cordata
Nidus-avis Spenn. = Neottia N.-avis
ovata Spenn. = L. ovata
DIOTIS III 271 (877)
candidissima Desf. = maritima
maritima Sm. 271
DIPCADI I 194 (198)
serotinum Medic. 194
DIPLACHNE I 78 (100)
serotina Lk. 78, A 20
DIPLOGAMA = Silene
Otites Opiz = S. Otites
DIPLOPAPPUS = Erigeron
annuus Bluff et Fing. = E. ann.
dubius Cass. = E. annuus
dysentericus Bluff et Fing. = Pulicaria dys.
pulicarius Ledeb. = seg.
vulgaris Bluff et Fing. = Pulicaria vulg.
DIPLOPRION = Medicago
medicaginoides Viv. = M. coronata
DIPLOTAXIS I 448 (377)
apula Rigo = versicolor
apula Ten. 448, A 97 (1 β)
biennis Rouy et Fouc. (*mural.*) 449 (4 c)
biloba C. Koch = Sisymbr. pannonic.
bracteata Gr. et Godr. = Brassica ochroleuca
brassicæformis Koch = Moricandia arvens.
brevicaulis Bluff et Fing. = viminea
crassifolia DC. = Harra
crassifolia b. Guss. = hispida
decipiens Gandog. = erucoides
delphinensis Rouy (humilis) = Brassica repanda
Erucastrum Gr. et Godr. = Brassica Erucastr.
erucoides DC. 448 (1), A 97
fruticulosa Tod. 449 (6), A 212
Harra Boiss. 449 (7), A 97
hiemalis Somm. (*vimin.*) A 97 (2 d)
hirsuta Bert. = Harra
hispida DC. A 97 (7 b)
hispidula Ten. 448, A 97 (1 δ)
integrifolia Guss. (*vimin.*) A 97 (2 b)
integrifolia Koch (*tenuifol.*) 449 (5 b)
intermedia Schur A 97 (4 d)
Lagascana DC. = Harra
muralis DC. 449 (4), A 97
muralis Moris = viminea
pendula DC. = Harra
pollinensis N. Terr. (*mural.*) 449 (4 b), A 97
præcox Lge. (*vimin.*) A 97 (2 c)
DIPLOTAXIS I 448 (377)
provincialis Rouy (humilis) = Brassica — saxatilis
repanda Gr. et Godr. = Brassica rep.
saxatilis DC. = Brassica — saxat.
saxatilis Rchb. = Brassica repanda
scaposa DC. 448 (3), A 97
tenuifolia DC. 449 (5)
variabilis Roch. = mural. et tenuifol.
versicolor Huter P. et R. A 97 (1 γ)
viminea DC. 448 (2), A 97
DIPSACUS III 141 (832)
carminatorius Salisb. = fullon.
connatofolius Gilib. = prec.
divaricatus J. et C. Presl = quid?
elongatus Salisb. = pilosus
fallax Simonk = lacin. × silv.
ferox Lois. 143 (4)
fullonum L. (β) 142 (1)
fullonum α L. = silvestris
laciniatus Klett. et Richt. (silv.) = pinnatifidus
laciniatus L. 142 (3)
laciniato × silvestris Wohlfarth 142
minor Neck. = pilosus
Morisonii Bor. = silvestris
Orsinii Sang. 142 (2 d)
palustris Salisb. = fullonum
pinnatifidus M. et K. (*silvestris*) 142 (2 b)
pilosus L. 143 (5)
sativus C. C. Gmel. = fullonum
silvester Lam. = fullonum
silvester Huds., Mill. 142 (2)
silvester B. Ten. = subintegrifol.
subintegrifolius Bég. (*silv.*) 142 (2 c)
vulgaris C. C. Gmel. = silvestris
DISCOLENTA = Polygonum
lapathifolia Raf. = P. lapath.
DISCUREA = Sisymbrium
Sophia Schur = S. Sophia
DISINSTYLIS = Chlora
italica Raf. = C. imperfol.
DISTIMUS = Cyperus
flavescens Raf. = C. flavesc.
DISTOMÆA = Listera
cordata Spenn. = L. cord.
Nidus-avis Spenn. = Neottia Nid.-avis
ovata Spenn. = L. ovata
DITHECA = Ammannia
verticillata Miq. = A. vertic.
DŒRRIENA = Cerastium
erecta Borkh. = C. erect.
DOLICHOS = Vigna
Catjang L. = V. Catjang
melanophthalmus DC. = V. melan.
sinensis L. = V. sinensis
unguiculata L. = V. unguic.
DOLLINERIA = Arabis
ciliata Saut. = A. Scopoliana
DONAX = Arundo
acuminata Presl = A. Pliniana
DONAX = Arundo
Ampelodesmos Presl = Ampel. tenax
arundinacea P. B. = A. Donax
bicolor P. B. = Ampelodesma bicol.
Donax Asch. et Græbn. = A. Donax
festucoides P. B. = Ampelodesma tenax
mauritanica P. B., R. et S. = A. maurit.
montana P. B. = Calamagrostis varia
Plinii C. Koch = A. Plinii
sativa Presl = A. Donax
tenax P. B. = Ampelodesma tenax
versicolor P. B. = A. Donax
DONDIA = Hacquetia
Epipactis Spr. = H. Epipact.
DONDIA = Suæda
maritima Druce = S. mar.
DONIA = Oxyria
digyna R. Br. = O. dig.
sapida R. Br. = O. digyna
DORIA = Solidago
paludosa Fourr. = Senec. pal.
vera Fourr. = Senecio Doria
Virga-aurea Scop. = S. Virga-aur.
DORONICUM III 221 (859)
angustifolium Ambrosi (scorpioides) = hirsutum
Arnica Desf. = Arnica mont.
austriacum Jacq. 222 (1)
Bauhini Saut = hirsut. b. villosum
Bellidiastrum Desf. = Bellis pappulosa
Bellidiastrum L. = Bellidiastr. Michelii
Bellidiastrum Sm. = Bellis silvestris
bellidiflorum Schrank = Erigeron annuus
bellidifolium Salisb. = Bellidiastr. Michelii.
caucasicum Cocc. = monocephalum
caucasicum M. B. 223 (4)
caucasicum Vis., Roch., Caruel = Columnæ
Clusii Tausch = hirsutum
Columnæ Ten. 223 (5)
Columnæ β Bert. = cordifolium
cordatum Lam. = Pardal.
cordatum Sch. Bip. = Columnæ
cordifolium Sternb. 223 (5 b)
corsicum Poir. 224 (7)
elatior Ambrosi (caucas.) = seg.
elatior Fiori (*Columnæ*) 223 (5 c)
eriorrhizon Guss. = caucasicum
glaciale Nym. 224 (6 γ)
glandulosum G. Beck (*hirsut.*) 223 (6 β a)
grandiflorum Lam. 223 (6), A 182
Halleri Tausch = medium
helveticum Mill. = Senecio Doronic.
hirsutum Lam. 224 (6 β)
hungaricum Rchb. f. = Lobelii

Digitized by Google

DORONICUM III 221 (859)
incanum Hill = hirsut.
incanum L. = Senecio Doronicum
italicum Guss. (caucas.) = caucasicum
Jacquini Tausch = latifolium
latifolium DC. (grandiflor.) 223 (6 α a)
Lobelii Ten. (plantag.) 222 (2 β)
longifolium Griseb. 222 (nota)
longifolium Griseb. (plantag.) = prec.
Matthioli Tausch = Pardal.
medium DC. (grandiflor.) 223 (6 α b)
monocephalum Fiori (Pardal.) 222 (3 b)
montanum Lam. = Arnica mont.
oppositifolium Lam. = Arnica mont.
orientale Hoffm. = caucasicum
orientale Rchb. = Columnæ
Pardalianches L. (β) 222 (3)
Pardal. L. α = austriacum
Pardalianches Ten. = Lobelii
plantagineum L. 222 (2)
Portæ Chab. A 216
scorpioides Comolli = Pardalianches?
scorpioides Lam. = medium
scorpioides Ten. 224 (nota)
scorpioides DC., Koch = plantagineum (α)
scorpioides Facch = grandiflor.
scorpioides W. = Willdenowii
scorpioides Wimm. et Grab. = austriacum
toxicarium Salisb. = Pardal.
uniflorum Ten. (austr.) = Columnæ
villosum Fiori (caucas.) 223 (4 b)
villosum Tausch (hirsut.) 223 (6 β b)
Willdenowii Rouy = plantagin. (var.)
Wulfenianum Poir. = Columnæ
DORYCNIUM II 69 (495)
angustifolium Mœnch = Psoralea bituminosa
collinum Jord. et Fourr. A 141 (1 γ b)
corsicum Jord. = insulare
decumbens Kern. (non Jord.) = germanic
elongatum Jord. et Fourr. A 141 (1 γ a)
fruticosum Pers. = suffruticos.
germanicum Burn. (suffruticos) = seg.
german. Gremli (Jordani) = seg.
germanicum Rouy (pentaphyll.) A 141 (1 δ)
glabrum Somm (hirsut) A 141 (3 γ)
gracile Jord. 70 (1 β)
herbaceum Vill. 70 (1 α)
hirsutum Ser. in DC. 71 (3)
hirtum Rikli (hirsut.) A 141 (3 α)
humile Jord. et Fourr. A 141 (1 γ d)
DORYCNIUM II 69 (495)
incanum Ser. in DC (hirsut.) 71 (3 β)
insulare Jord. et Fourr. A 141 (1 γ c)
intermedium Ledeb. = herbaceum
italicum Fiori (hirsut.) 71 (3 α b)
Jordani Lor. et Barr. = gracile
monspeliense M. B., Orsini = herbaceum
monspeliense W. = suffrutic.
parviflorum Ser. in DC. = Lotus parvifl.
pentaphyllum Rchb. = suffruticosum
pentaphyllum Scop. 70 (1), A 141
procumbens Lap. = Doryenopsis Gerardi
prostratum Rikli (hirsut.) A 141 (3 α d)
rectum Ser. in DC. 70 (2)
retusum Fiori (hirsut.) 71 (3 α c)
sabaudum Rchb. = herbaceum
sericeum G. Beck (suffrut.) = seg.
sericeum Neilr. (pentaphyll.) = germanic.
suffruticosum Koch = germanicum
suffruticosum Vill. 70 (1 γ), A 141
tomentosum G. Don. = hirsut.
tomentosum Rikli (hirsut.) = italicum
DORYCNOPSIS II 69 (494)
Gerardi Boiss. 69
DOUGLASIA II 317 (676)
Vitaliana B. et H. 317, A 162
DRABA I 460 (397)
affinis Host 460, A 98 (1 γ)
aizoides L. 460 (1), A 98
aizoides β Lojac. = aizoides (var. pl.)
alba Gilib. = verna
alpestris Jord. = aizoides (α)
alpina Baumg. (non L.) = Hutchinsia alp.
alpina Crantz = aizoides (α)
alpina Koch (aizoid.) = aizoides (α)
americana Cus. et Ausb. (verna) 462 (9 α c)
americana Pers. = prec.
androsacea W. = Arabis Scopoliana
armata Schott (longirostra) A 98 (1 δ b)
argentea Lam. = Alyss. arg.
aspera Bert. (non Adams) = Bertolonii
austriaca Crantz = stellata
Bertolonii Nym. 461, A 98 (1 η)
Beyeri L. Vacc. (aizoid.) A 98 (1 α b)
Candollei Rouy et Fouc. = tenuifol.
capsularis Ces. P. et G. (turgida) = seg.
capsularis Fiori (longirostra) A 98 (1 δ c)
DRABA I 460 (397)
capsularis Lojac. (oxycarpa) = prec.
carinthiaca Hpe. 462 (5 β)
carnica Scop. = Thlaspi præcox
carniolica Vitm. = prec.
cheiranthifolia Lam. = Alyssum incan.
cheirifolia Berg. ex DC. = prec.
cheiriformis Lam. = prec.
ciliaris DC. (non L.) = tenuifol.
ciliata Scop. = Arabis Scopoliana
clypeata Lam. = Fibigia clyp.
confusa Ehrh. = incana
contorta Ehrh. 462 (6 b)
corsica Jord. = Loiseleurii
curtipes Rouy et Fouc. (verna) A 212 (9 β for.)
cuspidata Arc. p. p. (non M. B.) = Loiseleurii
cuspidata Gr. et Godr., Bert. = Bertolonii
cuspidata Lojac. = longirostra
eriocarpa Caruel (aizoides) 461 (1 γ) = aizoides (var. pl.), cfr. A 99
erioscapa Caruel (aizoides) = Bertolonii
fladnizensis Gaud. = lapponica
fladnizensis Wulf. 461 (5), A 99
frigida DNtrs. = carinthiaca
frigida Saut. 461 (4 α c), A 99
glabra Baldacci (turgida) = longirostra (a)
glabrata Koch (carinth.) = Hoppeana
glabrata Koch (Wahlenbergii) = glabrata
glabrescens Rouy et Fouc. 463 (9 δ)
glabriuscula Huet (longirostra) A 98 (1 δ a)
glacialis Hpe. et Koch (non Adams) = Zahlbruckneri
grandiflora Rchb. (aizoid.) = affinis
grassensis Rouy et Fouc. 461 (1 η c)
hebecarpa DC. (stellata) = seg.
hebecarpa Koch (incana) = incana (α)
hebecarpa Paol. (toment.) 461 (4 α b)
helvetica Schleich. = fladnizens.
hesperidiflora Lam. = Aubrietia deltoidea
heterotricha Lindbl. (fladniz.) = lapponica
hirsuta Baldacci (aizoides) = aizoid. (var. pl.)
hirta All. (non L.) = carinthiaca
hirta Oed., Jacq. = stellata
hirtella Fouc. et Rouy 463 (9 δ b)
homotricha Lindbl. (fladniz.) = fladnizens. (α a)
Hoppeana Rchb. = Zahlbruckneri
Hoppeana Rudolphi 462 (5 β b)
Hoppii Trachsel = Hoppeana
incana L. 462 (6)
Johannis Host = carinthiaca

Digitized by Google

DRABA I 460 (397)
Johannis Ledeb. = fladnizens.
Krokeri Rchb. (*verna*) A 99 (9 var.)
Krokeri Schur = prec.
lactea Adams = fladnizens.
lanceolata Neilr. (verna) = americana
lanciformis Rouy et Fouc. = hebecarpa
lapponica DC. 462 (5 α b)
lasiocarpa Neilr. (longirostra) = armata
lasiocarpa Strobl (*olympicoides*) A 98 (1 ε b)
lejocarpa Neilr. (longirostra) = glabriuscula
lejocarpa Rouy et Fouc. (incana) = contorta
lejocarpa Strobl (*olympicoides*) A 98 (1 ε a)
leptophylla Fouc. et Rouy 462 (9 α b)
Levieri Janka 461 (1 η b)
levigata Hpe. A 99 (5 α c)
levipes DC. 461 (4 β)
Loiseleuri Boiss. 461, A 98 (1 θ)
longirostra Schott A 98 (1 δ)
longistyla Rouy. et Fouc. (levipes) = Traunsteineri
lutea Gilib. = nemorosa
macrophylla Cus. et Ausb. (*verna*) 463 (9 β), A 212
major Burn. (aizoid.) = affinis
majuscula Rouy et Fouc. = macrophylla
maritima Lam. = Alyss. mar.
minor Burn. (aizoid.) = aizoides (α)
mollis Scop. = Arabis vochinensis
montana Berg. = aizoides (α)
muralis L. 462 (7), A 99
muralis Thunb. = nemoralis
mutabilis Desv. = Alyss. mut.
Nasturtiolum Scop. = Hutchinsia alpina
nemoralis Ehrh. 462 (8 b)
nemorosa All. = muralis
nemorosa L. 462 (8)
nivalis Gaud., DC. = carinthiaca
nivalis Lap. (non Liljebl.) = frigida
nivea Saut. A 99 (4 α d)
olympica Duby (non S. et S.) = Loiseleuri
olympica Strobl = olympicoides
olympicoides Strobl A 98 (1 ε)
petræa Baumg. = Hutchinsia petr.
polygonifolia Mill. = nemorosa
pontica Desf. = nemorosa
præcox Stev. 463 (9 γ), A 212
pyrenaica L. = Petrocallis pyr.
ramosa Gater. = muralis
ramosa E. Thom. (*frigida*) A 99 (4 α c subfor.)
Revelieri Rouy et Fouc. A 212 (9 γ for.)
rigida Lois. (non W.) = Loiseleuri
rotundata Neilr. (verna) = præcox

DRABA I 460 (397)
rubra Crantz = Petrocallis pyren.
ruderalis Baumg. = Lepidium Draba
Sauteri Hpe. 461, A 99 (1 ι)
saxigena Jord. = affinis
sclerophylla Gaud. = fladnizens. (α a)
spathulata Hpe. 463 (9 γ b)
stellata Jacq. 461 (4 γ)
stellata α DC. = frigida
stellata Lap. = carinthiaca
stellata Sieb. = Cochlearia brevicaulis
stylaris J. Gay = incana
subrotunda Fouc. et Rouy A 212 (9 γ for.)
tenuifolia Rchb. (*aizoid.*) 460, A 98 (1 β)
Thomasii Koch 462 (6 c)
tomentosa L. 461 (4 , A 99
Traunsteineri Hpe. 462 (5 γ)
turgida Huet 460 (1 α c) = armata, cfr. A 98
verna L. 462 (9), A 99, 212
Wahlenbergii Hartm. = fladnizens.
Zahlbruckneri Host 461, A 98 (1 ζ)
DRACÆNA = Asparagus
medeoloides L f. = A. medeol.
DRACOCEPHALUM III 22 (784)
austriacum L. 23 (2)
angustifolium Gilib. = Ruysch.
fragrans Salisb. = seg.
Moldavica L. 23 (nota)
Ruyschiana L. 23 (1)
DRACUNCULUS I 148 (150)
crinitus Schott = D. musciv.
Dracunculus Voss. = vulgaris
minor Blume = muscivorus
muscivorus Parl. 149 (2)
polyphyllos Blume = vulgaris
vulgaris Schott 149 (1), A 39
DREPANIA = Tolpis
ambigua DC. = T. virgata
barbata Desf. = T. barbata
umbellata DC. = T. umbellata
DREPANOPHYLLUM = Falcaria
agreste Hoffm. = seg.
Falcaria Desv. = F. vulgaris
palustre Hoffm. = Sium latifol.
sioides Wib. = F. vulgaris
DROSERA I 529 (443)
anglica Huds. = longifolia
corsica R. Maire A 110 (1 β)
intermedia Hayn. 530 (3), A 110
longifolia L., Hayn. 530 (2)
longifolia Sm., Bert. p p. (an L. p. p. ?) = intermedia
longifolio × rotundifolia Gren. = obovata
obovata M. et K. 530 (2 b)
rotundifolia L. 530 (1), A 110
rotundifolio = anglica Schiede = obovata
DROSOCARPIUM = Hypericum
fimbriatum Fourr. = H. Richeri
DRYAS I 564 (458)
alpina Salisb. = seg.

DRYAS I 564 (458)
chamædrifolia S. F. Gray = seg.
octopetala L. 564, A 117
DRYMOCALLIS = Potentilla
rubricaulis Fourr. = P. rupestris (for.)
DRYMOSPARTUM = Genista
ætnense Presl = G. ætn.
sardum Presl = G. ætnensis
DRYMOSPHACE = Salvia
glutinosa Opiz = S. glut.
DRYPIS I 370 (341)
Jaquiniana Murb. et Wettst. A 77 (β)
Linnæana Murb. et Wettst. A 76 (α)
spinosa Jacq., Vis. = Jaquiniana
spinosa L. 371, A 76
DUCHESNEA = Fragaria
chrysantha Miq. = F. indica
fragarioides Sm. = F. ind.
fragiformis D. Don = F. ind.
indica Focke = F. ind.
DULCAMARA = Solanum
flexuosa Mœnch = S. Dulcam.
lignosa Gilib. = prec.
DZIEDUSZYCKIA = Ruppia
limnobia Rehm. = R. maritima (α)

EBULUM = Sambucus
humile Garcke = S. Ebulus
ECBALLIUM III 158 (839)
agreste Rchb. = Elat.
Elaterium A. Rich. 158
officinale Nees. = Elat.
purgans Schrad. = Elat.
ECHINARIA I 77 (97)
capitata Desf. 77
pumila Wk. = capitata
sicula Tod. (*capitata*) 77 (b)
Todaroana Ces. (capit.) = prec.
ECHINOCHLOA = Panicum
aristata Rchb. (Crus-G.) = P. echinatum
colona Lk., Parl. = P. colon.
commutata Schult. = P. oryzoides
Crus-Corvi P. B. = seg.
Crus-Galli R. et S. = P. Crus-Galli
echinata P. B. = P. echin.
eruciformis Rchb. = P. eruc.
stagnina P. B. = P. oryzoid.
zonalis Parl. = P. zonale
ECHINODORUS = Alisma
natans Englm. = A. natans
parnassifolius Englm. = A. parnass.
ranunculoides Englm. = A. ranunc.
repens Asch., Mich. (ranunc.) = A. repens
zosterifolius Asch. (ranunc.) = A. — zosterifol.
ECHINOPHORA II 210 (608)
maritima Gouan = spinosa
pubescens Guss. (*spinosa*) 210 (1 b)
Sibthorpiana Guss. 210 (2 β)
spinosa L. 210 (1)
tenuifolia L. 210 (2)
tenuifol. S. et S. = Sibthorp.

Digitized by Google

ECHINOPS III 306 (902)
australis Ten. = elegans
banaticus Nic., Arc. = siculus
banaticus Roch. 307 (2 γ)
commutatus Juratzka 306 (2 β)
corymbosus L. = Cardopatium corymb.
echinophorus Boiss. = spinosus
elegans Bert. = seg.
elegans Bert. (*Ritro*) 307 (3 β)
exaltatus Schrad. 306 (2)
glabratus Barbaz. (sphær.) = siculus?
multiflorus Lam. = sphæroceph.
paniculatus Jacq. f. = sphæroc.
pauciflorus Lam. = Ritro (α)
polycephalus Ten. (Ritro) = siculus?
Ritro L. 307 (3), A 186
Ritro Schk. = exaltatus (α)
Rochelianus Griseb. = banatic.
ruthenicus Guss. et Auct. it. = siculus
ruthenicus M. B. 307 (nota)
ruthenicus Nym. p. p. = elegans
ruthenicus Roch. = banaticus
Sartorianus Boiss. 307 (nota)
siculus Strobl 307 (3 γ)
sphærocephalus L. 306 (1)
sphærocephalus S. et S. = viscosus
sphærocephalus Wulf. = exaltatus
spinosissimus Turra = seg.
spinosus L. 307 (4)
spinosus Urv. = viscosus
strictus Fisch. = exaltatus (α)
strigosus L. 308 (nota)
tenuifolius DC. p. p., Nic. (Ritro) = elegans
tenuifolius Fisch. 307 (nota)
virgatus Ten. (an Lam.?) = elegans
viscosus DC. 308 (5)
viscosus N. Terr. = sphæroceph.
vulgaris DC. (*Ritro*) 307 (3 α), A 186
ECHINOPSILON = Kochia
crassifolius Moq. = K. hirsuta
hirsutus Moq. = K. hirs.
hyssopifolius Moq. = K. hyss.
lanatus Moq. = K. hyssopifol.
ECHINOPUS = Echinops
Ritro Scop. = E. Ritro
sphærocephalus Scop. = E. sphær.
ECHINOSPERMUM = Lappula
casanense Wirz. = L. Myosotis
deflexum Lehm. = L. deflexa
Lappula Lehm. = L. Myosotis
patulum Lehm. = L. patula
squarrosum Rchb. = L. Myos.
vulgare Sw. = L. Myosotis
ECHIOIDES = Myosotis et Nonnea
alba Poir. = N. alba
annua Mœnch = M. arvensis
arvensis Poir. = Lycopsis arv.
lutea Poir. = N. setosa
nigricans Desf. = N. vesicaria
obtusifolia Poir. = N. obtus.
palustris Mœnch = M. pal.
perennis Mœnch = prec.
ECHIOIDES = Myosotis et Nonnea
ventricosa Poir. = N. ventr.
violacea Desf. = N. vesicaria
ECHIUM II 364 (717)
albereanum Debx. = italic. (α)
albiflorum Fiori (*plantag.*) 366 (3 α c)
altissimum Jacq. 365 (1 β), A 165
ambiguum DC. 367 (nota)
anglicum Huds., Mill. = vulg.
arenarium Guss. 366 (5)
aren. b Guss. = aren. v. macranthum
asperrimum Lam. = pyramidatum
asperrimum M. B. = altissim.
australe Lam. 366 (3 β)
calycinum Viv. = parviflor.
collinum Salisb. = italic.
confusum De Coincy 365 (4)
creticum Moris (an L.?) = grandiflor.
creticum S. et S. = parviflorum
decumbens Fiori (*vulg.*) 365 (2 α b)
diffusum Guss. (non Alior.) = arenarium
diffusum Jan = confusum
elegans Lehm. 365 (2 ε)
elongatum Lam. = italicum
grandiflorum Caruel (vulgare) = pustulatum
grandiflorum Desf. 366 (3 γ)
grandiflorum Lap. = albiflor.
hispidum S. et S. = elegans
italicum L. 364 (1), A 165
italicum Lehm., Koch = altissimum
lætum Salisb. = vulgare
linearifolium Mœnch = italic.
lineatum Jacq. f. 367 (nota)
lusitanicum All. (non L.) = parviflor.
luteum Lap. = italicum (α)
macranthum Fiori (*arenar.*) 366 (5 β)
macranthum R. et S. = grandiflor.
macranthum Viv. = megalanthos
maritimum Auct. = confusum
maritimum W. = plantagin. (α)
megalanthos Lap. 365 (3 α b)
ovatum Poir. = seg.
parviflorum Mœnch 367 (6)
pictum Jan 365 (2 δ b)
pilosissimum Fiori (*vulg.*) 365 (2 β)
plantagineum L. 365 (3)
plant. β Bert. = megalanthos
prostratum Ten. (non Del.) = parviflor.
pustulatum S. et S. 365 (2 δ)
pyramidale Lap. = italicum (α)
pyramidatum DC. 364 (1 α)
pyrenaicum L., Desf. = prec.
rosmarinifolium Vahl = Lithosperm. rosm.
rubrum Mœnch (non Jacq.) = grandiflor.
Schifferi Lang. 365 (2 γ)
ECHIUM II 364 (717)
setosum Bory et Chaub. = elegans
setosum Vahl 366 (nota)
Sibthorpii R. et S. = elegans
spathulatum Viv. = setosum
strictum L. f. 367 (nota)
tuberculatum Auct. it. (an Hoffgg. et Lk. p. p.?) = pustulatum
tuberculat. Gilib. = vulgare
violaceum Auct. it., Koch = plantagin. (α)
violaceum DC. (an L.?) = grandiflor.
violaceum L. hb. = pustulat.
virescens Jan = ambiguum
vulgare L. 365 (2)
vulg. β Bert. = decumbens
vulg. δ Bert. = Schifferi
vulg. κ Bert. = pilosissimum
Wierzbickii Hab. = Schifferi
ECLIPTA III 299 (894)
alba Boiss. = vulgaris
alba Hassk. 299, A 186
erecta L. = alba
neapolitana N. Terr. (*alba*) 299 (β)
prostrata L. = alba
vulgaris Fiori (*alba*) 299 (α)
EDRAIANTHUS = Hedræanthus
EHRHARTA I 52 (56)
clandestina Weber in Wigg. = Oryza cland.
erecta Lam. = panicea
panicea Sm. 52, A 14
ELÆAGNUS I 280 (268)
angustifolia L. 280
argentea Mœnch (non Pursh.) = angustif.
hortensis M. B. = angustif.
incana Lam. = angustif.
inermis Mill. = angustif.
orientalis L. 280 (b)
spinosa L. = angustif.
tomentosa Mœnch = angustif.
ELÆOSELINUM II 193 (583)
Asclepium Bert. 193
Lagascæ Boiss. = tenuifol.
meoides Koch 193 (β)
polygamum Caruel (quoad loc.) = Thapsia polyg.
tenuifolium Lge. 193 (nota)
ELATERIUM = Ecballium
cordifolium Mœnch = Ecb. Elaterium
ELATINE I 383 (351)
alata Rostk. et Schm. = Callitriche verna
Alsinastrum L. 383 (1), A 80
campylosperma Ross = Gussonei
campylosperma Seub. = pedunculata
conjugata Lam. = major
Fabri Gren. = macropoda
Gussonei Somm. (*Hydropiper*) A 211 (2 α')
hexandra DC. 384 (2 γ)
hippuroides St.-Lag. = Alsin.
Hydropiper DC., Schk. = major
Hydropiper L. 384 (2), A 80, 211

Digitized by Google

ELATINE I 383 (351)
Hydrop. β L. = hexandra
macropoda Bert., Parl. = pedunculata
macropoda Guss. 384 (2 ε), A 80
macropoda Solla, Lojac. = Gussonei
major A. Br. 384 (2 δ)
majuscula Dum. = major
nodosa Walk.-Arn. = Hydrop.
octandra Gr. et Godr. (paludosa) = major
orthosperma Van-Dueb. = Hydropip.
paludosa α Seub. = hexandra
palud. β Seub. = major
pedunculata Moris (*Hydrop.*) 384 (2 β)
Schkuhriana Hayne = Hydrop.
Serpyllifolium Gilib. = prec.
siphosperma Dum. = Hydropip.
triandra Schk. 384 (2 ζ)
tripetala Sm. = hexandra
verticillata Lam. = Alsin.
ELATINE = Linaria
cirrosa Fourr. = L. cirrosa
Cymbalaria Mœnch = L. Cymb.
græca Fourr. = L. commutata
hastata Mœnch = L. Elatine
ovata Mœnch = L. spuria
pilosa Mœnch = L. pilosa
spuria Fourr. = L. spuria
tenuis Mœnch = L. cirrosa
ELATINOIDES = Linaria
cirrosa Wettst. = L. cirrosa
commutata Wettst. = L. comm.
Elatine Wettst. = L. Elatine
spuria Wettst. = L. spuria
ELEOCHARIS = Heleocharis
ELEOGENUS = Heleogenus
ELEOGITON = Heleogiton
ELEPHANTINA = Elephas
proboscidea Bert. = E. Column.
ELEPHAS II 462 (769)
Columnæ Guss. 463
recta G. Don = prec.
ELEUSINE I 76 (95)
ægyptia Pers. = Dactylocten. ægypt.
ægyptiaca Desf. = prec.
barcinonensis Costa = tristachya
brachystachya Trin. (indica) = tristachya
ciliata Raf. = Dactyloct. ægyptiac.
coracana Gærtn. 76 (β), A 19
cruciata Lam. = Dactyloct. ægyptiac.
dura Lam. = Sclerochloa dura
geminata Lge. = tristachya
indica Gærtn. 76, A 19
italica N. Terr. = tristachya
oligostachya Lk. 76 (γ) = tristachya (cfr. A 19)
pectinata Mœnch = Dactyloct. ægyptiac.
rigida Spr. = coracana
tristachya Kth. A 19 (γ)
tristachya Schrank = indica (α)
ELICHRYSUM = Helichrysum
frigidum W., Bert. = H. frig.
ELISANTHE = Silene
noctiflora Rupr. = S. noct.
viscosa Rupr. = S. visc.
ELISMA = Alisma
natans Buchen. = A. natans
ELODEA = Helodea
ELODES = Helodes
ELYMUS I 111 (131)
arenarius L. 111 (1)
asper Fiori (*Caput-Med.*) A 33 (3 β)
Bobartii Fiori (*Caput-Med.*) A 33 (3 α)
caninus Leers. = Agrop. — Leersianum
caninus L. = Agropyrum can.
Caput-Medusæ L. 111 (3), A 33
compositus Steud. = europæus
crinitus Sadl., Koch = asper
crinitus Schreb. 111, A 33 (3 γ)
europæus L. 111 (2), A 33
intermedius M. B. = crinitus
microstachys Borb. (crinitus) = asper
platyatherus Lk. = crinitus
ELYNA = Kobresia
Bellardi C. Koch = K. myosuroides
caricina M. K. = K bipartita
scirpina Pax = K. myosuroides
spicata Schrad. = prec.
stricta Hpe. = prec.
ELYTRIGIA = Agropyrum
repens Desv. = A. repens
EMERUS = Coronilla
alpestris Scheele = C. Emerus
Cæsalpina Medic. = prec.
fruticosus Horn. = prec.
hortensis Desv. = prec.
major Mill. = prec.
minor Mill. = prec.
EMEX I 297 (283)
spinosa Campd. 297, A 63
EMPEDOCLIA = Sideritis
montana Raf. = S. sicula
EMPETRUM II 296 (657)
nigrum L. 296
procumbens Gilib. = prec.
rubrum Vahl = prec.
scoticum Hook. = prec.
ENANTIOSPARTON = Genista
radiatum C. Koch = G. rad.
ENARTHROCARPUS
pterocarpus DC. A 98
ENDIUSIA = Vicia
hirsuta Alef. = V. hirs.
ENDOPTERA = Crepis
aspera DC. = C. asp.
Dioscoridis DC. = C. Diosc.
ENDOTRICHE = Gentiana
campestris Steud. = G. camp.
ENDRESSIA = Ligusticum
pyrenaica J. Gay = L. pyren.
ENDYMION = Scilla
campanulatus Parl. = S. hispanica
cernuus Dum. = seg.
non-scriptus Garcke = S. non-script.
nutans Dum. = prec.
patulus Dum. = S. patula
ENGELMANNIA = Cuscuta
migrans Pfeiff. = C. racemosa
suaveolens Pfeiff. = prec.
ENODIUM = Molinia
atrovirens Dum. = M. arundinacea
cæruleum Gaud. = M. cærul.
flavescens Gaud. (cærul.) = M. — viridiflora
pallidum Lge. (cærul.) = prec.
silvaticum Lk. = M. arundinacea
EPHEDRA I 31 (37)
altissima Desf. = fragilis
botryoides C. A. Mey. = distachya
Clusii Duf. = distachya
Desfontainii Stapf (fragil.) = fragilis
dissoluta B. et W. = fragilis
distachya L. 31 (1), A 12
distachya Sut. = helvetica
distachya Ucria, Brot. = fragilis
distachya Vill. = nebrodensis
equisetiformis W. et B. = nebrodensis
fragilis Desf. 32 (3), A 13
fragilis Moris = nebrodensis
Gerardiana Wall. = distachya
græca Coss. = nebrodensis
helvetica C. A. Mey. A 13 (1 β)
Linnæi Stapf (*distach.*) A 12 (1 α a)
major Host = nebrodensis
maritima S.-Lag. = distachya
minor Host = distachya
monostachya L. 31, A 13 (1 α b)
nebrodensis Tin. 32 (2)
Polygonoides Pall. = distachya
procera Vis. = nebrodensis
scoparia Lge. = nebrodensis
tristachya Stapf (*distach.*) A 13 (1 α c)
Villarsii Gr. et Godr. = nebrodensis
vulgaris Rich. = distachya
EPHEMERUM = Lysimachia
nemorum Rchb. = L. nemor.
Nummularia Schur = L. numm.
EPILINELLA = Cuscuta
cuscutoides Pfeiff. = C. Epilinum
EPILOBIUM II 130 (528)
adnatum Griseb. A 147 (7 α)
alatum Heg. = alsinæfol.
albiflorum Dum., Hausskn. (*angustifol.*) A 147, 214 (1 c)
alpestre Hpe. = trigonum
alpestre Jacq. (montan.) = trigonum
alpestre Pers. (mont.) = collinum
alpestre Poir. (roseum) = alsinæfol.
alpestre F. W. Schm. = alsinæfolium
alpestre W. (mont.) = prec.
alpinum Burn. (*Dodonæi*) A 146 (1 γ)
alpinum DC. (rosmarinifol.) = prec.
alpin. Gœrter = collinum
alpinum Hausskn. (*collin.*) A 214 (3 β for.)
alpinum L. 133 (3), A 148

Digitized by Google

EPILOBIUM II 130 (528)
alpinum W. = nutans
alsinæfolium Vill. 133 (8 β)
alsinæf. × *collinum Hausskn.* A 148
alsinæfol. × *gemmascens Hausskn.* A 148
alsinæfol. × *montan. Hausskn.* 133 (nota), A 148
alsinæfol. × *palustre Hausskn.* 133 (nota), A 148
alternifolium Neilr. (mont.) = collinum
altissimum Genn. (*tetrag.*) 132, A 147 (7 α d)
amplexicaule Lam. = hirsutum
anagallidifolium Lam. A 148 (8 α)
angustifolium Lam., Ard. = Dodonæi
angustifolium L. 131 (2), A 147, 214
angustifol. γ L = seg.
angustissimum Rchb. = Dodon. v. alpin.
angustissimum Weber. = Dodonæi (α)
aquaticum Thuill. = hirsutum
bicolor Hausskn. = gemmasc. × roseum
Biknellianum Hausskn. = prec.
brachycarpum Leight. A 147 (1 d)
brevifolium Hausskn. (parviflor.) = cordatum
canescens Dœll (tetrag.) = Lamyi
carpetanum Wk. = collinum
chordorrhizum Fr. = obscurum
collino × *hirsutum Gelmi* 133 (nota)
collinum C. C. Gmel 131, A 147 (3 β)
cordatum Biv. 131 (4 c)
crassifolium Lehm. = Dodon. (α)
crassifolium Nym. = Dodon. v. alpin.
decumbens Dum. = obscurum
decurrens Spr. = tetragon. (α)
denticulat. Lap. (palustre) = obscurum
denticulatum Wend. (non Ruiz. et Pav.) = Dodon. v. alpinum
difforme Gilib. = angustifol.
Dodonæi Vill. 131 (1), A 146
Duriæi J. Gay 131, A 147 (3 δ)
elatior Hausskn. (*collin.*) A 214 (3 β for.)
erroneum Hausskn. = hirsut. × montan.
Facchinii Hausm. hb. = alsin. × mont.
flaccidum Brot. = obscurum
Fleischeri Hochst. 131 = Dodon. v. alpin., cfr. A 146
foliosum Ficin. (tetrag.) = parvifl. × roseum
foliosum Holl et Heynh. = parv. × roseum et roseum
fontanum Whlnb. (alpin.) = alsinæfol.
gemmascens C. A. Mey. A 148
gemmascens Michalet = alsinæf. × gemmascens
EPILOBIUM II 130 (528)
gemmasc. × *roseum Hausskn.* A 148
gemmiferum Bor. = alsinæf. × gemmascens
gemmiferum Lge. = obscurum
Gesneri Vill. = angustifol.
glabrum Gilib. = montanum
grandiflorum Kern. (*mont.*) A 147 (3 α c)
grandiflorum Salzm. (tetrag.) = Tournefortii
grandiflorum Weber., All. = hirsutum
Haynaldianum Hausskn. = alsin. × palustre
heterophyllum Heg. = nutans
hirsutum All. = parviflor.
hirsutum L. 132 (5), A 147
hirsutum β L. = parviflorum
hirsuto × *montan. Hausskn.* 133 (nota), A 147
hirsuto × parviflor. Wimm. = parviflor. × hirs.
hirsuto × *Tournefortii Hausskn.* A 147
Hoheneckianum Kirschl. (mont.) = Duriæi
Hornemanni Schur = nutans
Huteri Borb. = alsin. × collinum
hybridum Schur?, Borb. = parvifl. × hirsut.
incanum Pers. = tomentosum
intermedium Mérat = parviflor. (ex Hausskn.)
intermedium Rchb. = parvifl. × hirsutum
Kerneri Borb. = palustre
Knafii Celak. = parvifl. × roseum
Lamyi F. Schultz 132, A 147 (7 β)
lanceolatum Seb. et Maur. 131, A 147 (3 γ)
latifolium Guss. (pubescens) = cordatum
latifolium Matt. (non L.) = angustifol.
lavandulæfolium Lec. et Lam. (*palustre*) 132 (6 e)
leiostylon Peterm. = angustif.
lejocarpum Ducom. (alpin.) = alpinum (α)
lejocarpum Fiori (*parviflor.*) A 147 (4 d)
lejocarp. N. Terr. (pubescens) = prec.
leucanthemum Wend. (spicat.) = albiflor.
lineare Krause = palustre
Lobelii Vill. = Dodonæi (α)
macrocarpum Steph. A 147 (1 e)
Magdalenæ A. Terr. = tetrag. (α)
majus Fr. (origanifol.) = alsinæfol.
majus Fr. (*palustre*) 132 (6 d)
majus Whlnb. (alpin.) = alsinæfol.
majus Wk. et Lge. (virgatum) = Tournefortii
Mathiæi F. Schultz = Duriæi
EPILOBIUM II 130 (528)
micranthum Lge. (hirsut.) = parvifl. × hirsut.
micranthum Walp. (pubescens) = cordatum
minus Fr. (alpin.) = alpin. (α)
minus Kit. (roseum) = alpinum (α)
minus Wimm. et Grab. (mont.) = collinum
minutum Schloss. et Vucot. (mont.) = prec.
molle Lam. = parviflorum
montanum L. 131 (3), A 147, 214
mont. γ DC. = collinum
mont. × alsinæfol. Focke = alsin. × mont.
mont. × hirsutum Gelmi 133 (nota) = hirs. × mont.
mont. × *trigonum Hausskn.* 133 (nota), A 147
mutabile Boiss. et Reut. = parviflor.
nebrodense Strobl = hirsut. × Tournefortii
nicæense Burn. (*Dodon.*) A 146 (1 β)
nigrescens Simkov. (scaturiginum) = nutans
nitidum Fuss. (mont.) = collinum
nitidum Guép. = lanceolat.
nitidum Host = collinum
nitidum Sauter p. p. = alsin. × mont.
nudum Schum. = roseum
nutans Lej. = collinum
nutans F. W. Schm. 133, A 148 (8 γ)
oblongum Mey. (mont.) = lanceolat.
obscurum Fr. (tetrag.) = Lamyi
obscurum Guss. = Tournefortii
obscurum Lowe = Lamyi
obscurum F. W. Schm. = tetragonum (α)
obscurum Roth 132, A 147 (7 δ)
oliganthum Michx. = palustre
origanifolium Kirschl. = Duriæi
origanifolium Lam. = alsinæf.
origan. × montan. Gelmi 133 (nota) = alsin. × mont.
origanoides Ser. (mont.) = collinum
ovatum Peterm. (mont.) = collinum
pallidum Tausch = mont. × trigon.
palustre Burn. (*Dodonæi*) A 146 (1 α)
palustre L. 132 (6), A 147
palustre Vis. = parviflor.
palustre Ucria = tetragon. (α)
palustre × origanifol. Gelmi 133 (nota) = alsin. × pal.
palustre × parviflorum = rivulare
parviflorum Soy.-Will. (mont.) = collinum
parviflorum DC. 132 (4), A 147
parvifl. × *hirsutum Rchb.* A 147

Digitized by Google

EPILOBIUM II 130 (528)
parvifl. × *roseum F. Schultz* 133 (nota), A 147
perramosum Schur = collinum
persicifolium Vill. = angustif.
persicinum Rchb. = parvifl. × roseum
pilosum Koch (*palustre*) 132 (6 b)
prostratum Gaud. (Dodon.) = Dodon. v. alpin.
pseudo-trigonum Borb. = mont. × trigon.
ptarmicæfolium F. Schultz = tetrag. (α)
puberulum Dum. (roseum) = parvifl. × roseum
pubescens Roth = parviflorum
pumilum Pers. (alpin.) = alsin. × mont.
purpurascens Gilib. = obscurum
purpureum Fr. = hirsut. × montan.
ramiflorum Heg. = palustre
ramosissimum Heg. = collinum
ramosissimum Lge. (pubescens) = parvifl. × roseum
ramosum Huds. = hirsutum
ramosum Ser. (mont.) = collinum
repens Hill = alpinum (α)
rhynchocarpum Boiss. = palustre
rivulare Heg. = umbrosum
rivulare Kirschl. = parvifl. × hirsut.
rivulare Paol. (parviflor.) 131 = umbrosum
rivulare Whlnb. A 147 (4 in text.)
roseum DC. = trigonum
roseum Pers. 133 (9), A 148
roseo × parviflor. Krause = parv. × roseum
rosmarinifolium Hænke = Dodonæi (α)
salicifolium Clairv. = angustifol.
salicifolium Facch. = alsin. × mont.
Salzmanni Boiss. et Reut. in Huet exs. = Tournefortii
scaturiginum Kern. = palustre
Schmidtianum Rostk. 132 (6 c), A 147
silvaticum Bor. = montanum
silvestre Dierb. = collinum
simplex Lasch, Moris? (*roseum*) 133 (9 b)
simplex Tratt. = palustre
sparsifolium Dum. = lanceolat.
spicatum Lam. = angustifol.
stenophyllum Borb. = parvifl. × roseum
stenophyllum Hausskn. (*adnatum*) A 147 (7 α c)
strictifolium Hausskn. (*obscurum*) A 148 (7 δ b)
subcordatum Hausskn. (mont.) = grandiflor.
subglabrum Koch (*hirsut.*) 132 (5 c)
subhirsutum Gennari A 147

EPILOBIUM II 130 (528)
subintegrifolium Moris (*tetrag.*) 132 (7 α b)
subpetiolatum Beurl. (tetrag.) = Lamyi
sudeticum Beurl. = nutans
tenellum Heuff. (mont.) = collinum
tenellum Raf. = palustre
tetragoniforme Simkov. = parvifl. × roseum
tetragonum Forsk. = Lamyi
tetragon. Guss. = Tournefortii
tetragonum L. 132 (7), A 147
tetragonum Pollich = obscurum
Todari Strobl A 147 (5 d subf.)
tomentosum Gilib. = palustre
tomentosum Vent. 132 (5 b)
Tournefortii Freyn = tetrag. (α)
Tournefortii Michal. 132, A 147 (7 γ)
trifoliatum Kit. (montan.) = trigonum
trigonum Schrank 133 (10)
umbrosum Dum. A 147 (4 b)
valdepilosum Sauter (hirsut.) = tomentosum
verticillatum Koch (*mont.*) 131 (3 α b)
verticill. Schur = prec.
verticillatum Ten. A 147 (1 b)
villosissimum Koch (hirsut.) = tomentosum
villosum Curt. = parviflorum
villosum Hausskn. (hirsutum) = tomentosum
villosum Thunb. A 147 (5 d)
virgatum Fr. p. p. = strictifol.
virgatum Lam. = obscurum
virgatum Lamy exs., Koch = Lamyi
virgatum Spr. = lanceolat.
virgatum Sturm., DNtrs. = tetragon. (α)
EPIMEDIUM I 528 (441)
alpinum L. 528, A 110
EPIPACTIS I 252 (246)
abortiva All. = Linodorum abortiv.
alba Crantz = Cephalanth. ensifol. et pallens
alpina Schm. = Herminium alp.
atrorubens Schult. = rubiginosa
Corallorhiza Crantz = Corallorh. Neottia
cordata All. = Listera cord.
ensifolia Sw. = Cephalanth. ensifol.
Epipogum Crantz = Epipog. aphyllum
grandiflora All. = Cephalanth. ensifol.
grandiflora Gaud. = Cephalanth. pallens
Helleborine Crantz = latifolia
humilis Goir. (*palustr.*) A 210 (1 c)
lancifolia Schw., All. = Cephalanth. pallens
latifolia All. 253 (2), A 56, 210
latifolia var. C Ten. = microphylla

EPIPACTIS I 252 (246)
longifolia All. = palustris
longifolia Wettst. = Cephalanth. ensifol.
macropodia α Peterm. = rubiginosa
media Fr. = rubiginosa
microphylla Sw. (2 γ)
monophyllos Schm. = Malaxis monophylla
Monorchis Schm. = Herminium Mon.
myodes Schm. = Ophrys myodes
Nidus-avis Crantz = Neottia N.-avis
ochroleuca Baumg. = Cephalanth. pallens
ovalis Bab. = rubiginosa
ovata Crantz = Listera ov.
pallens W. = Cephalanth. pall.
pallida Sw. = Cephalanth. pallens
palustris Crantz 253 (1), A 56, 210
platyphylla Irm. (latifol.) = latifolia
purpurata Sm. = varians
purpurea Crantz = Cephalanth. rubra
pycnostachys C. Koch = latifolia
repens Crantz = Goodyera rep.
rubiginosa Crantz (Helleborine) = seg.
rubiginosa Gaud. 253 (2 β)
rubra All. = Cephalanth. rubra
silvatica Ten. (latifol.) = rubiginosa
spiralis Crantz = Spiranthes autumn.
unifolia Hall. = Malaxis monophylla
varians Crantz (Helleborine) = seg.
varians Richter (*latifol.*) A 210 (2 α b)
viridans G. Beck = latifolia
viridans Crantz (Helleborine) = latifolia
viridiflora Rchb. = varians
Xiphophylla Sw. = Cephalanth. ensifol.
EPIPOGIUM I 251 (243)
aphyllum Sw. 251, A 56
Gmelini Rich. = aphyllum
EPITHYMUM = Cuscuta
cuscutoides Opiz = C. Epithym.
EPITRACHYS = Cirsium
lanceolata C. Koch = C. lanc.
nemoralis C. Koch = C. silvat.
vulgaris C. Koch = C. italicum
EQUISETUM I 19 (26)
affine Milde (*variег.*) A 9 (9 for.)
alpestre Whlnb. (*arvense*) A 8, 203 (1 for.)
altissimum A. Br. (ramosiss.) = elongatum
ambiguum Genn. = max. b. serotinum
amphibolium Rotz. = pratense
anceps Milde (*variег.*) A 9 (9 for.)

Digitized by Google

EQUISETUM I 19 (26)
aquaticum Hpe. = limosum
arcuatum Milde (*palustre*) A 203 (5 d)
arenarium Opiz = palustre
arenicolum Goir. (*arvense*) A 203 (1 for.)
arvense L. 20 (1), A 8, 203
arvens. × heleocharis Asch. = seg.
arvens. × *limosum Lasch* A 206
asperrimum Gilib. = hiemale
autumnale Kœrn. = nudum Duby
boreale Bongard A 8 (1 for.)
breve Asch. (*maxim.*) A 8 (2 c)
breve Milde (Telmateja) = prec.
cæspitosum Schur = ramosiss.
campanulatum Poir. p. p. A 9 (8 for.)
campestre F. W. Schultz 20 (1 b)
comosum Milde (*maxim.*) A 203 (2 d)
conforme Schm. et Reg. (Telmateja) = max. b. serotinum
conforme F. Wirtg. (maxim.) = prec.
decumbens G. F. W. Meyer (*arv.*) A 8 (1 for.)
Drummondii Hook. = pratense
eburneum Schreb. = maximum
Ehrarhti Mey. = pratense
elongatum W. A 9 (8 a)
ephedroides Bory = ramosiss.
fastigiatum F. Hy (*ramosiss.*) A 9 (8 e)
fluviatile Gouan, Sm., Guss. etc. = maximum
fluviatile L. 21 (6 b), A 9
gracile A. Br. (ramosum) = seg.
gracile Milde (*ramosiss.*) A 9 (8 c)
granatense Lge. = maximum
Heleocharis Ehrh. = limosum et fluviatile
hiemale L. 21 (7), A 9
hiemale Raf., Torn.? = ramosissim.
humile Milde (*ramosiss.*) A 9 (8 for.)
illyricum Hpe. = ramosissim.
intermedium Schur = Schleicheri
inundatum Lasch = arvensi × limosum
lacustre Opiz = limosum
limosum L. 21 (6), A 9
Linnæanum Dœll (limos.) = limosum
litorale Kuehl. = arvensi × limos.
longevaginatum Strobl = maximum?
maximum Lam. 20 (2), A 8, 203
meridionale Milde (*varieg.*) A 9 (9 for.)
minor Lge. (Telmateja) = max. c. breve
Moorei Newm. = Schleicheri
multicaule Ledeb. = ramosiss.
multiforme Vauch. = ramosiss.

EQUISETUM I 19 (26)
nanum Milde (*pal.*) A 9 (5 for.)
nanum Milde (*prat.*) A 9 (4 b)
nemorosum A. Br. (*arvense*) A 8 (1 c)
nodosum Hpe. = palustre
nudum Duby (*pal.*) A 9 (5 for.)
pallidum Bory = ramosissim.
palustre L. 21 (5), A 9, 203
pannonicum Kit. A 9 (8 for.)
polystachium Ehrbrg. 21 (8 b)
polystachyum Weigel, Vill. (*pal.*) 21 (5 b)
pratense Ehrh. 21 (4), A 9
pratense Rchb. exc. = palustre
pratense Roth = nemorosum
procerum Pollini A 9 (8 for.)
prostratum Hpe. = palustre
pseudo-silvaticum Milde (*arv.*) A 8 (1 for.)
pyramidale Milde (*silvat.*) A 9 (3 b)
ramigerum A. Br. (*hiem.*) A 9 (7 α b)
ramosissimum Desf. 21 (8), A 9
ramosiss. Milde (elongat.) = elongatum
ramosum DC. = ramosissim.
ramulosum Milde (*pal.*) A 9 (5 c)
rivulare Scheele = maximum
scabrum Milde (ramosiss.) = campanulat.
Schleicheri Milde (*hiemale*) 21 (7 β)
Schleicheri Nym. = prec.
serotinum A. Br. (eburneum) = seg.
serotinum Fiori (*maxim.*) 20 (2 b)
serotinum G. F. W. Mey. (arven.) = campestre
silvaticum L. 20 (3), A 9
simplex Dœll (elong.) = seg.
simplex Milde (*ramosiss.*) A 9 (8 d)
striatum Gilib. = limosum
subverticillatum A. Br. (ramosum) = procerum
Telmateja Ehrh. = maximum
tenue Dœll (*palustre*) A 203 (5 e)
tenue Hpe. = variegatum
tenue Presl = pannonicum
tenellum Krok = variegatum
trachyodon Milde, Ber. (non A. Br.) = Schleicheri
umbrosum J. G. F. Mey. = pratense
variegatum Schl. 22 (9), A 9
varium Milde (*arv.*) A 8, 203 (1 for.)
veronense Pollini = palustre
verticillatum Dœll (limos.) = fluviatile
virgatum A. Br. (ramosum) = pannonicum
virgatum Dœll (*varieg.*) A 9 (9 for.)
zonatum Friv. = hiemale

ERAGROSTIS I 82 (108)
Barrelieri Daveau 82 (1 γ)
brizoides Costa = megastachya

ERAGROSTIS I 82 (108)
cilianensis Asch. et Græbn. (megast.) = megastachya
Eragrostis Karsten = poæoides (α)
Eragrostis Mac Millan = megastachya
leersoides Guss. = megastachya
major Host = megastachya
megastachya Lk. 82 (1 β), A 22
microstachya Coss. et Germ. (vulgar.) = poæoides (α)
minor Host = poæoides (α)
multiflora Asch. (non Trin.) = megastachya
pilosa P. B. 82 (2), A 22
poæformis Lk. = poæoides
poæoides Boiss., Gr. et Godr. = Barrelieri
poæoides P. B. 82 (1), A 22
verticillata P. B. A 22 (2 b)
vulgaris Coss. et Germ. = poæoides et megastachya

ERANTHIS I 517 (432)
hiemalis Salisb. 517, A 107

EREMANTHE = Hypericum
calycina Spach = H. calyc.

EREMOPYRUM = Agropyrum
cristatum Wk. et Lge. = A. cristat.

ERESDA = Reseda
alba Spach = R. alba

ERIANTHUS = Saccharum
Hostii Griseb. = S. strictum Spr.
orientalis C. Koch = prec.
Ravennæ P. B. = S. Ravenn.
strictus Bluff et Fing. (non Baldw.) = S. strictum Spr.

ERICA II 300 (664)
absinthioides Spr. = scoparia
acrophya Fresen. = arborea
albiflora Goir. (*carnea*) A 161 (7 d)
anthura Lk. = vagans
arborea L. 301 (2)
arctica Waitz = Phyllodoce cærulea
bracteata Mœnch = carnea
cærulea W. = Phyllodoce cær.
caffra L. = arborea
carnea L. 302 (7), A 161
ciliaris Huds. (non L.) = Calluna — pubescens
cinerea L. 302 (6)
corsica DC. = stricta
cretica Tausch = verticillata
decipiens St. Am. (non Spr.) = vagans
dianthera Mœnch = multifl.
didyma Stokes = vagans
elata Hofmgg. et Lk. = arborea
Forskalii Vitm. = vagans
fucata Thunb. = scoparia
glabra Gilib. = Calluna vulg.
herbacea L. = carnea
humilis Neck. (non al.) = cinerea
manipuliflora Salisb. = verticillata
mediterranea L. = urceolaris?
mediterranea Sieb., Urv. ecc. = verticillata

Digitized by Google

ERICA II 300 (664)
multicaulis Salisb. = stricta
multiflora Huds. = vagans
multiflora L. 301 (4)
mutabilis Salisb. = cinerea
pallido-purpurea L. = vagans
peduncularis J. et C. Presl (non Salisb.) = multiflora
pendula Wendl. = stricta
procera Salisb. = arborea
purpurascens Lam. = multiflora
purpurascens L. A 161 (7 c)
ramulosa Viv. = stricta
sagittifolia Stokes = Calluna vulg.
saxatilis Salisb. = carnea
scoparia L. 301 (1), A 161
scoparia Thunb. = arborea
sicula Guss. = Pentapera sic.
stricta Donn 301 (5)
stylosa Rudolph = arborea
terminalis Salisb. = quid?
umbellifera Lois. = multiflora
urceolaris Rchb. (*carnea*) 302 (7 b)
vaga Benth. = verticillata
vaga Salisb. = vagans
vagans Desf. = multiflora
vagans Koch = verticillata
vagans L. 301 (3)
verticillata Forsk. 301 (3 β)
virgulata Wendl. = scoparia
vidipurpurea Gouan = cinerea
vulgaris L. = Calluna vulg.
ERICALA = Gentiana
ERICOILA = prec.
ERIGERON III 232 (866)
acer L. 234 (5), A 182, 216
acer B Ten. = depressus
acer × alpinus Rchb. = intermedius?
acer × canadensis Vatke A 182
alpestris Rikli (*acer*) A 182 (5 α e)
alpinus Chenev. (acer) = alpestris
alpinus L. 234 (6), A 182, 216
alp. × uniflorus Bruegg. = rhæticus
annuus Pers. 233 (3)
ambiguus Fiori (*glabratus*) 235 (6 ζ b)
ambiguus Sch. Bip. = crispus
angulosus Gaud. 234 (5 β c)
appenninianus Georgi = uniflorus
asteroides Andrz. = murale
asteroides Caldesi (non DC.) (acer) = murale
atticus Vill. 234 (6 δ)
bellidioides Spenn. = annuus
bonariensis L. 232 (nota)
bonariensis Sch. Bip., Nym., Arc. = crispus
canadensis L. 233 (2), A 182
Christii J. O. Wolff A 183
contortus Desf., Pers. = crispus
coronopifolius Clem. 232 (1 b)
corymbosus Wallr. 234 (5 α a)
crispus Pourr. 232 (1)
depressus Fiori (*acer*) 234 (5 α d)
diversifolius Rich. = annuus
ERIGERON III 232 (866)
Drœbachensis O. F. Muell. 234 (5 β), A 216
dubius Chenev. (*Schleicheri*) A 216 (6 ε b)
elongatus Ledeb. A 182 (5 α for.)
elongatus Mœnch = atticus
elongatus Rikli in Chen. (alpin.) = gracilis
elongatus Rikli (*uniflor.*) A 216 (6 η for.)
erectus Chenev. (*Drœbachens.*) A 216 (5 β d)
glaberrimus Scheele 234 (5 β b)
glabratus Hpe. 235 (6 ζ)
glabrescens Rikli (*uniflor.*) A 183 (6 η d)
glutinosus L. = Jasonia glutin.
gracilis Tavel (*alpinus*) A 183 (6 α e)
grandiflorus Hpe. 234 (6 α d)
graveolens L. = Inula graveol.
heterophyllus Kth. et Bouch. = mucronatus
heterophyllus Muehl. = annuus
hirsutus Hpe. 234 (6 α b)
hirsutus Moritzi = intermedius
Huelsenii Vatke = acer × canadens.
intermedius Schleich. (*alp.*) 234 (6 γ)
Karwinskyanus DC. 233 (4)
leucanthemifolius Schauer = mucronatus
linearifolius Cav. = crispus
linifolius W. = crispus
Linosyris Clairv. = Aster Lin.
maximus Rikli (*alpin.*) A 216 (6 α f)
minimus Rikli in Chen. (uniflor.) = nanus
mucronatus DC. 233 (4 β)
Muelleri Lund. = Drœbachens.
murale Lap. 234 (5 α b)
nanus Rikli (*uniflor.*) A 183 (6 η b)
neglectiformis Rikli (*uniflor.*) A 183 (6 η d)
neglectus Kern. A 183 (6 β′)
oligocephalus Fiori (*strigosus*) 234 (6 β b)
paniculatus Lam. = canadensis
perramosus Schur (*canadens.*) A 182 (2 b)
pleiocephalus Wk. (*alp.*) 234 (6 α c)
polycephalus Rikli in Chen. (alpin.) = pleiocephal.
polymorphus Scop. = alpinus
pumilus Auct. (uniflor.) = nanus
purpureus Re (non Ait) = atticus
pusillus Uechtritz (canadens.) = perramosus
reductus Chenev. (acer) = alpestris
rhæticus Bruegg. A 183
rupestris Schleich. (non Hpe.) = Schleicheri
scaber W. = acer
Schleicheri Gremli 235 (6 ε), A 216
ERIGERON III 232 (866)
Senecio Sch. Bip. = Senecio vulgaris
serotinus Weihe 234 (5 α c)
siculus L. = Pulicaria sicula
squarrosus Clairv. = Inula Conyza
strictus DC. = canadensis
strigosus Bigel. (non Muehl.) = annuus
strigosus Fiori (*alp.*) 234 (6 β)
subulatus Nobili = mucronatus
umbellatus Gilib. = acer
uniflorus Fiori, Parl. etc. = strigosus
uniflorus L. 235 (6 η), A 183, 216
unifl. × Schleicheri J. O. Wolff = Christii
Villarii Bell. = atticus
Villarsii Auct. = prec.
Villarsii Fiori = Schleicheri
Villarsii Heg. = intermedius
viscosus L. = Inula viscosa
vulgaris Scheele = acer
ERINACEA
pungens Boiss. II 23 (nota)
ERINIA = Campanula
Campanula Noulet = C. Erinus
campanulata Nym. = prec.
ERINOSMA = Leucojum
dianthum Goir. (vern.) = L. — dianthum
vernum Herb. = L. vern.
ERINUS II 445 (762)
alpinus L. 446
hirsutus Gr. et Godr. (*alp.*) 446 (2)
lanceolatus Kitt. = alpinus
ERIOBOTRYA I 598 (472)
japonica Lindl. 598
ERIOLEPIS = Cirsium
echinata Cass. = C. echin.
ferox Cass. = C. ferox
italica Cass. = C. ital.
lanceolata Cass. = C. lanceol.
lanigera Cass. = C. eriophorum
ERIOPHORUM I 116 (133)
alpinum L. 117 (2)
alpinum Vill. = Scheuchzeri
angustifolium Roth = polystachyum (α)
cæspitosum Host = vaginatum
cæspitosum Rchb. = Scirpus cæsp.
capitatum Host = Scheuchzeri
Chamissonis C. A. Mey. = Scheuchzeri
gracile Koch 117 (1 γ)
latifolium Hpe. 116 (1 β)
polystachium DC., Sm. = latifolium
polystachyum L. 116 (1)
polystach. β L. = latifolium
pubescens Sm. = latifolium
Scheuchzeri Hpe. 117 (4)
triquetrum Hpe. = gracile
vaginatum L. 117 (3)
vulgare Pers. = latifolium
ERIOSTOMUM = Stachys
alpinum Hoffgg. et Lk. = S. alpina
germanicum Hoffgg. et Lk. = S. german.

Digitized by Google

ERIOSTOMUM = Stachys
polystachyum Presl = prec.
salviæfolium Presl = S. italica
ERITHEIS = Inula
maritima S. F. Gray = I. crithmoides
ERITRICHIUM II 382 (731)
Hacquetii Koch = tergloviense
lejospermum Koch (nanum) = tergloviense
nanum Schrad. 382, A 215
tergloviense Endl. 382 (β)
ERNODEA = Putoria
calabrica Lk. = P. calabr.
montana S. et S. = P. calabr.
EROBATHOS = Nigella
damascenum Spach = N. damasc.
ERODIUM II 241 (626)
acaule Rouy (pimpinellæfol.) = præcox
affine Ten. = laciniatum
albiflorum Genn. (*Cicon.*) 244 (8 d)
albiflorum Moris = alnifolium
alnifolium Guss. 242 (4 β)
alpinum L'Hér. 244 (9)
althæoides Jord. 243 (5 b)
anthemidifolium Ten. (non M. B.) = alpinum
apenninum Ten. = alpinum
apetalum Rouy et Fouc. (*marit.*) 242 (3 d)
arenarium Jord. 245 (11 γ d)
bicolor Somm. (*cicutar.*) A 158 (11 α for.)
bipinnatum W. 245 (11 δ)
Bocconii Viv. 241 (3 c), A 158
Botrys Bert. 243 (7)
brevicaule Bert. 243 (8 b)
brevicaule Rouy (*Botrys*) 243 (7 b)
canescens Guss. (*romanum*) 245 (11 β b)
Carioti Jord. 245 (11 β c)
carneum Jord. 245 (11 γ c)
Cavanillesii Lojac. (non Wk.) = laciniatum
Chærophyllum DC. (*cicutar.*) 245 (11 γ)
Chærophyll. Steud. = prec.
chamædryoides L' Hér. 242 (nota) = Reichardi
chamædryoides Parl. = maritimum
chium W. 242 (4), A 158
Ciconium W. 244 (8)
cicutæfolium Salisb. = seg.
cicutarium L'Hér. 244 (11), A 158
cinerescens Moris = laciniatum
commixtum Jord. 245 (11 α d)
commutatum Tod. = malachoides
corsicum Lém. 241 (2)
crassifolium Asch. (non Ait., nec DC.) = alnifolium
cuneatum Viv. 242 (4 α b)
decipiens Del. in Ten. = laciniatum
dryadifolium Salisb. = Reichardi
dissectum Rouy = Chærophyllum
ERODIUM II 241 (626)
elongatum Tod. = alnifolium
Gasparrinii Guss. 243 (7 c)
glabratum A. Terr. (*marit.*) 241 (3 b)
glaucovirens Lojac. = soluntinum
gruinum Sol. in Ait. 243 (6)
gruinum Ten. = laciniatum
Gussonei Ten. 241 (1)
hirtum Jacq. (non W.) = Jacquinian.
hirtum Moris (cicutar.) = Jacquinian.
hispidum Presl 242 (4 δ b)
involucratum Kze. = hispidum
Jacquinianum F. M. et Avé-Lall. 245 (11 ε)
laciniatum W. 243 (4 δ), A 158
leucophyllum Presl = laciniatum
litoreum Bad. (non Lém.) = chium (α)
litoreum Gr. et Godr. = cuneatum
litoreum Rchb. = subtrilobum
longicaule Tod. = alnifolium
luxurians Guss. (Botrys) = Gasparrinii
macranthum Beck. (*cicutar.*) 245 (11 α f)
maculatum Koch (*cicutar.*) 245 (11 α h)
maculatum Salzm. = prec.?
malachoides W 243 (5)
malacitanum Amo = Jacquinian.
malopoides Lois. = corsicum
malopoides W. = alnifol.
malvaceum Jord. = malachoides (a)
Marcuccii Parl. 245 (11 δ b)
maritimum Sm. 242 (3)
micropetalum Celak. (*cicutar.*) 245 (11 α g)
minor Rouy (moschat.) = pusillum
monsonioides Steud. = gruinum
moschatum L'Hér. 244 (10)
murcicum W. 242 (4 α c)
nervulosum L'Hér. ex DC. = quid?
obliquifolium Ten. = alnifolium
parviflorum Jord. 245 (11 γ b)
petræum Ten. (non W.) = alpinum
pilosum DC. (cicutar.) = bipinnatum
pilosum Jord. = bipinnatum (a)
pilosum Steud. = seg.
pilosum Thuill. (*cicutar.*) 245 (11 α i)
pimpinellæfolium Sibth., W. = cicutarium (α)
præcox DC. (cicutar.) = præcox W.
præcox Somm. (*marit.*) 242 (3 e)
præcox W. 245 (11 α b)
p œtermissum Jord. A 158 (11 α for.)
ERODIUM II 241 (626)
prostratum A. Terr. 245 (11 ε c)
pumilum Goir. (*cicutar.*) A 158 (11 α for.)
pusillum Somm. (*moschat.*) 244 (10 b)
pyramidatum Presl = laciniat.
Reichardii DC. A 158 (2 bis)
ribifolium Jacq. = malachoides
romanum W. 245 (11 β)
soluntinum Tod. 242 (4 γ)
staphylinum Bert. = Jacquinian.
subalbidum Jord. 245 (11 α e)
subtrilobum Jord. 243 (5 c)
tenuisectum Gr. et Godr. 245 (11 ε b)
tenuisectum Nym. (*Cicon.*) 243 (8 c)
Timbali Jord. 245 (11 α c)
tolosanum Jord. 245 (11 β d)
triviale Jord. = cicutar. (α a)
EROPHILA = Draba
americana DC. = D. — americ.
brachycarpa Jord. = D. præcox
curtipes Jord. = D. — curtip.
glabrescens Jord. = D. — glabresc.
hirtella Jord. = D. — hirtella
Krockeri Andrz. = D. — americana
leptophylla Jord. = D. — leptoph.
majuscula Jord. = D. — macrophylla
medioxima Jord. = D. glabrescens
obovata Jord. = D. spathulata
præcox DC. = D. præcox
Revelieri Rouy et Fouc. = D. Revel.
spathulata Lang = D. spath.
stenocarpa Jord. = D. — americana
subrotunda Fouc. et Rouy = D. — subrot.
verna E. Mey. = D. verna
vulgaris DC. = D. verna
ERUCA I 442 (374)
alba Noulet = Sinapis alba
aquatica Mœnch = Nasturt. amphib.
arvensis Noulet = Moricandia arv.
aspera Mill. = Brassica Erucastr.
Barbarea Lam. = Barbar. vulg.
bellidis-folia Mill. = Diplotax. viminea
cappadocica Reut. 442 (nota)
dasycarpa Rouy et Fouc. (sativa) = hispida
decumbens Mœnch = Diplotax. mural.
drepanensis Caruel = Brassica — drep.
elongata Baumg. = Brassica elong.
erecta Lag. = Brassica Tournefortii
Erucastrum Gærtn. M. et S. = Brassica Eruc.
fœtida Mœnch = sativa

Digitized by Google

ERUCA I 442 (374)
glabrescens Jord. = longirostris
grandiflora Cav. = sativa
hispida DC. = Diplotax. hispidula
hispida Groves (sativa) 442 (b)
longirostris Uechtr. 442 (c)
macrocarpa Caruel = Brassica macr.
muralis Bess. = Diplotax. muralis
muralis Gærtn. M. et S. = Diplotax. tenuifol.
perennis Mill. = Diplotax. tenuifol.
Ruchetta Spach = sativa
sativa Mill. 442, A 96
silvestris Lam. = Brassica Erucastrum
tanacetifolia Mill. = Sisymbr. tanacetifol.
tenuifolia Mœnch = Diplotax. tenuifol.
viminea Mill. = Diplotax. vim.
ERUCAGO = Bunias
arvensis Fourr. = B. arvens.
aspera Horn. = B. macroptera
brachyptera Fourr. = B. Erucago (a)
campestris Desv. = B. Erucago
dentata Mœnch = B. Erucago
glandulosa Rœhl. = B. Erucago
macroptera Fourr. = B. macropt.
monspeliensis Cav. = B. Erucago
runcinata Horn. = B. Erucago
segetum Nic. = B. Erucago
ERUCARIA
aleppica Gærtn. 453 (nota), A 98
aleppica M. B = Brassica adpressa
hypogæa Viv. = Morisia hyp.
hyrcanica DC. = Brassica adpressa
persica Gorter = Brassica adpressa
ERUCASTRUM = Brassica
bœticum Lge. = B. bœtica
bracteatum St.-Lag. = B. ochroleuca
cheiranthiflorum Lk. = B. cheiranthifl.
Cheiranthus Lk. = B. monensis
dasycarpum Lge. (incanum) = B. — inflexa
Decandollii Sch. et Spenn. = Moricandia arvens.
elongatum Rchb. = B. elong.
fruticulosum Presl = B. frutic.
heterophyllum Nym. p. p. = B. — acutifolia
incanum Koch = B. adpressa
inodorum Rchb. = B. ochroleuca
monense Lk. = B. monen.
montanum Heg. = B. mont.
obtusangulum Rchb. = B. Erucastrum
oleraceum Presl = B. fruticulosa
palustre Vis. = B. pal.
ERUCASTRUM = Brassica
Pollichi Schp. et Spenn. = B. ochroleuca
pubescens Wk. et Lge. = B. pubesc.
Richeri Lk. = B. Rich
Tournefortii Lk = B. Tourn.
virgatum Presl = B. bœtica
Zanonii Ball = Sisymbr. Zanon.
ERVILIA = Vicia
cassubica Schur = V. cassub.
hirsuta Opiz = V. hirs.
monanthos Opiz = V. multifida
pisiformis Schur = V. pisif.
sativa Lk. = V. Ervilia
silvatica Schur = V. silv.
tetrasperma Schur = V. tetr.
vulgaris Godr. = V. hirsuta
ERVUM = Vicia
agrigentinum Guss. = V. leucantha
aristatum Raf. = V. gracilis
Biebersteini Guss. = V. pubescens
calcaratum Trautv. = V. monantha
cassubicum Peterm. = V. cassubica
Centoides Ten., err. pr. lentoides
corsicum Nym. = V. cors.
Cracca Trautv. = V. Cracca (α)
dispermum Roxb. = V. Lens b disperma
eriocarpum Gr. et Godr. (gracile) = V. grac. d. eriocarpa
eriocarpum Gr. et Godr. (tetrasper.) = V. tetrasp. b. eriocarpa
Ervilia L. = V. Ervilia
glabrum Gilib. = V. tetrasperma
gracile DC. = V. grac.
hirsutum L. = V. hirs.
lejocarpum Moris (hirsutum) = V. — Terronii
lejocarp. Ten. (pubescens) = V. — Terronii
Lens L. = V. Lens
Lenticula Schreb. = V. Lentic.
lentoides Ten. = V. lentoides
Loiseleurii M. B. (non C. A. Mey.) = V. pubescens
longifolium Ten. = V. — longifol.
macrocarpum Presl = quid?
minor Ten. (Lens) = V. Lens b. disperma
monanthos L. = V. multifida
nemorale Giraudias = V. nemor.
nigricans M. B. = V. Marschalii
parviflorum Bert. = V. disperma
pisiforme Peterm. = V. pisiform.
plicatum Mœnch = V. Ervilia
pubescens DC. = V. pub.
Salisii J. Gay = V. pubescens
sardoum Moris = V. — Terronii
silvaticum Peterm. = V. silv.
soloniense L. = V. lathyroides
ERVUM = Vicia
soloniense Thuill. = V. tetrasper.
soloniense Wulf. = V. Lenticula
stipulaceum Bast. = V. multifida
subuniflorum Somm. (pubescens) = V. — subunifl.
Tenorei Dietr. = V. — Terronii
tenuifolium Lag. = V. gracilis
tenuifolium Trautv. = V. tenuifol.
tenuissimum Pers. (an M. B.?) = V. gracilis
Terronii Ten. = V. — Terronii
tetraspermum L. = V. tetr.
tetraspermum M. B. = V. pubescens
uniflorum Ten. = V. — uniflora Fiori
varium Brot. = V. gracilis
villosum Trautv. = V. vill.
ERXLEBENIA = Pirola
rosea Opiz = P. media
ERYNGIUM II 147 (589)
alpinum L. 150 (11)
amethystinum L. 149 (5), A 149
australe Wulf. et West = prec.
Barrelieri Boiss. 149 (6)
Billardieri Macch. (non Delar.) = campestre
Bocconi Lam. = tricuspidat.
cæruleum Gilib. (non M. B.) = planum
cærul. Lk. = ametistin.
campestre L. 148 (4), A 149
contractum Michel. (camp.) A 149 (4 c)
creticum Jan = triquetrum
creticum Lam. 148 (2)
crinitum Lojac. (non (Presl) = siculum
crinitum Paol. (amethyst.) 149 (5 b) = siculum, cfr. A 149
cyaneum S. et S. = creticum
dichotomum Desf. 149 (7)
dilatatum Bert., Guss. (non Lam.) = siculum
elegans Michel. (camp.) A 149 (4 d)
intermedium Gelmi (camp.) 148 (4 b)
latifolium Gilib. = planum
leucanthum St.-Lag. = Spina-alba
maritimum L. 148 (1)
multifidum S. et S. 149 (5 c)
orientale Mill. = seg.?
pallescens Mill. = amethyst.
planifolium Pall. = seg.
planum L. 149 (9)
pumilum Gilib = prec.
pusillum Gilib. = prec.
pusillum L. p. p. = Barrelieri
siculum Lojac., Ross (amethyst.) A 149 (5 b)
Spina-alba Vill. 149 (10)
syriacum Lam. = creticum
tenuifolium Boiss. (ameth.) = multifidum
tenuifol. Paolucci = prec.
tricuspidatum L. 148 (3)

Digitized by Google

ERYNGIUM II 147 (539)
trifidum L. = campestre
triquetrum Vahl 149 (8)
vulgare Lam. = campestre
ERYSIMUM I 424 (363)
ætnense Jord. = cheiranthoides
alliaceum Salisb. = Alliaria offic.
Alliaria L. = Alliaria offic.
alpestre Jord. = pumilum
alpinum Caruel (Cheiranthus) = lanceolat. et pumilum
alpinum Chenev. (*rhætic.*) A 90 (4 ε′ a)
alpinum Pers. (non Fr.) = pumilum
alpinum Roth = Arabis pauciflora
arcuatum Opiz = Barbarea arcuata
arvense Thore = Brassica monensis
aurantiacum Leyb 426 (4 ε b)
aurigeranum Jeaub. et Timb. = cheiranthoides
australe Caruel (Cheiranthus) = canescens
australe J. Gay = canescens
austriacum Roth = Conringia austriaca
Barbarea Forsk. = Nasturtium palustre
Barbarea L. = Barbarea vulg.
Baumgartenianum Schur = crepidifol.
Bocconi Pers. = canescens et ochroleucum
Bonannianum Presl A 90 (4 γ′)
brachyceratum Rchb. (Cheiranth.) = cheiriflor.
Brassica Crantz = Conringia oriental.
brachyoides Schrank = Braya alpina
campestre Scop. = Conringia oriental.
canescens Roth 426 (4 ζ)
carniolicum Dœll 425 (4 β b)
carniolicum Dollin. = pannonic.
carniolicum Schur = crepidifol.
cheiranthifolium Gilib. = lanceolat.
cheiranthoides Crantz = lanceolat.
cheiranthoides L. 425 (1), A 90
cheiranthoides Seb. et Maur. = canescens
Cheiranthus Baumg. = pannonic.
Cheiranthus Caruel = hieracifol. (var. γ δ ε ζ)
Cheiranthus Roth, Pers. = lanceolat.
Cheiri Crantz = Cheiranth. Cheiri
cheiriflorum Wallr. 425 (4 β c)
confertum Jord. 425 (4 α d)
confine Jord. = Bonannianum
cordifolium Pall. = Alliaria offic.
crassistylum Presl = canescens
crepidifolium Rchb. 425 (3)
ERYSIMUM I 424 (363)
curtisiliquum Rouy et Fouc. (pannonic.) = cheiriflor.
densisiliquum Jord. 425 (4 α c)
diffusum Ehrh. = canescens
dubium DC. A 90 (4 ε′ c)
Erucastrum Scop. = Brassica Eruc.
glabrum Presl = Brassica nigra
glastifolium Crantz = Arabis glabra
glaucum Mœnch = Conringia orient.
grandiflorum Caruel (hieracifol.) = pannonicum
grandiflorum Desf. = canescens
helveticum DC. 426 (4 ε)
Hesperis Scop. = lanceolat.
hieracifolium Jacq. = pannon.
hieracifolium L. 425 (4), A 90
hieracifol. Savi = cheiranthoides
integrifolium Ten. ex Steud. = quid?
juranum Gaud. (virgatum) = hieracifol. (α)
lanceolatum R. Br. 425 (4 γ)
lanceolatum Presl = Bonannianum
lanceolatum Rchb. = pannonic.
linearifolium Tausch = canescens
linifolium Arc. (non J. Gay) = canescens
longifolium DC. = canescens
longisiliquum Rouy et Fouc. (pannonic.) = pannonic. (a)
longisiliquum Schleich. 425 (4 α e)
lucidum Salisb. = Barbarea vulg.
lyratum Gilib. = Barbarea vulg.
lyrifolium Stokes = prec.
majus Guss. (lanceolat.) = seg.
majus Strobl (*Bonannian.*) A 90 (4 γ′ b)
medium Caruel (Cheiranthus) = helvetic. et rhætic.
minus Guss. (lanceolat.) = Bonannianum (a)
montanum Crantz = hieracifol.
murale DC. = lanceolat.
murale Lam. = Cheiranthus Cheiri
murale Sang. (non Desf.) = canescens
nebrodense Heldr. (lanceolat.) = Bonannianum (a)
ochroleucum β DC. = lanceolatum
odoratum Baumg. = crepidifol.
odoratum Bert. = hieracifol. (α)
odoratum Ehrh. = pannonicum
officinale L. = Sisymbr. offic.
orientale Mill. = Conringia or.
orientale β Bert. = Conringia austriaca?
orientale N. Terr. = Arabis pauciflora
pallens Wallr. = crepidifol.
pannonicum Crantz 425 (4 β)
parviflorum Pers. = cheiranthoides
ERYSIMUM I 424 (363)
perfoliatum Crantz = Conringia orient.
polyceratium Lk. = Sisymbr. polycerat.
præcox Sm. = Barbarea verna
pumilum Gaud. 425 (4 δ)
pyrenaicum Vill. = Sisymbr. austriac.
ramosissimum Crantz = seg.
repandum L. 425 (2)
rhæticum DC. 426, A 90 (4 ε′)
rigens Jord. = squarrosum
rigidum DC. = repandum
robustum D. Don = hieracifol.
runcinatum Gilib. = Sisymbr. offic.
Schleicheri Rouy (*hieracifol.*) 425 (4 α b)
segusianum Jord. = helveticum (for.)
siculum Heldr. = lanceolat.
silvaticum Ors. (non M. B.) = canescens?
silvestre Scop. = canescens
sinuatum Koch (odorat.) = pannonic.
squarrosum Jan = canescens (for.)
stœchadifolium Tausch = canescens
strictum DC. = pannonicum
strictum Gærtn. M. et S. = hieracifol. (α)
suffruticosum Lojac. (non Spr.) = canescens
tanacetifolium Clairv. = Sisymbr. tanac.
tenuifolium Clairv. = Diplotaxis tenuifol.
tenuifolium Stokes = Barbarea verna
Thalianum Kitt. = Arabis Thal.
turritum Lam. = lanceolat. et cheiranthoides
vernum Mill. = Barbarea verna
virgatum Roth = hieracifol. (α)
vulgare Rupr. = Sisymbr. offic.
Witmanni Zawadsk. = crepidifolium
ERYTHRÆA II 358 (711)
albiflora Goir. (*Centaur.*) A 165 (3 e)
albiflora Lge. (pulchella) = tenuifl. f. albifl.
albiflora Led. (*pulchella*) 359 (4 α c)
albiflora L. Vacc. (*tenuifl.*) 359 (4 β e)
arenaria Presl = tenuiflora
Boissieri Wk. = grandiflora
Carueliana A. Terr. = pulchella
Centaurium Pers. 358 (3), A 165
centauroides Schrad. = tenuiflora
compacta Moris (*Centaur.*) 358 (3 b)
conferta Steud. (non (Pers.) = tenuiflora
Gerardi Baumg. = pulchella
germanica Hoffgg. et Lk. = Centaur.
grandiflora Biv. 358 (3 c)

Digitized by Google

ERYTHRÆA II 358 (711)
inaperta Schlecht., W. = pulchella
intermedia Pollini = pulchella
latifolia Sm. = laxiflora?
laxiflora A. Terr. (*tenuifl.*) 359 (4 β b)
leptina Guss. = maritima?
longepedunculata Guss. (ramosiss.) = seg.
longepedunculata L. Vacc. (*tenuifl.*) 359 (4 β d)
lutea R. et S. = maritima
luteola Pers. = Cicendia pusilla
major Boiss. (non Hoffgg. et Lk.) = grandifl.
maritima Pers. 358 (1)
nana Heg. = pulchella
occidentalis R. et S. = marit.
pallens Freyn (*Centaur.*) 358 (3 d)
pseudo-spicata Goir. (*pulchella*) A 165 (4 α d)
pulchella Horn. 359 (4), A 165
pyrenaica Rich. = prec.
ramosissima Pers. 359 (4 α b)
sanguinea Mab. = quid?
spicata Pers. 358 (2)
subsimplex Moris (**Centaur.**) = seg.
subsimplex L. Vacc. (*tenuifl.*) 359 (4 β c)
tenuiflora Guss. = laxiflora
tenuiflora Hoffgg. et Lk. 359 (4 β)
variabilis Schur = pulchella
vulgaris S. F. Gray = Centaur.
ERYTHRONIUM I 179 (182)
Dens-canis L. 179, A 206
decoloratum Fiori (*Dens-can.*) A 206 (c)
longifolium Mill., Sweet A 206 (b)
maculatum DC. = seg.
maculosum Lam. = Dens-canis
ovatifolium Poir. = Dens-canis
ESCHENBACHIA = Erigeron
ambigua Moris = E. crispus
ESMARCHIA = Cerastium
cerastoides Rchb. = C. tetrandrum
ESULA = Euphorbia
ETHEIRANTHUS = Muscari
maritimus Kostel. = M. mar.
ETHULIA = Dichrocephala
paniculata Schk. = D. sonchifolia
EUCALYPTUS II 125 (521)
amygdalina Labill. 125 (3)
Globulus Labill. 125 (1)
robusta Sm. 125 (2)
EUCLIDIUM I 453 (387)
ægyptiacum Andrz. = Ochthodium ægypt.
syriacum R Br. 453
EUDIANTHE = Lychnis
Cæli-rosa Fenzl = L. Cæli-rosa
corsica Fenzl = L. cors.
læta Fenzl = L. læta
oculata A. Br. = L. aspera
parviflora Strobl (Cæli-rosa) = L. Cæli-rosa c. parvifl.
EUFRAGIA = Bartsia
atroviolacea Dur. = seg. (for.)
latifolia Griseb. = B. latifol.
viscosa Benth. = B. viscosa
EUONYMUS = Evonymus
EUPAREA = Anagallis
bractealis Baudo = A. tenella
EUPATORIUM III 203 (853)
albiflorum Goir. (*cann.*) 204 (α c)
cannabinum L. 203, A 180
corsicum Req. 204 (γ)
heterophyllum Goir. (*cannab.*) A 180 (α c)
indivisum DC. p. p., Neilr. (*cann.*) 204 (α b), A 180
indivisum DC. p. p (cann.) 204 (β b) = integrifol., cfr. A 180
indivisum DC. p. p. (cann.) = corsicum
integrifolium Fiori (*syriac.*) A 180 (β b)
partitum Neilr. (*cann.*) 204 (α a)
Soleirolii Lois. 204 (γ b)
syriacum Jacq. 204 (β), A 180
EUPHORBIA II 273 (648)
acuminata Lam. 282 (27 α c)
acuta L. (*exigua*) 283 (29 a)
affinis DC. = terracina
akenocarpa Guss. 280 (21), A 160
aleppica L. 283 (30), A 160
alexandrina Delil. = terracina
alpigena Kern. = dulcis
ambigua W. et K. = carniolica
amygdaloides Lam. = nicæensis
amygdaloides L. 289 (48), A 161
androsæmifolia Presl (non Schousb.) = nutans
angulata Jacq. 279 (16 β)
angustifolia Fiori (*Esula*) 288 (45 α b)
angustifolia Sweet. = Esula
Apios L. 278 (14)
Artaudiana DC. 284 (32 γ b)
arvensis Schleich. = falcata
Barrelieri Savi 287 (42), A 160
Baselicis Ten. = Barrelieri
bialata Lk. = pterococca
biglandulosa Desf. 286 (39)
biumbellata Poir. 285 (36)
Bivonæ Steud. 276 (11)
bonifacensis Req. 285 (37 β)
brachiata Jan = palustris
brachyadenia Boiss. (*spinosa*) 277 (12 c)
Brittingeri Opiz = verrucosa Lam.
Burmanniana J. Gay = thymifolia Burm.
cæspitosa Ten. = pinea
Cajogala Ehrh. = Gerardiana
canescens L. 275 (5 b)
Canuti Parl. 279 (17 δ)
carinthiaca Traunf. = pilosa
carnica Boiss. (saxatil.) = seg.
carnica Fiori (*Barrelieri*) 287 (42 β)
carniolica DC. = dulcis
carniolica Jacq. 278 (15)
cechica Opiz = villosa W. et K.
EUPHORBIA II 273 (648)
ceratocarpa Ten. 276 (10)
Chaixiana Timb. 289 (48 α c)
Chamæsyce L. 275 (5)
Chararias Host = veneta
Characias L. 289 (49), A 161
Coderiana DC. = platyphylla
communis Ces. (*variabil.*) A 161 (43 β a)
condensata Fisch. = aleppica
confusa Blume = humifusa
congesta W. = pinea
coralloides L. 280 (19)
cordata Schrank = dulcis
corsica Req. 286 (40 β)
coscinosperma Rchb. = pinea
cretica Mill. = Characias
crispata Horn. = pubescens
cuneifolia Guss. 280 (22), A 160
Cupani Guss. 285 (37 γ)
curtifolia Chaub. = Myrsinit.
cybirensis Boiss. 278 (nota)
Cyparissias L. 288 (44)
decussata Salisb. = Lathyris
Delorti Timb. = terracina
dendroides L. 285 (35)
denudata Bert. = glabrata
depressa C. Gay = Engelmanni
Deseglisei Bor. = angulata
diffusa Jacq. = retusa
divaricata Jacq. = dendroides
diversifolia Poir., W. = terrac.
dubia Dierb. = stricta
dulcis Bert. = Gasparrinii et verrucosa
dulcis L. 278 (16), A 160
Ehrenbergii Sweet = terrac.
elatior Fiori (*variabil.*) A 161 (43 β b)
Engelmanni Boiss. 274 (4), A 160
epithymoides Bert., March. = fragifera
epithymoides Jacq. = Jacquini
epithymoides L., Jacq. 277 (13), A 160
ericetorum Zumagl. = quid?
eriocarpa Bert. 289 (49 α b)
erosa Fiori (*variabil.*) A 161 (43 β d)
Esula L. 288 (45)
Esula M. B. = virgata
Esula Pollich = Gerardiana
Esula Ten. = esuloides
Esula Uoria = terracina
Esula β Bert. = angustifolia
esuloides DC. (*Cypariss.*) 287 (44 b)
esuloides Ten. = prec.
exigua L. 283 (29)
falcata L. 282 (27), A 160
flavescens Benth. (verruc.) = flavicoma
flavicoma DC. 278 (13 ζ)
fœtida Hpe. = stricta
fragifera Jan 277 (13 β)
fruticosa Biv. (non Forsk.) = Bivonæ
fruticosa b. Guss., Bert. = papillaris
Gasparrinii Boiss. 277 (13 γ)
Gayi Salis 287 (43), A 161
Gayi var. γ Salis = variabilis

Digitized by Google

EUPHORBIA II 273 (648)
Gerardiana Jacq. 286 (41 γ), A 160
Gibelliana Peola 279 (17 γ)
glaucescens W. = Gerardiana
Gmelini Steud. = virgata
glabra Ten. (verrucosa) = samnitica?
glabrata Ten. (*coralloides*) 280 (19 b)
Gussoneana Fiori (*amygdaloid*) A 161 (48 α d)
helioscopia L. 281 (24)
helioscopia b. Guss. = purpureocarpa
heterophylla Desf. (non L.) = terracina
hibernica Spr. = hyberna
humifusa W. 275 (6), A 160
humilior Guss. (*heliosc.*) 281 (24 b)
humilis Ces. (*variabilis*) A 161 (43 β c)
hyberna Auct. it. = insularis, Gibelliana et Canuti
hyberna L. 279 (17)
hyberna Viv. = insularis
hypericifolia Jan (non L.) = nutans
illyrica Lam. = pilosa
incompta Ces. = dulcis
inermis Boiss. (spinosa) = linifolia
insularis Auct. it. p. p. = Gibelliana
insularis Boiss. 279 (17 β)
intermedia Bréb. = Esula
involucrata Strobl (*dendroides*) 284 (35 b)
italica Lam. = seg.?
italica Tin. = terracina
Jacquini Fiori (*epithymoides*) 277 (13 α)
japygica Ten. 286 (41 β)
juncea Ait. = aleppica
Kerneri Huter = carnica
Kunzei Lehm. = Lagascæ
læta Ait. = dendroides
Lagascæ Spr. 284 (34)
lanuginosa Lam. = coralloides
lanuginosa Thuill. = subciliata
Lathyris L. 275 (8)
latifolia Moris (Pithyusa) = bonifacensis
latifolia Strobl (*exigua*) 283 (29 d)
lejosperma S. et S. = obliquata
ligustica Fiori (*spinosa*) 277 (12 b)
linariæfolia Desf. = terracina
linariæfol. Lam. = Gerardiana
linarioides Poir. = linifolia
linearifolia W. = linifolia
linifolia Jacq. 277 (nota)
linifolia Ten. = pinea
literata Jacq. 281 (23 α c)
litoralis Noë = pinea
longebracteata Lec. et Lam. (*Cypariss.*) 288 (44 c)
longeradiata Goir. (*carniol.*) 278 (15 b)
longibracteata DC. = segetalis
luganensis Born. (*amygdal.*) 289 (48 α b)

EUPHORBIA II 273 (648)
lugubris Chab. A 160
luxurians Bert. (Cyparissias) = biumbellata
maculata L. mant = nutans
maculata L. sp. 274 (2), A 160
maculata Parl. (*Chamæsyce*) 275 (5 c)
major Boiss. (Cypariss.) = esuloides
major Guss. (*falcata*) 282 (27 α b)
Martinsiana Steud. = Lagascæ
massiliensis DC. = Chamæsyce
melapetala Gasp. 289 (49 γ), A 161
melitensis Parl. 277 (11 γ)
micrantha Steph. 281 (23 b)
minor Gaud. (platyphylla) = stricta
minor Koch (falcata) = acuminata
minor W. (Peplus) = peploides
mollis C. C. Gmel. = pilosa
monstruosa Parl. (Cypariss.) = longebracteata
montana Rchb. (*virgata*) 288 (46 β)
montana Salis (*Gai*) 287 (43 α b)
mucronata Evers (*falcata*) A 160 (27 e)
mucronata Lam. = falcata
mucronata Lap. = Pithyusa
multicaulis Thuill. = nicæens.
muricata Sm. = akenocarpa
muscosa Ten. = ceratocarpa
Myrsinites Brot. = nicæensis
Myrsinites L. 286 (40), A 160
neapolitana Ten. = terracina
nemoralis Salisb. = amygdaloid.
nicæensis All. 286 (41 α)
nicæensis Seb. et Maur. = terracina
nicæensis var. β Bert. = Cupani
nicæensis var. δ Bert. = Barrelieri
nutans Lag. 274 (1)
obliquata Forsk. 284 (33 β)
obscura Lang = virgata
obscura Lois. = acuminata
obtusifolia Lam. = terracina
oleæfolia Gouan = nicæensis
oleracea Pers. = Peplus
opaca Lang = virgata
orientalis Bert. = ceratocarpa
orientalis L. 276 (10 nota)
ovalifolia Fiori (*Pithyusa*) 285 (37 α b)
palustris L. 276 (9)
paniculata Lois. (non Desf.) = pilosa
paniculata Ten. = platyphylla
papillaris Jan 276 (11 β)
Paralias L. 286 (38)
Peplis L. 275 (7)
peploides Gouan 282 (26 β)
Peplus L. 282 (26)
perforata Guss. = prostrata
perramosa Borb. A 160
pilosa All. et Auct. = pubesc.

EUPHORBIA II 273 (648)
pilosa Guss. (Chamæsice) = canescens
pilosa L. 279 (18), A 160
pilosa Parl. (platyphylla) = subciliata
pilosa Vill. = flavicoma
pilulifera L. 289 (nota)
pinea All. = aleppica
pinea L. 284 (32 γ), A 160
pinea var c. Guss. = virescens
pinifolia W. = aleppica
Pithyusa L. 285 (37)
platyphylla L. 281 (23)
polygonifolia Forsk. = Peplis
polygonifolia Jacq. (non L.) = maculata
polygonisperma Gr. et Godr. = humifusa
portlandica L. 283 (32 β)
Preslii Guss. = nutans
procera Gr. et Godr. (Pithyusa) = bonifacensis
procera M. B. = pilosa
prostrata Ait. 274 (3)
prostrata Boiss. (terracina) = obliquata
provincialis W. = terracina
pterococca Brot. 282 (25)
pubescens Vahl 280 (20), A 160
pubigera Friv. = Apios
pungens Lam. = spinosa
purpureocarpa Strobl (*heliosc.*) 281 (24 c)
purpurata Thuill. 278 (16 α b)
racemosa Tausch = Esula
ragusana Rchb. = pinea
ramosissima Lois. = terracina
refracta Lowe = nutans
retusa Cav. = seg.
retusa L. (*exigua*) 283 (29 b)
rigens Sweet = linifolia
rigida Lois. = corsica
rigida M. B. = biglandulosa
rigida Ten. = biglandulosa et Myrsinites
rigidula Steud. = linifolia
riparia Jord. = Esula
rotundifolia Lois. = peploides
rubra Cav. 282 (27 α d)
rubra DC. = retusa
samnitica Fiori (*epithymoides*) 277 (13 δ)
Sarati Ardoino 288 (45 γ)
saxatilis Auct. it. = carnica
saxatilis Jacq. 287 (nota)
saxatilis Lois. = Gerardiana
segetalis L. 283 (32), A 160
segetalis var. γ DC. = biumbellata
Seguieri All. = Gerardiana
Seguieriana Neck. 286 (41), A 160
semiperfoliata Viv. 289 (48 β)
serotina Host = nicæensis
serrata L. 288 (47), A 161
serrulata Thuill. = stricta
seticornis Poir. = terracina
silvatica Guss. = Gussoneana
silvatica L. = amygdaloides
simplex C. Koch = segetalis
solisequa Rchb. = dulcis
spartioides Jacq. = Cupani

Digitized by Google

EUPHORBIA II 273 (648)
sphærococca Salzm. = akenocarpa
spinosa L. 277 (12)
spinosa Viv. = Bivonæ
spinosa var. A Desf. = Bivonæ
spongiosa Led. = Lathyris
stellulata Lois. = cuneifolia
stellulata Salzm. = pterococca
stricta L. 281 (23 β)
stricta Ten., Guss. = platyphylla
subciliata Pers. 281 (23 α b)
subdeltoidea Genn. (*terracina*) 284 (33 α b)
subglabra Gr. et Godr. (*pubescens*) 280 (20 b)
suffruticulosa Lec. et Lam. = flavicoma
sulcata De Lens 283 (28)
supina Raf. = maculata
tanaicensis Guss. = Cupani
taurinensis All. 283 (31)
terracina Lag., Rchb. = Lagascæ
terracina L. 284 (33)
terracina Rchb. = taurinens.
thymifolia Auct. it. = maculata
thymifolia Burm. 274 (nota)
tiphatina N. Terr. = seg
tiphatina N. Terr. (*Gerardiana*) A 160 (41 γ b)
Tommasiniana Bert. = montana
trichocarpa Koch (procera) = coralloides
trichogona Bert. = prostrata
tricuspidata Lap. 283 (29 c)
trigonocarpa Fisch. = pilosa
trinervis Bert. = nutans
tristis Bess. = Esula
Triumfetti Bert. 288 (45 β)
undulata W. (non M. B.) = pubescens
valentina Ortega = terracina
Valliniana Belli A 160
variabilis Ces 287 (43 β), A 161
velutina Boiss. (*verruc.*) 278 (13 ε b)
veneta Ten = Characias (α)
veneta W. 289 (49 β)
vernalis Fiori (*falcata*) 282 (27 β)
verrucosa Bert. = akenocarpa
verrucosa Delicata = melitensis
verrucosa Guss. = Gasparrinii
verrucosa Lam. 278 (13 (ε), A 160
verrucosa L. sp. 278 (nota)
villosa Fiori (*flavicoma*) 278 (13 ζ b)
villosa W. et K. 279 (18 b)
virescens Fiori (*pinea*) 284 (32 γ c)
virgata W. et K. 288 (46)
viridicarpa Strobl (heliosc.) = helioscopia (a)
Wulfenii Hpe. = veneta
EUPHRAGIA = Eufragia
EUPHRASIA II 448 (765)
alpina Lam. 452 (4), A 170
alpino × minima = Christii ?
EUPHRASIA II 448 (765)
arguta Kern. (non R. Br.) = Kerneri
Biancæ Guss = Odontit. Biancæ
Bicknellii Wettst. 451 (3 δ b)
Bocconei Guss. = Odontit. Bocc.
brevipila Burn. et Gremli 452 (3 ι), A 170
cærulescens Favr. (*salisb.*) 450 (1 α g)
calvescens Chab. (*alpina*) A 170 (4 var.)
Christii Favr. (*alpina*) 452 (4 α b)
corsica Lois. = Odontit. cors.
cuspidata Host 450 (2 β), A 170
divergens Jord. = Odontit. diverg.
drosocalyx Fr. 452 (3 η c), A 170
eglandulosa Chab. (*hirtella*) A 215 (3 θ for.)
gracilis Fr. 452 (3 ζ), A 170
Freynii Wettst. A 170
hirtella Jord. 452 (3 θ), A 170, 215
hispidula Favr. (*min.*) 452 (3 η b)
hybrida Wettst. A 170
illyrica Wettst. 450 (1 β)
integrifolia Vis. et Sacc. (tricuspid.) = tricusp. (α)
italica Wettst. 450 (2 γ)
Kerneri Wettst. 453 (4 γ), A 170
Kochii F. Schultz = Odontit. Kochii
lanceolata Gaud. = Odont. lanc.
latifolia L. = Bartsia latif.
liburnica Wettst. 451 (3 γ)
linifolia L. = Odontit. linif.
linifolia Pollini = tricuspid (α)
lutea L. = Odont. lut.
macrodonta Gremli (*salisb.*). 449 (1 α f)
majalis Jord. = officin. (α)
Marchesettii Wettst. 450 (1 δ), A 170
minima Jacq., Lam. 452 (3 η), A 170
min. × hirtella Wettst. = Freynii
minor Moris (lutea) = Odontit. — minor
minuta Beck (*Rostkov.*) A 170 (4 δ c)
minuta Gremli (*salisb.*) 449 (1 α e)
montana Jord. 453 (4 δ b), A 170
nana Gremli (*salisb.*) 449 (1 α d)
nemorosa Pers. 451 (3 ε), A 170
Odontites L. = Odont. serotina
Odontit. β L. = Odont ser. (α)
officinalis L. 451 (3), A 170, 215
parviflora Bunouf, Fouc. (nemorosa) = salisburg. A 170
parviflora Soy-Willm. (*nemorosa*) A 170 (3 ε b)
EUPHRASIA II 448 (765)
pectinata Ten. 451 (3 α)
picta Wimm. 453 (4 β)
Portæ Wettst. 450 (1 γ)
pratensis Fr. = Rostkoviana
procera Gren. (*salisb.*) 449 (1 α b)
puberula Jord. 451 (3 α b)
pulchella A. Kern. 452 (3 η d)
pumila A. Kern. A 170 (3 var.)
rigidifolia Biv. = Odontit. rigidifol.
rigidula Jord. A 170 (3 ζ for.)
Rostkoviana Hayne 453 (4 δ), A 170
Rostkoviana × stricta Wettst. = hybrida
salisburgensis Funck 449 (1), A 170
Schleicheri Wettst. (*min.*) 452 (3 η a)
serotina Koch = Odontit. Kochii
serotina Lam. = Odontit. ser.
sicula Guss. (serot.) = Odontit. sicula
speciosa Kern. (non R. Br.) = Kerneri
stricta Host 451 (3 β), A 170
subalpina Gren. (*salisb.*) 449 (1 α c)
tatarica Fisch. 451 (3 δ), A 215
tenuis Brenn. (offic.) = tenuis Wettst.
tenuis Posp. (*ital.*) 450 (2 γ b)
tenuis Wettst. A 170 (3 ι b)
Towsendiana Freyn = offic. (α)
transiens Borb. (*illyr.*) 450 (1 β b)
tricuspidata L. 450 (2), A 170
tricusp. × Kerneri Wettst. = vestinensis
verna Bell. = Odontit. verna
versicolor A. Kern. A 170 (3 var.)
versicolor Halácsy et Br. = picta
vestinensis Wettst. A 170
viscosa L. = Odontit. visc.
EUPTERIS = Pteris
aquilina Newm. = Pt. aquil.
EUTHALIS = Arenaria
serpyllifolia Rupr. = A. serpyll.
EUXOLUS = Amarantus
Blitum Gren. = A. ascendens
caudatus Moq. = A. ascendens
crassipes Hieron. = A. polygonoides
crispus Lesp. et Thév. = A. crispus
deflexus Raf. = A. defl.
emarginatus A. Br. et Bouchè = A. ascendens
viridis Moq. = A. ascendens
EUXOMUM = Eruca
sativum Lk. = E. sat.
EVACOPSIS = Evax
discolor Pomel = E. discol.
exigua Pomel = E. exigua
Heldreichii Pomel = E. Heldr.
polycephala Pomel = E. exigua

Digitized by Google

EVALLARIA = Polygonatum
bifolia Neck. = Majanthem. bifol.
polygonata Neck. = P. officin.
verticillata Neck. = P. vertic.
EVAX III 272 (879)
ambigua Fiori (*pygmæa*) 272 (1 α b)
asteriscifiora Pers. 272 (1 β)
bicolor Lojac. (Heldreichii) = discolor
carpetana Lge. A 185
discolor DC. 273 (3)
exigua DC. p. p. 273 (4), A 185
Heldreichii Parl. 273 (3 b)
longibracteata Lojac. (*exigua*) A 185 (4 var.)
mucronulata Pomel (*pygm.*) A 185 (1 var.)
pygmæa Pers. 272 (1), A 185
rotundata Moris 273 (2)
tenuifolia Guss. = Filago Gussonei
umbellata Gærtn. = pygmæa
EVONYMUS II 219 (616)
angustifolius Gilib. 219 (2 b)
europæus L. 219 (2), A 155
floribundus Stev. = multiflorus
grandifolius Rouy (*latifol.*) A 155 (4 a)
intermedius Gaud. (europ.) = macrophyllus
japonicus L. f., Thunb. 219 (1)
latifolius L. (europ.) = seg.
latifolius Mill. 219 (4), A 155
leprosus L. f. (europ.) = verrucosus
leucocarpus DC. (*europ.*) 219 (2 d)
macrophyllus Schleich. (*europ.*) 219 (2 c)
multiflorus Opiz A 155 (2 e)
parvifolius Rouy (*latifol.*) A 155 (4 b)
quadrigonus Gueld. = europ.
tenuifolius L. (europ.) = europ. (α)
verrucosus Scop. 219 (3), A 155
vulgaris Mill. = europæus
EXACULUM = Cicendia
pusillum Caruel = C. pus.
EXACUM = Cicendia
Candollei Bast. = C. pusilla
filiforme W. = C. filif.
pusillum DC. = C. pus.
EYRYTHALIA = Gentiana
Amarella Borckh. = G. Amar.
campestris Borckh. = G. camp.
carinthiaca Bercht. et Presl = Pleurogyne carinth.
germanica Schrank = G. germ.
glacialis Bercht. et Presl = G. glac.
nana Borckh. = G. nana
obtusifolia Bercht. et Presl = G. obtus.
tenella Buek = G. tenella

FABA = Vicia
angustifolia Bernh. = V. ang.
Bona Medic. = V. narbon.
FABA = Vicia
equina Bluff. et Fing. (vulg.) = V. equina
narbonensis Schur = V. narbon.
sativa Bernh. = V. sativa
sepium Bernh. = V. sepium
serratifolia Fuss. = V. serrat.
vulgaris Mœnch = V. Faba
FABAGO = Zygophyllum
alata Mœnch = Z. Fabago
major Sweet = prec.
FABERA = Hypochæris
cretensis Sch. Bip. = H. creten.
hispida Sch. Bip. = H. hispida
FACCHINIA = Alsine
lanceolata Rchb. = A. lanceol.
FAGONIA II 252 (630)
cretica L. 252
FAGOPYRUM = Polygonum
carinatum Mœnch = P. Convolvulus
cereale Raf. = P. Fagopyr.
dentatum Mœnch = P. tataricum
dumetorum Schreb. = P. dumetorum
emarginatum Mœnch = P. Fagopyr.
esculentum Mœnch = P. Fagopyr.
membranaceum Mœnch = P. dumetor.
rotundatum Bab. = P. tataricum
sagittatum Gilib. = P. Fagopyr.
sarracenicum Dum. = prec.
subdentatum Gilib. = seg.
tataricum Gærtn. = P. tatar.
volubile Gilib. = P. Convolvulus
vulgare T. Nees = P. Fagopyr.
FAGUS I 271 (257)
angustifolia Ugolini (*silv.*) A 61 (c)
Castanea L. = Castanea sativa
colorata DC. (silv.) = purpurea
cuprea Lodd. = purpurea
echinata Gilib. = silvat.
hepatica Ambrosi (silv.) = purpurea
purpurea Ait. (*silv.*) A 60 (b)
purpurea Dum.-Cours. = prec.
sanguinea Rchb. (silv.) = purpurea
silvatica L. 271
silvestris Gærtn. = prec.
FALCARIA II 165 (555)
latifolia Koch 165 (2)
pastinacæfolia Rchb. f. = latifolia
Rivini Host = vulgaris
saxifraga Rchb. f. 165 (1)
sioides Asch. = vulgaris
vulgaris Bernh. 165 (3)
FALCATULA = Trifolium
falsotrifolium Brot. = T. ornithopodioides
monspeliaca Fourr. = Trigonella monsp.
FARFARA = Tussilago
radiata Gilib. = T. Farfara
FARSETIA = Fibigia
cheiranthifolia Desv. = seg.
FARSETIA = Fibigia
clypeata R. Br. = F. clypeata
Columnæ Ces. P. et G. = Aubrietia Column.
deltoidea R. Br. = Aubrietia delt.
incana R. Br. = Alyssum incan.
italica Ces. P. et G. = Aubrietia delt.
mutabilis R. Br. = Alyssum mut.
obliqua Spr. = Alyssum obliq.
sinuata Roth = Alyssum sin.
FASCICULUS = Spergularia
ruber Dulac = S. rubra
FAVRATIA = Campanula
Zoysii Feer. = C. Zoysii
FEDIA III 140 (881)
albiflora Strobl (*Cornuc.*) 140 (b)
Auricula M. et K. = Valerianella Auric.
brachystephana Ten. = Valer. brach.
cærulea Aikin = Val. olitor.
campanulata Steud., Presl = Val. eriocarpa
carinata Stev. = Val. carin.
Cornucopiæ Gærtn. 140
coronata Gærtn. = Val. discoid.
coronata Vahl = Val. cor.
costata Stev. = Val. cost.
dasycarpa Rchb. (dent.) = seg.
dasycarpa Stev. = Val. dent. b. dasyc.
dentata Mirb. = Val. dent.
discoidea Mirb., Vahl = Val. disc.
ecalyculata Stokes = Val. olitor.
echinata Mirb., Vahl = Val. echin.
eriocarpa R. et S., Horn. = Val. erioc.
eriocarpa Stev. = Val. truncata
gibbosa Guss. = Val. costata
græca Dufr. = seg.
incrassata Mœnch = Cornucop.
hamata R. et S. = Val. coronata
lasiocarpa Rchb. (Locusta) = Val. olit. b. lasioc.
laxiflora R. et S. = Val. rimosa
leiosperma Wallr. (dentata) = Val. dent. a. leiosp.
Locusta Rchb. = Val. olitoria
microcarpa Guss. = Val. micr.
microcarpa Rchb. = Val. dentata
mixta Vahl = prec.
Morisonii Spr., DC. = Val. dentata
olitoria Gærtn. = Val. rimosa
olitoria Vahl, Gmel. = Val. olit.
paniculata Colla = prec.
puberula Bert. = Val. puber.
quadrangularis W. = Val. carinata
rugulosa Spr. = Val. eriocarpa
scorpioides Dufr. = Cornucop.
sicula Guss. = Val. discoidea
striata Stev. = Val. olitor.
tridentata Rchb. = Val. rimosa
truncata Rchb. = Val. trunc.
vesicaria Vahl = Val. vesic.

Digitized by Google

FERRUM-EQUINUM = Hippocrepis
multiflorum Mœnch = seg.
multisiliquosum Medic. = H. multisil.
uniflorum Mœnch = seg.
unisiliquosum Medic. = H. unisil.
FERULA II 175 (578)
austriaca Spr. = Peuced. austr.
Barrelieri Ten. = silvatica
brevifolia Hoffgg. et Lk. = nodiflora
communis L. 176 (1), A 152
Ferulago L. 176 (8), A 152
galbanifera Mill. = Ferulago
geniculata Guss. = nodosa
glauca DC. = nodiflora
glauca L. 176 (1 δ). A 152
hispida Friv. = Pastinaca hisp.
Lobeliana Vis. = communis
monspeliensis Gr. et Godr. (nodiflora) = nodiflora
montana Spr. = Peuced. mont.
neapolitana Ten. 176 (1 γ)
nodiflora Jacq. et Auct. plur. = Ferulago
nodiflora L. 176 (1 β)
nodifl. α Bert. = commun.
nodifl. β Bert. = nodiflora
nodifl. S. et S. = communis (α)
nodosa Jacks. 176 (2)
nudicaulis Spr. (non Nutt.) = Bonannia resinosa
Opopanax Spr. = Pastinaca Opopan.
rablensis Wulf. = Peuced. rablense
rigida Ten. = nodosa
silvatica Bess. 176 (4)
sulcata Bert., Arc. (non Desf.) = Ferulago
tingitana Scop. (non L.) = glauca
FERULAGO = Ferula
Dodonæi Kostel. = seg.
galbanifera Koch = F. Ferulago
geniculata Guss. = F. nodosa
nodiflora M. et K. = F. Ferulago
nodosa Boiss. = F. nodosa
silvatica Rchb. = F. silvat.
FESTUCA I 89 (115)
acuminata Gaud. 93, A 28 (7 γ b)
adscendens Retz = elatior × Lolium perenne
ætnensis Presl = Poa ætn.
ætnensis Richter = Vulpia ætn.
airoides Lam. = Poa nemoralis (for.?)
Alopecuros Schousb. = Vulpia Alop.
alopecuroides Savi = Vulpia Alopecuros
alopecuroides Ten. = Vulpia ciliata
alpestris Gr. et Godr. p. p. (duriusc.) = supina
alpestris R. et S. A 28 (7 δ)
alpestris Wulf. = nigrescens
alpina Gr. et Godr. (heterophylla) = nigricans
FESTUCA I 89 (115)
alpina Host = alpestris
alpina Neilr. (ovina) = rupicaprina
alpina Parl. (*rubra*) A 26 (1 α b subf.)
alpina Suter 91, A 26 (1 ρ)
alpina Wimm. (duriusc.) = supina
altissima All. 94 (12), A 29
ambigua Guss. (bromoid.) = Vulpia — ambig.
amethystea Pourr. = nigrescens
amethystina Host, Schrad. (non L.) = vaginata
amethyst. Koch (ovina) = vaginata
angustiflora Hack. (*pseudovina*) A 25 (1 θ b)
apennina DNtrs. 92, A 27 (4 γ)
arduenna Dum. = pallens
argentea Savi = Sesleria argent.
aristata Koch (Lachenalii) = Nardurus — festucoides
aristata Koch (tenuiflora) = Nardurus marit. (a)
articulata DNtrs. = pratensis
arundinacea Schreb. 92, A 27 (4 δ)
ascendens Asch. (elatior) = subspicata
aspera M. et K. = Bromus ramosus
atrorubens Wulf. = pulchella
attenuata Parl. = Vulpia atten.
aurata Gaud. 91, A 27 (2 ζ d)
aurea Hack. (spadicea) A 28 = seg.
aurea Lam. A 28 (5 a)
australis Schur = apennina
balearica Guatt. A 27 (2 ε e)
barbata Brot. = Vulpia Alopecur.
barbata Gaud. = Vulpia — Gaudiniana
barbata Hack. (*fallax*) A 26 (2 δ e)
barbata Schrank. A 26 (2 α e)
barbulata Hack. (sulcata) = rupicola
Barrelieri Ten. = Brachyp. Barrel.
bergomensis Rota A 26 (?)
biuncialis Koch (tenuiflora) = Nardurus — biunc.
Borreri Bab. = Glyceria Borreri
brachystachys Hack. (*varia*) A 28 (7 γ d)
brachystachys Richt. = prec.
breunia Facch. = Poa — breunia
brevifolia Belli (capillata) = capillata for.
breviseta Belli (*duriusc.*) A 25 (1 δ i)
brizoides Wulf. = alpestris
bromoides L. = Vulpia uniglumis et dertonensis
bromoides Savi = Vulpia myurus
bromoides Sm. = Vulpia dertonensis
FESTUCA I 89 (115)
Broteri Nym. = Vulpia Brot.
bulbosa Biv. = cærulescens
cærulea DC. = Melinia cær.
cærulescens Desf. 92 (6), A 28
cæspitosa Desf. = Brachyp. ramos.
cæspitosa Hack. (rubra) = fallax
calabrica Huter P. et R. 93, A 28 (10 γ)
calamaria Sm. = altissima
calycina L. = Schismus calyc.
campana Hack. (*levis*) A 25 (1 λ d)
campana N. Terr. (duriusc.) = prec.
canescens Host = laxa
canescens Rchb. Ic. = saxatilis
capillaris Wulf. = alpina
capillata Lam. A 24 (1 α)
capitata Balb. = Poa capitata
carnica Hack. (*violacea*) A 27 (2 ζ c)
carniolica Hack. (*spectabilis*) A 28 (10 α c)
carniolica Richt. = prec.
cenisia Hack. (*varia*) A 28 (7 γ f)
cenisia Richt. = prec.
cernua Schult. = pulchella
ciliata Asch. et Græbn. (genicul.) = Vulpia genic. b. cil.
ciliata Danth. in DC. = Vulpia cil.
ciliata Gouan = Brachyp. distachyum
ciliata Lk. = Vulpia Alopecurus
ciliata N. Terr. (duriusc.) = duriusc. c. villosa
ciliolata Hack. (*crassifol.*) A 25 (1 δ g for.)
cinerea Vill. 90, A 25 (1 ε b)
clavata Mœnch = Vulpia genicul.
coarctata Posp. (non Hack.) (spectab.) = croatica
coleotricha Belli (*fallax*) A 27 (2 δ g)
commutata Gaud. (rubra) = fallax
compressa DC. = spadicea
convoluta Kth. = Glyceria convol.
corsica Hack. (*Fenax*) A 27 (4 ε b)
crassifolia Gaud. (glauca) = seg.
crassifolia Hack. (*duriusc.*) A 25 (1 δ g)
crassifolia Koch (varia) = Eskia
Crinum-Ursi Ram. = Eskia
cristata L. = Kœleria phleoides
croatica Hack. (spect. v. affinis) = seg.
croatica Kern. A 28 (10 β)
curvula Gaud. A 24 (1 δ a subf.)
curvula Gaud. (duriusc.) = prec.
dactyloides S. et S. = Dactylis — Sibthorpii
Danthonii Asch. et Græbn. = Vulpia ciliata
decidua Sm. = altissima
decipiens Clairv. = Halleri

Digitized by Google

FESTUCA I 89 (115)
decumbens L. = Triodia dec.
depauperata Bert. = Poa — depaup.
dertonensis Asch. et Græbn. = Vulpia derton.
dimorpha Guss. 93 (8), A 28
distachya Kœl. = Brachyp. dist.
distans Kth. = Glyceria dist.
divaricata Desf. = Sclerochloa divar.
diversifolia Gaud. (rubra) = megastachys
dolichophylla Asch. et Græbn. (duriusc.) = longifolia Viv.
Donacella Wallr. (glauca) = pallens
drepanensis Ponzo (*elatior*) A 27 (4 α c)
drymeia M. et K. = montana
dumetorum Fiori (rubra) 91 (2 α g) = seg., cfr. A 26
dumetorum Gaud. (rubra) = barbata Schrank
dumetorum Heg. et Heer. = fallax
dumetorum L. A 26 (nota)
dura Host 91, A 26 (1 η)
dura Vill. = Sclerochloa dura
duriuscula Gaud. (rubra) = rubra d. juncea
duriusc. Guss. = levis
duriusc. var. b. Guss. = gracilis Hack.
duriuscula Host = sulcata
duriuscula L. 90, A 24 (1 δ)
duriusc. γ Bert. = duriusc. c. villosa
duriusc. δ Bert. = capillata
duriusc. ε Bert. = vivipara
duriusc. κ Bert. = ovina β vulgaris
duriusc. Schrad. = heterophylla
elatior L. 92 (4), A 27
elatior β L. = arundinacea
elatior Ucria = Ampelodesma tenax
elat. × *Lolium perenne F. Schultz* 104
elongata Ehrh. = elatior × Lolium perenne
elongata Guss. (ciliata) = Vulpia — elong.
erecta Wallr. = Bromus erecta
Eskia Le. = pallens
Eskia Ram. A 28 (7 ζ)
exaltata Presl A 29 (11 b)
expansa Kth. = Sphenopus divaricatus
fallax Thuill. 91, A 26 (2 δ)
fasciculata Forsk. = Vulpia uniglumis
fasciculata Sonder (*arundin.*) A 27 (4 δ f)
Fenax Lag. 92, A 27 (4 ε)
ferruginea Rchb. = spadicea (a)
fibrosa Griseb. A 28 (5 b)
filiformis Pourr. = Psilurus aristat.
firmior Belli et Hack. (*flavescens*) A 28 (7 ε c)
firmula Hack. (ovina v. vulg.) = Lemani

FESTUCA I 89 (115)
flaccida Belli (*duriusc.*) A 25 (1 δ h)
flaccida Schur A 27 (2 ζ e)
flavescens Asch. et Græbn. (pumila) = lutea
flavescens Bell. 93, A 28 (7 ε)
flavescens α Bert. = dimorpha
flavescens Gaud. = acuminata
flavescens Koch (varia) = alpestris et flavescens
flavescens Rchb. Ic. = alpestris
fluitans L. = Glyceria fluit.
fusca Mut. =varia (a)
fusca Vill. (non L.) = spadicea (a)
Gaudini Kth. = Halleri
Gaudiniana Guss. = Vulpia — Gaudin.
geniculata W. = Vulpia genic.
genuensis Pollini = Brachyp. gen.
gigantea Vill. 92 (3), A 27
glauca Griseb. (ovina) = sulcata
glauca Lam. 90, A 25 (1 ε)
glauca Schrad = pallens
glaucantha Hack. (*sulcata*) A 25 (1 ι e)
glaucescens Asch. et Graeb. (rigida) = Sclerochloa — glauc.
glaucescens Boiss. (arund.) = Fenax
glaucescens Hack. (*fallax*) A 26 (2 δ b)
glaucescens Hack. et Belli (*pedemontana*) A 26 (1 o b)
glaucescens Heg. et Heer. 91 A 26 (2 α c)
glomerata All. = Dactylis glom.
gracilior Hack. (*duriusc.* α) A 24 (1 δ b)
gracilis Hack. (*levis*) A 25 (1 λ c)
gracilis Kth. = Nardurus Halleri
gracilis Mœnch = Brachyp. silvat.
græca Hack. (*varia*) A 28 (7 γ c)
grandiflora Hack. (rubra) = megastachys
Halleri All. 91, A 26, 204 (1 ξ)
Halleri Koch = alpina
Halleri Pucc. = Puccinellii
hemipoa Del. = Sclerochloa hem.
heteromalla Pourr. = pratensis
heterophylla Lam. 91, A 27 (2 ε)
hirsuta DC. = Kœleria hirs.
hirsuta Host A 25 (1 ι c)
hirta Seenus = Bromus erectus
hispanica Kth. = Nardurus — hisp.
hispida Hack. (*sulcata*) A 25 (1 ι d)
hispida Savi = Kœleria hisp.
hispidula Asch. et Græbn. (ligustica) = Vulpia hispid.
hispidula Hack (ovina v. vulg.) = ov. β b pubescens Parl.
Hostii Kth. = Glyceria festucæfor.

FESTUCA I 89 (115)
hybrida Brot. = Vulpia Broteri
incrassata Bert. = Vulpia tenuis
incrassata Salzm. = Vulpia incrass.
inermis DC. = Bromus iner.
inops DNtrs. A 25 (1 ε d)
intermedia R. et S., Ten. = duriuscula
intermedia Stebl. et Schr. (*Halleri*) A 204 (1 ξ for.)
interrupta Asch. et Græbn. (*spadicea*) A 28 (5 c)
interrupta Gr. et Godr. (non Desf.) = Fenax
juncea Belli (*fallax*) A 27 (2 δ f)
juncea Hack., Gremli (*rubra*) 91, A 26 (2 α d)
juncea Mœnch = Agropyr. junceum
jurana Gren. = Scheuchzeriformis
Kitaibeliana Schult. = barbata
Lachenalii Spenn. = Nardurus Halleri
lanceolata Forsk. = Sclerochloa marit.
latifolia Host = altissima
laxa Host A 28 (7 bis)
lejophylla Hack. (*heterophylla*) A 27 (2 ε b)
Lemani Bast. A 24 (1 β d)
levifolia Hack. (*ovina v. vulg.*) A 24 (1 β c)
levigata Clairv. A 25 (1 δ g subf.)
levigata Gaud. (duriusc.) = prec.
levis Hack. (1881) 91, A 25 (1 λ)
levis Hack. (1882) (ovina) = prec.
Leysseri Mœnch = Bromus inermis
ligustica Bert. = Vulpia ligust.
linearis Gilib. = Vulpia myurus
Linnæana Steud. = Vulpia uniglumis
litoralis S. et S. = Æluropus litor.
litorea Wahlenb. = arundinacea
loliacea Asch. (marit.) = Sclerochloa mar. b. lol.
loliac. Asch. et Græbn. (lanceolata = prec.
loliacea Curt. (non Huds.) = elatior × Lolium perenne
Longana Hack. et Belli (*rubra*) A 27 (2 ι)
longearistata Hack. (*duriusc.*) A 24 (1 δ a subf.)
longifolia Hack. (crassifol.) = longifolia Viv.
longifolia Heg. = rubra (α a)
longifol. Parl. (duriusc.) = longifolia Viv.
longifolia Thuill. = duriuscula (a for.)
longifolia Viv. A 25 (1 δ g subf.)
longiglumis Hack. (*Fenax*) A 28 (4 ε d)

Digitized by Google

FESTUCA I 89 (115)
longiseta Heg. et Heer. = heterophylla
lubrica Lap. = Eskia
lutea Ser., Gremli (pumila) 93 (7 α b), A 28
macrantha Richter (rubra) = megastachys Gaud.
macrathera Hack. (violacea) A 204 (2 ζ for.)
madritensis Desf. = Bromus madr.
major Hagenb. (glauca) = pallens
maritima DC. = Sclerochloa mar.
maritima L. = Nardurus mar.
maritima Nym. (an C. Koch?) = Glyceria mar.
maxima Jessen = Bromus villosus
mediterranea Hack. (arundin.) A 27 (4 δ e)
megaphylla Schur = rupicola
megastachys Gaud. (rubra) 91, A 26 (2 α b)
megastachys Heg. et Heer. = multiflora
Michelii Kth. = Avellinia Mich.
microstachya Batt. et Trab. (sciuroid.) = Vulpia Broteri
minor Hack. (violac.) = carnica
minor Neilr. (varia) = pumila (α a)
minor Schur = varia (a)
monostachya Poir. = Brachyp. monost.
montana M. B. 94 (11), A 28
montana Savi = Bromus erectus
montana Sternb. et Hpe. = Poa hybrida
Morisiana Parl. 91, A 26 (1 σ)
multiflora Hoffm. A 26 (2 β)
multiflora Presl 92 (4 α b) = pluriflora, cfr. A 27
mutica Koch (tenuiflora) = Nardurus unilateralis
mutica Parl. (ovina) = seg.
mutica Wulf. = capillata
mutinensis Hack. (rubra) 91, A 27 (2 ζ b subf.)
myurus L. = Vulpia myurus et ciliata
nebrodensis Jan = Poa — nebrod.
Negri Goir. (pumila) = rigidior Mut.
nemorosa Pollini (spadic.) = spectabilis (α a)
nemorum Leyss. = heterophylla
nigrescens Gaud., Parl. = nigricans
nigrescens β Gaud. = nigric. b. pubescens
nigrescens Lam. A 26 (2 δ c)
nigricans Schleich. 91, A 27 (2 η)
norica Hack. (rubra) A 27 (2 θ)
norica Richt. = prec.
nutans Host (non Whlnb.) = pulchella
oranensis Steud. = cærulescens
oryzetorum Pollini = Fenax?
ovina Host = pseudo-ovina

FESTUCA I 89 (115)
ovina L. 90 (1), A 24, 204
ovina Savi etc. = duriuscula
pallens Host A 25 (1 ε c)
paludosa Gaud. = capillata
palustris Seenus = Glyceria festucæform.
pannonica Griseb. (ovina) = sulcata
panormitana Parl. = Vulpia panor.
parviflora Asch. et Græbn. (pseudovina) A 25 (1 θ a)
parviflora Hack. (duriusc.) = prec.
patens Asch. et Græbn. (rigida) = Sclerochloa pat.
pauciflora Hartm. (arundin.) A 27 (4 δ c)
pedemontana Hack. et Belli (ovina) A 26 (1 c)
pentastachya Presl = Brachyp. pentast.
phalaroides Lam. = Dactylis hispanica?
phleoides Vill. = Kœleria phleoid.
phœnicoides L. = Brachyp. phœnic.
Phœnix Thuill. = elatior × Lolium perenne
Phœnix Vill. = arundinacea
pilosa Hall. f. = Poa violacea
pinnata Huds. = Brachyp. pinnata
planifolia Belli (pedemontana) A 26 (1 c c)
planifolia Hack. (rubra) = multiflora
planifolia Richter = prec.
planifolia Trautv. (rubra) 91, A 26 (2 β b)
plicata Huter ap. Hack. (pulchella) = Scheuchzeriformis
pluriflora Schult., Guss. A 27 (4 β)
Poa Kth. = Nardurus Halleri
poæformis Host = Poa violacea
poæformis Pers. = Bromus inermis
poæoides Thuill. = prec.
pratensis Guss. = pluriflora
pratensis Huds. 92 (4 α), A 27
pratensis Schreb. = multiflora
pratens. × Lolium perenne = elatior × L. per.
procumbens Kth. = Sclerochloa proc.
pseudo-distans Asch. et Græbn. = Glyceria pseudo-dist.
pseudo-dura Steud. = dura
pseudo-loliacea Fr. (praten.) = subspicata
pseudo-loliacea Grantz. (gigant.) = triflora
pseudo-myurus Soy.-Will. = Vulpia myuros
pseudo-ovina Hack. (1880) 90, A 25 (1 θ)
pseudo-ovina Hack. (1882) (ovina) = prec.
pseudo-rubra Schur = fallax
pseudo-varia Volkart (ovina) A 26 (1 var.)

FESTUCA I 89 (115)
puberula Parl. (heterophylla) A 27 (2 ε d)
pubescens Asch. et Græbn. (nigricans) A 27 (2 η b)
pubescens Hack. (duriusc.) A 25 (1 δ e)
pubescens Parl. (duriusc. v. vulg.) = duriusc. c. villosa
pubescens Parl. (ovina v. vulg.) 90, A 24 (1 β b)
pubescens Parl. (nigrescens) = nigricans b. pubesc.
pubescens Somm. (bromoides) = Vulpia derton. d. pub.
pubescens Somm. (myurus) = Vulpia myur. b. pub.
pubescens W. = barbata
Puccinellii Parl. 91, A 27 (2 ζ b)
pulchella Schrad. 93 (9), A 28
pulchra Schur = pseudo-ovina
pumilla Chaix in Vill. 93 (7), A 28
pumila γ Gaud. = lutea
pyramidata Lk. = Vulpia uniglumis
racemosa Celak. (elatior) = subspicata
ramosa Koch (Lachenalii) = Nardurus — Festuca
ramosa Roth = Brachyp. ramos.
repens Heg. = rubra (α a)
rhætica Sut. = Poa violacea
rhomboidea Kit. = pulchella
rigida Kth. = Sclerochloa rig.
rigida Roth = Brachyp. asperum
rigidior Belli (flavescens) A 28 (7 ε b)
rigidior Belli (rubra) A 26 (2 α f)
rigidior Mut. (pumila) A 28 (7 α c)
rigidior Richter = prec.
rigido-aspera Steud. = Brachyp. asperum
rigurosa Schur = pallens
robusta Asch. et Græbn. (rigida) = Sclerochloa — rob.
robusta Hack. (duriusc.) A 25 (1 δ f)
robusta Mutel = Sclerochloa marit.
Rottbœllia Asch. et Græbn. = Catapodium loliaceum
rottbœllioides Kth. = prec.
rubens Pers. = Bromus rub.
rubra L. 91 (2), A 26, 204
rupicaprina Hack. (ovina) A 26 (1 π)
rupicaprina Richter = prec.
rupicola Heuff. A 25 (1 ι b)
sardoa Fiori (pumila) 93, A 28 (7 β)
sardoa Hack. (varia) = prec.
sardoa Richter = prec.
Savii Ten. = Vulpia Alopecurus
saxatilis Schur A 25 (1 ι f)
scabra Hack. (fallax) A 26 (2 δ d)
scabriculmis Hack. (varia) A 28 (7 γ e)
scabriculmis Richt. = prec.

Digitized by Google

FESTUCA I 89 (115)
Scheuchzeri Gaud. = pulchella
Scheuchzeriformis Schur A 28 (9 β)
sciaphila Schur. = ov. β b. pubescens Parl.
sciuroides Roth = Vulpia dertonensis
segetum Savi = Trisetum parviflorum
serotina L. = Diplachne ser.
setacea Parl. = Vulpia set.
sicula Parl. (elatior) = pluriflora
sicula Presl = Vulpia sicula
sicula var. b. Guss. = Vulpia setacea
Sieberi Tausch A 28 (10 α)
silvatica Host = montana
silvatica Huds. = Brachyp. silvat.
silvatica Presl = exaltata
silvatica Vill. = altissima
simplex Celak. (arundin.) = pauciflora Hartm.
spadicea L. 92 (5), A 28
speciosa Schreb. = Bromus inermis
spectabilis Guss. = calabrica
spectabilis Jan 93 (10), A 28
spectabilis Marches. = croatica
Sphenopus C. A. Mey. = Sphenop. divaricatus
splendens Pourr. = Kœleria vallesiana
spuria Hack. (*Fenax*) A 28 (4 ε c)
stenantha Hack. (*ovina*) A 25 (1 μ)
stenantha Nym. = prec.
sterilis Jessen = Bromus ster.
stipoides DC. = Vulpia ligustica
stipoides Desf. p. p. = Vulpia incrassata
stipoides Jan = Vulpia genicul.
stricta Gaud. = duriuscula
stricta Host A 25 (1 κ)
strictifolia Opiz = glauca
strictior Hack. (*arundin.*) A 27 (4 δ b)
subalpina Gaud. (glauca) = levigata Clairv.
subalpina Hack. (*arundin.*) A 27 (4 δ d)
subhirsuta Hack. (*crassifol.*) A 25 (1 δ g subf.)
submutica Parl. (duriusc.) = inops
subspicata G. F. W. Meyer (*elatior*) A 27 (4 α b)
subvariegata Hack. (*spectabilis*) A 28 (10 α b)
subvilllosa M. et K. (rubra) = barbata
sudetica Kitt. (ovina) = supina
sulcata Hack. (1881) 90, A 25 (1 ι)
sulcata Hack. (1882) (ovina) = prec.
supina Schur A 25 (1 γ)
taurinensis Hack. (*glauca*) A 25 (1 ε e)
tectorum Jessen = Bromus tectorum

FESTUCA I 89 (115)
tenella Boiss. (myurus) = Vulpia Broteri
Tenoreana Steud. = Brachyp. Tenoreanum
tenuicula Kth. = Nardurus — festucoides
tenuicula Lk. = Nardurus marit. (a)
tenuiflora Schrad. = Nardurus maritimus (a)
tenuifolia Pollini = alpestris
tenuifolia Sibth. = capillata
tenuis Nym. = Vulpia tenuis
tenuissima Tausch = Nardurus marit. (a)
thalassica Kth. = Glyceria maritima
Thomasiana Gay in Mutel = Vulpia sicula
trachyphylla Hack. (*duriusc.*) A 25 (1 δ d)
trichophylla Ducr. 91, A 26 (2 γ)
triflora Sm. 92 (8 b)
tuberculosa Richter = Catapodium tuberc.
uliginosa Hack. (*trichophylla*) A 26 (2 γ b)
uliginosa Schur (rubra) = prec.
uniglumis Sol. = Vulpia un.
unilateralis Schrad. = Nardurus unil.
unioloides Kth. = Catopodium siculum
unioloides W. = Ceratochloa uniol.
vaginata Gaud. = pallens
vaginata W. et K. A 25 (1 ζ)
valesiaca Schl. in Gaud. 90, A 25 (1 η)
valesiaca Koch (ovina) = seg.
varia Hœnke 93, A 28 (7 γ)
varia Pers. = pumila (α a)
versicolor Tausch = varia (a)
villiflora Hack. (planifolia) = planifolia Trautv.
villosa M. et K., Hack. (*duriusc.*) A 24 (1 δ c)
villosa M. et K. (montana) = Bromus erect. c. vill.
villosa M. et K. (rubra) = barbata
villosa Schrad. (ovina) = duriusc. c. villosa
villosula Hack. (*levis*) A 25 (1 λ b)
violacea Gaud. in Schleich 91, A 27, 204 (2 ζ)
vivipara Hack. (supina) = vivipara Sm.
vivip. L., Parl. (ovina) = vivipara Sm.
vivipara Parl. (*heterophylla*) A 27 (2 ε f)
vivipara Sm. A 25 (1 γ b)
vulgaris Koch (*ovina*) 90, A 24 (1 β)
vulpioides Schur. A 27 (2 ε c)
FESTUCARIA = Nardurus
psilantha Lk. = N. marit. (a)
tenuicaulis Lk. = N. Halleri
FESTULOLIUM = Festuca × Lolium
ascendens Asch. et Græbn. = F. elatior × L. perenne

FIBICHIA = Cynodon
umbellata Koel = C. Dactylon
FIBIGIA I 459 (394)
clypeata Medic. 459, A 98
FICARIA = Ranunculus
calthæfolia Gr. et Godr. = R. ficariæformis
calthæfolia Rchb. = R. nudicaulis
communis Dum.-Cours. = R. Ficaria
grandiflora Rob. = R. ficariæformis
nudicaulis A. Kern. = R. nudicaul.
polypetala Gilib. = R. Ficaria
ranunculoides Mœnch, Roth = R. Ficaria (α)
verna Huds. = R. Ficaria
FICUS I 276 (268)
albescens Miq. = Carica (for.)
bifera Gasp. (polymorpha) = Carica (for.)
Caprificus Risso 277 (β)
Carica L. 276
castanea Gasp. (deliciosa) = Carica (for.)
chlorocarpa Miq. = Carica (for.)
colombræ Gasp. = Carica (for.)
communis Lam. = Carica
deliciosa Gasp. = Carica (for.)
depressa Gasp. (polymorpha) = Carica (for.)
dottata Gasp. = Carica (for.)
elegans Gasp. (polymorpha) = Carica (for.)
fasciata Gasp. (pachycarpa) = Carica (for.)
globosa Miq. = Carica (for.)
hæmatocarpa Gasp. (polymorpha) = Carica (for.)
hypoleuca Gasp. = Carica (for.)
Juliana Gasp. (polymorpha) = Carica (for.)
latifolia Gasp. (deliciosa) = Carica (for.)
leucocarpa Gasp. = Carica (for.)
lusitanica Gasp. (pachycarpa) = Carica (for.)
maxima Gasp. (deliciosa) = Carica (for.)
melanocarpa Gasp. (polymorpha) = Carica (for.)
neapolitana Miq. = Carica (for.)
nobilis Gasp. (pachycarpa) = Carica (for.)
pachycarpa Gasp. = Carica (for.)
pedunculata Miq. = Carica (for.)
polymorpha Gasp. = Carica
rugosa Miq. = Carica (for.)
sarnensis Gasp. (polymorpha) = Carica (for.)
sativa Fiori (*Carica*) 276 (α)
Sycomorus Gasp. (non L.) = Carica
viridis Miq. (albescens) = Carica (for.)
FIEBERA = Physocaulis
nodosa Opiz = Ph. nod.
FIEDLERIA = Tunica
illyrica Rchb. = T. ill.
FILAGINELLA = Gnaphalium
luteo-alba Opiz = G. luteo-album

Digitized by Google

FILAGINELLA = Gnaphalium
nuda Opiz = G. nudum
uliginosa Opiz = G. ulig.
FILAGO III 278 (880)
acaulis Krock. = Gnaphal. ac.
acaulis L., All. = Evax pygmæa
affinis Tin. = prostrata
albida Neilr. (german.) = canescens
alpestris Presl = Lagopus
apiculata G. E. Sm. = lutescens
arvensis Fiori = Lagopus
arvensis L. 275 (2), A 185
australis Fiori (*min.*) 275 (4 d)
brevifolia Fiori (*min.*) 275 (4 a)
Candolleana Parl. = prostrata
canescens Jord. 274 (1 α b)
congesta DC. = Evax exigua
cossyrensis Lojac. = Gussonei
cossyrensis Tin. = tenuifolia
cuneata Lojac. A 185
Cupaniana DC. (arvens.) = heterantha
Cupaniana Parl. = prec.
decumbens Gib. et Pir. (*spathul.*) 274 (1 γ b)
dichotoma Gilib. = arvensis
discolor Guss. = Evax discolor
eriocephala Guss. 274 (1 β)
exigua S. et S. = Evax exigua
filiformis Lam. = gallica
fulvescens Lojac. (*heterantha*) A 185 (3 for.)
gallica L. 275 (5), A 185
germanica L. 274 (1), A 185, 216
gracilescens Fiori (*german.*) 274 (1 α d)
Gussonei Lojac. 274 (1 ε), A 185
heterantha Raf. Guss., 275 (3), A 185
Jussiæi Coss. et Germ. = spathulata
Kaltenbachii Sch. Bip. 274 (1 α e)
Lagopus Parl. 275 (2 β), A 185
lanceolata Fiori (*min.*) 275 (4 b)
lanuginosa DC. (german.) = seg.
lanuginosa Req. = eriocephala
leontopodioides Lojac. = micropodioides
Leontopodium L. = Leontopod. alpinum
lutescens Jord. 274 (1 α a)
maritima L. = Diotis marit.
micropodioides Lge. A 185
minima DC. (montana) = brevifolia
minima Fiori = australis
minima Fr. 275 (4)
montana DC. = lanceolata
montana L. Fl. Suec. et hb. = arvensis
montana L. Spec. ed. II. = minima
multicaulis Fouc. et Sim. (*tenuifol.*) 276 (5 β b)
multicaulis Lam. = Micropus — multic.
neglecta DC. 276 (*nota*)
paniculata Gilib., Mœnch = arvensis
FILAGO III 278 (880)
pilularis Lk. = Gnaphal. pilul.
prostrata Parl. (*non DC.*) 274 (1 δ), A 216
pygmæa L. = Evax pygm.
pygmæa b Cav. = Evax asteriscifiora
pyramidata Auct. pl. (an L.?) = spathulata
recta Lk. = Gnaphal. rectum
rotundata Mœnch = germanica
sicula Lojac. = subulata
silvatica Lk. = Gnaphal. silv.
simplex Fouc. et Sim. (*tenuifol.*) 276 (5 β a)
spathulata Presl 274 (1 γ)
stellata Lam. = Leontopod. alpinum
subulata Lojac. (*micropodioid.*) A 185
supina DC. (mont.) = seg.
supina Fiori (*min.*) 275 (4 c)
supina Lam. = Micropus supinus
tenuifolia Presl 276 (5 β)
Tinei Sorrent. A 185 (5 var.)
uliginosa Lk. = Gnaphal. ulig.
virescens Guss. (*spathul.*) 274 (1 γ c)
virescens Parl., Wirtg. (*german.*) 274 (1 α c)
vulgaris Lam. = germanica
FILIPENDULA = Spiræa
cinerea Glaab (Ulmaria) = S. glauca
denudata Beck (Ulmaria) = S. denud.
denudata Fritsch = prec.
Filipendula Voss. = S. Filip.
glauca Asch. et Græbn. (Ulmaria) = S. — tomentosa
hexapetala Gilib. = S. Filipend.
pubescens Fourr. = S. pubesc.
quinqueloba Asch. et Græbn. (Ulmaria) = S. quinq.
subdenudata Fritsch (Ulmaria) = S. glauca
tomentosa Maxim. (Ulmaria) = S. — toment.
Ulmaria Maxim. = S. Ulm.
vulgaris Mœnch = S. Filipend.
FIMBRISTYLIS I 123 (137)
adventitia Ces. 123 (X)
annua Presl = dichotoma
annua R. et S. 123 (4)
bisumbellata Bub. = dichotoma
Cioniana Savi 123 (1 β)
comata Nees = squarrosa
communis Kth. = annua
dichotoma Vahl 123 (3)
diphylla Vahl = annua
exilis R. et S. 123 (1)
hirta R. et S. = squarrosa
hispidula Kth. = exilis
laxa Vahl = annua
macrostachya Bœckel. (dichotoma) = adventitia
melanostachya Brogn. = Heleocharis palustris
Micheliana Rchb. = Scirpus Michelianus
Michelii Bub. = squarrosa
mucronata Vahl = Scirpus litoralis
FIMBRISTYLIS I 123 (137)
polymorpha Bœckel. = annua
pubigera Bernh. = dichotoma
pygmæa Vahl = Scirpus cernuus
Scherardi Bub. = annua
squarrosa Vahl 123 (2)
FIORINIA = Aira
pulchella Parl. = A. Tenorei
FISTULARIA = Rhinanthus
Alectorolophus Wettst. = R. Alector.
angustifolia Wettst. = R. angust.
Crista-Galli Wettst. = R. minor
major Wettst. = R. major
serotina Wettst. = R. — serot.
FLAMMULA = Ranunculus
Lingua Fourr. = R. Lingua
Ranunculus Fourr. = R. Flammula
FLOSCUCULI = Lychnis
pratense Opiz = L. Flos-cuculi
FLUVIALIS = Najas
minor Pers. = N. minor
FŒNICULUM II 173 (567)
capillaceum Gilib. 173 (2 α)
Carvi Lk. = Carum Carvi
divaricatum Griseb. = piper.
dulce Mill. 173 (2 α c)
græcum Calestani = Bonannia græca
officinale All. 173 (2 α a)
peucedanoides Jacks. 173 (1)
piperatum Ten. = seg.
piperitum Sweet, DC. 173 (2 β)
sativum Bert. 173 (2 α b)
segetum Presl = Ridolfia seg.
virescens Arc. = peucedanoides
vulgare Mill. 173 (2)
FŒNUM-GRÆCUM = Trigonella
officinale Mœnch = T. Fœn.-græc.
prostratum Fourr. = F. gladiata
sativum Medic. = T. F. græc.
FOLLICULIGERA = Trigonella
cærulea Pasq. = T. cærul.
graveolens Pasq. = T. Fœn.-græcum
procumbens Pasq. = T. gladiata
FONTANELLA = Isopyrum
tertiaria Kluk = I. thalictroides
FONTANESIA II 840 (697)
chinensis Hance = phillyr.
Fortunei Carr. = phillyr.
phillyreoides Labill. 840
FOSSELINIA = Clypeola
Jonthlaspi All. = C. Jonthl.
FRAGA = Potentilla
micrantha Fourr. = P. micr.
parviflora Lap. (steril.) = prec.
sterilis Lap. = P. sterilis
FRAGARIA I 577 (461)
ananassa Duch. = chiloens. X virgin.
ananassa Ser. (chilensis) = prec.
breslingea Duch. = viridis
calycina Mill. = chiloen. X virgin.
campestris Stev. = viridis
caulescens Crantz = Potent. Clusiana

Digitized by Google

FRAGARIA I 577 (461)
cerinoalba Jord. et Fourr. = viridis
chiloensis Ehrh. A 121
chiloensis L. (vesca) = prec.
chiloens. × *virgin. Focke* A 121
collina Ehr. 577 (1 γ) = viridis, cfr. A 121
Crantzii Crantz. = Potent. salisburgensis
dubia Crantz = Potent. minima
efflagellis Duch. 577 (1 α b)
efflagellis Ser. (vesca) = prec.
elatior Ehrh. 577 (1 β) = sativa, cfr. A 121
fruticosa Crantz = Potent. frut.
grandiflora Ehrh. 577 (1 δ) = chiloen. × virgin., cfr. A 121
hortensis Duch. = vesca (f. cult.)
incana Lam. = Potent. incana
indica Andr. 577 (2)
magna Thuill. = sativa
minor Duch. = vesca (α for.)
moschata Duch. = sativa
palustris Crantz = Potent. pal.
præcox Kit. = Potent. sterilis
pratensis L. (vesca) = sativa
reversa Kit. = sativa
rubens Crantz = Potent. opaca
sativa L. (*vesca*) A 121 (1 β)
silvestris Duch. = seg.
silvestris L. (vesca) = vesca (α)
sterilis All. = Potent. micrantha
sterilis L. = Potent. steril.
suecica Jord. et Fourr. = viridis
Tormentilla Crantz = Potent. erecta
verna Crantz = Potent. verna
vesca L. 577 (1), A 121
villosa Crantz = Potent. salisburgensis
virginiana Duch. A 121
viridis Duch. A 121 (1 γ)
vulgaris Ehrh. = vesca
FRAGARIASTRUM = Potentilla
album Schur = P. alba
caulescens Schur = P. caul.
Clusianum Schur = P. Clus.
micranthum Schur = P. micr.
petiolatum Schur = P. petiol.
sterile Schur = P. steril.
FRANCA = Frankenia
hispida Vis. = F. hisp.
levis Vis. = F. levis
mollis Vis. = Cressa cretica
pulverulenta Vis. = F. pulv.
FRANGULA = Rhamnus
Alnus Mill. = Rh. Frangula
latifolia Mill. = Rh. alpina
pentapetala Gilib. = Rh. Frangula
rotundifolia Mill. = R. pumila
rupestris Schur = Rh. rup.
saxatilis Cramer = Rh. saxat.
vulgaris Borkh., Rchb. = Rh. Frangula
Wulfenii Rchb. = Rh. rupestris
FRANKENIA I 381 (347)
canescens Presl = pulverulenta
cinerescens Moris (levis) = hirsuta
FRANKENIA I 381 (347)
ericæfolia Salisb. = hirsuta
ericoides Pers. = prec.
hirsuta L. 381 (2 β)
hispida DC. 381 (2 β a)
intermedia DC. 381 (2 β b)
levis L. 381 (2)
mollis M. B. = Cressa cretica
pulverulenta L. 381 (1)
FRANQUEVILLIA = Cicendia
minima S. F. Gray = C. filiformis
FRAXINELLA = Dictamnus
alba Gærtn. = D. albus
Dictamnus Mœnch = prec.
FRAXINUS II 340 (698)
acutata DC. (*Ornus*) 340 (1 β b)
angustifolia Vahl 341 (2 ε)
apetala Lam. = excelsior
argentea Lois. 340 (1 δ)
australis J. Gay 341 (2 β)
australis Montagne = obtusa
biloba Gr. et Godr. 341 (2 δ c)
biloba J. Richter (excelsior) = emarginata
borealis Gr. et Godr. (excels.) = excelsior (α)
canescens Fiori (*argentea*) 340 (1 δ b)
dentata Tausch = Ornus?
emarginata Car. et St.-Lag. (*excels.*) 341 (2 α c)
excelsior L. 341 (2)
florifera Scop. = Ornus
lanceolata Fiori (*Ornus*) 340 (1 γ)
lentiscifolia Desf. = parvifolia
leptocarpa DC. (*oxycarpa*) 341 (2 δ d)
mannifera Hort. = Ornus
microphylla Goir. (*Ornus*) A 168 (1 α b)
Montagnei Nym. = obtusa
obtusa Gr. et Godr. (*oxycarpa*) 341 (2 δ a)
Ornus L. 340 (1), A 168
Ornus Scop. = excelsior
oxycarpa W. 341 (2 δ)
oxyphylla M. B. = oxycarpa
paniculata Mill. = Ornus
parvifolia Lam. 341 (2 γ)
parvifolsa Ten. = rotundifol.
rostrata Gillot ex Rouy (*excels.*) 341 (2 α b)
rostrata Guss. 341 (2 δ b)
rostrata Rouy (*angustifol.*) 341 (2 ε b)
rostrata Rouy (*parvifol.*) 341 (2 γ b)
rotundifolia Mill., Lam. 340 (1 β)
tamariscifolia Vahl = parvifolia
FREIREA = Parietaria
lusitanica Gaudich. = P. lusit.
FREYERA = Bunium
cynapioides Griseb. = B. cynap.
tuberosa Rchb. = B. tuber.
FRITILLARIA I 181 (184)
Burnati Nym. = seg.
Burnati Planch. (*delphin.*) 181 (2 b)
caussolensis Goaty et Pons = tenella
FRITILLARIA I 181 (184)
delphinensis Gren. 182 (2), A 45
illyrica Beck (*neglecta*) A 45 (3 β b)
intermedia N. Terr. A 45 (5 δ)
involucrata All. 182 (4)
italica Pers. = tenella
lutea Rchb., Moggr. (non Mill.) = Moggridgei
Meleagris Bert., Ambr. (non L.) = delphinensis
Meleagris β Bert. = involucrata
Meleagris Desf., Biv. = messanensis
Meleagris Ten. = Orsiniana
messanensis Raf. 182 (3), A 45
messanensis Rchb. = neglecta
micrantha Beck (*tenella*) A 45 (5 β)
minor Ker-Gawl. (racemosa) = tenella
Moggridgei Boiss. et Reut. = seg.
Moggridgei Planch. (*delphin.*) 181 (2 c)
montana Hpe. = tenella (α)
neglecta Parl. 182, A 45 (3 β)
Orsiniana Parl. A 45 (5 γ)
persica L. 181 (1), A 45
pollinensis N. Terr. A 45 (5 ε)
pyrenaica Guss., Presl (non L.) = messanensis
pyrenaica Host = tenella
pyrenaica Ten. = Orsiniana
tenella M. B. 182 (5), A 45
Tombeanensis Boiss. = Burnati
tubæformis Gr. et Godr. = delphinen.
versicolor Baker (*involucrata*) 182 (4 b)
FROELICHIA = Kobresia
caricoides Wulf. ex R. et S. = K. myosuroides
FRORIEPIA = Petroselinum
nuda C. Koch = P. segetum
subpinnata Baill. = prec.
FUIRENA I 117 (134)
pubescens Kth. 117, A 84
FUMANA = Helianthemum
arabica Spach = H. arab.
Barrelieri Gross. (thymif.) = H. Barr.
Barrelieri Rouy et Fouc. (viscida) = prec.
Barrel. Wk. et Lge. (glutin.) = prec.
coridifolia Chaten. = H. ericoides
ericifolia Wallr. = H. Fumana (α)
ericoides Pau = H. ericoid.
Fumana Karst. = H. Fumana
glutinosa Boiss. = H. glutin.
hispidula Loscos et Pardo = H. viride et juniperinum
juniperina Gross. (thymif.) = H. junip.
juniperina Wk. (viscida) = prec.
juniperina Wk. et Lge. (glutin.) = prec.
levipes Spach = H. levipes
parviflora Wk. (arabica) = H. Savii

Digitized by Google

FUMANA = Helianthemum
pinifolia Wallr. = H. Fumana (α)
procumbens Gr. et Godr. = H. Fumana (α)
scoparia Pomel = H. ericoides
Spachii Gr. et Godr. = H. ericoides
thymifolia Burn. = H. thym.
viridis Boiss. (glutin.) = H. viride
viridis Gross. (thymif.) = H. viride
viridis Rouy et Fouc. (viscida) = H. viride
viscida Spach = H. thymifol.
vulgaris Spach = H. Fumana
FUMANOPSIS = Helianthemum
glutinosa Pomel = H. glut.
levipes Pomel = H. levip.
thymifolia Fourr. = H. thym.
FUMARIA I 478 (413)
abyssinica Hamm. = pycnantha
acaulis Wulf. = Corydalis ac.
acrocarpa Peterm. = Schleicheri
affinis Hamm. = Gussonei
agraria Gr. et Godr. = major
agraria Koch = spectabilis
agraria Lag. 479 (1 γ)
albida DC. (densiflora) = parviflora
albiflora Hamm. (capreol.) = pallidiflora
albiflora Moris (parvifl.) = parviflora (a)
albiflora Parl. (offic.) = minor
alexandrina Ehrenb. ex Ten. = judaica
alexandrina Gasp. = capreolata (α ?)
ambigua Lojac. (*non Pall.*) 479 (1 β b)
anatolica Boiss. 480 (2 β), A 102
apiculata Lge. = vagans
atrosanguinea Broch. et Neyr. (*capreol.*) A 102 (1 α b subfor.)
atrosanguinea Nic. = prec.
Bastardi Bor. = Borœi, serotina
benedicta Nic. = serotina
bicolor Somm. 479 (1 ε), A 102
Borœi Jord. 480 (1 θ), A 102
bulbosa All. = Corydalis cava
calycina Bab. = densiflora
capnoides L. = Corydalis capn.
capreolata L. 478 (1), A 102
capreolata γ Guss. = Gussonei
cava L. (bulbosa) = seg.
cava Mill. = Corydalis cava
confusa Jord. 479 (1 ζ a)
densiflora DC. 480 (2 γ), A 102
densiflora Moris (offic.) = prec.
densiflora Parl. (offic.) = pycnantha
diffusa Hausskn. (Gussonei) = serotina
diffusa Hausskn. (parvifl.) = parvifl. (a)
elata Nic. (agraria) = Gussonei
FUMARIA I 478 (413)
enneaphylla L. = Sarcocapnos enneaph.
erecta Hausskn. (parvifl.) = glauca
fabacea Retz. = Corydalis intermedia
flabellata Albert = provincialis
flabellata Gasp. 479 (1 β), A 102
flavescens Nic. (capreol.) = pallidifl.
floribunda Hamm. (offic.) = pycnantha
floribunda Koch (offic.) = pycnantha
Gasparrinii Bab. 481 (2 η b)
glauca Jord. 480 (2 ε c)
gracilescens Nic. (capreol.) = muralis, serotina
grandiflora Hausskn. (capreol.) = speciosa
Gussonei Boiss. 479 (1 ζ b)
Halleri W. = Corydalis solida
inarimensis Guss. (offic.) = scandens?
inflata Nic. (capreol.) = pallidifl.
intermedia L. (bulbosa) = prec.
intermedia Ehrh. = Corydalis interm.
Jordani Guss. = Gussonei
judaica Boiss. 479 (1 δ c)
Kraliki Jord. = anatolica
læta Lowe (muralis) = muralis
Laggeri Jord. = Schleicheri
latifolia Gaud. (Vaillantii) = Schleicheri
latifolia Nic. (parvifl.) = leucantha
latisecta Hausskn. (parvifl.) = parvifl. (for.)
leronensis Burn. (Loiseleurii) = vagans
leucantha Viv. 480 (2 ε b)
lilybœtana Nic. (agraria) = agraria
Loiseleurii Clav. = capreolata (var. ζ-ι)
lutea L. = Corydalis lutea
major Bad. 479 (1 δ)
major Ten. = Gussonei
Martini Clav. = flabellata
media Bast. = Borœi
media Lois. = capreolata (var. ζ-ι), scandens
media Rchb. = Wirtgeni
messanensis Nic. (parvifl.) = leucantha
micrantha Lag. = densiflora
microsepala Lojac. = agraria
minor Guss. (capreol.) = serotina
minor Koch (*offic.*) A 212 (2 α e)
Morisiana Genn. (agraria) = agraria
muraliformis Clav. = muralis
muralis Bor. = Borœi
muralis Sond. 480 (1 ι)
neapolitana Vaill. ex Parl. = capreol. (α)
nemorosa Lojac. 479 (1 β c)
FUMARIA I 478 (413)
officinalis L. 480 (2), A 102, 212
pallidiflora Jord. 479 (1 α a)
Parlatoreana Kral. 480 (2 γ b)
parviflora Hausskn. (capreol.) = pallidifl.
parviflora Lam. 480 (2 ε)
patens Hausskn. (Gusson.) = Gussonei (for.)
peloritana Nic. (flabellata) = ambigua
Petteri Guss. (an Rchb.?) = serotina
Petteri Parl. = Reuteri
Petteri Ten. = offic. (α)
pia Nic. A 212
prehensilis Kit. = densiflora
Prestandreae Nic. (parvifl.) = glauca
provincialis Rouy et Fouc. (*capreol.*) A 102 (1 α for.)
pumila Host = Corydalis pum.
pycnantha Lor. et Bar. (*offic.*) 480 (2 α c)
Reuteri Boiss. 480 (2 δ)
rubiflora Moris (parvifl.) = glauca
rupestris Boiss. et Reut. 479 (1 δ b)
scandens Hausskn. (*flabell.*) A 102 (1 β d)
scandens Rchb. (*offic.*) 480 (2 α d)
Schleicheri Soy.-Will. 480 (2 ζ), A 102
segetalis Hamm. (parvifl.) = parvifl. (for.)
serotina Guss. 479 (1 ζ)
solida Ehrh. = Corydalis sol.
solida L. (bulbosa) = prec.
speciosa Jord. 479 (1 α b), A 102
speciosa Tin. = ambigua
specioso × *Gussonei Somm.* A 102
spectabilis Bischoff 479 (1 δ d)
spicata L. 481 (3)
subemarginata Sang. (offic.) = Wirtgeni
tentaculata Wallr. = pallidifl.
tenuiflora Fr. = Wirtgeni
tenuiflora Guss. (offic.) = densiflora
tenuisecta Lojac. (parvifl.) = glauca
umbrosa Hausskn. (parvifl.) = leucantha
vagans Jord. 479 (1 η)
Vaillantii Guss. = Wirtgeni
Vaillantii Lois. 481 (2 η), A 102
Vaillantii Ten. = serotina
Wirtgeni Koch 480 (2 α b)
Zancleana Nic. (capreol.) = pallidifl.
FUSSIA = Aira
capillaris Schur = A. capill.
caryophyllea Schur = A. caryoph.
præcox Schur = A. præcox

Digitized by Google

GAGEA I 183 (187)
anomala Goir. (Liottardi) = fragifera
arvensis Dum. 184 (7), A 46
australis Lindem. (*lutea*) A 46 (2 α b)
Baumgarteniana Schur = minima
belgica Dum. = spathacea
bifida Goir. (*lutea*) A 46 (2 α e)
Biroliana Chiov. et Rossi = fragifera
bohemica Gr. et Godr. = saxatilis
bohemica R. et S. A 46 (7 ter)
bracteolaris Salisb. = pratensis
Brentæ Evers A 46 (2 β)
bulbifera Goir., Beck. (*arvens.*) A 46 (7 α b)
bulbifera Fiori (*fistulosa*) A 46 (6 d)
bulbifera Goir. (Liottardi) = prec.
bulbifera Goir. (*lutea*) A 46 (2 α g)
bulbillifera Bolzon (*arvens.*) A 46 (7 α b subfor.)
busambarensis Parl. 185, A 47 (7 ter c)
calabra N. Terr. A 46 (7 bis c)
calabra N. Terr. (amblyopetala) = prec.
calabra N. Terr. (*minima*) A 46 (4 b)
callosa Rchb. = minima
chrysantha Schult. 185, A 206 (7 bis b)
Clusiana R. et S. = pusilla
corsica Jord. et Fourr. = saxatilis
corsica Tausch A 47 (7 ter e)
Durisæi Parl. = foliosa (for.)
fascicularis Salisb. = lutea
fistulosa Ker-Gawl. 184 (6), A 46
foliosa Schult. 185, A 46, 206 (7 bis)
fragifera A. et H. Schultes (*fistul.*) A 46 (6 c)
græca Irm. = Lloydia græca
Granatelli Parl. 185 (7 β)
intermedia Rchb. 184 (6 b) = minimo × fistul.
Liottardi Macchiati = Granatelli
Liottardi R. et S. = fistulosa
lutea Duby = pratensis
lutea Ker-Gawl. 184 (2), A 45
major Goir. (lutea) = maxima
mauritanica Dur. = Granatelli
maxima Schur (*lutea*) A 46 (2 α c)
minima Ker-Gawl. 184 (4), A 46
min. × fistulosa Asch. et Graebn. A 46
minor Goir. (*lutea*) A 46 (2 α d)
monantha Goir. (lutea) = simplex
nebrodensis Nym. 185, A 47 (7 ter d)
nevadensis Boiss. = foliosa (for.)

GAGEA I 183 (187)
nivalis Huet. = foliosa
obliqua Kern (pusilla) = succedanea
obtusiflora Somm. (*Granatelli*) A 46 (7 β b)
pollinensis Fiori (*pratensis*) A 45 (1 c)
pollinensis N. Terr. (stenopetala) = prec.
polymorpha Boiss. = foliosa
polymorpha F. Schultz = pratensis
pomeranica R. Ruthe = spathacea Parl.
pratensis R. et S. 183 (1), A 45
prolifera Bég. (*fistulosa*) A 46 (6 b)
prolifera Goir. (Liottardi) = prec.
prolifera Goir. (*lutea*) A 46 (2 α f)
pubescens Bég. (lutea) = fistulosa
pubescens Goir. (lutea) = australis
pusilla Schult. 184 (3), A 46
pygmæa Salisb. = fistulosa
pygmæa Schult. = foliosa (for.)
ramulosa A. Terr. A 46 (7 bis d)
reflexa Czern. in Rchb. = pusilla
saxatilis Koch 185, A 47 (7 ter b)
Schreberi Rchb. = pratensis (for.)
serotina Ker-Gawl. = Lloydia serot.
silvatica Loud. = lutea
simplex Schur (*lutea*) A 46 (2 α h)
Soleirolii Schultz, Mutel A 46 (7 bis e)
spathacea Parl. (*pratensis*) 183 (1 b)
spathacea Salisb. 184 (5)
stenopetala Rchb. = pratensis
subuniflora Rchb. (arvens.) = saxatilis
succedanea Griseb. et Schenk A 46 (3 β)
Szovitsii Bess. = bohemica
Theobaldii Bruegg. = min. × fistulosa
transsilvanica Schur = lutea
villosa Duby = arvensis
GAHNIA = Cladium
Mariscus F. Muell. = C. Mariscus
GAILLARDIA
bicolor Lam. = pulchella
Drummondii DC. = seg.
Drummondii Hook. (*pulchella*) 303 (nota)
picta Hook. (*pulchella*) 303 (nota)
pulchella Foug. 303 (nota)
GALACTITES = Lupsia
alata DC. (tom.) = L. — alata
alba Nic. (toment.) = seg.
albiflora N. Terr. (toment.) = L. — albifl.

GALACTITES = Lupsia
cærulea Nic. (toment.) = L. — cærul.
elegans DC. (toment.) = L. — elegans
elegans Nym. = prec.
tomentosa Mœnch = L. Galactites
GALANTHUS I 212 (212)
Atkinsii Hort. Barr = majus
autumnalis All. = Leucojum hiemale
Clusii Fisch. = majus?
grandior R. et S. (nivalis) = majus
Imperati Bert. = majus
Linnæi Goir. (nivalis) = nivalis (a)
majus Ten. (*nivalis*) A 50, 208 (b)
minor Goir. (*nivalis*) A 208 (c)
nivalis L. 212, A 50, 208
plicatus Guss. (non M. B.) = majus
reflexus Herb. A 208 (var.)
vernus All. = Leucojum vern.
GALARDIA = Gaillardia
GALATEA = Aster
intermedia Cass. = A. acer
punctata Cass. = prec.
GALATELLA = Aster
acris F. Schultz = A. acer
intermedia Buek = A. acer
Linosyris Rchb. = A. Linos.
punctata Nees = A. acer
Sorrentinii Tod. = A. Sorrent.
GALEARIA = Trifolium
Bonanni Presl = T. Bon.
Cupani Presl = T. physodes
fragifera Presl = T. fragif.
resupinata Presl = T. resup.
tomentosa Presl = T. toment.
tumens Presl = prec.
GALEGA II 87 (502)
albiflora Zersi (*offic.*) 87 (c)
emarginata Ten. (*offic.*) 87 (b)
ochroleuca Jacq. = Vicia ochr.
officinalis L. 87
vulgaris Lam. = prec.
GALEOBDOLON = Lamium
amplexicaule Mœnch = L. amplex.
Galeopsis Curt. = seg.
luteum Huds. = L. Galeobdolon
montanum Pers. (vulg.) = L. mont.
montanum Rchb. = prec.
vulgare Pers. = L. Galeobdol.
GALEOPSIS III 30 (790)
abundantiaca Briq. (*intermedia*) A 215 (3 β for.)
alpicola Jord. = Tetrahit (γ a)
angustifolia Kern. = Kerneri
angustifolia Wallr. 32 (3 α), A 172
arenaria Gr. et Godr. (angustifol.) = calcarea
arvatica Jord. = calcarea
arvensis Schlecht. (*Tetrahit*) 30 (1 α a), A 172
bifida Bœnn. 31 (1 β)
calcarea Schœnheit 33 (3 α g)

Digitized by Google

GALEOPSIS III 30 (790)
canescens Kern. = Kerneri
canescens Schultes 32 (3 α e)
cannabina Balb. = sulfurea
cannabina Gm. = pubescens
cannabina L. (Tetrahit) = speciosa (a)
cannabina Pollich = dubia
carpetana Wk. 33 (3 α g subf.)
Carthusianorum Briq. (*pubescens*) 31 (1 δ a subf.)
dubia Leers. 32 (2)
Eversii Murr. A 172
Galeobdolon L. = Lamium Galeobd.
glabra Desetangs (*Ladan.*) 32 (3 α c)
glabrescens Evers (*intermedia*) A 172 (3 β b)
glabrescens Gremli (angustifol.) = glabra
Gogognei Jord. = Tetrahit (α a)
grandiflora Bluff. et Fing. = Ladanum (α)
grandiflora Roth = dubia
hirsuta All. ex Steud. = quid?
hirsuta L. = Stachys hirta
inermis Posp. 33 (3 α f)
intermedia Vill. 33 (3 β), A 172, 215
Kerneri Briq. (*Ladan.*) 32 (3 α d)
Ladanum L. 32 (3), A 172, 215
latifolia Hoffm. = intermedia
leucantha Jord. = Tetrahit (α a)
Murriana Borb. et Wettst. A 172 (1 δ for.)
ochroleuca Lam. = dubia
orophyla Timb. 32 (3 α b), A 172
parviflora Lam. = intermedia
polychroma Beck (*pubescens*) 31 (1 δ b for.)
præcox Jord. 31 (1 α c)
prostrata Vill. = dubia
pubescens Bess. 31 (1 δ), A 172
Reichenbachii Reut. 31 (1 α d)
Reuteri Rchb. f. 33 (3 γ)
segetum Reichard = dubia
silvestris Schlecht (*Tetrahit*) 30 (1 α b)
speciosa Mill. 31 (1 γ)
spinosa Benth (*Ladan.*) 32 (3 α a)
sulfurea Jord. 31 (1 γ b)
Tetrahit L. 30 (1), A 172
Tetrahit β L. = speciosa (a)
tridentina Evers hb. = Eversii
tristis Briq. (*pubescens*) A 172 (1 δ for.)
urticæfolia Tausch (*pubescens*) 31 (1 δ b)
Verloti Jord. 31 (1 α c for.)
versicolor DNtrs. = sulfurea
versicolor Spenn. = pubescens
versicolor W., Curt. = speciosa (a)
villosa Huds. = dubia
Walteriana Schlecht (*pubescens*) 31 (1 δ c)
GALILEA = Cyperus
mucronata Parl. = Cyperus ægyptiacus
GALILEA = Cyperus
nana Parl. (mucronata) = C. — nanus
GALINSOGA III 303 (899)
parviflora Cav. 303, A 186
quadriradiata Ruiz. et Pav. = parviflora
quinqueradiata Ruiz. et Pav. = parviflora
GALION = Galium
aparinum St.-Lag. = G. Aparine
molluginum St.-Lag. = G. Mollugo
GALIOPSIS = Asperula
glauca Fourr. = A. glauca
GALIUM III 104 (818)
ætnense Presl = seg.
ætnicum Biv. 109 (13 γ)
agreste Wallr. = Aparine (α)
alpestre Gaud. = anisophyll.
alpicolum Jord. 111 (15 γ c)
altissimum Lec. et Lam. (verum) = Wirtgeni
ambiguum Gr. et Godr. 107 (8 δ)
anglicum Huds. 115 (27 α a)
angustifolium Leers 110 (14 α c)
angustifolium Neilr. (Mollugo) = erectum
angustissimum Wallr. (*verum*) 106 (8 α b)
anisophyllum Vill. 112 (18 γ)
Aparine L. 115 (28), A 176
apenninum Paol. et Card. (*verum*) 106 (8 α f)
approximatum Gr. et Godr. 107 (8 s)
argenteum Vill. 112 (18 δ), A 176
aristatum Auct. = Schultesii
aristatum L. 108 (11), A 175, 216
asparagifolium Kern. = flavescens Borb.
aspericaule Rouy (pedemont.) = retrorsum
asperum Schreb. 112 (18 α), A 176
austriacum Jacq. 112 (18 β)
baldense Spr. 113 (22)
Barrelieri Salzm. = ellipticum
Bauhini R. et S. 104 (2 a)
bericum Turra = rubrum (α)
Bernardi Gr. et Godr. 109 (13 s), A 175
Bocconei All. 117 (nota)
boreale L. 105 (4)
brachypodum Jord. 111 (15 γ b)
brevifolium Goir. (*purpur.*) A 175 (9 d)
brevifrons H. Br. (*Moll.*) 109 (14 α a subf.)
brutium Terr. N. (*Cruc.*) 104 (1 b)
cæspitosum Lam. = pusillum
campanulatum Vill. = Asperula glauca
capillare Cav. = setaceum
chloranthum Brot. = pedemont. (α)
ciliatum Schrank = silvestre (α)
cinereum All. 109 (13 ζ)
GALIUM III 104 (818)
cometorhizon Lap. A 175 (20 bis)
commutatum Jord. = silvestre
congestum Jord. 114, A 176 (24 δ)
constrictum Chaub. 114, A 176 (24 γ)
corrudæfolium Vill. 108 (13 β)
corsicum Spr. = rubrum (α)
Cruciata Scop. 104 (1)
cynanchicum Scop. = Asperula cynanch.
debile Desv. = constrictum
decipiens Jord. (*non Ehrh.*) A 176 (27 γ)
decolorans Gr. et Godr. 107 (8 γ)
diffusum Schrad. = hyssopifol.
divaricatum Lam. 115 (27 β), A 176
echinospermum Wallr. (agreste) = Vaillantii
effusum Bég. (*Vaillantia*) 115 (29 b)
elato × verum Gr. et Godr. = ambiguum?
elatum Thuill. 109 (14 α)
ellipticum W. 106 (6), A 175
elongatum Presl 114 (24 β)
eminens Gr. et Godr. = Wirtgeni?
erectum DC. et Auct. p. p. = lucidum (α)
erectum Huds. 110 (14 β)
erecto × verum Gr. et Godr. = approximatum?
eriocarpum Batt. et Trab. (divar.) = microsperm.
eriocarpum Batt. et Trab. (parisiense) = litigios.
flavescens Borb. (*lucid*) 108 (13 c)
flaviflorum Goir. (*purpur.*) A 175 (9 b)
fragile Pourr. = murale
Gerardi Vill. 108 (13 α)
glabellum Lojac. (*elliptic.*) A 175 (6 b)
glaberrimum Ces. (*rubr.*) 110 (15 α a)
glabrescens Bég. (reflex.) 105 (3 γ b) = retrorsum, cfr. A 175
glabrum Gr. et Godr. (boreale) = hyssopifol.
glabrum Karst. = vernum
glabrum Neilr. (*erectum*) 110 (14 β a)
glabrum Neilr. (pal.) = rupicolum
glabrum Req. (*verum*) 106 (8 α g)
glabrum Schrad. (silvestre) = austriac.
glabrum Strobl (*verticill.*) 116 (31 b)
glabrum Ten., Sang. (rotundifol.) = rotundifol.
glabrum Wallr. (pusillum) = austriacum
glaucum L. = Asperula glauca
glaucum Strobl (*ciner.*) 109 (13 ζ a)

Digitized by Google

GALIUM III 104 (818)
gracile Presl (non Wallr.) = divaricat. (a)
græcum L. 116 (nota)
Grenieri Briq. (*rubr.*) 110 (15 β)
Halleri R. et S. 104 (2 c)
helveticum Weig. 113 (20)
hercynicum Weig. 112 (19)
hirsutissimum Briq. (*vernum*) A 216 (2 d)
hirsutum Nees = ellipticum
hirsutum Ten. (verum) = verosimile
hirsutum Ten., Car., Arc. (rotundifol.) = ellipticum
hirticaule Beck. (*vernum*) 104 (2 b)
hirtum Mey. (Mollugo) = pubescens Schrad.
hirtum Mey. (pusillum) = silvestre (α)
hirtum M. et K. (silvestre) = silvestre (α)
hirtum Neilr. 110 (14 β b)
hispidum Gærtn. = Vaill. hisp.
hispidum Roth = spurium
hybridum Facch. (verum) = decolorans
hypnoides Vill. 111 (17 β)
hyssopifolium Hoffm. 105 (4 e)
inermis Gib. et Pir. = rupicolum
inermis Tanf. (pedem.) = pedemont. (α)
infestum W. et K. = Vaillantia
insubricum Gaud. = tyrolense
intermedium DC. (boreale) = mesocarpon
intermedium Mérat 115 (28 α c)
inundatum Schur (Mollugo) = tyrolense
lanceolatum Uechtr. (elong.) = maximum
latifolium W. (*boreale*) 105 (4 b)
lejocarpum Batt. et Trab. (*divar.*) 115 (27 β a)
lejocarpum Tausch (paris.) = parisiense (α a)
lejospermum Wallr. (agreste) = spurium
leve Thuill. 112 (18 β b)
levicaule Rouy (pedem.) = pedemont. (α)
levigatum Koch (aristat.) = linifolium
levigatum L. = aristatum (α)
levipes M. et K. (*Cruc.*) 104 (1 c)
leviusculum Nic. (*Vaillantia*) 115 (29 c)
Leyboldii H. Br. (*rubr.*) 110 (15 α c), A 176
Leyboldii Evers = prec.
linearifolium Uechtr. (*boreale*) 105 (4 c)
linifolium Lam. A 175 (11 α b)
litigiosum DC. 115 (27 α b)
litorale Brébis. (*verum*) 106 (8 α e)
litorale Guss. 108 (12)
longifolium Goir. (*purpur.*) A 175 (9 c)
lucidum All. 108 (13), A 175
GALIUM III 104 (818)
magellense Auct. (an Ten ?) = baldense
majus Moris (rotundifol.) = ellipticum
majus Schur (elong.) = maximum
margaritaceum Kern. 113 (21)
maritimum L. 106 (7)
maximum Moris 114 (24 β b)
megalospermum All. 116 (nota)
megalosper. Lap. = cometorhizon
megalosper. Vill. = Villarsii
mesocarpon H. Br. (*boreale*) 105 (4 d)
messanense Tin. A 176
micranthum d' Urv. = paucifl.
microcarpum Gren. (*tricorne*) 116 (30 b)
microcarpum Vahl = setaceum
microspermum Desf. 115 (27 β b)
minimum R. et S. = murale
minus Guss. (*Apar.*) 115 (28 α b)
minus Moris (pal.) = constrict.
minutulum Jord., cfr. Iconographia 488
minutum Lojac. (*divaricat.*) A 176 (27 β c)
Mollugo L. 109 (14)
Mollugo × verum Wallr. A 175
montanum Poll. = Asperula glauca
montanum Vill. = leve
Morisii Spr. = obliquum
mucronatum Lam. = obliquum
multifolium Bizz. (pumilum) 117 (nota)
murale All. 116 (32)
muscoides Goir. (*verum*) A 175 (8 α for.)
myrianthum Jord. 111 (15 γ a)
nitidulum Thuill. 112 (18 α d)
nudiflorum Viv. = rubrum (α)
nudum Gr. et Godr. (paris.) = parisiense (α a)
obliquum Vill. 110 (15 γ)
ochroleucum Kit. = flavescens Borb.
ochroleucum Wolf. = decolorans
olympicum Boiss. = pyrenaic.
ovalifolium Schott = elliptic.
pallens Thuill. = obliquum
pallescens Gr. et Godr. (cors.) = obliquum
pallidum Celak. (*verum*) 106 (8 α h)
pallidum Presl 109 (13 ζ b)
palustre L. 114 (24), A 176
parisiense L. 115 (27), A 176
pauciflorum Kotsch. A 176
pedemontanum All. 105 (8), A 175, 216
peloritanum Nic. (*lucidum*) 109 (nota)
piligerum H. Br. (*rubr.*) 110 (15 α b)
piligerum Evers = prec.
pilosum Duby (rubr.) = piligerum H. Br.
GALIUM III 104 (818)
polymorphum Knaf. = Schultesii
præcox Lge. (verum) = Wirtgeni?
procumbens Asch. (*pedem.*) 105 (8 α)
pseudobliquum H. Br. (*obliq.*) 110 (15 γ a subf.)
pseudobliquum Evers = prec.
pseudomyrianthum Genn. = myrianthum
pseudoretrorsum Nic. (reflex.) = retrorsum
pubescens DC. (*silvat.*) 107 (10 b)
pubescens Evers = Moll. for. pubesc.
pubescens Guss. (*litor.*) 108 (12 b)
pubescens Guss. (verum) = verosimile
pubescens Schrad. (*Moll.*) 109 (14 α a subf.)
pubescens Schrad. (silvestre) = silvestre (α)
pubescens Tausch (*lucid.*) 108 (13 b)
pumilum Lam. = pusillum (α)
purpureum All. = rubrum (α)
purpureum Evers (*Leyboldii*) A 176 (15 α c subf.)
purpureum L. 107 (9), A 175
pusillum Auct. it. p. p. = silvestre
pusillum L. 111 (17), A 176
pusillum Sm. = austriacum
pyrenaicum Gouan 111 (16), A 176, 216
recurvum Req. A 176
reflexum Presl 105 (8 β), A 216
reflexum Strobl = retrorsum
retrorsum DC. A 175, 216 (8 γ)
rigidum Vill. = lucidum (α)
rhodanthum Briq. (*silvestre*) A 176 (18 α for.)
roseolum Mab. 109 (nota), A 175 (13 a b)
roseum Lojac. (*constrictum*) A 176 (24 γ for.)
rotundatum Gris. = Asperula levigata
rotundifolium L. 105 (5)
rotundifol. L. hb. = Asperula levigata
rotundifol. α Bert. = ellipticum
rotundifol. β L. sp. = Asperula levigata
rubioides Lam. (boreale) = hyssopifol.
rubioides L. 116 (nota)
rubro × Mollugo 117 (nota)
rubrum Briq. (rubr.) rubrum (α)
rubrum Jord., Gr. et Godr. = Grenieri
rubrum L. 110 (15), A 176
rupestre N. Terr. (*corrudæfol.*) 108 (13 β b)
rupicola Bert. = helveticum
rupicolum Bor. = seg.
rupicolum Desm. (*palustre*) 114 (24 α b)

Digitized by Google

GALIUM III 104 (818)
saccharatum All. (1785!) = Vaillantia
saxatile L. p. p. et Auct. = hercynicum
scabridum DC. (erectum) = hirtum
scabridum Evers = prec.
scabriusculum H. Br. (*silvestre*) 112 (18 α c)
scabriusculum Koch (arist.) = aristatum (α)
scabrum DC. (*boreale*) 105 (4 a)
scabrum DC. (Moll.) = pubescens Schrad.
scabrum Jacq. = silvestre (α)
scabrum M. et K. = hirtum
Schultesii Vest. 108 (11 β)
septentrionale R. et S. = boreale
setaceum Lam. 114 (26)
siculum Nic. (divar.) = divaricat.
silvaticum L. 107 (10)
silvaticum Schult. et Sadl. = Schultesii
silvestre Pollich 112 (18), A 176
Soleirolii Lois. = rubrum (α)
spurium Balb. = tricorne
spurium L. 115 (28 γ)
suaveolens Lap. (non Whlnb.) = cometorhizon
subglabrum H. Br. (*silvestre*) 112 (18 α b)
subpubescens H. Br. 110 (14 α c subf.)
sudeticum Tausch = anisophyll.
supinum Lam. = austriacum
Tendæ Rchb. f. 113 (22 β)
tenerum Schleich. 115 (28 β)
tenue Vill. 112 (18 δ b), A 176
tenuifolium All. = Gerardi
tenuifol. DC. = corrudæfol.
Terraccianoi Lojac. A 175
trachycarpum DC. (verum) = tunetanum
trachyphyllum Wallr. (verum) = verosimile
trichocarpum Tausch (paris.) = litigios.
trichophyllum All. = pusillum
trichophyllum Goir. (*purpur.*) A 175 (9 e)
tricorne With. 116 (30)
trinacrium R. et S. = ætnicum
trinerve Mœnch = boreale
tuberculatum Presl = verosimile
tunetanum Poir. 106 (8 α d)
turficulum R. Maire (*vernum*) A 175 (2 d)
tyrolense Leyb. = Leyboldii
tyrolense W. 110 (14 α b)
uliginosum L. 113 (28), A 176
uliginosum Sang. (palustre) = constrict.
umbrosum Asch. (elong.) = maximum
umbrosum Gr. et Godr. (elat.) = tyrolense
Vaillantia Web. 116 (29)
Vaillantii DC. 115 (28 δ), A 176
GALIUM III 104 (818)
venustum Jord. 109 (13 δ), A 175
vernum Scop. 105 (2), A 175, 216
verosimile R. et S. 106 (8 α c)
verrucosum Sm. = Vaillantia
verticillatum Danth. 116 (31), A 176
verum L. 106 (8), A 175
verum Wimm. et Grab. (Apar.) = Aparine (α)
ver. × elatum Gr. et Godr. = decolorans?
ver. × erectum Gr. et Godr. = Wirtgeni?
ver. × erectum Lec. et Lam. = ambiguum
ver. × Mollugo Lec. et Lam. = approximatum
ver. × Mollugo Schiede = decolorans
ver. × Moll. v. angustifol. H. Br. = decolorans
vestitum Gr. et Godr. (paris.) = litigiosum
vestitum Rouy (pedem.) = reflexum
vexans Rchb. = Vaill. muralis
Villarsii Req. A 176
Wirtgeni F. Schultz 107 (8 β)
GALLITRICHUM = Salvia
clandestinum Fourr. = S. cland.
horminoides Timb. = S. horm.
pratense Fourr. = S. prat.
verbenacum Fourr. = S. Verbenaca
GANDRILOA = Chenopodium
atriplicoides Steud. = C. polysperm.
GARACIUM = Mulgedium
alpinum Gr. et Godr. = M. alp.
GARHADIOLUS = Hedypnois
Hedypnois Jaub. et Spach. = H. polymorpha
GARIDELLA = Nigella
anethifolia Salisb. = N. Nigellastrum
nigellæformis St.-Lag. = seg.
Nigellastrum L. = N. Nigellastrum
GASPARRINIA = Fœniculum
virescens Bert. = F. peucedanoides
GASTRIDIUM I 61 (71)
australe P. B. = lendig.
lendigerum Gaud. 61
littorale Dur. exs. = Triplachne nitens
muticum Guenth. = G. scabrum
nitens Coss. et Dur. = Triplachne nit.
scabrum Presl 61 (β)
siculum Trin. = scabrum
triaristatum Dur. = Triplachne nitens
vestitum Spr. = lendig.
GASTRILIA = Thymelæa
geminata Raf. = Th. dioica
GATYONA = Crepis
Dioscoridis Dum. = C. Dioscor.
globulifera Cass. = prec.
GAUDINIA I 74 (89)
avenacea P. B. = fragilis
biloba Gdgr. = fragilis
colorata Gdgr. = fragilis
filiformis Albert A 19 (β)
fragilis P. B. 74, A 19
gracilescens Gdgr. = fragilis
pallida Gdgr. = fragilis
pubiglumis Gdgr. = fragilis
tenuis Trin. = Ventenata dubia
Todaroi Gdgr. = fragilis
GAYA = Pachypleurum
simplex Gaud. = P. simplex
GELASIA = Scorzonera
Jacquinii Cass. = S. hirsuta
villosa Cass. = S. vill.
GENISTA II 16 (483)
acanthoclada DC. 22 (17 δ)
ætnensis DC. 22 (19), A 136
alpestris Bert. (tinct.) = humilis
anaxæa Sacc. (*german.*) 20 (10 α b)
anglica L. 20 (11)
angulata Poir. = Cytis. scoparius
anxantica Griseb. = elatior
anxantica Ten. 18 (4 δ)
apennina Fiori (*tinct.*) 18 (4 η), A 136
aprutia Nym. = Michelii?
arcuata Koch 19 (9 α b)
Ardoini Rouy = Cytis. Ardoini
argentea Noulet = Cytis. arg.
aristata Presl 19 (9 β)
aspalathoides Lam. 21 (17), A 214
aspalathoides Moris = Salzmannii
Balbisii Rouy (*tinct.*) 18 (4 ε b)
bisflorens Rouy = Cytis. bisflor.
Bivonæ Presl = Adenocarpus Bivonii
brutia Parl. ex Huter P. et R. = anglica
candicans L. = Cytis. monspessul.
cinerea DC. 21 (16)
Colmeiri Rouy (candicans) = Cytis. — Colmeiroi
confertior Briq. (Lobelii) = seg.
confertior Moris (aspalath.) = Lobelii
cordifolia Porta A 136
corsica DC. 20 (13)
Cupanii Guss. 19 (7)
dalmatica Bartl. 20 (9 γ)
dalmatica Ten. = Michelii
decumbens W. = pedunculata
depressa Ten. = humilis Ten.
diffusa W. 17 (2 γ)
diffusa β Bert. = pilosula
elata Fiori (*peduncul.*) 17 (2 β)
elata Ten. (procumbens) = prec.
elata Wend. = virgata
elatior Koch 18 (4 α b)
elongata Rouy (tinct.) = virgata
elongata Scheele = Cytis. elong.
ephedroides DC. 22 (18), A 136
florida Asso (non L.) = cinerea

Digitized by Google

GENISTA II 16 (483)
Gasparrinii Presl, Spr. = ephedroides
genuensis Pers. = januensis
germanica L. 20 (10), A 136
glabra Spach = Cytis. scoparius
glabrata F. Gerard ap. Rouy (pedunculat.) = diffusa
grandiflora Gr. et Godr. (*pedunculat.*) 17 (2 α c)
grandis Rouy (supina) = Cytisus — grandis
Gussonei Fiori (*monosperma*) 22 (20 β)
gymnoptera Dub. = Salzmanni
Halleri DC. = pedunculata
herbacea Lam. = sagittalis
hirsuta DC. (tinct.) = pratensis
hirsuta Mœnch = Cytis. scoparius
hirsuta Ten. (non Vahl) = Michelii
hirsuta Tin. ex Spach = aristata
hirta Rouy = Cytis. hirtus
hispanica Host = dalmatica
hispanica L. 19 (8)
hispanica Wulf. = silvestris
holopetala Rchb. 21 (15 β)
humifusa Thore = pilosa
humifusa Wulf. (non L.) = diffusa
humilior Bert. (ovata) = mantica
humilis Rota (*german.*) 20 (10 α c)
humilis Ten. 18 (4 γ)
hungarica A. Kern. = Balbisii
inermis Gilib. = tinctoria
inermis Koch (*german.*) 20 (10 β)
infesta G. Don = Calycotome infesta
insubrica Bruegg. (tinctoria) = Marii
insubrica R. Keller (*german.*) A 136 (10 α d)
italica Lodd. = quid ?
januensis Viv. A 213 (8)
Jordani Shuttl. 19 (6 b)
juncea Scop. = Spartium junc.
Kochii Rouy = inermis
Laburnum Scheele = Cytis. Lab.
lanigera Spach = Calycotome villosa
lasiocarpa Gr. et Godr. (tinct.) = Balbisii et Perreymondi
lasiocarpa Spach = mantica
latifolia Coss. et Germ. (tinct.) = elatior
leiopetala N. Terr. (*pilosa*) 19 (*nota*)
linifolia L. = Cytis. linif.
linifolia Vill. = cinerea
Lobelii DC. 22 (17 β), A 214
mantica Pollini 18 (4 ζ), A 136
Marii Favrat (*tinctoria*) A 136 (4 α c)
maritima Rouy (scoparia) = Cytis. — mar.
Michelii Spach 20 (9 γ b)
microphylla Moris (non DC.) = Morisii

GENISTA II 16 (483)
microphylla Rouy (supina) = Cytisus — micr.
minor. Lam. = anglica
minor Ten. (*sagittalis*) A 136 (1 b)
monosperma Guss. = Gussonei
monosperma Lam. 22 (20)
Morisii Colla 21 (14)
nana Spach (radiata) = holopetala
Notarisii Rouy = Cytis. pumilus
odorata Mœnch = Spatium junceum
ovata Balb. = Balbisii
ovata W. et K. 18 (4 ε)
parvifolia G. Don = Morisii
pedunculata L'Hér. 17 (2), A 136
Perreymondi Lois. 18 (4 ε c)
pilosa L. 19 (6), A 136
pilosula Vis. et Sacc. (*diffusa*) 17 (2 γ b)
platyphylla F. Gérard (tinct.) = elatior
Pollini Spr. = mantica
pratensis Pollini 18 (4 β b)
pratensis Pollini (tinct.) = prec.
procumbens W. et K. 17 (2 α b)
prostrata Lam. = pedunculata (α)
pubescens Lang. ap. Rchb. (tinct.) = virgata
pubescens Lang. ap. Spach = prec.
purgans All. = cinerea
purgans L. 22 (*nota*)
radiata Scop. 21 (15)
ramosissima Boiss. (non Poir.) = cinerea
repens Lam. = pilosa
ringens Presl = Cupanii
sagittalis L. 17 (1), A 136
Salzmanni DC. 22 (17 γ), A 214
scariosa Viv. = januensis
scoparia Chaix in Vill. = cinerea
scoparia Lam. = Cytis. scop.
Scopolii Rouy = Cytis. prostratus
Scorpius DC. 20 (12)
sericea Avé-Lall. = cinerea ?
sericea Wulf. 18 (5)
sibirica All. (non L.) = tinctoria (α)
sibirica Rchb. = virgata
silvestris Scop. 19 (9)
spiniflora Lam. = Scorpius
spinosa Gilib. = germanica
spinosa Pollini = Calycotome spin.
subalpina Rouy (*pilosa*) 19 (6 c)
subinermis Rouy (*german.*) 20 (10 β b)
subsericea Bolzon (*pilosa*) A 136 = subalpina ?
supina Scheele = Cytis. supin.
Tabernæmontani Scheele = Cytis. sessilifol.
Tenorii Steud. = humilis Ten.
tenuifolia Lois. 18 (4 θ)
tetragona Friv. = januensis

GENISTA II 16 (483)
tetragona Vill. ex Verl. = sagittalis
tinctoria L. 18 (4), A 136
triacanthos Brot. 19 (7, oss.)
triangularis W. 17 (8) = januensis, cfr. A 213
triflora Rouy = Cytis. triflor.
triquetra L'Hérit., Lam. A 214
triquetra W. et K. = januensis
trisperma Spach = sætnensis
umbellata Salzm., Lois. (non Poir.) = Salzmanni
villosa Spach = Calycotome vill.
virgata W. 18 (4 β)
vulgaris S. F. Gray = Cytis. scoparius
GENISTELLA = Genista
racemosa Mœnch = G. sagittalis
verticillata Pourr. = G. cinerea
GENISTOIDES = Genista
elata Mœnch = G. virgata
tinctoria Mœnch = G. tinct.
tuberculata Mœnch = G. pilosa
GENNARIA = Cœloglossum
diphylla Parl. = C. diphyllum
GENTIANA II 349 (708)
acaulis Jacq., Koch = Clusii
acaulis L. 351 (7), A 164
acaulis Vill. = Kochiana
æstiva Schult. 358 (9 β)
alba Fiori (*neapol.*) 355 (15 β b)
alba Nym. (Columnæ) = prec.
albiflora Fiori (*campestris*) 355 (15 α b)
albiflora M. Gortani (*rhætica*) A 165 (16 η c)
alpina Vill. 352 (7 δ), A 164
Amarella Frœl., Roth = germanica
Amarella L. 355 (16), A 164, 215
Amarella Sturm. = Sturmiana
angulosa M. B. = æstiva
angustifolia Rchb. et Auct. = Clusii
angustifolia Sturm. = Frœlichii
angustifolia Vill. 352 (7 γ)
anisodonta Borb. = calycina
antecedens Wettst. 355 (16 γ), A 165
apiculata Ugolini (*Clusii*) A 164 (7 α b)
apiculata Ugolini (*Kochiana*) A 164 (7 β b)
Asclepiadea L. 351 (4), A 164
bavarica L. 358 (10)
biloba DC. = punctato × lutea
brachyphylla Vill. 353 (9 ε)
Burseri Lap. 350 (3 β)
calycina Koch (obtusifol.) = seg.
calycina Wettst. 355 (16 β)
campanulata Jacq. 350 (3 α b)
campestris L. 355 (15), A 164
candida E. De Toni (*Amarella*) 355 (*nota*), A 165 (16 η b)
carinthiaca Frœl. = Pleurogyne carinth.

Digitized by Google

GENTIANA II 349 (708)
carnica M. Gortani (*Amarella*) A 164 (16 β')
carnica Welw. = Frœlichii
caulescens R. Keller (*alpina*) A 164 (7 δ b)
caulescens Lam. = angustifolia
Centaurium L. = Erythræa Cent.
Centaur. β L. = Erythræa pulchella
Charpentieri Thom. = punct. × lutea
chlorœfolia Nees = spathulata, norica
ciliata L. 354 (14), A 164
Clusii Perr. et Song. 351 (7 α), A 164
Columnæ Ten. = neapolitana
compacta Heg. A 215 (16 var.)
concolor Koch (punctata) = campanulata
cruciata L. 352 (8)
cruciata Wartm. et Schl. (*Asclepiad.*) A 164 (4 b)
Favratii Rittn. (*verna*) A 215 (9 var.)
filiformis L. = Cicendia fil.
flavida Gremli (*purpur.*) A 164 (2 var.)
frigida Hænke 356 (nota)
Frœlichii Jan 351 (6)
excisa Koch = Kochiana
excisa Presl = alpina
elongata Hænke 358 (9 α b)
Gaudiniana Thom. = purpur. × punct.
Gelmii Fiori (*calycina*) 355 (16 β b)
Gentianella Wettst. (*Sturmiana*) 355 (16 ε b)
germanica Frœl. (*campestr.*) A 164 (15 α c)
germanica W. 356 (16 ζ)
glacialis Thom. 356 (17 β)
gracilis Nees = Sturmiana
hybrida Schleich. = purpur. × lutea
hybrida Vill. = Burseri
imbricata Frœl. 358 (9 δ), A 164
imbricata Schleich., Ten. = rotundifol.
islandica Murbeck. (*campestr.*) 164 (15 α a)
Kœnigii Gunn. = tenella
Kochiana Perr. et Song. 352 (7 β), A 164
Længstii Hausm. = punct. × lutea
latifolia Gr. et Godr. (acaul.) = Kochiana
latifolia Rchb. (*Pneumon.*) 351 (5 b)
leptina Raf. = Erythræa leptina
lutea L. 350 (1), A 164
macrophylla Bert. (non Poll.) = Burseri
maritima L. = Erythræa mar.
uniflora W. = Gentianella
minima Vill. = nivalis
minor G. W. F. Meyer (*german.*) 356 (16 ζ)

GENTIANA II 349 (708)
minor Koch (excisa) = alpina
Murbeckii Kern. = compacta
nana All. = tenella
nana Wulf. 356 (17 γ)
neapolitana Frœl. (*campestris*) 355 (15 β)
neapolitana Wettst. = prec.
nivalis L. 354 (12)
norica Kern. 356 (nota)
obtusiflora Ugolini (*Clusii*) A 164 (7 α a)
obtusiflora Ugolini (*Kochiana*) A 164 (7 β a)
obtusifolia W. 356 (16 θ)
orbicularis Schur = rotundifolia
palustris All. = Swertia perennis
pannonica Scop. 350 (2 β)
parvifolia Gr. et Godr. (acaul.) = alpina
pectinata Wartm. et Schl. (*Asclepiad.*) A 164 (4 a)
perfoliata L. = Chlora perfol.
pilosa Wettst. 355 (16 ϑ)
Pneumonanthe L. 351 (5)
prostrata Hænke 354 (13)
prostrata Whlnb. = rotundifolia
pseudo-germanica Gelmi (*calycina*) 355 (16 β c)
pseudo-pyrenaica Ces. (*nival.*) 354 (12 b)
pulchella Sw. = Erythræa pulchella
pumila Jacq. 358 (9 γ)
punctata Jacq. = pannonica
punctata L. 350 (3)
punctata Vill. = Burseri
punctato × lutea 350 (nota)
purpurea L. 350 (2)
purpurea Vill. = punctata
purpureo × lutea Griseb. 350 (nota)
purpureo × punctata Griseb. 350 (nota)
pusilla Lam. = Cicendia pus.
pyramidalis Fiori (*obtusifol.*) 356 (16 θ b)
pyramid. Nees. = prec.? 356 (nota)
ramosissima Vill. = Erythræa ramosiss.
rhætica A. et J. Kern. 356 (16 η), A 165
Rostani Reut. 358 (10 β)
rotundifolia Hpe. 358 (10 α b)
rubra Clairv. = purpur. × lutea
sabauda Reut. = angustifolia
schystocalyx Koch (*Asclep.*) 350 (4 b)
spathulata Bartl. 356 (nota)
spicata L. = Erythræa spic.
solstitialis Wettst. A 215
Sturmiana A. et J. Kern. 356, A 165 (16 ε)
submucronata Ugolini (*Clusii*) A 164 (7 α c)
suecica Mœnch (*campestr.*) A 164 (15 α b)
tenella Rottb. 356 (17)
tenuiflora Jan = Amarella (var.?)

GENTIANA II 349 (708)
tergestina Beck. 358 (9 β b)
tergloviensis Hacq. = imbricata
Thomasiana Gaud. = seg.
Thomasii Gillaboz., Hall. f. = purpur. = lutea
utriculosa L. 354 (11)
verna L. 352 (9), A 164, 215
GENTIANELLA = Gentiana
ciliata Borckh. = G. cil.
Cruciata Mœnch = G. Cruc.
fimbriata Delarb. = G. ciliata
tetrandra Mœnch = G. campestris
GEOCARYUM = Bunium
capillifolium Coss. = B. capill.
GEORGIA = Cosmos
bipinnata Spr. = C. bipinn.
GEORGINA = Dahlia
variabilis W. = D. pinnata
GERACIUM = Crepis
aureum Rchb. = C. aur.
chondrilloides Rchb. = Cr. Jacquini
croaticum Rchb. = C. mollis α croat.
incarnatum Rchb. = C. inc.
molle Schur = C. mollis
paludosum Rchb. = C. palud.
parviflorum Rchb. = C. Frœlichiana
præmorsum Rchb. = C. præm.
prenanthoides Rchb. = Hierac. pren.
succisæfolium Rchb. = C. mollis β succis.
GERANIUM II 238 (625)
abortivum Barbazita 236 (nota)
abortivum DNtrs. 236 (5 β e)
abortivum A. Terr. (*molle*) 235 (5 α f)
aconitifolium L'Hér. = rivulare
æthiopicum Lam. = Erod. Jacquinianum
albiflorum Goir. (*columbin.*) A 158 (10 b)
albiflorum Goir. (*rotundif.*) A 158 (9 c)
albiflorum Lev. (*purpur.*) 234 (2 β e)
alpinum Burm. f. = Erod. alp.
alpinum Ten. (*Robert.*) 234 (2 γ)
angustifolium Gilib. = dissectum
angustisectum Beck (*silvat.*) 239 (18 α b)
arenarium A. Terr. (*molle*) 235 (5 α e)
argenteum L. 238 (13)
asphodeloides Burm. f. 239 (17)
batrachioides Cav. = silvaticum (α)
batrachioides Rupr. = pratense
bipinnatum W. = Erod. bipinn.
bohemicum Auct. (non L.) = lanuginosum
bohemicum Krock. = divaricatum
Botrys Cav. = Erod. Botr.
brachypetalum Lamotte (silvestre) = parviflorum

Digitized by Google

GERANIUM II 233 (625)
brutium Gasp. = villosum
brutium N. Terr. = pollinense
cæruleo-purpureum Gilib. = silvaticum (α)
cæruleum Gilib = pratense
Chærophyllum Cav. = Erod. Chæroph.
chamædryoides Cav. = Erod. Reichardii
chium Burm. f., L. = Erod. chium
Ciconium L. = Erod. Cicon.
cicutarium L. = Erod. cicut.
cineraceum Lap. = cinereum
cinereum Cav. 238 (14), A 158
columbinum L. 237 (10), A 158
corsicum Poir. = Erod. cors.
crassifolium Cav. = Erod. alnifolium
delicatulum Ten. et Guss. 237 (7 β)
diffusum Ten. (*pyren.*) 236 (6 e)
diffusum Ten. (*villosum*) 235 (5 β b)
dissectum L. 237 (11)
divaricatum Ehrh. 237 (8)
divaricatum Lois. = lanuginosum
dubium Chaix = humile
elatum Ten. (*villosum*) 236 (5 β d)
emarginatum Goir. (*rotundifol.*) A 158 (9 b)
fœtidum Gilib. = Robertianum
fuscum L. 235 (4 α b)
grandiflorum Gilib. = sanguineum
grandiflorum Lge. (molle) = villosum
grandiflorum Vis. (*molle*) 235 (5 α b)
gruinum L = Erod. gruin.
humile Cav. 236 (7 α b)
laciniatum Cav. = Erod. lacin.
Lancastriense With. = prostratum
lanuginosum Lam. 238 (12), A 158
latifolium Parl. (*sanguin.*) 239 (15 c)
latisectum Beck (silvat.) = silvat. (α a)
latisectum Evers (sanguin.) = latifol.
lejocarpum Guss. (*pyren.*) A 158 (6 for.)
lividum L'Hér. 235 (4 α c)
lucanum Gasp. 236 (nota)
lucidum L. 234 (3)
luganense Chenev. A 158 (×)
macropetalum Boiss. (molle) = villosum
macropetalum Posp = prec.
macrorrhizum L. 234 (1), A 157
malachoides L. = Erod. malach.
malachoides β L. = Erod. marit.
malvæfolium Gærtn. M. et Sch. = rotundifol.
malvæfolium Vill. = humile
maritimum Burm. f., L. = Erod. mar.
mediterraneum Jord. 234 (2 β c)

GERANIUM II 233 (625)
meridionale A. Terr. (*silvat.*) 239 (18 α d)
Minaæ Tin. 236 (6 c)
minutiflorum Jord. 234 (2 β d)
modestum Jord. 234 (2 β b)
molle L. 235 (5), A 157
molle × pyrenaic. Chenev. = luganense
montanum A. Terr. (*molle*) 236 (nota)
montanum A. Terr. (*pyren.*) 236 (6 b)
montanum N. Terr. (lucidum) = alpinum Ten.
moschatum Burm. f., L. = Erod mosch.
muroicum Cav. = Erod. muro.
neapolitanum A. Terr. = alpinum Ten.
nebrodense Tin. ex Strobl = pyrenaicum (a)
nemorosum Ten. = asphodeloides
nodosum L. 240 (21), A 158
novum Winterl. = divaricatum
numidicum Poir. = Erod. Jacquinianum
palustre All. = silvaticum
palustre L. 240 (20)
parviflorum Evers = purpureum
parviflorum Evers (*sanguin.*) A 158 (15 d)
parviflorum Knáf (*silvat.*) 239 (18 α c)
parviflorum Viv. (Robert.) = purpureum
parvulum Scop. = Erod. marit.
parvulum Ten. (*molle*) 235 (5 α d)
parvulum N. Terr. (*striatum*) 240 (22 b)
patulum Vill. = lividum
perenne Huds. = pyrenaicum
Perreymondi Shuttl et Huet = lanuginosum
phæum L. 235 (4)
phæum Seb. et Maur. = reflexum
pimpinellæfolium Mœnch = Erod. cicutar. (α)
pollinense A. Terr. 236 (5 γ)
pollinense A. Terr. (molle) = prec.
pratense L. 240 (19)
prostratum Cav. 238 (15 b), A 158
purpureum Gilib. = palustre
purpureum Vill. 234 (2 β), A 157
pusillum Burm. f., L. 236 (7), A 158
pygmæum A. Terr. (molle) = parvulum
pyrenaicum Burm. f., L. 236 (6), A 158
radicatum M. B. = tuberosum
reflexum L. 235 (4 β)
Reichardii Murr. = Erodium Reichardii
rivulare Vill. 240 (18 β)
Robertianum L. 234 (2), A 157

GERANIUM II 233 (625)
romanum Burm. f., L. = Erod. roman.
roseo-cæruleum Gilib. = columbinum
rotundifolium L. 237 (9), A 158
rotundif. β Pollini = emarginat.
sanguineiforme Rouy = latifolium?
sanguineum L. 239 (15), A 158
Seguieri Paol. (*molle*) 235 (5 α g)
silvaticum L. 239 (18)
silvaticum Uoria = striatum
stipulare Kunze = villosum
striatum L. 240 (22)
subcæruleum Schleich. = lividum
subcaulescens L'Hér. = cinereum
subvillosum Schur (*pyren.*) A 158 (6 for.)
succulentum Evers (parvifl.) = seg.
succulentum Fiori (*purpur.*) A 157 (2 β for.)
tenuisectum A. Terr. (*molle*) 235 (5 α c)
triviale A. Terr. (*molle*) 235 (5 α a)
tuberosum L. 239 (16)
umbrosum W. et K. 236 (6 d)
varium L'Hér. = cinereum
versicolor L. = striatum
villosissimum Ten. (*villosum*) 236 (5 β e)
villosum Rchb. = grandiflorum
villosum Sauter (*pusillum*) A 158 (7 α c)
villosum Ten. = molle
viscidulum Fr. = rotundifol.
viscosum Gilib. = rotundifol.
Winterli Roth = divaricatum

GEROPOGON III 406 (940)
australis Spr. = glaber
calyculatus Jacq. = Scorzonera hirsuta
glaber L. 407
hirsutus All. = Scorzonera hirs.
hirsutus L. 406 (b)

GEUM I 564 (459)
ambiguum Schur = rivali × urban.
ascapum Goir. (*montan.*) A 117 (5 c)
atlanticum Desf. = silvaticum
australe Guss. (*urban.*) A 117 (2 β)
biflorum Brot. = silvaticum
Billietii Gillot = mont. × rivale
caryophyllata Gilib. = urbanum
Ehrharti Scheutz (intermed.) = rivale × urban.
hirsutum N. Terr. (*rivale*) A 117 (1 b)
hispidum Wk. et Lge. (non Fr.) = molle
humile Schur, Goir. (*rivale*) A 117 (1 c)
hybridum Wulf. = mont. × rivale
inclinatum Schleich = mont. × rivale

Digitized by Google

GEUM I 564 (459)
intermedium Ehrh. = rivali × urban.
intermedium Guss. = australe
intermedium Ten. = molle
micropetalum Gasp. 566 (nota)
molle Vis. et Panc. 565 (8), A 117
montanum L. 566 (5), A 117
montan. × *reptans Brügg.* A 117
montan. × *rivale Rchb.* 566, A 117
nanum Gaud. (*montan.*) A 117 (5 b)
nutans Crantz = rivale
platylobum Rouy et Cam. (*urban.*) A 117 (2 α a)
pyrenaicum Mill., W. 565 (4)
pyrenaicum Ram. = silvaticum
pyrenaicum Ten. = molle
reptans L. 566 (6), A 117
rhæticum Brügg. = mont. × reptans
rivale L. 565 (1), A 117
rival. × mont. Asch. et Græbn. = mont. × riv.
rival. × *urbanum G. Meg.* 565
rubifolium Lej. = rivali × urban.
silvaticum Pourr. 566 (4 β)
stenolobum Rouy et Cam. (*urban.*) A 117 (2 α b)
sudeticum Tausch = mont. × rivale
Thomasianum Ser. = mont. × rivale
tyrolense A. Kern. = mont. × rivale
Tournefortii Lap. = pyrenaicum
urbanum L. 565 (2), A 117
urban. × rivale Rchb. = rivali × urb.
villosum Bruegg. (*reptans*) A 117 (6 b)
Willdenowii Buek = rivali × urban.
GEUM = Saxifraga
rotundifolium Mœnch = S. rot.
GIFOLA = Filago
canescens Fourr. = F. can.
germanica Rchb. = F. german.
lutescens Fourr. = F. lut.
pyramidalis Dum. = seg.
spathulata Rchb. f. = F. spath.
vulgaris Cass. = F. germanica
GIGACHILON = Triticum
polonicum Seidl = T. polonic.
GITHAGO = Agrostemma
macrocalyx Schur (seget.) = A. — nicæensis
nicæensis Lk. = A. — nic.
segetalis St.-Lag. = seg.
segetum Lk., Desf. = A. Githago
GLADIOLUS I 227 (222)
albiflorus Parl. (*paluster*) 227 (1 b)
Borneti Ardoino = segetum
Boucheanus Schlecht. = paluster
byzantinus Mill. 228 (4 β)
communis L. 228 (4), A 52
GLADIOLUS I 227 (222)
communis S. et S. etc. = segetum
dubius Guss. = communis (α)
etruscus Levier (inarimensis) = inarimensis
galiciensis Bess. = imbricatus
illyricus Koch 228 (2 β), A 52
imbricatus L. 228 (2), A 52
inarimensis Guss. 228 (3 β)
infestus Bianca = segetum
italicus Gaud. = segetum
Ludoviciæ Jan. = segetum
Ludoviciæ Sieb. exs. = byzantinus
neglectus Schult. = imbricatus
Notarisii Parl. = communis (α)
paluster Gaud. 228 (1)
parviflorus Schur = imbricatus
pratensis Dietr. = paluster
pyramidalis Burm. = Antholyza æthiopica
rossicus Pers. = imbricatus
segetum Ker-Gawl. 228 (3), A 52
serotinus Welw. = illyricus
spathaceus Parl. 228 (3 α b)
tenuiflorus C. Koch = segetum
tenuis M. B. = imbricatus
tenuis Salzm. = paluster
triphyllus Bert. etc. (non Sibth.) = paluster
vexillaris Martelli A 52 (3 γ)
GLANDULA = Astragalus
leontina Medic. = A. leont.
GLAUCIUM I 483 (417)
aurantiacum Martr. 484 (2 d)
aureum C. Koch = flaviflorum
corniculatum Curt. 484 (2), A 102
flaviflorum DC. (*cornicul.*) 484 (2 e)
flavum Crantz 484 (1), A 102
fulvum Sm. = flavum
glabratum Wk. (*flavum*) A 102 (1 b)
glaucum Mœnch = flavum
hybridum Dum.-Cours. = Rœmeria hybrida
intermedium Lk. = corniculat.
litorale Salisb. = flavum
luteum Scop. = flavum
phœniceum Crantz 484 (2 a)
rubrum S. et S. 484 (2 b)
spurium Stev. = Rœmeria hybr.
tricolor Bernh. 484 (2 c)
tricolor Godr. = luteum
trivalve Mœnch = Rœmeria hybrida
vestitum Wk. (flavum) = flavum (a)
violaceum Juss. = Rœmeria hybrida
GLAUX II 325 (686)
maritima L. 325
GLAUX = Astragalus
astragaloides Medic. = A. Cicer
GLEBIONIS = Chrysanthemum
Roxburghii Cass. = C. coronarium
segetum Fourr. = C. seg.
GLECHOMA III 25 (786)
acutiloba Neum. (*heder.*) 26 (1 α b)
GLECHOMA III 25 (786)
arvensis L. = Stachys arven.
belgica L. = prec.
borealis Bég. (*heder.*) 26 (11 α a)
borealis Salisb. = prec.
grandiflora DC. = Stachys corsica
hederacea L. 26 (1)
heterophylla Opiz 26 (2 β)
hirsuta W. et K. 26 (2), A 172
intermedia Schrad. = heterophylla
magna Mérat = hederacea
major Gaud. (*heder.*) 26 (1 α d)
Marrubiastrum Vill. = Stachys arvens.
meridionalis Bég. (*hirsuta*) 26 (2 α b)
parviflora Sonder (*heder.*) 26 (1 α c)
pubescens Ces. (*heder.*) 26 (11 α e)
repens Gilib. = hederacea
rigida Kern. = hirsuta
rotundifolia Raf. = hederacea
sardoa Bég. (*heder.*) 26 (11 β)
subulata Moric. (*hirsuta*) 26 (2 α c)
villosa Koch (heder.) = heterophylla
GLEDITSCHIA II 7 (475)
polysperma Stokes = triacanth.
spinosa Marsh. = triacanth.
triacanthos L. 8
GLINUS I 330 (315)
dictamnoides Lam. = lotoid.
lotoides L. 330
setiflorus Forsk. = lotoid.
GLOBOCARPUS = Œnanthe
œnanthoides Caruel = Œ. globulosa
GLOBULARIA III 90 (813)
albiflora Fiori (*Alypum*) 91 (4 b)
alpina Salisb. = nudicaul.
Alypum L. 92 (4)
bellidifolia Rouy (cordifol.) = cordifol. (α)
bellidifolia Ten. 91 (3 β)
collina Salisb. = vulgar.
cordifolia L. 91 (3)
elongata Heg. 90 (1 b)
glauca Balb. ex Steud. = seg.
incanescens Viv. 92 (5)
integrifolia Ten. (*cordif.*) 91 (3 α a)
intermedia Rouy (cordifol.) = bellidifol.
latifolia Wk. (*vulg.*) 90 (1 e)
linifolia Lam. = vulgar.
Linnæi Rouy = vulgar.
microcephala Wk. (*vulg.*) 90 (1 f)
minima Vill. = cordifolia (α ?)
multicaulis Ten. ex Nym. = vulg
nana Cambes (cordif.) = seg.
nana Lam. = repens
nudicaulis L. 91 (2)
repens Lam. 91 (3 γ)
saxatilis Salisb. = cordifolia
squamosa Wk. (*vulg.*) 90 (1 d)
subacaulis A. DC. (*vulgar.*) 90 (1 c)

Digitized by Google

GLOBULARIA III 90 (813)
tridentata Avè-Lall. (*cordif.*) 91 (3 α b)
Turbith WK. = Alypum
virgata Salisb. = Alypum
vulgaris L. 91 (1)
Willkommi Nym. = vulgaris
GLOMERARIA = Amarantus
bicolor Cav. ex Moq. = A. melancholicus
deflexa Cav. = A. deflexus
viridis Cav. = A. græcizans
GLOTTIS = Astragalus
echinata Medic. = A. Pentaglottis
Epiglottis Medic. = A. Epigl.
Pentaglottis Medic. = A. Pent.
GLYCE = Alyssum
maritima Lindl. = A. mar.
GLYCERIA I 88 (114)
acuminata Schur = Festuca elatior × Lol. perenne
airoides Rchb. = seg.
aquatica Presl = Catabrosa aquat.
aquatica Whlnb. 89 (2), A 24
Borreri Bab. 89 (3 α c)
capillaris M. et K. = festucæform.
Catabrosa Kl. et Richt. = Catabr. aquatica
conferta Fr. 89 (3 α b)
convoluta Fr. 89 (3 β)
deflexa Syme (*marit.*) 89 (3 δ b)
distans Guss. = convoluta
distans Whlnb. 89 (3), A 24
festucæformis Guss. = convoluta
festucæformis Heynh. 89 (3 ε), A 24
fluitans Presl, Guss. = plicata
fluitans R. Br. 88 (1), A 24, 204
Gussonei Nym. = convoluta
intermedia Klinggr. = distans
loliacea Godr. = Festuca elatior × Lol. perenne
maritima Auct. it. (an p. p.?) = pseudo-distans (cfr. A 24)
maritima Whlnb., M. et K. 89 (3 δ), A 24
minor Lang. (*plicata*) A 204 (1 β for.)
obtusiflora Sonder (fluit.) = plicata
ochroleuca Dum. = Catabrosa ochrol.
permixta Guss. 89 (3 γ)
plicata Fr. 88 (1 β), A 204
procumbens Dum., Sm. = Sclerochloa proc.
pseudo-distans Crép. A 24 (3 δ')
rigida Sm. = Sclerochloa rig.
spectabilis M. et K. = aquatica
Sphenopus Steud. = Sphenop. divaricatus
spicata Guss. 88 (1 γ)
triticea Fr. (*fluit.*) A 24 (1 α b)
vivipara Pollini (*aquat.*) 89 (2 b)
GLYCINE = Kraunhia
Apios L. = Apios tuberosa
chinensis Sims = K. floribunda
floribunda W. = K. flor.
GLYCYRRHIZA II 86 (499)
Dioschoridis Medic. = seg.
echinata L. 86 (2), A 142
glabra L. 86 (1)
officinalis Lepech. = prec.
vulgaris Gueld. glabra.
GNAPHALIUM III 277 (883)
acaule Sieb. 279 (5 α c)
alpestre Bruegg. (silvat.) = Einseleanum
alpinum Neilr. (silvat.) = Hoppeanum
alpinum W. (non L.) = Antennaria carpathica
angustifolium Lam., Ten. = Helichrys. litoreum
angustifolium Moris = Helichrys. saxatile (α)
aquaticum Mill. = uliginosum
arvense L. = Filago arven.
arvense Ten. = Filago minima
asteriscoflorum Lam. = Evax asterisc.
Barrelieri Ten. = Helichrys. siculum
bellidiflorum Viv. = Helichrys. frigidum
cæspitosum Presl (non Lam.) = Helichrys. siculum
calabrum Ten. = Filago Lagopus
carpathicum Whlnb. = Antennaria carpathica
citrinum Gaud. p. p. (silvat.) = stramenticium
citrinum Lam. = Helichrys. Stœchas
conglobatum Mœnch = luteo-album
Cupanianum Guss. = Filago heterantha
decumbens Bert. (non Lag.) = Helichrys. siculum
dioicum L. = Antennaria dioica
Einseleanum F. Schultz 279 (4 α c)
elatius Gaud. (alpin.) = Antennaria carpathica
elegans Presl = Helichrys. siculum
fuscatum Pers. = norvegicum
fuscatum Ten. (silvat.) = silvat. (α)
fuscum Lam. = norvegicum
fuscum Scop. 279 (5 α b)
gallicum L. = Filago gallica
germanicum L. = Filago german.
glabrum Rchb. (uligin.) = nudum
glomeratum Huter P. et R. (*luteo-alb.*) 278 (2 d)
glutinosum Gasp. = Helichrys. italicum (α)
glutinosum Ten. = Helichrys. glutin.
heteranthum Raf. = Filago heterantha
Hoppeanum Koch 280 (5 β)
inodorum Desf. (Stœchas) = Helichrys. inod.
italicum Roth = Helichrys. ital.
Lagopus Steph. = Filago Lagop.
GNAPHALIUM III 277 (883)
lanuginosum Duby (german.) = Filago eriocephala
latifolium Gaud. (*norveg.*) 279 (4 β b)
Leontopodium L. = Leontopod. alpinum
litoreum Bert. = Helichrys. litor.
Lobelii Ten. 279 (4 α d)
luteo-album L. 278 (2)
magellense Fiori (*Hoppean.*) 279 (5 β b)
microphyllum Ten. = Helichrys. siculum
microphyllum W. = Helichrys. microph.
minimum Sm. = Filago minima
minus Moris (angustifol.) = Helichrys. microphyllum
montanum L., Huds. = Filago minima
montanum Neilr. (silvat.) = silvat. (α)
neglectum Soy.-Will. = Filago neglecta
nivale Ten. = Leontopodium — nivale
norvegicum Gunner 279 (4 β)
nudum DC. (pilulare) = seg.
nudum Hoffm. 278 (3 α b)
orientale Zeraph. (non L.) = Helichrys. rupestre
pedunculare Ten. (non L.) = Filago Lagopus
pendulum Bert. = Helichrys. scandens
pendulum Presl = Helichrys. pendul.
pilulare Whlnb. 278 (3 β c)
pompeianum Ten. 278 (2 b)
prostratum Huet (uligin.) = seg.
prostratum Nym. 278 (3 β b), A 185
pulcrum Steud. = Helichrys. siculum
pusillum Hænke = acaule
ramosum Lam. 278 (3 β), A 185
rectum Huet = Lobelii
rectum Sm. 279 (4 α)
rosmarinifolium Salzm. = Helichrys. italicum (α)
rupestre Raf. = Helichrys. rupestre
saxatile Bert. = Helichrys. stramin. et saxatile
scandens Sieb. = Helichrys. scand.?
silvaticum L. 279 (4)
Sophiæ Heldr., Nym. = Lobelii
sordidum L. = Phagnalon sord.
spadiceum Gilib. (non Lam.) = virgatum
sphæricum Perr. 278 (2 c)
Stœchas L. = Helichrys. Stœchas
Stœchas Ten., Bert. etc. = Helichrys. italicum
stramenticium Beck (*silvat.*) 279 (4 α e)
subacaule Whlnb. (supin.) = acaule

Digitized by Google

GNAPHALIUM III 277 (888)
subalpinum Neilr. (silvat.) = norvegicum
supinum Huet et Auct. pl. it. = Hoppeanum
supinum L. 279 (5)
tomentosum Hoffm. 278 (8 α)
uliginosum Bert. et Auct. it. = ramosum
uliginosum DC. = uligin. (α)
uliginosum L. 278 (3), A 185
umbrosum Ambrosi (silvat.) = norvegicum
undulatum L. 277 (1)
uniflorum L. Vacc. (supin.) = acaule
virgatum Kitt. (*silvat.*) 279 (4 α b)
viride Neilr. (uligin.) = nudum
Wirtgeni Nym. = ramosum
GNAPHALODES = Micropus
dentata Mœnch = M. supinus
erecta Mœnch = M. erectus
GOMPHOCARPUS = Asclepias
fruticosus R. Br. = A. frut.
GONIATICUM = Polygonum
solitarium Stokes = P. Orientale
GONIPIA = Gentiana
pulchella Raf. = Erythræa pulch.
pumila Raf. = G. pumila
rotundifolia Raf. = G. bavarica
sicula Raf. = quid?
GONOGONA = Goodyera
repens Lk. = G. rep.
GONONCUS = Polygonum
undulatus Raf. = P. alpinum
GONTARELLA = Isopyrum
tertiaria Gilib. = I. thalictroides
GOODYERA I 250 (239)
repens R. Br. 250
GOSSYPIUM II 269 (646)
herbaceum L. 270 (1)
hirsutum L. 270 (1 β)
siamense Ten. = herbaceum
GRAFIA = Hladnikia
Golaka Rchb. = Hl. Golaka
GRAMMARTHRON = Doronicum
biligulatum Cass. = D. hirsutum
scorpioides Cass. = D. grandifl.
GRAMMICA = Cuscuta
Chrysocoma Des Moul. = seg.
obtusiflora Berthiot. = C. australis
suaveolens Des Moul. = C. racemosa
GRAMMITIS = Gymnogramme
Ceterach Sw. = Ceterach offic.
leptophylla = Gymn. leptoph.
GRAMMOCARPUS = Trigonella
cæruleus Schur = T. cær.
GRAMMOSCIADIUM = Chærophyllum
coloratum Calestani = Ch. color.
GRANGEA = Dichrocephala
latifolia Lam. = D. latifolia
GRANTIA = Wolffia
globosa Griff. = W. arrhiza
GRAPHIOSA = Lathyrus
inconspicua Alef. = L. inconsp.
GRATIOLA II 431 (756)
angustifolia Gilib. = seg.
officinalis L. 431
GREGORIA = Douglasia
lutea St.-Lag. = seg.
Vitaliana Duby = D. Vital.
GROSSULARIA = Ribes
glanduloso-setosa Opiz = R. Grossularia (α a)
hirsuta Mill. = R. Grossularia
intermedia Opiz = R. Grossularia
nigra Mill. = R. nigrum
pubescens Opiz = R. Uva-crispa
reclinata Mill. = R. reclin.
rubra Scop. = R. rubrum
Uva Scop. = R. Grossularia
Uva-crispa Mill. = R. Uva-cr.
vulgaris Spach = R. Grossularia
GRUENERA = Salix
amygdaloides Opiz = S. amygdalina
GUENTHERA = Brassica
elongata Andrz. = B. elong.
GUEPINIA = Teesdalea
Iberis DC. = T. Iberis
Lepidium DC. = T. regularis
nudicaulis Bast. = T. Iberis
GYMNADENIA I 246 (231)
albida Rich. 247 (1), A 55
albiflora Fiori (*odoratiss.*) A 209 (2 e)
albiflora Goir. (conopsea) = ornithis
bifolia Mey. = Platanthera bif.
chlorantha Ambr. = Platanthera montana
conopsea R. Br. 247 (3), A 56
conopsea × *odoratissima* A 56
diphylla Lk. = Cœlogloss. diphyllum
erubescens Zucc. = odoratissima
humilis Lindl. = Orchis quadripunctata
Idæ Goir. (*odoratiss.*) A 56 (2 b)
Linkii Presl = Orchis intacta
lucida Schur = albida
nigra Rchb. f. = Nigritella nigra
odoratissima Rich. 247 (2), A 55, 209
odoratiss. b. Parl. = roseiflora
odoratiss. c. Parl. = albiflora
ornethia Schur = conopsea
ornithis Rich. A 209 (3 b)
o yglossa G. Beck (*odoratiss.*) A 56 (2 c)
roseiflora Fiori (*odoratiss.*) A 209 (2 d)
rubra Wettst. = Nigritella rubra
sibirica Turcz. = conopsea
suaveolens Rchb. = odoratissima
transsilvanica Schur = conopsea
GYMNADENIA I 246 (231)
tricuspis G. Beck (*albida*) A 55 (1 b)
viridis Rich. = Cœlogloss. viride
GYMNIGRITELLA = Nigritella × Gymnadenia
suaveolens G. Cam. = N. nigra × G. conopsea
GYMNOCLINE = Chrysanthemum
leucocephala Cass. = seg.
macrophylla Bluff et Fing. = Ch. macroph.
GYMNOGRAMME I 6 (4)
leptophylla Desv. 6 (1), A 2
Marantæ Mett. = Notholæna Mar.
spectabilis Zum. A 2 (?)
GYMNOLEIMA = Lithospermum
graminifolium Decne. = L. suffruticos
rosmarinifolium Decne. = L. rosmar.
GYMNOMESIUM = Arum
pictum Schott = A. pictum
GYNANDRIRIS = Iris
monophylla Klatt. = I. Sisyrinchium
sicula Tod. exs. = I. maculata
Sisyrinchium Parl. = I. Sisyr.
Sisyr. b. Parl. = I. — albiflora
GYPSOCALLIS = Erica
carnea D. Don = E. carnea
multiflora D. Don = E. multiflora
vagans S. F. Gray = E. vagans
GYPSOPHILA I 372 (343)
aggregata L. Sp. = Arenaria aggr.
aggregata Moris (saxifraga) = Tunica rigida
agrestis Pers. = muralis
altissima S. et S. (non L.) = Arrostii
arenicola Duf. = Tunica saxifr.
armerioides Ser. = Tunica arm.
Arrostii Guss. 378 (4), A 77
arvensis Borckh. = muralis
benacensis Rigo (fastigiata) = papillosa
cretica Auct. it. = Tunica compressa
cretica Griseb. = illyrica
cretica S. et S. = Tunica cret.
dianthoides Auct. it. = Tunica saxifr.
dianthoides Guss. (non S. et S.) = Tunica rigida
elegans M. B. 378 (5)
eubonensis Sibth. ex Guss. = Tunica rigida
fastigiata L. A 77 (1215 * oss.)
fastigiata Rigo = papillosa
fastigiata Vis. = Visianii
Gasparrinii Guss. = Tunica Gasp.
glaberrima Strobl (*Arrostii*) A 77 (4 a)
glomerata Ten. (saxifr.) = Tunica rigida
hispanica Wk. A 77 (3 bis)
illyrica S. et S. = Tunica armerioides

Digitized by Google

GYPSOPHILA I 372 (343)
illyrica Ten., Nym. = Tunica illyr.
multicaulis Poir. = Tunica saxifr.
muralis L. 373 (2)
nebulosa Boiss. = Arrostii
ochroleuca S. et S. = Tunica ochr.
paniculata Auct. it. (non L.) = repens
papillosa Porta A 77 (3 bis β)
permixta Guss. = Tunica — perm.
porrigens Boiss. 373 (1)
prolifera Arc. = Tunica prol.
prostrata All. (an L.?) = repens
pubescens Guss. (*Arrostii*) A 77 (4 b)
pulposa Gilib. = fastigiata
purpurea Gilib. = muralis
repens L. 373 (3)
rigida L. = Tunica rig.
rigida S. et S., Rchb. = Tunica saxifr.
saxifraga L. = Tunica sax.
sicula Jan (paniculata) = Arrostii
Struthium Asso (non L.) = hispanica
Vaccaria S. et S. = Saponaria Vacc
velutina D. Dietr. = Tunica vel.
Visianii Bég. A 77 (1215 * oss.)
GYROSTACHIS = Spiranthes
æstivalis Dum. = S. æst.
autumnalis Dum. = S. aut.

HABENARIA
albida R. Br., Sw. = Gymnad. alb.
bifolia R. Br., Sw. = Platanth. bifol.
bracteata R. Br. = Cœlogloss. bract.
chlorantha Bab. = Platanth. montana
conopsea Benth. = Gymnad. conops.
cordata R. Br. = Cœlogloss. diphyllum
densiflora Schur = Gymnad. albida
fornicata Bab. = Platanth. bifolia
intacta Benth. = Orchis intacta
nigra R. Br. = Nigritella nigra
odoratissima Fr. = Gymnad. odorat
viridis R. Br. = Cœlogloss. viride
HACKELIA = Lappula
deflexa Opiz = L. defl.
HACQUETIA II 151 (542)
Epipactis DC. 151, A 149
HÆNSELERA = Physospermum
danaæformis Lag. = Ph. aquilegifolium
HAGÆA = Polycarpon
alsinefolia Biv. = P. alsin.
polycarpoides Biv. = P. Cupanii
HAHNIA = Pirus
Aria Medic. = P. Aria
Chamæmespilus Medic = P. Cham.
edulis Dippel (Aria) = P. edulis
græca Dippel (Aria) = P. græca
Hostii Dippel = P. Aria × Chamæmesp.
torminalis Medic. = P. tormin.
HALIMIUM = Helianthemum
alyssoides Lamotte = H. guttatum
Clusii Spach = Cistus Clusii
halimifolium Wk. et Lge. = H. halimifol.
lepidotum Spach = H. halim.
planifolium Wk. (halimifol.) = H. halimifol.
umbellatum Spach = H. umbell.
HALIMUS = Atriplex
australis Nees = A. portulacoides
borealis Nees = A. portulac.
portulacoides Dum. = A. port.
HALMYRA = Pancratium
illyrica Salisb. = P. illyricum
stellaris Salisb. = prec.
HALOCNEMUM I 317 (298)
amplexicaule Tin. ex Ung. = Halopeplis amplex.
cruciatum Tod. = strobilac.
fruticosum A. Dietr. = Salicornia frut.
glaucum Presl = prec.
nodulosum Spr. = Halopeplis amplexicaulis
strobilaceum M. B. 317, A 65
HALOGETON I 318 (301)
sativa Moq. 318
HALOPEPLIS I 317 (299)
amplexicaulis Ung. 317, A 65
nodulosa Bunge = amplexicaul.
perfoliata Schweinf. et Asch. = amplexicaul.
strobilacea Ces. P. et G. = Halocnemum strob.
HALOSEPALUM = Hypericum
dubium Fourr. = H. quadrangulum
HALOSTACHYS = Halopeplis
nodulosa C. A. Mey. = H. amplexicaulis
perfoliata Moq. p. p. = prec.
HAMILTONIA = Comandra
elegans Rchb. = C. elegans
HAMARIA = Astragalus
uncinata Fourr. = A. hamosus
HAMOSA = Astragalus
Astragalus Medic. = A. hamosus
glyciphylla Medic. = A. glyc.
HAPALOSTEPHIUM = Crepis
alpestre Sweet = C. alp.
austriacum Sweet = C. blattar.
croaticum Sweet = C. mollis (α)
grandiflorum G. Don = C. conyzæfol.
hieracioides Sweet = C. succisæfol.
paludosum D. Don = C. palud.
pilosum D. Don = C. blattarioides
pyrenaicum D. Don = prec.
spinulosum D. Don = prec.
HAPLOPHYLLUM = Ruta
coronatum Griseb. = R. patavina
linifolium Rchb. (non alior.) = prec.
patavinum G. Don = prec.
HARMALA = Peganum
multifida All. = P. Harmala
Peganum Crantz = prec.
HASSELQUISTIA = Tordylium
lanata Boiss. = T. lanat.
HAYNALDIA = Triticum
villosa Schur = T. villosum
HEBELIA = Tofieldia
allemannica Gmel. = T. calyculata
collina Gmel. = T. collina
HECATONIA = Ranunculus
aconitifolia Schur = R. acon.
alpestris Schur = R. alpestr.
crenata Schur = R. cren.
glacialis Schur = R. glac.
palustris Lour. = R. sceleratus
platanifolia Schur = R. platan.
scelerata Fourr. = R. scel.
Traunfellneri Schur = R. Traunfell.
HEDERA II 137 (535)
chrysocarpa Walsh 137 (β), A 148
Helix L. 137, A 148
lobata Gilib. = Helix
poëtarum Bert. = chrysocarpa
poëtica Salisb. = Helix
quinquefolia L. = Parthenocissus quinquefol.
HEDRÆANTHUS III 189 (849)
albiflorus Flori (*gramin.*) A 180 (2 α d)
australis Wettst. (gramin.) = siculus
caudatus Rchb. = dalmaticus
croaticus A. Kerner 191 (nota)
dalmaticus DC. f. 190 (1)
elatus Wettst. (*gramin.*) 190 (2 α b)
graminifolius DC. f. 190 (2), A 180
Kitaibelii DC. f. 191 (*nota*)
Kitaibelii Neilr. = tenuifolius
pusillus Wettst. (*gramin.*) 190 (2 α c)
siculus Strobl (*gramin.*) 190 (2 β), A 180
tenuifolius DC. f. 191 (3)
HEDYPHYLLA = Astragalus
vulgaris Stev. = A. glycyphyllos
HEDYPNOIS III 389 (932)
autumnalis Huds. = Leontod. autumn.
biennis Huds. = Crepis bienn.
coronopifolia Ten. 389 (γ b)
crepidiformis Rchb. 389 (α b)
cretica S. et S. = monspeliensis
cretica W. 389 (γ)
erecta Gr. et Godr. (polym.) = pendula
furfuracea Rchb. = rhagadiol.
glabra Lojac. (*tubæform.*) A 192 (δ for.)
glabra Schm. = Hypochœr. gl.
globulifera Lam = polymorpha

Digitized by Google

HEDYPNOIS III 389 (382)
gracilior Boiss. (cretica) = monspel.
Gussonei Fiori (*tubæform.*) 390 (δ b)
hieracioides Huds. = Picris hier.
hirta Sm. = Leontod. hirt.
hispida Huds. = Leontod. hisp.
laciniflora Viv. = polymorpha
mauritanica W., Guss. = monspeliensis
mauritanica c Guss. = crepidiform.
monspeliensis W. 389 (α)
paludosa Scop. = Taraxac. palud.
pendula W., DC. 389 (α c)
pinnatifida DC. (pendula) = seg.
pinnatifida Wk. et Lge. (*polym.*) 389 (α d)
polymorpha DC. 389, A 192
pyrenaica Vill. = Leontod. pyren.
radiata Gærtn. = Hyoseris radiata
rhagadioloides Sch. Bip. = cretica
rhagadioloides S. et S. = tubæform.
rhagadioloides W. 389 (β)
scabra Schm. = Hyoseris scabra
Sprengelii Schult. = Arnoseris minima
subacaulis DC. (cretica) = seg.
subacaulis Fiori (*tubæform.*) 390 (δ c)
Taraxaci Huds. = Leontod. autumn.
Taraxaci Vill. = Leontodon Taraxaci Lois.
Taraxacum Scop. = Taraxac. offic.
tectorum Huds. = Crepis tect.
Tournefortii Cass. = polymorpha
tubæformis Ten. 390 (δ), A 192
tubæformis b Guss. = Gussonei
HEDYSARUM II 94 (511)
æquidentatum S. et S. = Onobrychis æquidentata
album W. et K. = Onobrychis alba
alpinum Jacq. = obscurum
alpinum L. = obscurum et sibiricum
alpinum β L. = obscurum
Bergerianum Spr. = Onobrychis Bergeriana
capitatum Desf. 95 (2 γ), A 143
capitatum Guss. = pallens
Caput-galli L. = Onobrychis Caput-galli
controversum Crantz = obscurum
coronarium L. 95 (3), A 143
corsicum Balb. = capitatum
Crista-galli L. (Cap.-galli) = Onobrychis Crista-galli
Crista-galli Murr. = prec.
Crista-galli Orsini = Onobrychis Caput-galli
HEDYSARUM II 94 (511)
echinatum Gilib. = Onobrychis viciæfolia
echinatum Guss. = Onobrychis alba
exaltatum Kern. 94 (1 β)
herbaceum Lap. = Onobrychis supina
obscurum Huter exs. = exaltatum
obscurum L. 94 (1)
Onobrychis L. = Onobrychis viciæfolia
pallens Moris (capit.) = seg.
pallens Rouy (*spinosiss.*) 95 (2 β)
pallidum Biv. (*non Desf.*) 95 (2 γ b)
pallidum Strobl (capit.) = prec.
saxatile L. = Onobrychis saxatile
Sibthorpii Nym. = pallens
spinosissimum All. = Onobrychis Caput-galli
spinosissimum L. 95 (2)
spinosiss. S. et S., DC. = pallens
spinosiss. Ten. = capitatum
supinum Chaix in Vill. = Onobrychis supina
variegatum Portschl. = capitatum
HELENIUM = Inula
grandiflorum Gilib. = I. Helenium
HELEOCHARIS I 121 (136)
acicularis R. Br. 121 (1), A 35
affinis C. A. Mey. = uniglumis
aquatilis Schur (palustr.) = major
atropurpurea Kth. 123 (6)
australis A. Terr. (palustris) = nebrodensis et reptans
Bæothrion Nees = Scirpus pauciflorus
Bartoliana DNtrs. = carniolica
caduca Schult. 122 (4)
cæspitosa Lk. = Scirpus cæsp.
capitata R. Br. = caduca
carniolica Koch 122 (2), A 35
comosa Richter = acicularis
conica Presl = uniglumis
costata Presl = acicularis
digyna Gr. et Godr. (*multicaul.*) 122 (3 δ b)
erratica Steud. = atropurpurea
filiculmis Schur A 35 (3 α e)
fluitans Dœll, Schur 121 (1 b)
fluitans Hook. = Scirpus fluit.
gracilescens A. Terr. (caduca) = caduca (for.)
humifusa A. Terr. (*ovata*) 122 (5 b)
italica A. Terr. (australis) = nebrodensis?
italica A. Terr. (ovata) = ovata
leptophylla Schult. = Scirpus americanus
Lereschii Shuttlew. = atropurpurea
longistachya N. Terr. (pal.) = major
macrostachya Bcklr. (*carniol.*) 121 (2 b)
HELEOCHARIS I 121 (136)
major Sond. (*palustr.*) A 35 (3 α c)
Mariana A. Terr. (*multicaul.*) A 205 (3 δ d)
Micheliana Rchb. = Scirpus Mich.
minor Kth. (atropurp.) = atropurpurea
minor Parl. (palustr.) = reptans et nebrodensis
minor Schur (*palustr.*) 122 (3 b), A 35
minor A. Terr. (australis) = reptans
multicaulis Sm. 122 (3 δ), A 35, 205.
nebrodensis Parl. 122 (3 β)
ovata Barbey = caduca
ovata R. Br. 122 (5)
pallescens Asch. et Magn. (*multicaul.*) 122 (3 δ c)
palustris R. Br. 122 (3), A 205
parvula W. J. Hook. = Scirpus parv.
pauciflora Lk. = Scirpus pauc.
polycaula Wend. = palustris
pumila Lge. (pal.) = minor
pungens Rchb. = Scirpus americanus
pygmæa Torr. = Scirpus parvulus
reptans Parl. (*palustr.*) A 35 (3 α d)
sessitensis A. Terr. (ovata) = ovata (for.)
uniglumis Schult. 122 (3 γ)
Watsoni Bab. = uniglumis
Zanardinii Parl. 123 (6 b)
HELEOCHLOA = Crypsis
alopecuroides Host = Cr. alop.
brachystachys Richter = Cr. — brach.
diandra Host = Cr. aculeata
phalaroides P. B. = Cr. alopecuroid.
schœnoides Host = Cr. schœn.
HELEOCHLOA = Glyceria
aquatica Fr. = G. aquat.
distans Fr. = G. dist.
HELEOGENUS = Heleocharis
atropurpureus Nees = H. atropurp.
ovatus Nees = H. ovata
HELEOGITON = Scirpus
compressum Peterm. = S. Caricis
fluitans Lk. = S. fluit.
glaucum Rchb. = S. Tabernæmontani
litorale Rchb. = S. lit.
parvulum Lk = S. parv.
pungens Rchb. = S. americanus
Tabernæmontani Peterm. = S. Tabern.
trigonum Rchb. = S. lacustri × triquetr.
triquetrum Rchb. = S. triq.
HELIANTHEMUM I 391 (353)
acuminatum Pers. 396 (11 η)
acutifolium Wk. (montan.) = canum (α a)
acutiusculum Fiori (*croceum*) A 82 (11 κ d)

Digitized by Google

HELIANTHEMUM I 391 (353)
acutiusculum Presl (glaucum) = prec.
ægyptiacum Mill. 396 (13), A 82
baliflorum Bolzon (*Berterianum*) A 82 (11 ζ b)
Allionii Tin. 394 (7 α c)
alpestre DC., Dun. 394 (7 β b)
alpestre Wk. (vulgare) = glabrum et grandiflor.
alyssoides Pesn. ex Nym = guttatum
Andersoni Sweet = apenn. × glaucum
angustifolium Koch (polifol.) = pulverulent.
angustifolium Spach (variab.) = leptophyllum
angustifolium Strobl (croceum) = stellatum
angustifolium Wk. (Jacquini) = Morisianum
angustifolium Wk. (vulgare) = hyssopifol.
annuum Fisch. = ledifolium
apenninum Mill. 394 (10), A 81
apenn. × *glaucum Gross.* A 81
arabicum Pers. 392 (2), A 81
arabicum b. Guss. = glutinoso-viscosum
arcuatum Presl = croceum
asperum Ten. (non Lag.) = apenninum
assurgens Duf. = intermedium
atroglandulosum Grosser (*rubellum*) A 81 (6 c)
aurantiacum Fiori (*Chamæc.*) A 82 (11 α e)
aurantiacum Goir. (vulgare) = prec.
barbatum Gross. (Chamæc.) = Chamæc. (α et γ)
barbatum Pers. A 82 (11 α)
Barrelieri Ten. 396 (8 β)
Berterianum Bert. 396 (11 ζ), A 82
bicolor Presl A 82 (11 λ)
bicolor Wk. (*rubellum*) A 81 (6 a)
brevifolium Moris (Fumana) = ericoides
calcareum Jord. A 81 (10 α d)
candidissimum Fiori (*canum*) A 81 (7 α d)
candidissimum Strobl (*croceum*) A 82 (11 κ c)
candidiss. Ten. (italic.) = canum d. candidiss.
canescens Whlnb. (œlandic.) = vineale
canum Dun. 396 (7), A 81
canum Gr. et Godr. = vineale
canum Ten. = canum d. candidissimum
Cavanillesii Dun. (gutt.) = eriocaulon
cenisiacum Gross. (*grandiflor.*) A 82 (11 γ b)
Chamæcistus Mill. 395 (11), A 81
Chamæcistus × *glaucum Gross.* A 82
ciliatum Moris (non Desf.) = Morisianum
ciliatum Ten. (an Pers.?) = apenn. δ roseum?
ciliatum Whlnb. (œlandic.) = glabratum
clandestinum Pourr. = ægyptiacum
Columnæ Dun. (gutt.) = guttatum (α)
concolor Wk. (vulgare) = barbatum
confusum Sweet = apenninum (α a)
controversum F. Schultz = apenninum (α a)
corsicum Gr. et Godr. (lavandulæfol.) = Thibaudi
croceum Pers. 396, A 82 (11 κ)
denticulatum Thib. 397 (14 α b)
discolor Wk. (vulgare) = tomentosum
ericoides Dun. 392 (1 β)
eriocaulon Dun. 397 (16 α b)
farinosum Dun. (racemosum) = seg.
farinosum Gross. (*pilosum*) A 81 (10 γ b)
flavum Wk. (glaucum) = glaucum
fuloraceum Dun. (gutt.) = eriocaulon
Fumana Mill. 392 (1)
Fumana β DC. = ericoides
Fumana × Chamæcistus = Sieberi, cfr. A 81
gemmiferum Huter P. et R. exs. = arabicum
glabellum Schur = glabratum
glabratum Dun. (alpestre) = seg.
glabratum Gr. et Godr. (*italic.*) 394 (7 β c)
glabrescens Neilr. (vulg.) = glabrum
glabrescens Wk. (Jacquini) = semiglabrum
glabrescens Wk. et Lge. (pulverulent.) = polifol.
glabrum Kern. 395 (11 α d), A 82
glabrum Koch (œland.) = glabratum
glabrum Koch (vulgare) = glabrum Kern.
glandulosum Presl = thymifolium
glandulosum Wk. (mont.) = Allionii
glaucum Ard. = tomentos. et roseum DC.
glaucum Auct. it. = croceum
glaucum Pers. 396 (11 ι), A 82
glutinosum Pers. 392 (8 α b)
glutinoso-viscosum Parl. (*arabicum*) 392 (2 α b)
gracile Rouy (salicifol.) = intermedium
grandiflorum DC. 395 (11 γ), A 82
guttatum Ball = inconspicuum
guttatum Mill. 397 (16), A 83
halimifolium Pers 398 (18)
Helianthemum Asch. et Græbn. = Chamæcistus
heterophyllum Schur = tomentosum
heterophyllum Wk. (vulgare) = ovatum
hirsutissimum Strobl (*bicolor*) A 82 (11 λ b)
hirsutum Kern. = obscurum
hirsutum Koch (vulgare) = obscurum
hirsutum Rouy et Fouc. (serpyll.) = barbatum
hirtum Baumg. = obscurum
hirtum Koch (œland.) = alpestre
hirtum Mill. 398 (nota)
hispidum Ten. (non Dun.) = apenninum
hololeucum Spach (variab.) = glaucum
hymettium Boiss. = rubellum
hyssopifolium Ten. 395 (11 α c), A 82
inconspicuum Thib. 397 (16 δ)
inflatum Mœnch, Parl. = ægyptiacum
intermedium Guss. (*croceum*) A 82 (11 κ b)
intermedium Pers. (*salicifol.*) 397 (14 β)
intermedium Thib. = prec.
italicum Pers. 394 (7 β), A 81
italicum Vis. (montan.) = alpestre
Jacquinii Wk. = roseum et acuminatum
juniperinum Lag. 398 (8 δ)
Lamarckii Dun. (gutt.) = guttatum (α)
lanatum Fiori (*Tuberaria*) A 83 (17 b)
lanceolatum Gross. (glaucum) = stellatum
lanceolatum Wk. (vulgare) = obscurum
latifolium Rouy et Fouc. (polifol.) = polifol.
lavandulæfolium Mill. 394 (9)
lavandulæfolium Ten. = apenninum
ledifolium Mill. 397 (15), A 83
leptophyllum Dun. 396 (11 θ)
leve Pers. = viride
levigatum Schur = glabrum
levipes Pers. 398 (4)
Libanotis Guss. = Cistus Clusii
lineare Rouy = leptophyllum
linearifolium Spach (variab.) = pilosum Pers.
Lippii Pers. 398 (5)
longepedicellatum Wk. (glaucum) = stellatum
lunulatum DC. 394 (8), A 81
marifolium Auct. it. (non Mill.) = canum
melanostrictum Fiori (*italic.*) A 81 (7 β d)
melanostrict. Gross. (penicillatum) = prec.
micranthum Boiss. (Lippii) = sessiliflorus
micranthum Evers = seg.

Digitized by Google

HELIANTHEMUM I 391 (353)
micranthum Gr. et Godr. (italic.) = penicillatum
micropetalum Wk. (*plantagin.*) A 83 (16 γ for.)
microphyllum Wk. (montan.) = vineale
Milleri Rouy et Fouc. = guttatum (α)
minus Dun. (Fumana) = ericoides
montanum Vis. = canum
Morisianum Bert. 395 (11 ε b)
nebrodense Heldr. in Guss. 393 (6 b), A 81
nebrodense Parl. (canum) = prec.
niloticum Mœnch = ledifol.
nummularium Fiori (Cham.) 395 (11 α b) = ovatum, cfr. A 82
nummularium Gross. = rotundifol.
nummularium Guss. = rubellum (a)
nummularium Mill. = ovatum vel tomentosum
oblongifolium Koch (polifol.) = apennin. (α a)
obscurum Pers. 395 (11 a), A 82
obtusiusculum Fiori (*croceum*) A 82 (11 κ e)
obtusiusculum Presl (glaucum) = prec.
œlandicum DC. (non Whlnb.) = glabratum
ovatum Dun. A 82 (11 α b)
patulum Pomel = eriocaulon
penicillatum Thib. 394 (7 β a)
petræum Whlnb. (vulg.) = tomentosum
pilosum Guss. (*salicifol.*) A 83 (14 α d)
pilosum Pers. 395 (10 γ), A 81
plantagineum Pers. 397 (16 γ), A 83
polifolium Mill. 394 (10 α c)
polifolium Sweet = pulverulentum
præcox Salzm. 397 (16 γ b)
procumbens Dun. = Fumana
pulverulentum DC. 395 (10 β)
retrofractum Pers. 396 (12), A 82
rodanthum Dun. = roseum DC.
roseum DC. (*an Mill.?*) 395 (11 ε)
roseum Fiori (*apenninum*) 395 (10 δ)
roseum Wk. (pulverulent.) = prec.
roseiflorum Rouy et Fouc. (oblongifol.) = roseum DC.
rotundifolium Dun. A 81 (6 oss.)
rotundifolium Fiori 393 (6) = rubellum, cfr. A 81
rubellum Presl A 81 (6)
rubellum β Bert. = nebrodense
rubellum Mœnch = salicifolium
rude Kern. in H. P. et R. exs. = obscurum
rupifragum A. Kern. = glabratum

HELIANTHEMUM I 391 (353)
rupinculum Huter P. et R. (polifol.) = apenn. × glaucum
rupicolum Schur = ovatum
salicifolium Mill. 396 (14), A 83
sanguineum Lag. in Dun. = retrofractum
Savii Bert. 392 (2 β), A 81
Scopolii Fiori (*Chamæc.*) 395 (11 δ), A 82
Scopolii Wk. (vulgare) = prec.
Seguieri Pollini A 82 (11 γ c)
semiglabrum Bad. 396 (11 η b)
semiglabrum Moris = Morisianum
serpyllifolium Gross. (Chamæc.) = glabrum
serpyllifolium Mill., Dun. 395 (11 β) = tomentosum, cfr. A 82
sessiliflorum Pers. 393 (5 β)
siculum Fiori (*guttat.*) A 83 (16 α c)
siculum Tin. = tomentos. vel croceum
Sieberi Bruegg. A 81 (×)
stabianum Ten. A 82 (×)
stellatum Guss. A 82 (11 κ f)
stœchadifolium Ten. = apenninum
strictum Pers. = pilosum
subovatum Fiori (*croceum*) A 82 (11 κ g)
subovatum Presl (glaucum) = prec.
tauricum Sweet = obscurum
Thibaudi Pers. 394 (8 b)
thymifolium Pers. 392 (3)
tomentosum Dun. A 82 (11 β)
tomentosum Guss. = croceum
tomentos. Koch (vulgare) = tomentos. Dun.
tomentos. Wk. (Jacquini) = roseum DC.
trifoliatum Wk. (*salicifol.*) 397 (14 α c)
tripetalum Miègev. = salicifolium
triviale Fiori (*Tuberaria*) A 83 (17 a)
Tuberaria Mill. 398 (17), A 83
umbellatum Mill. 398 (nota)
umbellatum Presl = Cistus Clusii
variabile Amo = guttatum
variabile Spach = apenninum et Chamæcistus
velutinum Jord. 394 (10 α b)
vineale Pers. 394 (7 α b)
virescens Boiss. (vulg.) = barbatum
virescens Gr. et Godr. (vulgare) = obscurum, ovatum, hyssopifol. et grandifl.
virescens Wk. et Lge. (pulverulent.) = apenninum (α)
viride Ten. 393 (8 γ)
viride Wk. (montan.) = italicum
viscidum Pomel = eriocaulon
viscosum Fouc. et Sim. (*plantagin.*) A 83 (16 γ for.)

HELIANTHEMUM I 391 (353)
viscosum Rouy et Fouc. (guttat.) = Vivianii
Vivianii Pollini 397 (16 β)
vulgare Dun. = tomentosum
vulgare Fiori (Chamæc.) 395 (11 α) = barbatum, cfr. A 82
vulgare Gærtn. = Chamæcistus
HELIANTHUS III 300 (896)
annuus L. 300
platycephalus Cass. = annuus
tuberosus L. 301
HELICHRYSUM III 280 (884)
angustifolium DC. = italicum
angustifolium Guss. (panormit.) = panormitanum
argyreum Jord. et Fourr. = italicum (α)
Barrelieri Nym. = siculum
cæspitosum DC. (Prodr. n. 70) = siculum
Cambessedesii DC. p. p. (rupestre) = scandens
chloroticum Jord. et Fourr. = italicum (α)
citrinum Ces. P. et G. = Stœchas
compactum Fiori (*siculum*) 281 (2 ε b)
compactum Guss. (cæspit.) = prec.
compactum Guss. (*pendulum*) 281 (2 δ b)
crassifolium Guss. = stramineum
decumbens Lojac. (non Camb.) = sicul. b compactum
elegans Presl = siculum
ericoideum Fiori (*italic.*) 283 (5 β)
Erreræ Tin. 282 (4 β)
Fontanesii Camb. = rupestre
frigidum W. 280 (1)
glutinosum Nym. 282 (nota)
Heldreichii Lojac. (pendulum) = nebrodense
inodorum Fiori 280 (2)
italicum G. Don 282 (5)
italicum Guss. = ericoideum
latifolium Guss. (panormit.) = rupestre
laxiusculum Guss. (*pendulum*) 281 (2 δ a)
litoreum Guss. 282 (4 γ)
longifolium Fiori (*siculum*) 281 (2 ε c)
longifolium Guss. (cæspit.) = prec.
luteo-album Rchb. = Gnaphalium luteo-album
microphyllum Camb. 283 (5 γ)
nebrodense Heldr. 281 (2 δ c)
panormitanum Tin. 280 (2 α b)
pendulum Presl 281 (2 δ)
Porcari Tin. = pendulum
psammiticum Fiori (*Stœchas*) 282 (3 β)
pseudo-litoreum Fiori (*italic.*) 283 (5 δ)
rupestre DC. 281 (2 α)
saxatile Moris 282 (4)
scandens Guss. 281 (2)
siculum Boiss. 281 (2 ε)

Digitized by Google

HELICHRYSUM III 280 (884)
Stœchas Ces. P. et G., Arc. ecc. = italicum
Stœchas DC. 281 (3)
stramineum Guss. 281 (2 γ)
uliginosum Mœnch = Gnaphalium ulig.
Wickstromii Tin. = pendulum
HELICODICEROS = Dracunculus
crinitus Schott = D. muscivorus
muscivorus Engl. = prec.
HELIOPHYTUM = Heliotropium
anchusæfolium DC. = H. anchus.
HELIOSPERMA = Silene
alpestre Rchb. = S. alpestris
eriophorum Juratzka = S. — Veselskyi
glutinosum Zois. in Rchb. = S. — Veselskyi
monachorum Vis. et Panc. = S. monach.
pudibundum Griseb. = S. pudib.
pusillum Vis. = S. quadrifida
quadrifidum Rchb. = S. quadr.
Veselskyi Janka = S. Veselsk.
HELIOTROPIUM II 382 (732)
æthnicum Jan = suaveolens
anchusæfolium Poir. 383 (nota)
Bocconei Guss. = suaveolens
curassavicum L. 383 (nota)
dolosum DNtrs. = Eichwaldi
Eichwaldi Steud. 383 (1 δ)
ellipticum Led. = Eichwaldi
europæum L. 382 (1)
gymnocarpum Borb. (europ.) = quid?
litorale Stev. = Eichwaldi
macrocarpum Guss. = Eichwaldi
odorum Stev. = suaveolens
parviflorum Stev. = Eichwaldi
peruvianum L. 383 (nota)
Stevenianum Andrz. = Eichwaldi
suaveolens M. B. 382 (1 γ)
supinum L. 383 (2)
tenuiflorum Guss. = seg.
tenuiflorum Guss. (*europ.*) 382 (1 β)
turcicum Friv. = suaveolens
vulgare Rota = europæum
HELLEBORASTER = Helleborus
fœtidus Mœnch = H. fœtid.
viridis Mœnch = H. virid.
HELLEBORINE = Serapias
Corallorrhiza Schm. = Corall. Neottia
cordata Schm. = Listera cord.
cordigera Pers. = S. cord.
latifolia Mœnch = Epipactis palustris
leucoglottis Steud. = seg.
Lingua Pers. = S. Lingua
longipetala Ten. = S. longipetala
Nidus-avis Schm. = Neottia N.-avis
ovata Schm. = Listera ovata
oxyglottis Pers. = S. Lingua
HELLEBORINE = Serapias
palustris Schrank = Epipact. pal.
pseudo-cordigera Seb. = S. longipetala
rubra Schrank = Cephalanth. rubra
succulenta Schm. = Neottia Nidus-avis
HELLEBOROIDES = Eranthis hiemale O. Ktze. = E. hiem.
HELLEBORUS I 517 (433)
albus Gueld. = Veratrum album
altifolius Hayne (*niger*) 518 (2 b)
altifolius Steud., Rchb. = prec.
angustifolius Host = multifidus
argutifolius Viv. = corsicus
bengesiacus Jord. et Fourr. = fœtidus
Bocconei Ten. 518 (1 δ)
Bocconi DC. (purpurascens) = odorus
Bocconi Rchb. = multifidus
brevicaulis Jord. et Fourr. = viridis (α)
corsicus W. 518 (4 b)
decorus Le Bêle = odorus
deflexifolius Jord. et Fourr. = fœtidus
dumetorum W. et K. 518 (1 β)
fœtidus L. 518 (3)
fœtidus β L. = lividus
grandiflorus Neilr. (virid.) = viridis (α)
grandiflorus Salisb. = niger
graveolens Rchb. = odorus
humilifolius Hayne (niger) = niger (a)
Hunfalvyanus Kan. = viridis
hyemalis L. = Eranthis hiem.
intermedius Guss. 518 (1 δ c)
involucratus Stokes = Eranthis hiem.
istriacus Schiff. (*odorus*) 518 (1 γ b)
Jacquinianus A. Br. (virid.) = viridis (α)
lividus Ait. 519 (4)
macranthus Freyn (*niger*) 518 (2 c)
macranthus Gürke = prec.
monanthos Mœnch = Eranthis hiem.
multifidus Vis. 518 (1 δ b)
nemoralis Jord. et Fourr. = fœtidus
niger L. 518 (2), A 107
occidentalis Reut. 518 (1 α b)
odorus W. et K. 518 (1 γ)
pallidus Host = dumetorum
parviflorus Neilr. (virid.) = dumetorum
pyrenaicus Zahlbruck. = occidentalis
rhodanicus Jord. et Fourr. = fœtidus
serratifolius DC. (lividus) = corsicus
siculus Schiff. 518 (1 δ d)
silvaticus Neilr. (virid.) = viridis (α)
HELLEBORUS I 517 (433)
Smithianus A. Br. (virid.) = occidentalis
spinescens Tausch = corsicus
thalictroides Lam. = Isopyrum thal.
Todari Gaud. in Tod. = Bocconei
trifolius Mill. p. p. = lividus
triphyllus β Lam. = lividus
vaginatus Host = dumetorum
viridiflorus Stokes = viridis
viridis L. 517 (1), A 107
HELMINTHIA III 405 (988)
aculeata DC. 405 (2)
echioides Gærtn. 405 (1)
humifusa Trevir. 405 (1 γ)
mollis Ces. P. et G., Arc., Nym. (aculeata) = seg.
mollis Duby (*pratensis*) 405 (1 β)
mucronata Ces. P. et G., Arc., Nym. (aculeata) = seg.
mucronata N. Terr. = echioides (α)
plejophylla Nic. 405 (1 β b)
pratensis Chev. 405 (1 β)
tuberculata Mœnch 405 (1 α)
HELODEA A 40 (164), cfr. I 158
canadensis Rich. in Michx. A 40, cfr. I 158
HELODEA = Hypericum
palustris Spach = H. Helodes
HELODES = Hypericum
ægyptiaca Payer = H. ægypt.
palustris Spach = H. Helodes
HELONIAS = Tofieldia
borealis W. = T. palustris
nigra Ker-Gawl. = Veratrum nigrum
HELOSCIADUM = Apium
crassipes Koch = A. crass.
Falcaria Heg. = Falcaria vulgar.
intermedium Ten. ex Nym. = A. nodiflor.
inundatum Koch = A. inund.
inundatum Sal.-Marschl. = A. crassipes
lateriflorum Koch = A. leptophyllum
leptophyllum DC. = A. leptoph.
nodiflorum Koch = A. nodifl.
ochreatum DC. (nodiflor.) = A. — ochreat.
repens Koch = A. repens
Ruta DC. = A. graveol.
stoloniferum Nym. = A. — stol.
HELXINE = Parietaria
Soleirolii Req. = P. Soleir.
HELXINE = Polygonum
arifolia Raf. = P. arifol.
Convolvulus Raf. = P. Convolv.
dumetorum Raf. = P. dumet.
HEMARTHRIA I 44 (41)
fasciculata Kth. 44
HEMEROCALLIS I 205 (201)
crocea Lam. = fulva
flava L. 205 (1)
fulva L. 205 (2)
Liliastrum L. = Paradisia Lil.
Lilio-Asphodelus L. = flava et fulva

Digitized by Google

HEMESTEUM = Nephrodium
montanum Newm. = N. Oreopteris
Thelypteris Newm. = N. Thel.
HEPATICA = Anemone
alba Mill. = A. Hepat. d. alba
anemonoides Vest = A. Hepatica
Hepatica Karst. = A. Hepatica
maculata Val de Lièvre (triloba) = A. — marmorata
marmorata G. Beck (nobilis) = A. — marmor.
minor G. Beck (nobilis) = A. Hep. b. minor
multiloba Lindb. (triloba) = A. — multiloba
nobilis Mill., Schreb. = A. Hepatica
picta G. Beck (triloba) = A. — marmorata
plena Mill. = A. — plena
rhætica G. Beck (nobilis) = A. — multiloba
rosea G. Beck (triloba) = A. Hep. c. rosea
triloba Chaix = A. Hepatica
vulgaris Mill. = A. Hep. c. rosea
HERACANTHA = Carthamus
lanata Hoffgg. et Lk. = C. lan.
HERACLEUM II 182 (577)
alpinum L. 183 (2), A 214
alpinum Pollini = pyrenaic.
amplifolium Lap. = pyrenaic.
angustifolium Jacq. = longifol.
asperum M. B. = pyrenaic.
austriacum L. 183 (3)
branca-ursina All. = Sphondylium
caucasicum Stev. 183 (nota)
cordatum Presl 183 (1 δ)
dubium Ten. = Panaces
elegans Jacq. 183 (1 γ)
flavescens Bess. 183 (1 β b)
Lecokii Gr. et Godr. = longifol.
longifolium Jacq. 183 (1 β)
Orsinii Guss. 183 (1 η)
palmatum Baumg. = pyrenaic.
Panaces L. 183 (1 ε)
Pollinianum Bert. 183 (1 ζ b)
proteiforme Crantz = Sphondylium
pulcrum Zum. = Panaces
pyrenaicum Lam. 183 (1 ζ)
pyrenaic. Poll. = Pollinianum
setosum Lap. = Panaces
sibiricum Auct. (an L.?) = longifol.
sitfolium Rchb. 183 (3 b)
Sphondylium L. 183 (1)
stenophyllum Gaud. (Sphond.) = elegans
stenophyllum Jord. = prec.
Tordylium Spr. = Tordyl. maximum
HERBICHIA = Senecio
abrotanifolia Zawadski = S. abrot.
HERITERIA = Tofieldia
anthericoides Schrank = T. calyculata
HERMINIUM I 248 (235)
alpinum Lindl. 249 (2)
HERMINIUM I 248 (235)
clandestinum Gr. et Godr. = Monorchis
cordatum Lindl. = Cœlogloss. diphyllum
Monorchis R. Br. 249 (1)
HERMIONE = Narcissus
æquilimba Herb. = N. serotinus
ambigena Salisb. = N. orientalis
anceps Rœm. = N. papyraceus
aurea Jord. et Fourr. = N. aureus
autumnalis Rœm. = N. autumn.
Bertolonii Jord. et Fourr. = N. Bertol.
Biancæ Tod. = N. Tazetta
cupularis Salisb. = N. cupul.
Cypri Haw. = N. Cypri
dubia Haw. = N. dubius
elegans Haw. = N. autumnalis
grandicrenata Bianca = N. Tazetta
intermedia Haw. = N. interm.
italica Herb. = N. ital.
Jonquilla Haw. = N. Jonq.
juncifolia Salisb. = N. Jonquilla
Luna Haw. = N. polyanthos
multiflora Haw. = N. aureus?
neglecta Jord. = N. Tazetta
nivea Rœm. = N. papyraceus
papyracea Haw. = N. papyr.
patula Haw. = N. patul.
polyantha Haw. = N. polyanth.
præcox Haw. = N. italicus
Seguentiæ Tod. = N. Seg.
serotina Haw. = N. serot.
syracusana Tod. = N. syrac.
Tazetta Haw. = N. Tazetta
unicolor Haw. = N. unic.
virginea Jord. et Fourr. = N. Panizzianus
HERMODACTYLUS I 227 (221)
decoloratus Palanza (tuber.) A 52 (α b)
longifolius Sweet A 52 (β)
repens Sweet = tuberosus
tuberosus Mill. 227, A 52
HERNIARIA I 335 (322)
alpestris Aubry = glabra
alpestris Lam. = alpina
alpina Lois. = incana
alpina Vill. 335 (2), A 67
alpina β Gaud. = semproniana
alsinæfolia Mill. = Polycarpon alsin.
annua Lag. = cinerea
arenaria O. Ktze. = glabra et hirsuta
atrovirens Strobl (glabra) = microcarpa
ciliata Bab. 335 (1 α b)
ciliata Clairv. = alpina
cinerea DC. 335 (1 β b), A 67
diandra Bunge A 67 (1 β d)
empedocleana Lojac. A 67
flavescens Lowe = cinerea
Fontanesii Lojac. hb. (non J. Gay) = empedocleana
fruticosa Gouan, Balb. (non L.) = glabra
glabra L. 335 (1), A 67
hirsuta L. 335 (1 β), A 67
HERNIARIA I 335 (322)
hirsuta M. B. = incana
hirsuta Viv. = cinerea
hirsuta β Bert. = cinerea
hirtocalyx Strobl (glabra) = permixta
incana Lam. 335 (2 β)
lenticulata All. = alpina
lenticulata Huds. = Polygonum Roberti
lenticulata L. = incana et Cressa cretica
macrocarpa Presl (non S. et S.) = permixta
microcarpa Presl 335 (1 α c)
montana Raf. = permixta
multicaulis Kit. = hirsuta?
nebrodensis Jan = microcarpa
parviflora Fenzl (hirs.) = hirsuta (a)
permixta Jan 335 (1 β c)
pubescens Sauter (glabra) = ciliata
rotundifolia Vis. = glabra (cfr. p. 335 1 α oss.)
semproniana Williams (alpina) A 67 (2 α b)
setulosa G. Beck (glabra) = ciliata
virescens Salzm. = cinerea
vulgaris Spr. = glabra, hirsuta et cinerea
HESIODIA = Sideritis
bicolor Mœnch = S. montana
montana Dum. = S. mont.
HESPERIS I 426 (361)
adenopoda Borb. (matron.) A 89 (2 α c)
æstiva Lam. = Matthiola incana
africana L. = Malcolmia afric.
alba Mill. A 89 (2 α d)
albiflora DC. (matron.) = alba
Alliaria Lam. = Alliaria offic.
alpestris Fourn. (silvestris) = candida
alyssoides Pers. = Malcolmia litor.
angustifolia Lam. = Matth. tristis
arvensis Cav. = Moricandia arvensis
australis Gris. (inodora) = candida
bituminosa W., Savi = inodora
calvata Borb. (sibirica) A 90 (2 β c)
candida Kit. A 90 (2 β b)
Columnæ Ten. (laciniata) A 89 (1 d)
Columnæ Vis. = villosa
Cupaniana Guss. = villosa
dalmatica Fourn. = glutinosa
densifolia Borb. (matron.) A 89 (2 α b)
dentata L. = Barbarea dent.
diffusa Lam. = Malcolmia africana
eglandulosa Spach (matron.) = matronalis
enganea Mars. in Ten. 424 (2 c) = matronalis (α), cfr. A 90
fasciculata Raf., DC.? = Matthiola tricusp. c. integrifol.

Digitized by Google

HESPERIS I 423 (861)
fenestralis Lam. = Matth. incana
fragrans Fisch. = villosa
glandulosa Spach (matron.) = inodora
glutinosa Vis. 423 (1 c)
grandiflora Sims. = sibirica
heterophylla Ten. 424, A 90 (2 δ)
hieracifolia Vill. = laciniata
hirsuta Paolucci = glutinosa
hirsuta Schloss. et Vuk. (lacin.) = glutinosa
hispida Schreb. = Malcolmia africana
hortensis Pers. = matronalis (α)
inodora Gouan = Arabis cebennensis
inodora L. 424, A 90 (1 ζ)
laciniata All. 424 (1), A 89
laciniata Rchb. Ic. = glutinosa
lanceolata Fourn. (silvestris) = sibirica
laxa Lam. = Malcolmia africana
litorea Lam. = Malcolmia lit.
maritima Lam. = Malcolmia mar.
matronalis All. = sibirica
matronalis L. 424 (2), A 89
matronalis Rchb. = densifolia
meridionalior Nym. (inod.) = matronalis
nivea Rouy et Fouc. (non Baumg.) = candida
oblongifolia Schur = sibirica
oblongipetala Borb. A 90 (2 γ)
Orsiniana Ten. = Malcolmia Orsin.
Pachypodium Fourn. = Malcolmia africana
parviflora DC. = Malcolmia parv.
provincialis L. = Matthiola prov.
pumila Poir. = Malcolmia parvifl.
ramosissima Viv. (non Desf.) = Malcolmia parviflora
rupestris Raf. = Matth. rupestris
sibirica L. A 90 (2 β)
sibirica L (matron.) = prec.
silvestris All. = matronalis
silvestris Crantz = inodora et sibirica
sinuata Lam. = Matth. sinuata
subsinuata Borb. A 90 (2 ε)
tricuspidata Lam. = Matth. tricusp.
tristis Santi (non L.) = laciniata
verna L = Arabis verna
villosa DC. 423 (1 b)
villosa Poir. = Matthiola tricuspid.
violaria Lam. = Matth. incana
Visianii Fourn = glutinosa
HETEROCHÆTA = Erigeron
erigeroides DC. = E. alpinus
HETEROPOGON I 45 (43)
Allionei R. et S. 45, A 13
HETEROPOGON I 45 (43)
contortus Ten. (non R. et S.) = Allionei
glaber Pers. = Allionei
hirtus Anderss. = Androp. hirtus
messanensis Guss. = secundus
pubescens Anderss. = Androp. pubesc.
secundus Fiori (Allionei) 45 (β)
HETEROTRICHUM = Saussurea
alpinum Lk. = S. alpina
HEUFFELIA = Avena
australis Fourr. = A. austral.
bromoides Schur = A. brom.
compressa Sshur = A. compressa
lucida Schur = A. sesquitertia
montana Fourr. = A. mont.
præusta Schur = A. alpina
pratensis Schur = A. prat.
pubescens Schur = A. pubesc.
Scheuchzeri Schur = A. versicolor
sempervirens Schur = A. semperv.
setacea Schur = A. setac.
HEXODONTOCARPUS = Sherardia
arvensis Dulac = S. arv.
HIBISCUS II 268 (645)
aquaticus DC. 269 (3 b)
palustris Thore (non L.) = roseus
pentacarpos L. 269 (4)
roseus Thore 269 (3), A 160
syriacus L. 269 (1)
ternatus Cav (non Mast.) 269 (2 b)
Trionum L. 269 (2)
HIERACHIUM = Hypochæris
levigatum Hill = H. Achyrophorus
HIERACIOIDES = Hieracium
flexuosa Mœnch = H. sabaudum
staticefolia Mœnch = H. stat.
umbellatum Mœnch = H. umb.
HIERACIUM III 442 (956)
abruptifolium Vuk. = heterospermum
absconditum Huter = ustulatum
acanthodontoides Arv. T. et Belli 488 (130)
acuminatum Jord. = vulgatum
acutifolium Belli (Sartorianum) 482 (108 γ)
acutifolium Cafl., Vill. p. p. = furcatum
adenocilinium Arv. T. 468 (49)
adenanthum Arv, T. (prenanthoid.) 498 (153 β)
adenophyllum Arv. T. (prenanthoid.) 498 (153 γ)
adpressum Arv. T. (villosum) 476 (88 β)
adriaticum N. et P. = florentinoides
æchmetes N. et P. (dentat.) A 197 (90 for.)
ageratoides Fr. 487 (128 γ)
Albertianum Arv. T. et Belli = virgatum
HIERACIUM III 442 (956)
albidum Vill. = intybaceum
aliflorum Fr. 501 (159 γ)
Allionii Monn. = glaucum
alpestre Arv. T. (subalp.) 495 (145 γ)
alpestre Arv. T. (vulgatum) 494 (144 α)
alpestre Jacq. = Crepis alpestr.
alpestre Sch. Bip. (muror.) 493 (141 ι)
alpicola Schleich. 451 (16)
alpicola × Laggeri F. O. Wolf = Chaberti
alpicolum Monn. 448 (7 α)
alpigenum Evers A 201
alpinum All. = glandulifer.
alpinum Belli (porrifolium) 484 (118 β)
alpinum L. 459 (31), A 195
alpinum Vill. = piliferum
alp. × glandulifer. N. et P. = cochlearifol.
alp. × silvat. × villosum Zahn = arolæ
alp. × vulgatum Zahn = Bocconei, dolichætum, nigresc.
alp. × vulgat. × silvat. Zahn = Vollmannii
ambigens Burn. et Gr. (amplexic.) = seg.
ambigens Arv. T. (viscosum) 464 (50 β)
amphigenum Arv. T. 480 (102)
amplexicaule L. 461 (38)
amplexic. × cæsium Rouy = Garidelianum
amplexic. × lanatum = digeneum
amplexic. × porrifolium Zahn = cadinense
amplexic. × saxatile Gelmi = cadinense
anadenum Belli (Pilosella) 447 (4 ι)
anadenum Arv. T. 479 (99)
anadenum Belli (prenanthoid.) 498 (153 δ)
andreæ Reg. et Zahn (Nægelianum) A 198 (117 var.)
andryaloides Vill. 467 (62)
anfractum Fr. 494 (144 γ)
angustifolium Evers (alpigen.) A 201
angustifol. Spr. = glaciale
angustifol. Sturm = furcatum
anomalum Belli (brachiatum) 449 (10 β)
anomalum Posp. = calycinum?
anysophyllum Boiss. = heterospermum
apenninum Levier = heterospermum
aphyllum N. et P. A 199 (×)
apricorum Wiesb. = gadense
arenicula Godet = inclinatum
argenteum N. et P. 454 (21 β)
argutidens Belli (crinitum) 487 (127 β)
argutidens Fr. 494 (144 β)
argutidens Fr. ex Zahn (ramosum) A 198
armerioides Arv. T. 481 (104), A 197

Digitized by Google

HIERACIUM III 442 (956)
arolæ Murr A 196
Aronicum Arv. et Belli = Gortanianum
arvense Scop. = Sonchus arv.
asperum Arv. T. et Belli 465 (58)
asterinum Arv. T. et Briq. A 197 (90 var.)
atratum Belli (*muror.*) 493 (141 ζ)
atratum Fr. 492 (139), A 199
atropaniculatum Zahn (*silvat.*) A 199 (141 θ for.)
atropurpureum N. et P. (*fuscum*) A 195
atrovirens Guss. = murorum
aurantellum N. et P. A 195 (X)
aurantiacoides Arv. T. 454 (24)
aurantiacum L. 454 (23), A 195
aurant. X Auricula N. et P. = pyrrhanthes
aurant. X furcatum N. et P. = fulgens
aurant. X glaciale N. et P. = aurantellum
aurant. X Pilosella Asch. = stoloniflorum
aurant. X Smithii = fuscum
aureum Scop. = Crepis aurea
Auricula L. p. p., Lam. et DC. 448 (7), A 194
Auricula Sm. = Smithii
Auricula X Pilosella = auriculæforme
auriculæforme Fr. 449 (9)
auriculifolium Arv. T. et Briq. A 196
Ausserdoferi Hausm. A 199 (X)
australe Fr. 504 (166), A 200
austriacum Uechtr. 489 (133)
autumnale Sch.-Bip. (muror.) = silvaticum
Balbisianum Arv. T. et Briq. A 201
baldense N. et P. (*illyricum*) A 198
barbatum Arv. T. (*villosum*) 476 (88 α)
barbatum Heg. et Heer = piliferum
barbatum Tausch = heterospermum
basifoliatum N. et P. (*dentat.*) A 197 (90 for.)
Bauhinii Schultes 454 (22)
Berardianum Arv. T. 460 (37), A 196
bernense Christen. A 195
Berninæ Griseb (*florentinum*) 452 (19 ζ)
Bertiscum Pancic = undulatum
Besseanum Favrat = Favreanum
Bicknellianum Belli et Arv. T. 465 (54)
bicolor Koch (aurant.) = Guthnickian.
bifidum Kit. 492 (140)
bifrons Arv. T. p. p. = vallisiacum
blattarioides L. = Crepis blatt.
HIERACIUM III 442 (956)
Bocconei Griseb. 458 (30), A 195
Boissieri Huet 479 (97 γ)
boreale Fr. 503 (164), A 200
Boreanum Jord. = rigidum
Borneti Burn. et Gr. 457 (25)
brachiatum Bert. 449 (10)
brachycomum N. et P. A 194 (X)
Braunianum Zahn et Chen. A 197
brennerianum Arv. T. (*ramosum*) A 198
brevicaule N. et P. (*sulphur.*) A 195
brevifolium Tausch 501 (159 ζ)
brevifolium Tausch p. p. = latifolium
breviscapum Gaud. = Smithii
breviscapum Koch p. p. = glaciale
breyninum G. Beck = parcepilosum
brunellæforme Arv. T. 488 (113), A 197
brutium N. Terr. (*scorzonerifol.*) A 197 (97 var.)
Buekii Thüm. = Auricula
bulbosum W. = Crepis bulb.
bupleurifolium Tausch A 200 (158 var.)
bupleuroides Gm. 486 (124), A 198
Burnati Arv. T. 470 (71)
cadinense Evers A 196 (X)
cærulaceum Arv. T. A 195 (X)
cæruleum Scop. = Mulgedium cærul.
cæsioides Arv. T. 491 (137)
cæsium Fr. A 199 (X)
calabricum Huet 482 (108 β)
calabrum N. Terr. (*Pilosella*) A 198 (4 var.)
calcicolum N. et P. (*subspecios.*) A 197
Calisii Evers = lejosoma
callianthum Arv. T. 478 (96)
calocephalum Uechtr. 472 (nota)
calodon Tausch A 195 (X)
calvescens Arv. T. (*glandulif.*) 480 (101 β)
calvifolinm N. et P. (villos.) = callianthum
calycinum Arv. T. 486 (124 β)
Camerarii All. = incanum DC.
canescens Schl. p. p. = austriacum
canum Vukot. (non N. et P.) = Pilosella
capillaceum All. = Scorzonera hirsuta
capillatum N. et P. (*niphobium*) A 194
caricinum Arv. T. (*florentinoides*) 454 (21 γ)
carnosum Wiesb. A 198 (X)
celvæ Evers A 198
cenisium Arv. T. 478 (95)
cephalotes Arv. T. 491 (nota)
ceratodon Arv. T. 484 (116)
Cerinthoides L. A 201
Chaberti F. O Wolf A 194 (X)
HIERACIUM III 442 (956)
Chiovendanum Belli (*muror.*) 492 (141 γ)
chloræfolium Arv. T. 477 (93) A 197
chlorocephalum Wimm. = Bocconei
chlorolepis Belli (*Auricula*) 448 (7 γ)
chloropsiforme Arv. T. 471 (74 β)
chloropsis Gr. et Godr. 471 (74)
chlorospermum Arv. T. (*pictum*) 478 (80 β)
chondrillæfolium Fr. p. p. = chondrilloides Vill.
chondrilloides L., Jacq. = Crepis Jacquini
chondrilloides Vill. 485 (122)
Christii Arv. T. A 196 (X)
chrysanthes N. et P. (*fuscum*) A 195
cichoriaceum Arv. T. 496 (147 α)
ciliatum W. = Picris Sprengeriana
ciliolatum Arv. T. (*Lemanian.*) A 200
Cimarollii Zahn (*cochlearifol.*) A 196
cinerescens Auct. pl. = murorum
cinerescens Gr. et Godr. (et Auct.) 488 (112)
cinerescens Jord. = lasiophyllum
cinereum Arv. T. (*ochroleucum*) 463 (46 α)
cinereum Arv. T. (*picroides*) 463 (47 β)
cinereum Arv. T. (*ps.-picris*) A 196 (48 var.)
cirritoides Zahn (*muror.*) A 199 (141)
cirritum Arv. T. 488 (129), A 198
citrinum Zahn et Besse (*tephrodes*) A 195
coarctatum Arv. T. 496 (147 ε)
cochleare Huter 459 (32), A 196
cochleare Kern. = cochlearifol.
cochlearifolium Zahn A 196 (X)
cœlatum Arv. T. 474 (83 β)
colognense Murr A 196 (39 for.)
Columnæ Ten. = Crepis Column.
Columnæ B Ten. = Crepis — hispidula Fiori
commixtum Jord. = vulgatum
commutatum Beck. et Lindeb. = boreale
concinnum Jord. = boreale
confusum Jord. = præruptorum
conicum Arv. T. = corymbosum
conringiæfolium Arv. T. 462 (45)
conringioides Arv. T. 464 (51)
conyzaceum Arv. T. 462 (44)
conyzæfolium Gouan = Crepis conyz.
conyzoideum Lam. = prec.
cophanense Lojac. 487 (126

Digitized by Google

HIERACIUM III 442 (956)
coriifolioides Evers A 201
coriifolium Arv. T. 491 (137 γ)
coronariæfolium Arv. T. 468 (65 β)
coronopifolium Fr. 501 (159 ε)
corsicum Hort = cerinthoides
corsicum Le Grand (*ps.-cerinthe*) A 196 (86 var.)
corsicum Reverch. = adenoclinium
coruscans Fr. 471 (73)
corymbosum Fr. 502 (162)
corymbosum Gaud. (præmorsum) = Crepis Frœlichiana
corymbuliferum Arv. T. 450 (13), A 194
cotoneifolium Frœl. = valdepilosum
Cotteti Christ = humile v. opimum
cottianum Arv. T. 497 (151)
crepidifolium Arv. T. 495 (146)
crepidifolium Polaki (*muror.*) A 199 (141 var.)
crinisquamum N. et P. A 197
crinitum S. et S. 487 (127), A 198
crinopodum N. et P. (*illyricum*) A 198
crispulum N. et P. (*armerioides*) A 197 (104 for.)
croaticum Schlaff. = heterospermum
croaticum W. et K. = Crepis mollis α croat.
crucimontis Zahn (*prediliense*) A 199
cruentum N. et P. A 194 (X)
crystallinum Arv. T. et Briq. (*muror.*) A 199 (141 var.)
ctenodon N. et P. A 199 (X)
cuneense N. et P. (*florent.*) A 194 (19 var.)
cyaneum Arv. T. 483 (114)
cydoniæfolium Fr., Nym. (an Vill.?) = ochroleucum
cydoniæfolium Huter = pseudo-picris
cymellum Arv. T. 452 (17 β)
cymosum L. 451 (17), A 194
cymoso X aurantiac. N. et P. = cruentum
cymoso X Auricula N. et P. = sciadophorum
dasytrichum Arv. T. 481 (106)
De-Aquini Tin. = Crepis — De-Aquini
decipiens Dœll (prœalt.) = Bauhini
decipiens Tausch A 196
decorum N. et P. (*expallens*) A 197 (90 for.)
Delasoiei Lagg. 485 (122 γ)
delicatulum Arv. T. A 198
deltophyllum Arv. T. 502 (161 α)
densicapillum N. et P. A 194 (X)
dentatiforme N. et P. (*dentat.*) A 197 (90 for.)
dentatum Arv. T. (*Sartorianum*) 482 (108 α)
dentatum Frœl. (porrifol.) = glaucum
HIERACIUM III 442 (956)
dentatum Hpe. 476 (90), A 197
dentatum Tausch (collin.) = calodon
dentifolium N. et P. (*expallens*) A 197 (90 for.)
depauperatum Jord. = vallisiacum
depilatum Belli (*Pelleterianum*) 448 (6 β)
depilatum Belli (*Pilosella*) 447 (4 η)
depressum Arv. T. (*Berardian.*) A 196 (37 for.)
Derbezianum Arv. T. 460 (37 δ)
Didieri Arv. T. = bor. β pubescens
digeneum Burn. et Gr. 471 (75)
divaricatum Huter P. et R. 479 (97 δ), A 197
dolichætum Arv. T. A 196 (X)
dolichocephalum N. et P. (*patulum*) A 198
Dollineri Sch.-Bip. A 198 (X)
Dollineri Sch. Bip. p. p. = austriacum
Dollineri X incisum Zahn = tephropogon
dolosum Burn. et Gr. p. p. = subvirens
dubium L. p. p., Vill. = Auricula
dumosum Jord. = boreale
elatum Fr. p. p. = vallisiacum
elatum N. Terr. = Crepis biennis
elbanum Belli in Baroni = lasiophyll.
elisum Arv. T. (*cirritum*) A 198 (129 var.)
elongatum W. p. p. 477 (91), A 197
elongato X mycelioides Zahn = kalsianum
ephemeridifolium Arv. T. = strictum
epimedium Fr. 495 (145 δ)
ericetorum Arv. T. (*boreale*) 503 (164 ζ)
ericetorum Arv. T. (*umbell.*) 501 (159 η)
eriophyllum W. 470 (70 β)
eriopodoides Zahn (*carnosum*) A 198
eriopodum Arv. T. (*Berardianum* 460 (37 β)
eriopodum Kern. A 198
ermineum N. et P. (*Pilosella*) A 193 (4 var.)
erucoides Arv. T. 491 (137 β)
eurybasis N. et P. (*villos.*) A 197 (88 for.)
exilentum Arv. T. 495 (145 β), A 199
expallens Fr. A 197 (90 var.)
Facchinii Rchb. (glaucum) = australe
falcatum Arv. T. 485 (121), A 198
farinulentum Jord. 474 (85)
fasciculiflorum Arv. T. 451 (17 α)
Faurei Arv. T. 450 (14), A 194
Favreanum Arv. T. 480 (102 γ)
HIERACIUM III 442 (956)
Ferrarianum Belli 467 (63)
Ferrarianum Belli (*elongatum*) 477 (91 β)
filicaule Murr ex Zahn (*bernense*) A 195
filifolium Arv. T. (*umbell.*) 501 (159 β)
filiforme Lindeb. = rigidum
Fiorianum Belli (*Borneti*) 457 (25 β)
flagellare Rchb. = brachiatum
Flahaultianum Arv. T. et Gaut. A 201
flammans N. et P. (*aurant.*) A 195 (23 var.)
flavescens Evers (*muror.*) A 199 (141 var.)
flexuosum DC. = scorzonerifol.
flexuosum W. et K. 479 (97 α)
florentinoides Arv. T. 453 (21)
florentinum All. 452 (19), A 194
florent. X Auricula N. et P. = sulphureum
florent. X echioides N. et P. = calodon
florent. X Pilosella = florentinoides
florent. X tardans N. et P. = tephrodes
Friesii Hartm. = rigidum
Frœlichii Koch (porrifol.) = saxatile
fulgens N. et P. A 195 (X)
fuliginatum Huter 480 (101 γ)
fuliginosum Posp. (*boreale*) A 200 (164 for.)
furcatum Hpe. 451 (15)
furcato X Auricula N. et P. = brachycomum
fuscum Arv. T. (*ochroleucum*) 468 (46 β)
fuscum Arv. T. (*picroides*) 468 (47 α)
fuscum Arv. T. (*ps.-picris*) A 196 (43 var.)
fuscum Vill. A 195 (X)
gadense Wiesb. A 198
Ganderi Hausm. A 199
gapense Arv. T. 476 (90 β)
garganum Arv. T. = jurassicum
Garibaldianum Fr. A 198
Garidelianum Arv. T. et Gaut. A 196 (X)
Gaudini Christen. 476 (90 α)
Gelmianum Sarnth. (*incisum*) A 199 (135 for.)
Gibellianum Arv. T. et Belli 469 (66)
Gisleri Lagg. 476 (90 γ)
glabratum Hpe. 479 (97 β), A 197
glabrescens Belli (*humile*) 458 (29 β)
glabrescens Chen. (*Gremlii*) A 197
glabrum Frœl. (villos.) = callianthum
glaciale Reyn. in Lach. 450 (12), A 194
glaciale X Auricula = Smithii
glaciale X Pilosella = Faurei

Digitized by Google

HIERACIUM III 442 (956)
glaciellum N. et P. = Faurei
glanduliferum Hpe. 480 (101), A 197
glandulifero × villosum = dasytrichum
glandulosissimum Zahn (*Bocconei*) A 195 (30 for.)
glareosum Koch (*florentinum*) 458 (19 η)
glaucescens Besser = Bauhinii
glaucescens Gremli (*pulmonarioides*) A 196 (89 for.)
glaucescens Murr et Zahn (*tridentin.*) A 198
glauciforme N. et P. ex Evers A 201
glaucocephalum N. et P. A 200 (×)
glaucophyllum Huet = scorzonerifolium
glaucopsis Gr. et Godr. 485 (122 β)
glaucum All. 484 (119)
glaucum DC. = bupleuroides
gnaphalodes Arv. T. 474 (86)
Godeti Christen. = bernense
Gortanianum Arv. T. et Belli 476 (89)
gothicum Fr. = rigidum
gracilentum Arv. T. (*glandulifer.*) A 197 (101 for.)
graminifolium Frœl. = bupleuroides
graminifol. Tausch (porrifol.) = glaucum
grandiflorum All. = Crepis conyzæfolia
grandiflorum DC. (Pilos.) = Hoppeanum
grandifolium Arv. T. = hemiplecum
graniticum Sch. Bip. = cyaneum, cfr. A 198
Gremlii Arv. T. A 197
grisanoense Beyer = tridentatum × vulgatum
Grovesianum Arv. T. 498 (142)
Guthnickianum N. et P. (*cruentum*) A 194
gymnocephalum Griseb. 472 (nota)
hæmatodes Vill. hb. (*vulgat.*) A 199 (144 var.)
halimifolium Frœl. 501 (159 ι)
Halleri Vill. 459 (31 γ), A 195
Hausmanni Sch. Bip. = rigidum
Hellwegeri Murr et Zahn A 200 (×)
hemiplecum Arv. T. 495 (145 ε)
Hervieri Arv. T. = heterospermum
heterospermum Arv. T. 505 (168), A 200
hirsutissimum F. Schultz (mutabile) = calodon
hirsutum Arv. T. (*humile*) 458 (29 γ)
hirsutum Arv. T. (*ochroleucum*) 463 (46 γ)
hirsutum Arv. T. (*picroides*) 463 (47 γ)
hirsutum Cald. (non Tausch) = quid?
HIERACIUM III 442 (956)
hirsutum Koch (præalt.) = calodon
hispidulum Arv. T 458 (26)
hispidum Fr. = Bocconei
hœttingense Murr (*dentat.*) A 197 (90 for.)
hololeptum N. et P. (*glandulifer.*) A 197 (101 for.)
Hoppeanum Schult. 447 (5), A 194
Hopp. × Auricula N. et P. = latisquamum
Hopp. × brachycomum N. et P. = lathræum
Hopp. × Pilosella N. et P. = hypeurium
horrens Murr et Zahn (*tridentin.*) A 198
Hostianum Wiesb. = heterospermum
Hugueninii Belli (*prenanthoid.*) 498 (153 ζ)
humile Jacq. 458 (29), A 195
hum. × amplexicaule = urticaceum
hum. × glabratum Murr = flicaule
hum. × glaucum Zahn = Kæserianum
hum. × murorum = squalidum
hum. × Schmidtii Zahn = cærulaceum
hum. × scorzonerifolium 484 (nota)
humiliforme Murr (*incisum*) A 199 (135 for.)
Huteri Hausm. = picroides
hybridum Chaix 458 (20)
hyoseridifolium Vill. = Crepis tergloviensis
hypericifolium Arv. T. = subsabaudum
hypeurium N. et P. A 194 (×)
hypochœrideum Arv. T. 490 (134)
hypochœrioides Ambr. = Crepis pontana
hypoleucum Arv. T. (*Faurei*) 450 (14 β)
illyricum Fr. A 198
illyricum Fr. p. p. = glaucum
ilvanum Arv. T. in Somm. A 197
incanum Arv. T. 447 (4 ε)
inalpestre N. et P. (*Pilosella*) A 193 (4 var.)
incanum Arv. T. 447 (4 ε)
incanum DC. (Pilosella) = prec.
incanum L. = Leontod. incan.
incarnatum Wulf. = Crepis incarn.
incisum Hpe. 490 (135), A 199
inciso × dentatum Arv. T. (pedemont.) = Garidelian.
inclinatum Arv. T. 485 (123)
insigne Favre (glandulif.) = Favreanum
insulare Rouy (*lactescens*) A 200
insulicolum Arv. T. et Briq. (*heterosperm.*) A 200 (168 β)
integrifolium Belli (*polyadenum*) 465 (52 α)
HIERACIUM III 442 (956)
integrifolium Hpe. = Crepis mollis β succisæfolia
intermedium Arv. T. (*alpin.*) A 195 (31 α for.)
interruptum Belli (*polyadenum*) 465 (52 γ)
intertextum Arv. T. 466 (58)
intybaceum α Lam. = Crepis — subruncinata
intybaceum Wulf. 463 (48)
intybellifolium Arv. T. 497 (149)
irriguum Jord. = vulgatum
italicum Fr. 487 (123 β)
Jaborneggi Pach. = dolichocephalum
jaceoides Arv. T. 496 (147 β)
Jacobeæfolium Frœl. 501 (159 κ)
Jaquetianum Zahn = adenophyllum
Jacquini Vill. = humile
Jordani Arv. T. 467 (59), A 196
juranum Fr. = jurassicum
jurano × picroides Arv. T. = Christii
jurassicum Griseb. 496 (147), A 200
juratense Gr. et Godr. (glauc.) = bupleuroides
jurellum Arv. T. et Belli 496 (147 θ)
Kæserianum Zahn A 195 (×)
kalsianum Huter 497 (150 β), A 200
Knollense Evers A 201
Kochianum Jord. A 201
Kochii Gremli (*glaciale*) 450 (12 α)
Kralikii Rouy A 194
laceridens Murr (*incisum*) A 199 (135 for.)
lacerum Reut. 458 (28)
lactaris Bert. A 200 (159 for.)
lactescens Rouy A 200
lactucaceum Fr. p. p. = lactescens
lactucaceum Frœl (*non Schrank*) A 200
lactucæfolium Arv. T. p. p. = conyzaceum
lactucella Wallr. = Auricula
lævibifidum = levibifidum
lagarinum Evers A 198
Laggeri Jord. = Jordani
Laggeri Sch. Bip. 450 (12 β)
Lamotteanum Arv. T. = heterospermum
lamprocomum N. et P. (*hypeurium*) A 194
lanatellum Arv. T. 474 (84)
lanatum Vill. 467 (60), A 197
lanatum Waldst. = Waldsteinii
lanceolatum Vill. 500 (157), A 200
lancifolium N. et P. (*florent.*) A 194 (19 var.)
lansicum Arv. T. 468 (64)
lantoscanum Burn. et Gr. 468 (47 δ)
lapponicum Fr. = rigidum
lasiophyllum Koch 483 (111), A 197

Digitized by Google

HIERACIUM III 442 (956)
lasiothrix N. et P. (*hypeurium*) A 194
lateriflorum Arv. T. et Belli 487 (nota)
lathræum N. et P. A 194 (X)
latifolium Belli (*polyadenum*) 465 (52 β)
latifolium Spr. 503 (168)
latisquamum N. et P. A 194 (X)
Lawsonii Vill. = saxatile
laxum N. et P. (*fuscum*) A 195
lejocephalum Bartl. p. p. = australe
lejopsis Murr et Zahn (racemosum) = heterospermum
lejosoura N. et P. A 200 (X)
Lemanianum Arv. T. A 200
leoninum N. et P. A 197 (93 var.)
lepidotorum Arv. T. (*muror.*) 493 (141 ε)
lepidum Arv. T. 491 (137 δ)
leptopogon Ehrenb. = Picris Sprengeriana
leucochlorum Arv. T. 480 (103), A 197
leucophæum Gr. et Godr. 484 (nota)
leucopogon Zahn (villosiceps) = villosum α barbat.
levibifidum Arv. T. 492 (140 β)
levicaule Jord. 494 (144 δ)
leviceps N. et P. (*bupleuroides*) A 198 (124 var.)
levigatum W. = austriacum, rigidum
ligusticum Rchb. = urticaceum
limonium Griseb. (*umbellat.*) A 200 (159 var.)
linifolium Lindeb. = rigidum
Liottardi Vill. 467 (61), A 197
litoraneum Belli (*florentinum*) 453 (19 κ)
lonchites N. et P. (*dentat.*) A 197 (90 for.)
Longanum Belli et Arv. T. 489 (131), A 198
longifolium Schleich. 466 (57)
lucidum Guss. 486 (125), A 198
lutescens Huter = pseudo-picris
lychnioides Arv. T. 473 (81)
lycopifolium Frœl. 500 (158 α)
macracladium N. et P. (*scorzonerifol.*) A 197 (97 var.)
macranthoides Zahn (*incisum*) A 199 (135 for.)
macranthum Auct. = stenolepis
macranthum Ten. hb. = Hoppeanum
maculatum Frœl. (muror.) = silvaticum
maculatum Sm. (*vulgat.*) A 199 (144 for.)
Magistri Godr. = rigidum
magyaricum N. et P. = Bauhini
Mairanum Belli 491 (138)
Mairanum Manfeld = anadenum
majellense Huet 479 (97 ζ)
HIERACIUM III 442 (956)
maranzæ Murr et Zahn (*boreale*) A 200 (164 for.)
marmoratum N. et P. (*dentat.*) A 197 (90 for.)
Mattirolianum Arv. T. et Belli 482 (109)
megacephalum Belli (*prenanthoid.*) 498 (153 ε)
megalocladum N. et P. (*crinisquam.*) A 197
meizocephalum N. et P. (*cymosum*) A 194 (17 var.)
melandryfolium Arv. T. 469 (67)
melanocephalum Belli (*Auricula*) 448 (7 β)
melanocephalum Tausch (*alpin.*) A 195 (81 α for.)
melanophæum N. et P. (*subspecios.*) A 197
melanops Arv. T. 488 (129 β)
melanotrichum Belli (*Hoppeanum*) 448 (5 α)
menthæfolium Arv. T. 469 (68)
mespilifolium Arv. T. A 200
Michelianum Arv. T. et Belli 470 (72)
Michelii N. et P. (*florent.*) A 194 (19 var.)
micranthum Huet = serpyllif.
microcephalum Arv. T. (*rupicolum*) 484 (115 β)
microcephalum Gremli (*murorum*) 492 (141 β)
milleglandulum Zahn (*Halleri*) A 195 (81 β for.)
misaucinum N. et P. A 197 (90 var.)
mixtum Rota A 201
molle Jacq. = Crepis mollis
monocephalum Huter = pseudopicris
montanum Jacq. = Crepis pontana
montanum Scop. = Crepis incarnata
monticola Jord. 501 (159 δ)
Morisianum Rchb. 471 (nota)
Moritzianum Heg. A 195
mucronatum Fr. (*lucidum*) A 198 (125 for.)
multiflorum Schleich., Gaud. = cruentum
multiglandulum N. et P. (*pilifer.*) A 197 (98 for.)
Muretii Gremli A 199
Murithianum Favre = armerioides
muroriforme Zahn (*incisum*) A 199 (135 for.)
murorum Auct. nord. et L. p. p. = vulgatum
murorum L. 492 (141), A 199
mur. X heterosperm. = Grovesianum
mutabile F. Schultz = florentinum, Bauhini
Muteli Arv. T. 471 (74 α)
myoelioides Griseb. = ochroleuc. v. piliferum
Nægelianum Pancic A 198 (117)
nanum Scheele = serpyllifol.
HIERACIUM III 442 (956)
neapolitanum Huet = villosum
neglectum Arv. T. 460 (85), A 196
nemorense Gr. et Godr. = murorum
neocerinthoides Arv. T. 466 (55)
neoprenanthes Arv. T. 499 (155)
nervulosum Arv. T. et Gremli A 199 (141 var.)
Nestleri Koch = cymosum
Nestleri Vill. 452 (17 γ)
nigrescens Gr. et Godr. (*Pilosella*) 447 (4 β)
nigrescens W. A 196 (X)
nigrescentiforme Zahn (*nigresc.*) A 196
nigritellum Arv. T. (ustulatum) = Favreanum
niphobium N. et P. = Smithii A 194
niphostribes N. et P. (*niphobium*) A 194
nœvibifidum Arv. T. 492 (140 α)
Notarisii Rchb. f. A 200
nudum Gr. et Godr. (villos.) = callianthum
oblongifolium N. et P. (*expallens*) A 197 (90 for.)
obscurum Posp. (*boreale*) A 200 (164 for.)
obscurum Rchb. 453 (19 ι)
occitanicum Jord. = bor. β pubescens
ochroleucum Huter p. p. = pseudo-picris
ochroleucum Schleich. 468 (46), A 196
odontinum Arv. T. 499 (156)
odontoglossum Arv. T. (*Halleri*) A 195 (81 β for.)
oleraceum Scop. = Sonchus oleraceum
oligocephalum Arv. T. 475 (87)
oligocephalum Evers (*tridentin.*) A 198
olygadenum Belli (*symphytac.*) 505 (167 β)
opimum Arv. T. (*humile*) 458 (29 δ)
oreites Arv. T. 490 (135 β)
orfentanum Belli (*jurassic.*) 496 (147 δ)
orophyllum Arv. T. 503 (164 α)
orthorrizon N. et P. (*densicapill.*) A 194
ovalifolium Jord. = silvaticum
oxyodon Arv. T. hb. = prediliense
oxyodon Fr. 489 (132 β), A 198
pachilodes N. et P. 447 (4 δ)
Paicheanum Arv. T. A 199 (X)
pallescens Wimm. = Schmidtii
pallidiflorum Jord. = picroides
pallidum Fr. = Schmidtii
paludosum L. = Crepis pal.
Pamphili Arv. T. 470 (70)
pappoleucum Vill. = Crepis — pappol.
parcepilosum Arv. T. 497 (152)

Digitized by Google

HIERACIUM III 442 (956)
parviflorum Schl. = Crepis Frœlichiana
parviflorum Tausch (angustifol.) = glaciale
parvulum Ten. = Crepis — pumila Fiori
patulum N. et P. A 198
pedemontanum Arv. T. = polyadenum
pedemontanum Burn. et Gr. 461 (40)
Pelleterianum Mérat 448 (6)
Pelleter. × Auricula N. et P. = xystolepium
pellitum Fr. 473 (82)
penninum N. et P. = falcatum
perfoliatum Frœl. = prenanthoides
perpilosum Arv. T. 476 (88 γ)
Perreymondi Jord. = heterospermum
petræum Hpe. A 196 (37 for.)
petrophilum Arv. T. (*amplexic.*) 461 (88 δ)
phalacrophyllum N. et P. (*armerioides*) A 197 (104 for.)
phlomidifolium Arv. T. 468 (65 α)
Pichleri Kerner 472 (nota)
picroides Auct. et Vill.? 463 (47), A 196
pictaviense Sauzé et Maill. = rigidum
pictiforme Belli et Arv. T. 474 (88)
pictum Schleich 478 (80)
picto × tomentos N. et P. = pulchellum
piliferum Griseb. (*ochroleuc.*) A 196 (46 var.)
piliferum Hpe. 479 (98), A 197
pilif. × eriophyllum = pteropogon
(pilif. × villos.) × silvat. Zahn = aphyllum
pilifolium Arv. T. (*armerioides*) 481 (104 β)
Pilosella L. 446 (4), A 198
Pilos. × florentinum = brachiatum
(Pilos. × Peleterianum) × cymosum = hybridum
pilosellæforme Hpe. = Hoppeanum
pilosellinum Gr. et Godr. = brachiatum
piloselloides Vill. 453 (19 θ)
pilosissimum Wallr. (Pilos.) = Peleterianum
plantagineum Arv. T. p. p. = calcicolum
platyphyllum Arv. T. = latifolium
pleioscapum Zahn (*pulchell.*) A 197
pleiotrichum Zahn (*silvat.*) A 199 (141 θ for.)
plurifolium Arv. T. (*austriacum*) 490 (133 β)
pogonites N. et P. A 197 (×)
poliocephalum N. et P. A 193 (×)
HIERACIUM III 442 (956)
poliocladum N. et P. (*florent.*) A 194 (19 var.)
politum Christen = Mureti
politum Fr. p. p. = glaucum
pollinense N. Terr. (macranthum) = stenolepis
polyadenum Arv. T. 465 (52)
polyphyllum Tausch = bupleuroides
porrifolium L. 484 (118)
porrifolium Vill. = glaucum
Portanum Belli 472 (77)
præalpinum Arv. T. A 201
præaltiforme Belli (*florentinum*) 452 (19 ε)
præaltum Vill. 452 (19 δ)
præalt. × cymosum Rouy = sclerotrichum
præcox Auct. pl. = murorum
præcox Sch. Bip. p. p. 492 (141 α)
præmorsum L. = Crepis præm.
præruptorum Gr. et Godr. A 200 (157 for.)
prætensum Arv. T. et Briq. A 200
prætenue Besse et Zahn A 201
prediliense N. et P. A 199 (×)
prenanthoides Gr. et Godr. = jurassicum
prenanthoides Vill. 498 (153), A 200
pren. × glaucum Zahn = glaucocephalum
pren. × Schmidtii Zahn = subtiliss.
pren. × silvat. Zahn et Besse = salassorum
pren. × villos. F. Sch. = valdepilosum
prenanthopsis Murr et Zahn (*ps.-juranum*) A 200 (147 ζ for.)
primulæfolium Viv. = Taraxacum obovatum
prionodes N. et P. (*dentat.*) A 197 (90 for.)
Profetanum Arv. T. (cephalotes) = seg.
Profetanum Belli 491 (136)
provinciale Jord. = heterospermum
prunellæfolium Gouan = Crepis pygmæa
psammogenes Zahn (*subcæsium*) A 199 (141 η for.)
pseudo-alpinum N. et P. A 196
pseudo-baldense Murr et Zahn (*tridentin.*) A 198
pseudo-boreale Arv. T. 503 (164 ε), A 200
pseudo-capnoides Zahn (*alpin.*) A 195 (31 α for.)
pseudo-cerinthe Koch 460 (36), A 196
Pseudo-Cotteti Zahn (*humile*) A 195 (29 var.)
pseudo-cyaneum Zahn (*graniticum*) A 198
Pseudo-Dollineri Murr et Zahn (*carnosum*) A 198
pseudo-elongatum N. et P. A 197 (91 var.)
HIERACIUM III 442 (956)
pseudo-eriophorum Burn. et Gr. (non Lor. et Timb.) = polyadenum
pseudo-eriopodum Zahn (*prediliense*) A 199
pseudo-flexuosum N. et P. (*glabratum*) A 197 (97 β for.)
pseudo-gothicum Arv. T. = rigidum
pseudo-graniticum Besse et Zahn (*Wiesbaurianum*) A 199
Pseudo-Halleri Zahn (*nigresc.*) A 196
pseudo-juranum Arv. T. 496 (147 ζ), A 200
pseudo-lanatum Arv. T. 471 (76)
pseudo-picris Arv. T. 462 (43), A 196
Pseudo-Pilosella Ten. 446 (3)
pseudo-præcox Zahn (*subcæsium*) A 199 (141 η for.)
pseudo-rhæticum Zahn (*nigresc.*) A 196
pseudo-senile Zahn (*Ausserdorferi*) A 199
pseudo-tridentinum Zahn (*tephropogon*) A 199
pseudo-villos. N. et P. (*dentat.*) A 197 (90 for.)
pteropogon Arv. T. 469 (69)
puberulum Arv. T. (armerioides) 481 (104 γ)
pubescens Arv. T. (*boreale*) 503 (164 β)
pulchellum Gr. et Godr. A 197 (×)
pulchrum Arv. T. 478 (94)
pulmonarioides Vill. 461 (39), A 196
pumilum Hpe. A 195 (31 var.)
pumilum Lap. A 194
pumilum L. = Crepis pygmæa
pumilum Ten. = Crepis — pumila Fiori
pygmæum Arv. T. (*pulmonarioides*) A 196 (39 for.)
pyramidale Burn. = polyadenum
pyrenaicum L. = Crepis blattarioides
pyrrhanthes N. et P. A 195 (×)
racemosiforme Zahn A 200 (×)
racemosum W. et K. = heterospermum
racemos. × latifol. Zahn = Hellwegeri
racemos. × porrifol. Zahn = racemosiforme
radiocaule Rchb. = Bauhinii
ramosissimum Schleich. p. p. = conringioides
ramosum W. et K. A 198
raphiolepium N. et P. (*kalsian.*) A 200 (150 β for.)
rapunculoides Arv. T. 494 (143)
Ravaudii var. Arv. T. = digeneum
Reichenbachii Verlot p. p. = urticaceum

Digitized by Google

HIERACIUM III 442 (956)
rhæticum Fr. 459 (84)
rhæticum Rota A 196
rhæadifolium Kern. (*Trachselian.*) A 198 (132 var.)
rigidatum Jord. = rigidum
rigidum Hartm. 502 (161)
Rigoanum Arv. T. et Belli 481 (107)
rivulare Evers (*tridentin.*) A 198
Rostani Arv. T. 445 (2)
Rotgesianum Arv. T. et Gaut. A 198 (128 var.)
roveretanum Evers A 201
rubellum Koch (sabinum) = cruentum
rupestre All. 472 (78)
rupestre Belli (*Pilosella*) 447 (4 ζ)
rupestre Evers (*tridentin.*) A 198
rupestre Schmidt = Schmidtii
rupicaprœ Schrank = piliferum
rupestre W. = Crepis — Willdenowiana
rupestre × staticæfol. = Rostani
rupicolum Fr. 484 (115)
rupigenum Arv. T. 462 (42)
sabaudum All. = boreale, umbellat. et vallisiac.
sabaudum Gr. et Godr. = vallisiacum
sabaudum L. p. p. 503 (164 η)
sabinum Seb. et M. 452 (18)
(sabin. × cymos.) × Auricula = corymbuliferum
sabin. × glaciale N. et P. = densicapillum
sabin. × niphobium N. et P. = tendinum
sabin. × Smithii Zahn = tendinum
salassorum Zahn et Besse A 200 (×)
salicifolium Reverch. 501 (159 α)
sanctum L. = Pterotheca nemausensis et Pt. bifida
sanctum N. et P. A 200
sardoum Belli (*serpyllifolium*) 449 (8 β)
sarracenicum Arv. T. et Belli 498 (154)
Sartorianum Boiss. et Heldr. 482 (108)
saxatile Jacq. A 198
saxatile Vill. 466 (56)
saxetanum Fr. p p. = glaucum
scabriceps N. et P. (*bupleuroides*) A 198 (124 var.)
schizocladum Zahn (scorzonerifol.) = divaricatum
Schleicheri Arv. T. = sixtinum
Schlosseri Huter, P. et R. (non Rchb.) = Portanum
Schmidtii Tausch 482 (110)
Schmidtii Tausch p. p. = cyaneum
Schraderi Koch = piliferum
Schultesii F. Schultz 449 (9 β)
sciadophorum N. et P. A 194 (×)
HIERACIUM III 442 (956)
sciaphilum Uechtr. = vulgatum
sclerotrichum Arv. T. A 195 (×)
scorzonerifolium Vill. 479 (97), A 197
seneppense Arv. T. 496 (148)
Seridis Fr. = boreale?
serotinum Host 501 (159 θ)
serpyllifolium Fr. 449 (8), A 194
serratulinum Arv. T. = heterospermum
sessilifolium Friv. = heterospermum
siculum Guss. 504 (165)
silvaticum Auct. nord. = murorum
silvaticum Lam. et Auct. pl. = vulgatum
silvaticum L. (*muror.*) 493 (141 θ), A 199
silvat. × glaucum Zahn = cæsium
(silvat. × pilifer.) × villos. Zahn = Paicheanum
silvat. × porrifol. N. et P. = prediliense
silvat. × villosum N. et P. = dentatum
silvestre Tausch et Frœl. = boreale
Simia Huter (*Bocconei*) A 195 (80 var.)
sixtinum Arv. T. 477 (92), A 197
Smithii Arv. T. 450 (11)
Soleirolianum Arv. T. et Briq. A 194
sparsifolium Lindeb. = rigidum
speciosum Horn. = pulchrum?
spelæum Arv. T. 461 (88 β)
speluncarum Arv. T. = amplexic. var. subhirsutum
sphærocephalum Frœl. = furcatum
spicatum All. 498 (153 α)
Sprengerianus L. = Picris Sprenger.
spurium Bruegg. = latisquamum
spurium Chaix = hybridum
squalidiforme Murr et Zahn (Vollmanni) = squalidum
squalidum Arv. T. 458 (27), A 195
squamatum Arv. T. 479 (97 s)
stagalligerum Arv. T. (*florentinum*) 452 (19 β)
staticæfolium All., Vill. 445 (1)
Staui Belli 472 (79)
stelligerum Frœl A 201
stenodontum Arv. T. et Belli 459 (88)
stenolepis Belli (*Hoppeanum*) 448 (5 β), A 194
stenophyllum Rota (*alpin.*) A 195 (81 var.)
stenoplecum Arv. T. 496 (147 η)
Sternbergii Frœl. = Schmithii
stipitatum Jacq. = Willemetia stip.
stiriacum Kern. = heterospermum
HIERACIUM III 442 (956)
stoloniferum Frœl. (angustifol.) = Smithii
stoloniferum Viv. = Crepis bulbosa
stoloniferum Wallr. (prœalt.) = Bauhinii
stoloniflorum Belli (*Pilosella*) 447 (4 γ)
stoloniflorum N. et P. A 195 (×)
stolonosissimum Arv. T. (*Pilosella*) A 198 (4 var.)
stolonosum Belli (*furcatum*) 451 (15 β)
strictissimum Frœl A 200 (157 for.)
strictum Fr. A 200 (157 for.)
stuppeum Griseb., Rchb. = stupposum
stupposum Rchb. 485 (120)
stylodontophyllum Arv. T. 499 (156 β)
styrense Wiesb. hb. = Dollineri (a)
subalpinum Arv. T. 495 (145), A 199
subamplexicaule Arv. T. (*Berardian.*) A 196 (87 for.)
subcæsium Fr. 493 (141 η), A 199
subcanescens Arv. T. (*Pilosella*) A 198 (4 for.)
subcaulescens Arv. T. (*muror.*) A 199 (141 var.)
subcaulescens N. et P. (*Pilosella*) A 198 (4 var.)
subcorymbosum Arv. T. (*incisum*) 490 (135 γ)
subdolum Jord. = heterospermum
subelongatum N. et P. A 200 (×)
subepilosum Zahn (*ochroleuc.*) A 196 (46 var.)
subfallax Arv. T. (*florentinum*) 452 (19 γ)
subglaciale N. et P. (*glaciale*) A 194 (12 var.)
subglaucescens Arv. T. (*boreale*) A 200 (164 var.)
subhirsutum Arv. T. (*amplexic.*) 461 (88 γ)
subhirsutum Arv. T. et Gaut. (*viscos.*) A 196 (50 var.)
subhumile Zahn (Cotteti) = squalidum
subincisum Arv. T. A 199 (135 for.)
subintermedium Zahn (*tephropogon* A 199
sublanigerum Arv. T. (*muror.*) 492 (141 δ)
sublevigatum G. Beck (*Dollineri*) A 198
subnivale Gr. et Godr. 480 (100)
subpallescens G. Beck (*Dollineri*) A 198
subperfoliatum Arv. T. 496 (147 γ)
subpræcox Arv. T. (*muror.*) A 199 (141 var.)
subpubens Arv. T. (*nervulos.*) A 199 (141 for.)

Digitized by Google

HIERACIUM III 442 (956)
subramosum Arv. T. (*ramosum*) A 198
subramosum Arv. T. (*vulgat.*) A 199 (144 var.)
subrubens Arv. T. (*Faurei*) 450 (14 γ)
subrupicolum Arv. T. (*brunellæforme*) A 197 (113 β)
subsabaudum Fr. 503 (164 γ)
subsabaudum Gr. et Godr. (*vallisiacum*) 500 (158 γ)
subspeciosum N. et P. A 197
subtilissimum Zahn A 199 (X)
subvirens Arv. T. 502 (160)
subvittatum Arv. T. (*Auricula*) A 194 (7 var.)
subvulgatum Arv. T. (*pulmonarioides*) A 196 (39 for.)
succissæfolium All. = Crepis mollis β succissæfol.
sulphureum Dœll A 195 (X)
symphytaceum Arv. T. 505 (167)
symphytifolium Frœl. = siculum
Taraxaci L. = Leontod. prat. b. Taraxaci
taraxacifolium Avè-Lall. (grandifl.) = Crepis conyzæfolia α d. taraxacifol.
tardans N. et P. (*Pilosella*) 447 (4 θ)
tardans X glaciale N. et P. = poliocephalum
Tatræ Griseb. = bupleuroides
taurinense Jord. = heterospermum
tendinum N. et P. A 194 (X)
tenuiflorum Arv. T. = muror. β microcephalum
tenuifolium Host = heterospermum
tephrodes N. et P. A 194 (X)
tephrophyllum Arv. T. 500 (158 β)
tephropogon Zahn A 199 (X)
tesinense Evers A 201
thapsoides Arv. T. 468 (65)
Thomasianum Zahn A 198
tigrinum N. et P. (*dentat.*) A 197 (90 for.)
tiroliense A. Kern. = fuscum
tomentellum N. et P. = Burnati
tomentosum All. = lanatum
tomentos. X piliferum N. et P. = pogonites
Trachselianum Christen 489 (132), A 198
trachypodum Kern. = eriopodum
trafoiense Evers A 201
transalpinum Arv. T. 500 (157 β)
transalpinum N. et P. (*Pilosella*) A 193 (4 var.)
translucens Arv. T. 494 (144 ε)
trichadenium N. et P. (*Pilosella*) A 193 (4 var.)
tricheilema N. et P. (*Auric.*) A 194 (7 var.)
trichocalathium Zahn (*pulmonarioides*) A 196 (39 for.)
HIERACIUM III 442 (956)
trichocalycinum Arv. T. (*Bauhinii*) 454 (22 β)
trichocephalum Lk. = scorzonerifol.
trichodes Griseb. A 200
tridentatum Fr. 502 (161 β)
tridentinum Evers A 198
trilacense Murr A 198
tubulosum Arv. T. (*ustulatum*) 481 (105 β)
tubulosum Belli (*amphigenum*) 480 (102 β)
tubulosum Belli (*piliferum*) 479 (98 β)
tubulosum Huter 459 (31 β)
tubulosum Lam. 468 (48 β)
turbinatum Arv. T. = australe
turritiforme N. et P. (*dentat.*) A 197 (90 for.)
umbellatum L. 501 (159), A 200
umbell. X porrifol. N. et P. = lejosoma
umbrosum Jord. = vulgatum
undulifolium N. et P. (*villos.*) A 197 (88 for.)
undulatum Boiss. (non W.) 484 = Nægelianum, cfr. A 198
uniflorum Gaud. (*Halleri*) A 195 (31 β for.)
urticaceum Arv. T. 462 (41)
ustulatum Arv. T. 481 (105)
Vaccarii Besse et Zahn (*cæsium*) A 199
valbonnense Arv. T. = pedemontanum
valdepilosum Vill. 497 (150), A 200
valdepil. X silvat. N. et P. = subelongat.
valesiacum Fr. = vallisiacum
vallisiacum Fr. 500 (158)
velutinum Heg. et Heer (*Pilosella*) A 193 (4 var.)
venetianum N. et P. = florentinoides
vernantianum Arv. T. et Briq. = silvat. var. cirritoides
vestitum Arv. T. (*glandulifer.*) A 197 (101 for.)
villosiceps N. et P. = adpressum
villosissimum Belli (*Pilosella*) 447 (4 κ)
villosissimum Næg. (*villos.*) A 197 (88 for.)
villosum L. 476 (88), A 197
villoso-lanatum Reut. = Pamphili
virens Arv. T. (*boreale*) 503 (164 δ)
virentisquamum N. et P. (*Hoppean.*) A 194 (5 var.)
virescens Fr. (*Pilosella*) 447 (4 α)
virosum Gr. et Godr. (non Pall.) = lactescens
Virga-aurea Coss. 487 (128), A 198
Virga-aurea X heterospermum 487 (nota)
virgatum Arv. T. (*Berardianum*) 460 (37 γ)
virgultorum Jord. = boreale
HIERACIUM III 442 (956)
viscosum Arv. T. 464 (50), A 196
Vollmannii Zahn A 195 (X)
vulgatiflorum Zahn (*Ausserdorferi*) A 199
vulgatum Fr. 494 (144), A 199
vulg. X glaucum F. Schultz = Dollineri
vulg. X incisum Zahn = Ausserdorferi
vulg. X silvat. X glaucum Zahn = carnosum
vulg. X villosum N. et P. = ctenodon
Waldsteinii Tausch 472 (nota)
Wiesbaurianum Uechtr. A 199
xystolepium N. et P. A 194 (X)
HIEROCHLOE I 58 (58)
australis R. et S. 58 (1)
borealis R. et S. 58 (2)
odorata P. B. = australis
odorata Whlnb. = borealis
orientalis Fr. et Heuff. = borealis
parviflora Presl = Holcus tenuis
repens P. B. = borealis
vinealis Schur = borealis
HIMANTOGLOSSUM = Loroglossum
anthropophorum Spr. = Aceras anthrop.
caprinum Spr. = seg.
hircinum Spr. = L. hirc.
parviflorum Spr. = Orchis ustulata
secundiflorum Rchb. = Orchis intacta
viride Rchb. = Cœloglossum viride
HINTERHUBERA = Hutchinsia
Berengariana Rchb. = H. procumb.
pauciflora Rchb. = H. paucifl.
HIPPION = Gentiana
æstivum F. W. Schmidt = G. æstiva
alpinum Id. = G. alp.
Amarella Id. = G. germanica
bavaricum Id. = G. bav.
campestre Id. = G. camp.
ciliatum Id. = G. cil.
cruciatum Id. = G. cruc.
dentosum Id. = G. ciliata
elongatum Id. = G. elong.
filiforme Id. = Cicendia fil.
Gentianella Id. = G. Gent.
imbricatum Id. = G. prostrata
nanum Id. = G. nana
nivale Id. = G. niv.
obtusifolium Id. = G. obtus.
prostratum Id. = G. prostr.
pumilum Id. = G. pum.
pusillum Id. = G. imbricata
spicatum Id. = Erythræa spic.
tenellum Id. = G. ten.
utriculosum Id. = G. utr.
vernum Id. = G. verna
HIPPOCREPIS II 93 (509)
alpestris Arv. T. A 143 (1 α c)
alpina Rouy (*comosa*) 93 (1 α b)
annua Lag. = ciliata

Digitized by Google

HIPPOCREPIS II 93 (509)
biflora Raf. (*unisiliq.*) 93 (3 b)
ciliata W. 93 (2 β)
comosa L. 93 (1), A 143
glandulosa Presl = quid?
glauca Ten. 93 (1 β)
helvetica G. Don = comosa
leiocarpa Rouy (unisiliq.) = monocarpa
major Rouy (*comosa*) A 143 (1 α d)
monocarpa M. B. 94 (3 c)
multisiliqua Rchb. = seg.
multisiliquosa L. 93 (2), A 143
multisiliquosa Vill., Lap. = ciliata
perennis Lam. = comosa
unisiliquosa L. 94 (3)
HIPPOMARATHRUM II 205 (603)
Bocconei Boiss. = Libanotis (α)
cristatum Boiss. 206 (γ b)
Libanotis Koch 205, A 154
pterochlænum Boiss. = siculum
pungens Boiss., Lojac. 206 (β)
siculum Hoffmg. et Lk. 206 (γ)
HIPPOPHAE I 281 (269)
littoralis Salisb. = rhamnoides
rhamnoides L. 281
sibirica Hort. ex Steud. = prec.
HIPPOPHÆSTUM = Centaurea
vulgare S. F. Gray = C. Calcitrapa
HIPPURIS II 136 (534)
fluviatilis Hoffm. A 148 (b)
palustris Gorter = vulgaris
verticillata Gilib. = vulgaris
vulgaris L. 136, A 148
HIRCULUS = Saxifraga
propinquus Haw. = S. Hirculus
punctatus Raf. = S. Hircul.
ranunculoides Haw. = S. Hirc.
HIRSCHFELDIA = Brassica
adpressa Mœnch = B. adpressa
incana Lowe = B. adpressa
inflexa Presl = B. — inflexa
integrifolia Presl = prec.
HLADNIKIA II 201 (593)
golacensis Koch = seg.
Golaka Rchb. f. 201
pastinacæfolia Rchb. = Falcaria latifolia
HOHENWARTHA = Carthamus
gymnogyna Vest. = C. lanatus
HOHENWARTHIA = Silene
Pumilio Pacher = S. Pum.
HOLCUS I 66 (80)
æstivalis Jord. = lanatus
Arduini Gmel. = Sorghum vulgare (α)
arenarius All. = Kœleria pubescens
aristatus Posp. (*lanatus*) A 17 (2 c)
arundinaceus Ruching. = Sorghum halep.
australis Schrad. = Hierochloë austr.
avenaceus L. = Sorghum halep.
avenaceus Scop. = Arrhenath. elatius
biaristatus Weber = Ventenata dubia
HOLCUS I 66 (80)
borealis Schrad. = Hierochloë bor.
bulbosus Schrad. = Arrhenater. — tuberosum
cernuus Ard. = Sorghum cern.
coloratus Rchb. (*lanatus*) A 17 (2 b)
Gayanus Boiss. 66 (nota)
Gryllus R. Br. = Andropogon Gryll.
halepensis L. = Sorghum halep.
lanatus L. 66 (2), A 17
mollis L. 66 (1), A 17
niger Ard. = Sorghum nigrum
Notarisii Nym. 66 (3), A 17
odoratus L. = Hierochloë austral. et borealis
repens Host = Hierochloë borealis
rubrum L. = Sorghum — rubr.
saccharatum L. = Sorghum saccharat.
Savii Spr. = Trisetum paniceum
setiger DNtrs. (non Nees) = Notarisii
Sorghum L. = Sorghum vulgare (α)
tenuis J. Gay = Gayanus
tenuis Trin. 66 (nota)
HOLOSCHŒNUS = Scirpus
albo-vittatus Rchb. = S. australis
australis Rchb. = S. romanus et australis
exserens Rchb. = S. australis
globiferus Dietr. = S. globifer
Linnæi Rchb. = S. Holoschœn.
panormitanus Nym. = S. panorm.
romanus Rchb. (Linnæi) = S. romanus
vulgaris Lk. = S. Holosch.
HOLOSEPALUM = Hypericum
dubium Fourr. = H. quadrangulum
humifusum Fourr. = H. humif.
quadrangulum Fourr. = H. quadr.
HOLOSTEUM I 349 (334)
Alsine Sw. = Stellaria media
ciliatum Opiz 350 (b) = glutinosum, cfr. A 71
dichotomum C. Koch = Cerastium anomalum
filiforme Risso = Cerastium — octandrum
glaberrimum Strobl (umbell.) = glabrum
glabratum G. Beck (umbell.) = glabrum
glabrum O. Ktze. (*umbell.*) A 71 (a)
glandulosum Vis. (umbell.) = glutinos.
glutinosum F. et M. A 71 (b)
Heuffelii Wierzb. = glutinosum
liniflorum F. et M. = glutinosum
oligandrum Fenzl (umbell.) = umbell. (a)
HOLOSTEUM I 349 (334)
roseiflorum Rouy et Fouc. (*umbell.*) A 71 (c)
tetraphyllum Thunb. = Polycarpon tetr.
umbellatum L. 350, A 71
viscosissimum Celak. (umbell.) = glutinos.
HOMALOBUS = Astragalus
campestris Nutt. = A. camp.
HOMALOCARPUS = Anemone
narcissiflorus Schur = A. narc.
uniflorus Schur (narcissifl.) = A. dubia
HOMALOCENCHRUS = Oryza
oryzoides Pollich = O. clandestina
HOMOGYNE III 205 (355)
alpina Cass. 206 (1)
discolor Cass. 206 (1 β)
silvestris Cass. 206 (2)
HONORIUS = Ornithogalum
nutans S. F. Gray = O. nutans
HORDEUM I 110 (130)
Ægiceras Royle = trifurcatum
æstivum Haller = distichum
æthiopicum Alef. (vulg.) = nigricans
albidum Kœrn. (vulg.) = vulgare (α a)
ambiguum Dœll = leporinum
annuum Lge. (pratense) = Gussoneanum
arenarium Asch. = Elymus aren.
asperum Degen (Caput-Med.) = Elymus — asper
bifarium Roth = quid?
Bobartii Asch. et Græbn. (Caput-Med.) = Elymus — Bob.
breve Alef. (vulg.) = Zeocriton
bulbosum L. 110 (2)
cœleste L. (*vulg.*) 100 (1 α b)
cœleste Viborg. = prec.
cœlestoides Ser. = nudum
Caput-Medusæ Coss. = Elymus Cap.-Med.
ciliatum Lam. = Triticum villosum
chilense Brongn. (murin.) = leporinum
ciliatum Gilib. = murinum
crinitum Desf. = Elymus crin.
cylindricum Murr. = Elymus europæus
Decaisnei Hort. ex Boiss. = spontaneum
Desmoulinsii Phil. = Elymus europæus
dilatatum Gdgr. = murinum
distichum L. 110 (1 γ), A 33
elymoides Vest = Elymus europæus
europæum All. = Elymus eur.
geniculatum All. = maritimum
geniculatum Kit., M. B. = Gussoneanum?
Gussoneanum Parl. 111 (4 β), A 33
hexasticum L. 110 (1 β)
Hystrix Roth = maritimum
imrinum Forsk. = murinum
intermedium G. Beck (*murin.*) A 33 (5 d)

Digitized by Google

HORDEUM I 110 (130)
intermedium Hausskn. = Elymus crinitus
ithaburense Boiss. = spontaneum
jubatum DC. (non L.) = Elymus Caput-Medusæ (α)
laxum Ser. (distich.) = distichum (α)
leporinum Lk. 111 (5 b)
lineare Janka = bulbosum
majus Gr. et Godr. (murin.) = leporinum
marinum Huds. 110 (3 b)
marinum Koch (secalin.) = prec.
maritimum Roth = marinum
maritimum With. 111 (4), A 33
montanum Schrank. = Elymus europæus
murinum L. 111 (5), A 33
murinum β L. (1753) = secalinum
muticum Farneti (distich.) A 33 (1 γ e)
nigricans Ser. (distich.) 110 (1 γ d)
nigrum W. 110 (1 α c)
nodosum Auct. (an L.?) = secalinum
nodosum Ucria = bulbosum
nudum Ard. = seg.
nudum L. (distich.) 110 (1 γ c)
nutans Schnebl. (distich.) = dichum (α)
oligostachyum Flatt = Elymus crinitus
pallidum Ser. (vulg.) = vulgare (α a)
polystichum Haller = vulgare (α)
pratense Huds. = secalinum
pseudo-murinum Tapp. = leporinum
pubescens Guss. 111 (4 α b)
pusillum Goir. (murin.) A 33 (5 c)
rigidum Roth = maritimum?
Rothii Lk. = marinum
sativum Jessen. = vulgare
secalinum Baumb., Guss. pl. rar. = Gussoneanum
secalinum Schreb. 111 (3)
silvaticum Huds. = Elymus europæus
spontaneum C. Koch 110 (1 oss.)
strictum Desf. = bulbosum
Tappeineri Hausm. (murin.) = leporinum
tetrastichum Kœrn. = vulgare (α)
trifurcatum Jacq. ex Baill. (1854) = seg.
trifurcatum Schlecht. (1837) (cœleste) = seg.
trifurcatum Wend. (1843) (*vulg.*) 110 (1 α d)
villosum Mœnch = Elymus arenarius
vulgare L. 110 (1), A 33
Winkleri Hack. = Gussoneanum
Zeocriton L. 110 (1 γ b)
HORMINUM III 47 (796)
albiflorum Goir. (pyren.) 47 (b)
HORMINUM III 47 (796)
coloratum Mœnch = Salvia Hormin. (a)
pyrenaicum L. 47
sativum Mill. = Salvia Hormin. (a)
verbenaceum Mill. = Salvia Verbenaca
verticillatum Mill. = Salvia verticill.
viride Mœnch = Salvia vir.
HORNUNGIA = Hutchinsia
petræa Rchb. = H. petr.
HÒSTIA = Crepis
fœtida Mœnch = C. fœt.
rubra Cass. = C. rubra
HOTTONIA II 308 (674)
Millefolium Gilib. = palustris
palustris L. 308
HUGUENINIA = Sisymbrium
tanacetifolia Rchb. = S. tanacetifol.
HUMULUS I 277 (264)
americanus Nutt. = Lupulus
japonicus Sieb. et Zucc. A 61
Lupulus L. 277
Lupulus Thunb. = japonicus
volubilis Salisb. = Lupulus
vulgaris Gilib. = Lupulus
HUPERZIA = Lycopodium
densa Trevis. (Selago) = L. — densum
laxa Trevis. (Selago) = L. — laxum
patens Trevis. (Selago) = L. — patens
Selago Trevis. = L. Selago
HUTCHINSIA I 468 (405)
affinis Gren. 468 (1 b)
alpina R. Br. 468 (1)
brevicaulis Hpe. 468 (1 c)
brevistyla DC. = Thlaspi brevist.
cepeæfolia DC. = Thlaspi cep.
corymbosa J. Gay. = Thlaspi — corymbos.
diffusa Jord. A 99 (3 α e)
grandiflora Sol. ex Nym. = Lepidium humifusum
maritima Jord. = procumbens (α a)
pauciflora Bert. 468 (3 β)
petræa R. Br. 468 (2), A 99
procumbens Desv. 468 (3)
Prostii J. Gay 468 (3 α d), A 99
pygmæa Viv. = Thlaspi brevistylum
Revelieri Jord. 468 (3 α c), A 99
rotundifolia R. Br. = Thlaspi rotund.
speluncarum Jord. 468 (3 α b), A 99
stylosa DC. = Thlaspi styl.
Torreana Ten. = Thlaspi præcox
HYACINTHOIDES = Scilla
racemosa Medic. = S. hispanica
HYACINTHUS I 190 (191)
abortivus Cavalier = trifoliatus
amethystinus Lam. (non L.) = Scilla patula
HYACINTHUS I 190 (191)
botryoides L. = Muscari botr.
ciliatus Cyr. 191 (6)
commutatus Ten. = Muscari commut.
comosus L. = Muscari comos.
dubius Guss. 191 (4)
fastigiatus Bert. 190 (2)
fuliginosus Pall. = Muscari comosum
Hackelii Richter (dubius) = dubius (for.)
juncifolius Lam. = Muscari racemos.
lividus Pers. = Dipcadi serotinum
maritimus Pers. = Muscari Gussonei
monstruosus L. = Muscari monstr.
Muscari L. = Muscari moschatum
Muscari β Lam = Muscari — flavum
non-scriptus L. = Scilla nonscripta
orientalis L. 190 (1)
paniculatus Lam. = Muscari monstruosum
parviflorus Pers. = Muscari parv.
patulus Bert. = ciliatus
patulus Desf. = Scilla patula
pendulinus Chiov. 191 (5 β)
Pouzolzii Gay = fastigiatus
pratensis Lam. = Scilla nonscripta
racemosus L. = Muscari rac.
romanus L. 191 (3)
sarmaticus Pall. = ciliatus
serotinus L. = Dipcadi ser.
spicatus Mœnch = Scilla patula
trifoliatus Ten. 191 (5), A 48
Webbianus Nym. = Muscari comos. × Hyac. roman.
HYDROCHARIS I 159 (167)
Morsus-ranæ L. 159
rotundifolia Gilib. = Mors.-ranæ
vivipara Ces. (Mors.-ran.) 159 (b)
HYDROCHLOA = Glyceria
airoides Hartm. = Catabrosa aquatica
aquatica Hartm. = Glyceria aquat.
cærulea Hartm. = Molinia cærulea
distans Hartm. = G. dist.
fluitans Host = G. fluit.
maritima Hartm. = Glyceria mar.
HYDROCOTYLE II 146 (536)
inundata Sm. = Apium inund.
natans Cyr. = ranunculus.
pleiantha Ces. = prolifera
prolifera Maratti 146 (1 b)
ranunculoides L. 146 (2)
vulgaris L. 146 (1)
HYDROPIPER = Elatine
Fabri Fourr. = E. macropoda
hexandrum Fourr. = E. hex.

Digitized by Google

HYLEBIA = Stellaria
nemorum Fourr. = S. nem.
HYMENOCARPUS = Circinus
circinatus Savi = C. circin.
HYMENOLOBUS = Hutchinsia
procumbens Nutt. = H. proc.
HYMENOPHYLLUM I 15 (18)
tunbridgense Sw. 15 1)
HYOSCYAMUS II 394 (738)
agrestis Kit. 394 (1 b)
albus L. 395 (2)
aureus All. et Auct. it. (non L.) = major
auriculatus Ten. 395 (1 c)
bohemicus Schm. = agrestis
lethalis Salisb. = niger
luridus Salisb. = albus
major Mill. 395 (2 b)
micranthus Goir. (*niger*) A 168 (1 e)
niger L. 395 (1), A 168
pallidus W. et K. 395 (1 d)
reticulatus L. 395 (nota)
Scopolia L. = Scopolia carniolica
varians Vis. = major
verviensis Lej. = agrestis
vulgaris Neck. = niger
HYOSERIS III 388 (931)
aculeata Pers. = Leontod. hispidus
adspersa Mœnch = scabra
aspera Desf. = scabra
bætica Sch. Bip. 389 (1 β)
calyculata Jan. 388 (1 β b)
cichorioides Steud. = Leontod. hirtus
cretica Cav. = Hedypn. monspeliensis
cretica L. = Hedypn. cretica
exigua Salisb. = Arnoseris minima
fœtida L. = Aposeris fœt.
glauca Zeyh. = Hypochæris Achyrophorus
grandiflora Fiori (*bætica*) 388 (β c)
grandiflora Guss. (lucida) = prec.
grumosa Poir. = Leontod. tuberosum
Hedypnois L. = Hedypn. polymorpha
hirta Balb. = Crepis Balbisiana
hirta Gærtn. = Leontodon hirtus
incrassata Mœnch = Hedypn. polymorpha
imbricata DC. (lucida) = calyculata
lucida Guss., Boiss. = bætica
lucida L. 389 (nota)
lucida Ten. = radiata (α)
microcephala Cass. = scabra
minima L = Arnoseris min.
monspeliensis Pers = Hedypn. monspel.
parviflora Pers. = scabra
pendula Balb. = Hedypn. pendula
radiata L. 388 (1)
rhagadioloides L. = Hedypn. rhag.
scabra L. 389 (2)
HYOSERIS III 388 (931)
scabra Mœnch = Hedypn. polymorpha
setulosa DC. (lucida) = seg.
setulosa Guss. 388 (1 α b)
setulosa Guss. (rad.) = prec.
simplex Mérat = Hypochæris glabra
Sprengelii Steud. = Arnoseris minima
taraxacoides Vill. = Leontodon hirtus
tubæformis Ten. = Hedypn. tub.
tuberosa Savi = Leontodon tub.
HYPARRHENIA = Andropogon
podotricha Anderss. = A. podotr.
HYPECHUSA = Vicia
hybrida Alef. = V. hybr.
lutea Alef. = V. lutea
pannonica Alef. = V. pann.
purpurascens Alef. = V. striata
tricolor Alef. = V. melanops
HYPECOUM I 482 (415)
arcuatum Mœnch = procumb.
glaucescens Guss. 483 (α b)
grandiflorum Auct. it. (non Benth.) = ps.-grandifl.
littorale Wulf. = procumb.
macranthum Rouy et Fouc. (procumb.) = ps.-grandifl.
nodosum Lam. = procumb.
pendulum Petagna (non L.) = procumbens
procumbens L. 483, A 102
pseudo-grandiflorum Petrov. 483 (β)
tetragonum Bert. = procumb.
HYPERICUM I 384 (352)
acutifolium Fiori (*perfoliat.*) A 80 (14 α b)
acutum Mœnch 387 (7 γ), A 80
ægyptiacum L. 385 (2)
ætneum Torn. 388 (9 α e)
albiflorum N. Terr. (*australe*) A 80 (10 β b)
alpinum Parl. (*perforat.*) 388 (9 β), A 80
alpinum W. et K. = Richeri
amplexicaule Gilib. = pulchrum
anagallidifolium Presl = perfoliat.
androsæmifolium Vill. 389 (13 b)
androsæmoides Vill. = prec.
Androsæmum L. 386 (5)
anglicum Bert. = Androsæm.
angustifolium DC., Koch (*perforat.*) A 80 (9 α c')
angustifol. Lowe = prec.
angustifolium Parl. (*perfoliat.*) 389 (14 α b)
annulatum Moris 389 (14 β)
Ascyron Mill. (non L.) = calycin.
australe Ten. 388 (10 β)
bacciferum Lam. (non L.) = Androsæm.
bæticum Boiss. = undulatum
balearicum L. 386 (3)
barbatum All. = Richeri
barbatum Jacq., L. 388 (12)
blentinense Bert. = mutilum
HYPERICUM I 384 (352)
Bocconi Ten. ex Nym. = perfoliat.
calabricum Spr. 388 (12 b)
calycinum L. 386 (4), A 80
caucasicum Boiss. (*montan.*) 389 (16 b)
ciliatum Desr. in Lam. = perfoliat.
confertum Mœnch = montan.
corifolium Salisb. = seg.
Coris L. 390 (20), A 80
Coris Solla = hircinum
corsicum Steud. 387 (7 δ)
crispum L. 387 (8)
decipiens Watson = undulatum
dentatum Lois. = perfoliat.
delphinense Vill. = quadrangul.
Desetangsii Lamotte 387 (7 β)
dichotomum Zum. A 81
diversifolium DC. = hyssopifol.
Dodonæi Vill., Ré ex Steud. = quid?
dubium Leers = quadrangul. (α)
dubium Mauri = australe
elatum Guss. (perforat.) = perforat. (α a)
elegans Bert. (non Steph.) = perfol. b. angustifol.
elegantissimum Crantz = montanum
Elodes Huds. = Helodes
fallax Grimm. = quadrangul.
fasciculatum Lap. (non Lam.) = hyssopifol.
fimbriatum Lam. = Richeri
floridum Salisb. = Androsæm.
glandulosum Gilib. = montanum
grandiflorum Salisb. = calycin.
grandiflorum Somm. (Desetangsii) = alpinum, cfr. A 80
Helodes Huds., L. 385 (1)
heterostylum Parl. = ægyptiacum
hircinum L. 386 (6)
hirsutum L. 390 (17), A 80
humifusum L. 388 (10), A 80
humifusum Ten. = australe
hyssopifolium Vill. 390 (19)
imperforatum Bonnet (*Desetangsii*) 387 (7 β b)
imperforatum L. Vacc. (*montan.*) A 80 (16 c)
insulare Fouc. et Mand. A 80 (7 γ c)
intermedium Bellynck (non Steud.) = Desetangsii
latifolium Koch (*perforat.*) 388 (9 α d)
Leersii C. C. Gmel. = quadrangulum
Linnæanum Gren. et Call. = Desetangsii
linearifolium Bert. (non Vahl) = australe
lineolatum Jord. 388 (9 α b)
Liottardi Vill. A 80 (10 α b)
maculatum Crantz = quadrangulum
maculatum Orsini = Richeri
mediterraneum Rouy et Fouc. (*perforat.*) A 80 (9 α for.)
medium Peterm. = perforat.

Digitized by Google

HYPERICUM I 384 (352)
microphyllum DC. (*perforat.*) 388 (9 α c)
microphyllum Jord. = prec.
minus Rouy et Fouc. (*australe*) A 80 (10 β c)
montanum L. 389 (16), A 80
montanum Ucria, Desf. = perfoliat.
mutilum L. 390 (21)
myrtifolium Spach (non Lam.) = perfoliat.
neapolitanum Ten. = undulat.
nummularium L. 388 (11)
obtusum Dulac = Richeri
obtusum Mœnch = quadrangulum (α)
officinarum Crantz = perforat.
parviflorum W. = mutilum
palustre Salisb. = Helodes
perfoliatum L. 389 (14), A 80
perforatum L. 388 (9), A 80
perforat. β Gaud. = latifolium
perforat. δ Gaud. = angustifol.
perforato × tetrapterum Michal. = Desetangsii
platycalyx Celak. (perforat.) = latifol.
pollinense N. Terr. (*perforat.*) A 80 (9 α for.)
pseudo-perforatum Bert. = perforat.
pulchrum L. 389 (15)
punctatum Schinz (*quadrang.*) A 80 (7 α b)
quadrangulare Sm. = acutum
quadrangulare W. = quadrangulum
quadrangulare Ucria, Savi etc. = acutum
quadrangulum Crantz, All. etc. = acutum
quadrangulum L. 387 (7), A 80
quadratum Stokes = prec.
quadrialatum Whlnb. = acutum
quinquenervium Walt. = mutilum
repens Duby = acutum
repens Poir., Moris (non L.) = australe
Richeri Vill. 389 (18)
scaberulum G. Beck (montan.) = scabrum
scabrum Koch (*montan.*) A 80 (16 d)
stenophyllum Opiz = angustifol.
tenellum Ces. P. et G. (tetrapter.) = seg.
tenellum Tausch = corsicum
tetragonum Fr. = quadrangul.
tetrapterum Fr. = acutum
tomentosum L. 390 (18)
tomentosum Moris = annulat.
triquetrifolium Turra = crispum
undulatum Schousb. 387 (7 γ b)
venosum Lam. = calycinum?
veronense Schrank = microphyllum
verrucosum Salisb. = balearic.
verticillatum Lam. = Coris
villosum Crantz = hirsutum
vulgare Lam. = perforatum

HYPERICUM I 384 (352)
Webbii Nym. (non Steud.) = ægyptiac.
HYPOCHÆRIS III 391 (934)
Achyrophorus L. 394 (6), A 192
adscendens Brot. = glabra (α)
ætnensis Ces. P. et G. 394 (7)
albicans Ucria 394 (6 β)
albida Ces. P. et G., Arc. (levig.) = albicans
Alliatæ Fiori (*albicans*) 394 (6 β b)
alpestris Facch. = Facchiniana
alpina Nym. = maculata
arachnoidea Biv. = glabra (α)
arachnoides Poir., DC. 392 (1 γ), A 192
Balbisii Koch = pantorrhyncha
Balbisii Mauri, Lois. 382 (1 β)
Bartholdii W. = glabra
corsica Tausch = pinnatifida
cretensis Boiss. 393 (5)
depressa Ces. P. et G. (*ætnen.*) 394 (7 b)
dimorpha Brot. = glabra (α)
dimorpha Ten. = neapolitana
erostris Coss. et Germ. (glabra) = arachnoides
Facchiniana Ambr. 393 (4 β)
foliosa Arc. (*ætnen.*) 394 (7 c)
foliosa Vill. = uniflora
glabra L. 391 (1), A 192
glabrata Fiori (*creten.*) 393 (5 β)
glabrata Ten. (*pinnat.*) 394 (5 δ c)
glabrescens Bolzon (*macul.*) 393 (4 α b)
glauca Presl 394 (6 α b)
grandiflora Gilib. = maculata
helvetica Wulf. = uniflora
heterocarpa Moris (radic.) = neapol.
heterosperma Schult. = glabra
hirsuta Fiori (*albicans*) 394 (6 β c)
hirsuta Fiori (*hispida*) 393 (5 γ b)
hirsuta N. Terr. (levig.) = prec.
hirta Ucria in Rœm. = quid?
hispida Brot. 392 (1 α d)
hispida Peterm. (*radic.*) 392 (2 α b)
hispida W. 393 (5 γ)
hispidula Peterm. (*glabra*) 392 (1 α c)
hymettia Fiori (*creten.*) 393 (5 α b)
infesta Salisb. = radicata
intertexta Peterm. = glabra
levigata Ces. P. et G. = Achyrophorus
Loiseleuriana Godr. (glabra) = Balbisii
macrorrhiza Guenth. in Spr. = pinnat. f. glabrata?
maculata Facch. = Facchiniana
maculata L. 392 (3)
media Fiori (*Achyroph.*) A 192 (6 for.)
minima Balb. = Balbisii
minima Cyr. 392 (1 α e)
minima S. et S. = arachnoides

HYPOCHÆRIS III 391 (934)
minutissima DNtrs. (*glabra*) 392 (1 α f)
monocephala Fiori (*macul.*) 392 (3 b)
montana N. Terr. (creten.) = pinnatifida
neapolitana DC. 392 (2 β)
oxyodonta Fiori (*hispida*) 393 (5 γ c)
pantorrhyncha Peterm. (*Balbisii*) 392 (1 β b)
pinnatifida Cyr. 394 (5 δ)
pinnatifida Fiori = cretensis (α)
platylepis Boiss. = neapolitana
platylepis Ces. P. et G. (glabra) = arachnoides
pontana L. = Crepis pont.
pusilla Poir. = minima
radicata L. 392 (2)
ramosa Fiori (*pinnat.*) 393 (5 δ b)
rostrata Moris (radic.) = radicata (α)
rubescens Tin. = albicans
runcinata Gilib. = radicata
serioloides Bert. = ætnensis
serioloides Fiori (*creten.*) 393 (5 α c)
sicula Ucria = hispida?
simplex Mérat 392 (1 α b)
taraxacifolia Mœnch = Crepis albida
taraxacifolia Lois. = seg.?
taraxacoides Benth. et Hook. f. = Robertia tarax.
taraxacoides Pourr. = Crepis albida
Tenorii Guss. = neapolitana
tirolensis Schiw. 392 (3 c)
uniflora Hoffm. = maculata
uniflora Vill. 392 (4)
urens Fiori (*creten.*) 393 (5 α a)
vulgaris Regel (radic.) = rad. f. hispida
HYPOCISTIS = Cytinus
lutea Fourr. = C. Hypocistis (a)
rubra Fourr. = C. — kermesinus
HYPODEMATIUM = Nephrodium
californicum Fée = N. — meridionale
nivale Fée = N. — Hypodematium
HYPOGLOTTIS = Astragalus
purpurea Fourr. = A. Hypoglottis
HYPOPELTIS = Aspidium
hastulata Tod. = A. hastul.
lobulata Bory = A. angulare
HYPOPITHYS II 297 (658)
europæa Nutt., G. Don = multiflora
glabra DC. 297 (b)
hypophegea Don = glabra
lutea Gray = multiflora
Monotropa Crantz = multiflora
multiflora Scop. 297, A 161
Rivini Ces. P. et Gib. = multiflora
HYSSOPUS III 64 (801)
alopecuroides Fisch. = decussatus

Digitized by Google

HYSSOPUS III 64 (801)
altissimus Mill. = offic.
angustifolius M. B. 64 (d)
canescens DC. (*offic.*) 64 (b)
decussatus Pers. (*offic.*) 64 (c)
Fischeri Hort. = decussatus
latifolius Benth. (offic.) = prec.
myrtifolius Desf. = decussatus
officinalis L. 64
ruber Mill. = offic.
vulgaris Benth. (*offic.*) 64 (a)

IBERIDELLA = Thlaspi
rotundifolia Hook. = Th. rotund.
IBERIS I 473 (411)
amara L. 475 (10), A 101
amara Scop. = intermedia
arbuscula Spach = sempervirens
aurosica Caruel = nana
aurosica Chaix 474 (nota)
badensis L. = Thlaspi montan.
bellidifolia Presl = Pruiti
Bursa-pastoris Crantz = Capsella Bursa-past.
bursifolia Berger. = Teesdalea Iberis
campestris Wallr. = Lepidium camp.
Candolleana Jord. A 101 (5 β b)
carnosa W. p. p., Lap. (non W. et K.) = spathulata
cepeæfolia Guss. = Pruiti
cepeæfolia Pourr. = spathulata
cepeæfolia Ten. = Tenoreana
cepeæfolia Wulf. = Thlaspi cepeæfolium
ciliata All. 474 (6)
corifolia DC. (*saxatil.*) 473 (2 b)
coronaria D. Don = umbellata
corymbosa Mœnch = umbellata
crassifolia Pourr. = spathulata
crenata Lam. 475 (11 b)
cuneata Mœnch = semperflorens
divaricata Tausch = intermedia
florida Salisb. = semperflorens
garrexiana All. = sempervirens
garrexiana Scop. = saxatilis
glabrescens Huter P. et R. (Tenoreana) = Pruiti (α a), cfr. A 101
graminifolia Roth = Lepidium gram.
Grenieri Thuret et Born. 475 (9 b)
hortensis Jord. = umbellata
humilis Presl 473 (1 b)
integerrima Moris 474 (4 β)
intermedia Guers. 475 (8)
leptophylla Jord. = linifolia
linifolia L. 475 (7), A 101
macrodonta Burn. (linifol.) = Grenieri
Molinerii Balb. = ciliata
nana All. 474 (5 β), A 101
nudicaulis L. = Teesdalea Iberis
parviflora Lam. = Æthionema saxat.
pinnata L., Gouan 475 (11), A 101
Pruiti Tin. 474 (4), A 101

IBERIS I 473 (411)
pulchra Salisb. = umbellata
pyrenaica Lap. = Æthionema saxatile
recurvifolia Rouy et Fouc (*saxatil.*) 473 (2 d)
rhodocarpa Wk. = Tenoreana
Rollii A Terr. 475 (11 c)
rotundifolia Lam. = spathulata
rotundifolia L. = Thlaspi rotund.
ruderalis Crantz = Lepidium rud.
ruficaulis Lej. = amara
saxatilis L. 473 (2)
saxatilis Vitm., Caruel = sempervirens
semperflorens L. 473 (1),
sempervirens L. 474 (3), A 101
spathulata J. P. Berg. 474 (5), A 101
stylosa Ten. = Thlaspi styl.
Tenoreana DC. 474 (4 α b)
Tenorei Spr. = prec.
tenuifolia Presl = quid?
thymbrifolia DC. (saxatil.) = saxatilis (a)
umbellata L. 475 (9), A 101
vermiculata W. 473 (2 c)
virginica F. et M. = Lepid. virgin.
IBIDIUM = Spiranthes
spirale Salisb. = S. autumnalis
ILEX II 216 (613)
aquifolium L. 216, A 155
crispa Strobl (*Aquifol.*) A 155 (e)
heterophylla G. Don 216 (b)
inermis Vis. et Sacc. (Aquifol.) = senescens
integrifolia Guss. (Aquif.) = senescens
marginata Guss. (*Aquifol.*) = A 155 (f)
platyphylloides Christ (*Aquifol.*) A 155 (d)
senescens Gaud. (*Aquifol.*) 216 (c)
ILLECEBRUM I 333 (320)
Achyrantha L. = Alternanthera repens
alpinum Vill. = Paronychia polygonifolia
alsinefolium L. = Polycarpon alsin.?
alsinefolium Comm. = Polycarpon alsin.
arabicum L. = Paron. arab.
argenteum Pourr. = Paron. arg.
atrorubens Thuill. = verticillatum
capitatum All. = Paron. serpyllifolia
capitatum L. = Paron. cap.
capitatum S. et S. = Paron. macrosepala
cymosum L. = Paron. cym.
cymosum S. et S., Balb. = Paron. echinata
echinatum Desf. = Paron. ech.
herniarioides Pourr. = Paron. capitata
italicum Vill. = Paron. argentea

ILLECEBRUM I 333 (320)
Kapela Hacq. = Paron. Kap.
longisetum Bert. = Paron. arabica
lugdunense Vill. = Paron. Kapela
maritimum Vill. = Paron. argentea?
niveum Pers. = Paron. capitata
Paronychia All. = Paron. polygonifol.
Paronychia L. = Paron. argentea
Paronychia Wulf. = Paron. Kapela
polygonifolium Vill. = Paron. polyg.
pungens Spr. = Alternanthera repens
serpyllifolium Chaix = Paron. serp.
serpyllifolium Host = Paron. Kapela
spurium Loefl. = Loeflingia hispan.
striatum Pers. = Polycarpon diphyllum
thymifolium Pourr. = Paron. cymosa
verticillatum L. 333
IMPATIENS II 226
apetala Rouy (*Noli-tang.*) A 157 (c)
micrantha Rouy (*Noli-tang.*) A 157 (b)
Noli-tangere L. 226, A 157
penduliflora St.-Lag. = Noli-tangere
IMPERATA I 47 (47)
arundinacea Cyr. = cylindr.
cylindrica P. B. 47
europæa Anderss. (cyl.) = prec.
ovata Tratt. = Lagurus ovatus
IMPERATIA = Tunica
filiformis Mœnch = T. saxifraga
IMPERATORIA = Peucedanum
Angelica Borck. = Angelica silvestr.
angustifolia Bell. = P. angust.
aromatica Salisb. = P. Ostruthium
Chabræi Spr. = P. carvifolia
glauca Bartl. = P. petræum
major S. F. Gray = P. Ostruthium
montana DC. = Angelica mont.
nodiflora Lam. = Trochiscanthes nodifl.
Ostruthium L. = P. Ostr.
silvestris Lam. = Angelica silv.
trilobata Gilib. = P. Ostruthium
triternata DC. (Ostruth.) = P. tritern.
verticillaris DC. = P. verticillare
verticillata Lam. = prec.
IMPIA = Filago
germanica Bluff et Fing. = F. german.
pyramidata Bluff et Fing. = F. spathulata

Digitized by Google

INCARVILLEA = Paulownia
tomentosa Roxb. = P. toment
INTYBELLIA = Crepis
incarnata Monn. = C. incarn.
præmorsa Monn. = C. præm.
pulchra Monn. = C. pulchra
INTYBUS = Crepis
bulbosus Fr. = C. bulb.
incarnatus Fr. = C. incarnata
præmorsus Fr. = C. præm.
INULA III 285 (886)
acris Bernh = Erigeron acer
alpestris Rota (*hirta*) 286 (3 α c)
angustifolia Bœnn. (*britann.*) 288 (7 b)
angustifolia Wender. = ensifol.
anthelmintica Salisb. = Helenium
apula Crantz = Pulicaria odora
argentea Gandog. 289 (9 a)
aspera Poir. 288 (6 β)
Barrelieri Ten. (*graveol.*) 290 (14 b)
Bengesiaca Gandog. 289 (9 b)
bifrons L. 290 (12), A 186
britannica L. 288 (7), A 185
Bubonium Jacq. = spiræifolia
calycina Presl, Spr. 289 (9 c)
campestris Bess. = Oculus-Christi
canadensis Bernh. = Erigeron canad.
candida Cass. 289 (8)
caucasica Pers. = Buphthalm. speciosum
chrysocomoides Poir. = Pulicaria sicula
cinerea Lam. = Vaillantii
comosa Lam. 288 (7 c)
Conyza DC. 289 (11), A 185
conyzæa Lam. = Pulicaria dysenterica
cordata Boiss. = aspera
cordatofolia Gilib. = Pulicaria dysenterica
corymbosa Borb. (semicordata) = hispida
corymbosa Schur (hirta) = multiflora
crassifolia Salisb. = seg.
crithmoides L. 290 (13)
denticulata Posp. (*viscosa*) 290 (15 b)
dichotoma Zuccagni = britannica
discoidea Tausch (*britann.*) 288 (7 d)
dysenterica L. = Pulicaria dysent.
ensifolia L. 286 (4)
ensifolio × *hirta G. Beck* 287
etrusca = hetrusca
fasciculata Gilib. = germanica
fœtida Zer. (non L.) = Jasonia glutinosa
germanica L. 291 (*nota*), A 185
germanica Vill., Lam., Nocca et Balb. = spiræifolia
glabra Besser = bifrons
glabra Gilib. = salicina
glomeriflora Lam. = bifrons
grandiflora S. F. Gray = Helenium
INULA III 285 (886)
graveolens Desf. 290 (14)
Haussmanni Huter = ensifolio × hirta
Helenium L. 285 (1)
hetrusca Moretti = salicina
hirsuta Gueld., Suffr. = hirta
hirsuta Vitm. = britannica
hirta L. 286 (3)
hirta Maxim. (salic.) = subhirta
hirta Pollich = britannica
hirto × ensifolia Fritze = ensifol. × hirta
hirto × *salicina G. Beck* 288
hispida Schur 288 (×)
incanescens Lojac. (montana) = argentea
laciniata Lam. = Senecio uniflorus
lanuginosa Gilib. = Oculus-Christi
latifolia DC (salic.) = aspera
latifolia Fiori (*spiræifol.*) A 185 (5 c)
latifol. Goir. (squarrosa) = prec.
laxiflora Boiss. (*viscosa*) 290 (15 d)
longifolia Pasq. 290 (13)
lugdunensis Gandoger = persalic. × hirta
macrolepis Bunge = comosa
micrantha Poir. = germanica
montana L. 289 (9)
montana M. B., Vis. = Oculus-Christi
montana Pollich = hirta
multiflora Spenn. (*hirta*) 286 (3 α b)
myrtifolia L. = spiræifolia
oblongifolia G. Beck (*hirta*) 286 (3 α)
Oculus-Christi L. 289 (10), A 185
Oculus-Christi Ten. = Pulicaria — corymbosa
odora L. = Pulicaria odora
Œtteliana Rchb. A 185 (7 e)
parviflora Salisb. = Pulicaria vulgar.
pinifolia G. Beck (*ensifol.*) 287 (4 α)
pleiocephala Heuffel (hirta) = multiflora
prostrata Gilib. = Pulicaria vulgaris
provincialis L. = Senecio uniflorus
pubescens Lindem. (salic.) = subhirta
Pulicaria L. = Pulicaria vulgaris
ramosissima Clairv. = Vaillantii
rigida Dœll = salic. × hirta
rotundifolia G. Beck (*hirta*) 286 (3 β)
salicina L. 287 (6)
salicino × *hirta* 288
salicino × hirta Fiori (pr. err.) = Buphthalmum speciosissimum
Savii G. Beck = spiræifol. × salicina
INULA III 285 (886)
saxatilis Lam. = Jasonia glutinosa
semiamplexicaulis Ces. P. et G. (Vaillantii) = seg.
semiamplexicaulis Reut. 286 (nota)
semicordata Borb. 288 (×)
semihirta Borb. = salic. × hirta
sericea Kit. = Oculus-Christi
serrata Gilib. = britannica
serratifolia Marches. (*viscosa*) 290 (15 c)
simplex DNtrs. (squarrosa) = seg.
simplex Fiori (*spiræifol.*) 287 (5 b)
spiræifolia L. 287 (5), A 185
spiræifolio × *salicina G. Beck* 287
spuria A. Kern. = salic. × hirta
squarrosa Auct. pl. = aspera
squarrosa L. = spiræifolia
squarrosa Savi = spiræfol. × salicina
suaveolens Jacq. 291 (nota)
subhirta C. A. Meyer (*salic.*) 287 (6 α b)
thapsoides Spr. 291 (nota)
umbrosa Goir. (*Conyza*) A 185 (11 b)
uniflora Gaud. (britann.) = angustifolia
uniflora Spenn. (*hirta*) 286 (3 α a)
Vaillantii Vill. 286 (2)
Vaillantii × *salicina Beck* 286 (nota)
vera G. Beck (rigida) = persalic. × hirta
verbascifolia DC. (*candida*) 289 (8 α)
villosa L. = montana
viscosa Ait. 291 (15)
vulgaris Trevisan = Conyza
ION = Viola
tricolor Medic. = V. tricolor
IONOPSIDIUM = Bivonæa
albiflorum Dur. = B. albifl.
acaule Rchb. = Cochlearia acaulis
Savianum Ball = B. Saviana
IPOMŒA II 388 (784)
arenaria R. et S. = stolonifera
Batatas Poir. 388 (3)
hispida Zuccagni = purpurea
platanifolia Fiori (*Batat.*) 388 (3 b)
purpurea Roth 389 (4)
sagittata Poir. 388 (1)
stolonifera J. F. Gmel. 388 (2)
IRIS I 223 (220)
acoroides Spach = Pseudo-Acorus
acuta W. = sibirica
Adami W. = graminea
ægyptia Del. = Sisyrinchium
alata Boir = planifolia
alba Asch. et Græbn. (*olbiensis*) A 208 (6 β b)
alba Savi = florentina
albiflora Fiori (*Sisyrinch.*) A 52 (16 α b)
angustifolia Gilib. = sibirica

Digitized by Google

IRIS I 223 (220)
anomala Rigo in Goir. (*pallida*) A 208 (2 b)
australis Tod. = pallida
bayonnensis Darr. = silvatica
benacensis Kern. = germanica
biflora Petagna 227 (nota)
binata Schur = pumila
Cengialti Ambr. = illyrica (for.)
Chamæiris Bert. 224 (6), A 51, 208
Chamæiris Gr. et Godr. = pseudo-pumila
Clusiana Rchb. = pumila
collina Fiori (*graminea*) 226 (12 β), A 51
compressa Mœnch = graminea
curtopetala Red. = Pseudo-Acorus
diantha C. Koch = pumila
discolor Fiori (*pseudo-pumila*) A 208 (7 β c)
discolor Guss. (pumila) 225 (7 c) = prec.
elegans Tod. exs. = maculata
ensata Thunb. 226 (13)
erirrhiza Posp. A 51 (10 β)
erratica Tod. = lutescens
flexuosa Murr. = sibirica
florentina L. 223 (1)
fœtida Thunb. = seg.
fœtidissima L. 225 (9), A 51
fugax Ten. = Sisyrinchium
germanica L. 224 (3)
germanica S. et S. = pallida
glauca Salisb. = pallida
graminea L. 226 (12), A 51
hortensis Tausch = pallida
humilis Goir. (germanica) = Cengialti?
illyrica Tomm. 224 (3 β), A 51
imberbis Klatt. = juncea
involuta Garzia = Sisyrinchium
italica Parl. 224 (6 α b)
italica Porta et Rigo exs. = pseudo-pumila
italica Vis. et Sacc. = Cengialti
juncea Poir. 226 (15), A 52
Kochii Kern. = germanica
latifolia Spach (graminea) = silvatica
lepida Heuff. = squalens
longifolia DC. = Pseudo-Acorus
longifolia Spach = Hermodactylus longifol.
lorea Janka A 51 (9 β)
lurida Rchb. = squalens
lurida Soland. 224 (X)
lutea Fiori (*pseudo-pumila*) A 208 (7 β e)
lutea Biv., Guss. (pumila) 225 (7 d) = prec.
lutea Lam. = Pseudo-Acorus
lutescens Fiori (*pseudo-pumila*) A 208 (7 β d)
lutescens Guss. = prec.
lutescens Lam. 224 (5)
lutescens Red., DNtrs. = Chamæiris
maculata Tod. A 52 (16 β)
Mandraliscæ Tod. 223 (1 b), A 51
maritima Mill. = sibirica

IRIS I 223 (220)
mauritanica Ker.-Gawl. = juncea
microptera Vahl = planifolia
neglecta Horn. 224 (X)
nepalensis Wall. = germanica
odoratissima Jacq. = pallida
olbiensis Henon. 225 (6 β), A 51, 208
olbiensis b. Parl. = alba
Pallasii Fisch. = ensata
pallida Lam. 224 (2), A 208
pallida Ten. = florentina
pallido-cærulea Pers. = pallida
paludosa Mart. = Pseudo-Acorus
palustris Mœnch = Pseudo-Acorus
panormitana Tod. = lutea
planifolia Fiori 227 (17)
pratensis Lam. = sibirica
Pseudo-Acorus L. 225 (8), A 51
pseudo-pumila Janka = pumila
pseudo-pumila Tin. 225, A 51, 208 (7 β)
pumila L. 225 (7), A 51, 208
pumila L. hb., Vill. etc. = Chamæiris
pumila Savi = italica
Reichenbachiana Klatt = spuria
sambucina L. 224 (X)
scorpioides Desf. = planifolia
sibirica L. 225 (10), A 51
sicula Tod. 224 (2 for.)
silvatica Balb. A 51 (12 α b)
Sisyrinchium L. 226 (16), A 52
spathulata Lam. = spuria
spuria Bert. = fœtidissima
spuria L. 225 (11)
squalens L. 224 (X)
squalens Pet., Ten. = sambucina?
Statellæ Tod. = lutescens
stricta Mœnch = sibirica
suaveolens A. Terr. (german.) 224 (3 α b) = olbiensis (cfr. A 51)
Tinei Tod. = pallida
transtagana Brot. = planifolia
trialata Brot. = planifolia
triflora Balb. = ensata
tuberosa L. = Hermodactylus tub.
variabilis Jacq. = Xiphium
variegata Lam. 224 (4)
violacea Parl. (*pseudo-pumila*) A 208 (7 β b)
violacea Savi = germanica
vulgaris Pohl = germanica
Xiphium L. p. p. 226 (14), A 52

ISATIS I 454 (389)
ægyptiaca L. = Cakile ægypt.
aleppica Moris (non Scop.) = Villarsii
alpina Vill., All. 454 (2)
canescens DC. 454 (1 β c)
canescens Lamotte = villosa
dalmatica Mill. = tinctoria
glauca Gilib. = tinctoria
hirsuta DC. (tinct.) = Villarsii (a)
hirsuta Pers. = prec.

ISATIS I 454 (389)
lusitanica Moris (non L.) = Villarsii
oxycarpa Jord. 454 (1 α c)
pilosa Caruel (tinct.) = Villarsii
pilosa Schur = prec.?
pinnatifida Forsk. = Cakile — pinnatif.
præcox Kit. 454 (1 α b)
rostellata Bert. = Villarsii
sativa DC. (tinct.) = tinctoria (α)
tinctoria L. 454 (1)
Villarsii Gaud. 454 (1 β)
villosa Rouy et Fouc. (*Villarsii*) 454 (1 β b)

ISCHARUM = Biarum
Bovei Schott = B. Bovei
Carsaami Schott = prec.
crispulum Schott = prec.
dispar Schott = prec.
Kotschyi Schott = prec.

ISIAS = Orchis X Serapias
triloba DNtrs. = S. longipet. vel cordigera X O. papilion.

ISIDROGALVIA = Tofieldia
borealis Steud. = T. palustris
calyculata Ruiz et Pav. = T. calyc.

ISIKA = Lonicera
alpigena Borck. = L. alpig.
cærulea Medic. = L. cær.
lucida Mœnch = L. alpigena

ISNARDIA = Ludwigia
nitida Poir. = seg.
palustris L. = L. pal.

ISOETELLA = Isoëtes
Duriæi Genn. = I. Duriæi

ISOETES I 24 (29)
adspersa A. Br. = capillacea
atrovirens Thuill. = lacustris (α)
brevifolia A. Br. (*velata*) 25 (3 α b)
brevispina A. Br. (Hysthrix) = subinermis
capillacea Bory 25 (nota)
curvifolia Pirotta (*echinosp.*) A 10 (1 β a)
Delalandei Lloyd = Hystrix
dubia Genn. tegulensis
Duriæi Bory 25 (4), A 10
Duriæi Hook. = Hystrix
echinospora Dur. 25 (1 β), A 10
elatior Fliche (*echinosp.*) A 10 (1 β b)
emersa Fiori (*tegulensis*) A 10 (3 β c)
emersa Genn. (dubia) = prec.
Hystrix Dur. 25 (5), A 10
lacustris Erb. critt. it. = echinospora
lacustris L. 24 (1), A 10
ligustica DNtrs. = Duriæi
longissima Bory = velata
maculosa Fiori (*tegulensis*) A 10 (3 β b)
maculosa Genn. (dubia) = prec.
Malinverniana Ces. et DNtrs. 25 (2), A 10
Pseudo-Hystrix Genn. = Hystrix (α)

Digitized by Google

ISOETES I 24 (29)
rectifolia Pirotta (echinosp.) = elatior
setacea Bert. = velata
setacea Del. 25 (nota)
setacea Mor. et DNtrs. = Hystrix (α)
sicula Ces. et DNtrs. (*velata*) A 10 (3 b)
sicula Tod. = subinermis
subinermis Dur. (*Hystrix*) 25 (5 β)
tegulensis Genn. 25 (3 β)
tiguliana Genn. = prec.
tridentata Dur. = Durisei
velata A. Br. 25 (3), A 10
ISOLEPIS = Scirpus
acicularis Schlechtd. = Heleochar. acic.
brachyphylla Presl = seg.
brevis Brogn. = S. cernuus
fuscescens N. Terr. (non Steud.) = S. — campanus
globifera Nym. = S. globifer
globulifera Steud. = prec.
gracillima Nym. = S. clathratus
hirta H. B. et K. = Fimbrist. squarrosa
Holoschœnus R. et S. = S. Holosch.
Kochii Steud. = S. cernuus
leptalea Steud. = S. cernuus
Lereschii Schutt. = Heleochar. atropurpurea
Meyeniana Nees = S. cernuus
Micheliana R. et S. = S. Mich.
Minæ Parl. = S. Minæ
nervosa Rich. et Hochst. = S. nervosus
oligantha C. A. Mey. = Scirp. alpinus
panormitana Parl. = S. panorm.
Poiretii R. et S. = S. romanus
pubescens R. et S. = Fuirena pub.
pubigera Bernh. = Fimbrist. dichot.
pumila Lk. = S. cernuus
pygmæa Kth. = S. cernuus
Saviana Schult. = S. cernuus
setacea R. Br. = S. setac.
sicula Presl = S. cernuus
supina R. Br. = S. supin.
tenuis Presl = S. cernuus
ISOPHYLLUM = Bupleurum
affine Schur = B. virgatum
australe Fourr. = B. patens
baldense Hoffm. = B. ranunculoides
falcatum Hoffm. = B. falc.
Gerardi Hoffm. = B. Ger.
glaucum Fourr. = B. glauc.
Jacquinianum Fourr. = B. Jacquinian.
junceum Hoffm. = B. junc.
petræum Hoffm. = B. petr.
tenuissimum J. et C. Presl = B. tenuiss.
ISOPYRUM I 519 (434)
album Dulac = thalictr.
aquilegioides L. = thalictr.
insignis Gib. et Pir. (*thalictr.*) A 107 (b)
ISOPYRUM I 519 (434)
thalictrifolium Gilib. = seg.
thalictroides L. 519, A 107
thalictroideum St.-Lag. = prec.
ITTNERA = Najas
major C. C. Gmel. = N. marina
minor C. C. Gmel. = N. minor
Na'as C. C. Gmel. = N. marina
IXIA = Romulea
Bulbocodium L. = R. Bulboc.
Bulbocodium S. et S. = R. Linaresii
Bulboc. A et B Ten. = R. Columnæ
Columnæ R. et S. = R. Column.
elongata Vahl = R. elong.
minima Ten. = R. Columnæ
parviflora Salisb. = R. Columnæ
purpurascens Ten. = R. purp.
ramiflora Ten. = R. ramifl.
IXINE = Cirsium
arvensis Hill = C. arv.
Casabonæ Hill = C. Casab.
tuberosa Hill = C. tuber.

JACEA = Centaurea
alata Lam. = C. montana
Cineraria Delarb. = C. Ciner.
communis Delarb. = C. Jacea
graminifolia Lam. = C. variegata
nigra Hill = C. nigra
paniculata Lam. = C. panic.
plumosa Lam. = C. pectinata et uniflora
pratensis Lam. = C. Jacea
ragusina Steud. = C. rag.
Scabiosa Lam. = C. Scab.
segetum Lam. = C. Cyanus
supina Lam. = C. amara
tomentosa Gilib. = C. Jacea
vulgaris Bernh. = C. nigra
JACOBÆA = Senecio
abrotanifolia Mœnch = S. abrot.
alpina Mœnch = S. alp.
alpina Raf. = S. lycopifol.?
anthoræfolia Presl = S. Badaroi
aquatica Gærtn. M. et S. = S. aquat.
carniolica Schrank = S. carn.
carnosa Presl = S. ætnensis
cordata Opiz = S alpinus
denticulata Gilib. = S. silvat.
Doria Gærtn. M. et S. = S. Doria
erratica Fourr. = S. errat.
erucifolia Gærtn. M. et S. = S. eruc.
frondosa Opiz = S. nemorensis
Fuchsii C. A. Mey = S. Fuch.
incisa Presl = S. glaber
lanceolata Raf. (chrysanth.) = S. ætnensis
lanuginosa Presl = S. nebrodensis for. (cfr. III 212)
nebrodensis Raf. = S. nebr.
nemorensis Mœnch = S. nem.
ovata Gærtn. M. et S. = S. ovat.
paludosa Gærtn. M. et S. = S. paludosus
rubella Mœnch = S. erucifolius
saracenica Mœnch = S. fluviatilis
JACOBÆA = Senecio
sicca Gilib. = S. Jacobæa
suaveolens Gilib. = S. erucifol.
tenuifolia J. et C. Presl = S. tenuifol.
tomentosa Mœnch = S. Cineraria
verna Raf. = S. vernus
viscosa Gilib. = S. visc.
vulgaris Claus = S. vulg.
vulgaris Gærtn. = S. Jacobæa
JASIONE III 164 (844)
ætnensis Lojac. (*mont.*) A 179 (1 for.)
dentata DC. f. (*mont.*) 165 (1 β)
depressa Huet (mont.) = litoralis
echinata Boiss. = dentata
echinata Wk. et Lge. (mont.) = prec.
gracilis Wk. et Lge. (*mont.*) A 179 (1 for.)
Heldreichi Boiss. = dentata
humilis Guss. (mont.) = litoralis
humilis Jan. (non Lois.) = litoralis
levis Lam. = perennis
litoralis Fr. (*mont.*) 165 (1 α c)
major M. et K. (*mont.*) 165 (1 α b)
maritima Duf. (*mont.*) 165 (1 α d)
montana L. 165 (1), A 179
montana Presl, Guss. p. p. = dentata
nana Gr. et Godr. (mont.) = litoralis
perennis Bert. = montana
perennis Lam. 165 (2)
prolifera Bell. (*mont.*) 165 (nota)
sicula Tod. exs. (mont.) = ætnensis
stolonifera DC. (*mont.*) 165 (nota)
supina Sieb. 165 (2 β)
umbellata Gilib. = montana
undulata Lam. = montana (α)
JASMINUM II 337 (692)
collinum Salisb. = seg.
fruticans L. 337 (2)
humile L. 337 (nota)
officinale L. 337 (1)
revolutum Sims = humile
Wallichianum Lindl. = humile
JASONIA III 291 (887)
discoidea Cass. = Pulicaria sicula
glutinosa DC. 291
saxatilis Guss. = glutinosa
sicula DC. = Pulicaria sicula
JIRASEKIA = Anagallis
alpina F. W. Schm. = A. tenella
crassifolia Rchb. = A. crassifolia
tenella Rchb. = A. ten.
JOACHIMIA = Beckmannia
phalaroides Ten. = B. erucæformis
JONDRABA = Biscutella
auriculata Webb. et Berth. = B. auric.

Digitized by Google

JONDRABA = Biscutella
cichoriifolia Webb. et Berth. = B. cichor.
hispida Rouy et Fouc. (cichor.) = B. hispida
macrocarpa Rouy et Fouc. (cichor.) = B. dilatata
sulphurea Medic. = B. auriculata
villosa Rouy et Fouc. (cichor.) = B. cichoriifol. (a)
JONORCHIS = Limodorum
abortiva G. Beck = L. abort.
JONQUILLA = Narcissus
bicolor Raf. = N. Pseudo-narciss.
incomparabilis Raf. = N. incomp.
major Haw. = N. Jonquilla
media Haw. = prec.
minor Haw. = prec.
Tazetta Raf. = N. Taz.
triloba Raf. = N. odorus
JONTHLASPI = Clypeola
clypeolatum Lk. = C. Jonthlaspi
macrocarpum Caruel (clypeolat.) = C. Johnthlaspi (α)
microcarpum Caruel = C. microcarpa
microcarpum Caruel (clypeolat.) = C. Gaudini
JOVIBARBA = Sempervivum
arenaria Opiz = S. aren.
hirta Opiz = S. hirtum
sobolifera Opiz = S. sobol.
JUGLANS I 254 (247)
regia L. 254
JUNCAGO = Triglochin
palustris Mœnch = T. pal.
JUNCASTRUM = Juncus
acutum Fourr. = J. acutus
maritimum Fourr. = J. mar.
JUNCELLUS = Cyperus
junciformis C. B. Clarke (levigat.) = distachyus
levigatus C. B. Clarke = C. levig.
serotinus C. B. Clarke = C. serot.
JUNCINELLA = Juncus
capitata Fourr. = J. capit.
pygmæa Fourr. = J. pygm.
JUNCUS I 164 (175)
acuminatus Balb. = arcticus
acuminatus Mchx. A 43
acutiflorus Ehrh. 167 (9 β), A 205
acutiflorus Guss. = Gussonei
acutiflorus b. Guss. = Gussoneanus
acutiflor. × *lamprocarpus Buchen.* A 43
acutus L. 166 (5)
acutus β Lam. = maritimus
acutus Thuill. = glaucus
adscendens Host = lamprocarpus
affinis Gaud. = lamprocarpus et supinus
albidus Hoffm. = Luzula nemorosa
alpestris Hartm. = alpinus
alpicola Goir., Asch. et Græbn. (*lamprocarp.*) A 205 (8 α h)
alpinus Goir. (an Schur?) (*bufon.*) A 206 (22 α f)
alpinus Pers. = uliginosus
alpinus Vill. 167 (8 η)
alpin. × *lamprocarpus Buchen.* A 43
alpino-pilosus Chaix in Vill. = Luzula spadicea
ambiguus Guss. = Tenageja, cfr. A 206
anceps De la Harpe 167 (8 ζ)
anceps × *lamprocarpus Murb.* A 43
Angelisii Ten. 165 (1 α b)
angustifolius Sieb. (maxim.) = Luzula Sieberi
angustifolius Wulf. = Luzula nemorosa
aquaticus All. = lamprocarpus
aquaticus Brot. = acutiflorus
aquaticus Seb. et Maur. = obtusiflorus
arcticus W. 165 (3)
aristatus Lk. = tenuis
aristiflorus Clairv. = lamprocarpus
articulatus DC. = obtusiflorus
articulatus L. 166 (8), A 42, 205
articul. β L. = viviparus
articul. γ L. = acutiflorus
asper Sauzé = striatus
atlanticus De la Harpe = heterophyllus
atratus Krock. 167 (8 γ), A 43
atratus Lam. = Jacquinii
atricapillus Drej A 43 (8 θ b)
attenuatus Viv. = Gerardi
aureus Pourr. = Luzula lutea
bicephalus Viv. 169 (oss.) = pygmæus (for.)
bifolius Hpe. = obtusiflorus
biglumis Jacq. (non L.) = Jacquinii
biglumis Sang. 170 (nota)
Birolii Zum. 170 (nota) = articulatus, cfr. A 42
bogotensis H. B. et Kth. = effusus
bothnicus Whlnb. = Gerardi
brevirostris Nees = multiflorus
brevirostris Schur = Thomasii
Broteri Steud. = rigidus
Buchenani Dœrfl. = alpino × lamprocarp.
bufonius L. 169 (22), A 43, 206
bulbosus Guss. = Gerardi
bulbosus L. (1753), All. = supinus
bulbosus L. (1762) = compressus
bupleuroides Pourr. = pygmæus
caffer Bert. = maritimus
campestris α L. = Luzula campestris
campestr. γ L. = Luzula multiflora
campestr. δ L. = Luzula nutans
campestr ε L. = Luzula lutea
campestr. ζ L. = Luzula congesta
campestr. η L. = Luzula sudetica
capitatus Weig. 169 (20), A 43
castaneus Clairv. = Jacquinii
castaneus Sm. 169 (18)
Castellii Tin. = Gussoneanus?
chloroticus Schult. = tenuis
cœnosus Bicheno = Gerardi
communis E. Mey = conglomer. et effusus
commun. × glaucus E. Mey. = effuso × glauc.
compactus Celak. (bufon.) = hybridus
compactus Nees = obtusiflorus
compressus Jacq. 168 (14)
compressus Roth = lamprocarpus
compress. × effusus O. Kze. = tenuis
congestus Schousb. = hybridus
congestus Ten. (*capitatus*) A 43 (20 d)
congestus Thuill. = Luzula congesta
conglomeratus L. 165 (2), A 42
conglomerat. × *glaucus Ruhmer* 165, A 42
consanguineus Ziz = Gerardi
cuspidatus M. Brenn. (*lamprocarp.*) 166 (8 α b)
cymosus Schrank (pilosus) = Luzula pilosa
Czetzii Schur = castaneus
diaphragmaticus Brot. = glaucus
Deangelisii Bert. = Angelisii
decompositus Guss. (*acutus*) 166 (5 α b)
depauperatus Ten. 165 (1 γ)
diffusus Hpe. = effuso × glaucus
diffusus Huet (striatus) = Fontanesii
diphyllus Hpe. = obtusiflorus
divaricatus Gilib. = bufonius
divaricatus Wolff = obtusiflorus
divergens Koch = obtusiflorus
Dregeanus Presl = bufonius
Duvalii Loret = Fontanesii
echinuloides Webb. = Fontanesii
effusus L. (1755) 165 (2 β), A 42
effusus α L. (1753), β L. (1755) = arcticus
effusus β L. (1753) = effusus
effusus Pollich = glaucus
effus. × *glaucus Meyer* 165
elatus Steud. = longicornis
ellipsoideus Neilr. (compress.) = Gerardi
erectus Pers. = Luzula multiflora
ericetorum Pollich = capitatus
exaltatus Tausch ex Goir. (*bufonius*) A 206 (22 α e)
fascicularis Schrank (pilosus) = Luzula silvat.
fasciculatus Bert. (non Schousb.) = hybridus

Digitized by Google

JUNCUS I 164 (175)
fasciculatus Koch (bufon.) = prec.
fasciculiflorus Boiss. (bufon.) = hybridus
filiformis L. 165 (4)
Fischeri Turcz. = alpinus
fistulosus Guss. 165 (2 γ)
flavescens Host = Luzula flav.
floridanus Raf. = Gerardi
fluitans Koch (lamprocarp.) A 42 (8 α d)
fluitans Lam. 167 (10 c)
foliatus Neilr. (trifidus) = monanthos
foliosus Desf. 169 (22 β)
foliosus Hpe. = lamprocarpus
foliosus Neilr. (trifidus) = monanthos
Fontanesii J. Gay 167 (8 ε)
Forsteri Sm. = Luzula Forst.
fusco-ater Posp. = anceps?
fusco-ater Schreb. = alpinus (for.)
geniculatus Schrank = alpinus
Gerardi Lois. 168 (14 β)
germanorum Steud. = tenuis
Gesneri Sm. = tenuis
gibraltaricus Salzm. = striatus
giganteus Asch. et Græbn. (bufon.) = exaltatus
glabratus Hpe. = Luzula glabr.
glaucus Ehrh. 165 (1), A 42
glauc. × conglomer. Lasch = congl. × glauc.
glauc. × effusus Schnizl. = eff. × glauc.
glomeratus Regel (bufon.) = hybridus
gracilis Lej. = Tenageia
gracilis Roth = capitatus
gracilis Sm. = tenuis
Gussoneanus Tod. A 205 (8 β' b)
Gussonei Parl. A 205 (8 β')
Hagenbachianus Gaud. (acutifl.) = multiflorus?
Hancockii Hance = triglumis
Heldreichianus Marss. in Buchen. A 42
heterophyllus Duf. 167 (9), A 43
Hochstetteri Steud. = Fontanesii
Hostii Tausch 168 (15 β) = monanthos, cfr. A 205
hybridus Brot. 169 (22 γ)
hybridus Brot. p. p. = pygmæus
inæqualis W. = foliosus
inflexus L. p. p., Leers = glaucus
insulanus Viv. = hybridus
insularis Fouc. et Mand. (effusus) A 42 (2 β b)
intermedius Host. = Luzula glabrata
intermedius Meig. = conglomeratus
intermedius Poir. = alpinus
intermedius Rohde = multiflorus
intermedius Thuill. = Luzula multiflora

JUNCUS I 164 (175)
isthmiacus Neck. = lamprocarpus
Jacquinii L. 168 (16)
Jacquinii Sm = arcticus
Jacquinii Sym. = castaneus
jadarensis N Bryhn (bufon.) = parvulus
lacteus Lk. = Luzula lactea
lagenarius J. Gay. = Fontanesii
lampocarpus Ehrh. = seg.
lamprocarpus Ehrh. 166 (8 α), A 42, 205
latifolius Wulf. = Luzula silvat.
laxiflorus Lge. (glaucus) = longicornis
Leersii Mars. = conglom. × glaucus
leucophobus Ehrh. = Luzula nemorosa
levis Ger. in S. F. Gray = effusus
liniger With. = Luzula multiflora
litoralis Salzm. = anceps
longicapsularis Cheval. = lamprocarpus
longicornis Bast. A 42 (1 β)
longifolius Genn. (bufonius) = foliosus
lucidus Hochst. = tenuis
luteus All. = Luzula lutea
Luzula Krock. = Luzula pilosa
luzulæformis Genn. = ranarius?
luzulinus Vill. = Luzula flavescens
luzuloides Lam. = Luzula nemorosa
lychnocarpus Wallr. (bulbosus) = Gerardi
macer S. F. Gray = tenuis
macrocarpus Dœll (lamproc.) = macrocephalus
macrocephalus Koch (silvat.) = multiflorus
macrocephalus Viv. A 42 (8 α f)
Magnagutii Asch. et Græbn. (glaucus) A 42 (1 β b)
major Asch. et Græbn. (bufon.) = exaltatus
major Boiss. (bufon.) = foliosus
major Parl. (silvat.) = multiflorus
maritimus Lam. 166 (6)
maximus Reich. = Luzula silvatica
megalocarpus Asch. et Græbn. (acutus) = acutus (α)
melananthos Rchb. = atratus
micranthus Desv. = acutiflorus
microcarpus Asch. et Græbn. (glaucus) A 42 (1 α c)
microcarpus Duv.-Jouve (acutus) = Tommasinii
microcarpus Nolte = fusco-ater
Mimizani Guill. = heterophyllus
Minæ Strobl 169 (21 b)
monanthos Jacq. A 205 (15 β)

JUNCUS I 164 (175)
montanus α Lam. = Luzula silvat.
montanus β Lam. = Luzula nutans
mucroniflorus Clairv. = alpinus
multibracteatus Tin. 166 (5 β)
multiflorus Desf. = subulatus
multiflorus Ehrh., Hoffm. = Luzula mult.
multiflorus Lge. (lamproc.) = macrocephalus
multiflorus Roch. (silvat.) = Thomasii
multiflorus Sang. = seg.
multiflorus Weihe (acutifl.) A 205 (8 β c)
Murbeckii Sagorski = anceps × lamprocarp.
mutabilis α Lam. = pygmæus
mutabilis Cav. (β Lam.) = capitatus
mutabilis γ Lam. = supinus
mutabilis Savi = hybridus
nanus Dubois = pygmæus
natans Chiov. (heterophyll.) A 43 (9 a)
nebrodensis Tod. exs. = pauciflorus Tin.
Neesii Heller = obtusiflorus
nemorosus Host = Luzula campestris
nemorosus Lam. = Luzula pilosa?
nemorosus Pollich = Luzula nem.
nemorosus β Pollich = Luzula silvat.
nemorosus Savi = Luzula Forsteri
nemorosus Sibth. = acutiflorus
nigricans Lam. = Jacquinii
nigricans Wolff = acutiflorus
nitidiflorus Duf. = Gerardi
niveus L = Luzula nivea
nodosus Biroli (non L.) 170 (nota) = articulat., cfr. A 42
nodulosus Whlnb. = alpinus
nutans Vill. = Luzula nutans
obtusatus Kit. = obtusiflorus
obtusiflorus Ehrh. 166 (7)
obtusiflorus Neilr. (lamprocarp.) = alpinus
oligocephalus Goir. (lamprocarp.) A 205 (8 α h)
olympicus Schott A 205 (8 α h oss.)
pallens Fiori (acutifl.) 167 (8 β b) = seg.
pallescens Fiori (acutifl.) A 205, cfr. prec.
pallescens Parl. (silvaticus) = prec.
pallescens Schrank = Luzula flavesc.
pallidiflorus Becker A 42 (8 α e)
pallidus Hpe. hb. = longicornis
paniculatus Hpe. 165 (1 β) = longicornis, cfr. A 42
parviflorus Kit. = compressus
parviflorus Poir. = tenuis

Digitized by Google

JUNCUS I 164 (175)
parvulus Hartm. (*bufon.*) A 43 (22 α b)
pauciflorus Mœnch = arcticus
pauciflorus Tin. ex Parl. (*striatus*) A 205 (8 δ b)
pediformis Chaix in Vill. = Luzula nutans
pilosus α L. = Luzula pil.
pilosus δ L. = Luzula silvatica
pilosus ε L. = Luzula nemorosa
pilosus η L. = Luzula nivea
pilosus M. B. = Luzula Forsteri
pilosus Reich. = Luzula nemorosa
pistillaris Jan (luteus) = Luzula lutea
pleianthos Bluff et Fing. (trifidus) = trifid. (α)
pratensis Hpe. = acutifl. × lamprocarp. ?
pratensis Wolff = acutiflorus
prolifer H. B. et Kth. = foliosus
prolifer Parl. (lamprocarpus) = viviparus Gaud.
prolifer Parl. (*striatus*) A 205 (8 δ c)
proliferus Goir. (*bufon.*) A 206 (22 α g)
proliferus Vahl = striatus
pumilio Griseb. (*bufon.*) A 43 (22 α c)
pygmæus Asch. et Græbn. (alpin.) = Requienii
pygmæus Rchb. Ic. = triander
pygmæus Req. exs. = Sorrentinii
pygmæus Rich. in Thuill. 169 (21)
pygmæus Salis. (lamprocarp.) Requienii
Pylæi Laharpe = effusus
querioides Pourr. = hybridus
radicans Schur = stolonifer
ranarius Nees = bufonius
ranarius Song. et Perr. A 43 (22 δ)
rariflorus Fr. (nodulosus) = seg
rariflorus Hartm. = alpinus
repens Koch (supinus) = uliginosus
repens Nolte 166 (8 α c) = stolonifer, cfr. A 42
repens Req. = Fontanesii
Requienii Parl. 167 (8 η b), A 43
rigidus Desf. 166 (6 β)
Rochelianus R. et S. = Thomasii
Ruhmeri Asch. et Græbn. = conglomer. × glaucus
salinus Coss. et Dur. = siculus
salsugineus Perr. et Song. = ranarius
Schranckii Moll = monanthos
scirpoides Dum. = rigidus
secundus P. B. = tenuis
septangulus Peterm. = atratus
setaceus Ten. (non Rostk.) = congestus
setifolius Ehrh. = supinus
siculus Jan = Fontanesii

JUNCUS I 164 (175)
siculus Tin. A 43 (11 b)
silvaticus Huds. = Luzula silv.
silvaticus Parl. = Gussonii
silvaticus Reich. = acutiflorus
Smithii Kth. = tenuis
Sorrentinii Parl. 169 (22 γ b)
spadiceus All, Vill. (1787) = Luzula spad.
spadiceus Schreb. = acutiflorus
spadiceus Vill. (1779) = Luzula lutea
sphærocarpus Neilr. (compress.) = compressus (α)
phærocephalus Salzm. = macrocephalus
spicatus L. = Luzula spic.
spinosus Forsk. = acutus, maritimus ?
Sprengeli W. = squarrosus
squarrosus All. = acutiflorus
squarrosus L. 168 (12)
stellatus Sol. ex R. et S. = capitatus
stellatus W. = Fontanesii
stolonifer Wohlleb. A 42 (8 α c)
striatus Griseb. = Thomasii
striatus Schousb. 167 (8 δ), A 205
stygius L. 169 (19)
subcongestus Goir. (*bufon.*) A 206 (22 α d)
subnodulosus Schrank = obtusiflorus
subulatus Forsk. 168 (11), A 43
subverticillatus Wulf. = supinus
sudeticus W. = Luzula sudet.
supinus Bicheno = capitatus
supinus Mœnch 167 (10)
Tenageja Ehrh. 170 (23), A 206
tenax Sol. in Russ., Poir. = glaucus
tenellus Genus = capitatus
tenuis W. 168 (13), A 43
terricolus Chiov. (*heterophyll.*) A 43 (9 b)
Thomasii Ten. 167 (8 ζ)
thyrsiflorus Vest = Luzula spicata
Tommasinii Parl. 166 (×), A 42
triander Gouan A 43 (20 c)
triandrus Vill. = supinus
tricephalus J. Gay. = macrocephalus
triceps Rostk. = castaneus
trichocephalus De la Harpe = macrocephalus
trichodes Steud. = filiformis
trifidus L. 168 (15), A 43, 205
triglumis L. 169 (17)
uliginosus Roth 167 (10 b)
uniceps Hartm. (alp.) = Requienii
ustulatus Hpe. = alpinus
utriculatus Auct. (lamprocarp.) = viviparus
vacillans Steud. = tenuis
vaginatus Neilr. (trifidus) = trifid. (α)
Vaillantii Thuill. = Tenageia

JUNCUS I 164 (175)
variegatus Caruel 166 (×), A 42
vernalis Brot. = Luzula Forsteri
vernalis Reich. = Luzula pilosa
versicolor Asch. et Græbn. (*capitatus*) A 43 (20 b)
verticillatus Pers. = supinus
virens Goir. (*lamprocarp.*) A 205 (8 α g)
virescens Asch. et Græbn. (lamprocarp.) = prec.
viviparus Asch. et Græbn. (bufon.) = proliferus Goir.
viviparus Gaud. (*lamprocarp.*) A 205 (8 α j)
Welwitschii Hochst. = supinus
JUNDZILLIA = Lepidium
Draba Andrz. = L. Draba
JUNIPERUS I 30 (35)
ægæa Gris. = excelsa
alpina S. F. Gray = nana
alpina Lodd. = Sabina
arborea Rchb. (*comm.*) A 12 (1 α b)
bacciformis Carr. = phœnicea
Biasolettii Lk. = macrocarpa (a)
Bonatiana Vis. = thurifera
canadensis Lodd. = nana
coccinea Posp. (*Oxycedr.*) A 12 (2 b)
communis L. 30 (1), A 12
comm. γ L. = nana
comm. × nana Wettst. = intermedia
cupressifolia Ait. (Sabina) = Sabina
dealbata Loud. = nana
depressa Stev. = nana
ellipsoidea Neilr. (macroc.) = Lobelii
excelsa M. B. A 12
excelsa W. = Sabina
fœtida Spach = Sabina
globosa Neilr. (macroc.) = macrocarpa (a)
hemisphærica Presl 30 (1 β)
heterocarpa Timb. = Oxycedrus
hispanica Lam. = thurifera
horizontalis Mœnch = Sabina
hudsonica Lodd. = Sabina
intermedia Schur A 12 (1 α c)
Lobelii Guss. 30 (3 b)
lusitanica Mill. = Sabina
lycia L. = phœnicea
lycia Pall. = Sabina
macrocarpa S. et S. 30 (3), A 12
Marschalliana Stev. = Oxycedrus
microcarpa Neilr. (Oxycedr.) = rufescens Carr.
montana Ait. (comm.) = nana
montana Endl. (comm.) = intermedia
montana Schult. = prec.
nana W. 30 (1 γ)
oblongata Guss. = Lobelii
oophora Kze. = turbinata
Oxycedrus L. Sp. 30 (2), A 12

Digitized by Google

JUNIPERUS I 30 (35)
Oxycedrus L. hb., Endl. = macrocarpa
phœnicea L. 30 (4)
prostrata Pers. = Sabina
prostrata Wk. (comm.) = intermedia
repens Nutt. = Sabina
rufescens Carr. (*Oxycedr.*) A 12 (2 a)
rufescens Lk. = prec.
Sabina L. 31 (5), A 12
sibirica Burgsdf. = nana
sphærocarpa Ant. = macrocarpa
tenella Ant. = Oxycedrus
tetragona Mœnch = phœnicea
thurifera L. A 12
turbinata Guss. 30 (4 b)
umbilicata Gr. et Godr. = macrocarpa (a)
virginiana L. 31 (6)
viridis Posp. (*Oxycedr.*) A 12 (2 c)
Willkommii Ant. = macrocarpa
JUNO = Iris
planifolia Asch. = I. planifol.
scorpioides Tratt. = prec.
JURINEA III 317 (911)
Bocconii DC. (*humilis*) 318 (2 β)
Bocconii Gr. et Godr. = humilis (α)
Bocconii Guss. = humil. v. Bocconii
humilis DC. 318 (2)
mollis Rchb. 317 (1)
moschata DC. 318 (1 β)

KABLIKIA = Primula
minima Opiz = P. min.
KALBFUSSIA = Leontodon
Muelleri Schultz = L. Muell.
KALI = Salsola
inermis Mœnch = S. Soda
Soda Mœnch = S. Kali
Soda Scop. = S. Soda
Tragus Scop. = S. Tragus
KENTROPHYLLUM = Carthamus
cæruleum Gr. et Godr. = C. cærul.
dentatum DC. = C. dentatus
depressum Lojac. (lanat.) = C. — depress.
elatum Gasp. = C. elatus
incanum Tausch = C. lanatus
intermedium Paolucci (lanatum) = C. turbinatus?
lanatum DC. = C. lanatus
luteum Cass. = C. lanatus
rubrum Lk. = C. dentatus
turbinatum Gasp. = C. turbin.
KERNERA = Cochlearia
auriculata Rchb. = C. auric.
brevicaulis Facch. = C. brevic.
glastifolia Rchb. = C. glastif.
myagrodes Medik. = C. saxatilis
sagittata Miég. = Neslea paniculat.
saxatilis Rchb. = C. saxat.
KERNERA = Posidonia
nodosa Schult. f. = Cymodocea nod.
oceanica W. = P. ocean.
KERNERIA = Bidens
bipinnata Gr. et Godr. = B. bipinn.
KETMIA = Hibiscus
arborea Mœnch = H. syriacus
syriaca Scop. = H. syr.
Trionum Scop. = H. Trion.
KICKXIA = Linaria
Elatine Dum. = L. Elat.
spuria Dum. = L. spuria
KLASEA = Serratula
heterophylla Cass. = S. lycopifolia
nudicaulis Fourr. = S. nudic.
pinnatifida Cass. = S. radiata
KLEINIA = Senecio
ficoides Haw. = S. ficoid.
Mandraliscæ Tin. = S. ficoides
KLUCKIA = Sisymbrium
officinalis Andrz. = S. offic.
KNAFIA = Salix
Helix Opiz = S. Helix
purpurea Opiz = S. purp.
KNAPPIA = Mibora
agrostidea Sm. = M. minima
verna Trin. = prec.
KNAUTIA III 146 (835)
adenophora Gremli (arven.) = arv. for. glandulosa
alpicola Briq. (silvat.) = Sendtneri
alpina Form. (hybrida) = integrifolia
alpina Pacher (*silv.*) 148 (4 α b)
amplexicaulis Borb. A 177 (1 β)
arvensis Coult. 146 (2), A 177, 216
arvens. Dœll (vulgaris) = prec.
arvens. Godr. (communis) = prec.
baldensis Kern. = magnifica
baldensis × longifol Borb. = decalvata
bidens Boiss. A 177 (1 β b)
brachytricha Briq. A 178 (3 var.)
Brandzai Porcius A 178 (4 var.)
Breindlii G. Beck A 178
calycina Bég. (*arvens.*) 146 (2 α d)
campestris Koch (*arvens.*) 147 (2 β)
carpatica Heuff. 146 (2 α e), A 177
carpophylace Ducomm. exs. (arvens.) = transalpina
centrifrons Borb. A 178
ciliata Boiss. = drymeia
collina Duby, Wohlf. (arvens.) = purpurea
collina Gr. et Godr. = mollis Jord.
collina Jord. = purpurea
communis Godr. = arvensis, integrifol. et silvatica
cuspidata Bor. (non Jord.) = dipsacifolia
decalvata Borb. A 178 (3 var.)
decipiens Kras. (*arvens.*) A 177 (2 α for.)
decipiens Kras. (pratorum) = Breindlii?
delphinensis Briq. (*subcanescens*) A 178
KNAUTIA III 146 (835)
dipsaciformis Borb. = seg.
dipsaciformis Borb. (*silvat.*) A 178 (4 γ)
dipsacifolia Heuff. (non Schott) 148 = prec., cfr. A 178
dissecta Borb. (*purpurea*) A 177 (2 δ for.)
diversifolia DC. = arven. for. glandulosa
drymeia Briq. p. p. = centrifrons
drymeia Heuff. A 178 (4 β)
eradiata Wohlf. (longif.) 147 = feminascens, cfr. A 178
feminascens Borb. (*longif.*) A 178 (3 α b)
Fleischeri Reut. hb. = transalpina
Fleischmanni Borb. = seg.
Fleischmanni Borb. (*rigidiuscula*) A 177 (1 γ c)
Fleischmanni Reut. hb. = transalpina
foliosa Bég. (collina) 147 = seg., cfr. A 177
foliosa Borb. (*purpurea*) A 177 (2 δ b)
glabrata Hausskn. (silvat.) = Sendtneri
glandulifera G. Beck (dipsacifol.) = Brandzai
glandulifera Koch (*arvens.*) 147 (2 γ b)
glandulosa Frœl. (*arvens.*) A 177 (2 α for.)
gloiotricha G. Beck (arven.) = arv. for. glandulosa
Grenieri Briq. (collina) = mollis Jord.
heterotricha Form. (non C. Koch) = purpur. b. foliosa
Heuffelii Borb. (*arvens.*) A 177 (2 α for.)
hirsuta Borb. (*purpurea*) A 177 (2 δ for.)
hybrida Coult. 146 = amplexicaulis, cfr. A 177
illyrica G. Beck = purpurea
indivisa Bég. (rigidiuscula) 147 = Fleischmanni, cfr. A 177
indivisa Borb. = seg.
indivisa Borb. (*magnifica*) A 178 (3 β b)
integrifolia Auct. (*arvens.*) 146 (2 α c)
integrifolia Bég. (*campestr.*) 147 (2 β b)
integrifolia Bert. 146 (1), A 177
intercedens G. Beck = silvatica
intermedia Gaud. in Briq. (silvat.) = Sendtneri
Kochii Bruegg. = longifolia
lancifolia G. Beck = silvatica
lanceæfolia Kotschy = longifolia
longifolia Koch 147 (3), A 178
longif. Neilr. (arvens.) = prec.
lyrata Koch (hybrida) = amplexicaul., cfr. A 177
magnifica Boiss. et Orph. 147 (3 β), A 178

Digitized by Google

KNAUTIA III 146 (835)
meridionalis Borb. (*purpurea*) A 178 (2 δ for.)
meridional. Briq. (collina) = prec.
mollis Hausm. (*silvat.*) 148 (4 α c), A 178
mollis Jord. 147 (2 ε), A 178
micrantha C. Koch (hybrida) = integrifolia
montana Schl. (silvat.) = transalpina
montenegrina G. Beck = purpurea b. foliosa
neglecta Meurer = arven. for. glandulosa
nudicaulis Borb. (*longif.*) A 178 (3 α for.)
nudiuscula Briq. hb. = seg.
nudiuscula Briq. (*transalp.*) A 178 (2 ζ for.)
odontophylla Borb. (*purpurea*) A 178 (2 δ for)
oligadena Briq. (collina) = mollis
palæstina L. Mant. II = brachiata
pannonica Wohlf., Bég (silv.) 148 = drymeia, cfr. A 178
pannonica Wettst., Gremli, Borb. = drymeia
pannonica Heuff = tomentosa, cfr. A 178
persicina Kern. 146 (2 α b), A 177
præsignis G. Beck (dipsacifol.) = Brandzai
pratensis Rouy = arvensis
pratorum v. decipiens Kras. = Breindlii?
pseudocollina Briq. (*arvens.*) A 178 (2 var.)
psiloptera Borb. = Ressmanni
pubescens Gremli (silv.) (non Wahl.) = drymeia
purpurea Borb. A 177 (2 δ)
Ressmanni Borb. (1904) = seg.
Ressmanni Pacher et Jaborn. (*silvat.*) 148 (4 α d)
rigidiuscula Borb. = seg.
rigidiuscula Hladnik in Koch (*arvens.*) 147 (2 γ), A 177
rimosa Borb. A 177 (2 α for.)
Sendtneri Bruegg. A 178 (4 α for.)
silvatica G. Beck = drymeia
silvatica Duby 148 (4), A 178
silvatica var. Sendtn. = Sendtneri
stenolepis Borb. (*longifol.*) A 178 (3 α for.)
subcanescens Jord. A 178
tergestina Beck (silvat.) = seg.
tergestina Bég. (pann.) 148 = seg.
tergestina Fiori (*drymeia*) A 178 (4 β b)
Timeroyi Jord. = purpurea?
tirolensis Gremli (longifol.) = longifolia
tomentosa Payot = magnifica?
tomentosa Wimm. et Grab. (*arvens.*) A 178 (4 β oss.)

KNAUTIA III 146 (835)
transalpina Borb. (magnifica) A 178 = seg., cfr. A 216
transalpina Briq. A 178, 216 (2 ζ)
transalp. Christ (silvat.) = prec.
travnicensis G. Beck = rigidiuscula
umbrosa Rota (arvens.) = calycina
variabilis F. Schultz = arvens.
velutina Briq. A 216
veneta G. Beck = Ressmanni
vulgaris Dœll = arvensis et silvatica
KNAVEL = Scleranthus annuum Scop. = S. annuus
KOBRESIA I 125 (141)
Bellardi Degl. = myosuroides
bipartita Dalla Torre A 35 (2)
caricina W. 125 (2) = bipartita, cfr. A 35
myosuroides Fiori 125 (1)
scirpina W. = myosuroides
KOCHIA I 313 (292)
arenaria Roth 314 (4), A 65
atriplicifolia Roth = Cycloloma platyphyll.
dasyantha Schrad. = arenaria
densiflora Turcz. = scoparia
dentata W. = Cycloloma platyphyll.
glabra Moq (aren.) = arenaria
hirsuta Nolte 314 (3)
hyssopifolia Schrad. 314 (2)
longifolia Koch (aren.) = arenaria (a)
major Moq. (aren.) = arenaria
prostrata Schrad. 314 (5)
pubescens Moq. 314 (6 oss)
rubra Roth (aren.) = arenaria
saxicola Guss. 314 (6), A 65
scoparia Schrad. 313 (1)
Sieversiana C. A. Mey. = scoparia
tripteris Dum. = hirsuta
virgata Kostel. = scoparia
KŒLERIA I 79 (102)
alpicola Gr. et Godr. 79, A 21 (4 β)
ambigua Schur = cristata (α)
apennina Rolli exs. = splendens
aristata Lois. = Triset. subspicatum
aurea Posp (*gracilis*) A 21 (6 γ e)
aurea Ten. = Trisetum aur.
australis Kern. = canescens
Barrelieri Ten. A 19 (1 b)
brachystachya DC. = laxa
brevifolia Reut. 80 (5 β)
cærulea Ten. = Sesleria argentea
cærulescens Guss. = Festuca cærul.
calycina DC. = Schismus calyc.
canescens Asch. et Græbn. (*splendens*) A 21 (6 δ f)
canescens Fiori (crist.) 80 (6 δ) = canescens et carniolica
canescens Vis. (cristata) = splend. f. canescens
carniolica Domin (eriostachya) = seg.

KŒLERIA I 79 (102)
carniolica Kern. A 21 (6 ε)
caudata Steud. A 21 (6 δ e)
cenisia Domin (*gracilis*) A 21 (6 γ d)
cenisia Reut. = brevifolia
ciliata Kern. A 21 (6 α)
cinerea Goir. (cristata) = canescens et carniolica
collina N. Terr. = Trisetum panicum
condensata Boiss. et Bl. A 20 (3 d)
crassipes Lge. = caudata
cristata Bert. Amœn. = phleoides
cristata Pers. 80 (6), A 21
cristata Rchb. p. p. = dactyloides
cristata Ten. = splendens
dactyloides Posp. (*gracilis*) A 21 (6 γ f)
dactyloides Rchb. = glauca
dactyloides Spr. = phleoides
discolor Guss. = Barrelieri
eriostachya Panc. A 21 (6 ε oss.)
Fenzliana Schur = montana
flexilis Janka = gracilis
glabra Janka = montana
glabra Marches. (phleoides) = glabriflora
glabrescens Domin (*gracilis*) A 21 (6 γ b)
glabriflora Trautv. (*phleoides*) A 20 (3 b)
glauca DC. 80, A 21 (6 ζ)
gracilis Guss. = splendens
gracilis Pers. A 21 (6 γ)
grandiflora Bert. = splendens
grandis Bess. = glauca
hirsuta Gaud. 80 (5)
hirtella Fiori (splend.) 8 (6 β b) = canescens, cfr. A 21
hirtella Parl. (grandiflora) = canescens
hispida DC. 79 (2)
intermedia Guss. (non Ahlq.) = Barrelieri
intricata Genty = vallesiana
lanata Domin (*gracilis*) A 21 (6 γ a)
latifolia Domin (*gracilis*) A 21 (6 γ c)
laxa Lk. A 20 (3 c)
Linkii Kth. = pubescens
lobulata Hausskn. (phleoides) = laxa
macilenta DC. = Avellinia Michelii
major Koch (cristata) = pyramidata
Michelii Coss. = Avellinia Mich.
montana Dalla Torre = seg.
montana Hausm. (*cristata*) A 21 (6 β)
montana Jord. = brevifolia
nitida Ten. = Sesleria nitida
parviflora Bert. = cristata
parviflora Lk. = Triset. parvifl.
phleoides Pers. 79 (3), A 20
pseudo-glauca Borb. = latifolia
pseudo-glauca Schur = montana

Digitized by Google

KŒLERIA I 79 (102)
pseudo-gracilis Domin (*splendens*) A 21 (6 δ d subf.)
pseudo-rigidula Domin (*splendens*) A 21 (6 δ c)
pubescens Dalla Torre = crist. for. pubesc.
pubescens Domin (*vallesiana*) A 21 (4 α b)
pubescens Hausm. (*cristata*) A 21 (6 α c)
pubescens P. B. 79 (1), A 20
pubescens Parl. (setacea) = vallesiana for. pubescens
pubiflora Trautv. (*phleoides*) A 20 (8 a)
pyramidata Domin (*splendens*) A 21 (6 δ b)
pyramidata Pers. (*cristata*) A 21 (6 α b)
rigidiuscula Domin (*cristata*) A 21 (6 α d)
rigidula Simonkai = montana
robusta Borb. (phleoides) = laxa
Rochelii Schur = glauca
setacea DC., Gr. et Godr. 79 (4) = vallesiana, cfr. A 20
setacea Pers. (tuber.) = prec
splendens Presl 80, A 21 (6 δ)
subcaudata Asch. et Græbn. (*splendens*) A 21 (6 δ d)
submutica Domin (*condensata*) A 20 (8 d subf.)
subspicata Mart. = Trisetum subspic.
tuberosa Pers., Lois. = vallesiana
tunicata Presl = Festuca cœrulesc.
vallesiaca Gaud. 79 (4 b) = vallesiana (α a)
vallesiana Asch. et Græbn. A 20 (4)
velutina Freyn (crassipes) = canescens
villosa Pers. = pubescens
KŒLLEA = Eranthis
hiemalis Biria = E. hiem.
KOHLRAUSCHIA = Tunica
diminuta Rchb. = T. — dim.
glabra Podpera (velut.) = T. — levicaulis
obcordata Rchb. = T. obcord.
prolifera Kth. = T. prol.
Sibthorpii Kth. = T. armerioides
uniflora Schur (prolif.) = T. — diminuta
velutina Rchb. = T. vel.
KONIGA = Alyssum
edentula Heynh. = A. petræum
halimifolia Rchb. = A. halimifolia
maritima R. Br. = A. marit.
rupestris Heynh. = A. rup.
KOPSIA II 470 (771)
achroantha Bég. (*purpur.*) 473 (6 α b)
ægyptiaca Caruel 471 (2)
albiflora Bég. (*ramosa*) 471 (1 α d)
angustiflora Bég. (*Muteli*) 472 (8 β)
arenaria Dum. 473 (7), A 172
KOPSIA II 470 (771)
Bohemica Bég. (*purpur.*) 473 (6 γ)
Borkhausenii Caruel = arenaria
cærulea Dum. = purpurea (α)
cyanea Bég. (*ramosa*) 471 (1 α c)
emarginata Bég. (*Muteli*) 471 (8 α b)
Gussoneana Lojac. 473 (5 γ)
jonantha Bég. (*aren.*) 473 (7 b)
lavandulacea Caruel 472 (4), A 172
monoclonos Bég. (*ramosa*) 471 (1 α b)
Muteli Bég. 471 (8)
Muteli Caruel (ramosa) = prec.
nana Bég. (*ramosa*) 471 (1 β)
panormitana Lojac. 472 (8 α c)
polyclonos Bég. (*ramosa*) 471 (1 α a)
proboscistyla Bég (*ramosa*) 471 (1 α a)
purpurea Bég. 473 (6)
ramosa Dum. 471 (1)
rufescens Bég. (*Muteli*) 472 (8 α d)
Schultzii Bég. 472 (5)
Spitzelii Bég. (*purpur.*) 473 (6 β)
stricta Caruel 472 (5 β)
trinacria Bég. (*ægypt.*) 471 (2 b)
KOSTELETZKYA = Hibiscus
pentacarpos Ledeb. = H. pent.
KRATZMANNIA = Agropyrum
imbricata Opiz = A. cristatum
KRAUNHIA II 87 (503)
floribunda Taub. 88
KROKERIA = Lotus
edulis Wk. et Lge. = L. edulis
oligoceratos Mœnch = prec.
KRUBERA II 174 (570)
leptophylla Hoffm. = peregrina
peregrina Hoffm. 174
KUNDMANNIA II 172 (566)
sicula DC. 172
KUNOKALE = Polygonum
carneum Raf. = P. Fagopyrum

LABURNUM = Cytisus
alpinum J. Presl = C. alpinus
Alschingeri C. Koch et Fint. = C. Alsching.
anagyroides Medic. = C. Laburnum
glabrescens Tanf. = C. emeriflorus
lanigerum J. Presl = Calycotome villosa
nigricans J. Presl = C. nigric.
pendulum Raf. = C. Laburnum
præcox Fuss = C. Alschingeri
purpureum Drapiez = C. purp.
triflorum J. Presl = C. triflor.
vulgare Gris. = C. Laburnum
LACHENALIA = Dipcadi
serotina W. = D. serot.
LACHNAGROSTIS = Triplachne
Gussonis Trin. = T. nitens
nitens Trin. = T. nitens
phleoides Nees et Meyen = Gastridium lendiger.
LACTUCA III 420 (949)
adulterina Gren. = virgata
albida Guss. (*sativa*) 422 (4 γ b subf.)
alpina Benth. et Hook. f. = Mulgedium alp.
altissima M. B. = Chaixii
ambigua Schrad. = virosa
angustifolia Gilib. = saligna
angustifol. Steud. = Scariola
angustifolia Tomm. (Scar.) = virgata
atrovirens Guss. (*sativa*) 422 (4 γ a subf.)
augustana All. 422 (4 β)
augustana Rchb. = Chaixii
autumnalis Bernh. = Leontodon autumn.
capitata DC. = seg.
capitata Lam. (*sativa*) 422 (4 γ b)
caucasica C. Koch = saligna
Chaixii Vill. 423 (6 β)
chondrillæflora Bor. 421 (2 γ)
cichoriifolia DC. A 193 (1 α b)
coriacea Bischoff (Scar.) = virgata
coriacea Sch. Bip. 422 (4 α d)
crispa L. (*sativa*) 422 (4 γ c)
crispa Roth, DC. = prec.
cyanea C. Koch = saligna
decorticata Forsk. = viminea
dubia Jord. = integrifolia
elata Salisb. = Scariola
erysimifolia DC. = muralis
esculenta Salisb. = sativa
heterophylla Bogenh. (querc.) = quercina (α)
integrata Gr. et Godr (Scar.) = augustana
integrifolia Bischoff (*perenn.*) 420 (nota)
integrifolia Bischoff. (querc.) = Chaixii
integrifolia Bogenh. (*Scar.*) 422 (4 α b)
integrifolia Fiori (*vim.*) 421 (2 α b)
laciniata Roth 422 (4 γ d)
latifolia Fiori (*vim.*) 421 (2 β)
latifolia Gilib. = Scariola
longidentata Moris 423 (7)
longifolia Lam. (*sativa*) 422 (4 γ a)
maculosa DC (*Scar.*) 422 (4 α c)
microcephala Goir. (*mural.*) A 193 (8 c)
muralis E. Mey., Fres. 423 (8), A 193
officinarum Crantz = Scariola
pallida Guss. (*sativa*) 422 (4 γ a subf.)
palmata W. = laciniata
perennis L. 420 (1), A 193
pinnatifida Bischoff (querc.) = = quercina (α)
plicata Balb. 422 (4 β b)
prenanthoides Scop. = Chondrilla prenanth.
quercina L. 423 (6)
ramosissima Bor. = chondrillæflora
ramosissima Gr. et Godr. 421 (2 δ)

Digitized by Google

LACTUCA III 420 (919)
runcinata Bogenh. (querc.) = quercina (α)
runcinata Gr. et Godr., Celak. (saligna) = virgata
Ruppiana Wallr. (*saligna*) 422 (3 α a)
sagittata W. et K. = Chaixii
salicifolia Salisb. = seg.
saligna L. 421 (3)
sativa L. 422 (4 γ)
Scariola L. 422 (4)
segusiana Balb. = tenerrima
silvestris Lam. 422 (4 α)
sinuata Forsk. = virosa
stricta W. et K. = quercina (α)
tenerrima Pourr. 420 (1 β)
Tommasiniana Sch. Bip. = virgata
Vialea Bell. = quercina (α)
viminea J. et C. Presl 421 (2)
virgata Tausch 422 3 β)
viridis Guss. (*sativa*) 422 (4 γ b subf.)
virosa L. 423 (5)
Wallrothiana DC. (sal.) = seg.
Wallrothii Spr. 422 (3 α b)
LACTUCOPSIS = Lactuca
altissima Sch. Bip. = seg.
Chaixi Sch. Bip. = L. Chaixi
quercina Sch. Bip. = L. querc.
LADANIUM = Cistus
laurifolium Spach = C. laurifol.
LADANUM = Galeopsis
luteum Gilib = G. ochroleuca
purpureum Gilib. = G. Ladanum
LÆLIA = Calepina
iberioides Pers. = C. Corvini
LAGENARIA III 157 (838)
clavata Ser. (*vulg.*) 157 (c)
Cougourda Ser. (*vulg.*) 157 (b)
depressa Ser (*vulg.*) 157 (e)
Gourda Ser. (*vulg.*) 157 (a)
turbinata Ser. (*vulg.*) 157 (d)
vulgaris Ser. 157
LAGŒCIA II 147 (537)
Cuminoides L. 147
LAGOPUS = Trifolium
flexuosus Bernh. = T. medium
montanus Bernh. = T. mont.
pratensis Bernh. = T. prat.
LAGOPUS = Plantago
albicans Fourr. = P. alb.
arvensis Fourr. = P. Lagopus
Bellardi Fourr. = P. Bell.
lanceolatus Fourr. = P. lanc.
LAGOSERIS = Pterotheca
alata Nym. = Pt. nemausensis
apargioides Lk. = Willemetia stipitata
bifida Koch = Pt. bifida
bursifolia Lk. = Crepis burs.
cernua Lk. = Crepis neglecta
crepoides M. B. = Pt bifida
leontodontoides Lk. = Crepis leontodont.
nemausensis M. B., Koch = Pt. nemaus.
taraxacifolia Rchb. = Crepis taraxacifol.
taraxacoides Lk. = Crepis leontodontoides
LAGUROSTEMON = Saussurea
pygmæus Cass. = S. pygmæa
LAGURUS I 60 (68)
cylindricus L = Imperata cylin.
nanus Guss. (*ovatus*) A 15 (b)
ovatus L. 60, A 15
LAHAYA = Polycarpon
alsinæfolia R. et S. = P. alsin.
polycarpoides Lk. = P. Cupanii
LAMARKIA I 81 (105)
aurea Mœnch. 81
LAMIELLA = Lamium
amplexicaulis Fourr. = L amplex.
LAMIOPSIS = Lamium
amplexicaulis Opiz = L amplex.
purpurea Opiz = L. purp.
LAMIUM III 33 (791)
acutifolium Bolzon (*album*) A 172 (8 c)
affine Guss. et Ten. = rugosum
albiflorum Goir. (macul.) = lacteum
albiflorum Goir. (*purpur.*) 36 (7 α b)
albiflorum P. A. Sacc. (*Orvala*) 34 (1 b)
albifolium Bolzon (*Galeobd.*) 34 (2 b)
album Benth. (vulgatum) = album
album Briq. (macul.) = lacteum
album Desf. = flexuosum
album L 36 (8), A 172
amplexicaule L. 35 (5)
amplexic. × purpureum G. Mey. = hybridum
apenninum Bég. (*Galeobd.*) A 172 (2 c)
aristatum Bég. (*pubescens*) 35 (3 β 6)
bifidum Cyr. 36 (6)
calyciflorum Ten. (amplexic.) = clandestinum
capitatum Sm. = album
clandestinum Rchb. (*amplexic.*) 35 (5 α b)
Columnæ Ten. (1827) = grandiflorum
Columnæ Ten. hb. = Tenoreanum
corsicum Gr. et Godr. 35 (4 γ)
cryptanthum Guss. 36 (6 b)
decipiens Sond. = hybridum
dissectum With. = hybridum
flexuosum Ten. 34 (3)
fœtidum Gilib. = purpureum
foliosum Crantz = album
Galeobdolon Crantz 34 (2), A 172
garganicum L. 35 (4)
glabratum Gris. (gargan.) = grandiflor.
gracile Briq. (*grandifl.*) 35 (4 β b)
grandiflorum Pourr. 35 (4 β)
grandiflorum Salisb. = Orvala
hirsutum Lam. = maculatum
hirsutum Timb. et Marc. = rugosum?
hybridum Vill. 36 (7 β)
incisum W. = hybridum
intermedium Fr. 36 (5 β)
LAMIUM III 33 (791)
lacteum Wallr (*macul.*) 36 (9 for.)
Ladanum Crantz = Galeopsis Lad.
levigatum DC. = grandiflor.
levigatum L, All. = maculatum (a)
longiflorum Ten = grandiflor.
luteum Krock. = Galeobdolon
maculatum L. 36 (9), A 173
medium Mœnch = purpur. (α)
melissæfolium Mill. = maculat.
Michaelianum Tausch = garganic.
minus Moris (longiflorum) = corsicum
molle Ait. = purpureum
montanum Briq. (*Galeobd.*) 34 (2 c)
mutabile Dum. = maculat. (a)
nemorale Rchb. (macul.) = maculat. (a)
niveum Schrad. = lacteum
numidicum Noë = grandiflorum
obtusifolium Bolzon (*album*) A 172 (8 b)
ocimifolium Sims. = purpur. (α)
Orvala L. 34 (1)
pallens Goir. (Orvala) = Orv. b. albiflorum
pallidum Salisb. = garganic.
palmatum Sm. = amplexic.
pannonicum Scop. = Orvala
parietariæfolium Benth. = album
pedemontanum Rchb. = grandiflor.
pubescens Sibth. 35 (3 β)
pubescens b. Guss. = aristatum
purpureum L. 36 (7)
purpur. × amplexicaule G. Mey. = intermedium
roseum Goir. (*maculat.*) A 173 (9 for.)
rubrum Wallr. 37 (9 a)
rugosum Ait. 37 (9 b)
rugosum S. et S. = pubescens
Tenoreanum Bég. (*macul.*) 37 (9 c)
Tetrahit Crantz = Galeopsis Tetr.
tomentosum Auct. it. = macul. 37 (nota)
tomentosum W. 37 (nota)
urticæfolium Weihe = purpur.
veronicæfolium Benth. 35 (4 β c)
vulgare Rchb. (*Galeobd.*) 34 (2 a)
vulgatum Benth. = album et macul.
LAMOTTEA = Carthamus
cærulea Pomel = C. cærul.
LAMYRA = Cirsium
alata Cass. = C. strictum
glabella Cass. = prec.
lobata Cass. = C. afrum
stipulacea Cass. = C. stellatum
triacantha Cass. = C. Casabonæ
LAPATHUM = Rumex
Acetosa Scop. = R. Acetosa

Digitized by Google

LAPATHUM = Rumex
Acetosella Scop. = R. Acetosella
acutum Scop. = R. crispo × obtusifol.
alpestre Scop. = R. scutatus
alpinum Lam. = R. alp.
aquaticum Scop. = R. aquat.
arborescens Mœnch = R. Lunaria
arvense Lam. = R. Acetosella
aureum S. F. Gray = R. maritimus
bononiense Montand. = R. pulcher
bucephalophorum Lam. = R. buceph.
conglomeratum S. F. Gray = R. congl.
crispum Scop. = R. crisp.
digynum Lam = Oxyria dig.
divaricatum Rén. = R. divar.
giganteum Opiz = R. Hydrolapath.
glomeratum Gilib. = R. conglom.
hortense Lam. = R. Patientia
Hydrolapathum Scop. = R. Hydrolap. vel conglom.?
limosum Rén. = R. limos.
maritimum Mœnch = R. mar.
maximum Gilib. = R aquaticus
minus Lam. = R. maritimus
nemorosum Fourr. = R. sanguineus
obtusifolium Mœnch = R. obt.
obtusatum Montand. = prec.
palustre S. F. Gray = R. limosus
persicarioides Mœnch = R. maritimus
pratense Lam. = R. Acetosa
pulchrum Mœnch = R. pulchr.
rivale Rén. = R. Hydrolapath.
rotundifolium Montand. = R. alpinus
sanguineum Mœnch = R. sang.
scutatum Lam. = R. scut.
sinuatum Lam. = R. pulcher
silvestre Lam. = R. silv.
vesicarium Mœnch = R. vesic.
virgatum Mœnch = R conglomer.
viride S. F. Gray = R. virid.
LAPPA = Arctium
Arctium Hill. = A. majus
Bardana Mœnch = A. majus
Carduelis Lam. = Carduus Carduelis
communis Coss. et Germ. = A. Lappa
glabra α Lam. = A. minus
glabra β Lam. = A. majus
intermedia Rchb. f. = A. nemorosum
macrosperma Wallr. = A. nemorosum
major Gærtn. = A. majus
minor Hill., DC. = A. minus
nemorosa Kœrn. = A. nem.
officinalis All. = A. majus
Personata Lam. = Carduus Pers.
pubens Bor. = A. pubens
tomentosa Lam. = A. toment.
vulgaris Hill = A. majus
LAPPAGO = Tragus
racemosa Honck. = Tr. racemosus
LAPPULA II 381 (730)
deflexa Garcke 381 (2)
echinata Gilib. = seg.
Myosotis Mœnch 381 (1)
patula Fiori 381 (nota)
squarrosa Dum. 381 (1 b)
tomentosa Fiori (*Myosotis*) 381 (1 c)
LAPPULARIA = Torilis
infesta Pomel = T. arvensis
neglecta Pomel = T. negl.
nodosa Pomel = T. nod.
LAPSANA III 386 (927)
capillaris L. p. p. = Crepis virens
communis L. 386, A 192
crispa Pers. (*comm.*) 386 (α b)
crispa W. = prec.
fœtida Scop. = Aposeris fœt.
glandulosa Freyn (comm.) = hirta
gracilis Lam. = Arnoseris min.
hirta Guss. (*comm.*) 387 (γ), A 192
hirta Ten. (*comm.*) A 192
lampsanæfolia Mill. = Rhagadiolus edulis
leontodontoides DC. = Aposeris fœtida
macrocarpa Coss. 387 (δ)
macrocarpa Tod. = hirta
minima All. = Arnoseris min.
pubescens Horn. 386 (β)
pulchra Vill. = Crepis pulchra
pusilla W. = Arnoseris minima
ramosissima Crantz = seg.
Rhagadiolus L. = Rhagad. edulis
silvatica Wallr. 386 (α c)
sonchifolia Gilib. = communis?
stellata L. = Rhagadiolus stellata
vulgaris Gromow = communis
Zacyntha L. = Zacyntha verrucosa
LARBREA = Stellaria
alpina Schur (uligin.) = S. — alp.
aquatica A. St. Hil. = S. uliginosa
aquatica Ser. = Malachium aq.
graminea Fuss = S. gram.
latifolia Godr. (graminifol.) = S. — latifol.
palustris Fuss = S. pal.
uliginosa Rchb. = S. uliginosa
LARIX I 29 (31)
caducifolia Gilib. = decidua
communis Laws. = decidua
decidua Mill. 29
europæa DC. = decidua
excelsa Lk. = decidua
Larix Karsten = decidua
pyramidalis Salisb. = decidua
vulgaris Fisch. = decidua
LASER = Siler
aquilegifolium Rœhl. = S. trilobum
trilobum Baumg. = Laserpit. marginatum
trilobum Bork. = S. trilob.
LASERPITIUM II 189 (581)
abortivum Mutel = Thapsia polygama
alpinum W. et K. 190 (2 β)
angustifolium Goir. (*Siler*) A 153 (5 α b)
angustifolium L. 191 (6 b)
angustifolium Scop. = peucedanoides
aquilegifolium DC. p. p. = alpinum
aquilegifol. Jacq., Murr. = Siler trilob.
aquilegifol. Moretti = latifol.
aquilegifol. Ten. = Trochiscanthes nodiflora
Asclepium Calestani = Elæoselin. Asclep.
asperum Crantz 190 (3 b)
carniolicum Bernh. = Siler trilobum
Carota Boiss. = Thapsia polygama
Cervaria C. C. Gmel. = asperum
Chironium L. = Opopanax Chir.
commune Mill. = latifol.
crispum Turra = latifol.
cuneatum Mœnch = gallicum
cynapiifolium Sal.-Marschl. 192, A 214 (8 β)
daucoides Duf. = prutenicum
dauricum Jacq. = Ligusticum ferulaceum?
ferulaceum L. = Prangos ferul.
formosum W. = seg.
gallicum L. 191 (6)
gallicum Scop. = prutenicum
garganicum Ten., Bert. 191 (5 β)
Gaudinii Moretti 190 (2 γ), A 153
glabratum DC. (*prutenic.*) 191 (7 b)
glabratum Gr. et Godr. (Panax) = cynapiifol.
glabrum Crantz = latifol.
gummiferum Desf. 192 (nota)
Halleri Vill., All. = Panax
hirsutum Gilib. = prutenicum
hirsutum Lam. = Panax
hirtellum Gaud. = nitidum
latifolium L. 190 (3)
Libanotis Lam. = latifol (a)
ligulatum Posp. (*prutenic.*) 191 (7 c)
lineatum Tausch = Siler
Lobelii Vill. = Cnidium silaifol.
lucidum Ait. = Pachypleurum simplex
luteolum Gaud. = Gaudinii
marginatum W. et K. 190 (2), A 153
meoides Desf. = Elæoselinum meoides
montanum Lam. = Siler
mutellinoides Crantz = Pachypleurum simplex
nebrodense Jan = siculum
nitidum Zanted. 190 (1)
ovalifolium Moris (Siler) = garganic.
paludapifolium Mill. = latifol.

Digitized by Google

LASERPITIUM II 189 (581)
Panax Gouan 192 (8), A 214
peucedanoides L. 191 (4)
pilosum Comolli = nitidum
polygamum Lam. = Thapsia polyg.
prutenicum L. 191 (7)
pubescens Lag. = asperum
resinosum Presl = Bonannia græca
scabrum Gaud. (latifol.) = asperum
selinoides Crantz = prutenicum
selinoides Scop. = Selinum carvifolia
siculum Spr. 191 (5 γ)
silaifolium Jacq. = Cnidium silaifol.
Siler L. 191 (5), A 158
Siler β Pollini = Siler b. angustifol.
simplex L. = Pachypleurum simpl.
Thapsia Calestani = Thapsia garganica
thapsiæforme Brot. = gummiferum
trifurcatum Lam. = gallicum
trilobum L. = Siler trilob.
trilobum Rochel = alpinum
trilobum Suter = marginat.
verticillatum W. et K. = Physosperm. vert.
LASIAGROSTIS = Stipa
Calamagrostis Lk. = S. Calam.
LASIOPERA = Odontites
Bocconi Presl = O. Bocon.
frutescens Presl = prec.
rhinanthina Hoffgg. et Lk. = Bartsia Trixago
rigidifolia Presl = O. rigid.
viscosa Hoffgg. et Lk. = Bartsia visc.
LASIOPTERA = Lepidium
campestris Andrz. = L. camp.
hirta Andrz. = L. hirtum
LASIOSPORA = Scorzonera
hirsuta Cass. = S. hirsuta
LASTILA = Lathyrus
hirsuta Alef. = L. hirsut.
LASTREA = Nephrodium
calcarea Newm. = Polyp. Robertianum
Callipteris Newm. = N. cristatum
collina Moore = N. dilatatum
cristata Presl = N. crist.
deorso-lobata Moore (Fil.-mas) = N. — deorso-lob.
dilatata Presl = N. dilatatum
Dryopteris Newm. = Polyp. Dryopt.
dumetorum Moore (dilatata) = N. — dumet.
Filix-mas Presl = N. Filix-mas
glandulosa Newm. = N. dilatatum
incisa Moore (Fil.-mas) = N. - affine
multiflora Newm. = N. dilatatum
nivalis Moore = N. — Hypodematium
LASTREA = Nephrodium
Oreopteris Presl, Bory = N. Oreopt.
paleacea Moore (Fil.-mas) = N. — pal.
Phegopteris Newm. = Polyp. Pheg.
rigida Presl = N. rigid.
spinulosa Presl = N. spinul.
Thelypteris Presl, Bory = N. Thelypt.
LATERIFISSUM = Montia
minus Dulac = M. minor
rivulare Dulac = M. rivul.
LATHRÆA II 485 (778)
clandestina L. 486 (2)
Phelypea Forsk. = Kopsia ramosa
simplex S. F. Gray = seg.
Squamaria L. 486 (1)
LATHYRUS II 99 (516)
abbreviatus Goir. (latifol.) A 143 (10 β b)
affinis Guss. 99 (1 b)
alatus Fouc. et Šim. (*setifol.*) A 148 (14 α b)
alatus Ten. 100 (4 γ b)
albiflorus Alef. (*vernus*) 107 (28 α b)
albiflorus Fiori (*venetus*) 108 (29 c)
albus Garcke, Kitt. = pannonic.
amphicarpos Gouan (non L.) = heterocarpus
amphicarpos L. = sativus?
angulatus L. Mant., S. et S., Bert. = sphæricus
angulatus L. p. p. 104 (15), A 148
angustatus Ser. (*sativus*) A 148 (6 β c)
angustifolius Gremli (*silvester*) 102 (10 α b)
angustifol. Medic. = silvester
angustifol. Moris (silvester) = membranaceus
angustifol. Rouy (*annuus*) 101 (5 b)
angustifol. Rouy (Clymen.) = Clymenum (α)
angustifol. Rouy (*niger*) 106 (25 b)
angustifol. Rouy (vernus) = flaccidus
angustifol. Schrank = silvester (α a)
angustifol. Strobl (*membranac.*) 102 (10 γ b)
angustissimus Fiori (*varius*) 106 (28 β b), A 148
annuus L. 101 (5)
Aphaca L. 99 (1)
aphyllus S. F. Gray = prec.
aristatus Vis. = saxatilis
articulatus L. 100 (4), A 148
articulatus Lois. = alatus
asphodeloides Gr. et Godr. = pannonicus
attenuatus Ten. = digitatus
attenuatus Viv. = tuberosus
aurantiacus Loser (*annuus*) 101 (5 e)
auriculatus Bert. = articulatus
LATHYRUS II 99 (516)
axillaris Lam. = inconspicuus, sphæricus
bithynicus L. = Vicia bithyn.
brachyphyllos Goir. (*silvester*) A 148 (10 α e)
brachyphyllos Schur = prec.?
brutius Ten. = grandiflor.
canescens Gr. et Godr. = filiformis
Cicera All. = articulatus
Cicera L. 101 (6), A 148
ciliatus Guss. = saxatilis
Clymenum L. 100 (4 γ), A 148
coccineus All. = sphæricus
controversus Lor. et Barr. = neapolitanus
corsicus Rouy (*latifol.*) 102 (10 γ c)
currentifolius Lam. = Ochrus
denudatus Gilib. = pratensis
digitatus Fiori 105 (21)
divaricatus DC. (macrorrhizus) = seg.
divaricatus Fiori (*montanus*) 107 (27 α b)
diversifolius Presl = quid?
dubius Ten. 101 (6 α b)
ensifolius Bad. = membranaceus
erectus Lag. 104 (17 β)
eriocarpus Godr. (*erectus*) 104 (17 β a)
erythrinus Presl = dubius
exaltatus Ces., Pass. et Gib. 108 (nota)
filiformis J. Gay 106 (22), A 148
flaccidus Ces., Pass. et Gib. (*vernus*) 107 (28 β), A 144
filipetiolatus St.-Lag. = Aphaca
foliaceopetiolatus St.-Lag. = Nissolia
Gaudini Rouy = gracilis
Gerardi Roth = sphæricus
glaber Guss. (*odoratus*) 101 (8 β)
Gmelini Rouy 106 (24 α)
Gorgoni Parl. 101 (6 δ)
Gouani Rouy = heterocarpus
gracilis Gremli (*vernus*) 107 (28 γ)
gramineus S. F. Gray = Nissolia
gramineus A. Kern. = linearis
grandiflorus Fiori (*erectus*) 104 (17 β b)
grandiflor. Lang. = platyphyllus
grandiflor. Rouy (stans) = erectus b. grandiflor.
grandiflorus S. et S. 108 (11)
grandiflorus Ten. (*sativus*) 101 (6 β b)
heterocarpus Lor. et Barr. (*setifol.*) 104 (14 β, A 148
heterophyllus L. 108 (10 δ)
hexædrus Chaub. = angulatus
hirsutus L. 102 (9)
hirsutus β Bert. = pinnatus
hispanicus Mill. = articulatus
inconspicuus Balb. = angulatus
inconspicuus L. 104 (17), A 148
incurvus Rchb. = palustris

Digitized by Google

LATHYRUS II 99 (516)
inermis Roch. 105 (20)
intermedius Wallr. = silvester (α)
italicus Fisch. ex DC. = quid?
Jordani Arc. (niger) = seg.
Jordani Ces., Pass. et Gib. 107 (26)
lasiocarpus Godr. (*erectus*) 104 (17 β c)
latestipulatus Marches. (pratens.) = sepium
latifolius Goir. (*sativus*) A 143 (6 β d)
latifol. Gr. et Godr. (Clymen.) = alatus
latifol. L. 102 (10 β), A 143
latifol. Peterm. (silvester) = platyphyllus
latifol. Rouy (*annuus*) 101 (5 c)
latifol. Rouy (*articul.*) 100 (4 α b)
latifol. Rouy (Cicera) = dubius
latifol. Rouy (niger) = tristis
Lens Bernh. = Vicia Lens
Lenticula Peterm. = Vicia Lentic.
leptophyllus Maly = annuus
ligusticus Burn. (*articul.*) 100 (4 β)
linearis Rouy (*Nissolia*) 100 (2 b)
Linnæi Rouy 106 (24)
longepedunculatus Led. = angulatus
longifolius Ten. = membranaceus
Lusseri Heer A 143 (18 e)
luteus Mœnch = annuus
luteus Peterm. = Linnæi
Maccaguenii Tod. = glaber Guss.
macrorrhizus Wimm. = montanus
maritimus Bigel. 108 (nota)
megalanthos Steud. = platyphyllus
membranaceus Presl 108 (10 γ)
micranthus Gér. in Lois. = inconspicuus
monanthos W. = Vicia multifida
monspeliensis Burn. (latifol.) = membranaceus
monspeliensis Del. = prec.
montanus Bernh. 107 (27)
montanus Gr. et Godr. = Linnæi
montanus Lec. et Lam. (*pratens.*) A 143 (18 f)
multiflorus Fiori (*venetus*) 108 (29 b)
multiflorus Peterm. = venetus
multiflorus Tin. ex Lojac. (*annuus*) 101 (5 d)
neapolitanus Ten. (*sphæric.*) 104 (16 b)
nervatus Presl = sphæricus
niger Bernh. 107 (25)
nigricans Peterm. = Vicia Marschalii
Nissolia L. 100 (2)
occidentalis Rouy 106 (24 β)
Ochrus DC. 100 (8)
odoratus L. 102 (8), A 143

LATHYRUS II 99 (516)
odorus Thomas = grandiflorus
oleraceus Lam. = Pisum arvense
pallescens C. Koch 106 (22 b)
paluster Lang ex Ten. = Clymenum
paluster L. 105 (19)
pannonicus Garcke 106 (23), A 143
parviflorus Roth = inconspicuus
petiolaris Rouy (*Ochrus*) 100 (8 b)
phylloideus St.-Lag. = Nissolia
pilosus Ser. (*sphæric.*) 104 (16 c)
pinnatus Vis. et Sacc. (*hirsut.*) 102 (9 b)
pisiformis Houtt. = maritimus
platyphyllus Retz 102 (10 α c)
pratensis L. 105 (18), A 143
prolixus Goir. (*silvester*) A 143 (10 α d)
prostratus Brign. = setifolius
prostratus Host = montanus
pubescens Strobl, Beck (*pratens.*) 104 (18 b)
pulcher Salisb. = tingitanus
purpureus DC. (odoratus) = odoratus
purpureus Desf. = alatus
purpureus Gilib. = latifol.
purpureus Presl = dubius
quadrimarginatus Bory et Ch. 101 (6 γ)
Rothii Rouy = mont. β tenuifolius
sativus L. 101 (6 β), A 143
saxatilis Vis. 108 (13)
segetum Lam. = Aphaca
sepium Scop. 105, A 143 (18 d)
sessilifolius Ten. = digitatus
setifolius L. 104 (14), A 143, 214
siculus L. (odoratus) = odorat.
siculus Steud. = dubius
silvester L. 102 (10), A 143
Simonii Rouy (1903) = setifol. b. alatus
sphæricus Retz 104 (16), A 143
spurius W. = Clymenum
stans Koch = erectus b. grandiflor.
stans Vis. = erectus
stenophyllus Boiss. (*sphæricus*) A 143 (16 d)
subalpinus Rouy (pratens.) = Lusseri
tenuifolius Ces., Pass. et Gib. (*montan.*) 107 (27 β)
tenuifol. Desf. = articulatus (α)
tenuifolius Fouc. et Sim. (*Cicera*) A 143 (6 α b)
tenuifol. Lois., Guss. = Clymenum
tingitanus L. 101 (7)
tristis Fiori (*niger*) 106 (25 c)
tuberosus L. 103 (12), A 143
tumidus W. = Vicia bithynica
turgidus Lam. = prec.
variegatus Gilib. = silvester
variegatus Gr. et Godr. = venetus

LATHYRUS II 99 (516)
varius C. Koch 106 (23 β), A 143
velutinus DC. pratens.) 104 (18 c)
venetus Hall. et Whlf. 108 (29)
vernus Bernh. 107 (28), A 144
versicolor Beck (albus) = varius
viciæfolius Ledeb. = seg.
viciæformis Gilib. = paluster
villosus Friv. = inermis
LAUNÆA III 424 (950)
chondrilloides Hook. f. = resedifolia
resedifolia O. Ktze. 424
LAURENTIA III 192 (852)
commutata Tod. 193 (*nota*)
Gasparrinii Tin. 192 (1 b)
Gussonei Bég. (*Michel.*) 192 (1 c)
Michelii DC. f. 192 (1)
Michelii b Guss. = Gussonei
tenella DC. f. 193 (2)
LAUREOLA = Daphne
sempervirens Fourr. = D. Laureola
LAUROCERASUS = Prunus
lusitanica M. Rœm. = P. lusitanica
officinalis M. Rœm. = P. Laurocerasus
Ottinii Carr. = prec.
vulgaris Carr. = prec.
LAURUS I 281 (270)
nobilis L. 281, A 61
LAVANDULA III 17 (781)
alba De Ging. (*latifol.*) 18 (4 c)
alba De Ging. (*Spica*) 18 (8 d)
albiflora De Ging. (*multifida*) 19 (5 b)
angustifolia Bég. (*Spica*) 18 (8 b)
angustifol. De Ging. (vera) = prec.
angustifol. L. f. (Spica) = Spica
angustifolia Mill. = prec.
brachystachya De Ging. (*Stœchas*) 18 (1 a)
delphinensis Jord. 18 (8 c)
dentata L. 18 (2)
fragrans Salisb. = latifol.
incana Salisb. = Stœchas
latifolia De Ging. (Spica) = delphinensis
latifolia L. f. (Spica) = latif.
latifolia Medic., Vill. 19 (4)
ligustica DNtrs. (vera) = angustifolia
macroloba Briq. (Stœch.) = seg.
macrostachya De Ging. (*Stœchas*) 18 (1 b)
multifida L. 19 (5)
officinalis Chaix = Spica
ovata Steud. = latifol.
pinnata Mœnch (non L.) = dentata
pinnatifida Webb = multifida
platyloba Briq. (Stœch.) = brachystachya
Spica All., DNtrs. etc. = latifol.
Spica L. 18 (8)
Spica β L. = latifolia
Stœchas L. 18 (1)

Digitized by Google

LAVANDULA III 17 (781)
tomentosa L. f. (*latifol.*) 18 (4 b)
vera DC. = Spica
vulgaris Briq. (*latifol.*) 18 (4 a)
vulgaris α Lam. = Spica
vulgaris β Lam. = latifolia
LAVATERA II 263 (642)
acutifolia Lam. = Olbia
africana Cav. = Olbia
africana Mill. = trimestris
agrigentina Tin. 264 (4 β)
alba Medic. = trimestris
alba Parl. (*trimestris*) 265 (9 b)
altheæfolia Mill. = trimestris
ambigua DC. = thuringiaca
arborea L. 263 (1)
bicolor Shuttlew?, Rouy 265 (7 β)
biennis Guss. (non M. B.) = punctata
calycina Poir. = triloba
cretica L. 263 (2)
Empedoclis Ucria = cretica
eriocalyx Steud. = arborea
flava Desf. 264 (4)
flava Guss. = agrigentina
grandiflora Lam., Mœnch = trimestris
hispanica Mill. = maritima
hispida Desf. (*non Sm.*) 264 (3 β)
hispida Gr. et Godr. (Olbia) = intermedia
intermedia Rouy (*Olbia*) A 159 (3 α c)
maritima Gouan 264 (7)
moschata Moris = triloba
neapolitana Ten. = cretica
Olbia L. 264 (3), A 159
Olbia S. et S. = unguiculata
pallescens Moris 265 (8 β)
punctata All. 264 (6)
rosea Medic. = trimestris
rotundifolia Lam. = maritima
sicula Tin. = cretica
silvestris Brot. = cretica
silvestris Cyr. = thuringiaca
Thirkeana C. Koch = thuringiaca
thuringiaca All. = Olbia
thuringiaca L. 264 (5)
thuringiaca Savi = punctata
tomentosa Dum.-Cours. = unguiculata
triloba Gouan, Zum. = trilobata
triloba Jacq. = Olbia
triloba L. 265 (8)
triloba Seb. et M. = cretica
trilobata Rouy (*marit.*) 264 (7 α b)
trimestris L. 265 (9)
undulata Desf. = Olbia
unguiculata Desf. 264 (3 α b)
veneta Mill. = arborea
vulgaris H. Mart. = thuringiaca
LAZAROLUS = Pirus
Aria Borckh. = P. Aria
Chamæmespilus Borckh. = P. Chamæm.
oxyacanthoides Borckh. = Cratægus Azarolus
LAZAROLUS = Pirus
torminalis Borckh. = P. torm.
LECANOCARPUS = Chenopodium
aristatus Zucc. = C. arist.
LECOKIA II 207 (nota)
cretica Lam. 207 (nota)
LEDONIA = Cistus
aprica Jord. et Fourr. = C. — brevipeduncul.
arrigens Jord. et Fourr. = C. arrig.
elegans Jord. et Fourr. = C. — cymosus
fruticans Jord. et Fourr. = C. frutic.
peduncularis Spach = C. salvifolius
platyphylla Jord. et Fourr. = C. — grandifolius
rhodanensis Jord. et Fourr. = C. — biflorus
salviæfolia Fourr. = C. salv.
velutina Jord. et Fourr. = C. — longipeduncul.
LEERSIA = Oryza
oryzoides Sol. in Sw. = O. clandestina
LEGOUZIA = Specularia
arvensis Durand = S. Speculum
hybrida Gérard. = S. hybrida
parviflora S. F. Gray = prec.
Speculum Fisch. = S. Spec.
LEJOLOBIUM = Nasturtium
austriacum Opiz = N. austr.
LEMBOTROPIS = Cytisus
nigricans Gris. = C. nigric.
sessilifolia C. Koch = C. sess.
triflora Presl = C. triflorus
LEMNA I 150 (154)
arrhiza L. = Wolffia arrh.
banatica W. et K. = polyrrhiza
cruciata Roxb. = trisulca
cyclostasa Ell. = minor
gibba L 151 (4)
globosa Roxb. = Wolffia arrhiza
intermedia Ruthe = trisulca
linearis Asch. et Græbn. (*trisulca*) A 39 (2 b)
major C. A. Mey. = polyrrhiza
minor L. 151 (3)
minuta H. B. et K. = minor
orbicularis Kit. = polyrrhiza
orbiculata Roxb. = prec.
polyrrhiza L. 150 (1)
thermalis P. B. = polyrrhiza
trichorrhiza Thuill. = gibba
trisulca L. 151 (2), A 39
vulgaris Lam. = gibba et minor
LENS = Vicia
abyssinica Alef. = V. Lens
Biebersteinii Lamotte = V. Marschalii
culinaris Medic. = V. Lens b. disperma
disperma Webb et Berth. = V. Lens
esculenta Mœnch = V. Lens (α)
Lenticula Alef. = V. Lenticula
lentoides Webb et Berth. = V. lentoid.
LENS = Vicia
monantha Mœnch = V. multifida
nigricans Godr. = V. Marschalii
Nummularia Alef. = V. Lens
sativa Hell. = V. Lens
subsphærosperma Godr. (esculenta) = V. Lens b. disperma
Tenorei Lamotte = V. lentoides
uniflora Schur = V. Marschalii
vulgaris Delarb. = V. Lens
LENTICULA = Lemna
arrhiza Lam. = Wolffia arrh.
gibba Mœnch = L. gibba
minor Scop. = L. min.
polyrrhiza Lam. = L. polyrrh.
ramosa Lam. = L. trisulca
trisulca Scop. = L. tris.
vulgaris Lam. = L. minor
LENTISCUS = Pistacia
vulgaris Fourr. = P. Lentiscus
LEONTICE Leontopetalum L. 528 (nota)
LEONTODON III 395 (936)
alpester DC. (*hispid.*) 399 (8 δ)
alpester Heg. (autumn.) = aut. f. Taraxaci
alpester Tausch p. p. = Taraxacum alpin.
alpicolus Chen. (*opimus*) A 217 (8 β c)
alpinus Arc. (autumn.) = aut. f. Taraxaci
alpinus Guss. = Taraxac. apennin.
alpinus Jacq. = opimus
alpinus Stev., Hpe. = Taraxac. alpin.
alpinus Vill. = incanus
anomalus Ball 402 (11 γ)
apenninus DC., Ten. = Tarax. apenn.
apulus Fiori (*crispus*) 401 (10 γ)
arcuatus Tausch = Taraxac. levigat.
asper Rchb. 401 (10 ε)
aurantiacus Rchb. = croceus
aureus L. = Crepis aur.
Autrani Chaberi 401 (10 θ)
autumnalis L. 397 (5), A 192
Berinii Roth, Rchb. 402 (12)
Berinii × *tergestinus Fiori* A 192
biscutellæfolius DC. 401 (10 β b)
biscutellæfolius Fiori = intermedius
breviscapus DC. (croceus) = seg.
breviscapus Fiori (*Tarax.*) 398 (6 β), A 192
Brumati Rchb. 400 (8 η)
bulbosus Tausch = Crepis bulb.
carnicus Fiori (*opimus*) 399 (8 β b)
caucasicus Rchb. (non Fisch.) = opimus
chondrillæfolius Scop. = hispidus
cichoraceus Boiss. 397 (4)
ciliatus Scop. = Hypochæris radicata

Digitized by Google

LEONTODON III 395 (936)
ciliatus N. Terr. = intermedius
corniculatus Kit. = Taraxac. cornic.
corymbosus Borkh. = Picris hierac.
crepidiformis Lam. = pyrenaic.
crispatus Godr. (proteiform.) = seg.
crispatus Griseb. 399 (8 α d)
crispus DC., Rchb., Koch etc. = pseudo-crispus
crispus Groves = apulus
crispus Vill. 400 (10)
crisp. × *incanus Kern.* A 192
croceus Fiori (*incano* × *tergest.*) A 192
croceus Hænke 398 (7 d)
danubialis Jacq. 400 (8 ζ)
De-Aquini Tin. = Crepis — De-Aquini
dentatus L. = Crepis pygmæa
dubius Rchb. 400 (8 ζ c)
erectus Hpe. = Taraxac. — Sturmii
erectus Mayer = Taraxac. paludosum
ericetorum Rchb. (*hispid.*) 399 (8 α c)
eriolænus DC. (*alpester*) 399 (8 δ b)
erytrospermus Eichw. = Taraxac. erytr.
fasciculatus Nym. = cichoraceus
finalensis Bicknell et Fiori (*tenuiflor.*) 402 (11 β b)
furcatus Levier (*pyren.*) 398 (7 c)
glaber Baill. = Hypochæris glabra
glaber Fiori (*hirtus*) 396 (2 α c)
glaber Gilib. = autumnalis
glaber Vis. (saxat.) = glabriusculus
glabratus Koch (hastil.) = danubialis
glabrescens Posp. (incanus) = subglabratus
grabriusculus Comolli (*crispus*) 401 (10 δ b)
glaucanthus Led. = Taraxac. cornicul.
glaucescens M. B. = Tarax. cornicul.
Gortanii Fiori A 192
Gortanii Fiori (anomalus) 402 (11 γ b) = prec.
Gouani Schleich. = pyrenaic. for., cfr. 399
Gussonii Spr. = Crepis — Gussonei
gymnanthus Lk. = Taraxac. minim.
hastilis L. = danubialis
hieraciodes DC. = Picris hierac.
hirtellus Arv.-T. (*pyren.*) A 192 (7 for.)
hirtus Leyss. = Leysseri
hirtus L. 396 (2), A 192
hirtus Vill. = Villarsii
hispidissimus Sendtn. (*hispid.*) 399 (8 α f)

LEONTODON III 395 (936)
hispidus Bert. = hispidus et crispus
hispidus L. 399 (8), A 192, 217
hispidus Scop. = crispus
hyoseroides Gib. et Pir. (hastil.) = Villarsii
hyoseroides Koch (hastil.) = seg.
hyoseroides Welw. 400 (8 θ)
incanus Schrank 402 (11)
incan. × *tergestinus Fiori* A 192
infestus Salisb. = Taraxac. officin.
intermedius Huter P. et R. 401 (10, ζ)
isocarpus Fiori (*tuber.*) 396 (8 d)
leiocephalus Neilr. (autumn.) = autumn. (α)
levigatus W. = Taraxac. levig.
Leysseri G. Beck 396 (2 α e)
Linkii Wallr. = pratensis
livens All. = Taraxac. paludos.
lividus W. et K. = Tarax. paludos. (a)
longifolius Fiori (*siculus*) 399 (8 γ b)
longiscapus Fiori (*Tarax.*) 398 (6 α b)
lucidus DC. 400 (8 θ b)
lyratus Fiori (*tuber.*) 396 (3 c)
macrorrhizus Steud. = biscutellæfol.
major DC. (*hispid.*) 399 (8 α b)
major Fiori (*hirtus*) 396 (2 α d)
minimus Briganti = Tarax. min.
monocephalus Neilr. (autumn.) = aut. f. Taraxaci
montanus Lam. = Taraxaci Lois.
mucronatus Forsk. = Launæa resedifol.
Mulleri Ball 396 (1)
nigricans Kit. = Taraxac. alpin.
nudicalyx Fiori (*hirtus*) 396 (2 α b)
obliquus Fr. = Taraxac. erytrosperm.
obovatus W. = Tarax. obov.
officinalis J. F. Gm., With. = Taraxac. offic.
Oliverii Fiori (*tuber.*) 396 (3 b)
opimus Bischoff (*hispid.*) 399 (8 β), A 217
opimus Koch (hastil.) = prec.
paludosus Vitm. = Taraxac. palud.
paluster Sm. = prec.
pedemontanus Chabert (*Tarax.*) 398 (6 γ)
pinnatifidus Ball = Hypochær. pinn.
pinnatifidus Fiori (*hispid.*) 399 (8 α e)
pinnatifidus Koch (*pyren.*) 398 (7 b)
pinnatifidus Saut. (hastil.) = hyoseroides
Pollinii Welw. = croceus

LEONTODON III 395 (936)
pratensis Lam. = crispus (α)
pratensis Rchb. 397 (5 β), A 192
Preslii DC. = intermedius?
proteiformis Vill. = hispidus
pseudo-crispus Nym. = seg.
pseudo-crispus Sch. Bip. (*hispid.*) 399 (8 ε)
pyrenaicus Gouan 399 (7), A 192
radiatus Lam. = Hyoseris radiata
radicatus Baill. = Hypochæris radic.
Raii Gouan = Taraxac. palud.
ramosus Goir. (*hispidus*) A 192 (8 α g)
recognitus Monn. 400 (8 ζ b)
repandus Fiori (*apulus*) 401 (10 γ b)
Reuteri DC. (*autumn.*) 397 (5 β b)
Rosani DC. 400 (9 β)
Rothii Ball 396 (2 β)
runcinatus Gilib. = Taraxac. offic.
runcinatus Kittel (*autumn.*) 397 (5 α b)
salinus Pollich = Taraxac. palud. (α)
saxatilis Lam. = hirtus
saxatilis Rchb. 401 (10 β)
Scorzonera Roth = Taraxac. paludosum
siculus Nym. 399 (8 γ)
squamosus Lam. = pyrenaic.
subglabratus Fiori (*incanus*) 402 (11 α b)
subincanus Fiori = incano × tergestin.
Taraxaci Lois. 398 (6), A 192
Taraxaci Nym. (*autumn.*) 397 (5 β c)
taraxacoides Hpe. = Taraxac. levigat.
taraxaconoides Vand. = hirtus
Taraxacum L. = Taraxac. offic.
Taraxac. δ Huds. = Taraxac. paludosum
Tenorii Nym. = alpester
tenuiflorus DC., Rchb. 402 (11 β)
tenuiflor. × *hastilis* A 192
tenuifolius Hpe. = Taraxac. tenuif.
tenuisectus Chen. (autumn. v. alp.) = seg.
tenuisectus Fiori (*pratensis*) A 192 (5 β d)
tergestinus Fiori (*crispus*) 401 (10 δ)
tergloviensis Hacq. = Crepis tergl.
tuberosus L. 396 (3)
tulmetinus Fiori = Berinii × tergestin.
trichocephalus Neilr. (autumn.) = pratensis
umbellatus Schrank = Picris paleacea
Villarsii Lois. 400 (9)
vulgaris Kitt. = hispidus

Digitized by Google

LEONTODON III 395 (936)
vulgaris Koch (hastil.) = hispidus (α)
vulgaris Lam. = Taraxac. offic.
LEONTOPODIUM III 277 (882)
alpinum Cass. 277, A 185
dentatum Pamp. (*alpin.*) A 185 (α c)
nivale DC. (*alpin.*) 277 (β)
nivale Huet exs. = prec.
pygmæum Comolli (*alpin.*) 277 (α b)
umbellatum Bluff et Fing. = alpinum
LEONURUS III 37 (792)
campestris Andrz. = seg.
Cardiaca L. 37 (1)
crispus Murr. = prec.
Galeobdolon Scop. = Lamium Galeobd.
glabrescens Goir. (*Cardiaca*) 37 (1 c)
illyricus Hort. = Cardiaca
Marrubiastrum L. 38 (2)
neglectus Schrank = Cardiaca
parviflorus Salisb. = Marrubiastr.
ruderalis Salisb. = Cardiaca
villosus Desf. 37 (1 b)
LEOPOLDIA = Muscari
Calandriniana Parl. = M. Calandr.
comosa Parl. = M. comos.
Cupaniana Parl. = M. marit.?
graminifolia Heldr. = M. comosum
Gussonei Parl. = M. Gusson.
Holzmanni Heldr. = M. Holzm.
maritima Parl. = M. mar.
pyramidalis Heldr. = M. pyr.
tenuiflora Heldr. = M. tenuifl.
LEPIA = Lepidium
Bonanniana Presl = L. nebrodense
campestris Desv. = L. camp.
hirta Desv. = L. hirtum
sativa Desv. = L. sativum
LEPICAUME = Crepis
albida Lap. = C. alb.
blattarioides Fourr. = C. blatt.
grandiflora Lap. = C. conyzæfolia
prunellæfolia Lap. ex DC. = C. pygmæa
spinulosa Lap. = Sonchus olerac.
tomentosa Lap. = Senecio — toment.
LEPICEPHALUS = Cephalaria
alpinus Lag. = C. alpina
inflexus Eichw. = Succisa austral.
leucanthus Lag. = C. leuc.
Succisa Eichw. = Succisa pratens.
syriacus Lag. = C. syr.
transylvanicus Lag. = C. trans.
LEPIDIUM I 465 (404)
affine Led. = latifolium
alpinum L. = Hutchinsia alp.
americanum Vell. = Coronopus didymus
anglicum Huds. = Coronopus didymus
LEPIDIUM I 465 (404)
apetalos Gilib. = ruderale
aristatum Lap. = campestre
arvense Mill. = Draba
Bonannianum Guss. = nebrodense
bonariense Mill. (non L.) = Coronopus didymus
Bursa-pastoris W. = Capsella B.-past.
calycotrichum Kunze = nebrodense
campestre Brot. = hirtum
campestre R. Br. 467 (9)
canescens Guss. (*nebrodense*) A 99 (3 β a)
cepeæfolium Rchb. = Thlaspi cepeæfol.
crassifolium N. Terr. (*Draba*) A 99 (1 b)
crispum Desv. = ruderale
cristatum Lap. = Coronopus procumb.
dhayense Munby = nebrodense
diandrum Medic. = Iberis
didymum L. = Coronopus didym.
Draba L. 466 (1), A 99
drabifolium St.-Lag. = prec.
exiguiflorum Clairv. = Iberis
fragrans W. = Alyssum marit.
fruticulosum Desv. = ruderale
glabrum Strobl (*nebrodense*) A 99 (3 β c)
glaucescens Fiori (*Iberis*) A 99 (5 δ)
glaucescens Gillot (graminifol.) = prec.
graminifolium L. 467 (5 c)
gramineum Lam. = Iberis
Gussonei Schrad. = nebrodense
Halleri Crantz = Hutchinsia alpina
heterophyllum Benth. = hirtum
hirtum DC. 466 (3), A 99
humifusum Req. 466 (2)
hyssopifolium Desv. = ruderale
iberideum Rouy et Fouc. 467 (5 b)
iberifolium St.-Lag. = Iberis
iberioides Desv. = ruderale
Iberis L. 467 (5), A 99
Iberis Schk. = virginicum
incisum A. Terr. (*sativum*) A 99 (8 b)
intermixtum Ten. = Iberis
lanceolatum Presl = gramin.
latifolium L. 466 (4)
Linnæi Crantz = Hutchinsia petræa
marginatum Lap. = Æthionema ovalifol.
nebrodense Guss. 466 (3 β), A 99
nudicaule L. = Teesdalea regularis
oxyotum DC. = humifusum
perfoliatum L. 467 (nota)
petræum L. = Hutchinsia petr.
Pollichii Roth = graminifolium
præcox DC. = virginicum
procumbens L. = Hutchinsia proc.
LEPIDIUM I 465 (404)
prostratum Savi = Coronopus didymus
pubescens Tin. (non Desv.) = nebrodense
pusillum Lam. = Hutchinsia procumb.
pygmæum Lois. = Thlaspi brevistylum
rosulatum Torn. = nebrodense
rotundifolium All. = Thlaspi rotundif.
ruderale L. 467 (6)
ruderale Ten. = Iberis
sativum L. 467 (8), A 99
scapiferum Wallr. = Teesdalia nudicaulis
semiglabrum Strobl (*nebrodense*) A 99 (3 β b)
squamatum Forsk. = Coronopus procumbens
stylosum Pers. = Nasturt. pyrenaic.
subulatum Lap. = ruderale
subulatum L. A 99
tetraspermum Duf. = Hutchinsia petræa
Thlaspi Roxb. = Thlaspi arvense
triandrum Stokes = virginicum
umbellatum Mar. = quid?
virginicum L. 467 (7), A 99
LEPIDOSERIS = Crepis
taraxacifolia Fourr. = C. taraxacifolia
LEPIDOTHECA = Matricaria
suaveolens Nutt. = M. suav.
LEPIDOTIS = Lycopodium
incurva Opiz = L. inundatum
LEPIGONUM = Spergularia
arenarium Lge. (rubrum) = S. radicans
campestre Kindb. = S. atheniensis
canadense F. et M. = S. media
caninum Leffl. = S. marina
diandrum Fr. = S. diandra
diandrum Kindb. = S. atheniensis
glanduloso - pubescens Schur (medium) = S. urbica
halophilum F. et M. = S. urbica
heterospermum Delic., Guss. = S. media
heterospermum Schur = S. marina
macrorrhizon Nym. = S. macrorrhiza
marginatum Koch = S. media
marinum Whlnb., Fr. = S. media
medium Whlnb., Fr. = S. marina
melanospermum Lge. = S. diandra
murale Kindb. (trachysperm.) = S. mur.
neglectum Kindb. = S. marina
radicans Kindb. = S. radic.
rubrum Whlnb. = S. rubra
rupestre Kindb. = S. rupicola
rupicolum Bab. = S. rupicola
salinum G. Don = S. marina

Digitized by Google

LEPIGONUM = Spergularia
salsugineum F. et M. = S. diandra
segetale Koch = S. seget.
urbicum Leffl. (caninum) = S. urb.
LEPTASEA = Saxifraga
aizoides Haw. = S. aiz.
mutata Fourr. = S. mut.
LEPTERANTHUS = Centaurea
hygrometricus Cass. = C. phrygia
incoronatus Cass. = C. flosculosa
pectinatus Fourr. = C. pectinatus
LEPTOCARPÆA = Sisymbrium
Lœselii DC. = S. Lœselii
LEPTOCHLOA = Dinebra
arabica Kth. = D. retroflexa
LEPTOSILENE = Silene
inaperta Fourr. = S. inap.
LEPTRINA = Montia
autumnalis Raf. = M. fontana
LEPTURUS I 103 (124)
compressus Steud. = filiformis
curvatissimus Asch. et Græbn. (incurv.) = incurvat. (α)
cylindricus Trin. 103 (2), A 31
fasciculatus Trin. = Hemarthria fasc.
filiformis Trin. 103 (1 β), A 31
gracilis Asch. et Græbn. (*incurv.*) A 31 (1 β b)
gracilis Crép. (filiform.) = prec.
incurvatus Trin. 103 (1), A 31
strictus Buchenau (incurv.) = filiformis
strigosus Dum. = filiformis?
subulatus Kth. = cylindricus
LERCHEA = Suæda
fruticosa Medic. = S. frutic.
obtusifolia Steud. = S. frutic.
LERCHENFELDIA = Deschampsia
cuprina Schur = D. montana
flexuosa Schur = D. flexuosa
LERESCHIA = Cryptotænia
Thomasii Boiss. = Cr. Thom.
LEROUXIA = Lysimachia
nemorum Mérat = L. nem.
LEUCANTHEMUM = Chrysanthemum
alpicolum Gremli (vulg.) = Ch. Gaudini
alpinum Lam. = Ch. alpinum
asperulum N. Terr. (vulg.) = Ch. — asperul.
atratum DC. = Ch. montanum (a)
ceratophylloides Nym. = Ch. cerat.
Chamæmelum Lam. = Matricaria Chamom.
coronopifolium Vill., Gr. et Godr. = Ch. coronop.
corsicum DC. = Ch. ceratophyll. (α)
corymbosum Gr. et Godr. = Ch. corymb.
Delarbrei Timb. = Ch. Leuc. d. coronopifol.
Fontanesii Boiss. et Reut. = Ch. discoideum
LEUCANTHEMUM = Chrysanthemum
graminifolium Lam. = Ch. graminifol.
Gussonei Nym. = Ch. — tridactylites
heterophyllum DC. = Ch. heterophyll.
hirsutum Hartm. (vulg.) = Ch. — hispidum
incisum Arc. (vulg.) = Ch. Leuc. d. coronopifol.
laciniatum Huter P. et R. = Ch. — lacin.
lanceolatum DC. = Ch. heterophyll.
latifolium DC. = Ch. — latifol.
latifolium N. Terr. = Ch. pallens?
lobulatum Levier = Ch. — lobulat.
maximum Auct. it. p. p. = pallens. et heterophyll.
maximum DC. = Ch. maxim.
minimum Vill. = Ch. min.
montanum DC. = Ch. — saxicolum
odoratum Dulac. = Ch. Parthenium
pallens DC. = Ch. pallens
pallens Sarato hb., Bourg. exs. = Ch. — Saratoi
Parthenium Gr. et Godr. = Ch. Parth.
pilosum A. Terr. (vulg.) = Ch. — hispidum
pinnatifidum Lec. et Lam. (vulg.) = Ch. Leuc. d. coronopifol.
subglaucum De Laramb. 640 (nota)
subpinnatifidum Bruegg. (vulgare) = Ch. Leuc. d. coronopifol.
tridactylites Kern. et Huter = Ch. — tridact.
virgatum Clos. = Ch. discoideum
vulgare Lam. = Ch. Leucanthem.
LEUCE = Populus
alba Opiz = P. alba
canescens Opiz = P. canesc.
LEUCODONIUM = Cerastium
arvense Opiz = C. arv.
LEUCOGLOCHIN = Carex
pauciflorus Heuff. = C. pauc.
LEUCOJUM = Matthiola
incanum Mœnch = M. inc.
LEUCOJUM I 212 (213)
æstivum L. 212 (1), A 208
æstivum Moris = pulchellum
autumnale Balb. = hiemale
autumnale L. 213 (4)
biscapum Asch. et Græbn. (vern.) = seg.
dianthum Fiori (*vern.*) A 208 (2 b)
Hernandezianum R. et S. = seg.
Hernandezii Camb. = pulchellum
hiemale DC. 212 (3)
longifolium F. Gay 213 (5)
nicæense Ard. = hiemale
LEUCOJUM I 212 (213)
pulchellum Salisb. 212 (1 β)
roseum Lois. 213 (4 β)
trichophyllum Rchb. (non Brot.) = longifol.
uniflorum Goir. (*æstiv.*) A 208 (1 α b)
vernale Salisb. = seg.
vernum L. 212 (2), A 208
LEUCOLINUM = Linum
tenuifolium Fourr. = L. ten.
LEUCONOE = Ranunculus
alpestris Fourr. = R. alpestr.
crenatus Fourr. = R. cren.
magellensis Fourr. = R. mag.
Trauffelneri Fourr. = R. Trauff.
LEUCONYMPHÆA = Nymphæa
alba O. Ktze. = N. alba
LEUCORCHIS = Gymnadenia
albida E. Mey. = G. albida
LEUCOSEDUM = Sedum
album Fourr. = S. alb.
dasyphyllum Fourr. = S. das.
hirsutum Fourr. = S. hirs.
LEUCOSERIS = Senecio
maritimus Fourr. = S. Cineraria
LEUZEA = Centaurea
conifera DC. = C. conifera
LEVISTICUM II 173 (568)
officinale Koch 174
paludapifolium Asch., Rchb. f. = offic.
vulgare Rchb. = offic.
LIBANOTIS = Seseli
annua Crantz = Athamantha cretens.
athamanthoides DC. = S. — daucifolium
athamantica Gærtn. M. et S. = S. Libanotis
cretensis Gærtn. = S. Libanotis
cretensis Scop. = Athamantha cret.
daucifolia Rchb. = S. — daucifol.
daucoides Scop. = S. Libanotis
Daucus-creticus Crantz = prec.
hirsuta Lam. = Athamantha cretensis
italica Crantz = prec.
macedonica Crantz = Athamantha mac.
Matthioli Bert. = Athamantha Matth.
montana Crantz, All. = S. Libanotis
rigida Crantz = quid?
Riviniana Scop. - S. Libanotis
rupestris Scop. = Athamantha Matthioli
sicula Crantz, Bert. = Athamantha sic.
Turbith Crantz = Athamantha Matth.
vulgaris DC. = S. Libanotis
LIEBICHIA = Ribes
alpina Opiz = R. alpinum
LIGUSTICUM II 171 (564)
adonidifolius Rouy et Cam. = Meum adon.
alpinum Spr. = Bunium alpinum

Digitized by Google

LIGUSTICUM II 171 (564)
Angelica Stokes = Angel. Archangel.
apiifolium Desf. = seg.
apioides Lam. = Cnidium silaifol.
aquilegifolium W. = Physosperm. aquileg.
athamanthoides Spr. = Seseli — daucifolium
athamanthoides Ten. = Seseli — samniticum
austriacum Jatta = Hladnikia Golaka
austriacum L. = Pleurospermum austr.
balearicum L. = Kundmannia sicula
Braucionis Schrank = Molopsperm. peloponn.
Bulbocastanum Crantz = Bunium Bulb.
capillaceum Lam. = Meum athamanticum
carniolicum Host = Hladnikia Golaka
Carvi Roth = Carum Carvi
Carvifolia Caruel = Selinum carvifol.
Cervaria Spr. = Peuced. Cerv.
cicutaefolium Vill. = Cnidium silaifol.
cicutarium Lam. = Molopsperm. peloponn.
cornubiense L. = Physosperm. aquilegifol.?
corsicum J. Gay 171 (1), A 152
cuneifolium Guss. = pyrenæum (α)
cynapiifolium Viv. A 152 (2 bis) = Laserpit. cynap., cfr. A 214
cyprium Spr. 172 (4)
decussatum Mœnch = Peuced. carvifol.
ferulaceum All. 171 (2)
Fœniculum Roth = Fœnicul. vulg.
garganicum Ten. = Laserpit. gargan.
Gmelini Vill. = Pleurosperm. austriacum
græcum DC. = cyprium
Hacquetii Guss. = Hladnikia Golaka
hirsutum Crantz = Chærophyll. hirs.
Kochianum Rouy et Cam. A 152 (3 β)
Levisticum L. = Levist. offic.
Lobelii Re = Physosperm. aquilegifol.
Lobelii Vill. = Cnidium silaifol.
lucidum Mill. = pyrenæum
Meum Crantz, All. = Meum athamant.
minus Lam. = Cnidium Monnieri
Monnieri Calestani = Cnidium Monn.
Mutellina Crantz, All. = Meum Mut.

LIGUSTICUM II 171 (564)
mutellinoides Vill. = Pachypleurum simplex
nodiflorum Vill. = Trochiscanthes nod.
nodosum W. = Ferula nod.
peloponnense Lam., Vill. = seg.
peloponnesiacum L. = Molopsperm. pelop.
Phellandrium Crantz = Œnanthe aquat.
Podagraria Crantz = Ægopod. Pod.
pyrenæum All. = Kochianum?
pyrenæum Gouan 171 (3), A 152
resinosum Guss. = Bonannia græca
Retzii Vitm. = quid?
saxifragum Boiss. et Spr. = cyprium
Seguieri Caruel (pyren.) = Kochianum
Seguieri Koch 172 (3 β) = Kochianum, cfr. A 152
Seguieri Vill. = ferulaceum
silaifolium Gaud. = Cnidium silaifol.
Silaus Vill. = Silaus flavescens
simplex All. = Pachypleurum simpl.
Sprengelii Sieb. = Hladnikia Golaka
tenuifolium Salisb. = Physosperm. aquilegifol.
vaginatum Spr. = Pleurosperm. austriac.
LIGUSTRUM II 339 (695)
angustifolium Gilib. = vulgare
italicum Mill. 339 (1 b)
japonicum Thunb. 339 (2)
Kellerianum Vis. = japonicum
lucidum Ait. 339 (2 b)
Roxburghii Blume = lucidum
vulgare L. 339 (1)
LILAC = Syringa
suaveolens Gilib. = seg.
vulgaris Lam. = S. vulg.
LILIAGO = Anthericum
ramosa Presl = A. ramos.
vulgaris Presl = A. Liliago
LILIASTRUM = Paradisia
album Lk. = P. Liliastrum
LILIUM I 182 (185)
albiflorum Goir. (*Martagon*) A 206 (3 α b)
angustifolium Mill. 183 (4 α b)
angustifolium N. Terr. (*bulbiferum*) 182 (2 b)
bulbiferum DC. = croceum
bulbiferum L. 182 (2)
candidissimum Friv. = candidum
candidum L. 182 (1)
carniolicum Bernh. 183 (4 β)
chalcedonicum L. p. p., Jacq. = carniolicum
croceum Chaix 182 (2 c)
glabrum Spr. = Martagon
humile Mill. = bulbiferum (for.)
Martagon L. 183 (3), A 45, 206
Martagon γ Pollini = albiflor.
pomponium L. 183 (4)

LILIUM I 182 (185)
rubrum DC. = pomponium
scabrum Mœnch = bulbiferum
verticillatum Gilib. = Martagon
villosum Cavara = seg.
villosum Perona (*Martagon*) A 45 (3 β)
LIMBARDA = Inula
crithmifolia Raf. = seg.
crithmoides Dum. = I. crithm.
tricuspis Cass. = prec.
LIMNANTHEMUM II 359 (713)
nymphoides Hoffg. et Lk. 359
peltatum S. P. Gmel. = prec.
LIMNETIS = Spartina
pungens Rich. = Sp. stricta
LIMNIRIS = Iris
graminea Fuss. = I. gram.
Pseudo-Acorus Fuss. = I. Ps.-Acor.
sibirica Fuss. = I. sib.
LIMNOCHLOA = Scirpus
acicularis Rchb. = Heleochar. acic.
alpina Drejer = Eriophorum alpin.
alpina Rchb. = S. alp.
Bæothryon Rchb. = S. pauciflorus
cæspitosa Rchb. = S. cæsp.
multicaulis Rchb. = Heleochar. mult.
parvula Rchb. = S. parv.
pauciflora Peterm. = S. paucifl.
LIMNOCREPIS = Crepis
paludosa Fourr. = C. pal.
LIMODORUM I 251 (244)
abortivum Sw. 252
aphyllum Baumg. = Epipogium aphyllum
Epipogium Sw. = Epipogium aphyllum
sphærolabium Viv. = abortivum
LIMON = Citrus
vulgare Mill. = C. Medica
LIMONIASTRUM = Statice
articulatum Mœnch = S. monopetala
monopetalum Boiss. = S. monopetala
LIMONIUM = Statice
bellidifolium Dum. = S. bellid.
commune S. F. Gray = S. Limonium
confusum Fourr. = S. conf.
cordatum Mill. = S. cord.
echioides Mill. = S. ech.
minutum Fourr. = S. min.
monopetalum Hill = S. mon.
oleæfolium Mill. = S. oleæf.
reticulatum Mill. = S. ret.
siculum Mill. = S. monopetala
sinuatum Mill. = S. sin.
virgatum Fourr. = S. virg.
vulgare Mill. = S. Limonium
LIMONOSERIS = Crepis
biennis Peterm. = C. bienn.
LIMOSELLA II 432 (757)
annua Lindern. = seg.
aquatica L. 432
diandra Krock (non L.) = prec.
tenuifolia Wolf. = prec.

Digitized by Google

LINAGROSTIS = Eriophorum
alpina Scop. = E. alpinum
paniculata Lam. = E. latifol. et gracile
polystachya Scop. = E. polyst.
vaginata Scop. = E. vaginatum
LINARIA II 417 (751)
acutangula Ten. 418 (1 β)
æquitriloba Spr. 419 (5)
alba Mœnch = chalepensis
albiflora Goir. (*vulgaris*) 421 (13 α b)
albiflora Pasq. (*purpurea*) 424 (23 c)
albiflora Asch. (virgata) = pseudo-axiflora
alpina Mill. 422 (15)
alsinæfolia Spr. 425 (nota)
angustifolia Rchb. = italica
aparinoides Chav. = heterophylla
apennina Tausch = pallida?
arvensis Desf. 421 (12)
bellidifolia Dum.-Cours. = Simbuleta bellid.
Biancae Lojac. 420 (7 γ)
bipunctata Dum.-Cours. 425 (nota)
cærulea Chav. (*triphylla*) 423 (19 b)
cærulea Strobl (*reflexa*) 422 (17 c)
cærulescens Guss. (græca) = commutata
capraria Moris et DNtrs. 424 (24)
carnosa Mœnch = arvensis
Castelli Nic. (*reflexa*) 422 (17 d)
caulirrhiza Del. = rotundifolia?
chalepensis Mill. 424 (25)
chloræfolia Rchb. = genistifolia (α)
ciliata Bég. (*convolvulacea*) 420 (7 δ b)
ciliosa Lojac. (Prestandreæ) = stenotricha
cirrosa Dum.-Cours., W. 420 (10)
commutata Bernh. 420 (9)
concolor Guss. (triphylla) = cærulea Chav.
concolor Hausm. (*alpina*) 422 (15 α b)
convolvulacea Lojac. 420 (7 δ)
crinita Mabille = Biancæ?
cyanea Arc. (alpina) = concolor
Cymbalaria Mill. 418 (1), A 168
dalmatica Mill. 423 (20)
decumbens Mœnch = monspessulana
dentata Bég. (*Sieberi*) 419 (7 β c)
dentata Chav. (*spuria*) 420 (8 b)
dentata Guss. (Prestandreæ) = prec.
Elatine Mill. 419 (7)
elongata Dum. = vulgaris
filiformis Mœnch = supina
flava Desf. 422 (16), A 169
flaviflora Boiss., Caruel (arvens.) = simplex
fragrans Nic. (*reflexa*) 422 (17 e)
LINARIA II 417 (751)
genistifolia DC. = italica
genistifolia Mill. 423 (21), A 169
glabrata Guss. (Prestandreæ) = convolvulacea?
glabrata Sang. (*pilosa*) 418 (4 α b)
glauca Ait. = bipunctata
gracilior Caruel (purpurea) = litoralis
gracilis Chav. (*Pelisser.*) 421 (11 b)
gracilis F. G. Dietr. = prec.
græca Chav. = commutata
grandiflora Desf. = dalmatica
grandifolia Goir. (*Elatine*) 419 (7 α d)
hepaticæfolia Duby 418 (2)
heterophylla Desf. 423 (22)
humilis Chav. (rubrifolia) = rupestris
humilis Guss. 424 (22 β)
humilis Guss. (stricta) = prec.
inarimensis Guss. (*acutangula*) 418 (1 β b)
italica Trevir. 422 (13 β)
Jattæ Palanza = dalmatica
lanigera Lojac. (Prestandreæ) = Biancæ
lasiopoda Freyn = seg.
lasiopoda Vis. (Elatine) = Sieberi
laxiflora Desf. 422, A 169
Linaria Karst. = vulgaris
linifolia Chav. (*genistifol.*) 423 (21 β)
linifol. Rchb. = prec.
linifolia Roch. = italica
litoralis Caruel (*purpurea*) 424 (23 b), A 169
litoralis W. 425 (28 β)
major Bég. (*Sieberi*) 419 (7 β d)
major Freyn (lasiopoda) = prec.
major Goir. (*minor*) 425 (28 α a)
maritima DC. = supina
micrantha Spr. 421 (12 γ)
microphylla Chav. (spuria) 420 (8 c)
minor Desf. 425 (28)
minor Goir. (*Cymbal.*) 418 (1 α c), A 168
minor Goir. (*minor*) 425 (28 α b)
monspessulana Mill. 424 (26)
montana Caruel (*purpurea*) 424 (23 a)
Muelleri Moris 419 (6)
neglecta Guss. = triphylla
ochroleuca Strobl (reflexa) = Castelli
origanifolia DC. 425 (nota), A 169 (29)
Osyris Lk. = chalepensis
pallida Ten. 418 (3)
parviflora Desf. = micrantha
parvifolia Goir. (*Elatine*) 419 (7 α c)
pauciloba Benth. (pilosa) = Muelleri
Pelisseriana Mill. 421 (11)
Pellicerana Caruel = prec.
Pellicieriana Puel = prec.
LINARIA II 417 (751)
petræa Jord. 422 (15 β)
pilosa DC. 418 (4)
platyphyllos Goir. (*spuria*) A 168 (8 d)
Prestandreæ Tin. = Sieberi
Prestandreæ var. Levier = convolvulacea
pseudo-laxiflora Lojac. 423, A 168 (18)
pubescens Desf. = litoralis W.
pubescens Presl 419 (4 β)
pubescens Ten. = pallida
pubescens Torn. (Cymbal.) = pubesc.
pumila Chav. (*reflexa*) 422 (17 b)
purpurea Mill. 424 (23), A 169
reflexa Desf. 422 (17), A 169
repens W. (non Mill.) = monspessulana
robustior Caruel (purpurea) = purpur. (α)
rotundifolia Tin. (*commutata*) 420 (9 b)
rubrifolia Rob. et Cast. 425 (27)
rupestris Guss. 425 (27 b)
Seguieri Goir. (*Cymbal.*) 418 (1 α b)
Sieberi Rchb. 420 (7 β)
simplex DC. 421 (12 β)
Smithii Boiss. = dalmatica
speciosa Ten. 421 (13 α c)
spuria Freyn exs. = Sieberi d. major
spuria Mill. 420 (8), A 168
stenotricha Gandog. 419 (7 β b)
striata Dum.-Cours., DC. = monspessulana
stricta Guss. = heterophylla
stricta Posp. (*Elatine*) 419 (7 α b)
supina Desf. 422 (14)
Thuillieri Mér. = supina
triphylla Mill. 423 (19)
unicolor Gremli (alpina) = concolor
villosa Boiss. (Elatine) = Sieberi
virgata Desf. A 169
viscida Mœnch = minor
vulgaris Mill. 421 (13), A 168
LINDERNIA II 432 (758)
gratioloides Poir. = seg.
Pyxidaria All., L. 432, A 169
LINNÆA III 130 (827)
borealis L. 130
LINOPSIS = Linum
maritima Rchb. = L. mar.
LINOSTROPHUM = Chamælina
sativum Schrank = Ch. sativa
LINOSYRIS = Aster
anacamphthiphylla Ambrosi = A. — anac.
foliosa Cass. = A. Linosyris
minor Wallr. (vulg.) = A. — minor
palustris Ces. P. et G., Nym. = A. — palustr.
patula DC. (vulg.) = A. — patula
punctata DC. = A. acer
vulgaris Cass. = A. Linosyris

Digitized by Google

LINUM II 247 (628)
abyssinicum Hochstt. = gallicum
acuminatum Mœnch = angustifol. et narbonense
agreste Brot. = angustifol.
albiflorum Parl. (gallicum) 250 (10 b)
alpinum L. 248 (3 β), A 158
alternum Pers. (strictum) 250 (11 α b)
alternum Pieri = prec.
ambiguum Jord. 249 (4 β)
anglicum Mill. = perenne
angustifolium Huds. 249 (4 δ)
angustifolium Lge. (narbonense) 249 (5 c)
arvense Neck. = usitatissim.
aureum DC. = corymbulosum
aureum W. et K. = gallicum
austriacum DC. = alpinum
austriacum L. 248 (3 δ), A 158
axillare Gr. et Godr. (strictum) = spicatum
cæspitosum Pirona (tenuifol.) A 159 (7 α b)
campanulatum L. 251 (13 β), A 159
capitatum Guss. (strictum) 250 (11 α d)
capitatum Kit. 251 (13 γ), A 159
catanense Strobl 249 (5 d)
catharticum L. 247 (1)
cilicium Fenzl = tenuifol.
collinum Guss. 248 (3 η)
corymbulosum Rchb. 251 (11 β), A 159
crepitans Dum. = usitatissimum
cribrosum Rchb. 249 (4 γ)
crispum Steud. = salsoloides
cymosum Gr. et Godr. (strictum) 250 (11 α a)
decumbens Desf. 248 (2)
decumbens Moris = angustifol.
diversifolium Gilib. = catharticum
elatius Whlnb. (alpin.) = leve
exiguum Salisb. = Radiola linoides
flavum All. = campanulat.
flavum L. 251 (13), A 159
gallicum L. 250 (10)
gallicum S. et S. = corymbulosum
Galloi Sarato = corymbulosum
glandulosum Mœnch = flavum
grandiflorum Goir. (usitatiss.) A 158 (4 α b)
hirsutum All., DC. = viscosum
humile Mill. = angustifol.
Huteri Porta exs., Strobl = strictum (a)
imperforatum Strobl (angustifol.) = angustifol. (a)
inæquale Presl = spicatum
lactiflorum Rouy et Fouc. (tenuifol.) A 159 (7 α c)
latifolium Lge. (narbonense) 249 (5 b)
laxiflorum Gr. et Godr. (strictum) = alternum et corymbulos.

LINUM II 247 (628)
leve Rchb. = narbonense
leve Scop. 248 (3 β b)
liburnicum Parl. = corymbulosum
liburnicum Scop. = nodiflorum?, alternum?, corymbulosum?
luteolum M. B. = nodiflorum
marginatum Poir. = angustif.
marinum Suffren = seg.
maritimum L. 250 (8)
mauritanicum Pomel = punctatum
millegranum S. F. Gray = Radiola linoides
montanum Schleich. = leve
mucronatum Gilib. = usitatiss.
Muelleri Moris 250 (9)
multiflorum Lam. = Radiola linoides
narbonense All., Desf. = angustifol.
narbonense L. 249 (5), A 159
narbonense Suter = leve
nodiflorum L. 251 (12)
paniculatum Mœnch = narbonense
papulosum Genn. (austriac.) = collinum
perenne All. = leve
perenne Guss. = collinum
perenne Lam. = leve
perenne L. 248 (3), A 158
perenne Vill. = angustifol.
piliferum Presl = pubescens
pubescens Soland. 251 (nota)
punctatum Presl 248 (3 γ)
pyrenaicum Pourr. = angustifol.
Radiola L. = Radiola linoides
rigidum Sarato (non Pursh) = strictum
salsoloides Lam. 250 (7 β)
sardoum Muell. = Muelleri
sativum Hasselq. = usitatiss.
serrulatum Bert. = capitatum Kit.
sessiliflorum Lam. = strictum
siculum Presl 249 (4 ε)
silvestre Scop. = viscosum
spicatum Lam. 250 (11 α c)
strictum L. 250 (11), A 159
suffruticosum DC. (non L.) = salsoloides
tenuifolium L. 249 (7), A 159
tenuifolium ζ L. = angustifol.
tetrapetalum Gilib. = Radiola linoides
Tommasinii Rchb. 248 (3 ε)
trigynum L. = gallicum
usitatissimum L. 248 (4), A 158
utile Salisb. = prec.
verticillatum L. = quid?
viscosum L. 249 (6)
LIPANDRA = Chenopodium
atriplicoides Moq. = C. polysperm.
LIPARIS I 249 (237)
Loeselii Rich. 249
LIPPIA III 85 (809)
citriodora H. B. et K. 85 (*nota*)
nodiflora Rich. 85

LIPPIA III 85 (809)
repens Spr. 85 (b)
sarmentosa Spr. 85 (a)
LIQUIRITIA = Glycyrrhiza
officinalis Mœnch = G. glabra
officinarum Medic. = prec.
LISTERA I 250 (241)
cordata R. Br. 251 (2)
multinervis Peterm. = ovata
Nidus-avis Hook. = Neottia N.-avis
ovata R. Br. 251 (1)
LITHAGROSTIS = Coix
Lacryma-Jobi Gærtn. = C. Lacryma
LITHOSPERMUM II 367 (718)
affine Huter P. et R. (non DC.) = calabrum
angustissimum Ross (rosmarinifol.) 367 (1 b)
angustum Cald. (offic.) 368 (3 b)
apulum Vahl 368 (6), A 165
Arnebia Colla (non Del.) = Alkanna tinctoria
arvense L. 369 (8), A 165
cærulescens DC. (arvense) 369 (8 γ), A 165
calabrum Ten. 368 (5)
commutatum Bianca = Alkanna tinctoria
congestum N. Terr. (purp.-cærul.) 368 (4 b)
exsertum Fiori (rosmarinifol.) 367 (1 d)
fruticosum S. et S. (non L.) = rosmarinifol.
fruticosum Vitm., Biroli? = suffruticos.
Gasparrinii Heldr. 369 (8 α b)
glabrum Strobl (rosmarinif.) 367 (1 c)
graminifolium Viv. = suffruticosum
heliotropoides Forsk. = Heliotrop. supinum
incrassatum Guss. 369 (8 γ b)
Lehmanni Tin. = Alkanna tinctoria
longiflorum Salisb. = pur.-cærul.
majus Gilib. = officinale
medium Chev. = cærulescens
minimum Moris 368 (7)
minus Gilib. = arvense
monstrosum Caruel (arvense) = incrassatum
ochroleucum Stokes = offic.
officinale L. 368 (3)
permixtum Jord. = cærulescens
purpurascens Gueld. = seg.
purpureo-cæruleum L. 368 (4)
repens Stokes = prec.
Rochelii Friv. = arvense
rosmarinifolium Ten. 367 (1)
Splitgerberi Guss. 369 (8 β)
strigosum M. B. = apulum
suffruticosum A. Kern. 367 (2)
tenuiflorum Ces. P. et G. = minimum
tenuiflorum L. f. 368 (7 nota)
tinctorium L. = Alkanna tinct.
violaceum Lam. = purp.-cærul.

Digitized by Google

LITORELLA III 101 (815)
juncea Berg. = uniflora
lacustris L. = unifl.
uniflora Asch. 101
LLOYDIA I 183 (186)
alpina Salisb. = serotina
græca Endl. 183 (2)
serotina Rchb. 183 (1)
sicula Huet = græca
trinervia Coss. = græca
LOBARIA = Saxifraga
cernua Haw. = S. cernua
cuneifolia Haw. = S. cuneif.
hederacea Haw. = S. heder.
LOBELIA = Laurentia
Bivonæ Tin. = L. tenella
Laurentia L. = L. Michelii
minuta DC. (non L.) = seg.
tenella Biv. = L. tenella
LOBULARIA = Alyssum
halimifolia Steud. = A. halim.
maritima Desv. = A. marit.
rupestris Steud. = A. rupestre
LOCUSTA = Valerianella
communis Delarb. = V. olitoria
coronata Delarb. = V. coron.
echinata Delarb. = V. echin.
mixta Delarb. = V. dentata
LODICULARIA = Hemarthria
fasciculata Lk. = H. fasc.
fastigiata P. B. = prec.
LOEFLINGIA I 335 (323)
caspica S. G. Gmel. = Polycarpon diphyllum
hispanica L. 336
prostrata Mœnch = hispanica
LOGFIA = Filago
brevifolia Cass. = F. — brevif.
gallica Coss. et Germ. = F. gallica
lanceolata Cass. = F. — lanc.
montana Dum. = F. arvens.
minima Dum. = F. min.
spicata Pomel = F. heterantha
subulata Cass. = F. gallica
LOISELEURIA II 300 (663)
procumbens Desv. 300
LOLIUM I 103 (125)
album Asch. (temul.) = arvense
annuum Gilib. = temulentum
aristatum Caldesi (*siculum*) 104 (3 ε b)
aristatum Lag. = multiflorum
aristulatum Schur (*perenne*) 104 (3 α d)
arvense Guss. = Gussonei
arvense Schrad. = remotum
arvense With. A 31 (1 β)
Boucheanum Kth. 104 (3 γ c) = multiflorum, cfr. A 32
bromoides Huds. = Vulpia uniglumis
compactum Beck (perenne) = cristatum
compositum Fiori (perenne) 104 (3 β) = cristatum, cfr. A 32
compositum Thuill. A 32 (3 α for.)
cristatum Pers. 104, A 32 (3 β)
cylindricum Asch. et Græbn. = Lepturus cyl.
decipiens Dum. = arvense
LOLIUM I 103 (125)
festucaceum Lk. = Festuca elatior × Lol. perenne
Gaudini Parl. 104 (3 γ)
gracile Dum. = arvense
Gussonei Nym. = seg.
Gussonei Parl. (*temul.*) 100 (1 γ)
italicum A. Br. 104 (3 γ) = multiflor., cfr. A 32
linicola Sond. = prec.
linicolum A. Br. = remotum
leptochæton A. Br. (temul.) = arvense
lepturoides Boiss. 104 (2 β) = subulatum, cfr. A 32
lucidum Dum. = arvense
macilentum Delastre = strictum
macrochæton A. Br. (temul.) = temulent. (α)
Mayeri A. Br. = subulatum
maximum W. = arvense
multiflorum DC., Gaud. = Gaudini
multiflorum Guss. = siculum
multiflorum Lam. A 32, 204 (3 γ)
muticum Boiss. (temul.) = arvense
muticum DC. (*multiflor.*) A 204 (3 γ b)
muticum Fiori (*Gaudini*) 104 (3 δ c)
muticum Parl. (italic.) 104 (3 γ b) = seg., cfr. A 204
muticum Parl. (multiflor.) = Gaudini b. mutic.
nanum Paolucci = temulentum
oliganthum Gr. et Godr. (*temulent.*) A 31 (1 α b)
perennans Asch. et Græbn. (multifl.) = multiflor. (a)
perenne L. 104 (3), A 204
pseudo-linicola Genn. 103 (1 δ b)
ramosum Cocc. (italic.) 104 (3 γ d) = multiflor. b. ramos., cfr. A 204
ramosum Fiori (*Gaudini*) 104 (3 δ b)
ramosum Fiori (*multiflor.*) A 204 (3 γ d)
ramosum Guss., Parl. (multiflor.) = Gaudini b. ramos.
ramosum Guss. (temul.) = prec.
ramosum Sm. (*perenne*) 104 (3 α b)
remotum Schrank 103 (1 δ)
rigidum Gaud. 104 (2), A 31
robustum Rchb. 103 (1 β b)
romanum Sang. = Gaudini
rottbollioides Heldr. (rigidum) = subulatum
scabrum Koch (speciosum) = robustum
siculum Parl. 104 (3 ε)
speciosum Stev. in M. B. 103 (1 β) = arvense, cfr. A 31
strictum Presl A 31 (2 b)
submuticum Genn. (italic.) = seg.
submuticum Mutel (*multiflor.*) A 32 (3 γ c)
subulatum Vis. A 32 (2 β)
LOLIUM I 103 (125)
temulentum L. 103 (1), A 31
tenue Guss. = strictum
tenue L. 104 (3 α c)
tenue Noulet = remotum
triticoides Janka = arvense
vulgare Host = perenne
LOMARIA = Blechnum
Spicant Desv. = B. Spicant
LOMATOGONIUM = Pleurogyne
carinthiacum A. Br. = P. carinth.
LONAS III 270 (876)
inodora Gærtn. 270
LONICERA III 127 (826)
acutifolia Bég. (*implexa*) 127 (1 α d)
adenocarpa Guss. 127 (1 β)
alpigena L. 129 (8)
balearica Viv. 127 (1 α b)
biflora Desf. 128 (5)
cærulea L. 129 (9)
canescens Schousb = biflora
Caprifolium L. 128 (2)
dimorpha Tausch 129 (*nota*)
dumetorum Pers. = Xylosteum
etrusca Lej. = villosa
etrusca Santi, Savi 128 (3), A 176
germanica Dietr. = Periclymen.
glabra Nic. (*etrusca*) 128 (3 b)
implexa Ait. 127 (1)
japonica Thunb. A 176
latifolia Guss. = implexa
longifolia Guss. (*implexa*) 127 (1 α c)
macrophylla Arc. (*alpig.*) 129 (8 c)
nigra L. 129 (6)
ochroleuca St.-Lag. = Xylosteum
odora Salisb. = Periclymen.
pallida Host 128 (2 α b)
Periclymenum Gouan = etrusca
Periclymenum L. 128 (4)
præcox Colla (Caprif.) = pallida
pubescens Bég. (*alpig.*) 129 (7 b)
rubella Colla (*Caprif.*) 128 (2 α a)
rubra Gilib. = Xylosteum
sicula Ucria in Rœm. = Putoria calabr.
stabiana Guss. ex Pasq. 128 (2 β)
suavis Salisb. = Caprifolium
ternifolia Guss. (*implexa*) 127 (1 α e)
villosa Ten. (*Periclym.*) 128 (4 b)
Xylosteum L. 129 (7)
LOPHOCACHRYS = Hippomarathrum
echinophora Bert. = H. siculum
LOPHOCHLOA = Kœleria
phleoides Rchb. = K. phleoides
villosa Fourr. = K. pubescens
LOPHODIUM = Nephrodium
Callipteris Newm. = N. cristatum
collinum Newm. = N. dilatatum
glandulosum Newm. = prec.

Digitized by Google

LOPHODIUM = Nephrodium
multiflorum Newm. = prec.
rigidum Newm. = N. rigid.
spinulosum Newm. = N. spin.
LOPHOSCIADIUM = Ferula
Barrelieri Griseb. p. p. = F. silvatica
LORANTHUS I 287 (275)
europæus Jacq., L. 287, A 62
LOREIA = Campanula
baldensis Raf. = C. ramosissima
LORETIA = Vulpia
geniculata Duv.-Jouv. = V. genic.
incrassata Duv.-Jouv. = V. incr.
ligustica Duv.-Jouv. = V. lig.
setacea Duv.-Jouv. = V. set.
tenuis Wk. = V. tenuis
LOROGLOSSUM I 239 (229)
anthropophorum Rich. = Aceras anthr.
brachyglotte Rich. = Aceras anthrop.
hircinum Rich. 239
romanum Fiori (*hircin.*) 239 (b)
LOTUS II 71 (496)
Allionii Desv. = cytisoides
alpinus Schl. ex Ser. 72 (4 β)
angustifolius Gouan = seg.
angustissimus L. 72 (2), A 141
argenteus Brot. = Cytisus arg.
argenteus Salisb. = creticus
aristatus DC. = coimbrensis
arvensis Pers., Schk. 72 (4 α), A 141
biflorus Desr. 75 (11)
Bivoneus Guss. 74 (10 b)
brachyodon Boiss. (cornicul.) = alpinus
brevis St.-Am. (angustiss.) = hispidus
candidus Mill. = Dorycn. hirsut.
ciliatus Amo = coimbrensis
ciliatus Koch (*cornicul.*) 72 (4 α b)
ciliatus Ten. 72 (2 α e)
coimbrensis W. 71 (1), A 141
commutatus Guss. 73 (5 α b)
conimbricensis Brot. = coimbrensis
conimbricensis Guss. = granatensis
conjugatus Guss. = Gussonei
coniugatus L. p. p. 74 (9)
coniugatus Poir. = biflorus
corniculatus L. 72 (4), A 141
coronillæfolius Guss. 73 (5 β c)
Crantzii Vis. = Dorycn. herbaceum
crassifolius Pers. 72 (4 α d)
creticus L. 73 (5)
creticus S. et S. = cytisoides
cytisoides All. = creticus
cytisoides L. 73 (5 β)
decumbens Poir. 73 (4 γ)
diffusus Seb. et Maur. = hispidus
diffusus S. et S. = Sibthorpii
diffusus Sol. = angustissim. (α)
digitatus Lam. = Dorycn. suffrut.
LOTUS II 71 (496)
Dioscoridis All. = ornithopodioides?
Dorycnium L. = Dorycn. pentaphyllum
edulis L. 74 (8)
elatus Somm. (*angustiss.*) 72 (2 α c)
elatus Somm. (*hispid.*) 72 (2 β b)
erectus L. = siliquosus
glaber Rouy (*angustiss.*) 72 (2 α b)
glaberrimus DC. 71 (1 b)
glaberrimus Timb. (angustiss.) = glaber
glaucescens Presl = cytisoides (a)
glaucus Sieb. (non Ait.) = cytisoides
gracilis Salisb. = Dorycn. suffrut.
gracilis W. et K. = ciliatus Ten.
granatensis Strobl = seg.
granatensis Wk. et Lge. (*coimbrensis*) A 141 (1 c)
grandiflorus Rouy (*cornicul.*) A 141 (4 α h)
Gussonei Huet 74 (9 α)
guttatus Pomel = Requienii
hemorroidalis Lam. = Dorycn. hirsut.
hirsutus Koch (*cornicul.*) 72 (4 α c)
hirsutus L. = Dorycn. hirs.
hispidus DC. = parviflorus
incanus Lois. (hirsutus) = Dorycn. incan.
incanus Strobl (*angustiss.*) A 141 (2 α f)
lateralis Presl = quid?
latifolius Schur (*cornicul.*) A 141 (4 α g)
Levieri Heldr. 72 (2 α d)
Linnæi Wk. et Lge. (cytisoides) = cytisoides (a)
major Moris (angustiss.) = hispidus
major Sm. (an Scop.?) = uliginosus
maritimus Clav. (cornicul.) = crassifolius
maritimus L. 75 (12 b)
medius Rouy (angustiss.) = ciliatus Ten.
microcarpus Brot. = parviflorus
microphyllus Presl (cytisoides) = coronillæfolius?
minor Rouy (*cornicul.*) A 141 (4 α d)
oligoceratos Desf. = edulis
oligoceratos Scop. = angustiss.
ornithopodioides L. 73 (6), A 141
paluster Ten. = uliginosus?
paluster W. = ciliatus Ten.
parviflorus Desf. 72 (3)
parvifolius Rouy (*cornicul.*) A 141 (4 α f)
patens Presl 73 (5 β b)
pedunculatus Cav. 73 (4 δ), A 141
pentaphyllos Gilib. = cornicul.
LOTUS II 71 (496)
pilosissimus Poir. = hispidus
pilosissimus Rouy (*cornicul.*) A 141 (4 α e)
pilosus N. Terr., Gremli (corniculatus) = hirsutus
pratensis Mill. = siliquosus
Preslii Ten. 73 (4 ε b)
prostratus Desf. = cytisoides
pusillus Medic., Viv. 74 (7)
rectus L. = Dorycn. rectum
Requienii Lojac. = Gussonei
Requienii Mauri 74 (9 β)
rubriflorus Lamotte (*cornicul.*) A 141 (4 α i)
secundiflorus Viv. = cytisoides
sericeus DC. = Dorycn. incanum
sericeus Mœnch = creticus
Sibthorpii Rouy (*decumbens*) 72 (4 γ b)
siliquosus L. 75 (12)
subbiflorus Lag. = angustiss. (α)
tenuifolius L. (*cornicul.*) 73 (4 ε)
tenuifolius Presl = Preslii
tenuifol. Rchb. = cornic. ε tenuifol.
tenuis W. et K. = tenuifolius
Tetragonolobus L. 74 (10)
tetrapterus Stokes = prec.
tomentosus Rhode (an Desr. in Lam.?) = Dorycn. incanum
uliginosus Schk. 73 (4 ζ)
uniflorus Gillot (*parviflor.*) 72 (3 b)
varians Desv. = creticus
versicolor Tin. 72 (4 α e)
villosus Forsk. (non Burm.) = pusillus
villosus Thuill. 73 (4 ζ b)
LOUICHEA = Pteranthus
cervina L'Hér. = P. dichotomus
Pteranthus L'Hér. = prec.
LUCIOLA = Luzula
LUDWIGIA II 133 (529)
apetala Walt. = palustris
nitida Michx. = palustris
palustris Ell. 133
LUNARIA I 459 (395)
alpina Berger. = rediviva
annua L. 459 (1), A 98
argentea All. = Alyssum arg.
biennis Mœnch = annua
canescens W. = Fibigia clypeata
clypeata All. = Fibigia clyp.
flagrans Gilib. = rediviva
halimifolia All. = Alyssum halimifolium
inodora Lam. = annua
lanceolata Stokes = rediviva
odorata Lam. = rediviva
ovalis Stokes = annua
perennis C. C. Gmel. = rediviva
rediviva L. 459 (2)
Ricotia Gærtn. (non Desv.) = rediviva
LUPINASTER = Trifolium
alpinus Presl = T. alp.
uniflorus Presl = T. unifl.

Digitized by Google

LUPINUS II 9 (480)
albus L. 10 (2)
angustifolius DC. = reticulat.
angustifolius L. 10 (1)
Bivonii Presl = Termis
Cosentini Guss. 11 (8 β b)
cryptanthus Shuttlew. 10 (1 γ)
digitatus Forsk. 11 (8 β)
Douglasii Guss. (non Agardh) = micranthus
Gussoneanus Agardh = micranthus
hirsutus L. 11 (4), A 185
hirsutus Sieb. = digitatus
linifolius Roth 10 (1 β)
luteus L. 11 (5), A 185
micranthus Guss. 11 (4 β), A 185
minor Lojac. (hirsutus) = micranthus
odoratus Hort. = luteus
pilosus Murr. 10 (8)
prolifer Desr. = Termis
reticulatus Desv. 10 (1 β b)
Termis Forsk. 10 (2 β)
varius Auct. (an L?) = pilosus
varius Salis = hirsutus
varius Savi = angustifol. (α)
LUPSIA III 379 (920)
alata Fiori (Galact.) 379 (α b)
albiflora Fiori (Galact.) 379 (α d)
cærulea Fiori (Galact.) 379 (α c)
elegans Fiori (Galact.) 380 (β)
Galactites O. Ktze. 379
LUPULARIA = Medicago
parviflora Opiz = M. Lupulina
LUPULINA = Medicago
aurata Noulet = M. Lupulina
LUPULUS = Humulus
amarus Gilib. = H. Lupulus
communis Gærtn. = H. Lupulus
Humulus Mill. = H. Lupulus
scandens Lam. = H. Lupulus
LUSEKIA = Salix
laurina Opiz = S. pentandra
LUTEOLA = Reseda
australis Webb. (tinctor.) = R. — austral.
resedoides Fuss. = R. Luteola
tinctoria Webb et Berth. = R. Luteola
LUZULA I 170 (176)
alba Parl. (silvat.) 171 (5 α b)
albida DC. 171 (6 δ) = nemorosa, cfr. A 44
albida Pucc. = pedemontana
Allionii E. Mey. (spadicea) = spadicea (α)
alpestris Celak. (campestr.) = sudetica
alpigena Schur = cuprina
alpina Gaud. (campestr.) = seg.
alpina Hpe. A 44 (7 δ b)
angustifolia Celak. (maxima) = Sieberi
angustifolia Goir. (vernalis) = piloso × Forsteri ?
angustifolia Wend. (non Poir.) = nemorosa
atrifusca Asch. et Græbn. (Forsteri) A 206 (1 β b)
LUZULA I 170 (176)
Borreri Bromf. = Forsteri × pilosa
calabra Ten. 172 (7 ε)
campestris DC. 172 (7), A 44
colorata E. Mey (albida) = cuprina
compacta E. Mey. (spicata) A 206 (8 c)
congesta Bouvier (silvat.) = conglobata
congesta Lej. 172 (7 γ)
conglobata Fiori (silvat.) A 206 (5 γ)
conglobata Goir. (maxima) = prec.
conglomerata Koch (spicata) A 44 (8 c) = compacta, cfr. A 206
cuprina Roch. A 44 (6 δ b)
decolor Webb et Berth. = Forsteri
depauperata R. Beyer = spicato × sudetica
erecta α Desv. = multiflora
erythranthema Wallr. (albida) = cuprina
flavescens Gaud. 170 (2), A 43
Forsteri DC. 170 (1 β), A 206
Forsteri × pilosa Buchen. A 43
fuscata Schur = cuprina
glabrata Desv. 171 (8 β), A 43
glabrescens Fiori (silvat.) A 206 (5 α b)
glabrescens Goir. (maxima) = prec.
glomerata Mielich. = compacta
gracilis Hpe. (spicata) = laxa
gracilis E. Mey. (nemorosa) = pedemontana
græca Guss. (non Kth.) = sicula
Hostii Desv. = flavescens
intermedia Baumg. = nemorosa
intermedia Nocc. et Balb. = silvatica
italica Parl. 172 (8 b)
Kochii Asch. et Græbn. (sudetica) = alpina
lactea De la Harpe = pedemontana
lactea E. Mey. 171 (6 β)
latifolia Goir. (vernalis) = pilosa (α)
laxa R. et S. (spicata) A 206 (8 d)
Lepetitiana R. Beyer = silvat. × pedemont.
leucanthema Asch. et Græbn. (nemorosa) = nemor. (a)
Levieri Asch. et Græbn. = pedemont. × nivea
longibracteata Zapal. (spicata) = laxa
longistyla Celak. (campestr.) = campestris (α)
lutea DC. 171 (4)
maxima DC. = silvatica
maxima Guss. = sicula
minor Rchb. (spicata) = compacta
multiflora Lej. 172 (7 α b), A 44
LUZULA I 170 (176)
nemorosa E. Mey A 44 (6 δ)
nigricans Desv. = spicata et sudetica
nigricans Koch (multifl.) = sudetica
nigricans Pohl. = spicata
nivalis Koch (multifl.) = seg.
nivalis Whlnb. (campestr.) = alpina
nivea DC. 171 (6), A 44, 206
niveo × pedemontana Levier = ped. × nivea
nutans Duv.-Jouve 172 (9)
obtusata Steud. = spicata
pallens Asch. et Græbn. (multifl.) = pallida
pallescens Hpe. (1819) (non Bess.) = flavescens
pallescens Hpe. (1839) = pallida
pallida Parl. (multifl.) 172 (7 α c)
pallida Rota in Parl. (Forsteri) A 206 (1 β b)
pedemontana Boiss. et Reut. 171 (6 γ)
pedemontano × nivea Asch. et Græbn. A 44
pediformis DC. = nutans
pilosa W. 170 (1), A 43, 206
piloso × Forsteri Bég. A 43
rubella Garcke (nemorosa) = cuprina
rubella Hpe. 171 (6 δ b) = cuprina, cfr. A 44
rubella M. et K. (nivea) A 44 (6 α b)
rubescens Favr. (nivea) 171 (6 α b) = rubella, cfr. A 44
sicula Parl. A 43, 206 (5 β b)
Sieberi Tausch 171 (5 β), A 43, 206
silvatica Gaud. 171 (5), A 43, 206
silvatico × pedemontana R. Beyer A 44
spadicea DC. 171 (3), A 43
spicata DC. 172 (8), A 44, 206
spicato × sudetica? R. Beyer A 44
subpediformis Schur (spicata) = laxa
sudetica DC. 172 (7 δ), A 44
tenella Mielich. = pallida ?
Toniniana Goir. A 206 (6 α c)
uliginosa Gremli (multiflora) A 44 (7 b subf.)
vaginata Rchb. (spicata) = laxa
vernalis DC. = pilosa
vernalis Seb. et Maur. = Forsteri
versicolor Bluff et Fing. (albida) = cuprina
vulgaris Buchen. = campestris
LYCHNANTHOS = Cucubalus
scandens C. C. Gmel. = C. baccifer
volubilis S. Gmel. = C. baccifer
LYCHNIDIA = Lychnis
Cœli-rosa Pomel = L. Cœlirosa

Digitized by Google

LYCHNIS I 355 (338)
acaulis Scop. = Silene acaul.
Agrostemma Spr. = Agrost. Githago
alba Mill. 357 (8), A 73
albiflora Fiori (*Viscar.*) 356 (4 b), A 73
albiflora Peterm. (*Flos.-cuc.*) A 73 (3 α b)
alpestris L. f. = Silene alpestr.
alpina L. 356 (5)
angustifolia S. F. Gray = Viscaria
Armoraria Scop. = Silene Armeria
arvensis Gærtn., M. et S. = rubra
arvensis Schk. = alba
aspera Poir. A 73 (5 b)
baccifera Scop. = Cucubalus bacc.
Behen Scop. = Silene vulgaris
cerastioides Scop. = Silene gallica
clavata Mœnch = Cœli-rosa
coccugosantha St.-Lag. = Flos-cuc.
Cœli-rosa Desr. 357 (6), A 73
cœlestis St.-Lag. = Cœli-rosa
conica Scop. = Silene con.
coriacea Mœnch = Coronaria
Coronaria Desr. 356 (1)
Coronaria × Flos-Jovis Gürke 356 (nota)
corsica Lois. 357, A 211 (7 β)
Cyrilli Richter 356 (3 β), A 73
dioica Asso = divaricata
dioica α L. = rubra
dioica β et γ L. = alba
diurna Sibth. = rubra
divaricata Rchb. 357 (8 β), A 73
elatior Fiori (*corsica*) A 211 (7 β b)
Flos-cuculi L. 356 (3)
Flos-Jovis Desr. 356 (2)
Githago Scop. = Agrostemma Gith.
helvetica G. Don = alpina
inaperta Scop. = Silene inap.
incana St.-Lag. = Flos-Jovis
laciniata Lam. = Flos-cuculi
laciniflora Stokes = prec.
læta Ait. 357 (7), A 73, 211
læta Moris = corsica
leucantha Borb. (Flos-cuc.) = Flos-cuc. b. albiflora
levis Poir. A 73 (5 a)
lusitanica Mill. = Flos-cuculi
macrocarpa Boiss. et Reut. = divaricata
media F. et M. = Coron. × Flos-Jovis
neglecta G. Don. = Visc. b. albiflora
nicæensis DC. (Githago) = Agrostemma — nic.
noctiflora Schreb. = Silene noct.
nutans Scop. = Silene nut.
oculata Backh. = aspera
ocymoides Jessen = Saponaria ocym.
officinalis Scop. = Saponaria officin.
Otites Scop. = Silene Otites

LYCHNIS I 355 (338)
palustris Brot. = læta
parviflora Fiori (*Cœli-rosa*) A 73 (5 c)
parviflora Goir. (*alba*) A 73 (8 α c)
plumaria S. F. Gray = Flos-cuculi
pratensis Rafn = alba
Pumilio Scop. = Silene Pum.
pusilla Poir. = Cœli-rosa?
quadridentata Lucé = Flos-cuc.
quadridentata Murr. = Silene quadrifida
quadrifida Scop. = Silene quadr.
rosea Salisb. = rubra
rubra Pat., Mey. et Elk. 357 (9), A 73
rubra Weig. (dioica) = prec.
Saponaria Jessen = Sapon. officin.
saxifraga Scop. = Silene sax.
segetalis St.-Lag. = seg.
segetum Lam. = Agrostemma Githago
silvestris Hpe. = rubra
splendens Hort. = Viscaria
stenopetala Goir. (*alba*) A 73 (8 α b)
umbellifera Lam. = Flos-Jovis
Vaccaria Scop. = Saponaria Vacc.
vespertina Sibth. = alba
Viscaria L. 356 (4), A 73
viscosa Scop. = Silene visc.
vulnerata Scop. = Silene quinquevulnera

LYCHNITIS = Verbascum
alba Fourr. = V. album
Bœrhavii Fourr. = V. Bœrh.
lutea Fourr. = V. Lychnitis
nigra Fourr. = V. nigrum
pulverulenta Fourr. = V. pulverul.
sinuata Fourr. = V. sin.

LYCIUM II 398 (742)
afrum L. 398 (1)
arabicum Solla (non Schweinf.) = ramulosum
barbarum L. 399 (nota)
chinense Mill. 398 (3)
europæum Lam. = lanceolat.
europæum L. 398 (2)
lanceolatum Lois. 399 (3 γ)
mediterraneum Dun. = europ.
megistocarpum Dun. = ovatum et lanceolatum
ovatum Lois. 398 (3 β)
racemosum Fiori (*europ.*) 398 (2 α b)
ramulosum Dun. (*europ.*) 398 (2 β)
siculum Ucria in Rœm. = quid?
vulgare Dun. 399 (nota)

LYCOCTONUM = Aconitum
silvaticum Fourr. = A. Lycoct.

LYCOPERSICUM = Solanum
cerasiforme Dun. = S. Pseudo-Lycopersicum
Dulcamara Medic. = S. Dulc.
esculentum Mill. = S. Lycopersicum
Galeni Mill. = prec.

LYCOPERSICUM = Solanum
macrophyllum Guss. = S. — macrophyll.
piriforme Dun. = S. piriforme
Pomum-amoris Mœnch = S. Lycopersic.
Solanum Medic. = prec.
tuberosum Mill. = S. tuber.

LYCOPODIUM I 22 (27)
alpinum L. 23 (2), A 9
anceps Wallr. = complanat. (α)
annotinum L. 23 (4), A 9
appressum Desv. (Selago) = densum
brevifolium Warnst. (Selago) = densum
chamæcyparissus A. Br. 22 (1 β)
ciliatum Lam. = Selaginella spinosa
clavatum L. 23 (3), A 9
complanatum L. 22 (1), A 9
complanat. Pollich = Chamæcyparissus
cupressifolium Opiz = alpinum
densum Lam. A 9 (6 a)
denticulatum L. = Selagin. dentic.
flabellatum Dœll (complan.) = complan. (α)
helveticum L. = Selagin. helvetica
insubricum Ces. (complan.) = Chamæcypariss.
intermedium Sacc. (*complan.*) A 9 (1 b)
inundatum L. 23 (5)
juniperifolium Lam. = annot.
laxum Desv. (*Selago*) A 9 (6 b)
microstachyum Opiz = clavatum
monostachyum Desv. (*clavat.*) A 9 (3 b)
patens Desv. (*Selago*) A 10 (6 c)
pseudo-annotinum Schur = clavatum
pungens Desv. (*annot.*) A 9 (4 β)
radicans Schrank = Selagin. helvetica
sabinæfolium Hom. (non W.) = Chamæcyparissus
Selaginoides L. = Selagin. spinosa
Selago L. 23 (6), A 9

LYCOPSIS II 373 (723)
albiflora Ten. (*arvensis*) 373 (1 b)
ampullosa Gilib. = Nonnea pulla
arvensis L. 374 (1)
bullata Cyr. = variegata
crispa Bert. = Anchusa litorea
glomerata d' Urv. = Anchusa aggregata
hispidula Gandog. = arvensis
lutea Desr. = Nonnea setosa
microphylla Bert. = Nonnea ventricosa
nigricans Desr. = Nonnea vesicaria
obtusifolia W. = Nonnea obt.
pulla Bert. = Nonnea vesicaria
pulla L. = Nonnea pulla
setosa Lehm. = Nonnea setosa

Digitized by Google

LYCOPSIS II 373 (723)
Sibthorpiana R. et S. = Nonnea ventricosa
undulata Gilib. = arvensis
variegata L. 374 (2)
vesicaria L. = Nonnea vesic.
LYCOPUS III 70 (804)
alboroseus Gilib. = europæus
aquaticus Mœnch = prec.
canescens Goir. (europ.) = mollis?
elatior Lge. (*europ.*) 70 (1 a)
europæus L. 70 (1), A 174
exaltatus L. f. 70 (2)
exaltatus Pourr. = elatior
giganteus Evers (*europ.*) A 174 (1 for.)
glabrescens Schmid. (*europ.*) 70 (1 b)
hirsutus Gaud. (europ.) = pubescens?
humilis Goir. (*exalt.*) 70 (2 b)
lanuginosus Bolzon (europ.) = mollis?
menthæfolius Mab. = europæus
mollis Kern. 70 (1 e)
mollis Schmid. (europ.) = pubescens?
palustris Burm. f., Lam. = europæus
pubescens Benth. (*europ.*) 70 (1 c)
riparius Salisb. = europæus
trichophorus Briq. (*europ.*) 70 (1 d)
vulgaris Pers. = europæus
LYGEUM I 48 (40)
insulare Gandog. = seg.
spathaceum Lam. = seg.
Spartum L. 48, A 18
tenax Salisb. = prec.
LYGIA = Thymelæa
Passerina Fasano = Th. Passer.
pubescens C. A. Mey. = Th. — pubesc.
LYONNETIA = Anthemis
abrotanifolia Less. = A. cretica
montana Griseb. = A. mont.
muricata DC. = A. muric.
pusilla Cass. = A. cretica
LYSIAS = Platanthera
bifolia Salisb. = P. bifolia
LYSIMACHIA II 322 (681)
azorica Horn. = nemorum
eileta Lehm. = nemorum
elata Salisb. = vulgaris
glabra Cocc (*punctata*) 322 (2 b)
glabrata Fiori (*vulgar.*) 322 (1 b)
glauca Adams = vulgaris
guestphalica Weihe = vulgaris (for.)
linifolia Salisb. = Asterol. Lin.-stell.
Linum-stellatum L. = Asterolinum Lin.-stell.
lutea Jiraseck = vulgaris
media W. = verticillata
nemoralis Salisb. = nemorum
nemorum L. 323 (3)
Nummularia L. 323 (4)
paludosa Baumg. = vulgaris
paniculata Gilib. = vulgaris
LYSIMACHIA II 322 (681)
pumila Pœpp. = Anagallis tenella
punctata L. 323 (2)
quadrifolia Mill. = punctata
repens Stokes = Nummul.
rotundifolia F. W. Schm. = Nummul.
serpyllifolia Poir. = Asterol. Lin.-stell.
stellata St.-Lag. = prec.
suaveolens Schœnh. = Nummul.
tenella L. = Anagallis tenella
thyrsiflora Geners = vulgaris
tomentosa Presl = vulgaris
Trientalis Klatt = Trientalis europæa
verticillaris Spr. = punctata
verticillata M. B. 323 (2 c)
villosa F. W. Schm. = punctata
vulgaris L. 322 (1)
westphalica Weihe A 162 (1 c)
Zavadskii Wiesn. = Nummul.
LYTHRUM II 128 (527)
acuminatum W. = virgatum
acutangulum Lag. = Græfferi
adsurgens Greene = Hyssopifolia
alatum Presl (non Pursh.) = Preslii
alternifolium Lorey = Salicaria
altissimum Pomel = tomentosum
australe Kœhne (nummul.) = Peplis austr.
austriacum Jacq. = virgatum
bibracteatum Gr. et Godr. = tribracteatum (α)
bibracteatum Salzm. = Candollei
biflorum Gay = Peplis biflora
Bocconei Dégl. = Salicaria
Boræi Kœhne (nummul.) = Peplis Boræi
borysthenicum Kœhne (nummul.) = Peplis borysth.
bracteosum DC. (*Salic.*) A 146 (1 α d)
Candollei Kœhne (*tribract.*) A 146 (5 β)
canescens Presl, Guss., Koch (Salic.) = tomentosum
Cashmerianum Royle = Salicaria
cinereum Griseb. = tomentos.
coronense Schur = Salicaria
dibracteatum Guss. = tribract.
diffusum Sweet = Salicaria
divaricatum Schur = virgatum
dubium Schult. 128, A 146 (1 α b)
elegans Schur = virgatum
erectum Kœhne (nummul.) = Peplis erecta
flexuosum Lag. = Græfferi
geminiflorum Bert. = thesioides
glaucum Dulac = Hyssopifolia
Græfferi Lodd. = Hyssopifolia (α)
Græfferi Ten. 129 (3), A 146
gracile DC. A 146 (1 β a)
gracile Zersi (*Salic.*) A 146 (1 α c)
LYTHRUM II 128 (527)
Gussonei Presl = Græfferi (α)
hamulosum Kœhne (nummul.) = Peplis — hamul.
hexagonum Bercht. = Salicaria
Hyssopifolia L. 129 (4), A 146
Hyssopifolia L. hb. = Græfferi
Hyssopifolia Moris p. p. = Thymifol.
junceum Sol. in A. Russ. = Græfferi
Loiseleurii Rouy et Cam. = — Peplis nummulariæfol.
longistylum Koch (Salic.) = gracile DC.
maculatum Boiss. et R. = Græfferi
major DC. (Thymifol.) = Candollei
minimum Moris ex Gr. et Godr. (Hyssop.) = Thymifolia
nummulariæfolium Lois. = Peplis numm.
nummulariæfolium Pers. = Salicaria
oblongum Kœhne (*Salic.*) A 146 (1 β b)
oppositifolium Kœhne (nummul.) = Peplis — opposit.
palustre Salisb. = Salicaria
parviflorum Bast. ex Rchb. = Hyssopifolia
Preslii Guss. 129 (3 β)
propinquum Weinm. = Salicaria
pubescens Sweet = Salicaria
pumilum Evers (Salic.) = gracile Zersi
puniceæfolium Ch. et Schl. = Græfferi
Purshianum Steud. = Salicaria
Salicaria L. 129 (1), A 146
Salzmanni Jord. A 146 (5 α)
spicatum S. F. Gray = Salicaria
spiciforme Dulac = Salicaria
tenellum Thunb. = Hyssopifolia
thesioides M. B. 129 (nota), A 146
Thymifolia All. = Græfferi
Thymifolia L. p. p. 129 (4 β), A 146
Thymifolia L. p. p., Guss., Bert. = Candollei
thymifolium S. et S. = tribracteatum (α)
tomentosum Mill. 128, A 146 (1 β)
tribracteatum Salzm. 129 (5), A 146
virgatum L. 129 (2), A 146
virgatum Gib. et Pir. = Salicaria
MACROPODIUM = Brassica
elongatum Schur = B. elong.
MACROSEMA = Astragalus
Onobrychis Stev. = A. Onobr.
MADARIA
elegans DC. 303 (nota)
MAGYDARIS II 205 (602)
pastinacea Paol. 205
tomentosa Koch = pastinac.

Digitized by Google

MAILEA = Phleum
sardoa Hack. (crypsoides) = Ph. sardoum
MAJANTHEMUM I 207 (205)
bifolium Desf. 207
Convallaria Weber = bifolium
cordifolium Mœnch = bifolium
MAJORANA = Origanum
fragrans Raf. = seg.
hortensis Mœnch = O. Majorana
Onites Benth = O. Onites
vulgaris S. F. Gray = O. Majorana
MALABAILA = Hladnikia
Golaka Walp. = H. Golaka
Hacquetii Tausch = prec.
Opoponax Baill. = Pastinaca Opopanax
orientalis Arc. = Pastinaca hispida
MALACHIUM I 350 (335)
aquaticum Fr. 350, A 71
erectum Gren. = Cerastium erectum
glabrum Peterm., Gelmi (aquatic.) 350 (b), A 71
manticum Rchb. = Cerastium mant.
octandrum Gren. = Cerastium — oct.
scandens Godr. (aquat.) A 71 (c)
MALACOCHÆTE = Scirpus
litoralis Nees = S. litor.
MALAXIS I 249 (236)
diphyllos Cham. = monophylla
Lœselii Rchb. = Liparis Lœs.
monophylla Sw. 249, A 56
MALCOLMIA I 422 (360)
africana R. Br. 423 (5)
binervis Boiss. = nana
confusa Boiss. 423, A 89 (4 bis)
confusa Rouy, Paol. (parviflora) 423 (4 β) = prec.
litorea R. Br. 422 (1)
maritima R. Br. 423 (2), A 89
nana Boiss. A 89 (4 bis oss.)
Orsiniana Ten. 423 (3)
parviflora DC. 423 (4), A 89
MALOPE II 261 (640)
althæoides Moris = seg.
grandiflora F. G. Dietr. = trifida
malachoides L. 261, A 159
stipulacea Cav. 261 (c)
trifida Cav. 261 (b)
MALUS = Pirus
acerba Mérat = P. Malus (α)
austera Wenzig (comm.) = P. Malus (α)
communis Poir. = P. Malus
dasyphylla Borckh. = P. das.
dioica Mœnch = P. Malus
domestica Borckh. = P. dasyphylla (for.)
frutescens Medic. = P. Malus
paradisiaca Medic. = P. præcox
præcox Borckh. = P. præcox
pumila Mill. = P. dasyphylla (for.)
sativa Dum.-Cours. = P. Malus
silvestris Mill. = P. Malus α silv.
MALUS = Pirus
Sorbus Borckh. = P. domestica
umbellata Gilib. = P. Malus
MALVA II 265 (643)
abscondita Burn. (Alcea) 266 (3 δ b)
albiflora Goir. (silvestris) A 159 (4 a c)
albiflora Presl (cretica) 265 (1 β b)
albiflora Presl = silvestris
Alcea L. 266 (3)
alceoides Ten. = italica
althæoides Cav. 265 (1 β)
althæoides S. et S. = cretica
ambigua Guss. 267 (4 δ), A 159
arborea Webb et Berth. (non St. Hil.) = Lavat. arbor.
arvensis Presl 276 (5 b)
Bismalva Bernh. = fastigiata
Bivoniana Presl = microcarpa
borealis Wallm. = pusilla
brevifolia Gilib. = crispa
canescens Strobl (silvestr.) = tomentella
cannabina Serres = multidentata
circinnata Viv. = nicæensis
Columnæ Ten. ex Steud. = quid?
cretica Cav. 265 (1)
cretica Ten. = althæoides
crispa L. A 160 (4 bis)
cristata Boiss. (parvifl.) = microcarpa
cymbalariæfolia Desr. = Sida Sherardiana
Cyrilli Vis. = Lavat. thuringiaca
dasycarpa Beck (silvestr.) = erecta
decumbens Host = Alcea
elata Salisb. = silvestris
erecta Gilib. = silvestris
erecta Presl 267 (4 γ), A 159
eriocarpa Boiss. (silvestr.) = erecta
excelsa Presl = nicæensis
fastigiata Cav. 266 (3 δ)
fastuosa Salisb. = Lavat. arborea
flava Alef. = Lavat. flava
flexuosa Horn. (non Gill.) 268 (8 α b)
florida Salisb. = Althæa rosea
geraniifolia J. Gay 266 (2 β)
glabra Bert (silvestr.) = mauritiana
glabra Desr. = prec.
glabrata Guss. ex Strobl (silv.) = mauritiana
glabrifolia Ten. ex Steud. = quid?
glabriuscula Parl., Strobl (silvestr.) = mauritiana
gracilis Lor. et Barr. (mosch.) = tenuifolia
hederæfolia Vis. = Lavat. cretica
Henningii Goldb. = pusilla
heterophylla Lej. et Court. (mosch.) 266 (2 α c)
hirsuta Ten. = althæoides
MALVA II 265 (643)
hirsuta Viv., Presl A 159 (4 γ c)
hispida Alef. = Lavat. hispida
hortensis Schimp. et Spenn. = Althæa rosea
integrifolia Lej. et Court. = Orsiniana
intermedia Cocc. et Cug. (non Bor.) = ambigua?
intermedia Gr. et Godr. (mosch.) = heterophylla
italica Pollini 266 (3 γ)
italica Rchb. = multidentata
laciniata Desr. = tenuifolia
latisecta Neilr. (Alcea) = fastigiata
lobata Cav. = Alcea
mammilosa Lloyd = Lavat. cretica
marcotica Del. 268 (8 α c)
maritima Lam. = Tournefortiana
maritima Salisb. = Althæa offic.
mauritiana L. 267 (4 β), A 159
microcarpa Desf. 268 (8 β)
montana Forsk. = nicæensis
Moreniana Pollini = seg.
Morenii Pollini = fastigiata
Morenii Rchb. = italica
Morisonii Pollini ex Schur = Alcea
moschata L. 266 (2)
Mulleri Mull. ex Parl. = Lavat. triloba
multidentata Koch (Alcea) 266 (3 β)
neglecta Wallr. = rotundifolia
nicæensis All. 267 (5)
obtusa Mœnch = silvestris
officinalis Schimp. et Spenn. = Althæa offic.
Olbia Alef. = Lavat. Olbia
orbicularis Deth. (silvestr.) A 160 (4 a)
Orsiniana Ten. 266 (2 γ)
pallida Salisb. = Lavat. Olbia
parviflora All., Cav. = microcarpa
parviflora Huds. = pusilla
parviflora L. 267 (8)
pedunculata Raf. = Malope malachoides
plebeja Stev. = erecta
polymorpha Guss. A 159 (4 δ b)
prostrata Gilib. = rotundifolia
Pseudo-lavatera Webb et Berth. = Lavat. cretica
Pseudo-Olbia Alef. = Lavat. Olbia
punctata Alef. = Lavat. punctata
pusilla With., Sm. 267 (7)
racemosa Presl A 159 (4 γ b)
Ramondiana Godr. (mosch.) = Orsiniana
repens Gueld. = pusilla
ribifolia Viv. 266 (3 a)
rotundifolia Bad. = nicæensis
rotundifolia Gorter = pusilla
rotundifolia L. 267 (6), A 160
ruderalis Salisb. = silvestris
salvitellensis Briganti = rotundifolia

Digitized by Google

MALVA II 265 (643)
setigera Schimp. et Spenn. = Althæa hirsuta
setosa Mœnch = nicæensis
Sherardiana L. = Sida Sher.
silvestris L. 267 (4), A 159
silvestris b Guss. = mauritiana
suboymosa Rouy (ambigua) = polymorpha
tenuifolia Guss. (*mosch.*) 266 (2 α b)
tenuifolia Savi = prec.
Thirkeana Alef. = Lavat. thuringiaca
tomentella Presl A 159 (4 α b)
Tournefortiana L. 266 (nota)
trimestris Salisb. = Lavat. trim.
umbellata Bert. (non Cav.) = Lavat. arborea
undulata Sims (mosch.) = moschata (α)
unguiculata Alef. = Lavat. unguic.
veneta Hort. ex DC. = silvestr.
Vivianiana Rouy = hirsuta
vulgaris Fr. = rotundifol.
vulgaris S. F. Gray = silvestris
vulgaris Ten. = mauritiana
Willkommiana Scheele = Lavat. cretica
MANDONIA = Hieracium
Pilosella Sch. Bip. = H. Pilos.
MANDRAGORA II 405 (748)
acaulis Gærtn. = vernalis
autumnalis Bert. 405 (2)
microcarpa Bert. 405 (2 β)
officinalis Mill. = vernalis
officinalis Moris = autumnal.
officinarum Bert. = autumnal.
officinarum L. = autumnalis et vernalis
officinarum Vis. = vernalis
vernalis Bert. 405 (1)
MANTISALCA = Centaurea
elegans Cass. = C. salmantica
MARESIA = Malcolmia
binervis Pomel = M. nana
nana Batt. et Trab. = M. confusa
MARGHARITA = Bellidiastrum
Bellidiastrum Gaud. = B. Michelii
MARGOTIA = Laserpitium
gummifera Lge. = L. gummiferum
laserpitioides Boiss. = prec.
MARIANTHEMUM = Campanula
aggregatum Schrank = C. glomerata
alpinum Schur = C. alp.
barbatum Schur = C. barb.
lingulatum Schur = C. ling.
Medium Schur = C. Med.
sibiricum Schur = C. sib.
MARISCUS
acicularis Mœnch = Heleochar. acic.
albus Gilib. = Rhynchosp. alba
mucronatus Gærtn. = Cyperus ægyptiacus
setaceus Mœnch = Scirpus set.
MARRUBIUM III 19 (782)
affine Host = peregrinum
album Gilib. = vulgare
Alysson L. 20 (2)
angustifolium Mœnch = peregrinum
apulum Ten. (*vulg.*) 19 (1 c)
Bauhini Nic. (vulg.) = apulum
candidissimum L. 20 (3)
catariæfolium Rchb (non Desr.) = prec.
cinereum Desr. = Ballota hirsuta
creticum Mill. = peregrinum
flexuosum Mœnch = candidiss.
germanicum Schrank = vulgare
hirsutum W. = Ballota hirs.
hispanicum Desf. = prec.
hispanic. L. = Ballota rupestris
incanum Desr. = candidiss.
lanatum Benth. (vulg.) = apulum
Marrubiastrum Ssow. = Leonurus Marr.
nigrum Crantz = Ballota nigra
pallidum Salisb. = Ballota Ps.-dictamn.
paniculatum Desr. = seg.
pauciflorum Wallr. = seg.
peregrinum L. 20 (4)
peregrinum Rchb., Ces. P. et G. = candidiss.
plicatum Forsk. = Alysson
Pseudo-dictamnus L. = Ballota Ps.-dict.
rupestre Biv. = Ballota rup.
saxatile Raf. = Ballota rupestris
setaceum Desr. = candidissim.
supinum Scop. (non L.) = prec.
uncinatum Horn. = prec.
villosum Strobl (*vulg.*) 19 (1 b)
vulgare L. 19 (1)
MARSILIA I 18 (24)
Fabri Dun. = pubescens
natans L. = Salvinia nat.
pubescens Ten. 18 (2)
quadrifolia L. 18 (1), A 8
quadrifoliata L. = prec.
strigosa Ces. (non W.) = pubescens
MARUTA = Anthemis
Cotula DC. = A. Cotula
fœtida S. F. Gray, Cass. = A. Cotula
fuscata DC. = A fuscata
Micheliana Fisch. = A. maritima
mixta Moris = A. mixta
vulgaris Bluff et Fing. = A. Cotula
MATRICARIA III 236 (868)
agrestis Weiss. (*inod.*) 236 (3 a)
alpina Desr. = Chrysanth. alpinum
arvensis Baill. = Anthem. arv.
aurea Boiss. 236 (1), A 183
atrata Schrank = Chrysanth. montan.
Balsamita Desr. = Chrysanth. Bals.
biennis Weiss. (*inod.*) 236 (3 b)
MATRICARIA III 236 (868)
ceratophylloides Poir. = Chrysanth. ceratoph.
Chamomilla L. 236 (2), A 183
chia Baill. = Anthem. chia
coronaria Desr. = Chrysanth. coron.
coronata J. Gay (Chamom.) = Courrantiana
coronata Koch = prec.
corymbosa Desr. = Chrysanth. corymb.
corymbosa Savi = Chrysanth. Achilleæ
Cotula Baill. = Anthemis Cot.
Courrantiana DC. 236 (2 d)
deflexa Gilib. = Chamomilla
discoidea DC. 236 (nota)
elegans Nym. 236 (3 c)
florida Salisb. = Chrysanth. Parthen.
gracilis Chenev. (*Chamom.*) A 183 (2 e)
Halleri Poir. = Chrysanth. coronopifol.
heterophylla Poir. = Chrysanth. heter.
indica Mill. = Chrysanth. ind.
inodora L. 236 (3)
italica Desr. = Chrysanth. Achilleæ
Kochiana Sz. Bip. 236 (2 c)
latifolia Gilib. = Chrysanth. Parthen.
Leucanthemum Scop. = Chrysanth. Leucanth.
macrophylla Poir. = Chrysanth. macroph.
maxima Poir. = Chrysanth. max.
minima Desr. = Chrysanth. min.
mixta Gr. et Godr. = Anthem. mixta
montana Desr. = Chrysanth. mont.
Myconis Desr. = Chrysanth. Mycon.
nigrescens Baill. = Anthem. austriaca
nobilis Baill. = Anthem. nob.
odorata Lam. = Chrysanth. Parthen.
oleracea Buch.-Ham. = Chrysanth. coronar.
Parthenium L., Bernh. = Chrysanth. Parth.
patens Gilib. = Chamomilla
perforata Mérat = inodora
ptarmicæfolia Poir. = Achillea Ptarmica
pumila Nym. = biennis
pusilla W. = Chamomilla
pyrethroides DC. = Courrantiana
rigida Desr. = Chrysanthem. flosculosum
segetum Schrank = Chrysanth. seget.
suaveolens Koch = inodora
suaveolens L., DC. 236 (2 b)
tenuifolia Salisb. = Chamomilla
tinctoria Baill. = Anthem. tinctoria

Digitized by Google

MATRICARIA III 236 (868)
virgata Desr. = Chrysanthem. discoideum
vulgaris S. F. Gray = Chrysanth. Parthen.
MATTEUCCIA = Struthiopteris
Struthiopteris Tod. = St. germanica
MATTHIOLA I 420 (359)
annua Sweet = incana
arcuata Guss., Lojac. (*tricuspid.*) 422 (4 b), A 89
australis Rouy et Fouc. = numidica
basiceras Conti (*tristis*) A 89 (3 δ c)
bicornis Conti (*tristis*) A 89 (3 δ f)
bicornis Guss. (coronopifol.) 422 (3 γ b) = prec.
calabrica Conti (*tristis*) A 88 (3 γ c)
caulescens Conti (*tristis*) A 88 (3 γ b)
coronopifolia Guss. (non DC.) = sicula
coronopifolia Paol. (tristis) 422 (3 γ) = sicula, cfr. A 89
dentata Strobl (*tristis*) A 89 (3 for.)
dentato-pinnatifida Fiori (*sicula*) A 89 (3 δ a)
dentato-pinnatif. Strobl (coronopifol.) = prec.
dentato-pinnatif. Strobl (*tristis*) A 89 (3 for.)
elata Tod. exs. (tristis) = trist. for. dentato-pinnatif.
fasciculata Conti (*italica*) A 88 (2 γ b subfor.)
fasciculata DC. = tristis
fenestralis R. Br. = incana
fruticosa Rouy et Fouc. (*incana*) 421 (1 α c)
furcata Conti (*incana*) A 88 (1 α d)
glabra DC. 421 (1 γ)
glabrata DC. = glabra
glabrata β Ces. P. et G. = undulata
glabrata Guss. (*sinuata*) A 88 (2 γ)
glabrescens Conti (sinuata) = glabrata
glandulifera Lojac. (*incana*) A 88 (1 α e)
glandulosa Vis. = sinuata
græca Sweet = incana
incana R. Br. 421 (1), A 88
incana ε R. Br. = glabra
integrifolia Fiori (*sicula*) A 89 (3 δ b)
integrifolia Guss. (coronopifol.) = prec.
integrifolia Strobl (*tricuspid.*) A 89 (4 c)
intermedia Conti (*sinuata*) A 88 (2 γ b)
italica Conti (*tristis*) A 88 (3 γ)
ligurica Conti (*sinuata*) A 88 (2 α b)
longifolia Caruel (incana) = rupestris
MATTHIOLA I 420 (359)
montana Tod. ex Conti (*tristis*) A 89 (3 δ e)
neapolitana Conti (*incana*) A 88 (1 α f)
numidica Coss. (*sinuata*) 421 (2 β)
Orsiniana Caruel = Malcolmia Orsin.
patens Presl = incana
pedemontana Gremli (valesiaca) = sabauda
provincialis Conti (*tristis*) A 88 (3 β)
pubescens Conti (*sinuata*) A 88 (2 α)
pulchella Conti (incana) = seg.
pulchella Tin. hb. = glandulifera
rupestris DC. 421 (1 β)
rupestris Ten. = neapolitana
sabauda Chodat = seg.
sabauda DC. (*tristis*) A 88 (3 α b)
sicula Conti (*tristis*) A 89 (3 δ)
sinuata Freyn = incana
sinuata R. Br. 421 (2), A 88
sinuatifolia Guss. (*incana*) 421 (1 α b)
sinuatifolia Paolucci = prec.
tricuspidata R. Br. 422 (4), A 88
tristis R. Br 421 (3), A 88
undulata Tin. 421 (1 δ)
valesiaca Boiss. 422, A 88 (3 α)
varia DC. p. p., Gaud. = valesiaca
virescens Guss. (*tristis*) A 89 (3 δ d)
MATTIA = Cynoglossum
Columnæ G. Don = C. Column.
magellensis G. Don = C. mag.
MAUKSCHIA = Carex
levis Heuff. = C. dioica
scabra Heuff. = C. Davalliana
MAYS = Zea
americana Baumg. = Z. Mays
vulgaris Ser. = Z. Mays
Zea Gærtn. = Z. Mays
MEDEOLA = Asparagus
angustifolia Mill. = seg.
asparagoides L. = A. medeoloides
latifolia Salisb. = prec.
MEDICA = Medicago
arabica Medic. = M. arab.
arborea Mill. = M. arb.
bimuricata Mœnch = cfr. M. polymorpha
ciliaris Medic. = M. cil.
coronata Medic. = M. cor.
echinata Lam. = M. orbicularis
falcata Mill., Scop. = M. falc.
hispanica Mill. = Circinus circinn.
incana Mœnch = M. muricata
inermis Lam. = M. orbicul., scutell., turbin.
intertexta Medic. = M. ciliaris
italica Mill. = M. obscura
lupulina Scop. = M. lup.
marina Lam. = M. mar.
media Fourr. = M. varia
MEDICA = Medicago
orbicularis Medic. = M. orb.
polymorpha Scop. = cfr. M. polym.
sativa Lam. = M. sat.
tomentosa Mœnch = M. marina
tornata Medic. = M. torn.
turbinata Medic. = M. turb.
MEDICAGO II 31 (488)
aculeata Gærtn. 37 (15 γ)
aculeata Guss. (*obscura*) 35 (11 β)
aculeata Moris (*tubercul.*) 36 (12 γ)
aculeata Moris (turbin.) = aculeata Gærtn.
aculeata Urb. (*Murex*) 37 (16 subsp. I)
agrestis Ten. 38 (18 γ)
alba Cocc. (*sativa*) 32 (4 α b)
ambigua Jord. A 137 (7 α for.)
angulata Láng = sativa
angustifolia Strobl (*recta*) 39 (20 β c)
apennina J. Woods = Cupaniana
apiculata Bast. = seg.
apiculata Urb. (turbinata) = spinulosa DC.
apiculata W. 41 (26 δ)
applanata W. 34 (7 α b)
arabica All. 40 (25), A 137
arabica L. (polymorpha) = prec.
arborea L. 32 (2), A 137
arborescens Presl = prec.
arenaria Ten. 37 (14 α)
astroites Bert. 35 (11 δ a)
Berteriana Moris = tuberculata W.
Berteroana Nym. = prec.
Biancæ Tod. 34 (7 γ b)
bimuricata Retz = cfr. polymorpha
Blancheana Boiss. 35 (8)
Bonarotiana Arc. 35 (8 β)
Bonarotiana Arc. (Blancheana) = prec.
brachyacantha A. Kern. = hirsuta
brachyacantha Lowe (lappacea) = Terebellum
brachyodon Rchb. (minima) = hirsuta
Braunii Gr. et Godr. 37 (14 α b)
breviaculeata Moris (tribul.) = truncatula (α)
breviaculeata Urb., Rouy (pentacycla) = Terebellum
breviacul. Urb. (truncatula) = truncatula (α)
breviflora Gilib. = lupulina
breviseta DC., Urb. (*litor.*) 37 (14 subspec. II)
breviseta Rouy (*ovata*) 38 (16 β c)
brevispina Benth. (*lacin.*) 39 (19 c)
brevispina Rouy (*Murex*) 37 (16 α c)
brevispina Rouy (tubercul.) = spinulosa DC.
cærulea Less. = sativa

Digitized by Google

MEDICAGO II 31 (488)
cæruleo-venosa Urb. (*præcox*) 41 (27 α b)
cancellata Ten. (non M. B.) = Tenoreana
canescens Moris (*lupul.*) A 137 (1 α c)
canescens Ser. in DC. (*minima*) 39 (20 α b)
caprensis Pasq. = recta
carstiensis Wulf. 40 (24)
catalonica Schrank = spinulosa DC.
ciliaris Balb. = tuberculata W.
ciliaris Krock 42 (29)
ciliaris L. (polymorpha) = prec.
ciliaris Savi = denticulata
cinerescens Jord. = rigidula (α)
circinnata L. = Circinus circinnata
commutata Tod. = muricata
confinis Koch (*apiculata*) 41 (26 δ b)
constricta Dur. = globosa
contorta Gilib. = sativa
cordata Desr. = arabica
corniculata Trautv. = Trigonella corn.
coronata Desr. 39 (21), A 137
coronata L. p. p. (polymorpha) = prec.
crassispina Vis. 36 (13 β b)
crinita Presl = Echinus?
cuneata J. Woods 34 (7 γ)
Cupaniana Guss. 32 (1 β)
cyclocarpa Hy A 137 (4 δ for)
cyclocarpa × sativa Hy = varia
cylindracea DC. 37 (14 δ), A 137
Decandollei Tin. 41 (28 β)
declinata Kit. 33 (5 b)
denticulata W. 40 (36 α)
depressa Jord. = agrestis
depressa Urb. (*litor.*) 37 (14 γ)
dextrorsa Asch. (aculeata) = neglecta
dextrorsa Asch. (*turbin.*) 37 (15 α b)
dextrorsa Fiori (*pusilla*) 37 (14 ζ a)
dextrorsa Fiori (*Rouyana*) 37 (14 β a)
dextrorsa Rouy (breviseta) = subinermis Bert.
dextrorsa Rouy (cylindrica) = Rouyana a. dextr.
dextrorsa Rouy (turbin. β breviseta) = olivæformis
dextrorsa Urb. (*depressa*) 37 (14 γ a)
dextrorsa Urb. (lit. oc. longiseta) = Braunii
dextrorsa Urb. (*muricata*) 35 (11 ζ a)
dextrorsa Urb. (*obscura*) 35 (11 α a)
dextrorsa Urb. (pentacycla) = pusilla a. dextr.
dextrorsa Urb. (*tornata*) 35 (11 ε a)
dextrorsa Urb. (*tribul.*) 36 (13 β d)
dextrorsa Urb. (*tricycla*) 37 (14 ε a)
MEDICAGO II 31 (488)
dextrorsa Urb. (*truncatula*) 36 (13 α b)
dextrorsa Urb. (*tubercul.*) 36 (12 α b)
diffusa Poir. 39 (19 b)
disciformis DC. 40 (23)
distans Poir. = hispida
echinata Steud. = orbicular.
Echinus DC. 41 (28 α)
elegans Jacq. = rugosa
eriocarpa Rouy (*lupul.*) A 137 (1 α d)
esculenta Rottl. = Trigonella corniculat.
falcata L. 33 (4 δ), A 137
falcato × sativa Rchb. = varia
falcato × sativa Rouy = pseudo-falcata
flexuosa Ten. = hispida (α)
Gerardi Kit. in W. = rigidula
Gerardi Moris = Morisiana
germana Jord. 38 (18 α b)
glabella Presl = intertexta?
glabra Urb. (*prostrata*) 33 (5 a)
glandulifera Strobl (*rugosa*) A 137 (9 c)
glandulifera Urb. (*prostrata*) 33 (5 c)
glandulosa Neilr. (lupul.) = Willdenowiana
glandulosa Urb. (*orbic.*) 34 (7 α c)
globosa Presl 42 (nota)
globulifera Desf. = sphærocarpos
glomerata Balb. 33 (4 γ b)
glutinosa M. B. 33 (4 γ)
gracilis Biv., Tod. = Braunii
gracillima Tin. = paucigyrosa
gracilis Urb. (falcata) = microphylla
græca Horn. = mollissima
hamata Presl = quid?
Helix DNtrs. - Soleirolii
Helix W. 35 (11 γ)
heptacycla Urb. (*arabica*) 40 (25 b)
heteracantha Loret (tribul.) = uncinata
heterocarpa Urb. = hispida
hirsuta All. 39 (20 γ)
hirsuta L. (polymorpha) = prec.
hirsuta Schk. = denticulata
hirsuta Thuill. = rigidula
hirsuta Vill. = hispida
hirsutissima Cyr. ex Steud. = hirsuta
hispanica Steud. = Circinus circinn.
hispida Gærtn. 40 (26), A 137
Hornemanniana Ser. in DC. = tribuloides
Hystrix Ten. = nigra
incisa Moris (*rugosa*) 35 (9 b)
inermis Asch. (*turbin.*) 37 (15 α)
inermis Moris (*litor.*) 37 (14 subspec. III)
inermis Rouy (cylindr.) = pusilla
inermis Rouy (litor.) = tricycla
inermis Steud. = spec. plur.
MEDICAGO II 31 (488)
inermis Urb. (polygyra) = reticulata (a)
integrifolia Godr. (lacin.) = diffusa
intertexta DC. = ciliaris
intertexta L. (polymorpha) = seg.
intertexta Mill., All. 41 (28)
italica Steud. = obscura
laciniata L. (polymorpha) = seg.
laciniata Mill., All. 39 (19)
lappacea Desr. p., p. DC. 40 (36 β), A 137
latifolia Goir. (*recta*) A 137 (20 β d)
lenticularis Desr. 35 (11 subspec. I)
levis Boiss. (turbin.) = turbinata (α)
levis Desf. = obscura (α)
lineata Tausch = minima
litoralis Rohde 37 (14), A 137
longeaculeata Moris (litor.) = litoral. (α)
longeaculeata Urb., Rouy (pentacycla) = nigra
longeaculeata Urb. (truncatula) = tribuloides
longiseta DC. (minima) = recta
longiseta DC., Urb. (*litor.*) 37 (14 subspec. I)
longiseta Rouy (cylindr.) = Rouyana
longispina Benth. (*lacin.*) 39 (19 a)
longispina Lowe (minima) = recta
longispina Rouy (*arabica*) A 137 (25 d)
longispina Urb. (hispida) = lappacea
lupulina L. 31 (1), A 137
macracantha Lowe (lappacea) = nigra
macrocarpa Moris (*Murex*) 37 (16 α b)
macrocarpa Moris et DNtrs. (denticul.) = nigra
macrocarpa Nym. = Murex b. macroc.
maculata Sibth., W. = arabica
marginata W. 34 (7 β)
marina L. 32 (3)
media Bor. = pseudo-falcata
media Pers. (sativa) = varia
microcarpa Rouy (*ovata*) 37 (16 β b)
microphylla Cus. et Ausb. (*falcata*) 33 (4 δ c)
minima Gruf. in L. 39 (20), A 137
minima L. (polymorpha) = prec.
minima β Bert. = hirsuta
minor Guss. (Gerardi) = Morisii
minor Ser. in DC. (Gerardi) = rigidula (α)
mitis W. = hispida
mollissima Roth 39 (20 β b)
monspeliaca Trautv. = Trigonella monsp.
Morisiana Jord. 38 (18 β)

Digitized by Google

MEDICAGO II 31 (488)
Morisii Tod. 38 (18 β b)
Murex Bert. = tribul. d. dextrorsa
Murex Guss. = crassispina
Murex W. 37 (16)
muricata All., W. 35 (11 ζ)
muricata Benth., Gr. et Godr. = aculeata Gærtn. a. sinistrorsa
muricata L. (polymorpha) = muricata All.
muricoleptis DC. = Decandollei
muricoleptis Tin. 41 (28 γ)
narbonensis DC. (tribul.) = truncatula (α)
neglecta Guss. 37 (15 γ b)
nigra W. 41 (26 γ)
Noccæ Balb. = carstiensis
obscura Retz. 35 (11)
olivæformis Guss. 37 (15 β), A 137
orbicularis All. 34 (7), A 137
orbicul. L. (polymorpha) = prec.
ornithopodioides Trautv. = Trifolium ornith.
ovalis Moris (sphærocarpa) = ovata
ovata Carmign. 38 (16 β)
panormitana Tin. 41 (28 α b)
paucigyrosa Guss. (*lappacea*) A 137 (26 β b)
pentacycla DC., Guss. = nigra
pentacycla Urb. (litor.) = pusilla
pilosa Benth. (orbic.) = applanata
pilosiuscula Lev. (*arabica*) A 137 (25 c)
Pironæ Vis. 38 (17)
plagiospira Dur. = Soleirolii
plumbea Bert. 35 (11 γ b)
polycarpa W. = hispida
polycycla Moris 41 (26 ζ b)
polygyra Urb., Rouy (hispida) = reticulata
polymorpha L. = spec. plur.
polymorpha W., Gr. et Godr. = hispida
pontificalis Genn. 41 (27 β)
præcox DC. 41 (27), A 137
prostrata Jacq. 33 (5)
pseudo-falcata Rouy (*varia*) A 137 (4 β b)
pseudo-glomerata Rouy (*varia*) A 137 (4 β b)
pseudo-sativa Rouy (varia) = varia (a)
pubescens DC 36 (12 α c)
pubescens Guss. (prostrata) = declinata
pubescens Horn. = tribuloides
pulchella Lowe 39 (20 γ b)
pungens Trautv. = Trigonella maritima
pusilla Viv. 37 (14 ζ)
radiata L. 42 (nota)
recta Desf. (polymorpha) = seg.
recta W. 39 (20 β), A 137
rectiuscula Rouy (*tribul.*) A 137 (13 β e)
reticulata Benth. 41 (26 ε)
rigidula Desr., All. 38 (18)

MEDICAGO II 31 (488)
rigidula L. (polymorpha) = prec.
Rouyana Fiori (*litor.*) 37 (14 β)
rugosa Desr. 35 (9), A 137
rugosa Urv. = spinulosa DC.
rupestris Pir. (non M. B.) = Pironæ
sardoa Moris 41 (26 δ for.)
sativa L. 32 (4), A 137
sativa × falcata Rouy = varia
sativa × glomerata Burn. = pseudo-glomerata
scutellata L. (polymorpha) = seg.
scutellata Mill., All. 34 (6)
secundiflora Dur. 32 (1 γ)
secundiramea Wk. et Lge. = prec.
sicula Tod. 38 (16 γ)
silvestris Fr. (*falcata*) A 137 (4 δ for.)
sinistrorsa Asch. (*aculeata*) 37 (15 γ a)
sinistrorsa Asch. (turbin.) = turbinata (α a)
sinistrorsa Fiori (*olivæform.*) 37 (15 β b)
sinistrorsa Fiori (*pusilla*) 37 (14 ζ b)
sinistrorsa Fiori (*Rouyana*) 37 (14 β b)
sinistrorsa Rouy (cylindr.) = Rouyana b. sin.
sinistrorsa Rouy (turbin. β breviseta) = olivæform. b. sin.
sinistrorsa Urb. (*depressa*) 37 (14 γ b)
sinistrorsa Urb. (lit. cc. longiseta) = arenaria (a)
sinistrorsa Urb. (*muricata*) 35 (11 ζ b)
sinistrorsa Urb. (*obscura*) 35 (11 α b)
sinistrorsa Urb. (pentacycla) = pusilla b. sin.
sinistrorsa Urb. (*spinosa*) 35 (11 δ b)
sinistrorsa Urb. (*tornata*) 35 (11 ε b)
sinistrorsa Urb. (*tricycla*) 37 (14 ε b)
sinistrorsa Urb. (*truncatula*) 36 (13 α a)
sinistrorsa Urb. (*tubercul.*) 36 (12 α a)
Soleirolii Duby 35 (10)
Sorrentini Tin. 38 (16 δ)
sphærocarpa Moris = sphærocarpos
sphærocarpa Seb. et Maur. = macrocarpa Moris
sphærocarpos Bert. 37 (16 α)
spinosa Fiori (*obscura*) 35 (11 δ)
spinosa Guss. (Helix) = prec.
spinosa Guss. (obscura) = aculeata Guss.
spinulosa DC. 36 (12 β)
spinulosa Guss. (Helix) = obscura δ spinosa
spuria Hy A 137 (4 β a)
striata Bast. = tricycla
subinermis Bert. 37 (14 δ b)

MEDICAGO II 31 (488)
subinermis Boiss. (litor.) = pusilla
syriaca Tod. (tubercul.) = tuberc. γ aculeata
Tenoreana Ser. in DC. 39 (22)
tentaculata W. 36 (13 α)
tenuifolia Presl = prostrata
Terebellum W. 41 (26 ζ)
tetracycla Presl = cylindracea
tornata L. (polymorpha) = tornata W.?
tornata Ten. = cylindracea
tornata W. (*an Mill.?*) 35 (11 ε)
tornata a Guss. = pusilla
tornata b Guss. = cylindracea
tribuloides Desr. 36 (13 β), A 137
tricycla DC. 37 (14 ε)
truncatula Gærtn. 36 (13), A 137
tuberculata Moris (denticul.) = sardoa
tubercul. Rouy (pentacycla) = sardoa
tubercul. Gr. et Godr. (polycarpa) = confinis
tuberculata Urb. (*intertexta*) 41 (28 δ)
tuberculata W. 36 (12)
turbinata L. (polymorpha) = seg.
turbinata W. 37 (15), A 137
umbellata Hort. = carstiensis
uncinata W. 36 (13 β c)
varia Martyn 32 (4 β), A 137
vermicularis Ces. = coronata
versicolor Koch (sativa) = varia (a)
versicolor Wallr. (sativa) = pseudo-varia
villosa DC. = rigidula
viscida Koch (*minima*) 39 (20 α c)
viscosa Urb. (*falcata*) 33 (4 δ b)
vulgaris Alef. = sativa?
vulgaris Moris (*tubercul.*) 36 (12 α)
Willdenowiana Koch (*lupul.*) 32 (1 α b)
Willdenowii Bœnn. (non Mérat) = prec.
Willdenowii Guss. = Cupaniana

MEDICUSIA = Picris
aspera Mœnch = P. Sprengeriana
lappacea Rchb. = P. pauciflora
Sprengeriana Rchb = P. Sprengeriana

MEGASTACHYA = Eragrostis
badensis P. B. = Poa badensis
brizoides P. B. = E. megastachya
Eragrostis P. B. = prec.
leersioides Presl = prec.
multiflora P. B. = prec.?
oblonga P. B. = E. megastach.?
pulchella R. et S. = Sclerochloa rigida
rigida R. et S. = Sclerochloa rigida
triticea Presl = Catapodium — tritic.

Digitized by Google

MEGASTACHYA = Eragrostis
unioloides Presl = Catapodium siculum
MEIEMIANTHERA = Cytisus
æolica Raf. = C. æolicus
MELAMPYRUM II 446 (763)
albiflorum Goir. (arvense) = albinum
albinum Zersi (*arvense*) 446 (2 α b)
alpestre Pers. = silvatic.
angustifolium Caruel (nemoros.) = pratense
angustifol. DNtrs. (*nemoros.*) 447 (4 α d)
angustifol. M. Gortani (*silvat.*) A 170 (5 b)
angustifol. Neilr. (nemoros.) = subalpin.
angustifol Wk. et Lge. (*pratense*) 447 (4 β c)
angustissimum Bolzon (*cristat.*) A 170 (1 b)
arvense L. 446 (2)
barbatum W. et K. 447 (3), A 170
cærulescens Gilib. = nemoros.
commutatum Tausch = pratense
cristatum L. 446 (1), A 170
dissectibracteatum Evers (*pratense*) A 170 (4 β d)
giganteum DNtrs. (*nemoros.*) 447 (4 α b)
hastatum Gilib. = pratense
hians Gilib. = silvatic.
impunctatum Godr. (arvense) = barbatum
latifolium Caruel (nemoros.) = nemoros. (α)
latifolium Wk. et Lge. (*pratense*) 447 (4 β b)
lineare Saut. (non Lam.) = pratense
montanum Johnst. = pratense
nemorosum L. 447 (4)
pratense L. 447 (4 β), A 170
purpurascens Gilib. = arvense
silvaticum L. 447 (5), A 170
silvat. × nemoros. Bermann = subalpin.
subalpinum Juratzka (*nemoros.*) A 170 (4 α for.)
subalpinum Kern. = prec.
variegatum Porta et Rigo = seg.
variegat. Porta et Rigo (*barbat.*) A 170 (3 var.)
versicolor Posp. (*arvense*) 447 (2 β)
violaceum Lam. = nemorosum
viride Schur 447 (4 α c)
vulgatum Pers. = pratense
MELANDRIUM = Lychnis
album Garcke = L. alba
auriculatum Rohrb. = Silene auricul.
dioicum Coss. et Germ. = L. alba
diurnum Fr. = L. rubra
divaricatum Fenzl = L. divaricatum
Elisabethæ Rohrb. = Silene Elisab.
MELANDRIUM = Lychnis
Flos-cuculi Rœhl. = L. Flos-cuculi
lanuginosum Rohrb. = Silene lanugin.
macrocarpum Wk. = L. divaricata
noctiflorum Fr. = Silene noct.
pratense Rœhl. = L. alba
purpureum Rupr. = L. rubra
Requieni Rohrb. = Silene Req.
rubrum Garcke = L. rubra
silvestre Rœhl. = L. rubra
stenopetalum Gürke (album) = L. — stenopet.
vespertinum Fr. = L. alba
viscosum Celak. = Silene visc.
MELANOSELINUM = Ligusticum
Seguieri Sweet = L. ferulaceum
MELANOSINAPIS = Brassica
communis Spenn. = B. nigra
MELANTHIUM = Nigella
damascenum Medic. = N. damascena
MELANTHIUM = Veratrum
album Thunb. = V. album
nigrum Thunb. = V. nigrum
MELARGYRA = Spergularia
media Raf. = S media
rubra Raf. = S. rubra
MELIA II 259 (639)
Azedarach L. 259
japonica G. Don = Azedarach
orientalis M. Rœm. = prec.
sempervirens Sw. = prec.
MELICA I 82 (109)
amethystina Pourr. = Bauhini
arrecta Kze. = latifolia
aspera Desf. = minuta
australis Coss = latifolia
Bauhinii All. 83 (3)
Bauhinii Ten. = ciliata
breviflora Parl. (*Cupani*) 83 (1 b)
cærulea L. = Molinia cær.
ciliata Gr. et Godr. et Auct. pl. = transsilvanica
ciliata L. 83 (2), A 22
cretica Boiss. = nebrod.
Cupanii Guss. 83 (1)
decumbens Weber = Triodia decumbens
glauca F. Schultz 83 (2 β b)
intermedia Rouy (ciliata) = glauca
latifolia Coss. (*minuta*) 83 (4 β)
Linnæi Hack. (ciliata) = ciliata (α)
Lobelii Vill. = uniflora
Magnolii Gr. et Godr. 83 (2 β)
major Auct. ital. = latifolia
major S. et S. = pyramidalis
minuta L. 83 (4)
montana Huds. = nutans
multiflora Zum. = Triodia decumbens
nebrodensis Gr. et Godr. = ciliata (α)
nebrodensis Parl. 83 (2 γ), A 22
nodosa Pill. et Mitt. = Diplachne serotina
nutans Cav. = minuta
MELICA I 82 (109)
nutans L. 83 (5), A 22
nutans Pollich = uniflora
nutans Savi = latifolia
Parlatorei Asch. et Græbn. (*nebrod.*) A 22 (2 γ a)
picta C. Koch A 22 (5 β)
pyramidalis Desf. = latifolia
pyramidalis Lam. 83 (4 α b)
ramosa Vill. = minuta
rigida Wibel = Triodia decumbens
saxatilis S. et S. = minuta
setacea Pers. = Bauhini
Tinei Lojac = breviflora
transsilvanica Schur 83 (2 δ)
typhina Bor. 83 (2 δ b)
viridiflora Czern. = seg.
viridiflora Griseb. (nutans) = picta
uniflora Retz. 83 (6)
MELILOTUS II 42 (489)
abyssinica Hochst. = elegans
alba Desr. 44, A 138 (8 bis)
altissima Thuill. 44 (9), A 138
angustifolia Freyn (indica) = Tommasinii
angustifolia O. E. Schulz (*indica*) A 138 (6 α c)
angustifolia O. E. Schulz (*neapolit.*) A 138 (3 e)
angustifolia O. E. Schulz (sulc.) = longifolia Ten.
anomala Ledeb. = Trifol. filiforme (α)
arvensis Wallr. A 138 (8 α c)
Aschersonii O. E. Schulz (*sulcata*) A 137 (2 α e)
Bonmetii Horn. = indica
Bonplandii Ten. A 138 (6 γ)
brachystachya W. = indica
Bungeana Boiss. = officin.
cærulea Desr. = Trigonella cærulea
cæspitosa O. E. Schulz (*messanen.*) A 137 (1 c)
collina Guss. = elegans
compacta Salzm. = segetalis
concinna Ten. (maurit.) = maurit.?
conferta Hausskn. (*indica*) A 138 (6 δ)
densiflora Somm. (indica) 44 = conferta, cfr. A 138
dentata Pers. 44 (7), A 138
diffusa Koch, Gaud. = officin.
diffusa O. E. Schulz (*neapol.*) A 138 (3 c)
diffusa O. E. Schulz (*sulcata*) A 138 (2 α h)
diffusa Ser. = dentata
diffusa Trev. = indica
elatior O. E. Schulz (*infesta*) A 138 (2 δ b)
elegans Salzm. 43 (5), A 138
exaltata Biv. 44 = Bonplandii, cfr. A 138
expansa Hort. ex Rchb. = officin.
fistulosa Somm. (*sulcata*) 43 (2 γ b)
gigantea Wend. = altissima
globulosa Stev. = neapolit.
gracilis DC. = neapolitana

Digitized by Google

MELILOTUS II 42 (489)
grandis Req. exs. = neapolit.
heterophylla Scheele = neapolit.
humilis Rouy (*sulcata*) A 137 (2 α f)
indica All. 43 (6), A 138
infesta Cus. et Ausb. = lejosperma
infesta Guss. 43 (2 δ), A 138
italica A. Rich. = elegans
italica Lam. 43 (4)
Kochiana DC. = officinalis
Kochiana W. = dentata
laxiflora Tomm. (indica) = permixta
lejosperma Pomel 43 (2 γ), A 138
leucantha Koch = alba
levis Medic. = indica
libanotica Ser. in DC. (*sulcata*) A 137 (2 α d)
linearis Cav. A 139 (9 γ)
Lippoldiana Lowe = elegans
longifolia Rchb. = neapolit.
longifolia Ten. 42 (2 α b)
longiracemosa Rouy (sulc.) = procerior
lupulina Trautv. = Medicago lupulina
macrocarpa Guss. (parvifl.) = conferta?
macrorrhiza Pers. A 139 (9 β)
macrostachya Pomel = infesta
major Camb. (sulcata) = lejosperma
mauritanica W. 42 (2 α c)
medicaginoides Zum. = Medic. lupulina
melanosperma Bess. = alba
melil.-indica Asch. et Græbn. = indica
melil.-ital. Asch. et Græbn. = italica
melil.-offic. Asch. et Græbn. = officin.
messanensis All. 42 (1), A 137
microcarpa Balb. = Trifol. filiforme (α)
microcarpa C. A. Mey. A 138 (3 b)
neapolitana Ten. 43 (3), A 138
neglecta Ten. 44 (8 β)
occidentalis Nutt. = indica
officinalis Lam. 44 (8), A 138
officin. Lam. p. p., W., Ten. = altissima
officin. β All. = alba
oxycarpa O. E Schulz (*alba*) A 138 (8 * b)
pallida Bess. = officinalis
palustris Kit. 44, A 139 (9 β b)
parviflora Desf. = indica
parvula Rouy (*indica*) A 138 (6 α b)
permixta Jord. 44 (6 β)
Pertusiana Gennari A 138 (5 β)
Petitpierreana W. 44 (8 α), A 138
polonica Ser. (non Desr.) = indica
procera Beck (macrorrh.) = altissima (α)

MELILOTUS II 42 (489)
procerior Guss. (*sulcata*) A 138 (2 α g)
prostrata O. E. Schulz (*segetalis*) A 138 (2 β c)
reticulata Pomel = permixta
Robinii Raf. = indica?
rostrata Vis. (neap.) = neapol.
rotundifolia Ten. 43 (4 b)
rugosa Gilib. = offic., alba
rugosa Mœnch = italica
rugulosa W. = alba
Salzmannii O. E. Schulz (*segetalis*) A 138 (2 β b)
sardoa O. E. Schulz (*elegans*) A 138 (5 γ)
secundiflora Rouy = Medicago secund.
segetalis Ser. in DC. 42 (2 β), A 138
silvestris Hartm. (macrorrh.) = altissima
simplex O. E. Schulz (*neapolit.*) A 138 (8 d)
stœchadica O. E. Schulz (*messanen.*) A 137 (1 b)
striata Mœnch = messan.
sulcata Desf. 42 (2), A 137
tenella Wallr. A 138 (8 * c)
Tommasinii Jord. 44 (6 ε)
Vatkeana O. E. Schulz (*offic.*) A 138 (8 α b)
virescens Jord. = altissima (α)
vulgaris W. = alba
Zelantea Nicotra = quid?

MELISSA III 54 (798)
acinoides Nym. = Satur. — suaveolens
Acinos Benth. = Satur. Acinos
alba W. et K. = Satur. thymifol.
alpina Benth. = Satur. alp.
alpina Boiss. = Satur. — granatensis
altissima S. et S. = romana
Baumgarteni Simonk. = Satur. — Baumg.
Calamintha L. = Satur. Calam.
Clinopodium Benth. = Satur. vulgaris
cordifolia Pers. = romana
corsica Hort. = officinalis
cretica All. (non L.) = Satureja Nepeta
foliosa Opiz 54 (c)
fruticosa L. = Satur. frutic.
frutic. W. = Satur. thymifol.
glomerata Stokes = Satur. vulgaris
granatensis Nym. = Satur. — granat.
grandiflora L. = Satur. grandiflora
graveolens Benth. = Satur. graveol.
graveolens Host = Satur. Calamintha
hirsuta Horn. = romana
lepinensis N. Terr. (offic.) = romana
microphylla Benth. = Satur. corsica
Nepeta L. = Satur. Nep.
obtusifolia Pers. = prec.

MELISSA III 54 (798)
officinalis L. 54
parviflora Salisb. = Satur. Nepeta
patavina Benth. = Calamintha patavina
Pulegium Griseb. = Mentha Puleg.
Pulegium Kitt. (non Roch.) = Satur. — acinitolia
pyrenaica Scop. = Hormin. pyr.
romana Mill. 54 (b)
silvatica Nym. = Satur. Calamintha (α)
silvestris Lam. = Melittis Melissophyll.
subnuda W. et K. = Satur. — subnuda
thymifolia Benth. = Satur. thym.
villosa Benth. (Acinos) = Satur. Acin. d. vill.
villosa Benth. (offic.) = romana
vulgaris Trevis. = Satur. vulg.

MELITTIS III 28 (788)
albida Guss. (*Meliss.*) 28 (b)
grandiflora Sm. = Melissophyllum
Melissophyllum L. 28
nivea A. Kern. (*Meliss.*) 28 (d)
ramosa Freyn (*Meliss.*) 28 (b)

MELO = Cucumis
flexuosus Sageret = C. flex.
sativus Sageret = C. Melo
vulgaris Cogn. = prec.

MENOMPHALUS = Centaurea
Cineraria Pomel = C. Cin.
Scabiosa Pomel = C. Scab.

MENTHA III 71 (805)
acutifolia Sm. = nitida
affinis Bor., Strail = Lobeliana
agrestis Sole 82 (5 δ)
albiflora Michel. (*Puleg.*) 82 (6 α c)
Allionii Bor. 81 (5 δ b)
amaurophylla Timb. 74 (×)
angustifolia Lej. 77 (3 α b)
angustifolia Posp. (*canesc.*) 77 (×)
aquatica L. 79 (4)
aquat. × arvensis Lasch. = verticill.
aquat. × arv. × viridis Malinv. = rubra
aquat. × longif. × rotund. Briq. = dumetor.
aquat. × rotundif. F. Schultz = pyramid.
aquat.-silvestr. G. F. Meyer = dumetor.
aquat. × viridis Briq. = citrata
aquat. × viridis F. Schultz = piperita
arguta Posp. (*carinth.*) 82 (×)
arvensis L. 81 (5)
arven. × rotundif.? = carinthiaca
arven. × viridis F. Schultz = gentilis
atrovirens Bor. = arvensis (α a)
austriaca All. = Allionii
austriaca Jacq. 81 (5 α)
Avellini Tod. = pyramid.

Digitized by Google

MENTHA III 71 (805)
Bakeri Briq. (aquat.) = aquatica
Bauhini Briq. (rotundif.) = rotundif. (α)
Beneschiana Opiz 81 (X)
Bicknellii Briq. (*aquat.*) 79 (4 b)
Bornmuelleri H. Br. 76 (2 δ b subf.)
brevipetiolata Rchb. 77 (3 α d)
bullata Briq. (*rotundif.*) 72 (1 α d)
canescens Fr., Gr. et Godr. (viridis) = longifolia (α)
canescens Roth 77 (X)
capitata Opiz 79 (4 a)
carinthiaca Host 82 (X)
cinereo-virens Bég. (*intermedia*) 73 (1 β b)
cin.-virens Briq. (rotundif.) = prec.
cin.-virens Mab. (insul.) = prec.
citrata Ehrh. 79 (X)
citriodora G. F. W. Meyer (aquat.) = citrata
conferta Posp. (cuspidata) = polystachia
cordata Posp. 76 (2 β)
cretica Portenschl. (*molliss.*) 76 (2 δ c)
crispa Ten. = undulata
crispa v. A Lam. = Lamarckii
cuneifolia Ley. et Court. (*arv.*) 81 (5 α b)
curvidens Posp. (*cuspidata*) 75 (2 α e subf.)
cuspidata Opiz 75 (2 α e)
denticulata Strail 80 (4 d)
dissimilis Dés. (*hirta*) 78 (X)
dulcissima Briq. (nemorosa) = seg.
dulcissima Dum. = velutina
dumetorum Schult. 77 (X)
Durandoana Malinv. 79 (X)
Eisensteiniana Opiz 76 (2 α h)
ensidens Briq. (*candicans*) 75 (2 α b subf.)
erecta Bég. (*Puleg.*) 82 (6 α)
exigua All. = arvensis (α)
Favrati Briq. (longifol.) = seg.
Favrati Dés. et Dur. = candicans?
foliosa Opiz = undulata
fontana Weihe A 174 (5 for.)
genevensis Dés. et Dur. 73 (X)
genevensis Dur. in Dés. (velutina) = prec.
gentilis All. = arvensis (α)
gentilis L. 82 (X)
glabra Colla = Durandoana
glabra Strobl (*suavis*) 78 (X)
glabrata Benth. (aquat.) = citrata
glabrata Deb. (insularis) = Mabillei
glabrescens Timb. (*rotundif.*) 72 (1 α e)
globosiceps Briq. (*piper.*) 79 (X)
glomerulata Jan = suavis
gracilis Briq. (rotundif.) = rotundif. (α)

MENTHA III 71 (805)
gracilis Malinv. (*rotundif.*) 72 (1 α c)
grandifolia Malinv. 78 (X)
grandis Briq. (*longifol.* α) 75 (2 α c)
grandis Wimm. (silvestris) = prec.
gratissima Lej. = velutina
grisella Briq. 76 (2 γ)
grisello X aquat. Posp. = canescens
hadrophylla Briq. (*sardoa*) 72 (1 β a subf)
Halleri C. C. Gmel 74 (X)
hirsuta L., Bert. = aquatica
hirsuta Per. (*Puleg.*) 83 (6 β b)
hirsutula F. et M. (*Requienii*) 83 (7 b)
hirta W. 78 (X)
Huguenini Briq. (longifol.) = seg.
Huguenini Dés. et Dur. = grandis
humidicola Briq. (*rotundif. cin.-virens*) 73 (1 β b subf.)
hybrida Schleich. 76 (2 δ b)
hypeuria Briq. (*aquat.*) 80 (4 c)
inarimensis Guss. 79 (X)
incana W. (*ex Posp.*) 72 (1 α b)
ingens Briq. (*longifol.* α) 75 (2 α f)
insularis Auct. al. p. p. = intermedia
insularis Req. 73 (1 γ)
intermedia Bég. (*rotundif.*) 72 (1 β)
istriaca Posp. (*hybrida*) 76 (2 δ b subf.)
jurana Briq. (*longifol.* α) 75 (2 α d)
jurana Dés. et Dur. (monticola) = prec.
Kœrnickei Briq. (*grandifol.*) 78 (X)
Krocheri Strail = glabrescens
lachnaiochroa Briq. (*meduanensis*) 72 (1 α f subf.)
Lamarckii Ten. 73 (X)
lamiifolia Ten. = suavis
lanigera Briq. (aquat.) = aquatica
late-ovata Strail = capitata
latifolia Beck (hirsuta) = capitata
latifolia Malinv. (insul.) = cin.-virens
latifolia Malinv. (sativa) = verticill. (a)
latifolia Posp. (*canesc.*) 77 (X)
latissima F. Schultz (sativa) = verticill. (a)
Lejeuneana Opiz = angustifolia
limnobia Briq. (*aquat.*) 80 (4 g)
Lobeliana Beck. (*aquat.*) 80 (4 i)
longifolia Huds. 74 (2)
longifolia L. (spicata) = prec.
longif. X aquat. Briq. = dumetor.
lupulina Briq. (aquat.) = denticulata

MENTHA III 71 (805)
Mabillei Briq. (*cin.-virens*) 72 (1 β b subf.)
macrocephala Strail = capitata
major Sole (aquat.) = Weiheana
Maximilianea F. Schultz 78 (X)
meduanensis Dés. et Dur. 72 (1 α f)
melanochroa Briq. (*arv.*) 81 (5 α a)
microdonta Briq. (*velut.*) 73 (X)
microphylla Posp. (*pubesc.*) 78 (X)
minor Malinv. (rotundif.) = lachnaiochroa
minor Sole (aquat.) = capitata
mirabilis Briq. (*insularis*) 73 (1 γ [for.])
mollicoma Opiz 75 (2 α b subf.)
mollissima Borkh. 76 (2 δ)
mollissimo X aquat. Posp. = pubescens
monticola Gelmi (silvestris) = jurana?
multiflora Borb. 76 (2 γ c)
nederhe mensis Strail = capitata
nemorosa W. 74 (X)
nemorosa Wirtg. (nemorosa) = niliaca
nepetoides Lej. 78 (X)
nepetoides Rchb. f. (silvestr.) = dumetor.
nicæensis Briq. (aquat.) 80 (4 e)
nitida Host 80 (X)
Notarisii Briq. (*niliaca*) 74 (X)
oblongifolia Briq. (rotundif.) = rotundif. (α)
obscura Tausch = cuspidata
ocimiodora Opiz 77 (3 α c)
officinalis Sole (*piper.*) 79 (X)
Ortmanniana Opiz 80 (4 h)
palustris Mœnch 81 (5 γ)
palustris Sole = dumetorum
parietariæfolia Becker 81 (5 β)
parvifolia Rchb. (*molliss.*) 76 (2 δ a subf.)
pedemontana Briq. (*rotundif.*) 72 (1 α a)
peduncularis Bor. 81 (X)
piperita L. p. p., Huds. 78 (X)
polystachia Vis. (*longifol.*) 75 (2 α e subf.)
pubescens W. 78 (X)
pulchella Host hb. = nitida
pulegioides Sieb. (non L.) = toment.
Pulegium L. 82 (6), A 215
Pulegium β DNtrs. = hirsuta Per.
punctata Mœnch = Preslia cervina
pyramidalis Ten. 78 (X)
ramosissima Strail = capitata
reflexifolia Opiz 76 (2 α i)
Requienii Benth. 83 (7)
riparia Strail = Lobeliana
Ripartii Briq. (niliaca) = seg.
Ripartii Dés. et Dur. = Halleri

Digitized by Google

MENTHA III 71 (805)
Rocheliana H. Br. 76 (2 δ a subf.)
Rosani Strail 74 (X)
rotundifolia Huds., L. 71 (1)
rotundif. L. (spicata) = prec.
rotundif. X aquat. F. Schultz = Maximilianea
rotundif. X Benthamiana Timb. = Timbali
rotundif. X longif. Briq. = niliaca, Timbali et velutina
rotundif. X silvestris Timb. = Timbali
rotundif. X viridis X longif. Briq. = prec.
rubra Sm. 82 (X)
rugosa Lam. = rotundifolia (α)
rugosa Timb. (rotundif.) = bullata
sapida Briq. (niliaca) = amaurophylla
sapida Malinv. = niliaca
sapida Tausch. = amaurophylla
sardoa Bég. (*intermedia*) 72 (1 β a)
sardoa Briq. (rotundif.) = prec.
sativa L. = verticillata
Schultzii Bout. 78 (X)
seriata Kern. 76 (2 γ b)
Sieberi Reverchon 76 (2 γ d)
silvestris L. = longifolia
similis Dés. et Dur. 74 (X)
sordida Briq. (*longifol.*) 75 (2 α g)
sordida Wimm. (silvestr.) = prec.
spicata Huds., Crantz = viridis
spicata L. = rotundif., longif., viridis
suavis Guss. 78 (X)
subintegra Posp. (*carinth.*) 82 (X)
Timbalii Briq. 73 (X)
tomentella Hoffmgg. et Lk. A 215 (6 v.)
tomentosa Sm. 83 (6 β)
transmota Dés. et Dur. = cuspidata
undulata Schur = Lamarckii
undulata W. 74 (2 α a)
urticæfolia Ten. = pyramid.
velutina Lej. 73 (X)
verticillata L. 80 (X)
viridis L. 77 (3)
viridis L. (spicata) = prec.
viridi X citrata F. Schultz = piperita
vulgaris Bég. (*Puleg.*) 82 (6 α b)
Weiheana Opiz 80 (4 f)
Weinerniana Opiz = sordida
Wildenowii Dés. et Dur. = niliaca
MENTHELLA = Mentha
Requienii Pérard = M. Req.
MENYANTHES II 359 (712)
americana Sweet = trifoliata
natans Lam. = Limnanthemum nymphoides
nymphoides L. = Limnanth. nymph.
palustris S. F. Gray = seg.
MENYANTHES II 359 (712)
trifoliata L. 359, A 165
Trifolium Neck. = prec.
verna Raf. = prec.
MENZIEZIA = Phyllodoce
cærulea Sw. = Ph. cærul.
MERCURIALIS II 291 (651)
ambigua L. 291 (3 β)
annua L. 291 (3)
calabra N. Terr. (*perennis*) 291 (2 α b)
ciliata Presl = annua
corsica Coss. et Kral. 291 (1)
Cynocrambe Scop. = perennis
elliptica Duby = corsica
elliptica Lam., Muell. 291 (1 nota)
Huetii Hanry ⊃ annua
longifolia Host = perennis
longifolia Lam. = annua
nemoralis Salisb. = perennis
ovata Stern. et Hpe. 291 (2 β)
perennis L. 291 (2)
silvatica Hpe. = perennis
MERENDERA = Bulbocodium
Bulbocodium Balb. (non Ram.) = B. vernum
MESEMBRYANTHEMUM I 326 (310)
acinaciforme L. 326 (3)
Bolleanum A. Terr. = edule
crystallinum L. 326 (2)
edule L. 326 (4)
glaciale Haw. = crystallinum
nodiflorum L. 326 (1), A 66
MESPILUS I 596 (468)
Amelanchier L. = Amel. vulgar.
Aria Scop. = Pirus Aria
Aronia W., Spach = Crat. Aronia
Aucuparia All. = Pirus Aucup.
Azarolus All. = Crat. Azar.
Chamæmespilus L. = Pirus Chamæm.
coccinea Marsh. = Crat. cocc.
coccinea W. et K. = Coton. toment.
Cotoneaster L. = Coton. integerrima
Crus-galli Duroi, Marsh. = Crat. Crus-galli
cuneifolia Marsh. = Crat. Crus-galli
domestica All. = Pirus dom.
elegans Poir. = Crat. monogyna
eriocarpa DC. = Coton. toment.
florentina Bert. = Pirus tormin. X Malus
germanica L. 596, A 134
grandiflora Smith = Smithii
integrifolia Wallr. (Oxyac.) = Crat. — integrif.
intermedia Poir. = Crat. — incisa?
Inzengæ Tin. = Crat. Inzeng.
japonica Thunb. = Eriobotrya japon.
laciniata Guss. = Crat. lacin.
laciniata Wallr. (Oxyac.) = Crat. — incisa.
lobata Poir. = Smithii
MESPILUS I 596 (468)
macrocarpa Asch. et Græbn. (Oxyac.) = Crat. macr.
maroccana Poir. = Crat. Azarolus
Maura Poir. = Crat. Azarolus
monogyna All. = Crat. monog.
nebrodensis Bert. = Coton. nummularia
orientalis Mill. = Coton. toment.
Oxyacantha Crantz = Crat. Oxyac.
pauciflora Lam. = Coton. Piracantha
Piracantha L. = Coton. Pirac.
pirifolia Hayne = Smithii
polyacantha Guss. = Crat. triloba
sativa Goir. (*german.*) A 134 (β)
silvestris Goir. (*german.*) A 134 (α)
Smithii Ser. in DC. 596 (nota)
tomentosa Ait. = Coton. tom.
torminalis All. = Pirus torm.
triloba Poir. = Crat. tril.
vulgaris Rchb. = germanica
Watsoniana Spach = Crat. Crus-galli
METABASIS = Hypochæris
ætnensis DC. = H. ætnensis
cretensis DC. = H. cretensis
hymettia DC. = H. — hymettia
neapolitana Nym. = H. pinnatifida
serioloides DC. (creten.) = H. — seriol.
urens DC. (creten.) = H. — urens
MEUM II 170 (563)
adonidifolium J. Gay A 152 (1 β)
anethifolium Gaertn. M. et S. = seg.
athamanticum Jacq. 171 (2)
capillaceum Dulac. = prec.
carvifolium Bert. = Carum carvifol.
corsicum Bert. = Ligusticum cors.
Dalechampii Ten. = Trinia carniolica
Fœniculum Spr. = Fœnicul. vulgare
heterophyllum Mœnch = Falcaria saxifraga
inundatum Spr. = Apium inund.
Mutellina Gærtn. 171 (1), A 151
nodiflorum Baill. = Apium nod.
nudicaule Mœnch = Seseli montan.
nutans Mœnch = Cnidium silaifol.
piperitum Schultes = Fœniculum pip.
pyrenaicum J. Gay = Ligust. pyrenæum
resinosum Baill. = Bonannia græca
rigidulum Bert. = Carum rigidul.

Digitized by Google

MEUM II 170 (563)
segetum Guss. = Ridolfia seg.
siifolium Presl = quid?
Silaus Baill. = Silaus flavescens
MEZEREUM = Daphne
officinarum C. A. Mey. = D. Mezereum
MIBORA I 60 (66)
minima P. B., Desv. 60.
verna P. B. = prec.
MICRANTHEUM = Trifolium
glomeratum Presl = T. glom.
suffocatum Presl = T. suff.
MICROCALA = Cicendia
filiformis Hoffgg. et Lk. = C fil.
pusilla G. Don = C. pus.
MICROCERASUS = Prunus
humilis M. Rœm. = P. hum.
prostrata M. Rœm. = T. prostr.
MICROLONCHUS = Centaurea
cichoraceus C. Koch = C. salmantica
Clusii Spach. = C. salmantica
Duriæi Spach = C. — Duriæi
isernianus J. Gay et Webb = C. isern.
salmanticus DC. = C. salmantica
siculus Guss. p. p. (salmant.) = C. — Duriæi
MICROMERIA = Satureja
angustifolia Benth. (græca) = S. consentina
approximata N. Terr. = S. Juliana
approximata Rchb. = S. fasciculata
canescens Benth. = S. canesc. Guss.
cordata Moris = S. cord.
cosentina N. Terr. = S. consentina
dalmatica Fenzl. (non Benth.) = S. — subnuda
densiflora Benth. (græca) = S. congesta
filiformis Benth. = S. filif.
glabriuscula Benth. (microphylla = S. — glabriusc.
græca Benth. = S. græca
hirsuta Benth. (Juliana) = S. Jul. b canescens
hirsuta Nym. = prec.
inodora Benth. = S. — inod.
Juliana Benth. = S. Jul.
Kerneri Murb. = S. Juliana
longiflora Benth. (græca) = S. consentina
longiflora Tod. ex Nym. = S. longifl.
marifolia Benth. = S. fruticosa
microphylla Benth. = S. micr.
montana Rchb. = S. mont.
nervosa Benth. = S. nerv.
Piperella Benth. = S. Piper.
pygmæa Rchb = S. subspicata
sicula Nym. = S. græca
tenuifolia Benth. = S. congesta
Thymbra Kostel. = S. Thymbra
thymifolia Benth. = S. thym.
thymoides DNtrs. = S. thym.
MICROMERIA = Satureja
variegata Rchb. = S. varieg.
villosa Benth. (microphylla) = S. micr. b. vill.
MICRONEMA = Satureja
Piperella Schott = S. Piper.
MICROPHYTON = Trifolium
glomeratum Fourr. = T. glom.
suffocatum Fourr. = T. suff.
MICROPUS III 271 (878)
bombycinus Lag. 272 (1 β)
discolor Ten. = erectus (α)
discolor B Ten. = multicaulis
discolor Pers. = bombycinus
erectus L. 271 (1)
exiguus Urv. = Evax exigua
multicaulis Fiori (*erectus*) 271 (1 α b)
pygmæus Desf. = Evax pygm.
supinus L. 272 (2)
MICROPYRUM = Nardurus
tenellum Lk. = N. Halleri
MICRORHYNCHUS = Launæa
chondrilloides C. B. Clarke = L. resedifolia
chondrill. Sch. Bip. = Chondrilla prenanthoides
MICROSTYLIS = Malaxis
diphyllos Lindl. = seg.
monophyllos Lindl. = M. monophylla
MIDDENDORFIA = Peplis
borysthenica Trautv. = P. borysth.
hamulosa Trautv. = P. — hamul.
MILIUM I 56 (62)
arundinaceum S. et S. = multiflorum
cærulescens Desf. 56 (3)
capillare Mœnch = Panic. capill.
ciliatum Mœnch = Digitar. ciliaris
colonum Mœnch = Panic. colon.
confertum Guss. = vernale
confertum Mill. (an L.?) = effusum
Crus-Galli Mœnch = Panic. Crus-G.
Dactylon Mœnch = Cynodon Dact.
effusum L. 56 (1), A 14
esculentum Mœnch = Panic. miliaceum
frutescens Sieb. = multiflorum
lendigerum L. = Gastridium lendig.
Montianum Parl. 56 (2 β), A 14
multiflorum Cav. 57 (5), A 14, 208
paniceum Host = Polypog. monspel.
Panicum Mill. = Panic. miliaceum
paradoxum All. = cærulesc.
paradoxum L. 56 (4), A 14
paradoxum Scop. = virescens
scabrum Guss. = Gastridium scabr.
scabrum Rich. in Merlet = vernale
MILIUM I 56 (62)
Schmidtianum C. Koch = effusum
tenellum Cav. = Airopsis tenella
Thomasii Duby A 208 (5 β)
transsilvanicum Schur = effusum
undulatifolium Mœnch = Oplismenus und.
vernale M. B. 56 (2), A 14
virescens Fiori (*paradox.*) A 15 (4 β)
MILLEFOLIUM = Achillea
compactum Fourr. = A. comp.
nobile Fourr. = A. nob.
odoratum Fourr. = A. odor.
officinale Gueld. = A. Millefol.
setaceum Fourr. = A. set.
tomentosum Fourr. = A. tom.
vulgare Gueld. = A. Millefol.
MILLINA = Leontodon
cichoracea Pomel, Endl. = L. cichoraceus
leontodontoides Cass. = prec.
MIMULUS = Rhinanthus
Alectorolophus Scop. = R. Alector.
Crista-Galli Scop. = R. minor
MINÆA = Bivonæa
Prolongi Lojac. = B. Prolongi
Saviana Lojac. = B. Saviana
MINUARTIA = Alsine
fastigiata Rchb. = A. fasciculata
rostrata Rchb. = A. mucronata
MISCOPETALUM = Saxifraga
cernuum S. F. Gray = S. cern.
rotundifolium Haw. = S. rot.
MISTRALIA = Daphne
Gnidium Fourr. = D. Gnid.
MISTYLLUS Presl = Trifolium
spumosus Presl = T. spum.
turgidus Presl = T. vesicul.
MITINA = Carlina
corymbosa Cass. = C. corymb.
lanata Cass. = C. lanata
sulphurea Cass. = C. racemosa
MNEMION = Viola
calcaratum Spach = V. calc.
tenellum Webb = V. parvula
tricolor Spach = V. tric.
MŒHRINGIA I 346 (332)
Burnati Rouy et Fouc. = Tendæ
bavarica Gren. (1841) = sperguloides
bavarica Kern. (1882), Dalla Torre (1884) = Ponæ
bavarico × *muscosa Behrend.* A 70
ciliata G. Beck (polygon.) 347 (4 b) = seg., cfr. A 70
ciliata Dalla Torre A 70 (4)
collina Goir. (*Ponæ*) 347 (2 α b)
collina Gürke (bavarica) = prec.
coronensis Behrend. = bavarico × musc.
crassifolia Rouy et Fouc. 347 (2 α a)
dasyphylla Bruno in Balb. 347 (2 β), A 70

Digitized by Google

MŒHRINGIA I 346 (332)
filifolia G. Beck (*muscosa*) A 70 (3 α c)
frutescens Panizzi = sedoides
glauca Leyb. = glaucovirens
glaucescens Neilr. = Tommasinii
glaucovirens Bert. 347 (3 β)
glaucovirens Tomm. = Tommasinii
intermedia Lois. = dasyphylla
muscosa L. 347 (3), A 70
muscosa Lucé = Sagina procumb.
nodosa Clairv. = Sagina nod.
obtusa Gürke (*ciliata*) A 70 (4 c)
obtusa M. et K. (polygon.) = prec.
papulosa Bert. 347 (2 γ), A 70
pentamera Gr. et Godr. (muscosa) = sperguloides
pentandra J. Gay 347 (1 β)
polygonoides M. et K. 347, A 70 (4 b)
Ponæ Fenzl 347 (2), A 70
Ponæ Loser = Tommasinii
pubescens Hausm. (*trinerv.*) A 70 (1 α b)
radiolata Panc. = trinervia
sedifolia Freyn = Tommasinii
sedifolia W. = sedoides
sedoides Colla 347 (2 β a)
sedoides Cumino (muscosa) = prec.
sperguloides Mutel, Nym. 347 (3 α b)
Tendæ Burn. (*dasyphylla*) 347 (2 β b)
tenuicaulis Rouy et Fouc. = collina
tetramera Fiori (*Ponæ*) A 70 (2 α c)
tetramera Gelmi (bavarica) = prec.
Thomasiana J. Gay = Alsine grineensis
Tommasinii Marches. A 70 (2 δ)
trinervia Clairv. 346 (1), A 70
MŒNCHIA = Cerastium
cerastoides Spr. = C. tetrandrum
erecta Gaertn. M. et S. = C. erect.
filiformis Risso = C. — octandrum
glauca Pers. = C. — octandrum
mantica Bartl. = C. mant.
octandra J. Gay = C. — oct.
quaternella Ehrh. = prec.
MŒNCHIA = Alyssum
aizoides Roth = Draba aiz.
arvensis Bernh. = Chamælina dentata
campestris Roth = A. calycinum
incana Roth = A. incanum.
sativa Roth = Chamælina sativa
saxatilis Schrank = A. montan.
MŒRKENSTEINIA = Senecio
silvatica Opiz = S. silv.
MOLINERIA = Aira
minuta Parl. = A. min.
palustris Tod. = A. minuta
MOLINIA I 78 (101)
altissima Lk. = litoralis
aquatica Wibel = Catabrosa aquat.
arundinacea Schrank 78, A 20 (γ)
depauperata Lindl. A 20 (β)
cærulea Mœnch 79, A 20
capillaris Hartm. = Glyceria distans
distans Hartm. = Glyceria dist.
fluitans Hartm. = Glyceria fluit.
Lightfootii Harz (cærul.) = viridiflora
litoralis Host A 20 (δ)
maritima Hartm. = Glyceria mar.
maxima Hartm. = Glyceria aquatica
minima Burkh. (cærul.) = depauperata
pallida Stebl. et Volk. (cærul.) = viridiflora
parviflora Beck (cærul.) = arundinacea
serotina M. et K. = Diplachne ser.
silvatica Lk. = arundinacea
varia Schrank = cærulea
variabilis Wibel = cærulea
viridiflora Laj. (*cærul.*) A 20 (α b)
MOLLIA = Polycarpon
alsinifolia Spr. = P. alsinef.
polycarpoides Lk. = seg.
Polycarpon Spr. = P. Cupanii
MOLLUGO I 329 (314)
Cerviana Ser. 330 (1)
Glinus A. Rich. = Glinus lotoides
hirta Thunb. = Glinus lot.
lotoides C. B. Clarke = Glinus lot
tetraphylla L. = Polycarpon tetr.
umbellata Ser. = Cerviana
verticillata L. 330 (2)
MOLOPOSPERMUM II 202 (596)
cicutarium DC. = peloponn.
peloponnesiacum Koch 192
MOLPADIA = Buphthalmum
suaveolens Cass. = B. speciosum
MOLTKIA = Lithospermum
graminifolia Nym. = L. suffruticosum
MOLUCELLA III 38 (793)
frutescens L. = Ballota frut.
fruticosa Forsk. = Ballota Pseudo-dictamn.
spinosa L. 38
MOLY = Allium
latifolium S. F. Gray = A. ursinum
speciosum Mœnch = A. multibulbosum
MOMORDICA = Ecballium
elastica Salisb. = seg.
Elaterium L. = E. Elater.
MONERMA = Lepturus
cylindrica Coss. et Dur. = L. cylindr.
MONERMA = Lepturus
monandra P. B. = Psilurus aristatus
subulata P. B. = L. cylindr.
MONESES = Pirola
grandiflora S. F. Gray = P. uniflora
uniflora Alef. = P. unifl.
MONOGINELLA = Cuscuta
Vahliana Des Moul. = C. monogyna
MONORCHIS = Malaxis
monophyllos Mentz. = M. monophylla
MONOTROPA = Hypopithys
flagrans Gilib. = H. multiflora
glabra Bernh. = H. glabra
glabra Roth (Hypopith.) = prec.
hirsuta Horn. = H. multifl. (a)
hirsuta Roth (Hypopith.) = prec.
Hypophagos Dum. = H. glabra
Hypophegea Wallr. = H. glabra
Hypopithys Gærtn. = H. glabra
Hypopithys L. = H. multiflora
Hypoxia Spr. = H. glabra
MONTIA I 329 (313)
alsine-facie Gilib. = minor
ambigua Nic (*font.*) A 66 (α b)
arvensis Wallr. = minor
cæspitosa Mey. (font.) = minor
Chaberti Gandog. = minor
chondrosperma Fenzl (font.) = minor
decumbens St.-Lag. = rivularis
erecta Pers. (font.) = minor
erecta Steud. = prec.
fluitans Wimm. (font.) = rivularis
fontana L. 329, A 66
intermedia Strobl (*rivular.*) A 66 (β b)
linearifolia Urv. = minor
major Schrad. (font.) = rivular.
minor C. C. Gmel. = seg.
minor L. (*font.*) 329 (α), A 66
repens C. C. Gmel. = rivularis
repens Pers. (font.) = seg.
rivularis C. C. Gmel. 329 (β), A 66
terrestris Dum. = minor
verna Neck. = minor
MORÆA = Iris
fugax Ten. = I. Sisyrinchium
sicula Tod. = I. maculata
Sisyrinchium Ker-Gawl. = I. Sisyr.
Tenoreana Sweet = I. Sisyr.
MORGANIA = Simethis
bicolor Bub. = S. Mattiazzi
MORICANDIA I 449 (378)
albiflora Strobl (arv.) = fabariæfol.
arvensis DC. 449, A 97
fabariæfolia Presl (*arv.*) A 97 (b)
MORISIA I 452 (383)
hypogæa J. Gay 452
monantha Asch. = hypogæa

Digitized by Google

MOROCARPUS = Chenopodium
capitatus Scop. = C. cap.
foliosus Mœnch = C. fol.
MORUS I 276 (262)
alba L. 276 (1)
australis Poir. = Broussonetia papyrifera
bullata Balb. = alba (for.)
cucullata Bonaf. = alba (for.)
heterophylla Loud. = alba
Morettiana Lodd. = alba
nigra L. 276 (2)
papyrifera L. = Broussonetia pap.
patavina Hort. = alba
pumila Balb. = alba (for.)
scabra Moretti (non W.) = nigra
siciliana Mill. = nigra
romana Lodd. = alba
silvestris Goir. (*alba*) A 61 (1 var.)
MOSCHARIA = Ajuga
arabica Vitm. = A. Iva
asperifolia Forsk. = A. — asperifol.
Forskalei Gmel. = prec.
pinnatifida Ruiz. et Pav. A 172 (in text.)
MOSCHATELLA = Adoxa
Adoxa Scop. = A. Moschatell.
MOSCHATELLINA = Adoxa
Adoxa All. = A. Moschatellina
fumariæfolia Gilib. = prec.
tetragona Mœnch = prec.
MOUTAN = Pæonia
officinalis Lindl. et Paxt. = P. offic. α fem.
MUEHLENBERGIA = Agrostis
interrupta Steud. = A. interrupta
Spica-venti Trin. = A. Spica-venti
MULGEDIUM III 419 (947)
alpinum Less. 419
macrophyllum DC. 419 (nota)
MUSA I 229 (223)
Ensete J. F. Gmel. 229 (nota)
ornata Roxb. = rosacea
paradisiaca L 229 (1 β)
rosacea Jacq. 229 (nota)
sapientum L. 229
MUSCARI I 191 (192)
acutilobum Bert. = commutatum
albiflorum Parl. (*racemos.*) A 48 (6 α c)
albovirens Nym. 193 (5 b)
alpinum Fiori (*racemos.*) A 48 (6 α b)
ambrosiacum Mœnch = moschatum
atlanticum Boiss. et Reut. = neglectum
autumnale Guss. = parviflorum
botryoides Mill. 193 (7)
Calandrinianum Kern. = comosum, cfr. 192 (nota)
castrovillarense N. Terr. (comos.) = Holzmanni
ciliatum Ker-Gawl. = Hyacinth. cil.
Clusianum C. Koch A 48 (2 α c)
MUSCARI I 191 (192)
commutatum Guss. 193 (5)
comosum Mill. 192 (2), A 48
comos. × *Hyac. romanus Caruel* 191
compactum Jord. = M. racemosum
Courtilleri Bor. = comosum
Cupanianum Gerb. et Tar. = marit.?
filifolium Whlnb. = parviflorum
flavum Sims (*moschatum*) 192 (1 β), A 207
Gussonei Nym. 193 (3 β)
Gussonei Tod. ex Nym. = racemosum
Holzmanni Freyn 192 (2 β), A 48
Kerneri Marches. 194 (7 β)
La-Farinæ Tin. 193 (5 b)
Lelievrii Bor. = botryoides (for.)
Levieri Heldr. = botryoides
longifolium Rigo A 48 (7 γ)
longissimum Medic. = comosum
luteum Tod. = flavum
macrocarpum Sweet = flavum
maritimum Desf. 192 (3)
maritimum Guss. = Gussonei
monstrosum Mill. 192 (nota)
moschatum W. 192 (1), A 207
Muscari Asch. et Græbn. = moschatum
Muscarimi Medic. = prec.
neglectum Guss. 193 (6 β)
nephrocarpon Posp. (*comos.*) A 48 (2 α b)
paniculatum Medic. = monstrosum
parviflorum Desf. 193 (4)
parviflorum Rod. et Ven. = botryoides?
pyramidale Tausch 192 (2 δ)
racemosum Mill. 193 (6)
segusianum Perr. et Song. A 48 (2 α d)
speciosum Marches. (neglect.) = neglectum (for.)
Strangwaysii Ten. = botryoides
tenuiflorum Fiori (comos.) 192 (2 γ) = constrictum cfr. A 48
tenuiflorum Tausch A 48
tubiflorum Stev. = tenuiflor.
MUSCARIA = Saxifraga
acaulis Haw. = S. pygmæa
atropurpurea Haw. = S. atropurp.
cæspitosa Haw. = S. pygmæa
crocea Haw. = S. crocea
elongella Haw. (muscoid.) = S. — laxa
muscoides Haw. = S. moschata
stenopetala Haw. = S. aphylla
MUSCIPULA = Silene
australis Fourr. = S. muscipula
portensis Fourr. = S. portensis
MUTELIA = Melissa
officinalis Gren. = M. offic.
MYAGRUM I 453 (388)
Alyssum Mill. = Chamælina dentata
amphibium Lois. = Nasturt. amph.
amplexicaule Mœnch = perfol.
aquaticum Lam. = Nasturt. amphib.
asperum Poir. = Bunias Erucago
auriculatum DC. = Cochlearia auric.
austriacum Jacq. = Nasturt. austr.
balearicum Lam. = Succowia bal.
Bauhini Gmel. = Chamælina fœtida
biarticulatum Crantz = Rapistrum perenne
bursifolium Thuill. = Calepina Corv.
clavatum Lam. = Bunias Eruc.
clavatum Poir. = Rapistrum rugos.
Crantzii Vitm. = Nasturt. austriac.
dentatum W. = Chamælina dent.
denticulatum Mass. = Chamælina sativa
erucæfolium Vill. = Calepina Corv.
Erucago Lam. = Bunias Eruc.
erucoides Pourr. = Calepina Corv.
glabrum Gilib. = Chamælina sat.
hispanicum L. = Rapistrum hisp.
iberioides Brot. = Calepina Corv.
irregulare Asso = Calepina Corv.
litorale Scop. = perfol.
monospermum Forsk. = Rapistrum rugos.
orientale L. = Rapistrum or.
palustre Lam. = Nasturt. pal.
paniculatum L. = Neslea pan.
perenne L. = Rapistrum per.
perenne Scop. = Rapistrum rugos.
perfoliatum L. 454
pinnatifidum Ehrh. = Chamælina pinn.
procumbens Pourr. = Rapistrum hirsutum
pumilum Lam. = Nasturt. palustre
pyrenaicum Lam. = Nasturt. pyr.
rigidum Pall. = Euclidium syriacum
rostratum Scop. = Euclidium syriacum
rugosum Gilib. = Neslea panic.
rugosum L. = Rapistrum rugosum
rugosum Vill. = Calepina Corv.
sativum Cav. = Chamælina silvestris
sativum L. = Chamælina sat.
saxatile L. = Cochlearia sax.

Digitized by Google

MYAGRUM I 453 (388)
sphærocarpum Jacq. = Crambe hispan.
syriacum Lam. = Euclidium syriacum
utriculatum Berg. = Vesicaria utric.
venosum Pers. = Rapistrum glabrum
verrucosum Lam. = Ochthodium ægypt.
MYANTHE = Ornithogalum
arabica Salisb. = O. arabicum
MYCELIS = Lactuca
angulosa Cass. = L. muralis
muralis Rchb. = L. muralis
MYCONIA = Chrysanthemum
Chrysanthemum Sz. Bip. = Ch. Myconis
MYGALURUS = Vulpia
alopecuroides Lk. = V. Alopecurus
bromoides Lk. = V. dertonensis
caudatus Lk. = V. myurus
geniculatus Lk. = V. genic.
uniglumis Lk. = V. unigl.
MYLINUM = Selinum
Carvifolia Gaud. = S. carvifolium
MYOBROMA = Astragalus
caprina Stev. = A. capr.
exscapa Stev. = A. exsc.
MYOGALUM = Ornithogalum
Boucheanum Kth. = O. Bouch.
nutans Lk. = O. nutans
MYOSOTIS II 369 (719)
adpressa Stokes = palustris
alpestris Schmidt A 166 (3 γ)
alpina Lap. = pyrenaica
ambigens Bég. (*pyrenaica*) A 166 (1 β)
annua Mœnch = arvensis
apennina Bég. (sicula) = seg.
apennina Fiori (*pseudo-cæspit.*) A 166 (1 γ b)
aprica Opiz = collina
apula L. = Lithosperm. apul.
arenaria Schrad. = stricta
arvensis Lam. 370 (4), A 167
arvens. L. (scorp.) = prec.
arvensis Lk. = collina
Balbisiana Jord. 371 (5 b)
cæspitosa Auct. it. = pseudo-cæspit.
cæspitosa Schultz 369, A 166 (1 δ)
caprariæ Bég. (*versicolor*) A 167 (5 β)
carnica Opiz = suaveolens
collina Ehrh. (scorp.) = versicolor
collina Hoffm. 371 (4 β), A 167
collina var. Huet exs. = gracillima
coronaria Dum. = palustris
cyanea Boiss. et Heldr. = Gussonei
deflexa Whlnb. = Lappula deflexa
elatior Opiz A 165 (1 β b)
elongata Strobl 370 (3 β) = Gussonei, cfr. A 166
exscapa DC. (*pyren.*) 370 (3 α b), A 166
MYOSOTIS II 369 (719)
gracillima Losc. et Pard. A 167 (4 β b)
grandiflora Bég. (*Gussonei*) A 166 (3 ε a)
Gussonei Bég. = seg.
Gussonei Nic. (silvat.) = seg.
Gussonei Zodda (*pyren.*) A 166 (3 ε)
hispida Schlecht. = collina
humilis Ten. (silvat.) = pyrenaica (var.)
incrassata Guss. 370 (2 b), A 166
intermedia Lk. 371 (4 α)
lactea Bænn 370 (3 γ c)
lactea Bor. = Soleirolii
Lappula L. = Lappula Myosotis
laxiflora Rchb. = palustris
lingulata R. et S. = cæspitosa
lithospermifolia Guss. = elongata
lithosperm. Horn. = seg.
lithosperm. W. (scorp.) = suaveolens
lutea Balb. = Balbisiana
lutea Lam. = Lithosperm. apulum
Marcillyana Burn. in Bég. A 167 (4 δ)
macrantha Fiori (cæspitosa) 369 (1 β b) = seg.
macrantha Fiori (*pseudo-cæspit.*) A 166 (1 γ a)
major Caruel (arvensis) = intermedia
marginata Soleir. hb. = Soleirolii
memor Kitt. (*palustr.*) A 165 (1 α)
micrantha Fiori (*silvat.*) 370 (3 γ b)
micrantha Fiori (*strigul.*) A 165 (1 β c)
micrantha Guss. (non Pall.) = sicula
minor Caruel (arvensis) = collina
montana Bess. = silvatica
montana M. B. = suaveolens
nana Amann in L., All., Vill. = Eritrichium nanum
nana Mieg. = intermedia
nana Wulf. = Eritrichium tergloviense
nemorosa Bess. = palustris
obtusa W. K. = Anchusa Barrelieri
odorata Poir. = pyrenaica
palustris Guss. = ps.-cæspit.
palustris Lam. 369 (1), A 165
palustr. L. (scorpioides) = prec.
parviflora Bég. (*Gusson.*) A 166 (3 ε b)
parviflora Celak. (*palustr.*) 369, A 165 (1 α b)
parviflora Strobl (elong.) 370 (3 β b) = Gusson. b. parvifl.
pseudo-cæspitosa Bég. (strigul.) = seg.
pseudo-cæspit. Fiori (*palustr.*) A 166 (1 γ)
pusilla Guss. = incrassata
MYOSOTIS II 369 (719)
pusilla Lois. 370 (2), A 166
pyrenaica Pourr. 370 (3), A 166, 215
repens Rchb. = palustris
rupicola Sm. = alpestris
scorpioides L. = palustris et arvensis
sicula Fiori p. p. (palustr.) 370 = apennina
sicula Guss. 370, A 166 (1 ε)
silvatica Guss. = parviflora Strobl
silvatica Hoffm. 370, A 166 (3 ζ)
Soleirolii Gr. et Godr. A 166, 215 (3 η)
sparsiflora Mik. A 167
sparsiflora Zum. = intermedia?
squarrosa M. B. = Lappula patula
squarrosa Retz. = Lappula squarr.
stricta Lk. 371 (4 γ), A 167
strigulosa Rchb. 369, A 165 (1 β)
suaveolens W. et K. 370, A 166 (3 δ)
tenella Bonn. et Layens (non Nutt.) = Marcilliana
tergloviensis Hacq. = Eritrichium tergl.
umbrosa Nym. = intermedia
versicolor Pers. (arvens.) = seg.
versicolor Sm. 371 (5), A 167
virgata Bég. (*sicula*) A 166 (1 ε b)
vulgaris DC. (pal.) = palustris (α)
MYOSOTIS = Cerastium
lanata Mœnch = C. tomentosum
linearis Mœnch = C. arvense
repens Mœnch = C. repens
semidecandra Mœnch = C. sem.
vulgaris Mœnch = C. glomerat.
MYOSOTON = Malachium
aquaticum Mœnch = M. aquat.
MYOSURUS I 499 (427)
cauda-muris Neck = minim.
europæus S. F. Gray = minim.
minimus L. 499, A 104
scaposus Gilib. = minim.
MYRIADENUS = Inula
glutinosus Cass. = I. viscosa
MYRICARIA I 382 (349)
alopecuroides Schrenk = german.
bracteata Royle = german.
germanica Desv. 382, A 80
Hoffmeisteri Klotzsch = prec.
squamosa Desv. 382 (β), A 80
MYRIOPHYLLUM II 136 (533)
alterniflorum DC. 136 (1 β)
intermedium Koch (*verticill.*) 136 (2 b)
pectinatum DC. 136 (2 c)
pinnatifidum Wallr. (verticill.) = verticill. (α)
spicatum L. 136 (1)
siculum Guss. 136 (2 d)
verticillatum L. 136 (2), A 148
MYRIOPTERIS = Cheilanthes
Szovitsii Sm. = Ch. Szov.

Digitized by Google

MYRRHINA = Erodium
alpina Rupr. = E. alp.
inodora Rupr. = E. cicutarium
MYRRHIS II 197 (588)
alpina Steud. = Anthriscus silvestris
ammoides Spr. = Bunium flexuosum
aromatica Spr. = Chæroph. arom.
aurea All. = Chæroph. aur.
australis All. = Scandix austr.
bulbosa All. = Chæroph. bulb., Anthrisc. Candollei
Bunium Spr. = Bunium flexuosum
capillifolia Guss. = Bunium capillifol.
chærophyllæa Lam. = Anthrisc. vulgaris
Cicutaria Spr. = Chæroph. Cicutar.
Cicutaria Ten. = Chæroph. calabricum
cynapioides Guss. = Bunium cynap.
hirsuta All. = Chæroph. hirs.
magellensis Bert. = Chæroph. magell.
nodosa Lam. = Physocaulis nod.
odorata Scop. 197, 493, A 153
Pecten-Veneris All. = Scandix Pect.-Ven.
pyrenaica Spr. = Bunium flexuosum
scabra Spr. = Torilis Anthriscus
silvestris Spr. = Anthriscus silv.
sulcata Lag. = odorata
temula All. = Chæroph. temul.
temulenta Sm., Bert. = prec.
tenerrima Presl = Bunium flexuosum
Villarsii Bert. = Chæroph. Villarsii
MYRSIPHYLLUM = Asparagus
asparagoides W. = A. medeoloides
MYRTILLUS = Vaccinium
niger Gilib. = V. Myrtillus
silvaticus Drej. = prec.
uliginosus Drej. = V. ulig.
MYRTUS II 126 (522)
acuta Mill. = lusitanica
bœtica Mill. = romana
communis L. 126, A 145
italica L. (*comm.*) 126 (α c)
italica Mill. = prec.
latifolia Wk. et Lge. (comm.) = romana
leucocarpa Ten. (*comm.*) 126 (α d)
lusitanica L. (*comm.*) 126 (α b)
lusitanica W. = prec.
microphylla Wk. et Lge. (*communis*) A 145 (α e)
romana Hoffmgg. = seg.
romana L. (*comm*) 126 (α a)
tarentina L. (*comm.*) 126 (β), A 145
tarentina Mill. = prec.
MYSCOLUS = Scolymus
grandiflorus D. Dietr. = Sc. grand.
hispanicus D. Dietr. = Sc. hisp.
megacephalus Cass. = Sc. grandiflorus
microcephalus Cass. = Sc. hispanicus

NAJAS I 157 (163)
alagnensis Masé = intermedia
alagnensis Paglia = minor
alagnensis Pollini = graminea
dichotoma Roxb. = minor
fluvialis Thuill. A 40 (1 α b)
fluviatilis Poir. in Lam. = marina (α)
fragilis Del. = minor
fucoides Griff. = marina (α)
graminea Del. 158 (8)
heteromorpha Griff. = minor
intermedia Ces. P. et G. (*minor*) 157 (2 b)
intermedia Wolfg. A 40 (1 β)
latior Muell. = marina
levis DC. (major) = fluvialis
major All. = marina
marina L. 157 (1)
marina L. var. = minor
microphylla Rchb. = Ceratophyll. demers.?, cfr. A 40
minor All. 158 (2)
monosperma W. = marina (α)
Morsus-ranæ Suffr. = Hydrocharis Mors.-ranæ
muricata Del. A 40 (1 γ)
muricata Thuill. = marina (α)
polonica Zalew. = marina
seminuda Griff. = graminea
serristipula Auct. 158 (nota)
serristipula Maxim. = graminea
subulata Thuill. = minor
tenuifolia Asch. (non R. Br.) = gramin.
tetrasperma W. = marina (α)
vallisnerioides Griff. = graminea
NANANTHEA III 245 (870)
perpusilla DC. 245
NAPELLUS = Aconitum
vulgaris Fourr. = A. Napellus
NAPUS = Brassica
Agriasinapis Schimp. et Spenn. = B. Sinapistrum
campestris Id. = B. camp.
Leucosinapis Id. = Sinapis alba
oleifera Id. = B. campestris
oleracea Id. = B. oler.
Rapa Id. = B. Rapa
Villarsii Id. = B. monensis
NARCISSUS I 213 (215)
æquilimbus Nym. = serotinus
albulus Lev. = Barlæ
amplus Salisb. = Ps.-Narc. × poeticus
anceps DC. = papyraceus
angustifolius Curt. A 208 (6 β)
Aschersonii Bolle 216 (4 ε)
aureus Lois. 215 (8 γ), A 50
aureo × Bertolonii Paolucci = aureus
autumnalis Lk. 214 (1 β)
Barlæ Parl. 217 (5 ζ), A 50
NARCISSUS I 213 (215)
Bernardi DC. = Ps.-Narc. × poeticus
Bertolonii Parl. 215 (8 β)
Biancæ Tod. = Tazetta
Bicchianus Parl. = Tazetta
biflorus Curt. = poetico × Tazetta
canaliculatus Guss. = Tazetta
Cocconii Paolucci = Tazetta
conspicuus Salisb. = Ps.-Narc. × Jonquilla
cothurnalis Salisb. = poet. × Tazetta
Cupanianus Guss. = autumnalis
Cupanianus Req., Grech-Del. = serotinus
cupularis Bert. 215 (8), A 50
cupularis Pucc. exs. = tenuior
Cypri Haw. 216 (4 ε b)
dalmaticus Hort. pat. ex Vis. = poet. × Tazetta
dubius Gouan 216 (5), A 50
elatior Haw. = Ps.-Narc. × Jonquilla
elatus Guss. = Cypri
elegans Spach = autumnalis
etruscus Parl. = patulus
festalis Salisb. = Pseudo-Narcissus
flavus Lag. = cupularis
flore-pleno Parl. (*Ps.-Narciss.*) 217 (7 b)
formosus N. Terr. = orientalis
Gennarii Parl. = papyraceus?
glaucifolius Pourr. = patulus?
Gouani Roth = Ps.-Narc. × poeticus
grandicrenatus Parl. = Tazetta
Grenieri Richter = poet. × Tazetta
incomparabilis Curt. = Ps.-Narc. × poeticus
intermedius Lois. 214 (×)
italicus Bianca = Tazetta
italicus Ker-Gawl. 216 (×)
italicus Ten. = orientalis
Jonquilla L., 214 (2), A 50
jonquilloides W. (non Wk.) = juncifol.
juncifolius Req. ex Lag. 214 (2 β)
juncifolius Salisb. = Jonquilla
ledroensis Evers 217 (6 α b)
lobatus Lam. = Ps.-Narc. × Jonquilla
longipetalus Schleich. exs. = angustifolius
Macleaii Lindl. = Ps.-Narc. × poet.
majalis Curt. = poeticus
major Ten. (non L.) = Pseudo-Narcissus
medio-luteus Mill. = poet. × Tazetta
medius Rœm. = Jonquilla
multiflorus Spach = aureus
neglectus Ten. = Tazetta
niveus Lois. = papyraceus
niveus Panizzi exs. = Panizzianus
obliquus Guss. 216 (×)

Digitized by Google

NARCISSUS I 213 (215)
odorus Gouan = Ps.-Narc. × poeticus
odorus L. = Ps.-Narc. × Jonquilla
odorus β L. = Ps.-Narc. × poeticus
orientalis L. 216 (4 δ)
pallidus Lam. = dubius
Panizzianus Parl. 216 (5 ε)
papyraceus Ker-Gawl. 216 (5 γ), A 50
parvicorona Rœm. = Jonquilla
patulus Lois. 215 (4 β)
poetarum Haw. = poeticus (for.)
poeticus L. 217 (6), A 50, 208
poet. × Ps.-Narcissus Gren. = Ps.-Narc. × poet.
poet. × Tazetta Henon 217 (×), A 50
pollinensis N. Terr. 217 (6 β b), A 50
polyanthos Lois. 216 (5 β)
præcox Ten. = italicus
Pseudo-Narcissus L. 217 (7)
Pseudo-Narc. × Jonquilla Herb. et Trev. 217
Pseudo-Narc. × poeticus Bout. et Bern. 217 (×), A 50
Puccinellii Parl. = tenuior
pumilus Red. = juncifolius
pusillus Rœm. = juncifolius
radiiflorus Salisb. 217 (6 β) = angustifol., cfr. A 208
remopolensis Panizzi 215 (4 γ)
Requienii Rœm. = juncifolius
Ricasolianus Parl. = patulus
Sequentiæ Tod. A 50
serotinus L. 214 (1)
siculus Parl. = Tazetta
similis Rœm. = Jonquilla
spiralis Fisc. et Mey. = serotinus
spiralis Parl. = Tazetta
stellatus var. a DC. = papyraceus
subdiscolor DC. (stellatus) = italicus
syracusanus Tod. A 50
Tazetta L. 215 (4)
Tazetta L. p. p. = dubius
Tazetta × poeticus Gren. et Godr. = poet. × Tazetta
Tenorei Parl. = orientalis
tenuior Curt. 215 (×)
Tinei Tod. = patulus
unicolor Ten. 216 (5 δ), A 50
varians Guss. = Tazetta
vergellensis Parl. = patulus
NARDOSMIA = Petasites
denticulata Cass. = P. fragrans
fragrans Rchb. = P. fragrans
racemosa Pasq., Nym. = P. — racem.
NARDURUS I 95 (117)
aristatus Boiss. (Poa) = festucoides
aristatus Boiss. (unilateralis) = hispanicus
aristatus Wk. et Lge. (Lachenalii) = festucoides
biuncialis Fiori (marit.) A 204 (1 b)
NARDURUS I 95 (117)
biuncialis Fiori (unilater.) 95 (1 b) = prec., cfr. A 204
Festuca Fiori (Halleri) 96 (2 b)
festucoides Fiori (Halleri) 96 (2 c)
Halleri Fiori 96 (2), A 29
hispanicus Fiori (marit.) A 204 (1 a)
Lachenalii Godr. = Halleri
maritimus Fiori A 204 (1)
Poa Boiss. = Halleri
ramosus Parl. (Poa) = Festuca
tenellus Parl., Duv.-Jouv. = Halleri
tenellus Rchb. = maritimus
tenuiflorus Boiss. 95 (1 c) = hispanicus, cfr. A 204
unilateralis Boiss., Fr. 96, A 29, 204 (1 c)
NARDUS I 102 (122)
aristata L. = Psilurus aristat.
incurva Gouan = Psilurus aristat.
stricta L. 102
NARTHECIUM I 176 (177)
alpinum Michx. = Tofieldia calycul.
anthericoides Hpe. = ossifragum
boreale Whlnb. = Tofieldia palustris
calyculatum All. = Tofieldia calycul.
corsicum Le Grand = Reverchoni
flavescens Whlnb. = Tofieldia calyculata
iridifolium Vill. = Tofieldia calyculata
ossifragum Huds. 177
Reverchoni Celak. 177 (β), A 44
NASSELLA A 14
trichotoma Hack. A 14
NASTURTIOIDES = Lepidium
inconspicuum Medic. = L. ruderale
NASTURTIOLUM = Coronopus
castratum Medic. = C. didymus
montanum S. F. Gray = Hutchinsia petræa
pinnatum Mœnch. = C. didymus
NASTURTIUM I 435 (369)
alpinum Crantz = Hutchinsia alp.
amphibium R. Br. 436 (6), A 92
amph. × silvestre Asch. 436, A 92
anceps DC. = amphib. × silvestre
aquaticum Whlnb. = officinale
Armoracia Fr. 437 (7)
armoracioides Tausch 436 (6 γ)
arvense Læst. = palustre
asarifolium Kralik (offic.) A 92 (1 c)
asperum Boiss. 435 (2)
astylon Rchb. = austriacum
austriacum Crantz 436 (6 β)
Boissieri Coss. = asperum
Bursa-pastoris Roth = Capsella Burs.-past.
NASTURTIUM I 435 (369)
crispum Medic. = Lepidium sativ.
diandrum Mœnch = Lepidium Iberis
diversifolium Wall. = palustre
Draba Crantz = Lepidium Draba
fluviatile Bert. 436 (6 α c)
fontanum Asch. = officinale
Halleri Andrz. = Arabis Halleri
heterophyllum D. Don = palustre
Iberis Gærtn. = Lepidium Iberis
indivisum DC. (amphib.) = amphib. (α a)
laxum Rikli (palustre) A 92 (1 δ for.)
lippizense DC. 435 (4), A 92
microphyllum Bœnn. A 92 (1 d)
Morisonii Tausch 435 (3 c)
nebrodense Raf. = Lepidium nebr.
officinale R. Br. 435 (1), A 92
ovirense Andrz. = Arabis ovir.
palustre DC. 436 (6 δ), A 92
paniculatum Crantz = Neslea panic.
parvifolium Peterm. A 92 (1 c)
petræum Crantz = Hutchinsia petræa
pinnatifidum Tausch (terrestre) = amphib. × silv.
pusillum DC. (palustre) A 92 (1 δ b)
pyrenaicum R. Br. 436 (5)
ramosissimum Læst. = palustre
rivulare Rchb. 435 (3 b)
roseum M. Gortani (offic.) = Cardamine — erubescens, cfr. A 93
ruderale Scop. = Lepidium ruderale
sativum Mœnch = Lepidium sativum
saxatile Crantz = Cochlearia saxat.
siifolium Rchb. 435 (1 b)
silvestre R. Br. 435 (3)
silvestri × amphib. Rouy et Fouc. = amph. × silv.
terrestre R. Br. = palustre
Thalianum Andrz. = Arabis Thaliana
variifolium DC. (amphib.) 436 (6 α b)
verrucarium Gars. = Senebiera procumb.
Wulfenianum Host = lippizense
NATRIX = Ononis
fruticosa Mœnch = O. frut.
pinguis Mœnch = O. Natrix
rotundifolia Mœnch = O. rotund.
NAUPLIUS = Asteriscus
aquaticus Cass. = A. aquat.
maritimus Cass. = A. mar.
NAVIDURA = Lathyrus
tingitana Alef. = L. tingit.

Digitized by Google

NECKERIA = Corydalis
capnoides Neck. = C. lutea
lutea Neck. = C. lutea
NECTALISMA = Alisma
natans Fourr. = A. nat.
NECTAROBOTHRIUM = Lloydia
Redowskianum Schl. et Cham. = L. serotina
striatum Led. = L. serotina
NECTAROSCILLA = Scilla
hyacinthoides Parl. = S. hyac.
NECTAROSCORDIUM = Allium
siculum Lindl. = A. sicul.
NEESIA = Diotis
maritima Spr. = D. mar.
NEGUNDO = Acer
aceroides Mœnch = A. Negundo
fraxinifolium Nutt. = prec.
Fraxinus Bourg. = prec.
virginianum Medic. = prec.
NEMAUCHENES = Crepis
aculeata Cass. = C. aspera
aspera Steud. = prec.
NEMOCHARIS = Scirpus
radicans Beurl. = S. radic.
silvatica Beurl. = S. silvat.
NEMOCTIS = Daphne
angustifolia Raf. = D. oleoides
buxifolia Raf. = D. oleoides
NENUPHAR = Nuphar
luteum Hayne = N. luteum
NEOGAYA = Pachypleurum
simplex Meissn. = P. simpl.
NEOTTIA I 251 (242)
abortiva Clairv. = Limodorum abort.
abortiva L. = Limodorum abortivum
æstivalis DC. = Spiranthes æst.
autumnalis Ten. = Spiranthes autumn.
cordata Rich. = Listera cord.
latifolia Rich. = Listera ovata
macrostelis Peterm. = Nidus-avis
Nidus-avis Rich. 251
ovata Bluff et Fing. = Listera ovata
repens Sw. = Goodyera rep.
spiralis α W. = Spiranthes autumn.
spiralis γ W. = Spir. æstivalis
NEOTINEA = Orchis
intacta Rchb. f. = O. intacta
NEOTTIDIUM = Neottia
Nidus-avis Schlecht. = N. N.-avis
NEPETA III 23 (785)
acerosa Webb = Apulei
agrestis Lois. 25 (7)
angustifolia Mill. = Nepetella
Apulei Ucria 24 (2)
argutidens Briq. (Nepetella) 25 (6 c)
austriaca Host = Nepetella
Balbisii Colla = quid?
Cataria L. 25 (5)
citriodora Dum., Becker = Cataria
croatica Spr. = Satur. thymifolia
delphinensis Mutel = Nepetella
NEPETA III 23 (785)
foliosa Moris 25 (8)
glabrata Guss. (graveolens) = seg.
glabrata Guss. (Nepetella) 25 (6 b)
Glechoma Benth. = Glechoma hederacea
graveolens Vill. = Nepetella
hederacea Trevis. = Glechoma hed.
hirsuta Jan (non L.) = tuberosa
humilis Salisb. = Nepetella
italica L. 24 (3), A 172
lanceolata Lam. = Nepetella
lanceolata Salis, Kral. = agrestis
macrostachya Jan = italica
marrubioides W. = italica
minor Mill. = Cataria
mollis Salisb. = Cataria
montana Turra = nuda
Nepetella L. 25 (6)
nuda Auct. pl. = pannonica
nuda L.?, Jacq. 24 (4)
nuda S. et S. = violacea?
orientalis Mill. = italica
paniculata Mill. = Nepetella
pannonica Jacq. (an L.?) 24 (4 β)
pumila Spr. = Satur. thymifolia
teucrioides Lam. = italica
tomentosa Vitm. = Cataria?
tuberosa Desf. = Apulei
tuberosa L. 23 (1)
violacea Vill., Rchb. (an L.?) 24 (4 γ)
vulgaris Lam. = Cataria
NEPHELOCHLOA = Sphenopus
breviglumis Trautv. = S. divaricatus
NEPHRODIUM I 8 (7)
affine Fiori (Fil.-mas) A 3 (3 d)
Bertolonii Fiori (rigid.) A 3 (5 var.)
calabrum N. Terr. (spinul.) A 3 (6 for.)
crenatum Fiori (Fil.-mas) 8, A 3 (3 b)
cristatum Michx. 8 (4), A 3
deltoideum Fiori (dilat.) A 3 (6 β a)
deorso-lobatum Fiori (Fil.-mas) A 3 (3 c)
dilatatum Desv. 9 (6 β), A 3
distans Ces. P. et G. A 3 (3 var.)
Dryopteris Michx. = Polyp. Dryopt.
dumetorum Fiori (dilat.) A 3 (6 β c)
erosum Fiori (spinul.) A 3 (6 for.)
Filix-mas Rich. 8 (3), A 3, 202
germanicum Fiori (rigid.) A 3 (5 α a)
glandulosum Fiori (Fil.-mas) 8, A 3, 202 (3 e)
gracile E. Petit (spinul.) A 3 (6 for.)
NEPHRODIUM I 8 (7)
Heleopteris Fiori (Fil.-mas) A 3 (3 g)
heterolobum Fiori (Fil.-mas) A 3 (3 for.)
Hypodematium Fiori (rigid.) A 3 (5 var.)
incisum Fiori (Fil.-mas) = affine
meridionale Fiori (rigid.) A 3 (5 α b)
montanum Baker = Oreopteris
nevadense Fiori (rigid.) A 202 (5 α c)
oblongum Fiori (dilat.) A 3 (6 β b)
Oreopteris Kth. 8 (2)
paleaceum Fiori (Fil.-mas) 8, A 3 (3 f)
pallidum Bory et Ch. 9 (5 β), A 3
pusillum Fiori (rigid.) A 202 (5 α d)
Phegopteris Prantl = Polyp. Pheg.
rigidum Desv. 9 (5), A 3, 202
Robertianum Prantl = Polyp. Robert.
Rogœtzianum Fiori (Thelypt.) A 201 (1 b)
Rostani Fiori (Fil.-mas) A 3 (3 for.)
rufidulum Michx. = Woodsia ilvensis (α)
spinulosum Stremp. 9 (6), A 3
subintegrum Fiori (Fil.-mas) A 3 (3 a)
tanacetifolium Ces. P. et G. (spinul.) = dilatatum
Thelypteris Stremp. 8 (1), A 3, 201
NERIUM II 342 (699)
albiflorus Fiori (Ol.) 342 (b)
flore-pleno DC. (Ol.) 342 (c)
floridum Salisb. = seg.
lauriforme Lam. = seg.
Oleander L. 342
NESLEA I 464 (401)
apiculata Fisch. = seg.
paniculata Desv. 464
NEUBECKIA = Iris
scorpioides Alef. = I. planifolia
NEUMAYERA = Alsine
austriaca Rchb. = A. austr.
Villarsii Rchb. = A. Vill.
NICANDRA II 404 (746)
physaloides Gærtn. 404
NICOTIANA II 396 (740)
alba Mill. 397 (3 ζ b)
albiflora Dun. (frutic.) = alba
alipes Schrank (Tabac.) = virginica
angustifolia Dun. (frutic.) = seg.
angustifolia Ehrh. 397 (3 a)
arborea Dietr. = glauca
asiatica Schrank (rustica) 396 (2 γ)
attenuata Schrank (Tabac.) = angustifol.
auriculata Bertero = brasil. × havan. × latiss.

Digitized by Google

NICOTIANA II 396 (740)
brasilia Schrank (rustica) = rugosa
brasiliensis Comes (*Tabac.*) 397 (3 γ)
brasil. × *havanensis Comes* 397 (3 γ)
brasil. × *havan.* × *latiss Comes* 397 (3 γ)
bullata Hort. = asiatica
calyciflora Caille = frut. × latiss. b. purp.
chinensis Fisch. = fruticosa
decurrens Comes (*glauca*) 396 (1 b)
Forsteri R. et S. = fruticosa
frutescens Lag. = fruticosa
fruticosa L. 397 (3 ζ)
frutic. × *latiss.* × *havan. Comes* 397 (ζ)
gigantea Hort., Led. = latissima
glauca Grah. 396 (1)
glaucophylla Grah. = decurrens?
gracilipes Schrank (Tabac.) = angustifol.
havanensis Lag. 397 (3 β)
humilis Lk. (non Ehrh.) = seg.
humilis Schrank (rustica) = pumila
lancifolia W. = angustifol.
latissima Mill. 397 (3 α)
Lehmanni Agardh. = fruticosa
lingua Schrank (Tabac.) = frut. × latiss. b. purp.
loxensis H. B. et K. 397 (3 ε b)
macrophylla Schrank (Tabac.) = latissima
macrophylla Spr. = prec.
marylandica Schübl. = latissima
maxima Hoffm. = latissima
nepalensis Lk. et Otto = frut. × latissima
pallescens Schrank (Tabac.) = virgin. × havan.
petiolaris Schlech. = frutic. × latiss. × havan.
pilosa Dun. = frut. × latissima b. purp.
pumila Cav. 396 (2 δ)
purpurea Hort (*Tabac.*) 393 (3 α b)
pusilla Pav. (non L.) = pumila
rugosa Mill. 396 (2 β)
rustica L. 396 (2)
senegalensis Hort. = texana
serotina Schrank (Tabac.) = frut. × latissima
sibirica Hort. = asiatica
subcordata Sendtn. (Tabac.) = frut. × latiss. × havan.
Tabacum L. 396 (3)
tatarica Hort. = asiatica
texana Naud. 396 (2 α)
turcica Hort. = asiatica
Verdon Schrank (Tabac.) = frut. × latiss. × havan.
virginica Agardh. 397 (3 δ)
ybarrensis H. B. et K. = angustifolia
NICOTIDENDRON = Nicotiana
glauca Griseb. = N. glauca
NIGELLA I 519 (435)
ægusina Tin. ex A. Terr. = divaricata Beaupré?
africana Brand (*damascena*) A 107 (1 e)
agrestis J. et C. Presl = arvensis
amœna Salisb. = hispanica
arvensis L. 520 (3), A 108
arvens. × divaricata Pau = gallica
Bourgæi Jord. = minor
cærulea Lam. = damascena
Catenæ Ten. et Guss. 520 (3 β b)
confusa Salle = gallica
crassifolia A. Terr. (arvens.) = divaricata Beaupré
damascena L. 519 (1)
divaricata Beaupré 520 (3 β)
divaricata Brand (*damascena*) A 107 (1 c)
divaricata Brand (*gallica*) 520 (nota), A 108
divaricata Wk. = gall. v. divar.
doliata Pall. = arvensis
elegans Salisb. = damascena
gaditana Soleir. = hispanica
Garidella Spenn. = Nigellastrum
gallica Jord. 520 (nota), A 108
glauca Schk. = arvensis
glauca A. Terr. (arvens.) = divaricata Beaupré
glaucescens Boiss. (hispan.) = gall. v. divaricata
glaucescens Guss. (arvens.) = divaricata Beaupré, gall. v. divaricata
hispanica Gr. et Godr. = gallica
hispanica L. A 108
indica Roxb. = sativa
intermedia Coss. (*hispan.*) A 108
involucrata Mœnch = damascena
latifolia Mill. = arvensis
levis Del. = divaricata Beaupré
minor Boiss. (*damasc.*) 519 (1 b)
multifida Gat. = damascena
Nigellastrum Wk. 520 (nota)
pallidiflora Reverch. (*damascena*) A 107 (1 d)
parviflora Coss. (hispan.) = gallica
polygyna Mœnch = hispanica
sativa L. 519 (2)
taurica Stev. = damascena
tenuiflora Gilib. = arvensis
truncata Viv. = sativa
tyrrhena A. Terr. (arvens.) = divaricata Beaupré?
unguiculata Stokes = arvensis
NIGRITELLA I 247 (232)
angustifolia Rich. = nigra
angustif. b. Parl. = rosea
brachystachya Kern. 247 (×)
fragrans Saut. ex Rchb. = nigra × Gymnadenia sp.
globosa Rchb. = Orchis globosa
Heufleri Kern. = nigra × Gymnad. odoratiss.
NIGRITELLA I 247 (232)
megastachya Kern. 247 (×)
Moritziana Gremli = nigra × Gymnad. conopsea
nigra Rchb. f. 247, A 56
nigra × *Gymnad. conopsea Kern.* 247, A 56
nigra × *Gymnad. odoratiss. Kern.* 247, A 56
rosea Gelmi (*nigra*) A 56 (α b)
rosea Goir. (angustifol.) = rubra
rosea Vis. et Sacc. (angustifol.) = rosea
rubra Richter 247, A 56 (β)
suaveolens Koch = nigra × Gymnad. conopsea
NINTOOA = Lonicera
canescens Webb = L. biflora
NISSOLIA = Lathyrus
parviflora Mœnch = L. inconspicuus
uniflora Mœnch = L. Nissolia
NIVARIA = Leucojum
æstivalis Mœnch = L. æstivum
hexanthera Medic. = L. vernum
monadelpha Medic. = L. æstiv.
verna Mœnch = L. vernum
NOCCÆA = Hutchinsia
affinis Rouy et Fouc. = H. affinis
alpina Rchb. = H. alpina
brevicaulis Rchb = H. brevic.
brevistyla Steud. = Thlaspi brevist.
cepeæfolia Rchb. = Thlaspi cepeæf.
diffusa Rouy et Fouc. = H. diffusa
maritima Rouy et Fouc. = H. procumbens (α a)
pauciflora Rouy et Fouc. = H. paucifl.
procumbens Rchb. = H. proc.
Prostii Rouy et Fouc. = H. Prostii
Revelieri Rouy et Fouc. = H. Revel.
rotundifolia Mœnch = Thlaspi rotund.
speluncarum Rouy et Fouc. = H. spel.
stylosa Rchb. = Thlaspi styl.
NOCHOTTA = Cicer
oleracea S. G. Gmel. = C. arietinum
NOMOCHLOA = Scirpus
compressa P. B. = Sc. Caricis
NONNEA II 372 (722)
alba DC. 373 (3 b), A 167
arvensis DC. ex Steud. = Lycopsis arv.
decumbens Mœnch = vesicaria
dubia Steud. = Alkanna lutea
lamprocarpa Griseb. = obtusifol.
lutea DC = Alkanna lutea
lutea Rchb., Arc. p. p. = setosa
nigricans DC. = vesicaria
obtusifolia R. et S. 373 (2)
parviflora DC. (*setosa*) 373 (1 b)
pulla DC. 373 (nota)

Digitized by Google

NONNEA II 372 (722)
setosa R. et S. 373 (1)
Sibthorpiana G. Don. = ventricosa
ventricosa Griseb. 373 (3)
vesicaria Rchb. 373 (4), A 167
NORTA = Sisymbrium
strictissima Schur = S. strict.
NORYSCA = Hypericum
calycina Blume = H. calyc.
venosa Blume = H. calycinum
NOTHOLÆNA I 5 (2)
Marantæ R. Br. 5 (1)
lanuginosa Desv. = vellea
microphylla Bolle = Cheilanth. Szovitsii
persica Bory = Cheilanthes Szovitsii
subcordata Desv. = Marantæ
vellea R. Br. 5 (2), A 201
NOTOBASIS = Cirsium
mitis Lojac. (syriac.) = C. — mite
syriaca Cass. = C. syriacum
NOTOPHILUS = Ranunculus
muricatus Fourr. = R. mur.
parviflorus Fourr. = R. parv.
vulgaris Fourr. = R. sardous
NUMMULARIA = Lysimachia
centimorbia Fourr. = L. Nummularia
officinalis Erndt = prec.
prostrata Opiz = prec.
repens Gilib. = prec.
silvatica S. F. Gray = L. nemorum
NUPHAR I 487 (421)
luteum S. et S. 487
rivulare Dum. = luteum
systylum Wallr. = luteum
NYMPHÆA I 487 (420)
alba L. 487, A 103
alba β DC. = minor
Asopii Orph. = alba
Dioscoridis Heldr. = alba
exumbonata Rupr. = alba
melocarpa Casp. (alba) = alba
minor Guss. (alba) A 103 (b)
lutea L. = Nuphar luteum
Milletii Bor. = alba
officinalis Gater. = alba
permixta Bor. = alba
polystigma Casp. (alba) = alba
suaveolens Dum. = alba
terrestris Clav. (alba) = minor
umbilicalis Salisb. = Nuphar luteum
NYMPHANTHUS = Nuphar
europæus Desv. = N. luteum
NYMPHOIDES = Limnanthemum
europæa Fisch. = L. nymphoides
orbiculata Gilib. = prec.
NYMPHOZANTHUS = Nuphar
vulgaris Rich = N. luteum

OBIONE = Atriplex
crispa Moq. = A. Halimus
Cupani Tin. 307 (nota)
græca Moq. 307 (nota)
portulacoides Moq. = A. port.
OCHRUS = Lathyrus
lathyroides Medic. = L. Ochrus
OCHRUS = Lathyrus
pallidus Pers. = prec.
uniflorus Mœnch = prec.
OCHTHODIUM I 453 (386)
ægyptiacum DC. 453
OCIMUM III 83 (806)
album L. 83 (f)
Basilicum L. 83
bullatum Lam. 83 (b)
integerrimum W. 83 (a)
lanceolatum Schum. 83 (d)
majus Hort. 83 (e)
pilosum W. 83 (c)
thyrsiflorum L. 83 (g)
OCTADENIA = Alyssum
maritima F. et M. = A. marit.
OCYMUM = Ocimum
ODONTARRHENA = Alyssum
alpestris Ledeb. = A. alpestre
argentea Ledeb. = A. argent.
microphylla C. A. Mey. = A. alpestre
muralis Schur = A. argenteum
saxatilis Jord. et Fourr. = A. alp. d. saxat.
ODONTITES II 454 (767)
albidula Mab. = corsica
albiflora Goir. (serotina) 456 (5 α d)
Biancæ Nym. 455 (1 b)
Bocconei Walp. 455 (1)
canescens Rchb. (serotina) 456 (5 α c)
Citardæ Tod. 456 (7 β)
corsica G. Don 456 (6)
cretica Boiss. = Biancæ
divergens F. Schultz 456 (5 α b)
Kochii F. Schultz, Freyn 456 (5 α e)
Jaubertiana Tod. (non Dietr.) = sicula
lanceolata Rchb. 455 (4)
linifolia G. Don 455 (3 c)
lutea Clairv., Rchb. 455 (3)
minor Bég. (lutea) 455 (3 b)
rigidifolia Benth. 456 (7)
rubra Pers. = serotina et verna
serotina Dum. 456 (5)
serotina β Rchb. = Kochii
sicula Nic. (vulgaris) = seg.
sicula Tod. ex Nym. 456 (5 γ)
verna Bell., Dum. 456 (5 β)
viscosa Clairv., Rchb. 455 (2)
vulgaris Mœnch, Caruel = serotina
vulgaris Stev. = verna
ODONTITES = Bupleurum
glauca Spr. = B. glauc.
luteola Hoffm. = B. semicompositum
semicomposita Spr. = B. semicomp.
tenuissima Hoffm. = B. ten.
ODONTOSPERMUM = Asteriscus
aquaticum Sch. Bip. = A aquat.
maritimum Sch. Bip. = A. mar.
ŒNANTHE II 207 (607)
apiifolia Brot. 209 (5 b)
approximata Mérat 209 (4 ε b)
approximata Ten. = Jordani
aquatica Poir. 208 (2)
australis Wulf. = peucedanifolia?
ŒNANTHE II 207 (607)
calycina Salzm. = globulosa
chærophylloides Pourr. = pimpinelloides
crocata L. 209 (5)
daucifolia Lk. = virgata
densa J. Woods 209 (nota)
diffusa Lag. = globulosa
filipenduloides Thuill. = peucedanifol.
fistulifolia Stokes = seg.
fistulosa L. 208 (3), A 154
fluviatilis Colem. = aquatica
gigantea Zum. 209 (nota)
globularis Lk. = seg.
globulosa L. 207 (1)
gymnorrhiza Brign. = Lachenalii
humilis Raf. = quid?
Jordani Ten. 209 (4 η), A 154
Karsthia Hacq. = silaifolia
Lachenalii C. C. Gmel. 209 (4 ε)
lanceolata Poir. = fistulosa
Lisæ Moris 209 (4 ζ)
major Fouc. et Mand. (pimpinell.) A 154 (4 α for.)
media Griseb. = silaifolia
megapolitana W. = Lachenalii
microsperma Guss. = peucedanifolia
Mutellina DC. = Meum Mut.
patens Mœnch = peucedanif.
peucedanifolia Caruel = silaifolia
peucedanifolia Pollich 209 (4 δ), A 154
peucedanifol. Pollini = Lachenalii
peucedanoides Roth = peucedanifol.
Phellandrium Lam. = aquatica
pimpinellæfolia DC. (pimpinelloides) = virgata
pimpinelloides L. 208 (4), A 154
Pollichii C. C. Gmel. = peucedanifol.
prolifera Host = silaifolia
prolifera L. = crocata?
purpurea Poir. = Meum Mutellina
rapacea Koch (pimpinelloides) = virgata
rhenana DC. = Lachenalii
silaifolia Bert., Sang. = Lachenalii
silaifolia M. B. 209 (4 γ)
stylosa Pers. = virgata
tabernæmontana C. C. Gmel. 208 (3 b)
virgata Poir. 208 (4 β)
ŒNOTHERA II 133 (530)
biennis L. 134 (2)
muricata L. 134, A 148 (2 bis)
purpurea Hort. ex Lam. = rosea
rosea Sol. 134 (1)
rubra Cav. = rosea
striata Led. = seg.
stricta Led. 134 (3), A 148
ŒOSPORANGIUM = Cheilanthes
persicum Vis. = Ch. Szovitsii
Szovitsii Vis. = Ch. Szov.

Digitized by Google

Digitized by Google

NB. — L'introduzione sulle regioni botaniche d'Italia e la chiave per la determinazione delle famiglie a complemento del Vol. I, compreso il frontespizio di questo volume, usciranno assieme al Vol. IV parte III.ª

PREZZO DELLA PRESENTE PARTE

Lire 6.00

Indirizzare le richieste ed i pagamenti al Prof. **Adriano Fiori, presso il R. Istituto Forestale, Vallombrosa** (prov. di Firenze).

Digitized by Google

FLORA ANALITICA D'ITALIA

OSSIA

DESCRIZIONE DELLE PIANTE VASCOLARI INDIGENE

INSELVATICHITE E LARGAMENTE COLTIVATE IN ITALIA

DISPOSTE PER QUADRI ANALITICI

DEI DOTTORI

ADRIANO FIORI E GIULIO PAOLETTI

VOLUME IV - PARTE III^a

INDICE GENERALE

PEL

Dott. ADRIANO FIORI

OPERA ENCOMIATA DALLA REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

PADOVA

TIPOGRAFIA DEL SEMINARIO

1908

Digitized by Google

Digitized by Google

OGLIFA = Filago
arvensis Cass. = F. arven.
minima Rchb. = F. min.
neglecta Rchb. = F. neglecta
Soyeri Godr. = F. neglecta
OLBIA = Lavatera
canescens Mœnch = L. maritima
deflexa Mœnch = L. punctata
flava Presl = L. flava
hastata Med. = L. Olbia
heterophylla Mœnch = L. thuringiaca
hispida Presl = L. hisp.
thuringiaca Med. = L. thur.
triloba Med. = L. tril.
OLEA II 337 (693)
bifera Ten. (europ.) = cajetana
buxifolia Ait. 337 (α b)
cajetana Petagna 338 (β b)
europæa L. 337
europ. β L. = Oleaster
gallica Mill. = sativa
hispanica Mill. = europæa
humilis Salisb. = Ligustrum vulgare
lancifolia Mœnch = sativa
officinarum Crantz = sativa
Oleaster Hoffgg. et Lk. 338 (α)
sativa Hoffgg. et Lk. 338 (β)
OLEANDER = Nerium
vulgaris Medic. = N. Oleander
OLIGANDRA = Chenopodium
atriplicoides Less. = C. polyspermum
OLIGOSPORUS = Artemisia
adfinis Less. = seg.
campestris Cass. = A. camp.
condimentarius Cass. = A. Dracunculus
scoparius Less. = A. scop.
OMALOCLINE = Crepis
montana Sch. Bip. = C. pontana
prunellifolia Cass. = C. pygmæa
pygmæa Rchb. f. = C. pygm.
succisæfolia Monn. = C. mollis
tergloviensis Sch. Bip. = Crepis tergl.
OMALOTHECA = Gnaphalium
Einseleana Schultz = G. Einsel
Hoppeana Schultz = G. Hopp.
norvegica Schultz = G. norv.
silvatica Schultz = G. silv.
supina Cass. = G. supin.
OMPHALIUM = Omphalodes
vernum Roth = O. verna
OMPHALODES II 380 (728)
linifolia Mœnch 380 (nota)
nana A. Gray = Eritrichium nanum
repens Schrank = seg.
sempervirens D. Don = Anchusa semp.
verna Mœnch 380, A 167
ONAGRA = Œnothera
biennis Scop., All. = Œ. bienn.
europæa Spach = prec.
muricata Mœnch = Œ. muric.
vulgaris Spach = Œ. biennis
ONCERUM = Silene
acaule Dulac = S. acaul.
alpinum Dulac = S. alpestris
ciliatum Dulac = S. ciliata
ONCERUM = Silene
cuspidatum Dulac = S. saxifraga
gallicum Dulac = S. gallica
glareosum Dulac = S. alp. f. minor
globosum Dulac = S. vulgaris
nutans Dulac = S. nutans
quadrifidum Dulac = S. quadr.
rubellum Dulac = S. rubella
rupestre Dulac = S. rupestr.
ONOBROMA = Carthamus
cæruleum Gærtn = C. cærul.
Carduncellus Steud. = Carduncellus monspel.
corymbosum Spr. = Cardopatium corymb.
lanatum Bluff et Fing. = C. lanat.
monspeliensium Spr. = Carduncellus monspel.
multifidum Spr. = C. multif.
pinnatum Spr. = Carduncellus pinn.
tingitanum Sweet = Carduncellus ting.
ONOBRYCHIS II 95 (512)
æquidentata d'Urv. 97 (3)
alba Desv. 96 (1 ε)
alba B Ten. = echinata
alectorolopha St.-Lag. = Crista-galli
Allionii Jord. 96 (2 b)
alpicola Arv. T. = montana
arenaria Koch p. p. et Auct. it. = Tommasinii
arenaria Koch p. p. (non DC.) = Gaudiniana
argentea March. (*Tommas.*) 96 (1 δ b)
Bergeriana DC. = quid?
Caput-galli Lam. 97 (4)
conferta Desv., Ten. = montana
cretica Desv. = æquidentata
Crista-galli Lam. 97 (nota)
culta Gr. et Godr. (sativa) = sativa
decumbens Wallr., Jord. A 143 (1 α b)
depressa Presl = foveolata?
echinata D. Dietr. 96 (1 ζ)
foveolata DC. 97 (3 b)
Gaudiniana Jord. 96 (1 γ), A 143
lasiostachya Boiss. 97 (nota)
montana DC. 96 (1 β)
sativa Lam. 96 (1 α), A 143
saxatilis All. = Allionii
saxatilis Lam. 96 (2)
speculum Lojac. = æquidentata
spicata Mœnch = viciæfolia
spinulifera Lojac. = æquidentata
supina DC. 96 (1 η)
supina Gaud. et Auct. it. p. p. = Gaudiniana
supina Guss. (cretica) = foveolata
tenuifolia Mœnch = saxatilis
Tommasinii Jord. 96 (1 δ), A 143
viciæfolia Scop. 95 (1), A 143
vicioides Medic. = prec.
ONOBRYCHIS II 95 (512)
virgata Presl = quid?
vulgaris Guldenst. = viciæfolia
ONOCLEA = Struthiopteris
germanica W. = S. germ.
serrata Bænitz (Struth.) = S. — serrata
Struthiopteris Hoffm. = S. germanica
ONONIS II 24 (487)
abortiva Fiori (*pusilla*) 27 (9 c)
abortiva Legr. (Columnæ) = prec.
adglutinans Presl = Natrix
aggregata Asso = striata
alba Poir. 26 (5), A 136
albiflora Goir. (*spinosa*) A 136 (1 α d)
alopecuroides L. 27 (6), A 136
alpina All. = cenisia
altissima Lam. = hircina
anisotricha Briq. (*spinosa*) 25 (1 δ b)
antiquorum Cus. et Ausb. = confusa
antiquorum Freyn = lejosperma
antiquorum L. 25 (1 γ)
antiquorum Vill. = parvifolia
antiquor. β Bert. = procurrens
aphylla Lam. = variegata
apula Ten. = pusilla
arachnoidea Lap. A 136 (11 α d)
arthropodia Brot. = pubescens
arvensis Auct. mult. = procurrens
arvensis Bert. = mitis
arvensis Gr. et Godr. (procurrens) = mitis
arvensis L. (1759) = hircina
arvensis L. (1767) = spinosa (α)
austriaca G. Beck = fallax
barbata Cav. = minutissima
bicolor Moris = geminiflora
biflora Desf. 30 (16)
Bonanniana Presl. = oligophylla?
breviflora Ser. in DC. 29 (15 β)
calycina Lam. = pubescens
calycina Wk. et Lge. (*minutiss.*) A 136 (10 b)
campestris Koch et Ziz = spinosa (α)
capitata Cav. = pusilla
cenisia L. 31 (19)
Cherleri Bert. (an L. p. p.?) = pusilla
Cherleri Desf. et Auct. pl. (an L.?) = mollis
Columnæ All. = pusilla
concolor Rouy (*Natrix*) 28 (11 α c)
condensata Gr. et Godr. A 136 (11 α e subf.)
confusa Burn. (*spinosa*) 25 (1 γ d)
confusa Lor. et Barr. (campestris) = prec.
crispa S. et S. (non L.) = hispanica
cristata Mill. = cenisia
cuneata L. Vacc. (*rotundifol.*) A 137 (21 b)

Digitized by Google

ONONIS II 24 (487)
Cupaniana Tod. = pubescens Guss.
Damanti Lojac. = tridentata
Dehnhardtii Ten. 26 (4 β b)
Desfontainii Duf. = mollis
diacantha Sieb. 25 (1 γ c)
diffusa Ten. 26 (4 β)
fallax Gremli (*procurrens*) 25 (1 ε b)
fœtens All. = spinosa (for.)
Fontanesii Webb et Berth. (reclin.) = mollis
fruticosa L. 31 (20)
geminiflora Lag. 30 (16 b)
glutinosa Presl = viscosa
haplocaulos Briq. (*spinosa*) 25 (1 α b)
hircina Auct. it. = procurrens
hircina Jacq. 25 (nota)
hispanica L. f. 28 (11 γ c)
hispida Desf. 25 (2)
inæqualifolia Ser. in DC., Bert. 28 (11 β)
inaperta Mœnch = pusilla
inclusa Bert. 30 (18 γ)
inclusa Pourr., Balb. = pusilla
inclusa Rouy (reclin.) = inclusa Bert.
inermis Huds. = hircina
intermedia C. A. Mey. 25 (1 β)
intermedia Guss. (*breviflora*) 29 (15 β c)
latifolia Asso = rotundifol.
laxa Rouy (*picta*) A 136 (11 α e subf.)
laxiflora Viv. (non Desf.) = reclinata
legitima Delarbre = spinosa (α)
lejosperma Boiss. 25 (1 γ b)
Linnæi Webb et Berth. (*reclin.*) 30 (18 α)
litoralis Vahl ex Wk. et Lge. = serrata
longearistata Presl 29 (15 β b)
macrantha L. Vacc. (*pusilla*) A 136 (8 d)
major Arc., Rouy (*ramosiss.*) 28 (11 γ b)
major Boiss. (Natrix) = Natrix (α)
major Lge. (*serrata*) A 136 (4 var.)
Masquillierii Bert. 25 (1 ζ)
Masquillierii Lojac. exs. = hispida
media Boiss. (Natrix) = picta
microphylla Presl = hispanica
minor Moris (reclin.) = mollis
minutissima Jacq. = pusilla
minutissima L. 28 (10), A 136
mitis L. (*spinosa*) 25 (1 δ)
mitis Mill. = prec.
mitissima L. 26 (3), A 136
mollis Savi 30 (18 β)
monophylla Desf., Ten. = alba
Morisonii Gouan = pubescens
Natrix L. 28 (11), A 136
oligophylla Ten. 27 (5 β), A 136
ornithopodioides L. 29 (12)
parviflora Lam. (non Berg.) = pusilla
parvifolia Fiori (*spinosa*) 25 (1 α c)

ONONIS II 24 (487)
parvifolia Rouy (campestris) = prec.
pauciflora Fiori (*pusilla*) 27 (9 b)
pauciflora Rouy (Columnæ) = prec.
pendula Desf. 30 (17)
pendula Sieb. = Sieberi
Perusiana Gr. et Godr. (*Natrix*) A 137 (11 α f)
picta Lap. = Perusiana
picta Desf. A 136 (11 α e)
pinguis Lam. = concolor
pinguis L. 28 (11 α b)
polymorpha Guss. = Sieberi
præcox Bianca = biflora
procurrens Burn. (*spinosa*) 25 (1 ε)
procurrens Wallr. = procurrens et mitis
pseudo-arborescens Salles = hispida
pubescens Guss. (*oligophylla*) 26 (5 β b)
pubescens L. 29 (13)
purpurea Gilib. = arvensis
purpurea Mill. = fruticosa
pusilla L. 28 (9), A 136
pygmæa C. Koch = breviflora
ramosissima Desf. 28 (11 γ)
ramosiss. b Guss. = major Arc.
reclinata Lam. = striata
reclinata L. 30 (18)
repens Auct. it. (non L.) = mitis
rhinanthoides Lap. = striata
rotundifolia L. 31 (21), A 137
saxatilis Lam. = minutissima
scariosa Mœnch = mitissima
Schouwii Ser. in DC. = pendula
serrata Boiss., Gr. et Godr. = diffusa
serrata Forsk. 26 (4), A 136
sicula Guss. 30 (15 γ)
Sieberi Bess. 29 (14), A 137
spinosa L. 24 (1), A 136
spinosa L. (*spinosa*) 25 (1 α)
spinosa Wallr. = spinosa (α)
striata Gouan 27 (8)
striata Rouy (Natrix) = pinguis
subocculta Vill. = pusilla
transiens Rouy (antiquor.) = confusa
tridentata Lowe (*reclin.*) 30 (18 α b)
variegata L. 27 (7)
villosa L. = viscosa
villosissima Desf. 26 (4 γ)
villosissima Lois. = diffusa
viscosa All. = breviflora
viscosa L. 29 (15)
viscosa S. et S. = breviflora
viscosa β L. = breviflora
vulgaris Fiori (*mitis*) 25 (1 δ b)
vulgaris Gueld. = hircina
vulgaris Lge. (procurrens) = mitis for. vulg.
vulgaris Rouy = spinosa

ONOPORDON III 381 (923)
acanthiifolium Gilib. = seg.
Acanthium L. 381 (1)
Acanthium B Ten. = viride
acaulon L. 383 (nota)
ambiguum Cass. (non Fres.) = Sibthorpianum
apulum Fiori (*tauricum*) 382 (2 γ)
arabicum L., Jacq. 383 (4 γ), A 191
arabicum Seb. et Maur., Ten. = illyricum
arenarium Pomel = Sibthorpianum
argolicum Boiss. 382 (nota)
Carduncules Boiss. (*illyr.*) A 191 (4 var.)
corymbosum Zwierlein 382 (nota)
elatum S. et S. 381 (2 β)
elongatum Lam. = illyricum
excelsum Salisb. = arabicum
ferox Rouy A 191
giganteum Fiori (*horridum*) 382 (2 δ b)
giganteum Paolucci (tauricum) = prec.
græcum Gouan (non L.) = illyricum
horridum Kralik p. p. = ferox
horridum Viv. 382 (2 δ), A 191
horrido × spinosiss. Rouy = ferox
illyricum Kralik = spinosissimum
illyricum L. 382 (4), A 191
lanatum Mœnch = arabicum
macracanthum Auct. it. (non Schousb.) = horridum
macranthum Boiss. (*illyr.*) A 191 (4 var.)
macranthum S. et S. = Sibthorpianum
Mandraliscæ Lojac. = horridum
minus Moris (*illyr.*) A 191 (4 var.)
nervosum Boiss. = arabicum
orientale Mill. = illyricum
rotundifolium All. = Berardia lanuginosa
Sibthorpianum Boiss. et Heldr. 382 (3), A 191
spinosissimum Rouy (*illyr.*) A 191
squarrosum Fiori (*illyric.*) 382 (4 β)
tauricum Guss. etc. = horridum
tauricum W. 381 (2), A 191
tomentosum Mœnch = illyr.
viscosum Horn. = tauricum (α)
virens Auct. it. = horridum
virens DC. = tauricum (α)
viride Wohlfarth (*Acanth.*) 381 (1 b)
viscosum Horn. = tauricum

ONOSMA II 363 (716)
angustifolium Lehm. = cinereum
arenarium W. et K 364 (α)
calycinum Stev. = Visianii
canescens Presl = cinereum
cinereum Schreb., Sieb. 364 (ε)

Digitized by Google

ONOSMA II 363 (716)
echioides Gaud. = helveticum
echioides Jacq. = Visianii
echioides Koch = Kochii
echioides L. 363
echioid. α L. = stellulatum
echioid. β L. = arenarium
erectum S. et S. = cinereum
helveticum Boiss. = seg.
helveticum DC. (*echioid.*) 363 (α c)
Kochii Fiori (*echioid.*) 364 (β)
lingulatum Freyn (*echioid.*) 363 (α b)
montanum S. et S. = cinereum
stellulatum W. et K. 364 (δ)
tridentinum Wettst. = helveticum
vaudense Gremli = helveticum
Visianii Clem 364 (γ)
ONOTROPHE = Cirsium
acaulis Cass. = C. acaule
oleracea Cass. = C. olerac.
palustris Cass. = C. pal.
OPHIOGLOSSUM I 16 (20)
lusitanicum L. 17 (1 β)
ovatum Opiz = vulgatum
vulgatum L. 16 (1), A 8
OPHIOPRASON = Asphodelus
fistulosum Salisb. = A. fistul.
OPHIOSCORODON = Allium
magicum Wallr. = A. magic.
ursinum Wallr. = A. ursin.
OPHIURUS = Lepturus
compressus Presl = L. filiformis
cylindricus P. B. = L. cylindr.
erectus Lk. = L. filiformis
gracilis Gay = L. — gracilis
incurvatus P. B. = L. incurv.
subulatus Lk. = L. cylindricus
OPHRYS I 232 (226)
Adrachnites Bert. = seg.
Adrachnites L. (insectifera) = seg.
æstiva Balb. = Spiranthes æstivalis
æstivalis Lam. = Spiranthes æstiv.
alpina L. = Herminium alp.
anthropomorpha W. = seg.
anthropophora L. = Aceras anthrop.
apiculata J. C. Schmidt A 53
apifera Huds. 234 (3), A 52
apiformis Desf. (insectifera) = Scolopax
Arachnites Lam. 235 (5), A 53
Arachnites L. (insectifera) = prec.
Arachnites Lk. = tenthredinifera
Arachnites Reich. (1778) = apifera
Arachn. × *Bertolonii* A 53
arachnitiformis Gren. et Philip. A 53
aranifera Huds. 233 (1), A 52
aranifero × atrata G. Cam. = Todaroana, cfr. A 52
aranif. × *Bertolonii Barla* 235
aranifero × lutea G. Cam. = quadriloba ?, cfr. A 52
aranif. × *myodes Pok.* A 53
OPHRYS I 232 (226)
aranif. × *Speculum Macchiati* 237 (nota)
aranif. × *tenthredinifera F. Cortesi* A 53
atrata Lindl. 234 (1 ζ), A 52
atropos Barla (Scolopax) = vetula
autumnalis Balb. = Spiranthes autumn.
Barlæ G. Cam. = bilineata
Bertolonii Moretti 235 (4), A 53
Biancæ Macchiati = Scolopax ?
biceratia Del. = atrata
bicornis Sadl. = cornuta
biflora Desf. (insectifera) = bombyliflora
bilineata Barla 235 (×)
bombylifera W. = seg.
bombyliflora Lk. 234 (2)
bombylifloro × *tenthredinifera Somm.* 236
Bonoitii Tin. ex Tod. A 52 (1 γ b)
brachyotus Rchb. = Arachnites
canaliculata Viv. = bombyliflora
cernua Thore = Goodyera repens
chlorantha Heg. et Heer. 234 (3 b)
ciliata Biv. = Speculum
Corallorhiza L. = Corallorh. Neottia
cordata L. = Listera cordata
corniculata Brot. = Scolopax
cornuta Barla (*Scolopax*) A 53 (5 δ for.)
cornuta Stev. 236 (5 ε)
crabronifera Mauri = exaltata
crucigera Jacq. = atrata
cyanogramma Welw. = atrata
densiflora Desf. = Orchis intacta
discors Bianca = Arachnites
disjecta Murr A 53 (×)
disthoma Biv., Ten. = bombyliflora
episcopalis Poir. = tenthredinifera
exaltata Ten. 235 (5 γ), A 53
fissa Moggr. (*aranifera*) A 52 (1 var.)
fucifera Sm. 233 (1 ε), A 52
fuciflora Mœnch, Rchb. = Arachnites
funerea Viv. 236 (8 α b)
fusca Lk. 236 (8)
Gelmii Murr A 53 (×)
glaberrima Desf. (insectifera) = lutea
Grampini F. Cortesi = aranif. × tenthredinif.
grandiflora Ten. = tenthredinifera
hiulca Mauri = bombyliflora
hybrida Pok. = aranif. × myodes
incubacea Bianca = fucifera
insectifera γ et κ L. = fusca
insectifera δ L. = aranifera et Speculum
OPHRYS I 232 (226)
insectifera ε L. = lutea
insectifera ι L. = apifera
integra Sacc. 234 (×)
Inzengæ Ces. 235 (4 β)
iricolor Griseb. (non Desf.) = fusca
labrofossa Brot. = bombyliflora
Landaueri Appel (*Bertolon.*) A 53 (4 α b)
latifolia L. = Liparis Lœselii
liliifolia L. = Liparis Lœselii
limbata Lk. = tenthredinifera
linearis Moggr. (*fucifera*) A 52 (1 ε d)
Lœselii L. = Liparis Lœselii
lunulata Parl. 233 (1 γ), A 52
lutea Cav. (1793) 236 (7), A 53
lutea Gouan (1765) (Myodes) = prec.
mammosa Desf. = atrata
minor Guss. (lutea) = sicula
monophyllos L. = Malaxis monophylla
Monorchis L. = Herminium Mon.
Morisii Martelli (*aranifera*) 234 (1 η)
Muscaria Suffren. = myodes
muscifera Huds. = myodes
Myodes Alsch. = bombyliflora
myodes Jacq. 237 (9)
myodes L. (insectifera) = prec.
myodes ζ Lam. = fusca
neglecta Parl. 236 (6 b)
nicæensis Barla (aranifera) = specularia
Nicotræ Zodda A 53
Nidus-avis L. = Neottia N.-avis
obscura G. Beck A 53 (5 β')
œstrifera Alsch. = cornuta
œstrifera Arc. (non M. B.) = Scolopax
œstrifera Rchb. = Arachnites
ovata L. = Listera ovata
oxyrrhinchos Tod. 235 (5 β), A 53
pallida Raf. 236 (8 β)
paludosa O. F. Muell. = Liparis Lœselii
picta Lk. = Scolopax
pseudo-apifera Caldesi = apifera ?
pseudo-aranifera Murr A 53 (×)
Pseudo-Bertolonii Murr A 53 (×)
Pseudo-Speculum DC. 233 (1 α b)
pulla Cyr. in Ten. = bombyliflora
purpurata Tausch A 52 (3 var.)
quadriloba Rchb. (*aranifera*) 233 (1 δ), A 52
ripæensis Porta A 53
rosea Desf. (insectifera) = tenthredinifera
rostrata Ten. = apifera
Saratoi G. Cam. = aranif. × Bertolonii
Scolopax Cav. 235 (5 δ), A 53
Scolopax Host = cornuta

Digitized by Google

OPHRYS I 232 (226)
Scolopax W. = Speculum
secundiflora Steud. = Orchis intacta
sicula Tin. 236 (7 for.)
Sommierii G. Camus = tenthredin. × aranifera
specularia Rchb. (*aranifera*) 234 (1 θ), A 52
Speculum Bert. = Bertolonii
Speculum Lk. 237 (10)
sphegifera W. = Scolopax
spiralis α L. = Spiranthes autumn.
spiralis β? et γ L. = Spiranth. æstivalis
subfucifera Rchb. (*fucifera*) 233 (1 ε c)
Syrphum Savi = fusca
tabanifera Sieb. exs. = tenthredinifera
tabanifera W. = bombyliflora
Tenoreana Bert. = oxyrrhynchos
Tenoreana Lindl. = tenthredinifera
tenthredinifera W. 236 (6)
tenthredinifera Ten. = neglecta
tenthred. × *aranifera Somm.* 236
Todaroana Macchiati A 52 (1 var.)
Tommasinii Vis. 233 (1 β)
trigona Gilib. = Liparis Lœselii
umbilicata Desf. = bombyliflora
vernixia Brot. = Speculum
vespifera Brot. = lutea
vetula Risso 235 (5 δ b)
villosa Desf. = tenthredinifera
viridiflora Barla (*aranifera*) 233 (1 ε b)
virescens Somm. (*exaltata*) A 53 (5 γ b)
viridis Palanza (*Arachnites*) A 53 (5 var.)
OPLISMENUS I 49 (51)
colonus Humb. et Kth. = Panicum col.
Crus-Corvi Dum. = seg.
Crus-Galli Dum. = Panicum Crus-Galli
stagninus Dum. = Panic. oryzoides
undulatifolius P. B. 49
OPOPANAX = Pastinaca
Chironium Koch = P. Opopanax
hispidum Griseb. = P. hispida
orientale Boiss. = P. hispida
siculum Nym. = P. hispida
OPORANTHUS = Sternbergia
colchiciflorus Herb. = S. colch.
luteus Herb. = S. lutea
siculus Parl. = S. sicula
OPORINIA = Leontodon
autumnalis D. Don. = L. aut.
pratensis Less. = L. praten.
pyrenaica Sch. Bip. = L. pyr.
OPULUS = Viburnum
edulis J. S. Presl = V. Opulus
glandulosa Mœnch = prec.
OPULUS = Viburnum
lobatifolia Gilib. = prec.
palustris S. F. Gray = prec.
rosea Schur = V. — roseum
trilobifolia Gilib. = V. Opulus
vulgaris Borckh. = prec.
OPUNTIA I 327 (311)
amyclea Ten. = maxima
coccinelifera DC. (non Mill.) = Tuna
decumana Haw. = maxima
Dillenii Haw. 328 (2 γ)
Ficus-indica Mill. 327, A 66 (1 bis)
humifusa Raf. = vulgaris
inermis Moris et DNtrs. = vulgaris?
intermedia S. Dyck. A 66
italica Ten. = vulgaris
maxima Mill. 328 (2 β)
monacantha Haw. A 66
nana Vis. = vulgaris
Tuna Mill. 327 (2)
vulgaris Mill. 327 (1)
vulgaris Ten. = Ficus-indica
ORCHIS I 239 (230)
acuminata Desf. = lactea
acutiflora Koch (*mascula*) A 55 (18 c)
ætnensis Tin. = commutata et lactea
alata Fleury = Morio × laxiflora
alba Arc., Goir. (*Morio*) A 208 (3 α e)
alba Fiori (*mascula*) A 55 (18 f)
alba Goir. (*purpurea*) A 209 (9 α b)
alba Goir. (speciosa) = mascula f. alba
alba Lam. = Platanth. bifolia
albida Scop. = Gymnad. alb.
albiflora Fiori (*pyramidal.*) A 209 (13 b)
albiflora Goir. (*fragrans*) A 209 (6 α d)
albiflora Guss. (*laxiflora*) 244 (16 α b)
albiflora Nicotra (*longicruris*) 243 (12 b)
albiflora Thielens (*ustulata*) A 209 (7 c)
alpina All. = Herminium alp.
alpina Chenev. (*macul.*) A 55 (24 α b)
alpina Crantz = Gymnad. albida
alpina Schrank = Herminium alpinum
amœna Crantz = ustulata
angustifolia Lois. in Rchb. 246 (25 γ), A 55
angustifolia Wimm. et Grab. = incarnata
angustif. × maculata Richter = macul. × angustifol.
anthropophora All. = Aceras anthrop.
aphylla Schm. = Epipogium aphyllum
Arachnites Scop. = Ophrys Arachn.
atlantica W. = intacta
ORCHIS I 239 (230)
atropurpurea Tausch = Nigritella nigra × Gymnad. conopsea
austriaca Kern. = ustul. × tridentata
Barlæ G. Cam. = palustri × coriophora
batrachites Schrank = Cœlogloss. viride
Bergoni Nant. = tephros. × Aceras anthrop.
Beyrichii A. Kern. = milit. × tephrosanthos
bicornis Gilib. = pyramidalis
Biermanni Ortm. = maculata
bifida Goir. (*laxiflora*) A 209 (16 α d)
bifolia Crantz = Platanth. montana
bifolia L. = Platanth. bifol.
bifol. γ L. = Platanth. montana
bipunctata Raf. = Brancifortii
Bivonæ Tod. 243 (×)
Bonanniana Tod. = maculata?
Bornemanni Asch. = longicornu × papilion.
Bornemanniæ Asch. = papilion. × longicornu
bosniaca G. Beck A 55
brachiata Gilib. = purpurea
brachyglossa Wallr. (bifol.) = Platanth. bifolia
brachystachya Fiori (*mascula*) A 209 (18 j)
brachystachya Goir. (speciosa) = prec.
bracteata Ten. = pseudo-sambuc.
bracteata W. = Cœloglossum bract.
Brancifortii Biv. 245 (19 b)
Braunii Hal. = latifol. × macul.
brevicornu Viv. = patens
calabra N. Terr. = pauciflora
calabra N. Terr. (*pauciflora*) A 55 (20 β for.)
Calvellii N. Terr. = maculata
Camusi Duff. A 55 (×)
candidissima Goir. (*tridentata*) A 209 (8 α c)
Canuti Richter = trident. × militaris
Capraria Somm. (*provincial.*) A 55 (20 γ)
caspia Trautv. = laxiflora
cassidea M. B. A 209 (6 α b)
cercopiteca Lam. = tridentata
Champagneuxii Barn. A 54 (3 β c)
chlorantha a. Guss. = Platanth. montana
chlorantha b. Guss. = Platanth. bifolia
cimicina Crantz 241, A 209 (6 β)
cinerea Gilib. (brachiata) = tephrosanth.
cinerea Schrank = militaris
coccinea Posp. = ustul. × pyramidalis
Columnæ Schm. = ustulata
commutata Tod. 242 (8 b)

Digitized by Google

ORCHIS I 239 (230)
comosa Scop. = latifolia
condensata Desf. = pyramidalis
conica W. = lactea
conopsea L. = Gymnad. conops.
cordata W. = Cœlogloss. diphyllum
cornuta Rigo in Goir. (*fragrans*) A 209 (6 α e)
coriophora L. 241 (6), A 54, 209
coriophoro × *palustris Timb.* 241
corsica Viv. = lactea
crenulata Gilib. = Morio
cruenta Friv. exs. = rubra
Cupani Tod. = quid?
Cyrilli Ten. = provincialis
Debeauxii G. Cam. = Morio × papilion.
decipiens Bianca = papilionacea
densiflora Tin. (sætnens.) = lactea
Destephani L. Marcello (*papilion.*) A 54 (2 var.)
Dietrichiana Bogenh. = ustul. × tridentata
divaricata Rich. = incarnata
ecalcarata Vayr. et Costa = Gymnad. albida
elabiata R. Kell. (*macul.*) A 55 (24 α c)
elatior Gaud. (bifol.) = Platanth. montana
elegans Heuff. = palustris
ennensis Guss. in Tin. = commutata
ensifolia Vill. = laxiflora
expansa Ten. = papilionacea
fallax DNtrs. (brevicornu) = seg.
fallax W. et Lge. 244 (17 for.)
fasciculata Tin. = pseudo-sambuc.
fistulosa Mœnch = latifolia
Fontanesii Rchb. f. (patens) = patens
fragrans Pollini 241, A 209 (6 α)
fragrans Ten. = longibracteata Biv.
fuciflora Crantz = Ophrys fuciflora
fusca Jacq. = purpurea
fuscata Pall. = purpurea
fuscescens Steph. = purpurea
fusco-cinerea Kirschl. = purpur. × milit.
fusco-Rivini Timb. = purpur. × milit.
galeata Poir. = militaris
galeato-fusca Godr. = purpur. × milit.
Gennarii Rchb. f. = papilionacea × Morio
germanorum Moritz. = palustris
Gervasiana Tod. = maculata?
glaucophylla A. Kern. = mascula
globosa Brot. = lactea
globosa L. 243 (14), A 209

ORCHIS I 239 (230)
graminea Crantz = Herminium alpinum
grandiflora Rchb. (*fragrans*) A 209 (6 α c)
Gussonii Tod. = commutata
hæmatodes Rchb. = angustifolia
Halleri Crantz = globosa
Hanrii Jord. = lactea
helodes Rchb. f. (*macul.*) A 55 (24 ε)
hircina Crantz = Loroglossum hirc.
Hostii Tratt. = quadripunctata
humilior Pucc. (provinc.) = pauciflora
humilis Fiori (*globosa*) A 209 (14 b)
hybrida Bœnn. = purp. × militaris
hybrida Lindl. (milit.) = purp. × militaris
imbricata Vest = ustulata
immaculata Fiori (*mascula*) A 209 (18 h)
immaculata Goir. (speciosa) = prec.
immaculata Posp. (*Morio*) A 54 (3 α c)
impudica Crantz = quid?
incarnata L. 246 (25 β)
incarnata W. = sambucina
insularis Somm. 245 (22 β), A 55
intacta Lk. 241 (5)
italica Poir.?, Arc. = longicruris
Jacquinii Godr. = purp. × militaris
lactea Poir. 242 (8 β)
læta Steinh. = pauciflora
lanceata Dietr. = incarnata
latifolia L. 246 (25)
latifol. × *maculata Hal.* A 55
latifol. × *sambucina Richter* A 55
latifol. × *Gymnadenia conopsea* 246, A 55
laxiflora Lam. 244 (16)
laxifloro × *coriophora Timb.* 246 (nota), A 54
laxiflora Tin. (sætnens.) = commutata
leucostachys Griseb. = provincialis
Lingua Scop. = Serapias longipetala
longibracteata Biv. 240 (1)
longibracteata C. Koch = saccifera
longibracteata Neilr. (latifol.) = incarnata
longibracteata Schm. = maculata
longibracteata Schur (*macul.*) A 55 (24 γ)
longicalcarata Boiss. (Morio) = picta
longicornis Lam. = longicornu
longicornu Poir. 241 (4), A 54
longicornu × *papilionacea Asch.* 241
longicruris Lk. 243 (12)

ORCHIS I 239 (230)
lucana Spr. = pseudo-sambuc.
lutea Fiori (*ps.-sambuc.*) A 209 (23 c)
macedonica Griseb. = saccifera
macra Koch = milit. × Aceras anthrop.
macra Lindl. = tephrosanthos
macroglossa Wallr. (bifol.) = Platanth. montana
macrostachya Fiori (*mascula*) A 209 (18 i)
macrostachya Goir. (speciosa) = prec.
macrostachys Tin. = saccifera
maculata L. 246 (24), A 55
macul. × *angustifolia Chenev.* A 55
macul. × Traunsteineri M. Schulze = macul. × angustifol.
maculata Goir. (speciosa) = mascula (α a)
maculifolia Fiori (*Morio*) A 209 (3 α f)
majalis Rchb. = latifolia
major Bess. (bifol.) = Platanth. montana
Markusii Tin. 246 (23 b)
mascula Crantz = palustris
mascula Jacq. = speciosa
mascula L. 244 (18), A 55, 209
mascula L. (Morio) = prec.
masculo × maculata Halacsy 245, A 55 = Spitzelii, cfr. A 209
masculo × *provincialis Penzig* 246 (nota)
maxima C. Koch = purpurea
mediterranea Guss. = palustris
Meyeri Rchb. f. (*macul.*) A 55 (24 δ)
militaris L. p. p., Jacq. 242 (10)
militar. β L. = purpurea
militar. ε L. = tephrosanthos
milit. × *tephrosanthos Timb.* 242
milit. × *Aceras anthropophora* 242, A 54
militaris Poir. = longicruris
Mimusops Thuill. = militaris
miniata Crantz = Nigritella nigra
minor Gilib. (brachiata) = militaris
minor Viv. (brevicornu) = patens
mixta Retz. = incarnata, sambucina
Monorchis All. = Herminium Mon.
montana Schm. = Platanth. mont.
monticola Richter = latifol. × sambuc.
moravica Jacq. A 54 (9 β)
Morio L. 240 (3), A 54, 208
Morio b. Parl. = Morio e. alba
Morio c. Parl. = Morio d. rosea
Morio e. Parl. = maculifolia
Morio × *laxiflora Reut.* 244 A 54

Digitized by Google

ORCHIS I 239 (230)
Morio × *papilionacea Timb.* 240, A 54
Moritziana Bruegg. = Nigritella nigra × Gymnad. conopsea
Muscaria Scop. = Ophrys myodes
musciflora Schrank = Ophrys myodes
Natalis Tin. = pseudo-sambuc.
nervata March. = militaris
Nicodemi Cyr. in Ten. = papilion. × laxiflora
nigra Scop. = Nigritella nigra
nigra B Ten. = Nigritella — rosea
nigro × conopsea Moritz = Nigritella nigra × Gymnad. conops.
nitescens N. Terr. (*macul.*) A 55 (24 α for.)
obtusiflora Koch (*mascula*) A 55 (18 a)
ochroleuca Rchb., Ten. = Platanth. montana
odoratissima L. = Gymnad. odor.
olbiensis Reut. = olivetorum
olivetorum Nym. = seg.
olivetorum Gren. (*mascula*) 244 (18 b)
ornithis Jacq. = Gymnad. ornith.
ovalis Schm. = mascula
pallens L. 245 (21)
pallens Savi = provincialis
palustris Jacq. 244 (16 β)
palustri × *coriophora Barla* A 55
Panormitana Tin. in Guss. = patens ?
papilionacea L. 240 (2), A 54
papilion. × *laxiflora Asch.* 244
papilion. × *longicornu Asch.* 240
papilion. × *Morio Parl.* 240
papil. × Morio Timb. et Març. = Morio × papil.
papilionacea Ten. etc. = rubra
Pareissii Presl = mascula
Parlatoris Tin. = tridentata
parviflora Lam. = Gymnad. albida
parviflora Ten. = lactea
parviflora W. = ustulata
patens Desf. 244 (17)
pauciflora Goir. (*ustulata*) A 209 (7 b)
pauciflora Ten. 245 (20 β), A 55
picta Lois. 240 (3 β), A 54
picta-alba Barla (Morio) = Champagneuxii
picta-rosea Barla (*picta*) A 54 (3 β b)
Polliniana Spr. = fragrans
provincialis Balb. 245 (20), A 55
provincialis × *mascula Penzig* 246 (nota)
provincialis Vis. = pauciflora
pseudo-pallens Tod. = pauciflora ?

ORCHIS I 239 (230)
pseudo-sambucina Moris, Barb. = insularis
pseudo-sambucina Ten. 246 (23), A 209
pseudo-sambuc. b. Parl. = lutea
purpurea Huds. 242 (9), A 54, 209
purpur. β Pollini = purp. b. alba
purpureo × *militaris Gr. et Godr.* 242
purp. × *tephrosanthos* A 54
purpurea Koch (*sambucina*) 245 (22 α b)
pyramidalis L. 243 (13), A 209
quadripunctata Cyr. in Ten. 245 (19), A 55
recurva F. Nyl. = O. maculata
Reinchenbachii Mut. = Nigritella nigra × Gymnad. conops.
Ricasoliana Parl. = lactea
Rivini Gouan = militaris
Rivino-fusca Timb. = purpur. × milit.
Robertiana Lois. = longibracteata Biv.
romana Seb. = O. pseudo-sambuc.
rosea Fiori (*mascula*) A 209 (18 g)
rosea Goir. (*Morio*) A 208 (8 α d)
rosea Goir. (speciosa) = mascula g. rosea
rubra Chabert (*pauciflora*) 245 (20 β b)
rubra Jacq. 240 (2 b), A 54
saccata Rchb. = sambucina
saccata Ten. 244 (15)
saccifera Brongn. 246 (24 β), A 55
sagittata Munby = intacta
salina Friv. = sambucina
sambucina Brot. = pseudosambuc.
sambucina L. 245 (22), A 55
sambucina Moris, Macch. = insularis
Schleicheri Sweet = sambucina
Schulzei Richter = macul. × angustifol.
Scopolii Timb. = tridentata
secundiflora Bert. = intacta
setacea Gilib. = Gymnad. conopsea
sicula N. Terr. = sambucina ?
sicula Tin. = pseudo-sambuc. (for.)
signifera Vest = militaris
Simia Lam. = militaris et tephrosanthos
Simia Vill. = tridentata
solida Mœnch = maculata
sparsiflora Sprun. exs. = saccata
speciosa Host A 55 (18 d)
sphærica M. B. = globosa
Spitzelii Saut. 245, A 55, 209 (18 bis)

ORCHIS I 239 (230)
spuria Rchb. f. = milit. × Aceras anthropophora
stabiana Ten. A 55 (18 e)
stenoloba Coss. et Germ. (fusca) = purp. × militaris
stenoloba Rchb. f. (purpurea) = prec.
suaveolens Vill. = Nigrit. nigra × Gymnad. conops.
subalpina Rchb. (sambuc.) = angustifol.
sulcata Goir. (*tridentata*) A 209 (8 α b)
sulphurea Sims. = pallens
sulphurea Spr. = pseudo-sambuc.
Tabernæmontani C. C. Gm. = laxiflora
taurica Lindl. = tridentata
Tenoreana Guss. in Tod. = lactea
tephrosanthos Desf. = longicruris
tephrosanthos Vill. 243 (11)
tephrosanthos × *Aceras anthrop. Paolucci et Card.* 246 (nota), A 54
Timbali Velen. = laxifloro × coriophora
transsilvanica Schur = maculata
Traunsteineri Saut. = angustifolia
trichoceras Brongn. = quadripunctata
tridentata Scop. 242 (8), A 209
trident. × *militaris Canut* A 54
undulatifolia Biv. = longicruris
ustulata L. 241 (7), A 209
ustul. × *Morio Christ* A 54
ustul. × *pyramidalis Posp.* A 54
ustul. × *tridentata Kern.* 242, A 54.
Vaillantii Ten. (viridis) = Cœlogloss. bracteatum
variegata All. = tridentata
variegata Pamp. (*Morio*) = A 54 (3 α b)
virens Scop. = Cœlogloss. viride
virescens Zoll. in Gaud. = Platanth. montana
viridis Crantz = Cœlogloss. viride
zoophora Thuill. = tephrosanthos
ORCHI-ACERAS = Orchis × Aceras
Bergoni G. Cam. = O. tephros. × A. anthr.
spuria G. Cam. = O. milit. × A. anthr.
ORCHI-GYMNADENIA = Orchis × Gymnadenia
Lebrunii G. Cam. = O. latifol. × G. conopsea
ORCHI-SERAPIAS = Orchis × Serapias
Barlæ G. Cam. = S. Lingua × O. papilion.

Digitized by Google

ORCHI-SERAPIAS = Orchis × Serapias
Debeauxii G. Cam. = S. cordig. × O. papilion.
Nouletii G. Cam. = S. cordig. × O. laxiflora
purpurea G. Cam. = S. longipet. × O. laxiflora
Tommasinii G. Cam. = S. longipet. × O. coriophora
OREOCHLOA = Sesleria
disticha Lk. = Sesleria dist.
pedemontana Boiss. et Reut. = Sesleria pedem.
seslerioides Richter = S. pedemontana
OREOSELINUM = Peucedanum
austriacum Hoffm. = P. austr.
Chabræi M. B. = P. carvifolia
Elaphoboscum Delarbre = P. Cervaria
legitimum M. B. = P. Oreoselinum
montanum Hoffm. = P. mont.
nigrum Delarbre = P. Oreosel.
peucedanoides Hoffm. = P. montanum
pseudo-carvifolium Hoffm. = Selinum carvifol.
rablense Hoffm. = P. rabl.
ORIBA = Anemone
silvestris Opiz = A. silv.
ORIGANUM III 68 (803)
album Salisb. = Onites
anglicum Hill = vulgare
confertum Savi = Majorana
creticum L. 69 (1 α b)
glabrescens G. Beck (*vulg.*) 68 (1 α a subf.)
heracleoticum Host (non L.) = hirtum
heracleoticum Rchb. = creticum
hirtum Lk. 69 (1 β)
humile Mill. 69 (1 α c)
humile Ten. = vulgare?
latifolium Mill. = creticum
macrostachyum Lk. = creticum
Majorana L. 69 (3)
megastachyum Lk. = creticum
odorum Salisb. = Majorana
officinale Gueld. = vulgare
Onites L. 69 (2)
orientale Mill. = vulgare
prismaticum Gaud. (vulg.) = creticum
purpurascens Briq. (*humile*) 69 (1 α c subf.)
purpurascens Gilib. = vulgare
sardoum Moris (hirtum) = hirtum
sardoum Nym. = prec.
semiglaucum Boiss. (*humile*) 69 (1 α c subf.)
semiglaucum Boiss. (*vulg.*) 68 (1 α a subf.)
siculum Nym. = virens
smyrnæum Host (non L.) = hirtum
spiculigerum Briq. (*vulg.*) 69 (1 α d)
thymiflorum Rchb. = vulgare
virens Auct. it. = viridulum
virens Hoffgg. et Lk. 69 (nota)
ORIGANUM III 68 (803)
virens C. A. Mey et Auct. pl. = hirtum
virescens Poir. = virens
viride Boiss. (vulg.) = hirtum
viridulum Martr.-Don. 69 (1 α a)
vulgare L. 68 (1)
ORLAYA = Daucus
Daucorlaya Mürb. = D. Daucorl.
grandiflora Hoffm. = D. grandiflorus
maritima Koch = D. pumilus
platycarpos Koch = D. platyc.
ORMENIS = Anthemis
bicolor Cass. = A. mixta
coronopifolia Less. = prec.
fuscata Sch. Bip. = A. fusc.
mixta Dum. = A. mixta
nobilis J. Gay = A. nobilis
ORNITHOGALUM I 185 (188)
Adalgisæ Groves 186 (2 β)
affine Bor. = minus
algeriense Jord. et Fourr. = orthophyllum
altaicum Laxm. = Lloydia serotina
ambiguum N. Terr. A 47 (1 β)
arabicum L. 187 (6)
arvense Pers. = Gagea arv.
autumnale Lam. = Scilla autumn.
bæticum Boiss. = umbell.
belgicum Lej. = Gagea spathacea
Bertolonii Jord. et Fourr. = exscapum
biflorum Jord. et Fourr. 185 (1 α b)
bifolium Neck. = Scilla bifol.
bohemicum Lois. = Gagea fistulosa
bohemicum Ten., Gaud. = Gagea saxatilis
bohemicum Zauschn. = Gagea bohem.
Boræanum Jord. et Fourr. = minus
Boucheanum Asch. 187 (7 β)
Bourgeanum Jord. et Fourr. = orthophyllum
brachystachys C. Koch A 47 (8 β b)
brevistylum Wolfn. = pyramidale
brutium N. Terr. 186 (2 γ)
busambarensis Tin. = Gagea busamb.
cæruleum Raf. = Scilla Cupanii?
cæspititium Jord. et Fourr. = minus
callosum Kit. = Gagea minima
chloranthum Saut. = Boucheanum
chrysanthum Jan = Gagea chrys.
Clusii Tausch = Gagea pusilla
collinum Guss. 186 (4 δ), A 47
collinum Koch = Kochii
comosum L. 186 (4), A 47
contortum Ten. 186 (4 α c)
ORNITHOGALUM I 185 (188)
cuspidatum Griseb. = montanum
decipiens Goir. 186 (4 α d)
divergens Bor. 187 (5 β), A 47
etruscum Parl. = orthophyllum
exscapum Ten. 185 (1), A 47
fistulosum Ram. = Gagea fist.
fistulosum Roth = Gagea saxatilis
flavescens Lam. A 47 (9 β)
foliosum Presl = Gagea fol.
fragiferum Vill. = Gagea — fragif.
garganicum Ten. = comosum
gracile Hagen = Gagea minima
gramineum Lam. = Anthericum Liliago
Granatelli Parl. = Gagea Gran.
Gussonei Ten. = tenuifolium
Haynii Roth = Gagea spathacea
hortense Jord. et Fourr. = umbellat. (α)
Huetii Boiss. = montanum
hyalinum Granier = nutans
intermedium Schleich = Gagea min. × fistul.
Kochii Parl. 186 (4 β)
lacteum Vill. (non Jacq.) = narbonense
latifolium L. hb. = pyrenaicum
latifolium Ucria = arabicum
liliiforme Lam. = Paradisia Liliastrum
Liottardi Sternb. = Gagea fistulosa
luteum L. = Gagea arvensis
luteum β L. = Gagea lutea
luteum W. = Gagea pratensis
majus Gilib. = Gagea lutea?
marginatum Pall. = Gagea Schreberi
maritimum Brot. = Urginea marit.
minimum L. = Gagea min.
minimum Œder = Gagea spathacea
minimum W., Pers. = Gagea arvensis
minus Gilib. = Gagea minima
minus L. A 47 (5 α b)
minus Red. (luteum) = Gagea pratensis
minutum Pall. = Gagea minima
montanum Cyr. 186 (3), A 47
mutabile DNtrs. = exscapum
nanum Parl. (an. S. et S.) = biflorum
nanum Ten. = umbellatum
nanum N. Terr. A 47 (1 nota)
narbonense L. 187, A 47 (8 β)
nebrodense Tod. = Gagea nebr.
nutans L. 187 (7)
orthophyllum Ten. 186 (4 α b)
patulum Raf. = montanum
pauciflorum Raf. = exscapum
Persoonii Hpe. = Gagea lutea
prætextum Stev. = minus
pratense Pers. = Gagea prat.
pseudo-tenuifolium Goir. = Kochii
pusillum Schmidt = Gagea pus.

Digitized by Google

ORNITHOGALUM I 185 (188)
pygmæum W. = Gagea pygm.
pyramidale L. A 47 (8)
pyrenaicum DC. = flavescens
pyrenaicum Jacq. = sphærocarpum
pyrenaicum L. 187 (9), A 47
ramosum Lam. = Anthericum ramos.
refractum Guss. etc. = divergens
refractum Kit. 186 (2)
refractum Ten. = brutium
rusticum Jord. et Fourr. = minus
ruthenicum Bouché = tenuifolium
saxatile M. et K. (bohemic.) = Gagea saxat.
saxatile Vis. = comosum (for.)
Schreberi Rchb. = Gagea Schreb.
siculum Ucria = exscapum
silvaticum Pers. = Gagea lutea
silvestre Neilr. (umbell.) = tenuifol.
spathaceum Hayne = Gagea spath.
speciosum Raf. = Scilla peruviana
sphærocarpum Kern. A 47 (9 α)
Squilla Ker-Gawl. = Urginea marit.
stachyoides Ait. = narbonense
stenopetalum Fr. = Gagea pratenis
Sternbergii Hpe. = Gagea minima
striatum W. = Lloydia serotina
sulphureum Schult. = flavescens
Szovitsii Lang = Gagea bohemica
tardans Jord. et Fourr. = minus
tenuifolium Guss. 186 (4 γ), A 47
tunicatum Presl = Gagea pusilla
umbellatum L. 187 (5), A 47
villosum M. B. = Gagea arvensis
Zauschneri Pohl = Gagea bohemica
ORNITHOPODIUM = Ornithopus
compressum All. = O. compr.
ebracteatum O. Ktze. = O. exstipulatum
scorpioides Scop., All. = Coronilla scorpioides
triphyllum Mœnch = prec.
ORNITHOPUS II 89 (507)
compressus L. 90 (2)
durus DC. (non Cav.) = seg.
ebracteatus Brot. = exstipul.
exstipulatus Thore 90 (1)
intermedius Roth = perpusillus
levigatus Sm. = exstipul.
lotoides Viv. = Coronilla repanda
nodosus Mill. = perpusillus
ORNITHOPUS II 89 (507)
nudiflorus Lag. = exstipul
perpusillus L. 90 (3)
pygmæus Viv. 90 (1 b)
repandus Poir. = Coronilla repanda
roseus Duf. = perpusillus
scorpioides L. = Coronilla scorpioides
subumbellatus Gilib. = perpus.
trifoliatus Lam. = Coronilla scorpioides
ORNITHORHYNCHIUM = Euclidium
syriacum Rœhl. = E. syriac.
ORNUS = Fraxinus
argentea Gr. et Godr. (europ.) = F. argentea
canescens Rouy (europ.) = F. — canesc.
europæa Pers. = F. Ornus
lanceolata Rouy = F. — lanceolata
rotundifolia Mœnch = F. rotund.
OROBANCHE II 474 (772)
abbreviata Beck (*crenata*) 479 (11 c)
achroantha Beck (purpur.) = Kopsia — achr.
adenostyla Vis. (minor) = pumila
ægyptiaca Pers. = Kopsia æg.
alba Guss. = Gussonei?
alba Kitt. = pallidiflora
alba Mutel = crenata
alba Steph. 479 (9)
alsatica Kirschl. 480 (13)
ambigua Moris = Carotæ
amethystea Caruel = alba
amethystea Thuill. 483 (20)
amethystina Rchb. = amethystea
amplissima Beck (*varieg.*) 478 (7 α d)
angustiflora Beck (Muteli) = Kopsia — angustifl.
arenaria Borkh. = Kopsia arenaria
Artemisiæ Vauch. = loricata (α)
Artemisiæ-campestris Vauch. = prec.
australis Lojac. = versicolor
australis Moris = canescens
barbata Poir. 483 (22 α d)
bicolor Bert. (non C. A. Mey.) = cernua
Borkhausenii Andr. = Kopsia arenaria
brachystachys Beck (*crenata*) 479 (11 b)
bracteosa Reut. (*Rapum-Gen.*) 482 (18 β)
brevispicata Beck (*caryophyll.*) 476 (8 b)
cærulea Moris = Kopsia stricta
cærulea Vill. = Kopsia purpur. (α)
cærulescens Steph. 476 (2)
cæsia Guss. = Kopsia Gussoneana
campuliflora Lojac. 484 (23 d)
OROBANCHE II 474 (772)
campuliflora Lojac. (pubesc.) = prec
canescens J. et C. Presl 485 (25)
canescens Sprun. = crenata
canescens var. b. Guss. = pedicellata
capitata Beck (*alba*) 479 (9 a)
Cardui Sauter = reticul. (α)
carnea Guss. = bracteosa
Carotæ Des Moul. 483 (21 β b)
caryophyllacea Sm. 477 (3)
caudata DNtrs. 480 (13 β)
centaurina Bert. 485 (nota) = major?
cernua Lœfl. 475 (1)
Cervariæ Kirschl., Suard = alsatica (α)
Chironii Lojac. 480 (13 γ)
Chrithmi Bert. = seg.
Crithmi-maritimi Schultz 484 (22 γ)
Cirsii Fr. = pallidiflora
citrina Coss. et Germ. (cruenta) = panxantha
collecta Beck (*lutea*) 477 (5 b)
Columbariæ Gr. et Godr. = concolor
comosa Wallr. = Kopsia arenaria
concolor Bor. = Chrithmi-mar., panxantha
concolor Duby 485 (27)
condensata Lojac. = amplissima
condensata Moris = variegata (α)
congesta Rchb. f. = crenata
crenata Forsk. 480 (11)
crinita Viv. 478 (8 β)
cruenta Bert. = gracilis
cumana Guss. = cernua
cyanea Beck (ramosa) = Kopsia — cyan.
decora Moris = denudata
densiflora Moris = procerior?
denudata Moris 481 (14)
depauperata Lojac. (sanguin.) = nebrodensis
Deucalion Rchb. f. 479 (10 β b)
elatior Koch et Ziz (non Sutt.) = lutea
elatior Poir = amethystea
elatior Sutton = major
eminens Beck (*Salviæ*) 481 (16 α b)
Epithymum DC. = alba
epixantha Beck (*varieg.*) 478 (7 α b)
eriostemon Rchb. (*caryophyll.*). 477 (3 f)
Eryngii Duby = amethystea
flava Mart. 481 (15)
flavescens Gr. et Godr. (minor) = Carotæ
flavescens Guss. (Rapum) = palatina
flavescens Strobl (canesc.) = pedicellata
flavidiflora Guss. = canescens
forojuliensis Nym. = major
fragrans Gib. et Pir. = lutea
fragrans Koch = major

Digitized by Google

OROBANCHE II 474 (772)
fragrantissima Bert. = lutea
Freynii Nym. = Carotæ
fuliginosa Reut. 485 (26)
Galii Duby = caryophyll.
Galii b Guss. = caryophyll.
gallica Gren. = cernua
Genistæ-cinereæ Schultz = gracilis
glaberrima Guss. = Hederæ?
glabrescens Gr. et Godr. (Rapum) = rigens
gracilis Sm. 478 (6)
grandiflora Bory et Chaub. = crenata
grandiflora Presl = varieg. (α)
grandiuscula Moris = gracilis
Grenieri Nym. = Chrithmi-maritimi
Grenieri F. Schultz = cernua
Gussonei Nym. (alba) 479 (9 g)
Hederæ Duby 481 (24)
Hederæ-Helicis Schultz = prec.
Helicis Rota = Hederæ
hispanica Boiss. = cernua
homochroa Beck (versicol.) 484 (23 c)
hyalina Sprun. = minor (α)
Hyperici Unger. = reticul. (α)
hypoxantha Beck (Rapum-Gen.) 482 (18 α c)
ionantha Kern = Kopsia — ionantha
Juccæ Savi f. 485 (nota)
Kochii F. Schultz = major
lactea Beck (alba) 479 (9 h)
Laserpitii-Sileris Reut. 485 (nota)
latebuscens Guss. = caryophyll.
laurina Bonap. = minor (α)
laurina Rchb. f. = Hederæ
lavandulacea Rchb. = Kopsia lavand.
laxiflora N. Terr. (alba) 479 (9 c)
Leonuri Rota = minor (α)
leptocalamus Beck (alba) = laxiflora
leucantha Gris. = pallidiflora
Levieri Lojac. = gracilis?
levis L. p. p. = Kopsia arenaria
litorea Guss. 484 (22 δ)
littoralis Lojac. = canescens?
livida Sendt. = pumila
longebracteata Beck (alba) 479 (9 d)
lopholepis Beck (lutea) 477 (5 c)
loricata Rchb. 483 (21)
loricata Rchb. p. p. = lucorum
lucorum A. Br. 482 (17)
lutea Baumg. 477 (5)
lutea Beck (lutea) 477 (5 d)
lutea Biv. (Spartii) = epixantha
lutea Lojac. = epixantha
major L. 480 (12)
major Lam., Sm. = Rapum-Genistæ
maritima Coss. (major) = forojuliensis
Mathesii F. Schultz = pallidiflora
maxima Beck (alba) 479 (9 b)

OROBANCHE II 474 (772)
Medicaginis Duby (non Schultz) = lutea
Medicaginis Rchb. p. p. = Hederæ
megaphyllon Beck (Hederæ) 484 (24 c)
microsepala Beck (alba) 479 (9 f)
Millefolii Guss. (cærulea) = Kopsia — Spitzelii?
minima Beck (minor) 483 (22 α c)
minor Sutton 483 (22), A 172
minuscula Beck (Hederæ) 484 (24 e)
monochroa Beck (Hederæ) 484 (24 d)
monoclonos Wallr. (ramosa) = Kopsia — monocl.
Morisiana Nym. = Kopsia — rufescens
Muteli F. Schultz = Kopsia Mut.
nana Noe = Kopsia — nana
nebrodensis Tin. (sanguin.) 478 (8 γ)
nigricans G. Beck (rigens) A 215 (19 b)
Noeana Nym. p. p. = gracilis
nudiflora Wallr. = minor (α)
occidentalis Beck (cærulesc.) 475 (2 b)
olbiensis Nym. = Kopsia — nana
pachnodes Beck (varieg.) 478 (7 α e)
palatina F. Schultz 482 (18 α b)
pallida Reut. (pubesc.) = homochroa
pallidiflora Bizz. (purpur.) = Kopsia — achroantha
pallidiflora Wim. et Grab. 479 (10 β)
panxantha Beck (gracilis) 477 (6 b)
parviflora Beck (gracilis) 477 (6 c)
pauciflora Wallr. (caryophyll.) 476 (3 a)
pedemontana Beck (Salviæ) 481 (16 β)
pedicellata Reut. (canesc.) 485 (25 b)
Pelargonii Cald. 485 (nota)
Picridis Schultz 483 (21 β)
Picridis-hieracioidis Schultz = Picridis
platystigma Rchb. = reticul. (α)
polyclonos Wallr. (ramosa) = Kopsia — polycl.
proboscistyla Bianca = Kopsia — probosc.
procera Koch 479 (10 β a)
procerior Rchb. (minor) 483 (22 α b)
pruinosa Lap. = crenata
pseudo-barbata Beck (versicol.) 484 (23 b)
pubescens d'Urv. = versicolor
pumila Koch et Noe 484 (22 β), A 172

OROBANCHE II 474 (772)
punctata F. G. Schultz (an Guss.?) = alba
purpurea Jacq. = Kopsia purp.
purpurea Raf. = variegata (α)
pyrrha Rchb. f. 485 (nota)
ramosa L. = Kopsia ram.
ramosa Presl (cærulea) = Kopsia lavandul.
ramosissima Lojac. (Muteli) = Kopsia — polyclonos
ramosissima Lojac. p. p. (non Wirtg.) = Kopsia — angustiflora
Rapum Thuill. et Auct. = seg.
Rapum-Genistæ Thuill. 482 (18)
Reichardiæ Freyn = Picridis
reticulata Wallr. 479 (10)
rhætica Bruegg. = reticul. (α)
rigens Lois. 482 (19), A 215
Ritro Gr. et Godr. 480 (12 b)
rubens Wallr. 477 (5 a)
Rubi Duby 481 (17 b)
rubra Hook. 479 (9 for.)
rufescens Nym. = Kopsia — rufescens
sabulicola Lojac. = canescens et fuliginosa
Salisii Req. = pumila
Salviæ F. G. Schultz 481 (16), A 172
sanguinea Presl 478 (8)
Satyrus DNtrs. 478 (7 b)
Sauteri F. Schultz = seg.
Scabiosæ Koch = reticul. (α)
Scabiosæ-Columbariæ Schultz = concolor
Schultzii Mutel = Kopsia Schultzii
segetum Sprun. = crenata
Serpylli Des Moul. = alba
sicula Lojac. 478 (7 α c)
sideritis Huter P. et R. = sparsiflora Wallr.
simplex Zersi, Pasq. (ramosa) = Kopsia — monoclonos
sparsiflora Wallr. (caryophyll.) 476 (3 c)
Spartii Rchb. f. = amplissima
Spartii Vaucher = variegata (α)
speciosa DC. (non Dietr.) = crenata
Spitzelii Beck (purpur.) = Kopsia Spitzelii
squalida Stev. = alba
stenantha Lojac. 484 (24 b)
stenophyllon Beck (alba) 479 (9 e)
stigmatodes Wim. = major
straminea Lojac. (crinita) 478 (8 β b)
stricta Moris = Kopsia stricta
strobiligena Rchb. 477 (3 e)
superba DNtrs. = variegata (α)
Teucrii Hol. 477 (4), A 172
thapsoides Lojac. = versicolor
thyrsiflora Wallr. (caryophyll.) 476 (3 d)
thyrsoides Moris = rigens
Tommasinii Lojac. 485 (nota)
Tommasinii Rchb. f. (elatior) = lutea

Digitized by Google

OROBANCHE II 474 (772)
Trifolii-pratensis Schultz = minor (α)
trinacria Beck (ægypt.) = Kopsia — trinacria
unicolor Bor. = Chrithmi-mar.
variegata Wallr. 478 (7), A 172
Vaucherii Noulet = Hederæ
versicolor F. G. Schultz 484 (23)
Viciæ-Fabæ Schultz = crenata
villosa Strobl (gracilis) = variegata (α)
Vitalbæ Bert. = versicolor
vulgaris Auct. al. = caryophyll.
vulgaris Gaud. (non Poir.) = gracilis
OROBELLA = Vicia
vicioides Presl = V. dumetorum
OROBUS = Lathyrus
alatus A. Br. = L. alatus
albus L. f. = L. pannonicus
angustifolius Balb., Ten. = L. varius
angustifol. Schur (vernus) = L. — flaccidus
angustifolius Vill. (non L.) = L. filiformis
angustissimus Cocc. (albus) = L. — angustiss.
articulatus A. Br. = L. artic.
asphodeloides Gouan = L. pannonicus
atropurpureus Desf. = Vicia sicula
austriacus Crantz = L. pannonicus
bimarginatus Stokes = L. sativus
bulbosus Stokes = L. montanus
canescens L. f. = L. filiformis
canescens B Ten. = L varius
ciliatus Alef. = L. saxatilis
Clusii Spr. = Vicia Oroboides
Clymenum A. Br. = L. Clym.
coccineus Mill. = L. sphæricus
collinus Ortm. (pannonicus) = L. varius
Denhardtii Ten. ex Steud. = quid?
digitatus M. B. = L. digit.
divaricatus Lap. = L. — divar.
exaltatus Ten. et Guss. = L. exalt.
Faba Brot. = Vicia Faba
filiformis Lam. = L. filif.
Fischeri Sweet = Vicia sicula
flaccidus Kit. = L. — flacc.
Gmelini Fisch. in DC. = L. Gmelini
gracilis Gaud. = L. — gracilis
hirsutus L. = L. inermis
hispidulus Alef. = seg.
inconspicuus A. Br. = L. inconsp.
Jordani Ten. = L. Jord.
lacteus M. B. = L. pannon. (α)
laxiflorus Desf. = L. inermis
Lens Stokes = Vicia Lens
linifolius Reichardt = L. mont. β tenuifol.
luteus L. = L. Linnæi
OROBUS = Lathyrus
macrorrhizus Dulac = L. montan.
macrorrhizus Neilr. (pannonicus) = L. varius
maritimus Rchb. = L. mar.
montanus Scop. = L. Linnæi
multiflorus Sieb. = L. — multifl.
niger L. = L. niger
Nissolia Dœll = L. Nissol.
occidentalis F. et M. (luteus) = L. occid.
occident. Fritsch = prec.
ochroleucus W. et K. = Vicia sparsiflora
Ochrus A. Br. = L. Ochrus
orientalis F. et M. (luteus) = L. Gmelini
pallescens M. B. = L. pallesc.
puluster Rchb. = L. palust.
pannonicus Jacq. = L. pann.
pratensis Stokes = L. prat.
purpureo-cæruleus Gilib. = L. vernus
pyrenaicus Scop. (non L.) = L. venetus
Rafinesquei Presl = L. filiformis
rigidus Láng = L. venetus
saxatilis Vent. = L. saxat.
serotinus Presl = L. venetus
sessilifolius S. et S. = L. digitatus
setifolius Philippe = L. setif.
siculus Raf. = Vicia sicula
silvaticus Bast. = Vicia Cassubica
silvaticus Baumg. (non L.) = L. vernus
sparsiflorus Cocc. et Cug. = Vicia spars.
sphæricus Philippe = L. sphær.
tenuifolius Roth = L. mont. β tenuifol.
tristis Láng = L. niger
tuberosus L. = L. montanus
variegatus Ten. = L. venetus
varius Hill, Sims = L. varius
venetus Mill. = L. venetus
vernus L. = L. vernus
vernus β Bert. = L. — gracilis
vernus S. et S. = L. venetus
versicolor J. F. Gmel. = L. varius
viciæformis Lag. = Vicia monantha
vicioides Ser. in DC. = Vicia Oroboides
vicioides Vill. = L. filiformis
ORONTIUM = Antirrhinum
arvense Pers. = A. Orontium
calycinum Pers. = A. calyc.
majus Pers. = A. majus
siculum Pers. = A. sicul.
ORSINIA = Jasonia
camphorata Bert. = J. glutinosa
ORTEGIA I 336 (324)
dichotoma L. = hispanica
hispanica L. 336
ORTHOCENTRON = Cirsium
glomeratum Cass. = C. polyanthemum
ORTHOLOTUS = Dorycnium
rectus Fourr. = D. rectum
ORTHOPOGON = Oplismenus
Crus-Galli Spr. = Panic. Crus-Galli
echinatus Spr. = Panic. echin.
stagninus Spr. = Panic. oryzoides
undulatifolius Spr., Rchb. = O. undul.
undulatus Lk. = prec.
ORTHOSPERMUM = Chenopodium
acuminatum Schur = C. blitoides
Bonus-Henricus Schur = C. Bon.-Henr.
crassifolium Schur = C. botryoides
glaucum Opiz = C. glauc.
rubrum Opiz = C. rubr.
ORTHOSPORUM = Chenopodium
ambrosioides Kostel. = C. ambros.
Bonus-Henricus Nees = C. Bon.-Henr.
glaucum Peterm. = C. glauc.
multifidum Kostel. = Roubiæva mult.
rubrum Nees = C. rubr.
suffruticosum Kostel = C. ambrosioides
unctuosum Montand. = C. Bonus-Henr.
ORVALA = Lamium
garganica L. III 37 (nota)
lamioides DC. = L. Orvala
ORYZA I 51 (55)
clandestina A. Br. 51 (2)
communissima Lour. = seg.
palustris Salisb. = seg.
perennis Mœnch = seg.
sativa L. 51 (1)
ORYZOPSIS = Milium
cærulescens Hack. (1885) = M. cærul.
miliacea Asch. et Schweinf. (1887) = M. multiflorum
paradoxa Nutt. = M. paradox.
Thomasii Richter, Asch. et Græbn. (miliacea) = M. Thomasii
virescens Beck (1890) = M. — viresc.
OSMUNDA I 17 (21)
crispa L. = Allosorus crisp.
lanceolata Gmel. = Botrych. lanceol.
longifolia Presl (regal.) A 8 (β b)
Lunaria L. = Botrych. Lun.
Lunar. γ L. = Botrych. matricariæfol.
Lunar. δ L. = seg.
Matricariæ Schrank = Botrych. Matricariæ
Plumierii Tausch A 8 (β)
ramosa Roth = Botrych. matricariæfol.
regalis L. 17 (1), A 8
Spicant L. = Blechnum Spic.
Struthiopteris L. = Struth. germanica

Digitized by Google

OSMUNDA I 17 (21)
ternata Thumb. = Botrych. tern.
virginiana L. = Botrych. virginianum
OSTEOSPERMUM
moniliferum DC. A 186
OSTERICUM = Peucedanum
verticillare Rchb. = P. vertic.
OSTRUTHIUM = Peucedanum
officinale Lk. = P. Ostruthium
OSTRYA I 267 (253)
carpinifolia Scop. 267, A 58
corsica Fliche (*carpin.*) 267 (β)
italica Spach = carpinifol.
Ladelcii Sang. 267 (α b)
Ostrya Mac Mill. = carpinifol.
virginiana Gürke (non C. Koch) = carpinifol.
vulgaris W. = carpinifol.
OSYRIS I 285 (273)
alba L. 285, A 62
megalocarpa Goir. (*alba*) A 62 (c)
scandens Goir. (*alba*) A 62 (b)
OTANTHUS = Diotis
maritimus Hoffgg. et Lk. = D. marit.
OTHOCALLIS = Scilla
amœna Salisb. = S. amœna
OTHONNA = Senecio
integrifolia L. = S. campester
OTITES = Silene
nemoralis Opiz = S. — floccosa
nutans Opiz = S. nutans
parviflora Fourr. = S. Otites
viridiflora Opiz = S. virid.
OXALIS II 246 (627)
Acetosella L. 246 (1)
adscendens Moris (*cornic.*) 246 (3 α c)
alpina Schur (Acetos.) = parviflora
ambigua Salisb. = stricta
atropurpurea Hort. (cornic.) = purpurea
Burmanni Jacq = cernua
cærulea DC. (*Acetos.*) 246 (1 d)
cernua Thunb. 246 (2), A 158
corniculata L. 246 (3), A 158
diffusa Bor. 246 (3 α b)
europæa Jord. = stricta
humilis Thunb. 247 (*nota*)
lilacina Rchb. (*Acetos.*) 246 (1 c)
lybica Viv. = cernua
minor Lang. (*cornicul.*) A 158 (3 α for.)
Navieri Jord. = adscendens
parviflora Goir. (*cornicul.*) A 158 (3 α for.)
parviflora Lej. 246 (1 e)
pleniflora Ces. P. et G. (*cernua*) 246 (2 b)
purpurea Parl. (*cornic.*) 246 (3 α d)
pusilla Salisb. = cornicul. (α a)
rosiflora Evers (Acetos.) = subpurpurata
rubra Hort. (cornic.) = purpurea
speciosa Zodda (non Jacq.) = humilis
stricta L. 247 (3 β)
OXALIS II 246 (627)
subacaulis Chast (*cornicul.*) A 158 (3 α for.)
subpurpurascens DC. (*Acetos.*) 246 (1 b)
tropæoloides Hort. = purpurea
variegata Goir. (*cornicul.*) A 158 (3 α for.)
villosa M. B. A 158 (3 α e)
violacea L. 247 (*nota*)
OXYACANTHA = Cratægus
laciniata M. Rœm. = C. lacin.
monogyna M. Rœm. = C. mon.
sicula M. Rœm. = C. laciniata
vulgaris M. Rœm. = C. Oxyacantha
OXYBAPHUS I 325 (307 bis)
nyctagineus Sweet 325 (nota), A 66
OXYBASIS = Chenopodium
minutiflora Kar. et Kir. = C. rubrum
OXYCOCCUS II 304 (670)
europæus Nutt. (1818) = O. quadripetal.
paluster Pers. = quadripet.
quadripetalus Gilib. 304
vulgaris Bong. = quadripet.
OXYLAPATHON = Oxyria
digynum St.-Lag. = O. dig.
OXYRIA I 302 (285)
acida R. Br. = digyna
digyna Hill. 302
reniformis Hook. = digyna
rotundifolia S. F. Gray = digyna
OXYS = Oxalis
Acetosella Scop., All. = O. Acetos.
alba Lam., Gilib. = O. Acetosella
ambigua Salisb. = O. stricta
corniculata Scop., All. = O. cornic.
lutea Lam., Mœnch = O. stricta
stricta All. = O. stricta
vulgaris Rupr. = O. Acetosella
OXYTROPIS = Astragalus
alpina Ten. (campestr.) = A. — alpinus Fiori
amethystea Arv. T. = A. — neglectus
campestris DC. = A. camp.
cana Boiss hb. (campestr.) = A. — alpinus Fiori
carinthiaca Huter (non Fisch.-Oost.) = A. — Huteri
cyanea Gaud. (non M. B.) = A. — neglectus
dichoptera DC. = A. austriacus
fœtida DC. = A. fœtid.
Gaudini Bge. = A. — neglectus
generosa Bruegg. = A. — Huteri
Halleri Bge. = A. — Halleri
Huteri Rchb. = A. — Huteri
hyposericea Rchb. (uralensis) = A. — Halleri
incanescens Huter P. et R. (camp.) = A. — alpinus Fiori
Jacquini Bge. = A. Jacq.
lapponica J. Gay, Gaud. = A. lapponicus
OXYTROPIS = Astragalus
montana Benth. = A. pyrenaicus
montana DC. = A. mont.
montana Gaud. = A. Jacquini
montana Guss. rar. = A. — neglectus
montana Spr., Wallr. = A. danicus
neglecta J. Gay = A. — neglect.
Parvopassuæ Parl. = A. Parvop. b. neglectus
pilosa DC. = A. pilosus
pyrenaica Gr. et Godr. = A. pyrenaicus
samnitica Arc. (Gaudini) = A. pyrenaicus
sericea DC. (uralensis) = A. — sericeus
sordida Gaud. = A. sord.
triflora Hpe. = A. triflorus
uralensis DC. = A. ural.
velutina Sieb., Schur = A. — sericeus

PACHYLOMA = Ranunculus
arvense Spach = R. arv.
PACHYPLEURUM II 169 (560)
albo-marginatum Rupr. = seg.
simplex Rchb. 169
PACHYPODIUM = Sisymbrium
bursifolium Endl. = Barbarea dentata
Columnæ Webb = S. Column.
erysimoides Webb et Berth. = S. erys.
pannonicum Endl. = S. pannon.
PADUS = Prunus
avium Mill. = P. Padus
eglandulosa Mœnch = P. lusitanica
germanica Borkh. = P. Padus
Laurocerasus Mill. = P. Lauroc.
lusitanica Mill. = P. lusit.
Mahaleb Borkh. = P. Mahal.
petræa M. Roem. = P. — petræus
racemosa Gilib. = P. Padus
vulgaris Borkh. = P. Padus
PÆDEROTA = Veronica
Ageria L. = V. lutea
Bonarota Jacq. = prec.
Bonarota L. = V. Bonar.
cærulea Scop. = V. Bonarota
Chamædryfolia Brign. = V. Cham.
Churchilii Huter = V. luteo × Bonarota
lutea Scop., L. f. = V. lutea
major DC. (Bonarota) = V. Bonar. × lutea
nudicaulis Lam. = Wulfenia carinthiaca
urticæfolia Brign. = V. lutea
Wulfenia W. = Wulfen. carinthiaca
Zannichellii Brign. = V. — Zann.
PÆONIA I 526 (439)
angustata Rouy et Fouc. 527 (γ b)
arietina Anders. = fœminea
Broteri Boiss. et Reut. p. p. = ovatifolia

Digitized by Google

PÆONIA I 526 (489)
Cambessedesii Wk. p. p. = corsica
commutata Wend. = fœminea
corallina Retz. = mascula
corsica Sieb. 527 (ζ), A 110
daurica Anderss. = triternata
festiva Tausch. = fœminea
flavescens J. et C. Presl 527 (δ c)
fœminea Desf. = seg.
fœminea L. (offic.) 526 (α)
hirsuta Mill. = fœminea
humilis W. (non Retz) = villosa
integra Murr. = mascula
integrifolia Lk. = mascula
lejocarpa Coss. (corall.) = corsica
lobata Boiss. (non Desf.) = ovatifolia
lobata Rchb. = fœminea
lusitanica Tausch = fœminea
mascula Desf. = seg.
mascula L. (offic.) 527 (δ)
mascula Mill. = fœminea
nemoralis Salisb. = fœminea
officin. Gouan., Retz = fœmin.
officinalis L. 526, A 109
officinalis Pall. = mascula
ovatifolia Boiss. et Reut. (Broteri) = seg.
ovatifolia Fiori (mascula) 527 (δ b)
Pallasii Huth (corall.) = triternata
paradoxa Anders. 527 (γ) = villosa, cfr. A 109
peregrina Mill. 526 (β)
promiscua Tausch = fœmin.
pubens Sims = paradoxa
pubescens Moris (corall.) = Russi
pubens Rchb. = fœminea
Reverchoni Fiori (corsica) A 110 (ζ b)
Reverchoni Legr. (Russi) = prec.
rosea Host = fœminea
rotundifolia Hort. = triternata
Russi Biv. 527 (ε b)
sessiliflora Sims = fœminea
tatarica Mill. = villosa
triternata Pall. 527 (ε)
villosa Desf., Sweet A 109 (γ)
PALEYA = Crepis
albida Cass. = C. albida
PALIMBIA = Peucedanum
carvifolia Koch = P. carvif.
Chabræi Bert. = P. carvifol. et P. Schottii
Chabræi DC. = P. carvifolia
PALIURUS II 212 (610)
aculeatus Lam. = Spina-Christi
australis Gaertn. = prec.
clypeiformis Medic. = prec.
humilis Fiori (Spina-Chr.) A 154 (e)
humilis Goir. (austral.) = prec.
macrocarpus Fiori (Spina-Chr.) A 154 (d)
macrocarpus Goir. (austral.) = prec.
PALIURUS II 212 (610)
macrophyllus Fiori (Spina-Chr.) A 154 (b)
macrophyllus Goir. (austral.) = prec.
microphyllus Fiori (Spina-Chr.) A 154 (c)
microphyllus Goir. (austral.) = prec.
Petasus Dum.-Cours. = seg.
solitarius Stokes = seg.
Spina-Christi Mill. 212, A 154
trinervatus Mœnch = prec.
vulgaris Steud. = prec.
PALLAVICINIA = Alliaria
Alliaria Cocc. = A. officinalis
PALLENIS = Asteriscus
aurea Nym. = A. aureus
montana N. Terr. (spin.) = A. spin. (α)
pallida Cicioni (Spin.) = A. spin. (α)
spinosa Cass. = A. spinosus
PANCRATIUM I 217 (216)
illyricum L. 218 (2), A 208
maritimum L. 218 (1), A 50
stellare Salisb. = illyricum
PANICASTRELLA = Echinaria
capitata Mœnch = E. capit.
muricata Mœnch = prec.
PANICUM I 49 (52)
adhærens Forsk. = Setar. verticill.
ambiguum Guss. (verticill.) = Setar. amb.
ambiguum Lap. = Digit. filiform.
antrorsum A. Br. (verticill.) = Setar. ambigua
arenarium Brot. = repens
arenarium M. B. = Digit. filiform.
aristatum Wirtg. (Crus-G.) = echinatum
asperum Lam. = Setar. verticill.
bicolor Mœnch = Setar. viridis
brevisetum Doell (Crus-G.) = Crus-Galli (a)
capillare L. 50 (4), A 18
caucasicum Trin. = eruciforme
ciliare Retz. = Digit. ciliaris
colonum L. 50 (7), A 18
coloratum Cav. = repens
commutatum Nees = Digit. ciliaris
compactum Kit. = Setar. ital.
compressum Biv. 49 (1)
Crus-Corvi L. = Crus-Galli
Crus-Galli L. 50 (8), A 208
cynosuroides Scop. = Setar. glauca
Dactylon L. = Cynodon Dact.
debile Desf. = Digit. debilis
deflexum Guss. = Ehrharta panicea
Digitaria Laterr. = Digit. disticha
digitatum Gilib. = Crus-Galli
dimidiatum L = Stenotaphrum dimid.
echinatum W. 50 (8 b)
eruciforme S. et S. 50 (6) A 18
PANICUM I 49 (52)
erythrospermum Horn. = Setar. italica
esculentum Gaud. (sanguin.) = Digit. — escul.
filiforme Gcke. (non L.) = Digit. filif.
filiforme Poir. = Digit. debilis
flavescens Mœnch = Setar. glauca
germanicum Mill., W. = Setar. germ.
glabrum Gaud. = Digit. filiformis
glaucum L. = Setar. glauca
glomeratum Mœnch = Setar. italica
gracile Nym. (non R. Br.) = Digit. gracilis
Gussonii Richt. = Digit. gracilis
hæmatodes Presl. = colonum
helvolum Georgi = Setar. glauca
hirtellum Scop., All. = Oplismenus undulatifol.
Hostii M. B. = oryzoides
humifusum Kth. = Digit. filiformis
Ischæmum Schreb. = Digit. filiformis
Isachne Roth = eruciforme
italicum L. = Setar. ital.
italicum Ucria = Setar. verticillata
levigatum Lam. = Setar. viridis
lineare Krock. (non L.) = Digit. filiformis
Linkianum Kth. = Digit. sanguinal.
longisetum Doell (Crus-G.) = echinatum
lutescens Weig. = Setar. glauca
luteum Gueld. = Setar. glauca
majus Gaud. (viride) = Setar. — major
miliaceum L. 50 (5)
Milium Pers. = prec.
muticum Wirtg. (Crus-G.) = Crus-Galli (a)
nodiflorum Asch. et Græbn. (viride) = Setar. — nodiflora
numidianum Presl = colonum
officinarum Maratti = Cynodon Dactylon
oryzinum Gmel. = oryzoides
oryzoides Ard. A 208 (8 c)
parvifolium Lam. 49 (8)
polystachyum Ucria = repens
phyllopogon Stapf A 18 (9)
pumilum Poir. in Lam. = Setar. pumila
reclinatum Vill. = Setar. glauco × viridis
repens L. 49 (2), A 18
sanguinale L. = Digit. sang.
sanguineum Gueld. = prec.
serpens Kth. 50 (8 β)
stagninum Retz ?, Host = oryzoides
Teneriffæ R. Br. = Tricholæna Tener.
tetrastachyon Forsk. = colonum
umbellatum Trin. = serpens

Digitized by Google

PANICUM I 49 (52)
undulatifolium Ard. = Oplismenus undul.
vaginatum Gr. et Godr. = Digit. disticha
vagum Scop. = Polypog. monspeliensis
verticillatum L. = Setar. verticillata
villosum Presl = Tricholæna Tenerif.
viride L. = Setar. viridis
vulpinum W. = Penniset. ciliare
zonale Guss. 50 (7 b)
PAPAVER I 484 (419)
albiflorum Koch (alpinum) = Burseri
albiflorum Rouy et Fouc. (*pyrenaic.*) 485 (1 β c)
album Mill. 486 (4 γ)
alpinum L. 484 (1)
ambiguum Fiori (*hybridum*) 485 (2 α b)
ambiguum Rouy et Fouc. (hispidum) = prec.
amplexicaule Stokes = somnifer.
apulum Ten. 485 (2 β c)
Argemone L. 485 (2 β)
argemonoides Ces. = apulum
arvense Borkh. = Argemone
arvense Salisb. = Rhœas
atropurpureum Gilib. = Rhœas
aurantiacum Lois. = pyrenaicum
breviflorum Gilib. = dubium
Burseri Crantz 485 (1 α)
Burseri Rchb. = albiflorum
caudatifolium Timb. 485 (3 α c)
cereale Jord. = Rhœas (α a)
clavatum Gilib. = Argemone
clavigerum Lam. = prec.
collinum Bogenh. A 102 (3 α for)
confine Jord. A 102 (3 ε for.)
corniculatum Pall. = Glaucium cornic.
corsicum Jord. et Fourr. = confine
corsicum Thouin = quid?
decipiens Rouy et Fouc. 485 (1 α b)
depressum Jord. et Fourr. A 102 (3 ε for.)
Dodonæi Timb. = intermedium
dubium L. 486 (3 ε), A 102
errabundum Jord. A 102 (3 ε for.)
erroneum Jord. = collinum
flaviflorum Koch (alpinum) = pyrenaicum
frentanum Ten. A 102 (3 ε for.)
frentanum Ten. (dubium) = prec.
glabrum Boiss. (somnifer.) = seg.
glabrum Gilib. = hortense
glabrum Koch (*Argemone*) 485 (2 β b)
heterotrichum Lojac. exs. = siculum
hispidum Lam. = hybridum
hortense Hussen 486 (4 β)
hybridum L. 485 (2)
PAPAVER I 484 (419)
improperum Jord. et Fourr. = Lecoqui
integrifolium Vig. ex DC. 485 (3 α d)
intermedium Becker 485 (3 α e)
laciniatum Goir. (*Rhœas*) A 102 (3 α for.)
Lecoqui Lamotte A 102 (3 α for.)
nigrum DC. (somnifer.) = setigerum
oblongatum Boiss. (Rhœas) = strigosum
obtusifolium Desf. 486 (3 γ), A 102
officinale C. C. Gmel. = album
opiiferum Forsk. = somnifer.
pallidum Gr. et Godr. (*Rhœas*) A 102 (3 α f)
parviflorum Lam = dubium
pinnatifidum Moris 486 (3 δ), A 102
pinnatifid. × *setigerum Genn.* 486 (nota)
pyrenaicum W. 485 (1 β)
rhæticum Leresche 485 (1 β b)
Rhœas L. 485 (3), A 102
Roubiæi Vig. 485 (3 α b)
Rubiæi Guss., Presl = obtusifolium
rusticum Jord. = strigosum
setigerum DC. 486 (4 α)
siculum Guss. 485 (2 α c)
Simoni Fouc. A 102 (3 δ')
somniferum L. 486 (4)
strigosum Bœnn. (*Rhœas*) 485 (3 β)
strigosum Schur = prec.
suaveolens Lap. = pyrenaicum
Tinei Lanza A 102 (3 δ'')
vestitum Gr. et Godr. (Rhœas) = Roubiæi
PAPILLARIA = Scheuchzeria
palustris Dulac. = S. pal.
PAPYRUS = Cyperus
antiquorum W. = C. Papyrus
siculus Parl. = prec.
PARADISIA I 204 (198)
hemeroantheticoides Massuc. = seg.
Liliastrum Bert. 204
PARALLOSA = Vicia
monanthos Alef. = V. multifida
PARAMESUS = Trifolium
levigatus Fourr. = T. levigat.
strictus Presl = prec.
PARENTUCELLIA = Bartsia
floribunda Viv. = B. latifolia
latifolia Caruel = B. latifol.
viscosa Caruel = B. viscosa
PARIETARIA I 279 (267)
affinis Hornem. = cretica
assurgens Poir. = judaica
bracteata Mœnch = cretica
cretica L. 280 (3)
cretica Lois. = lusitanica
cretica Moris = Soleirolii
diffusa M. et K. = judaica
erecta M. et K. 279 (1 α)
filiformis Ten. A 61 (2 β)
judaica L. 279 (1 β), A 61
PARIETARIA I 279 (267)
latifolia Fiori (*judaica*) A 61 (1 β b)
latifolia Gürke (ramiflora) = prec.
latifolia Strobl (diffusa) = prec.
longifolia Coss. et Germ. (offic.) = erecta
lusitanica L. 279 (2), A 61
lusitanica Viv. = Soleirolii
maderensis Rchb. = judaica
muralis Salisb. = erecta
officinalis L. 279 (1), A 61
parviflora Friedr. = lusitanica
platyphyllos Lk. = judaica
populifolia Nym. 279 (1 γ)
punctata W. = judaica
ramiflora Mœnch = judaica
repens Soleir. = Soleirolii
Soleirolii Spr. 280 (4)
PARIS I 206 (203)
pentafolia Renault = seg.
quadrifolia L. 206
trifolia Renault = prec.
PARNASSIA I 532 (445)
alpina Dalla Torre = palustr.
ciliata Gilib. = palustr.
europæa Pers. = palustr.
palustris L. 532, A 110
tenuis DC. = palustr.
vulgaris Dum.-Cours. = palustr.
PARONYCHIA I 333 (321)
Achyrantha Desf. = Alternanthera repens
arabica DC. 334 (nota)
argentea Lam. 334 (3)
argentea Neilr. = Kapela
capitata DC., Koch etc. = Kapela
capitata Lam. A 67 (5)
cymosa DC. 334 (1), A 67
echinata Lam. 334 (2)
glomerata Mœnch = argentea
Hacquetii Bartl. (serpyllifol.) = Kapela
hispanica DC. = argentea
imbricata Rchb. = Kapela
italica R. et S. = argentea
Kapela Griseb. (serpyllifol.) = seg.
Kapela A. Kern. 334 (6), A 67
Kochiana Boiss. = Kapela
longiseta Webb et Berth. Zum. = arabica
macrosepala Boiss. 334 (5 b)
nitida Gærtn. = argentea
nivea DC. 334 (5) = capitata, cfr. A 67
polygonifolia DC. 334 (4)
pubescens DC. = Herniaria hirsuta
rigida Mœnch = capitata
serpyllifolia DC. 334 (6 β), A 67
serpyllifolia M. et K. = Kapela
striata DC. = Polycarpon diphyllum
trinervis Dulac = polygonifolia
verticillata Lam. = Illecebrum verticill.
PARTHENIUM = Chrysanthemum
Matricaria Gueld. = Ch. Parthenium

Digitized by Google

PARTHENOCISSUS II 217 (614)
quinquefolia Planch 217
PASPALUM = Digitaria
ambiguum DC. = D. filiformis
aristatum Mœnch = Beckmannia erucæform.
ciliare DC = D. ciliaris
cynosuroides Brot. = Spartina stricta
Dactylon DC. = Cynodon Dact.
debile Poir., R. et S. = D. debilis
Digitaria Desm. = D. disticha
distichum L. = D. disticha
germanicum Baumg. = Setaria germ.
litorale R. Br. = D. disticha
sanguinale Lam., DC. = D. sang.
strictum Brot. = Spartina stricta
umbellatum Lam. = Cynodon Dactylon
vaginatum Sw. = D. disticha
PASSERINA = Thymelæa
annua Wikstr. = Th. Passerina
arvensis Ball = Th. Passerina
brevifolia Vis. et Sacc. (annua) = Th. — spoliata
concinna Walp. = Th. Passerina
dioica Ram. = Th. dioica
empetrifolia Lap. = Th. dioica
hirsuta L. = Th. hirs.
Metnan Forsk. = Th. hirsuta
pubescens Guss. = Th. — pubescens
pubescens Ten. (annua) = prec.
Stellera Ram. ex DC. = Th. Passerina
Tartonraira Schrad. = Th. Tartonr.
Thomasii Duby = Th. Thom.
Thymelæa DC. = Th. Sanamunda
tomentosa Wikstr. = Th. Tartonraira
PASTINACA II 177 (574)
alpina Calestani = Heracleum alpinum
altissima Lam. = Opopanax
Anethum Spr. = Aneth. graveolens
angulata Rouy (latifol.) = corsica
arvensis Stend. = sativa
austriaca Calestani = Heracleum austriacum
bipinnatifolia Babey (*sativa*) A 152 (4 α c)
collina Jord. = bipinnatifolia
cordata Calestani = Heracleum cordatum
corsica Caruel 178, A 152 (5 β)
divaricata Desf. 178, A 152 (4 γ)
edulis DC (*sativa*) A 152 (4 α d)
esculenta Salisb. = prec.
Fleischmanni Hladnik 177 (3)
glauca Scop. = Peuced. Schottii
graveolens Salzm. (non M. B.) = divaricata
hispida Fenzl 177 (2)
insularis Calestani = seg.
PASTINACA II 177 (574)
insularis Rouy et Cam. (*sativa*) A 152 (4 β)
involucrata Stokes = Opopanax
Kochii Duby (var. α) = divaricata
laciniata Vis. et Sacc. (sativa) = subpinnata
latifolia DC. 178, A 152 (5)
latifolia Nym. = corsica
lucida Ces. P. et G. = latifolia
lucida Gr. et Godr. (non L.) = corsica
lutea Gilib. = sativa
montana Calestani = Heracleum Panaces
officinalis Calestani = Tordyl. officinale
opaca Bernh. 178 (4 b)
Opapanax L. 177 (1)
Orsinii Calestani = Heracleum Orsinii
parvifolia Kralik = divaricata
pyrenaica Calestani = Heracleum pyrenaicum
sativa L. 178, A 152 (4)
sativa Mill. = edulis
selinoides Vis. = Peuced. — selin.
sibirica Calestani = Heracleum longifolium
silvestris Mill. A 152 (4 α a)
Sphondylium Calestani = Heracleum Sphond.
subpinnata Sacc. (*sativa*) A 152 (4 α b)
teretiuscula Rouy (latifol.) = latifolia
Tordylium Calestani = Tordyl. maximum
PASTOREA = Bivonæa
albiflora Tod. = B. albifl.
præcox Tod. = prec.
Saviana Ball ex Nym. = B. Sav.
PATROCLES = Narcissus
orientalis Salisb. = N. orient.
PAULOWNIA II 431 (755)
imperialis Sieb. et Zucc. = seg.
tomentosa Steud. 431
PAVETTA = Putoria
fœtidissima Cyr. = P. calabrica
PAVONIA = Hibiscus
pentacarpos Poir. = H. pent.
veneta Spr. = prec.
PECHEA = Crypsis
subcylindrica Pourr. = C. schœnoides
PECTANISIA = Reseda
Phyteuma Raf. = R. Phyt.
PECTEN = Scandix
Veneris Lam. = S. Pect.-Ven.
PECTINARIA = Scandix
vulgaris Bernh. = S. Pect.-Ven.
PECTINASTRUM = Centaurea
napifolium Cass. = C. nap.
PEDICULARIS II 463 (770)
acaulis Wulf. 468 (11)
adscendens Gaud. = Barrelieri
adscendens Schleich. = tuberosa
affinis Stein. = cæspit. × tuber.
albiflora Goir. (*rostrata*) 465 (5 α b)
albiflora Payot (*verticill.*) 463 (1 b)
PEDICULARIS II 463 (770)
Allionii Rchb. f. 469 (14 β)
angustisecta Rigo (*palustris*) 467 (7 b)
asplenifolia Baumg. = Œderi
asplenifolia Flœrke 465 (5 δ)
atrorubens Schl. = incarn. × recutita
Barrelieri Rchb. 464 (3)
Bohatschim Stein = rostr. × leptostachya
Bonjeani Colla = cenisia
cæspitosa Sieb. 465 (5 γ)
cæspitosa Webb = verticillata
cæspit. × *tuberosa Stein* 466
cenisia Gaud. 465 (5 ε)
comosa L. 467 (9)
densiflora Stein. (*helvet.*) 464 (4 β a)
elegans Ten. 466 (6 β), A 171
elongata Kern. = leptostachya
elong. × gyroflexa Huter = gyrofl. × leptostachya
erubescens Kern. = rostr. × tuberosa
fasciculata Bell., Koch etc. = gyroflexa
fasciculata Ten. = elegans
fasciculata W. = elegans
flammea Wulf. (non L.) = Œderi
foliosa L. 468 (12)
Friderici-Augusti Tomm. 468 (10 β)
Gaudini Arv.-T. = Barrelieri
glabrata Bouvier (tuberosa) = leptostachya
glabriuscula Stein. (*foliosa*) 468 (12 α b)
gyroflexa Bonjean etc. = cenisia
gyroflexa Ten. etc. = rostrata
gyroflexa Vill. 466 (6), A 171
gyrofl. × elongata Huter = gyrofl. × leptostachya
gyrofl. × *leptostachya Bég.* 467
gyrofl. × *tuberosa Penzig* 467
gyrofl. × tuberosa Arv.-T. = tuber. × gyroflexa
Hacquetii Graf. = sumana
Hausmanni Huter = roseo × rostr.
helvetica Stein. (*incarnata*) 464 (4 β)
hirsuta All. (non L.) = Allionii
hirsuta Stein. (tuberosa) = major
hirsuta Vill. = rosea
Huteri Kern. = recut. × tuber.
incarnata Baumg. = rostrata
incarnata Jacq. 464 (4)
incarn. × *cæspitosa Stein.* 464
incarn. × *recutita Nœg.* 464
incarn. × tuberosa Caruel = gyrofl. × tuber.
incarnatoides Stein. = incarn. × cæspitosa
insubrica Rota 467 (7 c)
Kerneri Dalla Torre = cæspitosa
Kerneri Huter = gyrofl. × leptostachya

Digitized by Google

PEDICULARIS II 463 (770)
Jacquinii Koch 465 (5 β)
Jacq. × elongata Gelmi = rostr. × tuber.
Jacq. × tuberosa Gelmi = rostr. × tuber.
laxiflora Stein. (*helvet.*) 464 (4 β b)
leptostachya Vis. et Sacc. (*tuber.*) 464 (2 β)
leucantha Bones. (*gyroflexa*) 466 (6 α c)
magna Bonjean (*cæspit.*) 465 (5 γ b)
major Ten. (*tuberosa*) 464 (2 α b)
minor Ten. (*tuberosa*) 464 (2 α c)
Murithiana Arv. T. = tuber. × recutita
Œderi Vahl 469 (15)
palustris L. 467 (7), A 171
pauciflora Stein. (*cæspit.*) 465 (5 γ a)
pennina Gaud. = incarn. × recutita
Penzigi Stein. = gyrofl. × tuber.
petiolaris Ten. 468 (10)
Portenschlagii Saut. = asplenifolia
prætutiana Levier (*gyroflexa*) 466 (6 α b)
proboscidea Gaud. (non Stev.) = cenisia
pubescens Orsini = petiolaris
recutita L. 469 (13), A 171
recut. × *tuberosa Kern.* 469
rhætica Kerner = cæspitosa
rosea Fiori = verticillata
rosea Ten. = elegans
rosea Wulf. 469 (14)
roseo × *rostrata Huter* 469, A 171
rostrata Guss. = elegans
rostrata Jacq. = Jacquini
rostrata L. 465 (5)
rostr. × elongata Bohatsch = rostr. × leptostachya
rostr. × *leptostachya Bég.* 466
rostr. × *tuberosa Kern.* 466
sumana Spr., Pollini 468 (12 β)
sumana Pollini (tuber.) = sumana
silvatica L. 467 (8)
Stevenii Bunge = verticillata
Tenoreana Huter, P. et R. = elegans
Tommasinii March. (Hacquetii) = sumana
tuberosa All. = gyroflexa
tuberosa L. 463 (2)
tuberosa β Bert. = Barrelieri
tuber. × fasciculata Bell. = gyrofl. × tuber.
tuber. × *gyroflexa Bég.* 466
tuber. × *recutita Arv.-T.* 465
veneta Huter = gyrofl. × leptostachya
Verloti Arv.-T. = tuber. × gyroflexa
versicolor Whlnb. etc. = Œderi
verticillata L. 463 (1)
PEGANUM II 253 (633)
crithmifolium Retz. = seg.
Harmala L. 253
PELARGONIUM
cucullatum Ait. A 158
inquinans Ait. 245 (nota)
zonale L' Hérit. A 158
PELECINUS = Biserrula
Biserrula Mœnch = B. Peleo.
vulgaris Medic. = prec.
PELTARIA I 454 (890)
alliacea L. 454
PELTIDIUM = Willemetia
apargioides Zoll. = W. stipitata
PENDULINA = Diplotaxis
crassifolia Wk. = D. Harra
PENNISETUM I 48 (49)
cenchroides Rich. = ciliare
ciliare Lk. 48 (1)
Crus-Galli Baumg. = Panic. Crus-Galli
distylum Guss. = ciliare
glaucum R. Br. = Setar. glauca
italicum R. Br. = Setaria ital.
longistylum Hochst. 48 (2), A 13
verticillatum R. Br. = Setaria verticillata
viride R. Br. = Setar. viridis
PENTAGLOSSUM = Lythrum
linifolium Forsk. = L. Hyssopifolia (α)
PENTAGLOTTIS = Anchusa
sempervirens Tausch = A. semperv.
PENTAGONOCARPUS = Hibiscus
pentacarpos Rchb. = H. pentac.
Zannichellii Parl. = prec.
PENTAPERA II 302 (665)
sicula Klotzsch 302
PENTAPHYLLUM = Potentilla
norvegicum Gærtn. = P. norvegica
PENTAPLE = Cerastium
mantica Rchb. = C. mant.
PEPLIS II 128 (526)
australis R. et S. = nummul. (α)
biflora DC. A 145 (2 β b)
Boræi Jord. A 146 (2 γ a)
borystenica Bess. A 146 (2 γ)
elatinoides Goir. (*Portula*) A 145 (1 b)
erecta Auct. it. = nummul. (α)
erecta Req. A 145 (2 β)
hamulosa Fiori (*erecta*) A 145 (2 β a)
hispidula Dur. = nummul.
nummularifolia Jord. 128 (2)
oppositifolia Fiori (*borysten.*) A 146 (2 γ b)
Portula L. 128 (1), A 145
pygmæa Kiærskon (erecta) = Boræi
Timeroyi Jord. = hamulosa
tithymaloides Bert. = nummul. (α)
PEPO = Cucurbita
Citrullus Sag. = C. Pepo
lagenarius Mœnch = Lagenaria vulgaris
macrocarpus Rich. = C. moschata
maximus Peterm. = C. max.
PEPO = Cucurbita
Melopepo Mœnch. = C. Melop.
moschatus Sag. = C. mosch.
Potiron Sag. = C. Pepo
verrucosus Mœnch = Cucumis Melo
vulgaris Mœnch = C. Pepo
PERAMIUM = Goodyera
repens Salisb. = G. repens
PERCEPIER = Alchemilla
arvensis Mœnch = A. arv.
PERIBALLIA = Aira
minuta Asch. et Græbn. = A. minuta
PERICLYMENUM = Lonicera
germanicum Mill. = L. Periclym.
italicum Mill. = L. Caprifol.
perfoliatum S. F. Gray = prec.
vulgare Mill. = L. Periclym.
PERIDERÆA = Anthemis
fuscata Webb = A. fuscata
PERIPLOCA II 344 (702)
angustifolia Lab. A 163 (2 β)
græca L. 344 (1)
levigata Ait. 345 (2), A 163
rigida Viv. = angustifolia
PERISTYLUS = Orchis, Cœloglossum
albidus Lindl. = Gymnad. albida
atlanticus Lindl. = O. intacta
bracteatus Lindl. = C. bract.
cordatus Lindl. = C. diphyll.
densiflorus Lindl. = O. intacta
maculatus Lindl. = O. intacta
viridis Lindl. = C. viride
PERSICA = Prunus
Amygdalus Mill. = P. Persica
communis Duham. = P. Persica
domestica Risso = P. Persica
levis DC. = seg.
nucicarpa Steud. = seg.
Nuci-persica Borkh. = P. — Nuci-pers.
vulgaris Mill. = P. Persica
PERSICARIA = Polygonum
acris Gilib. = P. Hydropiper
amphibia S. F. Gray = P. amph.
Brittingeri Opiz = P. tomentos.
dubia Fourr. = P. mite
fluitans Montand. = P. amphibium
Hydropiper Opiz = P. Hydr.
incana S. F. Gray = P. Persic.
interrupta S. F. Gray = P. Persicaria
lapathifolia S. F. Gray = P. lap.
laxiflora Opiz = P. mite
maculata S. F. Gray = P. tomentos.
maculosa S. F. Gray = P. Persic.
minor Opiz = P. minus
mitis Gilib. = P. Persic.
nodosa Opiz = P. nodos.
orientalis Vilm. = P. orient.
pusilla S. F. Gray = P. Persic.
rivularis Opiz = P. Persic.
salicifolia S. F. Gray = P. Persic.
serrulata Webb et Moq. = P. serrul.
urens Montand. = P. Hydropiper

Digitized by Google

PERSICARIA = Polygonum
vulgaris Webb et Moq. = P. Persic.
PERTYA = Senecio
delphinifolia Sz. Bip. = S. delph.
PERVINCA = Vinca
major Scop. = V. major
media Caruel = V. difformis
minor Scop. = V. minor
procumbens Gilib. = prec.
PETAGNIA II 147 (588)
saniculæfolia Guss. 147
PETASITES III 206 (856)
albus Gærtn. 208 (4)
alpinus Baumg. = Homogyne alpina
androgynus Schur = offic.
communis G. Beck (*offic.*) 207 (2 α)
consimilis Jord. = offic. (α)
discolor Baumg. = Homogyne disc.
elatior Hill = officinalis
fallax Uechtr. (*offic.*) 207 (2 β)
Farfara Baill. = Tussilago Farfara
fragrans Rchb. 207 (1)
hermaphroditus Schur = offic.
niveus Baumg. 207 (3)
officinalis Mœnch 207 (2)
paradoxus Baumg. = niveus subfœm.
pratensis Jord. 207 (2 α c)
racemosus Fiori (*fragr.*) 208 (1 b)
ramosus Baumg. = albus subfœm.
Reuterianus Jord. 207 (2 α b)
riparius Jord. 207 (2 α a)
sebethius Ten. (1845) 207 (b)
spurius Rchb. = tomentosus
subfœmineus DC. (*albus*) 207 (4 f)
subfœmineus DC. (*niveus*) 207 (3 f)
subfœmineus DC. (*offic.*) 207 (2 f)
submasculus DC. (*albus*) 207 (4 f)
submasculus DC. (*niveus*) 207 (3 f)
submasculus DC. (*offic.*) 207 (2 f)
tomentosus DC. 208 (nota)
vulgaris Desf. = officinalis
PETROCALLIS I 463 (398)
pubescens L. Vacc. (*pyren.*) A 99 (b)
pyrenaica R. Br. 463
PETROCARVI = Athamantha
cretense Tausch = A. cret.
PETRORRHAGIA = Tunica
multicaulis Lk. = T. saxifr.
rigida Lk. = T. rig.
saxifraga Lk. = T. saxifr.
PETROSELINUM II 160 (549)
ammoides Rchb. f. 160 (3)
crispum DC. (*hortense*) 160 (1 b)
crispum Nym. = prec.
heterophyllum Rchb. (*hortense*) A 151 (1 c)
hortense Hoffm. 160 (1), A 151
intermedium Rchb. = Apium inundat.
PETROSELINUM II 160 (549)
latifolium DC. (*hortense*) A 151 (1 d)
sativum Hoffm. = hortense
segetum Koch 160 (2)
PETROSILENE = Silene
saxifraga Fourr. = S saxifr.
PETTERA = Alsine
graminifolia Rchb. = A. gram.
PEUCEDANUM II 179 (576)
albiflorum DC. (alsatic.) = venetum
Angelica Caruel = Angelica silvestris
alpestre Desv. (non L.) = gallicum
alsaticum Auct. it. (non L.) = venetum
alsaticum Poir. = officinale
altissimum Desf. = offic.
altissimum Goir. (*venet.*) A 153 (6 c)
angustifolium Rchb. 182 (11 β), A 153
angustifolium Caruel (austriac.) = montanum
angustisectum Posp. (*venetum*) 180 (6 b)
angustiseptum Goir. (*Oreoselin.*) A 153 (8 b)
angustissimum Caruel (austriac.) = rablense
austriacum Koch 181 (10)
austriac. β Arc. = montanum
Bellardi Lag. ex Sweet = quid?
Bellardi Nym. = rablense
Carvifolia Lois. = Selinum Carvifol.
carvifolium Vill. 179 (1)
Cervaria Guss. 181 (7), A 158
Chabræi Rchb., Gaud. = carvifolium
coriaceum Rchb. 180, A 152 (3 β)
corsicum Arc. = Pastinaca cors.
divaricatum Arc. = Pastinaca divar.
Ferula Baill. = Ferula comm.
filiforme Gilib. = officinale
Fleischmanni Arc. = Pastinaca Fleischm.
gallicum Latour. 180 (3), A 152
glaucifolium St.-Lag. = Cervaria
graveolens Arc. = Anethum graveol.
heterophyllum Vis. = carvifolium
Imperatoria Endl. = Ostruthium
imperatorioides Lk. = angustifol.
intermedium Rouy et Cam. (austriac.) = montanum
involucratum Koch = montanum
italicum Mill. 180 (4 b)
latifolium Arc. (sativum) = Pastinaca latifol.
latifolium DC. (*Cervaria*) A 153 (7 c)
lucidum Arc. = Pastinaca latifolia
PEUCEDANUM II 179 (576)
microphyllum Posp. (*Cervaria*) 181 (7 b)
minus All. = carvifolium
minus Huds. = Trinia vulg.
montanum Koch 181 (10 α b)
nanum Goir. (*venet.*) A 153 (6 d)
neapolitanum Baill. = Ferula glauca?
nebrodense Nym. 179 (1 c)
nodosum L. = Ferula nodosa
officinale L. 180 (4)
officinale Thuill. = gallicum
officinale Uoria = Seseli Bocconi
opacum Franch = Pastinaca op.
Oreoselinum Mœnch 181 (8), A 153
Ostruthium Koch 182 (11), A 158
Palimbia Baill. = carvifolium
palustre Mœnch 181 (9)
paniculatum Lois. 180 (5)
parisiense DC. = gallicum
parisiense Koch = coriaceum
Pastinaca Baill. = Pastin. sativa
petræum Noé 179 (2 b)
Petroselinum Desf. = Petrosel. hortense
Petteri Vis. = coriaceum
Plinii Arc. (*palustre*) 181 (9 b)
pratense Lam. = Silaus flavescens
rablense Koch 182 (10 β)
sativum S. Wats. = Pastinaca sativa
saxatile Noé ex Bert. = carvifolium
Schottii Bess. 180 (2)
selinoides March. (*carvifol.*) 179 (1 b)
selinoides Vis. (Chabræi) = prec.
Silaus L. = Silaus flavescens
silvestre DC. = palustre
sulcatum Nym. = montanum
tauricum Hort. Par. = Fœniculum peucedanoides
trilobatum Gilib. = Silaus flavescens
triternatum Rouy et Cam. (*Ostruth.*) A 158 (11 α b)
velutinum Levier (*austriac.*) 181 (10 α c)
venetum Koch 181 (6), A 153
verticillare M. et K., Spr. 182 (12)
PEUTALIS = Polygonum
Hydropiper Raf. = P. Hydr.
incana Raf. = P. lapathifol.
minus Raf. = P. min.
nodosa Raf. = P. nodos.
Persicaria Raf. = P. Persic.
PFEIFFERIA = Cuscuta
suaveolens Buching. = C. racemosa
PHACA = Astragalus
alpina L (1753) = A. frigidus
alpina L. (1759), Wulf. = A. penduliflorus
alpina O. F. Muell. = A. frigidus
aristata Clairv. = A. sempervirens

Digitized by Google

PHACA = Astragalus
astragalina DC. = A. alpinus
atrata Turcz. = A. australis
australis L. = A. australis
austriaca Medic. = A. austriac.
campestris Whlnb. = A. camp.
frigida L. = A. frigidus
Gerardi Vill. = A. Gerardi
glabra Clarion = A. Gerardi
Halleri Vill. = A. australis
helvetica Vitm. = prec.
lapponica Whlnb. = A. lappon.
magellensis Huet = A. australis
minima All. = A. alpinus
montana All. = A. mont. (α)
montana Crantz = A. Jacquini
ochreata Crantz = A. frigidus
pilosa Clairv. = A. pilosus
Tragacantha All. = A. sempervirens
uralensis Whlnb. = A. Halleri
viscosa Clairv. = A. fœtidus
PHÆCASIUM = Crepis
lampsanoides Cass. = C. pulcra
pulcrum Rchb. f. = C. pulcra
PHÆNIXOPUS = Phœnixopus
PHAGNALON III 883 (885)
Bocconi Guss. (saxat.) = intermedium
calycinum Moris (non DC.) = Morisianum
fuscescens Fiori (*rupestre*) 284 (2 α b)
græcum Boiss. et Heldr. 284 (2 β)
intermedium DC. (saxat.) = græcum, intermed.
intermedium Lag. 284 (3 β)
Lagascæ Cass. = intermedium
Morisianum Arc. (*rupestre*) 284 (2 γ)
Morisianum Ces. (calycin.) = Morisianum
rupestre DC. 284 (2)
saxatile Cass. 284 (3)
saxatile × *sordidum Bicknell* 283
sordidum Rchb., DC. 283 (1)
spathulatum Cass. = rupestre
subdentatum Cass. = saxatile
Tenorii Presl 284 (2 α)
tricephalum Cass. = sordidum
PHALACRODISCUS = Chrysanthemum
corsicus Less. = Ch. ceratophyll.
maximus Less. = Ch. max.
montanus Less. = Ch. mont.
pallens Sch. Bip. = Ch. pallens
pyrethroides Decne. = Anthemis chia
PHALACROLOMA = Erigeron
acutifolium Cass. = E. annuus
annuum Dum. = prec.
PHALANGIUM = Anthericum
bicolor DC. = Simethis Mattiazzi
græcum Poir. = Lloydia græca
Liliago Schreb. = A. Liliago
planifolium Pers. = Simethis Mattiazzi
Liliastrum Red. = Paradisia Lil.
ramosum Poir. = A. ramos.
serotinum Poir. = Lloydia serot.
PHALANGIUM = Anthericum
sulphureum Poir. = Ornithog. sulph.
PHALARIS I 52 (57)
alpina Hænke = Phleum Michelii
ammophila Lk. = Psamma arenaria
aquatica Ait., W. = minor
aquatica Auct. (an L.?) = cærulescens
aquatica Desf., Guss. = truncata
arenaria W. = Phleum aren.
arundinacea L. 52 (1), A 14
aspera Retz. = Phleum paniculatum
Barrelieri Ten. = Kœleria Barrel.
Bellardi W. = Phleum tenue
brachystachys Lk. 53 (7)
bulbosa Cav., Presl = cærulescens
bulbosa Desf. = minor.
bulbosa L. = tuberosa? vel Phleum tenue?
bulbosa Ten. = tuberosa
cærulescens Desf. 52 (4), A 14, 208
cærul. b. Parl. = ovata
canariensis Brot. et Auct. = brachystachys
canariensis L. 53 (8)
capensis Thunb. = minor.
ciliata Lag. = Phleum Michelii
ciliata Pourr. = Anthoxanth. odorat., Kœleria pubescens
commutata R. et S. = cærulescens
cristata Forsk. = Polypog. monspel.
cylindrica DC. = Phleum tenue
decumbens Mœnch = minor
disticha Forsk. = Sporobolus pungens
erucæformis L. = Beckmannia eruc.
explicata Lk. = Crypsis alopecuroides
geniculata S. et S. = Crypsis alopecuroides
gracilis Parl. 53 (6 β)
macra Hack. (*arund.*) A 14 (1 d)
maritima Nutt. = Psamma arenaria
Michelii Savi = Phleum Michel.
minor Retz. 53 (6)
muricata Forsk. = Tragus racemosus
nitida Presl = brachystachys
nodosa L. = tuberosa
oryzoides L. = Oryza clandestina
ovata Asch. et Græbn. (*cærulesc.*) A 203 (4 b)
ovata Mœnch = canariensis
paniculata Ait. = Phleum panic.
paradoxa L. 53 (5), A 14
phleoides L. = Phleum Boehmeri
phleoides Savi = Phleum Michelii
picta L. (*arundin.*) 52 (1 b)
PHALARIS I 52 (57)
pubescens Lam. = Kœleria pubesc.
quadrivalvis Lag. = brachyst.
Rotgesii Fiori (*arund.*) A 14 (1 c)
sativa Pers. = Phleum tenue
Sibthorpii Griseb. = paradoxa
subulata Savi = Phleum tenue
tenuis Host = Phleum tenue
truncata Guss. 52 (2)
tuberosa L. 52 (3)
utriculata L. = Alopecur. utric.
vaginiflora S. et S. = Crypsis schœnoides
variegata Spr. = cærulescens
velutina Forsk. = Digitar. sanguinalis
villosula DNtrs. A 203 (4 c)
PHALOE = Sagina
nodosa Dum. = S. nod.
saginoides Dum. = S. Linnæi
subulata Dum. = S. sub.
PHALOLEPIS = Centaurea
alba Cass. = C. alba
splendens Cass. = C. splend.
PHALONA = Cynosurus
echinata Dum. = C. echin.
PHARBITIS = Ipomœa
hispida Choisy = I. purpurea
purpurea Voigt = I. purpurea
PHARNACEUM = Mollugo
Cerviana L. = M. Cerv.
umbellatum Forsk. = prec.
PHASEOLUS II 123 (519)
albiflorus DC. (*coccineus*) 123 (2 b)
coccineus L., Lam. 123 (2)
communis Taubert (*vulg.*) 123 (1 α)
fasciatus DC. (*vulgaris*) 123 (1 α b)
gonospermos Savi 123 (1 ζ)
multiflorus W. = coccineus
nanus L. 123 (1 η)
oblongus Savi 123 (1 γ)
romanus Savi 123 (1 β)
sphæricus Savi 123 (1 δ)
tumidus Savi 123 (1 ε)
unicolor DC. (*vulgaris*) 123 (1 α a)
variegatus DC. (*vulgaris*) 123 (1 α c)
vulgaris L. 123 (1)
PHEGOPTERIS = Polypodium
alpestris Mett. = Polyp. rhæticum
calcarea Fée = P. Robertianum
Dryopteris Fée = P. Dryopt.
polypodioides Fée = P. Phegopteris
Robertiana A. Br. = P. Robert.
vulgaris Mett. = P. Phegopteris
PHEGOPYRUM = Polygonum
esculentum Peterm. = P. Fagopyrum
tataricum Peterm. = P. tatar.
PHELIPÆA = Kopsia
ægyptiaca Walp. = K. ægypt.
albiflora Gr. et Godr. = K. — albifl.
arenaria Walp. = K. aren.
bohemica Celak. = K. — bohemica

Digitized by Google

PHELIPÆA = Kopsia
cærulea C. A. Mey. = K. purpurea (α)
cæsia Strobl = K. Gussoneana?
elongata Lojac. (non Koch) = K. — trinacria
emarginata Reut. = H. — emarg.
Gussoneana Lojac. = K. Gusson.
lavandulacea Reut. = K. lav.
Muteli Caruel (ramosa) = seg.
Muteli Reut. = K. Muteli
nana Boiss. (ramosa) = K. nana
nana Rchb. f. ecc. = K. nana
panormitana Lojac. = K. — panorm.
ramosa C. A. Mey. = K. ram.
ramosissima Genn. (non Wirtg.) = K. — emarginata
Reuteri E. et A. Huet p. p. = K. — angustiflora
Reuteri Moris = K. rufescens
rufescens Gris. = K. rufesc.
rufescens Lojac. = K. Gussoneana
simplex Vis. (ramosa) = K. nana
stricta Moris = K. stricta
PHELIPANCHE = Phelipæa
PHELLANDRIUM = Œnanthe
aquaticum L. = Œ. aquat.
divaricatum Gilib. = prec.
fistulosum Clairv. = Œ. fistul.
globulosum Bert. = Œ. globul.
Mutellina L. = Meum Mut.
PHILADELPHUS I 544 (450)
coronarius L. 544, A 114
nanus Mill. = coronarius
PHILLYREA II 338 (694)
angustifolia L. 338, A 163
benacensis Fiori (*latifol.*) A 163 (γ for.)
benacensis Goir. (variab.) = prec.
brachiata Stokes = angustifol.
buxifolia Ait. et Vahl (media) = seg.
buxifolia Lk. 339 (γ d)
conferta Stokes = angustifol.
coriacea Lk. = obliqua
ilicifolia Rchb., Strobl (media) = Stroblii
ilicifolia W. = spinosa
lanceolata Ait. et Vahl (*angustifol.*) 338 (α a)
lanceolata Steud. = prec.
latifolia L. 339 (γ), A 163
levis W. 339 (γ b)
ligustrifolia Mill. 338 (β c)
longifolia Lk. = latifol.
major Zum. = latifol.
media Koch = Stroblii
media L. 338 (β)
minor Zum. = angustifol.
obliqua W. 338 (β e)
obtusata Lk. = latifolia
oleæfolia Mill., W. = ligustrifolia
paniculata Roxb. = Ligustrum lucidum
pendula W. 338 (β b)
racemosa Lk. = media
rosmarinifolia Mill. 338 (α b)
spinosa L. (*latifol.*) 339 (γ a)
spinosa Mill. = prec.
PHILLYREA II 338 (694)
stricta Bert. 338 (β d)
Stroblii Fiori (*latif.*) 339 (γ c)
variabilis Timb. = angustifol. (sens. lat.)
virgata W. 338 (β a)
vulgaris Caruel = angustifol. (sens. lat.)
PHILOGYNE = Narcissus
Campernelli Haw. = N. Ps.-Narc. × Jonquilla
conspicua Salisb. = prec.
minor Haw. = N. juncifolius
odora Haw. = N. Ps.=Narc. × Jonquilla
PHLEUM I 57 (64)
abbreviatum Boiss. (*prat.*) A 15 (6 β c)
aculeatum Lam. = Crypsis acul.
Ægilops Scop. = Ægilops ovata
alatum Host = Phalaris cærulescens
alopecuroides Pill. et Mitt. = Crypsis alop.
alpinum L. 58 (5), A 15
altissimum Bizz. (nodosum) = serotinum
ambiguum Ten. 59 (7 β), A 15
arenarium L. 58 (1), A 15
arvense Pourr. = pratense vel Bœhmeri
asperum Jacq. 58 (3) = paniculatum, cfr. A 15
autumnale Scop. = Sesleria autumn.
Bellardi W. = tenue
Bertolonii DC. A 15 (6 α b)
blepharodes Asch. et Græbn. (*Bœhmeri*) A 203 (8 b)
Bœhmeri Wib. 59 (8), A 203
bulbosum Gouan, Host = nodosum
bulbosum Richter = tenue
capitatum Scop. = Alopecur. Gerardi
ciliatum Gilib. = pratense
ciliatum Griseb. = ambiguum
ciliatum Pourr. = Bœhmeri
commutatum Gaud. 58 (5 β), A 15
crinitum Schreb. = Polypog. monspel.
cristatum Scop. = Cynosurus crist.
crypsoides Arc. = sardoum
Dactylon Georgi = Cynodon Dact.
echinatum Host 58 (4), A 15
exaratum Griseb. = græcum
felinum S. et S. = echinatum
flavum Scop. = Alopecur. agrestis
Gerardi All. = Alopecur. Ger.
glabrum Bernh. = Bœhmeri
græcum Boiss. et Heldr. 58 (1 γ)
hirsutum Sut. = Michelii
intermedium Jord. = pratense
leve M. B. = Bœhmeri
Michelii All. 59 (7), A 15
microstachyum Ruiz. ex Nym. = abbreviatum
monspeliense Koel. = Polypogon monsp.
nodosum L. 59, A 15 (6 β)
PHLEUM I 57 (64)
paniculatum Huds. A 15 (3)
phalarideum Vill. = Michelii
phalaris Pers. = Bœhmeri
phalaroides Koel. = Bœhmeri
phleoides Simonkai = prec.
præcox Jord. = abbreviatum
pratense L. 59 (6), A 15
pusillum Bég. (*arenar.*) A 15 (1 α b)
ramosum Gilib. = arenarium
sardoum Hack. 58 (1 β)
schœnoides Jacq. = Crypsis aculeata
schœnoides L. = Cryps. schœn.
serotinum Jord. A 15 (6 β b)
serrulatum Lev. et Somm. (non Boiss. et Heldr.) = blepharodes
subulatum Asch. et Græbn. (non Spr.) = tenue
subalpinum Goir. = seg.
subalpinum Hack. (*alpin.*) A 15 (5 γ)
supinum Lam. = Crypsis schœnoid.
tenue Kth. (alpin.) = commutatum
tenue Schrad. 58 (2), A 15
ventricosum Mœnch. = paniculat.
villosum Opiz = nodosum
viride All. = paniculat.
PHLOMIS III 29 (789)
albiflora Strobl (*Herba-venti*) 29 (1 b)
collina Salisb. = fruticosa
cretica Presl = ferruginea
ferruginea Groves = fruticosa
ferruginea Ten. 29 (2 β)
fruticosa L. 30 (3)
Herba-venti L. 29 (1)
italica L., Sm. 30 (nota)
lanata W. 30 (4)
latifolia Mill. = fruticosa
Lychnitis L. 30 (nota)
microphylla Sieb. = lanata
montana Guss. (*fruticosa*) 29 (3 b)
parvifolia Presl = lanata
polymorpha Clos. = viscosa
Portæ Kerner 30 (nota)
pungens W. = Herba-venti
rotundifolia Mill. = italica
salvifolia Stokes = fruticosa
scariosa Presl = fruticosa
ventosa St.-Lag. = Herba-venti
virens DC. = ferruginea
viscosa Poir. 29 (2)
PHLOMITIS = Phlomis
pungens Rchb. = Ph. Herba-venti
PHŒNIX I 143 (143)
dactylifera L. 143
excelsior Cav. = dactylifera
humilis Cav. = Chamærops humilis
PHŒNIXOPUS = Lactuca
chondrillæflorus Fourr. = L. condrillæflora
decurrens Cass. = L. viminea
integrifolius DC. (vimin.) = L. — integrifolia
muralis Koch = L. muralis

Digitized by Google

PHŒNIXOPUS = Lactuca
ramosissimus Cass. = L. ramosiss.
vimineus Rchb. = L. vim.
PHŒNOPUS = Lactuca
vimineus DC. = L. vim.
PHONUS = Carthamus
lanatus Hill = C. lanat.
PHOTINIA I 598 (471)
serrulata Lindl. 598
PHRAGMITES I 65 (78)
altissima Mab. = Isiaca
chrysantha Mab. A 17 (β b)
communis Trin. 65, A 17
flavescens Cust., Koch (comm.) 65 (α b)
flavesc. Heg. = prec.
gigantea J. Gay = Isiaca
græca Steud. = communis
humilis DNtrs. 65 (γ)
Isiaca Kth. 65 (β), A 17
Isiaca Rchb. = flavescens
maritima Mab. = humilis
nigricans Gr. et Godr. (comm.) subuniflora
nigricans Mab. = prec.
Phragmites Karsten = communis
pumila Wk. = humilis
ruscinonensis Mab. = Isiaca
subuniflora Fiori (comm.) A 17 (α c)
vulnerans Asch. = communis
PHRYGIA = Centaurea
major S. F. Gray = C. Scabiosa
nigra S. F. Gray = C. nigra
pratensis S. F. Gray = C. nigrescens
PHRYNE = Sisymbrium
apennina Bub. (1878) = S. Zanonii
pinnatifida Bub. (1878) = S. dentatum
PHUCAGROSTIS
major Cavol. = Cymodocea nodosa
minor Cavol. = Zostera nana
PHYLLITIS = Scolopendrium
Hemionitis O. Kze. = Sc. Hem.
lancifolia Mœnch = Asplen. — lancifolium
Scolopendrium Newm. = S. vulgare
PHYLLOCISTUS = Cytisus
sessilifolius Fourr. = C. sessilif.
PHYLLODOCE II 300 (662)
cærulea Bab. 300
taxifolia Salisb. = cærulea
PHYSALIS II 403 (745)
Alkekengi L. 404 (2), A 168
Alpini Jacq. = somnifera
daturæfolia Lam. = Nicandra physaloides
edulis Sims. = peruviana
esculenta Salisb. 404 (3 β b)
flexuosa L. = somnifera
Halicacabum Crantz, Scop. = Alkekengi
hyemalis Salisb. = prec.
latifolia Lam. = seg.
peruviana L. 404 (3 β)
pubescens L. 404 (3)
ramosa Mill. = prec.
PHYSALIS II 403 (745)
somnifera L. 403 (1)
turbinata Medic. = pubescens
villosa Mœnch = somnifera
PHYSALOIDES = Physalis
somnifera Mœnch = Ph. somn.
PHYSANTHYLLIS = Anthyllis
tetraphylla Boiss. = A. tetraph.
PHYSOCAULIS II 198 (590)
nodosus Koch 198, A 154
PHYSOPLEXIS = Phyteuma
comosa Schur = Ph. comos.
PHYSOSPERMUM II 202 (597)
actææfolium Presl = verticillatum
angelicæfolium Guss. 203 (2 b)
aquilegifolium Koch 202 (1), A 214
commutatum Spr. = prec.
cornubiense Bab. = prec.
Gussoni Lag. = Pleurospermum austriacum
verticillatum Vis. 203 (2)
PHYTEUMA III 166 (845)
adulterinum Wallr. = nigro × spicatum
Alpini Ces. P. et G. (Mich. = petræum et Balbisii
amplexicaule S. et S. = trichocalycin.
angustatum Ambr. (Mich.) = Michelii (a)
angustissimum Koch (Mich.) 169 (9 a)
atropurpureum Hpe. = spicatum
austriacum Beck 168 (6 ζ)
Balbisii DC. f. 170 (10)
betonicæfolium Vill. 169 (9 c), A 179
betonicæfol. × *Halleri* 171 (nota)
betonicæfol. × *spicatum* 171 (*nota*)
Bovelini Heg. = hemisph. × orbicul.
brevibracteatum Bornmuell. (Scheuchz.) 168 (7 c)
cærulescens Celak. (spicat.) = seg.
cæruleum Gr. et Godr. (spicat.) 170 (11 α b)
Carestiæ Biroli = humile
Carestiæ Lois. = serratum
Carestiæ Luiset = longibracteat.
carinthiacum R. Schulz (hemisph.) = longibracteat.
Charmelii Auct. al. = Scheuchzeri
Charmelii Sieb. = Sieberi
Charmelii Vill. 169 (8)
Charmelioides Biroli = Scheuchzeri
collinum Guss. = limonifol.
coloratum Koch (humile) 167 (3 b)
Columnæ Rchb. f., Ten. (orbicul.) 168 (6 β)
Columnæ Thomas 168 (*nota*)
comosum Gouan = orbiculare
comosum L. 171 (13)
cordatum Balb. = Balbisii
cordatum Rchb. = Sieberi
cordatum Sims = orbiculare
PHYTEUMA III 166 (845)
cordatum Vill. 168 (6 α)
corniculatum Clairv. = Scheuchzeri
corsicum Sieb. ex Roch. = orbiculare
decipiens DC. f. (orbicul.) 168 (6 δ b)
dentatum Bég. (hemisph.) 167 (2 α b)
elegans Heg. 169 (9 d)
ellipticifolium Vill. 168 (6 δ)
ellipticum Auct. = prec.
ellipticum Poir. = lanceolat.
fistulosum Rchb. 168 (6 α b)
giganteum DC. f. (orbicul.) = ellipticifol.
glaciale Hpe. = Sieberi
globulariæfolium Sternb. et Hpe. 166 (1 β)
graminifolium Sieb. 167 (2 β)
Halleri All. 170 (12)
Halleri × *spicat.* 171 (*nota*)
hedraianthifolium R. Schulz = longibract.
Hegetschweileri Bruegg. = Halleri × spicat.
hemisphæricum L. 167 (2), A 216
hemisph. × *humile* 171 (*nota*)
hemisph. × *orbiculare* 171 (nota)
hemisph. × *pauciflorum* 171 (*nota*)
humile Schleich. 167 (3), A 179
humile × *Scheuchzeri* 171 (*nota*)
Huteri Murr = betonicæf. × Halleri
intermedium Jan = Sieberi
lanceolatum Rchb. (Charmelii) 169 (8 b)
lanceolatum Rchb. et Auct. al. (orbic.) = austriacum
lanceolatum Vill. 168 (6 γ)
limonifolium S. et S. 171 (14)
longibracteatum Bornm. (hemisph.) A 216 (2 α d)
longifolium Heg. 168 (6 ε)
Michelii All. 169 (9), A 179
Michelii β Bert. = petræum
Michelii Lap. = hemisphær.
Michelii Schm. = Scheuchzeri
Minæ Tanf. (trichocal.) 171 (15 β)
minor Goir. (Scheuchz.) = brevibracteatum
Murrianum Borb. = betonicæfol. × Halleri
nigrum Schm. 170 (11 β)
nigr. × *spicatum* 171 (*nota*)
oblongifolium Bég. (comos.) 170 (13 b)
orbiculare Jacq. = Scheuchzeri
orbiculare L. 168 (6)
ovale Hpe. = nigrum
ovatum Hoffm. = prec.
ovatum Lam. = Scheuchzeri
ovatum Schm. = Halleri
pauciflorum L. 166 (1), A 179
persicifolium Hpe. = scorzoneræfol.
petræum DC. (Balbisii) = seg

Digitized by Google

PHYTEUMA III 166 (845)
petræum Tanf. (*Mich.*) 169 (9 e)
pilosum Heg. 168 (6 γ b)
pubescens Facch. (*comos.*) 170 (18 c)
Rapunculus Pers. in L. = nigrum
Scheuchzeri All. 169 (7)
Scheuchzeri Schm. = orbiculare
scorzoneræfolium Vill. 169 (9 b)
serratum Koch (*Scheuchz.*) 168 (7 b)
serratum Viv. 167 (4)
sessilifolium DC. (*betonicæfol.*) A 179 (9 c subf.)
Sieberi Spr. 167 (5)
spicatum L. 170 (11)
spiciforme Roch. = prec.
strictum Sims. = limonifol.
superbetonicæfol. × *Halleri* 171 (nota)
trichocalycinum Tanf. 171 (15)
trichophyllum Christ (*hemisphær.*) 167 (2 α c)
urticæfolium Clairv. = Halleri
velutinum Ball (comos.) = pubescens
veronicæfolium Schrad. = Michelii
virgatum W. = Campan. Rapunculus
PHYTOLACCA I 324 (307)
decandra L. 324 (1)
dioica L. 325 (2)
populifolia Salisb. = dioica
vulgaris Crantz = decandra
PICEA = Abies
alpestris Stein = A. — alpestris
excelsa Lk. = A. excelsa
medioxima Wk. (excelsa) = A. — alpestris
monocaulis Nœdl. (excelsa) = A. — monocaul.
montana Schur = A. excelsa
obovata A. Schulz = A. — alpestris?
pectinata Loud. = A. alba
rubra Dietr. = A. excelsa
vulgaris Lk. = A. excelsa
PICNOMON = Cirsium
Acarna Cass. = C. Acarna
spinosum St.-Lag. = prec.
PICOTIA = Omphalodes
verna R. et S. = O. verna
PICRIDIUM = Reichardia
albidum DC. = Crepis alb.
arabicum Hochst. et Steud. = R. tingitana
crassifolium Wk. = R. — crass.
Cupanianum Nic. (vulg.) = R. — Cupan.
gracile Sch. Bip. (intermed.) = R. — grac.
hispanicum Poir. = R. tingitana (α)
indivisum Lojac. (vulg.) = R. — Cupaniana
intermedium Sch. Bip. = R. int.
ligulatum Boiss. (non Vent.) = R. — marit.
PICRIDIUM = Reichardia
maritimum Boiss. (vulg.) = R. — mar.
maritimum Rchb. = R. picroides (α)
minus Boiss. (tingit.) = R. — orientalis
orientale DC. = R. — orient.
pinnatifidum Lag. = R. tingitana (α)
pinnatifidum Macchiati (vulg.) = R. — pinn.
subacaule Wk. (tingitan.) = R. — subac.
tingitanum Desf. = R. ting.
vulgare Desf. = R. picroides (α)
PICRIS III 403 (937)
acaulis Bernh. = Leontod. hispidus
aculeata Vahl = Helminthia acul.
alpina Lam. = Crepis alp.
altissima Desf. (non Del.) = hierac.
altissima Led., C. Koch = Sprengeriana
aspera Gilib. = hierac.
aspera Poir. = Sprengeriana
auriculata Sch. Bip. = paleacea
autumnalis All. = Leontod. autumn.
Chaixi Poir. = pauciflora
corymbosa Gr. et Godr. = spinulosa
crepoides Saut. = paleacea
crinita Reut. = paleacea
danubialis All. = Leontod. danub.
decipiens Gr. et Godr. (piren.) = Villarsii
echioides L. = Helminthia echioid.
echioides β L. = humifusa
fœtida Lam. = Crepis fœt.
globulifera Desf. = Crepis Dioscoridis
grandiflora Ten. 404 (1 γ)
hieracioides L. 403 (1), A 192, 217.
hieracioides S. et S., Ten. etc. = spinulosa
Hieracium With. = hierac.
hirta All. = Leontod. Villarsii
hispida All. = Leontod. hisp.
hispida Fiori (*paleacea*) 404 (1 δ c)
hispida Gelmi (crepoides) = prec.
hispidissima Koch 404 (1 ε)
hispidissima Lec. et Lmt. = spinulosa
humifusa W. = Helminthia humif.
integrifolia Desf. = Sprengeriana
Kelleriana Arv. T. A 192 (1 var.)
lacera Baill. = Crepis lac.
laciniata Vis. = hispidissima
latifolia Posp. (*hierac.*) 403 (1 α c)
laxa DC. = Sprengeriana
paleacea Vest. 404 (1 δ)
pauciflora W. 404 (2)
PICRIS III 403 (937)
Pseudo-Villarsii Caldesi (*hierac.*) 403 (1 α b)
pyrenaica Auct. (an L.?) = paleacea
pyrenaica Gærtn. = pauciflora
Rhagadiolus Pers. = Sprengeriana
rubra Lam. = Crepis rubra
ruderalis Salisb. = Helminth. echioides
ruderalis Schm. 403 (1 α d)
saxatilis All. = Leontod. pyren.
scaberrima Guss. 404 (1 ζ)
scabrissima Ten. = scaberrima
setulosa Guss. 403 (1 β b)
sonchoides Vest, Rchb. = paleacea
spinosa Poir. = Helminth. echioides
spinulosa Bert. 403 (1 β)
Sprengeriana DNtrs. = pauciflora
Sprengeriana Poir. 404 (3)
stricta Jord. = spinulosa
subalpina Arv. T. et Chen. (*hierac.*) A 217 (1 var.)
Taraxaci All. = Leontod. Taraxaci Lois.
tenuifolia N. Terr. (hierac.) = grandiflora?
tuberosa All. = Leontod. tub.
umbellata Nees = paleacea
umbellata Vis. (hierac.) = spinulosa
Villarsii Jord. 404 (1 δ b)
virens Desf. = hieracioid.
PILEOCALYX = Cucurbita
elegans Gasp. = C. — pileiformis
PILOSELLA = Arabis
Thaliana Kostel. = A. Thal.
PILOSELLA = Hieracium
alpicola Sch. Bip. = H. alpic.
argyrocoma Sch. Bip. = H. Pilosella
aurantiaca Sch. Bip. = H. aurantiacum
Auricula Sch. Bip. = H. Aur.
auriculæformis Sch. Bip. = H. auriculæf.
Bauhini Arv. T. = H. Bauh.
brachiata Sch. Bip. = H. brach.
cymosa Sch. Bip. = H. cym.
Faurei Arv. T. = H. Faur.
florentina Sch. Bip. = H. flor.
glacialis Sch. Bip. = H. glac.
Hoppeana Sch. Bip. = H. Hopp.
hybrida Sch. Bip. = H. hybr.
Laggeri Sch. Bip. = H. Lagg.
macrantha Sch. Bip. = H. Hoppeanum
Nestleri Sch. Bip. = H. Nestl.
officinarum Sch. Bip. = H. Pilosella
Peleteriana Sch. Bip. = H. Pellet.
præalta Sch. Bip. = H. præalt.
sabina Sch. Bip. = H. sab.
Schultesii Sch. Bip. = H. Schult.
serpyllifolia Sch. Bip. = H. serp.
Tenoreana Sch. Bip. = H. Pa.-Pilosella

Digitized by Google

PILULARIA I 18 (25)
globulifera L. 18 (1), A 8
minuta Dur. 18 (2)
PIMPINELLA II 163 (554)
alpestris Spr. (*saxifr.*) 164 (2 β b), A 151
alpina Vest, Host = alpestris
angelicæfolia Lam. = Ægopodium Podagraria
angustifolia Gilib. = major
anisoides Briganti 164 (4)
asinoides Guss. = Gussonei
Anisum L. 165 (7)
apula Bernh. = Tragium?
austriaca Mill. = major
bubonioides DC. (non Brot.) = Gussonei
canescens Lois. = Tragium
Danaa M. B. = Physosperm. aquilegifol.
dioica L. = Trinia dioica
dissecta Retz. 163 (1 c)
dissectifolia Koch (saxifr.) = hircina
dumetorum Bœnn. = major
flexuosa Stokes = Bunium flex.
genevensis Vill. = hircina
glabra Rostk. et Schm. = major
glauca L. = Trinia glauca
glauca Lojac. (*Tragium*) 164 (5 b)
glauca Presl = prec.?
Gouani Jacks. = Seseli Gouani
Gussonei Bert. 164 (4 β)
hircina Mill., Leers 164 (2 β), A 151
hirtella Rich. = seg.
hispida Lois. = peregrina
involucrata Jan = Carum Carvi
laciniata Gilib. = saxifraga
laciniata Thore = dissecta
laciniata Wallr. (magna) = orientalis
lateriflora Pers. = Apium leptophyllum
latifolia Gilib. = saxifraga
leptophylla Pers. = Apium leptoph.
lutea Desf. 164 (3)
lutea N. Terr. = anisoides
magna L. = seg.
major Huds. 163 (1)
major L. (saxifraga) = prec.
media Geners. = saxifraga
media Weber = major
minor Ehrh. = saxifraga
nigra Mill., W. 164 (2 α b)
nodiflora Stokes = Apium nodifl.
orientalis Gouan 163 (1 b)
ovata Spr. = saxifraga
peregrina L. 164 (6)
polygama Pourr. = Trinia vulg.
poteriifolia Schur = seg.
poteriifolia Wallr. (saxifr.) = rotundifolia
pratensis Thuill = saxifraga
pumila Jacq., All. = Trinia dioica
rosea Koch (magna) = rubra
rotundifolia Scop. 164 (2 α c)
rubra Fiori (*alpestris*) A 151 (2 β b subf.)
rubra Hpe. et Schl. 163 (1 d)
PIMPINELLA II 163 (554)
rubra Ugolini (alpina) = rubra Fiori
saxifraga L. 163 (2), A 151
saxifraga Scop. = major
saxifraga Ucria = Tragium
segetum Spr. = Petrosel. seg.
seselifolia Rouy et Cam. (saxifr.) = hircina
seselinoides Marches. = Seseli Gouani
Thomasii Arc. = Cryptotænia Thom.
Tragium Vill. 164 (5)
variifolia Salisb. = saxifraga
PIMPINELLA = Poterium
minor Lam. = P. Sanguisorba
officinalis Lam. = P. offic.
Sanguisorba Gærtn. = P. Sang.
spinosa Gærtn. = P. spin.
PINARDIA = Chrysanthemum
coronaria Less. = Ch. coronar.
Roxburghii F. et M. = prec.
PINGUICULA III 87 (811)
alba Kuehl = alpina
albanica Griseb. = hirtiflora
alpestris Pers. = seg.
alpina L. 88 (2)
borealis Salisb. = vulgar.
cærulescens Briq. (*corsica*) A 215 (1 δ a)
corsica Bern. et Gren. 88 (1 δ), A 215
grandiflora Bert. et Auct. = leptoceras
grandiflora Lam. 88 (1 γ), A 215
gypsophila Wallr. 88 (1 α c)
hirtiflora Ten. 88 (1 ε)
leptoceras Rchb. 88 (1 β)
longifolia Gaud. = leptoceras
longifolia Ram. in DC. 88 (1 γ b)
ovata Stokes = vulgaris
pallida Reut. (*grandifl.*) A 215 (1 γ c)
pallidula Briq. (*corsica*) A 215 (1 δ b)
pratensis Koch (*vulg.*) 88 (1 α b)
Reuteri Genty = pallida
sixtina Briq. (*vulgar.*) A 215 (1 α d)
vulgaris L. 87 (1), A 215
vulgaris Petagna = hirtiflora
PINUS I 27 (30)
abasica Carr. = halepensis
Abies Duroi = Abies alba
Abies L. = Abies excelsa
austriaca Hœss 28, A 11 (5 α)
baldensis Zuccagni = Abies — tenuifolia
brutia Ten. 28, A 10 (4 bis)
calabrica Hort. = stricta
calabrica Kœhne (Laricio) = prec.
Cembra L. 27 (1)
cinerea Rœhl. = Abies excelsa
corsicana Loud. = Laricio (α)
crassifolia Goir. (Picea) = Abies — crassif.
dalmatica Vis. = austriaca
escarena Risso = minor
excelsa Lam. = Abies excelsa
PINUS I 27 (30)
Fenzlii Carr. = austriaca
fragilis N. Duham. (*Pinea*) A 10 (2 b)
Frieseana Wich. = silvestris
fruticosa Borb. (*silvestr.*) A 11 (6 b)
genuensis Cook = halepensis
halepensis Mill. 28 (4)
hamata Stev. (*silvestr.*) A 11 (6 d)
Heldreichii Christ = leucodermis
hierosolymitana Duham. = halepensis
humilis Lk. = rotundata
Laricio Koch = austriaca
Laricio Poir. 28, A 11 (5 β)
Laricio Savi = Pinaster
Laricio N. Terr. = leucodermis
Larix L. = Larix decidua
latisquama Wk. et Lge. (Laricio) = Laricio (α)
leucodermis Ant. A 11 (5 γ)
maderensis Ten. = Pinea
magellensis Guss. = austriaca
magellensis Schouw = leucodermis, Pumilio
magellensis Ten. et Guss. exs. = austriaca, leucodermis
maritima Ait. = Laricio
maritima Lam., Poir. = Pinaster
maritima Lamb. = brutia
maritima Mill. = Laricio?
microcarpa Schroet. et Bett. (*silvestr.*) A 11 (6 e)
minor Loud. = seg.
minor Soland. (*Pinaster*) 28 (3 b)
montana Lam. = Cembra
montana Mill.?, Duroi 28 (7), A 11
Mughus Jacq. = fruticosa
Mughus Scop. A 11 (7 γ)
nana Posp. (silvestr.) = fruticosa
nigra Arnold A 11 (5)
nigrescens Host = seg.
nigrescens Ten. = austriaca, leucodermis
nigricans Host 28 (5 β) = austriaca, cfr. A 10
nigricans B. Longo p. p. = leucodermis
obliqua Saut. = rotundata
Paroliniana Webb = brutia
Parolinii Vis. = brutia
parvifolia Heer (*silvestr.*) A 11 (6 c)
pectinata Lam. = Abies alba
Picea Duroi = Abies excelsa
Picea L. = Abies alba
Pinaster Soland. 28 (3), A 10
Pinaster Ten. Syll. = austriaca, leucodermis
Pinea L. 28 (2), A 10
pithyusa Strangw. = halepensis
Poiretiana Ant. (*Laricio*) A 11 (5 β a)
Prenja Beck = leucodermis
prolifera Parl. (*Pinaster*) A 10 (3 c)
Pumilio Hænke A 11 (7 β)

Digitized by Google

PINUS I 27 (30)
pyrenaica Lap. = brutia
reflexa Heer (silvestr.) = hamata
rigensis Desf. = silvestris
rostrata Ant. (*uncinata*) A 11 (7 α a)
rotundata Lk. A 11 (7 α b)
rubra Beck, Posp. (silvestr.) = hamata
rubra Mill. = silvestris
rubra Poir. = hamata
rubra Pourr. = montana
sanguinea Lap. = montana
sativa Lam. = Pinea
scariosa Lodd. = silvestris
silvestris L. 28 (6), A 11
silvestris β L. = Pinaster
squamosa Bosc = silvestris
stricta Carr. (*Laricio*) A 11 (5 β b)
syrtica Thor. = Pinaster
tenuifolia Goir. (Picea) = Abies — tenuif.
uliginosa Neum. = rotundata
uncinata Don (silvestr.) = hamata
uncinata Ram., Ant. A 11 (7 α)
Volkmanni Casp. (silvestr.) = hamata
PIPERELLA = Satureja
filiformis Presl = S. microphylla
PIPTATHERUM = Milium
cærulescens P. B. = M. cærul.
comosum R. et S. = M. Thomasii
frutescens Lk. = M. Thomasii
miliaceum Coss. = M. multifl.
multiflorum P. B. = M. multifl.
paradoxum Koch = M. — virescens
paradoxum P. B. = M. parad.
Thomasii Kth. = M. Thomas.
virescens Boiss. = M. — viresc.
PIPTOCEPHALUM = Catananche
carpholepis Sch. Bip. = seg.
luteum Sch. Bip. = C. lutea
phaiolepis Ball = prec.
PIPTOCHLAMYS = Thymelæa
hirsuta C. A. Mey. = Th. hirs.
PIPTOPOGON = Hypochæris
decipiens Cass. = H. Achyrophorus
glaucus Sch. Bip. = H. glauca
glaucus Tod. = H. — media
levigatus Sch. Bip. = H. Achyrophorus
PIRACANTHA = Cotoneaster
coccinea Rœm. = C. Piracantha
pauciflora Rœm. = prec.
Piracantha Asch. et Græbn. = prec.
PIRCUNIA = Phytolacca
dioica Moq. = Ph. dioica
PIRENIA = Pirus
Amelanchier Clairv. = Amel. vulgar.
Aria Clairv. = P. Aria
Aucuparia Clairv. = P. Aucup.
Chamæmespilus Clairv. = P. Cham.
Malus Clairv. = P. Malus
PIRENIA = Pirus
Pirus Clairv. = P. communis
Sorbus Clairv. = P. domestica
torminalis Clairv. = P. torm.
PIROLA II 298 (659)
asarifolia Radius = chlorantha
chlorantha Sw. 299 (5), A 161
convoluta Bartl. = chlorantha
declinata Mœnch = rotundifol. (α)
grandiflora Radius = rotundifol.
intermedia Schleich. = media
magna Guedd. = seg.
major Gilib., Lam. = rotundifol. (α)
media Hayne = chlorantha
media Sw. 299 (4 β)
minor L. 298 (3), A 161
noveboracensis Colden = rotundifol. (α)
rosea Sm. = minor
rotundifolia L. 298 (4)
rotundifol. Sturm = chlorantha
secunda L. 298 (2)
uniflora L. 298 (1)
virens Schweigg. et Kœrte = chlorantha
PIRUS I 598 (473)
acerba DC. = Malus (α)
Achras Gærtn. 599 (2 α)
acutifolia DC. (Aria) = edulis
alpina Duroi = Chamæmesp.
Amelanchier L. f. = Amel. vulgar.
Amelanch. b. Guss. = Amelanch. — tomentosa
amygdaliformis Vill. 599 (2 γ), A 134
Aria Ehrh. 601 (5), A 134
Aria S. et S. = græca
Aria × Aucuparia Irmsch. 601, A 135
Aria × Chamæmesp. Godr. 601
Aria × torminalis Irmsch. 600, A 134, 213
Aucuparia Ehrh. 601 (7), A 135
Aucup. × suecica A 135
Aucup. × Aria Focke = Aria × Aucup.
austera Wallr. (Malus) = Malus (α)
Balansæ Decsne. = sativa
castrovillarensis N. Terr. (*amygdal.*) A 134 (2 γ for.)
Chamæmespilus Ehrh. 601 (6)
communis L. 599 (2), A 134
Cotoneaster Mœnch = Coton. integerrima
crassipes N. Terr. (*amygdal.*) A 134 (2 γ for.)
cratægifolia Targ.-Tozz. = tormin. × Malus
cretica Asch. et Græbn. (meridional.) = seg.
cretica Lindl. (Aria) = græca
cretica W. = Amelanch. cret.
cuneifolia Guss. = piraina
Cydonia L. 599 (1), A 134
dasyphylla Bluff et Fing. 600 (8 β)
domestica Ehrh. 602 (8), A 135
PIRUS I 598 (473)
domestica Medic. = sativa
edulis W. = Aria (for.)
eriopleura Rchb. = nivalis
eriostyla Guss. = seg.
eriostyla Moris (*Malus*) 600 (8 β c)
floccosa Guss. (Amelanch.) = Amelanch. cretica
florentina Targ.-Tozz. = tormin. × Malus
glaberrima Fiori (*Malus*) A 134 (8 α a)
glaberr. Strobl (acerba) = prec.
glabra Goir. (*Aucup.*) A 135 (7 c)
glabra Koch (Malus) = Malus (α)
græca Lodd. 601 (5 b), A 134
hirsutiuscula Fiori (*Malus*) A 134 (8 α b)
hirsutiusc. Strobl (acerba) = prec.
hortensis Beck (comm.) = sativa
hortensis Wk. et Lge. (Malus) = dasyphylla
hybrida Sm. = Aucup. × suecica, cfr. A 135
inæqualis N. Terr. (*amygdal.*) A 134 (2 γ for.)
intermedia Bechst., Ten. = Aria × tormin.
lanuginosa Beck (*Aucup.*) A 135 (7 a)
latifolia Lindl. = Aria × tormin.
latifolia Ser. (intermedia) = prec.
latifolia N. Terr. (*amygdal.*) A 134 (2 γ for.)
longifolia Pers. (Aria) = edulis?
lusitanica Fiori (*Cydonia*) 599 (1 α b)
macrocarpa Goir. (*Aucup.*) A 135 (7 d)
Malus L. 600 (8), A 134
meridionalis Guss. = græca
mitis Wallr. (*Malus*) 600 (3 β b)
nebrodensis Guss. = Cotoneaster nummularia
nivalis Jacq. 599 (2 β)
nivalis Lindl. = amygdaliformis
oblonga N. Terr. (*Malus*) A 134 (8 var.)
oblongifolia Spach = amygdaliform.
paradisiaca L. (Malus) = præcox
parviflora Desf. = amygdaliform.
parviflora Guss. = sicula
pinnatifida Arc. = Aria × tormin.
pinnatifida Ehrh. = Aucup. × suecica, cfr. A 135
piraina Raf. 599 (2 γ c)
Piraster L. (*comm.*) 599 (2 α b)
Piraster Medic., Borkh. = prec.
pirifera Goir. (*domestica*) A 135 (8 b)

Digitized by Google

PIRUS I 598 (478)
pomifera Goir. (*domestica*) A 135 (8 a)
præcox Pall., Bluff et Fing. A 134 (3 α d)
præmorsa Guss. 601 (7 b), A 135
pubescens Goir. (*torminal.*) A 134 (4 b)
pumila Hort. ex C. Koch = dasyphylla (for.)
rosea Tausch (Aria) = Aria × Chamæmesp.
rupestris Goir. (*domestica*) A 135 (8 c)
salicifolia Balb. (non L. f.) = amygdaliform.
salvifolia DC. 599 (2 β b)
sativa DC. (*comm.*) 599 (2 α c)
sativa Goir. (*Cydonia*) A 134 (1 α)
sativa C. Koch = comm. c. sat.
semilobata Bechst. = Aria × tormin.?
semipinnata Roth = Aria × Aucup.
sicula Tod. 599 (2 γ b)
silvestris Goir. (*Cydonia*) A 134 (1 β)
silvestris S. F. Gray = seg.
silvestris L. (*Malus*) 600 (3 α), A 134
sinaica Thouin. = amygdaliformis
Sorbus Gærtn = domestica
sudetica Tausch = Aria × Chamæmesp.
tenuiflora Bluff et Fing. (*Malus*) A 134 (3 α c)
tenuiflora Bœnn. (acerba) = prec.
thuringiaca Ilse = Aria × Aucup.
Tinei Tod. exs. = commun. (α ?)
tomentosa Bluff et Fing., Koch (Malus) = mitis
torminalis Ehrh. 600 (4), A 134
tormin. × Aria Asch. et Græbn. = Aria × torm.
tormin. × *Malus Lindl.* 600
PISTACIA II 224 (620)
angustifolia DC. (Lentiscus) = massiliensis
angustifol. Lec. et Lam. (*Terebinth.*) A 157 (2 b)
Bauhini Ten. (narbon.) = vera × Terebinth.
crassifolia Salisb. = Terebinth.
gummifera Salisb. = Lentiscus
hybrida Gasp. = vera × Terebinth.
Lentiscus L. 225 (3), A 157
Lentisc. × *Terebinthus Saporta et Marion* 225
macrophylla Pers. = vera
massiliensis Mill. A 157 (3 b)
narbonensis L. = vera
nemausensis Req. = prec.
nigricans Crantz = vera
officinarum Ait. = vera
reticulata W. = vera
Saportæ Burn. = Lentisc. × Terebinth.
PISTACIA II 224 (620)
Terebinthus L. 225 (2), A 157
Terebinthus Mill. = vera
trifolia L. = vera
variifolia Salisb. = vera
vera L. 224 (1)
vera Mill. = Terebinthus
vera × *Terebinth. Planch* 224
PISTOLOCHIA = Aristolochia
latifolia Raf. = A. Pistolochia
PISTOLOCHIA = Corydalis
cava Bernh. = C. cava
intermedia Bernh. = C. interm.
solida Bernh. = C. sol.
PISUM II 98 (515)
Aphaca Brot. = Lathyrus Aph.
arvense S. et S. et Auct. it. p. p. = elatius
arvense L. 98 (β)
arvense Moris = biflorum
biflorum Raf. 98 (γ b)
biflorum Stokes = sativ.
coccineum Medic. = sativ.
commune Clav. = sativ. et arvense
decurrens Stokes = Lathyrus Ochrus
elatius M. B. 99 (γ), A 143
granulatum Lloyd = elatius
humile Mill. 98 (α e)
leiospermum Rouy (elatius) = biflorum
leptolobum Rchb. = arvense
macrocarpum Schur = seg.
macrocarpum Ser. in DC. (*sativ.*) 98 (α d)
maritimum All. = elatius
maritimum L. = Lathyrus mar.
melanospermum Strobl (*elatius*) A 143 (γ c)
multiflorum Stokes = Lathyrus marit.
Ochrus L. = Lathyrus Ochrus
quadratum L. (*sativ.*) 98 (α b)
quadratum Stend. = prec.
sativum L. 98, A 143
Tuffetii Lesson = elatius
umbellatum L. (*sativ.*) 98 (α c)
umbellatum Mill. = prec.
uniflorum Mœnch = arvense
variegatum Presl = biflorum
vulgare Jundz. = sativum
PLAGIUS = Chrysanthemum
ageratifolius L' Hér. = Ch. floscoulosum
Allionii L' Hér. = Ch. discoideum
virgatus DC. = Ch. discoid.
PLANCHONIA = Salpichroa
arbutifolia Dun. = S. rhomboidea
PLANTAGO III 93 (814)
adriatica Campana = Cornuti
adspersa Bernh. = Cynops
afra L. 101 (nota)
agrestis Salzm. = Psyllium
albicans L. 97 (11), A 175
albic. b. Poir. = albic. d. virescens
alpestris Goir. A 175 (9 α for.)
alpina Gaud. (lanceol.) = lanuginosa
alpina L. 99 (16 γ)
alpina Vill., Bert. = montana
PLANTAGO III 93 (814)
altissima Decaisn. (lanceol.) = lanceol. β maritima
altissima L. 97 (9 δ)
altissima Lois. = major
ambigua Guss. = lanceolata
amplexicaulis Cav. 95 (4)
angustifolia Goir. (*lanceol.*) A 175 (9 α for.)
angustifolia Guss. (*albic.*) 97 (11 c)
aquatica Gueld. = Alisma Plantago
arenaria W. et K. = ramosa
argentea Bell. = fuscescens
argentea Chaix 96 (8), A 175
arvensis Presl = Lagopus
arvens. β Presl = eriostachya?
arvens. γ Presl = transiens
asiatica Decaisn. (an L.?) = paludosa
atrata Hpe. = montana
atrata Ten. = lanceolata
Bellardi All. 97 (10)
Bellardi b Guss. = interrupta
Bertolonii Gr. et Godr. = media
bidentata Murith 99 (16 β c)
bracteata Mœnch = major
brutia Ten. 94 (3 β)
bulbosa Crantz = Serraria
calabrica Gaud. ex Rap. = brutia
capitata Hpe. et Hornsch. 96 (8 b)
capitata Ten. = sphærostachya
capitellata Ram. 100 (17 δ)
capitellata Salis (incana) = insularis
capitellata Soleir. exs., Wk. et Lge. (non DC.) = prec.
capitellata Sond. (lanceol.) = sphærostachya
carinata Schrad. 100 (17 β)
Castellii Nic. (lanceol.) = lanuginosa
caulescens Bég. (*major*) 93 (1 α b)
caulescens Guss. (*Lagopus*) 95 (7 b)
ceratophylla Hoffmgg. et Lk. 98 (12 a)
ciliata Koch (*serpent.*) 99 (16 β d)
Columnæ Gouan 98 (11 α b)
commutata Guss. 98 (12 β)
contorta Guss. 96 (9 α e)
Cornuti Gouan 94 (2)
Cornuti Jacq. = Coronopus
coronopifolia Brot. = macrorrhiza
coronopifol. Murr. = seg.
Coronopus L. 98 (11), A 216
crassa Auct. (an W.?) = pachystachya
crassifolia Forsk. 99 (15)
cretica Chaub. = Bellardi
crispa Auct. (an Jacq.?) = pachystachya
crispa Savi = Cynops
crithmifolia Wk. et Lge. (*Coron.*) 98 (12 α c)
crithmoides Desf. = macrorrhiza
Cupani Guss. 98 (13)
Cynops L. 100 (18)

Digitized by Google

PLANTAGO III 93 (814)
dasyurus Raf. = Lagopus
decumbens Bernh. = lanceolata
dentata Bég. (*crassifol.*) 99 (15 b)
dentata Bég. (*mont.*) 95 (5 b)
dentata Roth 99 (16 β b)
denticulata Guss. (*Lagopus*) 96 (7 d)
depauperata Bég. (*serpent.*) 99 (16 β g)
depauperata Gr. et Godr. (carinata) = capitellata
diomedea A. Terr. (Lagopus) = eriostachya
divaricata Zuccagni 101 (19 b)
dubia L. = lanceolata
eriocarpa Viv. ex Coss. = Psyllium
eriophylla Decaisn. (lanceol.) = lanuginosa
eriostachya Ten. p. p. 96 (7 f)
eriostachya B Ten. = Lagop. b caulescens et c transiens
filiformis C. Koch = pusilla
fuscescens Jord. 95 (6)
garganica Baxt. = seg.
garganica Bég. (*ramosa*) 101 (20 b)
gargan. Ten. (aren.) = prec.
genevensis Poir. = Cynops
Gerardi Pourr. = lanceolata
glabra Bolle (macrorrhiza) = macrorrh.
gossypina Clem. (*lanuginosa*) A 175 (9 γ for.)
Grovesii Bég. (*subul.*) 100 (17 α c)
Gussonei Bég. (*subul.*) 100 (17 α b)
heterophylla Guss. (*Cupani*) 98 (13 b)
hirta Ten. (macrorrhiza) = ceratophylla
Holostea Lam. = Bellardi
Holosteum Scop. = subulata
humilis Jan 101 (nota)
hungarica W. et K. A 175 (9 γ for.)
hybrida Ten. (*Serraria*) 98 (14 b)
incana Stokes = media
insularis Gr. et Godr. (*subul.*) 100 (17 γ)
insularis Nym. = prec.
integralis DC. (Coron.) = seg.
integralis Gaud. = serpentina
integrata Gr. et Godr. (Coron.) = pusilla?
intermedia Gilib. 93 (1 α f)
intermedia Gr. et Godr. = paludosa
interrupta Pasq. (*Bellardi*) 97 (10 d)
italica S. G. Gmel. = ramosa
lagopoides Desf. = amplexicaulis
lagopoides Viv. = Lagopus
Lagopus L. 96 (7)
Lagopus b Guss. = transiens
lanata Host = lanuginosa
lanceolata L. 96 (9), A 175
lanceol. β Bert. = polystachya
lanuginosa DC. 97 (9 γ), A 175

PLANTAGO III 93 (814)
lanugin. Koch (lanceol.) = prec.
latifolia DC. (Coron.) = Columnæ
latifolia Salisb. = major
latifolia Wk. et Lge. (*albic.*) 97 (11 b)
Lœflingii L. 101 (nota)
longebracteata Bég. (*carinata*) 100 (17 β b)
longebracteata Goir. (*serpent.*) 99 (16 β f)
longebracteata Koch (serpent.) = carin. b longebract.
longifolia Wk. et Lge. (albic.) = albicans (a)
lusitanica Ten. = transiens
lusitanica L., W. 101 (nota)
luxurians Nic. (Lagopus) = transiens
macrorrhiza Poir. 98 (12 δ)
macrostachya Goir. = major a. megastachya
magnidentata Vis. et Sacc. (*media*) 94 (3 α b)
major Auct. it. p. p. = paludosa
major Boiss. (*albic.*) 97 (11 a)
major Goir. (*Cynops*) 100 (18 a)
major L. 93 (1), A 175
major Scop. = Cornuti
marginata Somm. (*Coron.*) 98 (12 α d)
maritima Desf., Bert., Boiss. et Auct. pl. = crassifolia
maritima Gr. et Godr. (*lanceol.*) 96 (9 β)
maritima Koch p. p. = serpentina
maritima L. 99 (16), A 216
maxima Pasq. (*Bellardi*) 97 (10 b)
maxima Ruching. (non Jacq.) = Cornuti
media L. 94 (3), A 175
mediterranea A. Kern. = lanceol. β maritima
megastachya Wimm. et Grab. (*major*) 93 (1 α a)
microcephala Somm. (Coron.) = pusilla
minima DC. = intermedia
minima Pasq. (Bellardi) = pygmæa
minor Gilib. = major
minor Goir. (*Cynops*) 100 (18 b)
minor Ten. (*Lagopus*) 96 (7 e)
montana Gr. et Godr. (lanceol.) = sphærostachya
montana Huds., Lam. 95 (5), A 175
montana B Ten. = mont. b. dentata
nana Tratt. 94 (1 β)
neglecta Guss. = Coronopus (α)
nutans Poir. = lanceolata
officinarum Crantz = major
pachystachya Ces. (*major*) 93 (1 α d)
pallida Salisb. = albicans
pallidiflora Ugolini (*media*) A 175 (3 α c)

PLANTAGO III 93 (814)
paludosa Turcz. in Ledeb. 94 (1 β)
palustris Ten. (major) = sinuata
parvula Loser (Coron.) = pusilla
pauciflora Bég. (Bellardi) = pygmæa
pauciflora Gilib. = major
pilosa Pourr., Cav. = Bellardi
plicata Schott, Nym. et Kotschy = brutia
polystachya Wimm. et Grab. (*lanceol.*) 96 (9 α d)
Preslii Ten. = lanceolata
prolifera N. Terr. (lanceol.) = polystachya
prostrata Lojac. (*Psyllium*) 101 (nota)
pseudo-caulescens Bég. (Lagopus) = Lagop. b caulescens
pseudo-lusitanica R. et S. = transiens?
Psyllium L. 101 (19)
pumila Neilr. (*lanceol.*) 96 (9 α c)
pumila N. Terr. (Bellardi) = pygmæa
pumila Weld. = Weldenii
pusilla Moris (Coron.) 98 (12 γ) = Weldenii, cfr. A 216
pygmæa Lam. 97 (10 c)
ramosa Asch. 101 (20)
recurvata Koch = crassifolia
recurvata L. = carinata?
rigidifolia Ces. (*major*) 93 (1 α e)
rubens Host = argentea
salina Decaisn. = amplexicaulis
sarda Presl 101 (nota)
sericea Bég. (*mont.*) 95 (5 c)
sericea Bert. = fuscescens
sericea W. et K. (non Ruiz. et Pav.) = argentea
serpentina Koch = carinata
serpentina All., Vill. 99 (16 β), A 216
Serraria L. 99 (14)
sicula Presl 101 (19 c)
sinuata Lam. 93 (1 α c)
sphærocephala Poir. = montana
sphærostachya Wimm. et Grab. (*lanceol.*) 96 (9 α b)
squalida Salisb. = Psyllium
sublanceolata Murr (*media*) A 175 (3 α for.)
submonocephala Bég. (*ramosa*) 101 (20 c)
submonoceph. Rota (aren.) = prec.
subulata Auct. al. = carinata
subulata Guss. p. p., Ross p. p. = Gussonei
subulata L. 100 (17)
suffruticosa Lam. = Cynops
Tabernæmontani Baumg. = Cornuti
tomentosa Gilib. (non Lam.) = lanuginosa?
transiens Bég. (*Lagopus*) 95 (7 c)
uniflora L. = Litorella unif.

Digitized by Google

PLANTAGO III 93 (814)
vaginata Vent. = Lagopus
velutina Poir. = albic. c. angustifol.?
velutina Ten. = albicans
victorialis Poir. = argentea
villosa Lam. = Bellardi
virescens Bég. (*albic.*) 97 (11 d)
vivipara Sacc. (*major*) A 175 (1 α g)
Weldenii Arc. (Bellardi) = pusilla
Weldenii Rchb. A 216 (12 γ)
Wulfenii M. et K. = serpentina
Wulfenii Bernh. in W. 99 (16 β e)
Zwierleinii Nic. (*Psyllium*) 101 (nota)
PLANTINIA = Phleum
aspera Bub. = Ph. asper.
PLATANTHERA I 247 (233)
albida Lindl. = Gymnad. alb.
bifolia Rich. 248, A 209
brachyglossa Rchb. = bifolia
bracteata Rchb. f. (viridis) = Cœlogloss. bract.
Carducciana Goir. 247 (γ)
chlorantha Cust., Rchb. = montana
densiflora Drej. (solstialis) = seg.
densiflora M. Schulze (*bifolia*) A 209 (α b)
diphylla Rchb. f. = Cœlogloss. diphyllum
laxiflora Drej. (solstitialis) = seg.
laxiflora Goir. (*bifolia*) A 209 (α a)
montana Rchb. f. 247 (β)
pervia Peterm. = bifolia
Schuriana Fuss = bifolia
solstitialis Bœnn. in Rchb. = bifolia
virescens C. Koch = montana
viridis Lindl. = Cœlogloss. vir.
Wankelii Rchb. = montana
PLATANUS I 272 (258)
acerifolia Ait. (*orient.*) 272 (1 b)
acerifolia W. = prec.
cuneata W., Ten. A 61 (1 c)
excelsa Salisb. = occidentalis
hispanica Ten. = orientalis
hybrida Brot. = occidentalis
lobata Mœnch = occidentalis
occidentalis L. 272 (2)
orientalis L. 272 (1)
palmata Mœnch = orientalis
umbrosa Salisb. = orientalis
vulgaris Spach = orientalis
PLATYCAPNOS = Fumaria
spicatus Bernh. = F. spic.
PLATYSPERMUM = Daucus
aureum Pomel = D. aureus
grandiflorum M. et K. = D. grandifl.
muricatum Hoffm. = D. mur.
PLATYSTYLIS = Lathyrus
sessilifolia Sweet = L. digitatus
PLEUROGYNE II 348 (707)
carinthiaca G. Don 348
PLEUROSPERMUM II 201 (594)
austriacum Hoffm. 201
cicutarium Dietr. = Molopo-sperm. peloponnes.
Golaka Rchb. = Hladnikia Golaka
PLINTHINE = Arenaria
aggregata Rchb. = A. aggr.
PLUMARIA = Dianthus
revoluta Opiz = D. superbus
superba Opiz = D. superbus
vulgaris Opiz = D. Plumarius
PLUMBAGO II 327 (689)
angustifolia Spach = europ.
europæa L. 327
lapathifolia W. = europ.
undulata Mœnch = europ.
PNEUMONANTHE = Gentiana
acaulis Schm. = G. acaul.
angustifolia Gilib. = G. Pneumonanthe
angustifol. Schm. = G. angustifol.
Asclepiadea Schm. = G. Ascl.
grandiflora S. F. Gray = G. acaulis
pannonica Schm. = G. pann.
plicata Schm. = G. Asclepiadea
punctata Schm. = G. punct.
purpurea Schm. = G. purp.
vulgaris Schm. = G. Pneumonanthe
POA I 85 (113)
adspersa Drejer = palustris
ætnensis Fiori (nemoral.) 87 (6 ε) = seg., cfr. A 23
ætnensis Guss. A 23 (5 δ)
agrostoides Asch. et Græbn. (*nemoral.*) A 23 (6 α e)
airoides Kœl. = Catabrosa aquatica
alpina Gr. et Godr. (nemor.) = montana
alpina Guss. = insularis
alpina L. 85 (1), A 22, 203
alpina × cæsia? Asch. et Græbn. A 23
altissima Mœnch = Glyceria aquatica
anceps Gaud. (*pratens.*) 88 (11 β), A 24
anceps Heg. = prec.
anceps Presl = compressa
angustifolia L. 88 (11 α b)
angustifolia Whlnb. = palustris
annua L. 86 (3), A 23
aquatica L. = Glyceria aquat.
arenaria Retz. = Glyceria distans?
attica Boiss. et Heldr. A 23 (11 γ)
attica Fiori (pratens.) 88 (11 γ) = silvicola, cfr. A 24
attica Freyn, Arc. etc. = silvicola
australis N. Terr. (*alpina*) A 22 (1 α for.)
badensis Hœnke 85 (1 γ)
banatica W. = Festuca montana
Barrelieri Biv. = Glyceria plicata
POA I 85 (113)
Bivonæ Parl. 85 (1 β b)
Borreri Hook. et Walk. = Glyceria Borr.
breunia Richter, Fiori (*violac.*) 86 (5 β), A 23, 204
brevifolia DC. A 22 (1 α c)
brizoides Wohlleb. (non L.) = badensis
bulbosa L. 86 (2), A 23
cæsia Sm. 87 (6 ζ), A 23
cæspitosa Poir. = coarctata
calabra N. Terr. (*bulbosa*) A 23 (2 α for.)
campana N. Terr. (*annua*) A 23 (3 var.)
capillaris Falk = Eragrost. pilosa
capillata Mérat = Festuca capill.
capitata Asch. et Græbn. A 23, 204 (6 γ)
cenisia All. 87 (8)
cenisia Rchb. = badensis
Chaixi Vill. 87 (10), A 24
cilianensis All. = Eragrost. megastachya
ciliaris N. Terr. (*bulbosa*) A 23 (2 α for.)
cinerea Vill. = glauca?
coarctata Hall. f., DC. A 23 (6 δ c)
collina Host = badensis
collina Schur (compressa) = muralis
compressa L. 87 (9), A 23
concinna Gaud. 86 (2 β), A 23
conferta Parl. (*laxa*) A 23 (4 α d)
convoluta Horn. = Glyceria conv.
crispa Thuill. = bulb. b. vivipara
cristata Savi = Kœleria splendens
cristata W. = Kœleria crist.
curvata Kœl. = Festuca pratensis
debilis Thuill. = nemoralis (for.?)
decumbens Scop. = Triodia decumbens
depauperata Fiori (Balbisii) 87 = seg., cfr. A 204
depauperata Fiori (*capitata*) A 204 (6 γ b)
depressa Presl = humilis
distans Guss. = Glyceria convoluta
distans L. = Glyceria dist.
disticha Wulf. = Sesleria dist.
distichophylla Gaud. = cenisia
divaricata Gouan = Sphenopus divar.
dolosa Nym. (non Boiss. et Heldr.) = laxa
dubia Leers = trivialis
dubia Sut. = coarctata
dulcis Salisb. = Catabrosa aquatica
dura Scop. = Sclerochloa dura
effusa Asch. et Græbn. (*trivial.*) A 24 (12 α b)
effusa Kit. = palustris

Digitized by Google

POA I 85 (113)
elegans DC. = laxa
Eragrostis All. = Eragrost. pilosa
Eragrostis Desf. = Eragrost. Barrelieri
Eragrostis L. = Eragrost. poæoides (α)
Eragrostis Sm. = Eragr. megastachya
exigua Fouc. et Mand. (*non Dum.*) A 23, 204 (1 ε)
exilis Murbeck = seg.
exilis Tomm. (*annua*) A 23 (3 β)
expansa Gmel. = Sphenopus divaricatus
fertilis Host A 23 (7 b)
festucæformis Host = Glyceria fest.
flexuosa Sm. = laxa
firmula Gaud. (*nemoral.*) 87 (6 δ)
firmula S. F. Gray = prec.
flavescens Parl. (laxa) 86 (4 α b) = pallescens, cfr. A 23
flexuosa Whlnb. = cenisia
fluitans Biv. = Glyceria plicata
fluitans Scop. = Glyceria fluit.
Foucaudii Hack. = exigua
Gaudini R. et S. = cæsia
Gerardi All. = Festuca spadicea
glabra Ehrh. = pratensis
glauca DC. (an With.?) = seg.
glauca Gaud. (*nemoral.*) 87 (6 α b), A 23
glauca Schk. = Kœleria glauca
glauca Sm. = cæsia
glaucantha Gaud. A 204 (6 α for.)
glaucescens Guss. (rigida) = Sclerochloa — glaucesc.
glaucescens Beck (*alpina*) A 22, 203 (1 α for.)
glaucescens Roth = montana
hemipoa Lor. et Barr. = Sclerochloa hemip.
humilis Ehrh. 88 (11 α c)
hybrida Gaud. 87 (10 β), A 24
hydrophila Pers. = palustris
insularis Parl. 85 (1 β)
intermedia Ambrosi (alpina) = alp. × cæsia
Jolleri Chiov. (*alpina*) A 22 (1 α for.)
juncoides Gaud. = rigidula
jurana Genty = Chaixi
Kœleri Caldesi = silvicola
Kœleri DC. = badensis
Langeana Rchb. 87 (9 b)
latifolia Pohl = Chaixi
latifolia Weihe, Koch (*pratens.*) A 24 (11 α d)
laxa Balb. = minor
laxa Hænke 86 (4), A 23
leersioides Guss. = Eragrost. megastachya
litoralis Gouan = Æluropus litoralis
loliacea Huds. = Catapodium loliaceum
loliacea Kœl. = Festuca elatior × Lol. perenne

POA I 85 (113)
major Bert. (distans) = Glyceria festucæform.
marginata Schleich. = laxa
maritima Huds. = Glyceria mar.
maritima Pourr. = Sclerochloa mar.
maritima Savi = Glyceria distans
mediterranea Nem. in Chaub. = Glyceria festucæform.
megastachya Kœl. = Eragrost. megast.
miliacea DC. (non Lk.) = montana
miliacea Kit. = coarctata
minima With. = Mibora min.
minor Gaud. 86 (4 β)
minor Hpe. (*alpina*) A 22 (1 α b)
minor Whlnb. (pratens.) = humilis
minuta Trin. = Aira minuta
Molinerii Balb. = badensis
Molinerii DC. = concinna
montana All. = nemoralis, cfr. A 23 (6 α c oss.)
montana Delarbre = Festuca spadicea
montana Gaud., Koch (*nemoral.*) 87 (6 α c), A 23
mucronulata N. Terr. (*alpina*) A 22 (1 α for.)
multiflora Forsk. = Eragrost. megastachya?
multiflora Posp. (compressa) = Langeana
multiflora Rchb. (*trivial.*) A 24 (12 γ)
muralis Wibel A 24 (9 d)
nebrodensis Asch. et Græbn. (*violac.*) A 23 (5 γ)
nemoralis L. 86 (6), A 23, 204
nitens Weber = Hierochloë boreal.
nitida Lam. = Kœleria gracilis
nitida Savi = Kœleria glauca
nivalis Schur = alp. b. minor
nutans Gilib. = nemoralis
Nymanii Tin. = strigosa
oblonga Baumg. = Eragrost. megastachya
oreophila Heldr. = cenisia
ovalis Tin. = annua
pallescens Koch (*laxa*) A 23 (4 α b)
palustris DC. = rigidula
palustris L., Roth 87 (7), A 23
Parnellii Bab. = montana?
pauciflora Parl. (*laxa*) A 23 (4 α c)
pectinacea Lam. = Kœleria vallesiana
phleoides Lam. = Kœleria phleoid.
Phœnix Scop. = Festuca arundinac.
pilosa L. = Eragrost. pilosa
planiculmis Presl = compressa
pollinensis N. Terr. = silvicola, cfr. A 24
polymorpha Wibel = rigidula
pratensis All. = trivialis

POA I 85 (113)
pratensis Leers = rigidula
pratensis L. 88 (11), A 24
procumbens Curt. = Sclerochloa proc.
prolifera Schmidt = bulb. b. vivipara
protuberata Schur = pseudo-concinna
pseudo-concinna Schur A 23 (2 α c)
pseudo-laxa Schur = laxa
psychrophila Boiss. et Heldr. = cenisia
pulchella R. et S. = Sclerochloa rigida
pumila Host 85 (1 δ), A 23
pungens M. B. = Æluropus litoralis
pyramidata Lam. = Kœleria — pyram.
remotiflora Hack. (annua) = exilis
remotiflora Murbeck = prec.
repens Stev. = Æluropus rep.
retroflexa Curt. = Glyceria distans
rhenana Lej., M. et K. (non Kœl.) = coarctata
rigida L. = Sclerochloa rig.
rigidula M. et K., Koch 87 (6 δ b), A 23
riparia Wolff = palustris
rubens Mœnch = Chaixi
rupestris With. = Sclerochloa procumbens
sabauda All. = Festuca elatior
salina Pollich = Glyceria distans
scabra Ehrh. = trivialis
Scheuchzeri Sut. = coarctata
Schultesii Kth. = coarctata
sclerocalamos Facch. = alpina × cæsia
serotina Ehrh. = palustris
serotina Schrad. = rigidula
seslerioides All. = Sesleria pedemont.
seslerioides Lois. = Sesleria disticha
setifolia Zett. = violacea
sicula Jacq. = Catapodium siculum
silvatica Chaix in Vill. = Chaixi
silvicola Guss. A 24, 204 (12 β)
spadicea Kœl. = Festuca spad.
spicata Biv. = Glyceria spic.
stenantha Trin. = alp. b. minor
stolonifera Bell. = cenisia
strigosa Hoffm. A 24 (11 α b')
subcærulea Sm. = humilis
subcompressa Parn. = Langeana
subtilis Schur = alp. b. minor
subuniflora Rchb. (nemoral.) 87 (6 β) = uniflora, cfr. A 23
subuniflora Schur = uniflora
sudetica Hænke = Chaixi
supina Panz. in Sturm. = minor
supina Schrad. 86 (3 b)
tenella Rchb. (*nemoral.*) A 23 (6 α d)

Digitized by Google

POA I 85 (118)
thermalis Pers. = badensis
Tommasinii Asch. et Græbn. (*exilis*) A 23 (3 β b)
tremula Schur = laxa
triangularis Gilib. = annua
triflora Gilib. = palustris
trinervata DC. = Chaixi
trinervata Ehrh. = Festuca altissima
trivialis L. 88 (12), A 24, 204
trivialis Pollich = badensis
trivialis Presl = silvicola
tunetana Spr. = Æluropus repens
umbrosa Beck (*compressa*) A 23 (9 c)
uniflora M. et K. (*nemoral.*) A 23 (6 β)
varia Gaud. (annua) = supina
variegata Hall. f. = supina
versicolor Fiori (*silvicola*) A 24 (12 β b)
versicolor Hausskn. (attica) = prec.
verticillata Cav. = Eragrost. vertic.
violacea Bell. 86 (5), A 23, 204
violascens Halacsy (silvicola) = versicolor
vivipara L. (*alpina*) 85 (1 α b)
vivipara Kœl., Koch (*bulbosa*) 85, A 23 (2 α b)
vivipara Mazziari = bulb. b. vivip.
vivipara W. = alp. b. vivip.
Willemetiana Godefr. = Chaixi
PODAGRARIA = Ægopodium
Ægopodium Mœnch = Æ. Podagr.
PODANTHUM = Phyteuma
collinum Boiss. = seg.
limonifolium Boiss. = Ph. lim.
trichocalycinum Boiss. = Ph. trich.
PODOPETALUM = Trochiscanthes
nodiflorum Gaud. = T. nodifl.
PODOSEMUM = Sporobolus
pungens Lk. = Sp. pungens
PODOSPERMUM = Scorzonera
angustifolius Gr. et Godr. (decumb.) = S. Tenorii f. humilis
calcitrapifolium DC. = S. calcitr.
callosum DC. = S. callosa
Columnæ DC. = S. Column.
decumbens Gr. et Godr. = S. decumb. et S. Tenorii
integrifolium Gr. et Godr. (lacin.) = S. subulata
intermedium DC. = S. interm.
Jacquinianum Koch = S. Jacquin.
laciniatum DC. = S. lacin.
muricatum DC. = S. muric.
octangulare DC. = S. octang. et S. Jacquin.
octangulare Roth = S. octang.
resedifolium DC. = S. calcitrapifol.
resedifolium Gr. et Godr. (decumb.) = S. decumbens
PODOSPERMUM = Scorzonera
subulatum DC. = S. subul.
Tenorii DC. = S. Tenorii
POGONELLA = Simethis
planifolia Salisb. = S. Mattiazzi
POGONOSTYLIS = Fimbristylis
squarrosa Bert. = F. squarr.
POLEMONIUM II 360 (714)
cæruleum L. 360, A 165
elatum Salisb. = prec.
valerianæfolium Gilib. = prec.
vulgare S. F. Gray = prec.
POLIUM = Teucrium
album Mill. = T. Polium (α)
angustifolium Mill. = T. — angustifol.
aureum Mœnch = T. — luteum
capitatum Mill. = T. capit.
diffusum Mill. = T. Polium (for.)
erectum Mill. = prec.
fruticosum Mill. = prec.
integerrimum Mill. = prec.
latifolium Mill. = T. — latif.
luteum Mill. = T. — lut.
montanum Mill. = T. mont.
perenne Gueld. = T. Polium
pratense Gueld. = prec.
ramosum Mill. = T. Polium (for.)
serratum Mill. = prec.
smyrnæum Mill. = prec.
spicatum Mill. = prec.
tomentosum Mœnch = T. mont.
POLLICHIA = Lamium
amplexicaulis W. = L. amplex.
Galeobdolon Schrank, Roth = L. Galeobd.
montana Pers. = L. — mont.
vulgaris Pers. = L. Galeobdol.
POLLINIA = Andropogon
distachya Spr. = A. distach.
Gryllus Spr. = Chrysopogon Gryllus
pallida R. et S. = prec.
POLYACANTHA = Carduus
acanthoides Hill = C. acanth.
acaulos Hill = Cirs. acaule
crispa Hill = C. crisp.
palustris Hill = Cirs. pal.
procumbens S. F. Gray = Centaurea aspera
POLYCARPON I 336 (325)
alsinæfolium DC. 336 (1 β), A 67
alsinoides Gr. et Godr. (tetraph.) = alsinæfol.
Bivonæ J. Gay = Cupanii
caspicum C. A. Mey. (tetraph.) = diphyll.
Cupanii Bub. 336 (2 α b)
diphyllum Cav. A 67 (1 α b)
Gmelini Griseb. = alsinæfol.
latifolium Bert. = peploides
maritimum A. Schultz (tetraph.) = alsinæfol.
peploides Bert. = Cupanii
peploides DC. 336 (2)
rotundifolium Rouy 336 (2 β)
tetraphyllum L. 336 (1), A 67
verticillatum Fenzl (tetraph.) = tetraphyll. (α)
POLYCNEMUM I 315 (295)
arvense L. 315, A 65
Camphorosma Schrank = Kochia arenaria
macrophyllum Neilr. (arv.) = majus
majus A. Br. 315 (β)
minus Dœll (arv.) = arvense (α)
minus Jord. = prec.
pinifolium Rchb. (arv.) = majus
roseolum DNtrs. (*arvense*) A 65 (var.)
simplex Wallr. (arv.) = majus
vulgare Pall. = arvense
POLYGALA II 228 (624)
adriatica Chod. (*nicæensis*) 230 (nota) (3 θ for.)
albiflora N. Terr. = seg.
albiflora N. Terr. (*vulgaris*) A 157 (3 α for.)
alpestris Koch (vulg.) = pseudo-alpestris
alpestris Rchb. 229 (3 γ), A 214
alpina DC., Gaud. (*amara*) 231 (4 β)
alpina Steud., Perr. et Song. = prec.
amara L. 231 (4)
amarella Chod. (non Crantz) = amara (α)
amarella Coss. et Germ. = calcarea
amaro-depressa F. Schultz = alpestris
amaurocarpa Timb. 229 (3 α k)
Angelisii Ten. = alpestris
angustifolia N. Terr. (*major*) A 157 (1 for.)
apennina Chod. (*major*) 228 (nota) (1 d)
apiculata Huter et Porta (vulgar.) = seg.
apiculata Porta 231 (3 λ)
aquitanica Clav. = dunensis
austriaca Crantz = amara (α)
badensis Schimp. = serpyllacea
blepharoptera Borb. = ciliata
brachycoma Jord. 230 (3 ι c)
buxifolia Car. et St.-Lag. = Chamæbux. alpester
buxifolia Ten. = vulgaris (var.?)
calcarea F. Schultz 231 (4 γ)
Callayana Legrand = brachycoma
calyptera Legrand (*vulg.*) 229 (3 α j)
carniolica A. Kern. 230 (3 δ)
Carueliana Burn. 230 (3 ε), A 157
Chamæbuxus L. = Chamæbux. alpester
ciliata Lebel (*non L.*) 229 (3 α g)
collina Rchb. (oxyptera) = oxyptera
comosa Schk. 231 (3 ι), A 157
confusa Burn. (*nicæensis*) 230 (3 θ b)
corsica Gremli = pedemontana
corsica Sieb., Bor. 230 (3 θ d)
decipiens Bess. = amara (α)

Digitized by Google

POLYGALA II 228 (624)
decipiens Ten. (amara) = alpestris
densiflora Tausch = pseudo-alpestris
densiuscula Rouy et Fouc. 229 (β α i)
depressa Wend. = mutabilis
dubia Bellynck 229 (β α l)
dunensis Dum. 229 (β α f)
elongata Presl (non Klein.) = Preslii
exilis DC. 232 (6)
fallax Burn. (*nicæensis*) 230 (β θ f)
flavescens DC. 230 (β η), A 157
forojuliensis Kern. 230 (β θ e)
Gariodiana Jord. et Fourr. 230 (β θ c)
glacialis Bruegg. = alpina
glumacea S. et S. = monspeliaca
grandiflora Chod. (*major*) 228 (nota) (1 c)
grandiflora Gaud. (Chamæbux.) = Chamæbux. — grandifl.
grandiflora Orsini = major
grandiflora Rouy et Fouc. (comosa) = pyramidalis
Gremlii Chod. (comosa) = densiuscula, pedemontana
Hoppeana Rchb. (*comosa*) A 157 (β ι for.)
humilis Legrand (*comosa*) 230 (β ι d)
Huteri Chod. = apiculata
insubrica Chod. (nicæensis) = confusa
intermedia G. Cam. (comosa) = humilis
intermedia F. Schultz (*vulg.*) 229 (β α h)
italiana Chod. (*major*) 228 (nota) (1 b)
italiana Chod. (*nicæensis*) 230 (nota) (β θ for.)
istriensis Chod. (*nicæensis*) 230 (nota) (β θ for.)
laxa Burn. (nicæensis) = nicæensis (a)
Lejeunii Bor. 231 (β ι f)
Lejeunii Michal. = dubia
linearis Lag. (non alior.) = exilis
Liorani Jord. = serpyllacea
litigiosa Berher = dubia
litigiosa Legrand (comosa) = brachycoma
littorea Clav. = dunensis
lutea Neilr. (Chamæbux.) = Chamæbux. alpester (a)
major Jacq. 228 (1), A 157
major Rouy et Fouc. (serpyllac.) = pyxophylla
mediterranea Chod. (nicæensis) = confusa, corsica, Gariodiana etc.
Michaletii Gren. = dubia
microcarpa Gaud. = alpestris
minor Ledeb. (vulg.) = oxyptera
minor Legrand (flavesc.) = provincialis
monspeliaca L. 232 (5), A 157

POLYGALA II 228 (624)
monspeliaca Pollini = exilis
Morisiana Rchb. f. 229 (β γ c)
multicaulis Tausch 229 (β α e)
mutabilis Dum. 229 (β β h)
myrtifolia Fr. 231 (4 α b)
nana Boissieu = exilis
nicæensis Risso 230 (β θ)
nivea Miègev. = alpina
obtusata Chod. (*alpestr.*) A 214 (β γ for.)
oxysepala Borb. (*comosa*) 230 (β ι e)
oxyptera Rchb. 229 (β α d)
palustris Chodat (vulg.) = rosulata
parviflora Coss. et Germ. (vulg.) = oxyptera
parviflora Lois. (non Poir.) = exilis
parviflora Neilr. (amara) = amara (α)
pedemontana Perr. ex Verl. 231 (β κ)
pisaurensis Cald. 230 (β ζ)
polystachya Chod. (*alpestris*) 229 (β γ b)
pratensis Rchb. (oxyptera) = multicaulis
Preslii Spr. 228 (2)
prostrata F. Schultz (non W.) = serpyllacea
provincialis Legrand 230 (β η b)
pseudo-alpestris Gren. (*vulg.*) 229 (β α c)
pseudo-gracilis Gremli (*vulg.*) A 157 (β α for.)
pubescens Rchb. (amblyptera) = seg.
pubescens Rchb. (buxifol.) = seg.
pubescens Rohde (vulg.) = nicæensis
purpurea Neilr. (Chamæbux.) = Chamæbux. — grandiflorus
pyramidalis Chod. (*comosa*) 230 (β ι b)
pyxophylla Avè-Lall. (vulg.) = alpestris
pyxophylla Rchb. 229 (β β b)
Reichenbachii Rouy et Fouc. (amara) = myrtifol.
rhodoptera Ball (Chamæbux.) = Chamæbux. — grandiflorus
rosea Bert. et Auct. it. (non Desf.) = nicæensis
rosea Gr. et Godr. = confusa
rosulata Fr. (*vulg.*) A 157 (1 α for.)
scutellata Chaten. = dubia
serpyllacea Weihe 229 (β β)
serpyllifolia Fisch.-Oost. = alpina
sicula Tin. = monspeliaca
speciosa Kern. 230 (β θ g)
straminea Presl = monspeliaca
thuringiaca Spr. = nicæensis
transiens Burn. (vulg.) = intermedia
uliginosa Rchb. (non Pers.) = myrtifol.
valdensis Chodat (*vulg.*) A 157 (β α for.)

POLYGALA II 228 (624)
venulosa S. et S. 228 (2 nota)
versicolor Claire (vulg.) = dubia
vestita Gr. et Godr. (*vulg.*) 229 (β α b)
virescens Freyn (*vulg.*) A 157 (β α for.)
vulgaris L. 229 (3), A 157, 214

POLYGONATUM I 207 (207)
ætneum Fiori (*offic.*) 208 (β α b)
anceps Mœnch = officinale
bracteatum G. Don, Dietr. 207 (2 α b)
Broteri Baker (*multiflor.*) 207 (2 β)
glaberrimum C. Koch = officinale
Gussonii Parl. = Broteri
hirtum Pursh = latifolium
latifolium Desf. 208 (β β)
majale All. = Convallaria majalis
mas Geisenh. (multiflor.) = Broteri
multiflorum All. 207 (2), A 49
officinale All. 208 (3)
Polygonatum Jirasek = prec.
uniflorum St.-Hil. = officinale
verticillatum All. 207 (1), A 49
vulgare Desf. = officinale

POLYGONUM I 291 (282)
acidum Pall. = alpinum
acre Lam. = Hydropiper
acutifolium Schur (avicul.) = neglectum
adenophorum Spr. = toment.
agreste Meisn. (Persic.) = Persicaria (a)
alatum Dulac = dumetorum
alpestre Schur = Bistorta
alpinum All. 293 (8)
alpinum Schleich. (avicul.) = minimum
alpinum Schur = mite
amœnum Salisb. = Bistorta
amphibium L. 293 (9)
angustifolium D. Don = viviparum
angustifolium Meisn. (Bistorta) = confusum
angustifol. Neilr. (Persic.) = minus
angustifol. Roth = minus
angustissimum Meisn. (avicul.) = neglectum
arenarium Lois. = effusum
arenarium W. et K. 296 (17)
arenastrum Bor. = aviculare
arvense Gerh. (avicul.) = neglectum
aviculare L. 295 (15), A 63
axillare Rigo = miti × Persic.
Baumgartenianum Schur = tomentos.
Bellardi All. 296 (15 γ)
Bertolonii Goir. et Ton. 292 (β β)
Bistorta L. 293 (6), A 62
bistortoides Boiss. = confusum
bitense F. Schultz = miti × Persic.

Digitized by Google

POLYGONUM I 291 (282)
Blancheanum Gandog. = viviparum
bracteatum Spr. = viviparum
Braunianum F. Schultz = min. × Persic.
Braunii Bluff et Fing. = mite
Brittingeri Opiz = tomentos.
bulbiferum Royle = viviparum
capitatum C. Koch (*Bistorta*) A 63 (6 c)
carneum C. Koch = confusum
carnosum Schur (avicul.) = litorale
carthusianorum Gandog. = Bistorta
Centinodium Lam. = aviculare
cereale Salisb. = Fagopyrum
Cherrolatii Gandog. = viviparum
coccineum Muehlenb. = amphib.
condensatum Schultz = miti × Persic.
confusum Meisn. A 62 (6 b)
congestum Marches. (*avicul.*) A 63 (15 for.)
controversum Guss. = equisetiforme (α)
convolvulaceum Lam. = Convolvulus
convolvuliforme St.-Lag. = Convolvulus
Convolvulus L. 292 (3), A 62
corsicanum Lk. (1829) = seg.
corsicanum Meisn. (1826) (equisetiforme) = scoparium
crassifolium Lge. (avicul.) = litorale
crassinerve Ces. = litorale
crenatum Ehrenb. = equisetiforme
Debeauxii Le Grand A 63 (15 for.)
decipiens R. Br. = minus
densiflorum Neilr. (Persic.) = Persicaria
depressum Meisn. (*aviculare*) 296 (15 α f)
dissitiflorum Guss., Bianca in Tod. = patulum
divaricatum Vill. (non L.) = alpinum
dubium Stein. = mite
dubio × Persicaria A. Br. = miti × Persic.
dumetorum L. 292 (4), A 62
effusum Fiori (*aviculare*) 296 (15 δ)
effusum Meisn. (Bellardi) = prec.
Ehrenbergii Meisn. = equisetiforme
elatius R. Br. = tomentos.
elegans Ten. 297 (18 γ), A 63
ellipticum W. = Bistorta
elongatum Schur (avicul.) = neglectum
equisetiforme Goir. = aviculare
equisetiforme Gr. et Godr. etc. = scoparium
equisetiforme S. et S. 296 (18), A 63
POLYGONUM I 291 (282)
erectum L. 296 (15 α e)
exiguum Gaud. (avicul.) = minimum
Fagopyrum L. 292 (1), A 62
flagellare Bert. = romanum
flagellare Spr. = Bellardi
flavescens Jord. = Bellardi
geniculatum Poir. = aviculare
glandulosum Poir. = Hydropiper
glandulosum R. Br. = tomentosum
glaucum Nutt. = maritim.
gracile Guss. = patulum
gracile Salisb. = Hydropiper
græcum Meisn. (equisetif.) = equisetiforme (α)
Gussonei Tod. = depressum
herniarioides Del. 295 (14)
herniarioides Guss. = depressum
humifusum Jord. = neglectum
hybridum Chaub. = mite
Hydropiper L. 294 (11), A 63
Hydropip. × dubium Gr. et Godr. = Hydropiper
Hydropip. × serrulatum Nic. A 63
incanum Koch (lapathifol.) = seg.
incanum F. W. Schm. = tomentos.
incanum W. 294 (10 β c)
infestum Salisb. = Convolvulus
intermedium Rob. = Roberti
intermedium Ehrh. = minus
lapathifolium L. 293 (10)
latifolium Gr. et Godr. (litorale) = Roberti
latifolium Kotschy = alpinum
laxiflorum Schur = Bistorta
laxiflorum Weihe = mite
laxifloro × Persicaria Rchb. = miti × Persic.
laxum Goir. (*Fagopyr.*) A 62 (1 b)
laxum Ledeb. (avicul.) = neglectum
litorale Gr. et Godr. = Roberti
litorale Lk. 296 (15 α d)
longifolium F. et M. (Bistorta) = confusum
macrochætum Miq. = serrulatum
maculatum Krock = tomentosum
maculatum Raf. = Persicaria
marioticum Ehrenb. = equisetiforme
maritimum L. 295 (13)
minimum Murith (*avicul.*) A 63 (15 α b)
minoriflorum F. Schultz = min. × Persic.
minorifolium F. Schultz = min. × Persic.
minus Huds. 294 (12), A 63
minus Meisn. (Bistorta) = capitatum
minus Ten. = serrulatum
min. × Persicaria A. Br. 295, A 63
mite Schrank 294, A 63 (11 β)
POLYGONUM I 291 (282)
miti × Persicaria Schultz 294, A 63
mixtum Goir. et Ton. 292 (×)
monspeliense Guss. = Bellardi
monspeliense Thieb. = erectum
montanum Ciccioni (*dumetor.*) A 62 (4 var.)
nanum Bory 295 (15 α b) = minimum, cfr. A 63
natans Mœnch (*amphib.*) 293 (9 a)
neglectum Bess. 296 (15 α c)
nervosum Wallr. = neglectum
nodosum Pers. 293 (10 α b)
niloticum Meisn. = Persicaria
nudum Dulac = Bellardi
obtusatum Steud. = lapathifol.
ochreatum Houtt. = tomentos.
orientale L. 293 (5)
pallens Pers. = tomentos.
pallidum With. = tomentos.
paludosum Schur = mite
paniculatum Andr. = lapathif.
parvifolium Goir. (*Convolvul.*) A 62 (3 α for.)
parvifolium Schott = marit.?
patulum M. B. 296 (15 β)
pensylvanicum Curt. = toment.
Persicaria L. 294 (10 β)
Persic. β L. = minus
Persic. γ L. = tomentos.
Persic. × minus A. Br. = min. × Persic.
Persic. × mite A. Br. = miti × Persic.
pilatense Gandog. = Bistorta
plebeium R. Br. 295 (14 oss.)
polycnemiforme Lec. et Lam. = neglectum
polymorphum α Led. = alpinum
procumbens Gilib. = aviculare
prostratum Lge. (avicul.) = depressum
provinciale C. Koch = aviculare
Pseudo-Hydropiper Salzm. = salicifol.
Pseudo-Lapathum Schur = tomentos.
pulchellum Auct. it. = effusum
pulchellum Lois. 296 (nota)
pulchrum Blume = tomentos.
punctatum Gremli (*lapathifol.*) 293 (10 α c)
punctatum Krock = tomentos.?
purpureum Gilib. = amphib.
pusillum Goir. (*Fagopyr.*) A 62 (1 c)
pusillum Guss. ex Nym. = minimum
pusillum Kit. = Convolvulus
pusillum Lam. = minus
pusillum Rota (aviculare) = depressum
quadrifidum Meisn. = lapathif.
Raji Bab. = Roberti
ramiflorum Janka = patulum
reticulatum C. Koch = patulum
rivulare Roth = Persicaria
Roberti Lois. 295 (13 β)
romanum Jacq. 296 (16), A 63

Digitized by Google

POLYGONUM I 291 (282)
rurivagum Jord. = aviculare
salicifolium Del. (an Brouss.?) 294 (12 β b)
salicifolium Schur = amphib.
salinum Schur (avicul.) = litorale
salsuginosum Wallr. = litorale
saxatile Gaud. (avicul.) = minimum
scabrum Mœnch = tomentos.
scabrum Poir. = serrulatum?
scandens Güld. = dumetorum
Schurii Fuss = Bistorta et mite
scoparium Req. 297 (18 β)
serotinum Ten. 294 (10 β b)
serrulatum Lag. 294 (12 β)
serrulat. × *nodosum Nic.* A 63
sibiricum L. f. (non Pall.) = alpinum
somphocarpum De Bruyn = tomentos.
spectabile Lehm. = patulum
splendens Klotzsch = confusum
stenophyllum Schur (avicul.) = neglectum
striatum Dulac. = Convolvulus
strictum All. = minus et min. × Persic.
strictum Meisn. = serrulatum
suffruticosum Salzm. = equisetiforme
tataricum L. 292 (2)
tenuiflorum Presl 294 (10 α e)
terrestre Heg. = seg.
terrestre Leers (amphib.) 293 (9 b)
tomentosum Schrank 294 (10 α d)
trigynum Boiss. (equisetif.) = equisetiforme (α)
turgidum Thuill. = tomentosum
vegetum Ledeb. (avicul.) = erectum
Venantianum Clem. = arenarium
viscosum Bast. = tomentos.
viviparum L. 293 (7)
volubile Gilib. = Convolvulus
POLYPODIUM I 5 (3)
aculeatum L. = Aspid. acul.
acutum Wallr. (vulg.) A 1 (1 e)
alpestre Hpe. = rhæticum
alpinum Wulf. = Cystopt. alp.
angustatum Hoffm. (fragile) = Cystopt. — angustata
angustum Hausm. (vulg.) A 1 (1 d)
anthriscifolium Hoffm. = Cystopt. — anthr.
arvonicum Sm. = Woodsia alpina
arvonicum With. = Woodsia ilvensis (α)
asplenoides Scop. = Cystopt. — pumila
attenuatum Milde (vulg.) A 1 (1 c)
auriculatum Schur = vulgare
auritum Wallr. (vulg.) = seg.
auritum W. A 1 (1 f)
australe Fée A 2 (1 β for.)
calcareum Sm. = Robertianum
POLYPODIUM I 5 (3)
Callipteris Ehrh. = Nephrod. cristatum
cambricum L. 6 (1 γ), A 1
canariense W. = serratum
commune Milde (vulg.) A 1 (1 a)
crenatum Wollast. (vulg.) = serratum
cristatum L. = Nephrod. crist., spinul.
cynapiifolium Hoffm. = Cystopt. — cynap.
dentatum Dick. = Cystopt. — dent.
dilatatum Hoffm. = Nephrod. dil.
Dryopteris L. 6 (3), A 2
Filix-fœmina L. = Asplen. Fil.-fœm.
Filix-mas L. = Nephrod. Fil.-mas
fontanum L. = Asplen. font.
fragile L. = Cystopt. frag.
fragrans L. = Nephrod. Oreopt.
fragrans L. Mant. = Cheilanthes fragr.
fragrans Vill. = Nephrod. rigidum
grandifrons Lge. (vulg.) = serratum
Heleopteris Borckh. = Nephrod. — Heleopt.
hibernicum Moore (vulg.) = australe
hyperboreum Sw. = Woodsia alpina
leptophyllum L. = Gymnogramme leptoph.
limbospermum Bell. in All. = Nephrod. Oreopteris
lobatum Huds. = Aspid. lob.
Lonchitis L. = Aspid. Lonch.
Marantæ Hoffm. = Woodsia ilvensis (α)
meridionale F. W. Schultz (vulg.) = serratum
molle All. = rhæticum
montanum Lam. = Cystopt. mont.
montanum Vogler = Nephrod. Oreopteris
muricolum Gdgr. = Dryopteris
Myrrhidifolium Vill. = Cystopt. montana
Oreopteris Ehrh. = Nephrod. Oreopt.
ovatum Wollast. (vulg.) = serratum
pedicularifolium Hoffm. = Asplen. pedic.
Petrarchæ Guér. = Asplen. Petrarchæ
Phegopteris L. 6 (2)
pinnatifidum Milde (non Wallr.) (vulg.) = australe
Plukenetii Lois. = Aspid. — Pluken.
Pontederæ All. = Asplen. Fil.-fœm. f. dentatum
pumilum Goir. et Ton., Hausm. (vulg.) A 1, 201 (1 β b)
regium L. = Cystopt. regia
rhæticum L. 6 (4)
POLYPODIUM I 5 (3)
rhæticum L. p. p. = Asplen. — rhætic.
rigidum Hoffm. = Nephrod. rig.
Robertianum Hoff. 6 (3 β), A 2
rotundatum Milde (vulg.) A 1 (1 b)
semilacerum Woll. (non Lk.) (vulg.) = australe
serratum Christ = seg.
serratum W. (vulg.) 6 (1 β), A 1, 201
spinosum Weis (Fil.-fœm.) = Nephrod. spinul.
spinulosum Muell. = Nephrod. spinul.
tanacetifolium Hoffm. = Nephrod. dilatatum
tenue Hoffm. = Cystopt. — angustata
Thelypteris L. = Nephrod. Thel.
triangulare Hausm. = acutum
vulgare L. 5 (1), A 1, 201
POLYPOGON I 61 (70)
acutiflorus Guss. A 16 (2 α b)
adscendens Guss. = litoralis
crinitus Nutt. = monspeliens.
elongatus Lag. = litoralis
fasciculatus Pers. = Chæturus fasc.
intermedius Guss. A 16 (1 b)
Lagascæ R. et S. = litoralis
litoralis Sm. 61, A 16 (1 bis)
lobatus Posp. (litoral.) A 16 (1 bis β)
maritimus W. 61 (2), A 16
monspeliensis Desf. 61 (1), A 16
monspel. β Bert. = litoralis
monsp. × Agrostis verticill. Duv.-Jouve = litoralis
paniceus Lag. = monspeliens.
polysetus Steud. = monspel.
pumilus Clarke = maritim.
subspathaceus Req. 61 (2 β)
subspicatus W. = Chæturus fasciculat.
tatarious Fisch. = maritim.
POLYSTICHUM = Nephrodium
aculeatum Roth = Aspid. lobatum
australe Trevis. (rigid.) = N. pallidum
Bertolonii Trevis. (rigid.) = N. — Bertol.
Borreri Trevis. (Fil.-mas.) = N. — paleaceum
crenatum Trevis. (Fil.-mas) = N. — cren.
cristatum Roth = N. crist.
deltoideum Trevis. (dilatat.) = N. dilatatum (a)
dilatatum DC. = N. dilat.
distans Trevis. = N. distans
Dryopteris Roth = Polyp. Dryopt.
durum Schur = N. Fil.-mas
Filix-mas Roth = N. Fil.-mas
glandulosum Trevis. (Fil.-mas) = N. -- gland.
heterolobum Trevis. (Fil.-mas) = N. — heterolob.

Digitized by Google

POLYSTICHUM = Nephrodium
Hypodematium Trevis. (rigid.) = N. — Hypod.
induratum Schur = N. Fil.-mas
Lonchitis Roth = Aspid. Lonch.
Marantæ Roth = Woodsia ilvensis (α)
montanum Roth = N. Oreopt.
multiflorum Roth = N. dilatatum
oblongum Trevis. (dilatat.) = N. — oblong.
Oreopteris DC. = N. Oreopt.
pallidum Tod. = N. pallidum
Phegopteris Roth = Polyp. Pheg.
Plukenetii Duby = Aspid. Plukenetii
pseudo-cristatum Schur. = N. spinulosum
rigidum DC. = N. rigid.
Rostani Trevis. (Fil.-mas) = N. — Rostani
rupicolum Schur (Fil.-mas) = N. — subintegrum
spinosum Roth = N. spinul.
spinulosum DC. = N. spinul.
strigosum Roth = N. rigidum
Thelypteris Roth = N. Thel.
PONTIA = Chrysanthemum
Bauhini Bub. = Ch. coronopifolium
PONTINIA = Lychnis
Cœli-rosa Fr. = L. Cœli-rosa
POPULAGO = Caltha
palustris Scop. = C. palustr.
POPULUS I 262 (249)
alba L. 262 (4), A 58
albo × tremula Krause, Wimm. 262, A 58
albo-australis Bolle = albo × tremula
australis Ten. A 57 (3 b)
belgica Hort. = albo × tremula
Brachofenii Wierzb. = albo × tremula
canadensis Michx. = monilifera
canescens Sm. = albo × tremula
caudina Ten. A 57 (1 γ b)
croatica Kit. = neapolitana
denudata A. Br. A 58 (×)
dilatata Ait. = italica
excelsa Salisb. = alba
fastigiata Desf. = italica
flexibilis Roz. = italica
hybrida M. B. = albo × tremula
italica Duroi A 57 (1 β)
leucophylla Schur = albo × tremula
levigata Ait. = monilifera
lobata Parl. (*canescens*) A 210
major Mill. = alba
marylandica Bosc. = monilifera
monilifera Ait. 262 (2)
neapolitana Ten. A 57 (1 γ)
nigra L. 262 (1), A 57
nivea W. A 58 (4 β)
pannonica Kit. = neapolitana
parvifolia Goir. (*tremula*) A 58 (3 c)
POPULUS I 262 (249)
pubescens Parl. (*nigra*) 262 (1 α b)
pyramidalis Roz., Salisb. 262 (1 β) = italica, cfr. A 57
pyramidata Mœnch = italica
repanda Baumg. = nigra
tremula L. 262 (3), A 57
versicolor Salisb. = nigra
virginiana Dum. (non Foug.) = monilifera
PORCELLITES = Hypochæris
cretensis Cass. = H. — oxyodonta
helvetica Cass. = H. uniflora
maculata Cass. = H. mac.
radicata Cass. = H. radic.
PORRUM = Allium
Ampeloprasum Rchb. = A. Ampel.
arenarium Rchb. = A. vineale
Ascalonicum Rchb. = A. Ascal.
Cepa Rchb. = A. Cepa
commune Rchb. = A. Porrum
crinitum Rchb. = A. arvense
descendens Rchb. = A. descend.
oleraceum Mœnch = A. oler.
Ophioscorodon Rchb. = A. Ophiosc.
paniculatum Mœnch = A. pan.
rotundum Rchb. = A. rotund.
sativum Mill. = A. Porrum
sativum Rchb. = A sativ.
Scorodoprasum Rchb. = A. Scorod.
sphærocephalum Rchb. = A. sphær.
strictum Rchb. = A. strict.
vineale Rchb. = A. vin.
PORTENSCHLAGIA = Seseli
ramosissima Vis. = S. ramosiss.
PORTULA = Peplis
diffusa Mœnch = P. Port.
nummulariæfolia Fourr. = P. erecta
palustris S. F. Gray = P. Portula
PORTULACA I 328 (312)
aurea Hort. = sativa
dichotoma Gueld. = oleracea
grandiflora Hook. 329 (2)
hortensis Rupr. = sativa
latifolia Horn. = sativa
levis Buch.-Ham. = oleracea
maritima Gmel. = oleracea
officinarum Crantz = oleracea
oleracea L. 328 (1)
olitoria Pall. = oleracea
parvifolia Haw. = oleracea
repens Nor. = oleracea
sativa Haw. 328 (1 β)
silvestris DC. (olerac.) = oleracea (α)
silvestris Montand. = prec.
suffruticosa Thwait. = oleracea
viridis Hort. = sativa
POSIDONIA I 156 (160)
Caulini Kœnig = oceanica
oceanica Del. 156
POTAMOGETON I 152 (156)
acuminata Schum 154 (6 α b)
acuta Schlech. (compressa) = mucronata
POTAMOGETON I 152 (156)
acutifolia Lk. 153 (3), A 40
acutifolia Presl = mucronata
alpina Balb. 154 (6 β), A 40
angustata M. et K. (natans) = fluitans
angustifolia DC. (oppositif.) = setacea
angustif. M. et K. (densa) = setacea
angustifol. Meyer (natans) = prolixa
annulata Bell. = alpina
augustana Balb. = graminea
Berchtoldi Fieb. 153 (2 α d)
caudata Seidl = acuminata
colorata Horn. 154 (5 δ), A 40
compressa DC. et Auct. it. (non L.) = acutifolia
compressa Sm. etc. = mucronata
condylocarpa Tausch = tuberculata
cordato-lanceolata M. et K. (*perfol.*) A 40 (8 c)
corniculata Meyer (lucens) = acuminata
corniculata Schur = prec.
cornuta Presl = acuminata
crispa L. 154 (7)
densa L. 154 (9), A 205
dichotoma Wallr. (pectinata) = interrupta
dimidia Crép. (compressa) = mucronata
distachya Bell. = graminea
diversifolia M. et K. (lucens) = acuminata
drupacea O. F. Lang A 39 (1 α c)
elliptica Gaud. (natans) = prolixa
explanata M. et K. (natans) = prolixa et fluitans
fasciculata Wolfg. = marina
filiformis Pers., Nolte = marina
flabellata Bab. = interrupta?
fluitans Roth 154 (5 β)
fluitans Sm. = semipellucida
fluviatilis Fr. (natans) = prolixa
fluviatilis Schlech. (natans) = fluitans
Friesii Rupr. = mucronata
gemmifera Rchb. (*crispa*) 154 (7 c)
graminea L. 153 (4)
graminea Savi = pusilla
Grisebachii Heuff. = pusilla
Helodes Dum. A 40 (5 δ c)
heterophylla Schreb. = graminea
Hornemanni Koch = colorata
Hornemanni Meyer = polygonifolia
hybrida Petagna 153 (4 b)
interrupta Kit. A 39 (1 α b)
juncifolia Kern. = interrupta
lanceolata Meyer (rufesc.) = alpina
lancifolia M. et K. (densa) = serrata

Digitized by Google

POTAMOGETON I 152 (156)
lancifolia Vis. (perfol.) = cordato-lanceol.
laticaulis Whlnb. p. p. = acutifolia
latifolia Meyer (pectin.) = interrupta
latifolia Meyer (pusilla) = mucronata
laxifolia Gr. et Godr. (densa) = serrata
longepedunculata Mérat = graminea
lucens L. 154 (6), A 40
macrophylla Wallr. (lucens) = acuminata
major Fr. (pusilla) = mucronata
major Koch et Ziz (natans) = prolixa
major Meyer (densa) = serrata
major Morong = mucronata
marina Huds. = pectinata
marina L. 152 (1 β)
monogyna Gay = trichoides
mucronata Schrad. A 39 (2 bis)
natans L. 153 (5), A 40
nervigera Wolfg. = semipellucida
oblonga Viv. = polygonifol.
Œderi G. Mey. = mucronata
ovato-lanceolata Rchb. (perfol.) = cordato-lanc.
obscura DC. = alpina
obtusa Du Croz. = alpina
oppositifolia DC. = serrata
pachystachya Rchb. (*colorata*) A 40 (5 δ d)
palustris M. et K. (rufesc.) = alpina
panormitana Biv. = pusilla
pectinata L. 152 (1), A 39
perfoliata L. 154 (8), A 40
petiolaris Presl 153 (5 α b)
petiolata Wolfg. = fluitans
planifolia Meyer (crispa) = serrulata
plantaginea Du Croz. = colorata
polygonifolia Pourr. 154 (5 γ), A 40
prolixa Koch (*natans*) A 40 (5 α c)
Protea Cham. et Schl. = graminea et lucens
purpurascens Seidl in Presl = semipellucida
pusilla L. 153 (2), A 39
rigida Opiz (densa) = densa (α a)
rotundifolia Sonder (*perfol.*) A 40 (8 b)
rufescens Schrad. = semipellucida
rutila Richter (non Wolfg.) = mucronata
scoparia Wallr. (*pectinata*) A 39 (1 α a)
semipellucida Koch et Ziz 154 (6 β b), A 40
serotina Schrad. = prolixa
serrata Huds. = crispa
serrata L. 155 (9 β)
serrata Roth = alpina
POTAMOGETON I 152 (156)
serrulata Schrad. in Opiz 154 (7 b)
setacea L. 155 (9 β b)
setacea Meyer (pectin.) = scoparia
setacea Schum = marina
sicula Tin. 154 (5 δ b)
sinuata Fr. (crispa) = serrulata
spathulata Nolte (non Schrad.) = prolixa
stipulata Arc. (*densa*) 155 (9 α b), A 205
subflava Lorr. et Barr. = sicula
submarina Fr. (pectin.) = scoparia
tenuis Meyer (pectin.) = scoparia
tenuissima M. et K. (*pusilla*) 153 (2 α c)
trichoides Cham. et Schl. 153 (2 β), A 39
trichoides Schur = tenuissima
tuberculata Ten. et Guss. 153 (2 β b)
Vaillantii R. et S. = interrupta
variifolia Thor. = graminea
vulgaris Fr. (*pusilla*) 153 (2 α b)
zosteræfolia Bert. (non Schum.) = acutifolia
POTENTILLA I 566 (460)
acutifolia Gilib. = recta (a)
adscendens Baumg. = heptaphylla
adscendens Budd. (*reptans*) A 213 (13 α for.)
adscendens Gremli = reptans × erecta
adscendens W. et K. = hirto × argent.
æstiva Hall. f. (*verna*) A 119 (19 α for.)
æstiva Zimm. = prec.
ætnea Torn. = calabra
agrimonioides Ces. P. et G. (multifida) = sanguisorbifolia
agrivaga Timb. = hirsuta
alba L. 567 (2), A 117
albescens Opiz = hirsuta?
albicans Moggr. (subacaul.) = incana
albiflora Saut., Goir. (*nitida*) A 117 (4 e)
alchemilloides W. p. p. (non Lap.) = Nestleriana
alpestris Hall. f. = salisburg.
alpestr. × aurea Siegfr. = salisb. × aur.
alpestr. × Gaudini Wolf = salisb. × Gaud.
alpestr. × grandifl. Brügg. = grandifl. × salisb.
alpestr. × minima Brügg. = min. × salisb.
alpicola De la Soie A 121 (×)
alpina Ser. (Tormentilla) = divergens?
alpina Turcz. (nivea) = nivea
alpina Wk. (aurea) 572 (18 b) = aur. b. minor, cfr. A 119
POTENTILLA I 566 (460)
alpina Zimm., Dalla Torre = aurea b. minor
ambigua Gaud. (argentea) = frigida × multif.
amthoris Huter = minimo × salisb.
anadena Burn. et Briq. (*caulesc.*) A 117 (10 α)
angustifolia DC. 573 (21 α c)
anserina L. 572 (24), A 121
apennina Ten. 568 (5), A 117
arenaria Borkh. = incana
argentata Jord. A 120 (23 α for.)
argentea L. 574 (23), A 120
argent. × hirta Asch. et Græbn. = hirto × argent.
argent. × hirta Fiori 575
argent. × Johanniniana Wolf = Goirani
argent. × læta Siegfr. = hirto × argent.
argent. × recta Focke = hirto × argent.
argent. × sordida? Asch. et Græbn. = Goirani
argent. × verna Focke 574, A 120
argent. × Wiemanniana Wolf A 120
argentea Neilr. (anser.) = sericea
Argentina Huds. = anserina (a)
aurea L. 572 (18), A 119, 213
aur. × alpestris Siegfr. = aur. × salisb.
aur. × dubia Zimm. = minimo × aur.
aur. × maculata Brügg. = aurea
aur. × minima Brügg. = min. × aur.
aur. × salisburg. Rouy et Cam. A 119
aurea Caruel (hirta) = hirta (α)
aurigena Kern. = salisburg. × Gaudini
australis Jord. = angustifolia
australis Krasan 572 (19 δ b)
autumnalis Opiz = æstiva, incano × verna
baldensis Kern. 572 (19 ε b)
baldens. × cinerea Zimm. A 118
Bauhini Hort. = Nestleriana
bellunensis Huter et Porta = baldens. × ciner.
benacensis Zimm. A 119 (19 γ for.)
Beniczkyi Friv. A 121 (26 d)
bicolor Schur (anser.) = anserina (a)
Bocconi Nestl. = apennina
bolzanensiformis Saut. = argent. × verna
bolzanensis Zimm. A 119 (19 γ for.)
bolzan. × glandulifera Gelmi A 119
bondonis Evers = Gaudini
bordalensis Evers (*trident.*) A 119 (19 ε)

Digitized by Google

POTENTILLA I 566 (460)
bormiensis Cornaz hb. = bolzanensis
Brauniana Hpe. = minima
breunia Huter 571 (nota) = niveo × salisburg.
breviscapa Vest. = micrantha
bruginœnsis Evers = Gaudini
brutia Ten. hb. = argentea
calabra Ten. 574 (23 β), A 120
camonia Rota 573 (20 γ)
campestris Wallr. (verna) = verna (α)
cana Jord. A 121 (×)
canescens Bess. = hirto × argent.
cardiopetala Bess. = laciniosa
carstiensis Siegfr. (villosa) = baldensis
caufedinensis Evers (*trident.*) A 119 (19 ε for.)
caulescens L. 569 (10), A 117
caulescens Jacq., Scop. = Clusiana
caulescens Mœnch = alba
caulescens Presl, Guss. = nebrodensis
Charpentieri Brügg. = frig. × multifida
chrysantha Caruel = heptaphylla
chrysantha Ces. P. et G. (an Trev.?) = camonia
chrysantha Rchb. = thuringiaca
chrysopetala Bess. = angustifolia
cinerea Bég. (*De-Tomm.*) A 120 (22 b)
cinerea Chaix 571 (17 β)
cinerea Gaud. = Gaudinii
cinerea Raf. in Lehm. = incanescens
cinereo-sericea Schmid. (*grandifl.*) A 118 (16 for.)
Clusiana Geners. = alba
Clusiana Jacq. 568 (6)
collina Wib. = argent. × verna
Comarum Nestl. = palustris
concolor Burn. (valderia) = valderia (a)
concolor Strobl (*calabra*) A 120 (23 β b)
concolor Wallr. (anserina) = anser. c. sericea
concolor Zimm. = prec.
confinis Jord 574 (23 α e)
cordata Schrank = alba
Cornazi Buser A 120 (23 α for.)
corsica Fouc. et Sim. (*mixta*) A 118
corsica Soleir. 576 (26 c)
corymbosa Mœnch = obscura
Crantzii Beck = salisburgens.
crassinervia Viv. 568 (7), A 117
crocea Hall. f. = salisburgens.
crocea Koch (verna) = æstiva
dacica Zimm. = divergens
daonensis Evers A 118 (12 α for.)
debilis Schleich. = salisburg. (for.)
decipiens Jord. A 120 (×)

POTENTILLA I 566 (460)
decumbens Jord. A 120 (23 α for.)
demissa Jord. 574 (23 α c)
depressa W. = opaca, thuringiaca
De-Tommasii Ten. 574 (22), A 120
De-Tommasii N. Terr. = calabra
dichotoma Mœnch = norvegica
discolor Burn. (*valderia*) 569 (9 b)
discolor Strobl (*calabra*) A 120 (23 β a)
discolor Wallr. (anser.) = anserina (a)
dissecta Wallr., Ser. (*argent.*) 574 (23 α d), A 120
dissecta Zimm. = prec.
divaricata DC. 574 (21 β d)
divergens Nym. A 118 (12 α for.)
diversifolia Ser., Lehm. (*hirta*) A 120 (21 α for.)
dubia Mœnch = opaca
dubia Sut. = salisburgensis
dubia Zimm., G. Beck = minima
dubio × aurea Asch. et Græbn. = min. × aur.
dubio × villosa Asch. et Græbn. = min. × salisb.
dubiosa Evers = Gaudini
dumetorum Evers (*trident.*) A 119 (19 ε)
edentata Ser. (*nitida*) A 117 (4 c)
Elisæ Goir. hb. = bolz. var. micrantha
engadinensis Brügg. = stricticaulis
erecta Hampe 569 (12), A 118, 213
erecta × reptans Murb. = rept. × erecta
filiformis Vill. = salisburgens.
firma Gaud. (aurea) = sabauda
fissidens Borb. (canescens) = laciniosa
fissidens Zimm. = prec.
Fragaria Poir. = sterilis (α)
fragariæfolia Gmel. = prec.
fragariæfolia Hpe. = norvegica
fragarioides Poir. = rupestris
fragarioides Vill. (non L.) = sterilis (α)
Fragariastrum Ehrh. 567 (1 α)
Fragariastr. Guss. = micrantha
frigida Vill. 573 (19 ζ), A 119
frigido × grandifl. Zimm. = grandifl. × frig.
frigido × multifida Brügg. A 120
frigido × nivea Gremli A 120
fruticosa L. 576 (27)
galiciana Schult. = procumbens
gallica Siegfr. = grandiflora
gardæ Evers A 119
Gaudini Gremli 572 (19 γ), A 119
Gaudini × longifrons R. Kell. A 119

POTENTILLA I 566 (460)
Gaudini × villosa Jacc. = salisb. × Gaudini
Gelmiana Gelmi = seg.
Gelmiana Siegfr. (verna) = bolzan. × glandulif.
geminiflora Schrank = norvegica
geranioides Schleich. = aurea
geranioides Thom. = frig. × multif.
Gibelliana Siegfr. = argent. × verna
glabra Méline (non Koch) (reptans) = seg.
glabrata Rouy et Cam. (*reptans*) A 118 (13 α for.)
glabrata Sond. (anserina) = anser. b nuda
glabriuscula Sal.-Marschl. (*crassinervia*) A 117 (7 b)
glacialis Hall. f. = frigida
glacialis Pourr. = nivalis
glandulifera Krasan 572 (19 α b), A 119
glandul. × Gaudini R. Kell. A 119
glauca Moris = crassinervia
glauca Mutel (*crassinervia*) A 117 (7 c)
glaucescens W. p. p. = crassinervia
Goirani Zimm. A 120 (×)
grac lior Fiori (*salisb.*) A 119 (19 ε for.)
gracilior Focke (villosa) = prec.
gracilior Koch (alpestr.) = prec.
graja Beyer = verna (α)
grammopetala Moretti 568 (8), A 117
grandiceps Zimm. 574 (23 α f)
grandiflora L. 571 (16)
grandifl. × frigida Siegfr. A 118
grandifl. × salisburg. Siegfr. A 118
grandifl. × villosa Asch. et Græbn. = grandifl. × salisb.
grandiflora Blocki (Wiemann.) = thyrsiflora
grandifl. Heuff. (rupestr.) = Beniczkyi
grandifl. Wolf (alpestr.) = macropetala
grandiflora Wolf (bolzan.) = macrantha
grayana Wilcz. et Siegfr. = niveo × salisb.
Gremlii Zimm. = reptans × erecta
grisancensis Beyer (*Gaudini*) A 119 (19 γ for.)
grossa Dougl. = norvegica
Guentheri Pohl = argent. × verna
Gunneri Hartm. = sterilis
hæmatosticta Goir. 572 (19 α d)
Halleri Ser. = aurea
Halleriana Tratt. = Nestleriana
Hausmanni Uechtr. A 120 (×)
Hellwegeri Murr. = baldensis
helvetica Schleich. = frigida
haptaphylla Celak. = thuringiaca

Digitized by Google

POTENTILLA I 566 (460)
heptaphylla Mill. ?, Lehm. 573 (20), A 120
heptaph. × alpestris Brügg. = strictocaulis
Herminii Ficalho (Tormentilla) = seg.
Herminii Fiori (*erecta*) A 213 (12 var.)
hirsuta DC. (*verna*) 572 (19 β)
hirsuta Vis. (verna) = australis
hirta All. = pedata
hirta Hænke = hirto × argent.
hirta Lap., Rchb. = angustifolia
hirta L. 573 (21), A 120
hirto × argentea Fiori 575, A 121
holosericea Gaud. (anserina) = anser. c. sericea
humilis Ten. (canescens) = hirto × argent.
hungarica W. = hirto × argent.
Huteri Siegfr. = aur. × salisburg.
Huteri Porta = petiolulosa
inaperta Jord. = decipiens
incana G. M. et S. 571 (17 α)
incano × verna Asch. A 119
incanescens Opiz 574 (23 α b)
inclinata Vill. = hirto × argent.
incrassata Zimm. = argent. × hirta
indica Asch. et Græbn. = Fragaria ind.
impolita Whlnb. = incanescens
inquinans Turcz. = rupestris
intermedia Nestl. = Nestleriana
intermedia Roth (non L.) = recta (a)
intricata Gremli, Zimm. = verna (α)
italica Lehm. 570 (18 β)
Jæggiana Siegfr. = verna × argentea
Johanniniana Goir. 575, A 120 (×)
Kerneri Borb. = hirto × argentea
Kerneri Huter et Porta = baldens. × ciner.
Kristoflana Zimm. A 117 (10 α b)
laciniosa W. et K. 574 (21 β e)
læta Rchb. 573 (21 α d), A 120
Lamottei Siegfr. = hirto × argent.
lanata Lam. = nivalis
lanata Lge. (*reptans*) A 118 (18 α for.)
lanata Zimm. = prec.
laresciæ R. Kell. A 119
laria R. Beyer (caulesc.) = Kristofiana
latifolia Rouy et Cam. (aurea) A 119 (18 c) = seg.
latiloba Fiori (*aurea*) A 213 (18 c)
latiloba Ser. (Halleri) = prec.
laxa W. p. p. = opaca
laxiflora F. Schultz (collina) = Schultzii
leucantha Güldenst. = rupestris ?
leucotricha Borb. = hirta (α), obscura
ligurica Siegfr. = seg.
ligustica Siegfr. em. 574, A 120 (21 α for.)
longifol. Borb. (verna) = Gaudini for. longif.
longifolia Th. Wolf (*verna*) 572, A 119 (19 α c)
longifolia Zimm. A 119 (19 γ for.)
longifrons Borb. = Gaudini for. longifol.
longifrons Focke (verna) = verna for. longifol.
longifrons Pœverl. = verna α c. longifol.
loppiensis Evers = Gaudini
lupinoides W. = nivalis
luxurians Goir. (*alba*) A 117 (2 c)
macrantha Saut. (*bolzan.*) A 119 (19 γ)
macropetala Fiori (*salisb.*) A 119 (19 ε for.)
macropet. Saut. (villosa) = prec.
maculata Pourr. = salisburgens.
magyarica Borb. = argentea (for.)
Mandonii Fouc. A 118, 213 (12 β b)
mezzocoronæ Evers = bolz. var. macrantha
micrantha Ram. 567 (1 β)
micrantha Saut. (*bolzan.*) A 119 (19 γ)
micropetala Rchb. (non Don) = thuringiaca
microphylla Tratt. (*reptans*) A 118 (18 α for.)
microphylla Zimm. = prec.
millegrana Dougl. = norvegica
minima Hall. f. 573 (19 η)
min. × aurea Siegfr. in L. Vacc. A 120
min. × salisburg. Siegfr. in L. Vacc. A 120
minor Gilib. = verna (α)
minor Goir. (*erecta*) A 118 (12 α c)
minor Lehm. (*aurea*) A 119 (18 b)
minor Sauter (Torment.) = erecta for. minor
minor Ser. (Halleri) = aurea b. minor
minor Ser. (reptans) = microphylla
minor Venetz (*grandifl.*) A 118 (16 for.)
minuta Ser. p. p. (argent.) = demissa
minuta Zimm. p. p = prec.
mixta Michalet = reptans × erecta
mixta Nolte A 118
monspeliensis L. = norvegica (var.)
monticola Zimm. = Gaudini
multidentata Ser. (*nitida*) A 117 (4 b)
multifida L. 576 (28), A 121
mutinensis Siegfr. = verno × argent.
nana Caruel (verna) = frigida, minima
nebrodensis Strobl A 118 (10 γ)
neglecta Baumg. = incanescens
nemoralis Lehm. = reptans × erecta
nemoralis Nestl. = procumbens, reptans × erecta
nemoralis Salis = Salisii
Nestleri Fr. = seg.
Nestleriana Tratt. 573 (20 α), A 120
Neumanniana Wimm. (non Rchb.) = incano × verna
nitida Jacq. = multidentata
nitida L. 568 (4), A 117
nitida Scop. = alba
nitida Ten., Beck = apennina
nivalis Lap. A 118 (10 var.)
nivea L. 571 (15)
niveo × alpestris Th. Wolf = niv. × salisb.
niveo × frigida Asch. et Græbn. = frig. × niv.
niveo × salisburg. Wilcz. et Siegfr. A 118
niveo × verna Fiori 571 (nota) = niv. × salisb.
niveo × villosa Asch. et Græbn. = niv. × salisb.
Noarnæ Evers = Gaudini
norvegica All. = frigida
norvegica L. 570 (14)
nuda Gaud. (*anserina*) A 121 (24 b)
obovata Th. Wolf (*alba*) A 117 (2 b)
obscura W.?, Nestl. 574 (21 β b), A 120
ochroleuca Ces. P. et G. (*hirta*) 573 (21 α b)
œnipontana Murr. = bolzanens.
opaca L. p. p., Auct. = hirsuta
opaca L. p. p., Koch 572 (19 δ)
opaco × dubia Beck = opac. × Gaudini
opaco × Gaudini Wolf A 119
opacata Jord. 572 (19 β b)
ophiolithica Levier (*læta*) A 120 (21 α d subf.)
ossulana Siegfr. hb. = bolzanensis
pallens Mœnch = recta (a)
pallida Lag. 574 (21 β a)
pallido × læta Siegfr. = ligustica
palustris Scop. 576 (30)
Pari Evers = Gaudini
parva Friv. = læta ?
parviflora Gaud. A 120 (20 α for.)
parviflora Wolf (bolzan.) = bolzan. var. micrantha

Digitized by Google

POTENTILLA I 566 (460)
patula Gib. et Pir. (non W. et K.) = hirta
pedata W. 574 (21 α)
pedato × argent. Zimm. = hirto × argent.
pedato × Thomasii Chiov. A 120
pedemontana Reut. 571 (16 b)
pennina Gremli = frig. × multif.
pensilvanica L. 576 (29), A 121
pensilvanica Rchb. = sanguisorbifol.
pentaphylla Richter = pilosa
perincisa Borb. (*argent.*) A 120 (23 α for.)
perincisa Zimm. = prec.
petiolulata Gaud. = petiolulosa
petiolulosa Guss. (caulesc.) = nebrodensis
petiolulosa Ser. (*caulesc.*) 569, A 117 (10 β)
Petryana Blocki = decipiens
pilosa DC. = pedata
pilosa Döll (verna) = verna (α a)
pilosa Lojac. = De-Tommasii
pilosa Nocc. et Balb. = læta
pilosa Vill. = hirta (α)
pilosa W. 574 (21 β c)
pilosissima Ser. (verna) = hirsuta
pinnatifida Griseb. (*hirta*) A 120 (21 α for.)
pinnatifida Presl 570 (13 α b)
pollinensis N. Terr. (nemoral.) = italica ?
polymorpha Spenn. = verna
Ponale Evers = Gaudini
pontica C. Koch = thuringiaca ?
porphyracea Saut. = argent. × verna
procumbens Caruel = italica, reptans × erecta
procumbens Clairv. = Sibbaldi
procumbens Sibth. 570 (12 β), A 118, 213
prostrata Hænke = supina
prostrata Mœnch = sterilis (α)
pseudo-argentea Blocki A 120 (23 α for.)
pseudo-canescens Blocki = argenteo × recta
pulchella Brügg. = minimo × aurea
pusilla Favr. (erecta) = erecta b. minor
pygmæa Duby (*rupestr.*) 575 (26 b)
pyrenaica Hall. f. (non Ram.) = salisburgens.
pygmæa Jord. = prec.
recta L. 574 (21 β), A 120
recta Pensig (reptans) = rept. f. adscendens
reducta Goir. (*nitida*) A 117 (4 d)
reducta Rouy et Cam. A 118 (12 α for.)
reducta Vidal (*alba*) A 117 (2 d)
POTENTILLA I 566 (460)
reptans L. 570 (13), A 118, 213
rept. × erecta Zimm. 570, A 118
rept. × Tormentilla Focke = prec.
rhætica Brügg. = grandifl. × salisb.
Rivæ Evers = Gaudini
Rœmeri Friv. = Beniczkyi
Ronchi Evers = Gaudini
rotundifolia Vill. = salisburg.
rubens All. = hirta (α)
rubens Mœnch = rupestris
rubens Ser. p. p. (hirta) = pilosa
rubens Zimm. = opaca
rubens × Gaudini Asch. et Græbn. = opaco × Gaud.
rubescens Rouy et Cam. (rupestr.) = rupestris (for.)
rubra Hall. f. = palustris
rupestris L. 576 (26), A 121
rupicola Wender. = rupestris
sabauda Vill. 573 (19 ε c)
Sadleri Rchb. A 121 (×)
salassorum Beyer (*verna*) A 119 (19 α for.)
salisburgensis Hænk. 573 (19 ε), A 119
salisb. × aurea Siegfr. in L. Vacc. A 119
salisb. × Gaudini Fiori A 120
salisb. × minima Chenev. = min. × salisb.
Salisii Bor. A 118 (12 β b)
sanguisorbifolia Favre 576 (29 β), A 121
Sauteri Zimm. = argentea (α)
saxicola Rouy et Cam. (corsica) = corsica
saxifraga Ard. 568 (3)
Schrœteri Siegfr. = salisb. × Gaudini
Schultzii P. J. Müll. A 120 (×)
Schultzii × benacensis Siegfr. = verno × argent.
sciaphila Zimm. A 118 (12 α for.)
semiternata Huter et Porta = min. × aurea
septemsecta Mey. (*argent.*) A 120 (23 α for.)
septemsecta Zimm. = prec.
septenata Bouvier (*verna*) A 119 (19 α for.)
septenata Lehm. (argent.) = septemsecta
sericea Bréb. (*reptans*) A 118 (13 α for.)
sericea Hayne (*anserina*) A 121 (24 c)
sericea Zimm. (non L.) = prec.
serotina Vill. = verna (α)
Sibbaldiana Lehm. = seg.
Sibbaldii Hall. f. 569 (11), A 118
silvestris Neck. = erecta (α)
silvestris Ren. = procumbens
silvestris × reptans Asch. et Græbn. = rept. × erecta
stenantha Lehm. = Agrimonia agrimon.
POTENTILLA I 566 (460)
sterilis Garcke 567 (1)
stipularis Lap. (non L.) = nivalis
stricticaulis Gremli 573 (19 ε d)
strictissima Zimm. 570 (12 α b)
subacaulis L. 571 (17)
subacaulis Scop. = nitida
subacaulis Wulf., Vis. = Tommasiniana
subarenaria Borb. = incano × verna
subcinerea Borb. = incano × verna
suberecta Beckh. (reptans) = rept. f. adscendens
subnivalis Brügg. = min. × aurea
subopaca Zimm. A 119 (19 α for.)
subsericea Wolf (alpestris) = Verloti
subternata Brügg. = minimo × salisb.
sulfurea Caruel (hirta) = recta
sulphurea DC. = recta (a)
superlongifrons R. Kell. (×) A 119
supina L. 575 (25), A 121
Tabernæmontani Asch. 572 (19 α), A 119
Tabern. × arenaria Asch. et Græbn. = incano × verna
tenuiloba Jord. A 120 (23 α for.)
terglovensis Hacq. = nitida
tetrapetala Hall. f. = erecta
thuringiaca Bernh. 573 (20 β)
thyrsiflora Hüllsen A 121 (×)
tiroliensis Zimm. 572 (19 γ b)
tomentosa Gilib. = argentea
tomentosa Ten. = hirto × argent. ?
Tommasiniana F. Schultz 571 (17 β b)
Tormentilla Neck. = erecta
Torment.-erecta Scop. = prec.
tormentilloides Mayer = procumbens
Trefferi Siegfr. = salisburg. × aurea
tridentina Gelmi A 119 (19 ε for.)
trident. × glandulifera Gelmi A 120
trifoliata Beck = Tommasiniana
trifoliata Gilib. = norvegica
trifoliata Kitt. (verna) = Tommasiniana
trifoliata Koch p. p. (cinerea) = prec.
triphylla Tratt. (Clusiana) = Clusiana
unicolor Schur (anser.) = sericea
valderia L. 569 (9)
valderia Vill. = nivalis
vallesiaca E. Huet = grandifl. × frigida
vasonis Evers = trident. × glandul.
varia Wender. = verna

Digitized by Google

POTENTILLA I 566 (460)
velutina Lehm. = incana
venariensis Re = hirta
Verloti Jord. A 119 (19 ε for.)
verna L. 572 (19), A 119
verno × arenaria Wolf = incano × verna
verno × argentea Fiori 575
verno × cinerea Zimm. = incano × verna
villosa Lec. et Lam. (rupestr.) = Beniczkyi
villosa Zimm. (non Pall.) = salisburg.
vill. × arenaria Asch. et Græbn. = baldens. × ciner.
vill. × aurea Asch. et Græbn. = aur. × salisburg.
vill. × aurea Siegfr. = salisb. × aur.
vill. × dubia Zimm. = minimo × salisb.
vill. × Gaudini Asch. et Græbn. = salisb. × Gaud.
vill. × grandifl. Zimm. = grandifl. × salisb.
viminea Schrad. = hirto × argent.
vindobonensis Zimm. = bolzanens.
virens Ugolini (*alba*) A 117 (2 e)
virescens Wolf (Gaudini) = bolzanens.
viridis Fritsch p. p. = Gaudini
viridis Koch (anserina) = nuda
viridis Neilr. (verna) = Gaudini
viridis Zimm. = nuda
viscida Evers 572 (19 γ c)
viscida Gelmi (caulesc.) = seg.
viscosa Huter (*caulesc.*) 569, A 117 (10 β b)
viscosa Rouy et Cam. (crassinervia) = glauca
viscosissima Moris = caulescens
Wiemanniana Guenth. et Sch. = argent. × verna
Wolfii Siegfr. = frigido × nivea
POTERIUM I 585 (465)
agrimonifolium Lk. = verrucos.
canadense A. Gray 586 (3 oss.)
dictyocarpum Spach 586 (2 α a)
dodecandrum B. et H. 586 (3)
eriocarpum Spach = garganicum
garganicum Ten. 586 (2 β d)
glaucescens Rchb. 586 (2 α b)
glaucum Spach (dictyocarpum) = glaucescens
guestphalicum Bönningh. = glaucesc.
Magnolii Spach 586 (2 β b)
mauritanicum β Boiss. = verrucos.
megacarpon Lowe = verrucos.
microcarpum Jord. 586 (2 α d)
montanum Fiori (*offic.*) 586 (4 b)
muricatum Spach 586 (2 β a)
officinale A. Gray 586 (4)
polygamum W. et K. 586 (2 β)
POTERIUM I 585 (465)
puberulum DC. (*Sanguis.*) 586 (2 α c)
rupicolum Boiss. et Reut. 586 (2 γ)
sabaudum Fiori (*offic.*) 586 (4 c)
Sanguisorba L. 586 (2)
spinosum L. 585 (1)
verrucosum Ehrenb. 586 (2 β c)
PRANGOS II 206 (605)
angustifolia Nym = Colladonia angustif.
cylindracea DC. 206 (b)
ferulacea Lindl. 206
PRASIUM III 15 (779)
creticum Rchb. = majus
lætum Salisb. = majus
liparitanum Mandr. (*majus*) 15 (b)
majus L. 15
microphyllum Nic. (*majus*) 15 (c)
minus L. = majus
PRENANTHES III 419 (948)
amplexicaulis Mill. = purpurea
angustifolia Koch (purp.) = tenuifol.
bulbosa DC. = Crepis bulb.
chondrilloides Ard., L. = Chondrilla prenanthoid.
erysimifolia W. = Lactuca muralis
hieraciifolia W. = Crepis pulcra
multiflosculosa Nees = seg.
muralis L. = Lactuca mur.
Negretii Req. = Crepis leontodontoides
paniculata Mœnch = Crepis pulcra
parviflora Gilib. = Lactuca mural.
pulcra DC. = Crepis pulcra
purpurea L. 419, A 193
ramosissima All. = Lactuca ramosiss.
tenuifolia L. 419 (β)
viminea L. = Lactuca vim.
vimin. β Ten. = Lactuca — latifolia
viscosa Baumg. = Crepis pulcra
vulgaris Gueld. = Lactuca mural.
PREONANTHUS = Anemone
alpinus Schur = A. alpina
sulfureus Fourr. = A. sulfurea
PRESLIA
cervina Fresen. III 83 (nota)
PRIMULA II 308 (675)
acaulis Ahlqv. (farin.) = pygmæa Gaud.
acaulis Hill, Jacq. 309 (1)
acaulis L. (veris) = prec.
acaul. × elatior Muret 309
acaul. × Columnæ Stricker = acaul. × suaveol.
acaul. × officinalis Pax 310
acaul. × suaveolens Fiori 310
adulterina Gusmus = Wulfen. × tyrol.
alba Hoffmgg. = Auric. × viscosa?
PRIMULA II 308 (675)
albiflora Cald. (vulgar.) = seg.
albiflora Fiori (*acaulis*) 309 (1 α b)
albocincta Widm. (Auric.) = marginata Kern.
Allionii Hausm., Koch = tyrolensis
Allionii Lois. 314 (11)
alpina Lois. = latifolia
alpina Salisb. = Auricula
alpina Schleich. = Auric. × viscosa
ambigua Salisb. = elatior (α)
americana Rydberg = seg.
americana Torr. (farin.) = farinosa (α)
ampliata Koch (*officin.*) A 162 (8 α d)
androsacea Georgi = Androsace Chamæjasme
anglica Beck. = purpurascens
angustata Widm. (*viscosa*) 313 (10 γ b)
anisiaca Stapf = acaul. × elatior
apennina Widm. 314, A 162 (10 δ)
Arctotis Kern. = Auric. × viscosa
ascapa Goir. (*offic.*) 310 (8 α b)
ascapa Goir. (*spectab.*) 316 (16 α b)
Auricula Hill = farinosa
Auricula L. 311 (7), A 162
Auricula Vill. = marginata
Auric. × carniolica Kern. 312
Auric. × ciliata Pax = Obristi
Auric. × hirsuta Pax = Auric. × viscosa
Auric. × latifolia Widm. = Auric. × viscosa
Auric. × œnensis Pax, Widm. 313
Auric. × pubescens Arc. = Auric. × viscosa
Auric. × villosa Leyb. = Auric. × œnens.
Auric. × viscosa Pax., Widm. 312, 313
Balbisii Lehm. 312 (7 β)
Balbisii Ten. = glabrata Cald.
Balbis. × Auricula Fiori 312
Balbis. × tyrolensis Widm. 316 (nota)
baldensis Goir. 316 (16 γ)
Bauhini Beck (Auric.) = Auricula (α)
bellunensis Venzo (*Balbisii*) 312 (7 β c)
bellunensis Venzo in Kolb = prec.
Berninæ Kern. = latifol. × viscosa
bicolor Raf. = acaulis
biflora Huter = glutin. × min.
Bonjeani Huguenin = pedemontana
bosniaca Beck = acaul. × suaveol.
Brandisii Wiesb. = acaul. × suaveol.
brevis O. Ktze. = Androsace Charpentieri

Digitized by Google

PRIMULA II 308 (675)
brevis Zersi (*integrifol.*) 315 (15 b)
breviscapa Widm. (*œnensis*) 313 (10 δ d)
brevistyla DC. = offic. × acaul.
brigantiaca Derganc = Andros. carnea
cadinensis Porta 313 (10 δ c)
calycantha Retz. 309 (1 α d)
calycina Duby = glaucescens
calyc. × viscosa Widm. = glauc. × viscosa
Candolleana Rchb. = integrifolia
canescens Opiz A 162 (3 β)
carniolica Jacq. 312 (8)
carniolica Pollini = spectabilis
carniolica Wulf. p. p. = Wulfeniana
Caruelii Porta 316 (16 ε b)
caulescens Auct. pl. (acaul.) = offic. × acaul.
caulescens Koch (*acaulis*) 309 (1 δ)
ciliata Arc. (hirsuta) = confinis
ciliata Moretti = Balbisii
ciliata Schrank = viscosa
ciliata × tyrolensis Pax = Balbisii × tyrol.
colorata Ljungstr. (acaul.) = Sibthorpii
Columnæ Rchb. (elatior) = Tommasinii
Columnæ Ten. 310 (3 γ b)
compacta Widm. (farin.) = pygmæa Gaud.
confinis Schott 313 (10 γ c)
cordifolia Schur = suaveolens
coronaria Salisb. = officinalis
coronata Porta = min. × spectab.
Cortusa Sander = Cortusa Matthioli
cottia Widm. 313, A 162 (10 β)
crenata Fuss. = Auricula
crenata Lam = marginata
crenulata Lge. (variabilis) = offic. × acaul.
cridalensis Gusmus = Wulfen. × tyrol.
cuneata Widm. (*latifol.*) 314 (10 η c)
cynoglossifolia Widm. (*latifol.*) 314 (10 η b)
danubialis C. Richter = elatior (α)
daonensis Leyb. = œnensis
daonensis Leyb. (villosa) = prec.
decipiens Loud. (elat.) = elat. × offic.
decipiens Stein = viscosa
decora Sims = viscosa
denticulata Koch (spectab.) = spectabilis
denudata Koch (farin.) = lepida
digenea Kern. = elat. × acaulis
discolor Leyb. = Auric. × œnensis
dolomitis Hort. = Balbisii ?
Dumoulinii Stein 315 (min. × spectab.)

PRIMULA II 308 (675)
elatior Hill, Jacq. 309 (2), A 214
elatior L. (veris) = prec.
elat. × *acaulis Muret* 309
elat. × *officinalis Muret* 311, A 162
elat. × vulgaris Gren. = elat. × acaul.
exilis Bruegg. (glutin.) = glutinosa
expallens Lge. (variabilis) = offic. × acaul.
exscapa Heg. et Heer 313 (10 γ d)
Facchinii Schott = min. × spectab.
Falkneriana Porta = elat. × acaulis
farinosa L. 311 (4)
flagellicaulis Kern. = acaul. × offic.
Floerkeana Facch. = min. × spectab.
Floerkeana Schrad. = glutin. × min.
Flueggeana Lehm. = Perreiniana
Freyeri Hladnik = carniolica
glabrata Cald. (*Balbisii*) 312 (7 β d)
glabrescens Arv. T. = elat. × offic. ?
glandulosa Bonjean = pedemontana
glandulosa Duby (villosa) = prec.
glaucescens Moretti 316 (16 ζ)
glaucescens Rchb. p. p. = Wulfeniana
glaucesc. × hirsuta Pax = glaucesc. × viscosa
glaucesc. × villosa Cald. = glaucesc. × viscosa
glaucesc. × *viscosa Fiori* 314
glutinosa All. = Allionii
glutinosa Wulf. 315 (13)
glutin. × *minima Rchb.* 315
Goebelii Kern. = Auric. × viscosa
gracilis Cald. (vulgar.) = seg.
gracilis Fiori (*acaulis*) 309 (1 α c)
grandiflora Lam. = acaulis
grandifl. × officin. Goir. = acaul. × offic.
graveolens Heg. = latifolia
graveol. × viscosa Christ = latifol. × visc.
Hausmannii O. Ktze. = Andros. Hausm.
helvetica Donn = Auric. × viscosa
helvetica O. Ktze = Andros. helvet.
hirsuta All. 313, A 162 (10)
hirsuta Fiori, Mori = apennina
hirsuta Rchb. = viscosa
hirsuta Vill. = latifolia
hirs. × œnensis Pax = œn. × viscosa
hirs. × viscosa Pax = latif. × viscosa

PRIMULA II 308 (675)
Hoppei Derganc = Andros. alpina
Hornemanniana Lehm. p. p. = lepida
hortensis Pax (acaul. × elat.) = purpurascens
Huteri Kern. = glutin. × min.
hybrida Rchb. (min.) = glutin. × min.
hybrida Schrank = acaulis
iberica G. F. Hoffm. (acaul.) = Sibthorpii
idriana Gusmus = Auric. × carniol.
incana Jones = farinosa (α)
incisa Lam. = integrifolia
inflata Kern. (non Lehm.) = pannonica
inflata Duby, Kern. = canescens
inflata Pax (offic.) = prec.
inodora Gilib. = elatior (α)
integrifolia Jacq., Pollini = spectabilis
integrifolia L. 315 (15)
integrifolia Rchb. p. p. = Wulfeniana
integrifolia Scop. = carniolica
intermedia Facch. = offic. × acaul.
intermedia Heg. et Heer = glaucescens ?
intermedia V.-Houtte = Auric. × viscosa
intricata Gr. et Godr. 310 (2 β)
intric. × *grandiflora Goir.* A 162
intric. × *officinalis Goir.* A 162
Jelenkæ Gusmus = Auric. × carniol.
Jellenkiana Freyer = carniol.
judicariæ Widm. (*œnensis*) 313 (10 δ b)
juribella Sünd. = min. × tyrol.
Kerneri Gœbl et Stein = Auric. × viscosa
Kolbiana Widm. = latifol. × œnensis
lactea Lam. = Andros. lactea
lateriflora Goupil = elat. × offic. ?
latifolia Lap. 314, A 162 (10 ζ)
latifol. × *œnensis Widm.* 314 (nota)
latifol. × *viscosa Widm.* 314 (nota)
lepida Duby 311 (4 β)
leudrensis Porta = elat. × offic.
levigata Duby = glaucescens
longiflora All. 311 (5)
longifolia Cald. (variabilis) = quid ?
longifolia Pollini = spectabilis
longobarda Porta 316 (16 ε)
longob. × spectabilis Widm. = Caruelii
lutea Vill. = Auricula (α)
macciassonica Dalla Torre et Sarnh. = magiassonica
macedonica Adam. = Tommasinii
macrocalyx Schur = canescens

Digitized by Google

PRIMULA II 308 (675)
magiassonica Porta 315 (min. × spectab.)
marginata Curt. 312 (9)
marginata Kern. (*Auric.*) 312 (7 α b)
Mathildæ Derganc = Andros. Math.
Matthioli Richter = Cortusa Matthioli
media Peterm. = elat. × offic.
micrantha Cald. (*offic.*) 310 (3 α c)
micrantha Gusmus = Wulfen. × tyrol.
microcalyx Lehm. = marginata
minima L. 315 (14)
min. × Flœrkeana Arc. = glutin. × min.
min. × *œnensis Pax* 315, A 162
min. × *spectabilis Schott* 315
min. × *tyrolensis Sünd.* 315
mollis Rchb. (Auricula) = Auric. × viscosa
montana Opiz = elatior (α)
montana Reut. = officinalis
multiceps Duby (carniol.) = carniolica
nana O. Ktze. = Andros. nana
Nelsoni Hort. = viscosa
nigra Lemaire (Auric.) = Auric. × viscosa
nivalis Don = Balbisii
nivalis Turcz. = farinosa
obovata Huter = Balbis. × tyrol.
Obristi Stein 312 (7 β b)
odorata Gilib. = officinalis
odoratissima O. Ktze. = Andros. villosa
œnensis Thom. 313, A 162 (10 γ)
œnens. × *viscosa Widm.* 314 (nota)
officinalis Gib. et Pir. = pannonica
officinalis Jacq. 310 (3), A 162
offic. L. (veris) = prec.
offic. × *acaulis Kern.* 310
offic. × grandiflora Goir. = offic. × acaulis
offic. × vulgaris Gren. = acaul. × offic.
orientalis C. Koch (grandifl.) = Sibthorpii
Pacheri Derganc = Andros. Wulfen.
pachyscapa Goir. et Del Fabbro = intricata
Palinuri Petagna 311 (6), A 162
pallida Schott = viscosa
pannonica Kern. 310 (3 β) = canescens
Parlatorii Porta 316 (16 β)
pedemontana Thom. 314, A 162 (10 ε)
permixta Gusmus = glutin. × min.?
Perreiniana Flueg. 309 (2 α b)
Peyritschii Stein = Auric. × viscosa
Plantæ Bruegg. = œnensis
Polliniana Moretti = spectabilis
Pooliana Bruegg. = œnensis
Portæ Huter = Auric. × œnensis
procera Zersi (*farin.*) 311 (4 α c)
pseudo-acaulis Porta = acaul. × offic.
puberula Schott = glutin. × min.?
pubescens Jacq. = Auric. × viscosa
pubescens Lois. = viscosa
pubescens Rchb. = pedemontana
pumila Kern. = min. × œnensis
purpurascens Posp. = seg.
purpurascens Zersi, Camus (*acaul.*) 309, A 162 (×)
pygmæa Bert. (villosa) = viscosa
pygmœa Gaud. (*farin.*) 311 (4 α b)
pyrenaica Mieg. = suaveolens
rhætica Gaud. 313 (Auricula × viscosa)
rosea Boiss. (acaul.) = Sibthorpii
rubra S. et S., Arc. (vulg.) = Sibthorpii
salisburgensis Flœrke = glutin. × min.
Salisii Bruegg. = latif. × viscosa
Sauteri Schultz = minima
Schmiedelyi Gremli = acaul. × suaveolens
sedifolia Salisb. = Douglasia Vital.
Seguieri Goir. (*Auricula*) A 162 (7 α c)
seriana Widm. = œnensi × viscosa
Sibthorpii Hoffmgg. 309 (1 β)
Sieberi Derganc = Andros. Wulfen.
silvestris Scop. = acaulis
similis Stein = Balbisii × Auric.
Simsii Sweet = villosa
spectabilis Tratt. 316 (16), A 162
stelviana Vulp. = œnensis
suaveolens Bert. 310 (3 γ), A 162
suaveol. × *acaulis Wiesb.* 310
subacaulis Dœll. = acaul. × offic.
ternoviana Kern. = acaul. × suaveolens
Thomasinii Gr. et Godr. = seg.
Tommasinii Gr. et Godr. 311 (3 δ), A 162
travnicensis Wiesb. = suaveol. × acaul.
tyrolensis Schott 314 (12)
tyrol. × Wulfeniana Pax = Wulfen. × tyrol.
unicolor Nolte = elat. × offic.
uniflora Gmel. = acaulis
uniflora Scop. (integrifol.) = Wulfeniana
valmenona Gusmus = Wulfen. × tyrol.
variabilis Goupil = offic. × acaul.
venusta Host = Auric. × carniol.
Venzoi Huter = Wulfen. × tyrol.
Venzoides Huter = Wulfen. × tyrol.
veris L. = acaul., elatior, offic.
veris Œder = officinalis
vernalis Salisb. = acaulis
villosa Caruel = apennina
villosa Curtis, Rchb., Koch p. p. etc. = viscosa
villosa Lam. = Andros. vill.
villosa Wulf. 313, A 162 (10 var.)
viscosa All. p. p., Pax = latifolia
viscosa Vill. 313, A 162 (10 β)
visc. × œnensis Pax = latifol. × œnensis
Vitaliana L. = Douglasia Vital.
vulgaris Huds. = acaulis
Warei Stein = farinosa (α)
Weldeniana Pax = seg.
Weldeniana Rchb. f. (venusta) = spectabilis
Widmeræ Pax (*min.* × *œnens.*) A 162 (×)
Willkommii Derganc = Andros. helvetica
Wulfeniana O. Ktze. = Andros. Wulfen.
Wulfeniana Schott 316 (16 δ), A 162
Wulfen. × *tyrolensis Huter* 316
PRIONITIS = Falcaria
Falcaria Dum. = F. vulgaris
falcata Delarb. = prec.
PRISMATOCARPUS = Specularia
confertus Mœnch = Sp. hybrida
cordatus Rchb. = prec.
falcatus Ten. = Sp. falcata
hirsutus G. Don = seg.
hirtus Ten. = Sp. — hirta
hybridus L' Hér. = Sp. hybrida
Speculum L' Hér. = Sp. Specul.
PROBOSCIPHORA = Elephas
Columnæ Caruel = E. Columnæ
PROCRASSULA = Sedum
cæspitosa Fourr. = S. cæspit.
Magnolii Griseb. = S. cæspitos.
mediterranea Jord. et Fourr. = S. — medit.
pallidiflora Jord. et Fourr. = S. rubens (a)
PROSELIAS = Astragalus
monspessulanus Stev. = A. monsp.
PROSPERO = Scilla
autumnale Salisb. = S. aut.
hyacinthoideum Salisb. = S. hyac.
obtusifolium Salisb. = S. obt.
undulatum Salisb. = Urginea und.
PRUNELLA = Brunella III 27 (787)

Digitized by Google

PRUNUS I 556 (456)
acida Ehrh. 560 (11 α a)
albida Ehrh. (varia) = dulcis
amara Focke (*Amygdal.*) 557 (1 α b)
Amygdalus Stokes 557 (1)
Amygd.-Persica Duham. = seg.
Amygd. × *Persica Focke* 557 (nota)
angustifolia Wimm. et Grab. (*spinosa*) 559 (7 c)
arctiana Fiori (*avium*) 560 (10 a)
arctiana L. (Cerasus) = prec.
Armeniaca L. 558 (3), A 116, 213
armenioides Ser. (*domest.*) 558 (6 γ d)
austera Ehrh. = seg.
austera L. (*Cerasus*) 560 (11 α b)
avium L. 560 (10), A 116
avium L. (Cerasus) = prec.
bigarella L. (avium) = duracina
bigarella L. (Cerasus) = prec.
brigantiaca Vill. 558 (4)
brigantina Chaix = prec.
brutia N. Terr. 558 (5 β), A 116
Caproniana L. (*Cerasus*) 560 (11 α)
Caproniana Rchb. = prec.
Claudiana Poir. 558 (6 β)
cerasifera Auct. pl. = myrobolana
cerasifera Ehrh. = maritima, myrobolana, cfr. 559 (nota)
cerasifera × Armeniaca Asch. et Græbn. = myrobol. × Armen.
Cerasus L. 560 (11), A 116
Cerasus β L. = avium
cereola L. (domest.) = domestica
cereola Poir. = prec.
Chamæcerasus Jacq. = pumila
cœtanea Wimm. et Grab. (*spinosa*) 559 (7 d)
Coccumilia Kœhne = seg.
Cocomilia Ten. 558 (5), A 116
communis Arc. (1882) = Amygdalus
communis Huds. = domestica
communi × Persica Borzì 557 (nota) = Amygd. × Pers.
concolor Asch. et Græbn. (prostrata) = humilis
Cupaniana Guss. 561 (12 β)
Damascena Ehrh. 558 (6 γ b)
Damascena L. (domest.) = prec.
dasycarpa Ehrh. A 116, 213 = myrobolana × Armeniaca
discolor Asch. et Græbn. (prostrata) = prostrata (α)
discolor Raulin (nana) = prec.
divaricata Ledeb. = myrobolana (var.)
domestica L. 558 (6)
dulcis Fiori (*Amygdal.*) 557 (1 α a)
dulcis Fiori (*avium*) 560 (10 α d)
dulcis L. (Cerasus) = prec.
duracina L. (*avium*) 560 (10 β)
duracina L. (Cerasus) = prec.
duracina Sweet = prec.
fragilis Arc. (commun.) = seg.
fragilis Focke (*Amygdal.*) 557 (1 β)
fruticans Weihe = spin. × insititia
fruticosa Pall. = pumila
humilis Colla 559 (9 β)
inermis Gilib. = domestica
insititia L. 558 (6 γ)
insit. × spinosa Rchb. = spin. × insit.
intermedia Poir. = pumila
italica Borkh. = Claudiana
Juliana L. (Cerasus) = avium γ Jul.
Juliana L. (domest.) = seg.
Juliana Poir. 558 (6 γ c)
Juliana Rchb. 560 (10 γ)
Laurocerasus L. 561 (14)
levis Arc. (Persica) 557 (2 β) = Nuci-persica, cfr. A 213
levis Borzì (*Armeniaca*) 557 (3 b)
ligerina Lloyd = coætanea
lusitanica L. 561 (15)
macrocarpa Fiori (*avium*) 560 (10 α b)
macrocarpa Wallr. (spinosa) 559, A 213 = spin. × insitit.
Mahaleb Guss. = Cupaniana
Mahaleb L. 561 (12), A 116
major Posp. (spinosa) = spinosa (for.)
Marasca Rchb. 560 (11 β)
maritima Wang. 559 (nota)
microphylla Fiori (*pumila*) A 116 (11 γ b)
microphylla Goir. (Chamæcer.) = prec.
myrobalan L (domest.) = seg.
myrobolana Lois. 559 (8)
myrobolana × *Armeniaca C. K. Schneider* A 213
nectarina Maxim. (Persica) = Nuci-persica
nigra Desf. (Armeniaca) = dasycarpa
nigra Rchb. = insititia
nigricans Ehrh. = arctiana
Nuci-persica C. K. Schneider (*Persica*) A 213 (2 β)
oblonga B. Longo (*brutia*) A 116 (5 β b)
œconomica Borkh. 558 (6 α)
ovata Ser. (*spinosa*) 559 (7 b)
Padus L. 561 (13), A 116
pallescens Fiori (*Cerasus*) 560 (11 α c)
Persica Stokes 557 (2), A 213
Persica × communis Asch. et Græbn. = Amygd. × Pers.
persicoides Asch. et Græbn. = Amygd. × Pers.
petræa Tausch A 116 (13 b)
præcox Wimm. et Grab. (spinosa) = spinosa (α)
prostrata Labill. 559 (9)
prostrata Lojac. (Mahaleb) = Cupaniana
pudibunda Pass. 557 (2 α b)
pumila Fritsch (non L.) = seg.
pumila L. (*Cerasus*) 560 (11 γ), A 116
pyramidalis DC. = domestica
racemosa Lam. = Padus
rubella Ehrh. 560 (10 α c)
sativa Focke (Amygd.) = dulcis
sativa Rouy et Cam. = domestica, insititia
serotina Schur = macrocarpa
serotina Weihe (spinosa) = coætanea
silvestris Dierb. (avium) = arctiana
spinosa L. 559 (7), A 213
spinosa × *insititia Focke* A 213
stenopetala Manceau = coætanea
tiliæfolia Salisb. = Armeniaca
varia α Ehrh. = rubella
vulgata Rouy et Cam. = spinosa
PSAMMA I 65 (76)
arenaria R. et S. 65, A 17
australis Mab. A 17 (β)
litoralis P. B. = arenaria
pallida Presl = arenaria
PSAMMOPHILA = Gypsophila
muralis Fourr. = G. mur.
PSEUDATHYRIUM = Polypodium
alpestre Newm. = P. rhæticum
PSEUDO-DICTAMNUS = Ballota
acutus Mœnch p. p. = B. rupestris
PSEUDO-FUMARIA = Corydalis
capnoides Borck. = C. lutea
intermedia Borck. = C. interm.
lutea Medic. = C. lutea
major Borck. = C. cava
minor Borck. = C. cava
PSEUDO-IRIS = Iris
palustris Medic. = I. Pseudoacorus
PSEUDO-LYSIMACHION = Veronica
cristatum Opiz = V. orchidea
longifolium Opiz = V. longif.
spicatum Opiz = V. spic.
PSEUDORLAYA = Daucus
maritima Murbeck = D. pumilus
PSILATHERA = Sesleria
tenella Lk. = S. ovata
PSILONEMA = Alyssum
calycinum C. A. Mey. = A. calyc.
campestre Schur = A. camp.
minimum Schur = A. min.
ruderale Fourr. = A. calycin.
PSILURUS I 102 (123)
aristatus Duv.-Jouve 102, A 31, 204
erythrostachys Asch. et Græbn. (*arist.*) A 204 (b)
erythrostachys Goir. (nardoides) = prec.
nardoides Trin. = aristatus
PSORALEA II 86 (500)
alnifolia Bert. = polystachia
americana L. 87 (2)

Digitized by Google

PSORALEA II 86 (500)
angustifolia Guss. (bitum.) = bitum (α)
bituminosa L. 86 (1)
dentata DC. = americana
dentata β DC. = polystachia
fœtida Presl = bituminosa
latifolia Moris (bitum.) = seg.
ovata Rouy (plumosa) = seg.
palæstina Gouan., Murr. 86 (1 c)
plumosa Rchb. 86 (1 b)
plumosa Rchb. f. (bitum.) = prec.
polystachia Poir. 87 (2 β)
villosa Guss. (dentata) = polystachia
PSOROPHYTUM = Hypericum
undulatum Spach = H. balearicum
PSYLLIUM = Plantago
annuum Mirb. = P. Psyllium
annuum Thuill. = P. ramosa
arenarium Mirb. = P. ramosa
Cynops Mirb. = P. Cynops
ramosum Gilib. = P. ram.
PSYLLOPHORA = Carex
androgyna Schur (Davall.) = C. Sieberiana
capitata Schur = C. capit.
Davalliana Schur = C. Davall.
dioica Schur = C. dioica
pauciflora Schur = C. pauc.
pulicaris Schur = C. pulic.
Sieberiana Opiz = C. Sieb.
vulgaris Heuff. = C. pulicaris
PTARMICA = Achillea
alpina DC. p. p. = A. Ptarm. × macrophylla
atrata DC. = A. atrata
Barrelieri DC. = Anthemis Barrel.
calcarea Nym. = A. — calcar.
Clavenæ DC. = A. Claven.
Clusiana Schur = A. Clusiana
Hænkeana DC. (atrata) = A. atrata
Hausskneehtiana Nym. = A. Hausskn.
Herba-rota DC. = A. Herba-rota
hybrida DC. (mosch.) = A. moschato × nana
hybrida Nym. = prec.
impunctata DC. (mosch.) = A. atrato × moschata
impunctata Nym. = prec.
integrifolia Gilib. = A. Ptarmica
Laggeri Nym. = A. atrato × nana
Lereschei Nym. = A. macroph. × mosch.
linearis DC. (vulgaris) = A. — linearis
macrophylla DC. = A. macroph.
Morisiana Nym. = A. Moris.
moschata DC. = A. mosch.
mucronulata DC. = Anthemis mucr.
nana DC. = A. nana
oxyloba DC. = Anthemis alpina
polycephala DC. (oxyloba) = Anthemis — polyc.
PTARMICA = Achillea
Schleicheri DC. (valesiaca) = A. macroph. × mosch.
Schouwii DC. (Barrelieri) = Anthemis — Schouwii
Schouwii Nym. = prec.
vulgaris DC. = A. Ptarmica
vulgaris DC. (atrata) = A. atrata
PTERANTHUS I 332 (317)
dichotomus Forsk. 332
echinatus Desf. = dichotomus
Forskahlei Mirb. = dichotomus
PTERIDIUM = Pteris
aquilinum Kuhn = P. aquilina
integerrimum Luerss. (aquil.) = P. — integerrima
PTERIS I 14 (16)
Alpini Spr. = longifolia
aquilina L. 15 (1), A 8
brevipes Tausch = aquilina
cretica L. 15 (3)
crispa All. = Allosorus crisp.
ensifolia Sw. = longifolia
integerrima Moore (aquil.) A 8 (1 b)
lanceolata Desf. = longifolia
longifolia L. 15 (2), A 8
oligophylla Viv. = cretica
serrulata L. f. 15 (nota)
vittata L., Sm. = longifolia
vulcanica Bert. = longifolia
PTERIUM = Lamarckia
elegans Desv. = L. aurea
PTERNIX = Carduus
deflorata Hill = C. deflor.
PTEROCEPHALUS = Scabiosa
brachiatus Spr. = S. brach.
calabricus DC. (palæst.) = S. brachiata (α)
dalmaticus DC. (palæst.) = S. Sibthorpiana
indivisus Vis. (palæst.) = S. brachiata (α)
palæstinus Coult. = S. brachiata (α)
Sibthorpianus Steud. = S. Sibthorpiana
PTEROLOPHUS = Centaurea
pinnatifidus Cass. = C. alba
PTERONEURUM = Cardamine
bipinnatum Rchb. = C. marit.
corsicum Jord. = C. — eriocarpa
creticum Jord. = C. — eriocarpa
Cupanii Jord. = C. Cupanii
dalmaticum Vis. = C. marit.
eriocarpum DC. (græc.) = C. — erioc.
glaucum Lojac. = C. glauca
græcum DC. = C. græca
lasiocarpum Boiss. (græc.) = C. — eriocarpa
maritimum Rchb. = C. marit.
microphyllum J. et C. Presl = C. marit.
petiolare Lojac. = C. græca
Rochelianum Rchb. = C. — eriocarpa
trichocarpum Jord. = seg.
trichocarpum Rchb. (græc.) = C. — eriocarpa
PTERONIA = Cirsium
Chamæpeuce Ten. (non Spr.) = C. gnaphaloides
PTEROSELINUM = Peucedanum
austriacum Rchb. = P. austr.
Chabræi Rchb. = P. carvifol.
glaucum Rchb. = P. Schottii
intermedium Schur = seg.
montanum Rchb. = P. mont.
nebrodense Guss. = P. nebrod.
peucedanoides Rchb. = P. montanum
rablense Rchb. = P. rabl.
venetum Rchb. (alsaticum) = P. venet.
PTEROSPARTUM = Genista
sagittale Wk. = G. sagitt.
PTEROTHECA III 427 (954)
aptera Bischoff (nemaus.) = bifida
aspera Rchb. f. = Crepis asp.
bifida F. et M. 428 (2)
bifida Groves = Crepis corymbosa
Dioscoridis Rchb. f. = Crepis Diosc.
nemausensis Cass. 427 (1)
nemaus. DC. p. p., Rchb., Koch = bifida
sancta C. Koch = nemausensis
PTILOTRICHUM = Alyssum
halimifolium Borzì = A. halimif.
rupestre Boiss. = A. rup.
PTOSIMOPAPPUS = Centaurea
sempervirens Boiss. = C. semp.
PTYCHOTIS = Petroselinum et Falcaria
ammoides Koch = P. amm.
Bunius Rchb. = F. saxifraga
carvifolia Sond. 159 (nota)
heterophylla Koch = F. saxifraga
saxifraga Wohlfarth (1892), Drude (1898) = prec.
verticillata Duby = P. ammoides
PUCCINELLIA = Glyceria
convoluta Fourr. = G. conv.
distans Parl. = G. dist.
festucæformis Parl. = G. festuc.
Gussonii Parl. = G. convoluta
maritima Parl. = G. marit. et pseudo-distans
permixta Parl. = G. permixta
PULEGIUM = Mentha
aromaticum S. F. Gray = M. Pulegium
erectum Mill. = M. Puleg. α erecta
heterophyllum Opiz = M. Pulegium
incanum Per. (vulg.) = M. tomentosa
nummularioides Per. (vulg.) = M. Puleg. b. vulgaris
tomentellum Presl = seg.
vulgare Mill. = M. Puleg.
PULICARIA III 291 (888)
annua Gærtn. = Erigeron ann.
arabica Asch. (non Cass.) = sardoa, cfr. 292 (nota)

Digitized by Google

PULICARIA III 291 (838)
bellidiflora Wallr. = Erigeron annuus
Burnati Briq. (*odora*) 293 (4 c)
calycina Presl = Inula calyc.
Clausonis Pomel = græca
congesta C. Koch = odora
corymbosa Fiori (*odora*) 292 (4 b)
dentata Guss. (non DC.) = græca
dumetorum Salzm. = odora
dysenterica Gærtn. in Fl. Wett. 292 (3), A 186
germanica J. et C. Presl = vulgaris
græca Sch. Bip. 292 (2 β)
graveolens Nym. = Inula grav.
hirta J. et C. Presl = Inula hirta
lanata Fiori (*dysent.*) 292, A 186 (3 α b)
microcephala Boiss. (*dysent.*) A 186 (3 β)
odora Rchb. 293 (4)
pratensis Scheele = vulgaris
prostrata Asch. = vulgaris
salicina J. et C. Presl = Inula salicina
sardoa Fiori (*græca*) 292 (2 β b)
sicula Moris 292 (1)
Steveni Nym. = seg.
uliginosa Stev. (non Hoffgg. et Lk.) 292 (3 c) = microcephala, cfr. A 186
undulata C. A. Mey. = vulgaris
viscosa Koch = Inula viscosa
vulgaris Gærtn. 292 (2)
vulgaris Moris = sardoa
PULMONARIA II 371 (720)
alpina Mill. = offic.
angustifolia L. = tuberosa, azurea
azurea Bess. 372 (ζ)
Clusii Baumg. = azurea
Gallorum Gueld. = offic.
grandiflora DC. = saccharata
Kochii Kern. = oblongata
maculata F. G. Dietr. 371 (α b)
maculosa Dum. = officin. (α)
media Host, Rchb. = oblongata
mollis Wolff. 372 (δ)
montana Lej. = mollis
oblongata Schrad. 372 (ε b)
obscura Dum. = officin. (α)
officinalis L. 371
parviflora Knapp. = azurea
saccharata Mill. 371 (β)
suffruticosa L. = Lithosperm. suffrut.
tridentina Evers = offic. (α)
tuberosa Schrank 372 (ε)
Vallarsæ Kern. 371 (γ)
variabilis Godr. = officinalis
vulgaris Mér., Hol. = officin.
PULSATILLA = Anemone
alba Rchb. = A. alpina (α)
alpina Schrank = A. alp.
aperta Schur = A. nigricans
apiifolia Sweet = A. sulphurea
baldensis Delarb. = A. baldensis
PULSATILLA = Anemone
bolzanensis Murr = A. mont. × vernal.
Breynii Rupr. = A. pratensis
Burseriana Rchb. = A. Burser., sulfurea
coronaria Borkh. = A. coron.
germanica Blocki = A. Pulsatilla (α a)
grandiflora Rchb. (Burseriana) = A. Burser.
Halleri W. = A. Halleri
humilis Val de Lièvre (mont.) = A. — humil.
intermedia Hpe. et Horn. = A. montana
lutea Rchb. (Burseriana) = A. sulfurea
micrantha Sweet = A. alpina (α)
millefoliata Ser. = A. millefol.
montana Rchb. = A. mont.
narcissiflora Schrank = A. narcissiflora
nemorosa Schrank = A. nemor.
nigricans Stœrck = A. nigric.
parviflora Schur (alp.) = A. alpina (α)
pratensiflora Val de Lièvre (mont.) = A. — pratensifl.
pratensis Mill. = A. pratens.
propera Jord. = A. — propera
Pulsatilla Karsten = A. Pulsat.
pulsatilliflora Val de Lièvre (mont.) = A. pulsatill.
ranunculoides Schrank = A. ranunc.
recta Gilib. = A. Pulsatilla
reflexa Gilib. = A. pratensis
sulphurea Sweet = A. vernalis
vernalis Mill. = A. vernal.
vernal. × mont. Murr. = A. mont. × vernal.
vulgaris Mill. = A. Pulsatilla
PUNICA II 126 (523)
albescens DC. (*Granat.*) 126 (β)
florida Salisb. = seg.
Granatum L. 126, A 145
rubra DC. (*Granat.*) 126, A 145 (α)
sativa Strobl, Goir. (*Granat.*) A 145 (α b)
silvestris Strobl, Goir. (*Granat.*) A 145 (α a)
spinosa Lam. = Granatum
PUTORIA III 102 (816)
calabrica Pers., DC. 103
PYCNOCOMON III 156 (837)
alpinum Wallr. = Cephalaria alpina
leucanthum Wallr. = Cephal. leucantha
rutæfolium Hoffgg. et Lk. 156
syriacum Wallr. = Cephal. syr.
transsylvanicum Wallr. = Cephal. transs.
PYCNOCOMUS = Centaurea
sonchifolius Hill = C. sonch.
PYCREUS = Cyperus
capillaris Nees = C. globosus
flavescens P. B. = C. flavesc.
globosus Rchb. = C. glob.
lateralis Nees = C. levigatus
levigatus Nees = C. levigat.
PYCREUS = Cyperus
Monti P. B. ex Rchb. = C. serotinus
mucronatus Nees = C. levigatus
polystachyus P. B. = C. polyst.
PYRACANTHA = Cotoneaster
coccinea M. Rœm. = C. Pyracantha
pauciflora M. Rœm. = prec.
PYRENIA = Pirus
PYRETHRUM = Chrysanthemum
Achilleæ DC. = Ch. Achill.
alpestre Clairv. = Ch. coronopifol.
alpinum Gib. et Pir. = Ch. ceratophylloides
alpinum N. Terr. = Ch. — tridactylites
alpinum Schrank, W. = Ch. alpinum
alpinum β Bert. = Ch. minimum
atratum Less. = Ch. atrat.
Balsamita W. = Ch. Bals.
Barrelieri Duf. = Ch. ceratophylloides
carniolicum Dollin. = Ch. corymbos.
ceratophylloides W., Ten. = Ch. cerat.
cinerariæfolium Trev. = Ch. ciner.
Clusii Fisch. = Ch. Clusii
corymbosum Scop. = Ch. corymb.
discoideum Bizzozero (Parthen.) = Ch. — flosculos.
dissectum DC. p. p. (ceratoph.) = Ch. — tenuifol.
elegans Pollini = Matricaria elegans
elongatum Duch. = Ch. cinerariæfol.
flosculosum DC. (Parthen.) = Ch. — floscul.
graminifolium Guss. = Ch. — tridactyl.
graminifolium b. Guss. = Ch. — tridact. b. pallens
Halleri W. = Ch. coronopifol.
heterophyllum Baumg. = Ch. heter.
indicum Cass. = Ch. indicum
inodorum Mœnch = Matricaria inod.
latifolium W. = Ch. — latifol.
latifolium Ten. = Ch. pallens?
Leucanthemum Franch. = Ch. Leuc.
macrophyllum W. = Ch. macroph.
minimum Bruegg. (alpin.) = Ch. minim.
minimum DC. = Ch. tomentosum
Myconis Mœnch = Ch. Mycon.
Parthenium Sm. = Ch. Parthen.
pubescens Duby (alpin.) = Ch. minimum
rupestre Rota (Achilleæ) = Ch. — rupestre
segetum Mœnch = Ch. seg.

Digitized by Google

PYRETHRUM = Chrysanthemum
sinense DC. = Ch. sinense
subcorymbosum Schur = Ch. Clusii
tanacetoides Boiss. (Balsam.) = Ch. — tanacetoid.
Tanacetum DC. = Ch. — tanacetoides
tenuifolium Guss. (ceratoph.) = Ch. — tenuifol.
tenuifolium Ten. = Ch. — tenuifol. et Achilleæ
tenuifolium W. = Ch. — tenuifol.
tenuisectum Bert. = Ch. — tenuifol.
tomentosum Arc. (alpin.) = seg.
tomentosum Clairv. = Ch. minimum
tomentosum DC. = Ch. toment.
vulgare Boiss. = Ch. vulg.
PYROLA = Pirola
PYRUS = Pirus
PYXIDIUM = Amarantus
gangeticum Moq. = A. ganget.
græcizans Moq. = A. græciz.
melancholicum Moq. = A. mel.
retroflexum Montand. = A. retr.
silvestre Montand. = A. silv.
viride Moq. = A. ascendens

QUELTIA = Narcissus
ampla Salisb. = N. Ps.-Narc. × poeticus
fœtida Herb. = N. Ps.-Narc. × poeticus
incomparabilis Haw. = N. Ps.-Narc. × poeticus
Jonquilla Herb. = N. Jonq.
juncifolia Herb. = N. juncif.
Maclayi Rœm. = seg.
Macleana Herb. = N. Ps.-Narc. × poet.
odora Herb. = N. Ps.-Narc. × Jonquilla
orientalis Herb = N. orient.
pusilla Herb. = N. juncifolius
QUERCUS I 268 (255)
acutiloba Borb., Bér. in Borzì (*lanug.*) A 59 (1 ι for.)
Ægilops Scop. = Cerris
Ægilops L. 270 (3), A 60
Ægilops Mill. = lanuginosa
Ægilops Pollini = Cerris × Suber
ægylopifolia Pers. A 60 (×)
agrifolia DC. (*Ilex*) 271 (6 d)
ambigua DC. (*lanug.*) 269 (1 ι b)
amplifolia Guss. 268 (1 γ b)
amplifolia Guss. hb. p. p. = vulcanica
apennina Guss. hb. p. p. = vulcanica
apennina Lam. 268 (1 γ), A 58
apennina Lois. = conferta
arrioides Borzì (*conferta*) A 60 (1 quater c)
aspera Bosc = pinnatifida
asperata Pers. = pinnatifida
aurea Kit., Wierzb. = vulcanica
Aurin Bosc = Toza
QUERCUS I 268 (255)
australis Kotschy A 59 (1 ι for.)
australis Kotschy (*sessilifl.*) A 59 (1 δ for.)
austriaca W. 269 (2 b)
bipinnatifida Schur (Cerris) = Tournefortii
Bivoniana Guss. 270, A 60 (5 α b)
brachycalyx Borzì (*Ilex*) A 60 (6 for.)
brachycarpa Guss. = sessiliflora
brachylepis Borzì (*Suber*) A 60 (5 β for.)
brachyloba Borzì (Tauzini) = seg.
brachyloba Fiori (*Toza*) A 59 (1 bis β)
Brossa Bosc. = Toza
brutia Ten. A 58 (1 α for.)
calliprinos Webb. 270 (4 β), A 60
canescens Borzì (*lanug.*) A 59 (1 ι for.)
canescens Goir. (*Cerris*) A 60 (2 for.)
castaneifolia Pantocs. (non C. A. Mey) = macedonica
castellana Bosc = Toza
Cerris DC. = Toza
Cerris L. 269 (2), A 60
Cerris Pall. = lanuginosa
Cerris × lanuginosa Gürke A 60
Cerris × Suber Borzì 270, A 60, 210
cintrana Welw. = occidentalis
coccifera L. 270 (4), A 60
conferta Kit. 269, A 60 (1 quat.)
congesta Presl A 59 (1 δ for.)
conglomerata Ten. hb. = congesta
conocarpa Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
constricta Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
crinita Borzì (*Suber*) A 60 (5 α b)
crinita Lam. = canescens Goir.?, cfr. A 60
crinita s Lam. = Toza
crispata Bér. in Borzì (*sessilifl.*) A 59 (1 δ for.)
crispata Palanza (*macedon.*) A 60 (3 β b)
crispata Stev. = Cerris × lanugin.
cuneata A. DC. (*Robur*) 269 (1 η), A 59
cuneata Ten. (apennina) = prec.
Cupaniana Guss. A 59 (1 s for.)
cylindracea Guss. = pedunculata
cylindrocarpa Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
Dalechampii Ten. 269 (1 ζ), A 59
dasyantha DC. f. (coccif.) = seg.
dasyantha Wenzig. (*calliprinos*) A 60 (4 β b)
QUERCUS I 268 (255)
Dehnhardtii Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
denudata Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
echinata Salisb. = Cerris
Esculus All., Pollini etc. = sessiliflora
Esculus Griseb. = Dalechampii
Esculus L. = Cerris et Robur
Ettingeri Vuk. = brutia
exoniensis Béreng. = Cerris × Suber
faginea Ten. (non Lam.) = lanuginosa
Farnetto Ten. = conferta
Farnetto × pedunculata Chiov. A 60
fastigiata Lam. 268 (1 α d)
fimbriata Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
fœminea Mill. = pedunculata
Fontanesii Guss. A 60 (×)
frondosa Mill. = Cerris
Fragnos Longo = macedonica
fructipendula Schrank = pedunculata
geminiflora Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
germanica Lasch = pedunculata
glabrata Borb. = Kerneri
glabrata Heuff. (pubesc.) = Kerneri
glabrescens Borzì (Tauzini) = seg.
glabrescens Fiori (*Toza*) A 59 (1 bis γ)
glabrescens A. Kern. = Kerneri
græca Kotschy = Ægilops
gramuntia L. 271 (6 c)
Grisebachii Kotschy = macedonica
Gussonei Borzì (*lanug.*) A 59 (1 ι for.)
Gussonei DC. (*Pseudo-Suber*) A 60, 210 (×)
haliphlœos Guss. = Gussonei
haliphlœos Lam. = Cerris
heterophylla Loud. (*pedunculat.*) A 58 (1 α for.)
hispanica Lam. = Cerris × Suber
hispan. β Lam. = ægylopifolia
hungarica Hubeny = conferta
hybrida Bechst. 268 (4 α b)
Ilex L. 271 (6), A 60
Ilex × pedunculata Chiov. A 60
Ilex × Suber Borzì 271, A 60
ilicifolia Salisb. = Ilex
integrifolia Borzì (*Suber*) A 60 (5 α a)
intermedia Bér. A 59 (1 δ for.)
intermedia Bœnn., D. Don. 269 (1 δ b)
intermedia Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
intermedia Vis. (pubesc.) = Tommasinii
Kerneri Simk. A 59 (×)
lacera Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)

Digitized by Google

QUERCUS I 268 (255)
laciniata DC. (pedunc.) = heterophylla
laciniata Vuk. = prec.
laciniosa Bor. = pinnatifida
lanuginosa Lam. (*Robur*) 269 (1 ι), A 59
lanugin. Thuill. = prec.
lanugin. × *sessiliflora Gürke* A 59
laurifolia O. Debx. (*Ilex*) 271 (6 b)
leptobalanos Guss. 269 (1 κ)
lobatissima Bér. in Borzì (*sessilifl.*) A 59 (1 δ for.)
longæva Salisb. = pedunculata
Look Kotschy = macedonica?
macedonica A. DC. 270 (3 β), A 60
macrobalanos Schur (*pedunc.*) A 58 (1 α for.)
macrocarpa Guss. ex Borzì (*lanug.*) A 59 (1 ι for.)
macrolepis Borzì (*lanug.*) A 59 (1 ι for.)
macrolepis Kotschy = Ægilops
macrophylla Bér. in Borzì (*sessilifl.*) A 59 (1 δ for.)
macrophylla Lasch (*pedunc.*) A 58 (1 α for.)
macrophylla Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
macrostipulata Guss. = pedunculata
malacophylla Schur (*pedunc.* A 58 (1 α for.)
microbalana Borzì (*Ilex*) A 60 (6 for.)
microbalanos Bor. 269 (1 δ c)
microbalanos Schur (*pedunc.*), A 58 (1 α for.)
microcarpa Guss. ex Borzì (*lanug.*) A 59 (1 ι for.)
microcarpa Lap. 268 (1 α c)
microphylla Borzì (*lanug.*) A 59 (1 ι for.)
minor Fiori (*conferta*) A 60 (1 quater a)
minor Ten. (Farnetto) = prec.
Morisii Borzì = Ilex × Suber
nebrodensis Borzì (*vulcanica*) A 60 (1 ter γ)
nigra Thore (non L.) = Toza
occidentalis J. Gay 270, A 60 (5 β)
oleæfolia Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
oleæfolia Tomm. (*Ilex*) A 60 (6 a)
operculata Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
ostryæfolia Borb. = macedonica
pallida Heuff. = Kerneri
parvifolia Bér. in Borzì (*sessilifl.*) A 59 (1 δ for.)
parvifolia Borzì (*Ilex*) A 60 (6 for.)
pedemontana Colla = Toza
pedemontana Fiori (Robur) 269 (1 θ) = Toza et vulcanica, cfr. A 59
peduncularis Borzì (*lanug.*) A 59 (1 ι for.)

QUERCUS I 268 (255)
pedunculata Ehrh. 268 (1 α), A 58
perrobusta Borb. = brutia
pinnatifida Borzì (*vulcanica*) A 60 (1 ter β)
pinnatifida C. C. Gmel. 269 (1 ι c)
pinnatifida Lasch = heterophylla
pinnatiloba C. Koch = vulcanica
pinnatipartita Boiss. (pedunc.) = heterophylla
polycarpa Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
pseudo-alba Bér. (Esculus) = sessiliflora
pseudo-coccifera Desf. 270 (4 γ)
pseudo-coccifera Huet = dasyantha
pseudo-coccifera Labill. = calliprinos
Pseudo-Ilex Chat. = Ilex
pseudo-rubra Bér. (Esculus) = sessiliflora
Pseudo-Suber Santi = Cerris × Suber
pubescens Brot. = Toza
pubescens W. = lanuginosa
pyramidalis Gmel. = fastigiata
racemosa Borzì (*Suber*) A 60 (5 β for.)
Raineri Bér. A 59 (1 δ for.)
recurvisquama St.-Lag. = Cerris
reptans Lap. hb. = Toza
Robur L. 268 (1), A 58
roburoides Bér. A 59 (1 ι for.)
rumelica Griseb. = apennina
sempervirens Mill. = Ilex
serotina Borzì (Suber) = occidentalis
sessiliflora Salisb. 269 (1 δ)
sessilifl. × *Farnetto Chiov.* A 59
sessilifl. × sublanuginosa Simk. = Kerneri
sessilis Bér. ex Borzì (*pedunc.*) A 58 (1 α for.)
sessilis Ehrh. = sessiliflora
sinuata Pokorny (Cerris) = austriaca
slavonica Kit. = conferta
sphærocarpa Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
stolonifera Lap. = Toza
strangulata Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
Streimii Heuff. 269 (1 θ b) = lanugin. × sessiliflora
Suber L. 270 (5), A 60
subera St.-Lag. = Suber
suberosa Salisb. = Suber
sublobata Bér. in Borzì (*sessilifl.*) A 59 (1 δ for.)
sublobata Borzì (*conferta*) A 60 (1 quater b)
sublyrata Bér. in Borzì (*pedunc.*) A 58 (1 α for.)
suboccultata Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
Tanzini Bub. = Toza
Tauza Desf. = Toza

QUERCUS I 268 (255)
Tauzin Pers. = Toza
Tenorei A. DC. (Robur) = Dalechampii
Tenorei Posp. (croatica) = prec.
tergestina Wenzig. = sessilifl. for. australis
Thomasii Ten. 268 (1 β)
Tommasinii Kotschy A 58 (1 γ for.)
Tournefortii W. 269 (2 c)
Toza Gillet ex Bosc A 59 (1 bis)
tridactyla Borb. = Kerneri
turbinata Kit. = lanuginosa
undulata Kit. = Cerris × lanugin.
undulata Ten. (*Ilex*) A 60 (6 for.)
Virgiliana Ten. 269 (1 s), A 59
vulcanica Boiss. et Heldr. A 59 (1 ter)

QUINARIA = Parthenocissus
hederacea Raf. = P. quinquefolia
quinquefolia Kœhne = prec.

RADICULA = Nasturtium
lancifolia Mœnch = N. amphibium
palustris Mœnch = N. palustre
pinnata Mœnch = N. silvestre
pyrenaica Cav. = N. pyren.

RADIOLA II 251 (629)
dichotoma Mœnch = linoides
linoides Roth 251
Millegrana Sm. = linoides
multiflora Asch. = linoides
tetrapetala Steud. = linoides

RAMISCHIA = Pirola
secunda Garcke = P. sec.
secundiflora Opiz = P. secunda

RAMONDIA II 417 (nota)
Myconi Rchb. 417 (nota)
pyrenaica Rich. = prec.

RAMPHOSPERMUM = Rhamphosperm.

RANUNCULUS I 500 (429)
acer L. 513 (31), A 106
aconitifolius L. 504 (10)
aconit. × amplexicaulis Fiori 504 = acon. × plantag., acon. × pyren.
aconit. × *glacialis Focke* A 105
aconit. × *plantagineus Burn.* 504
aconit. × *pyrenæus Burn.* 504
aconitoides DC. (glacial.) = aconitifol. × glacial.
acutilobus Freyn (flabellatus) = dimorphorrhizus
aduncus Gr. et Godr. 512 (32 δ)
Agerii Bert. 510 (27), A 106
agrarius All. = hirsutus
albonævus Jord. A 107 (37 α b)
Aleæ Wk. 514 (37 β), A 107
alpester L. 503 (6), A 105
ambiguus Bruegg. (*alpester*) A 105 (6 α b)
ambiguus DNtrs. (*bulbos.*) A 107 (37 α for.)
amplexicaulis L. 502 (3), A 105

Digitized by Google

RANUNCULUS I 500 (429)
anemonoides Fiori (rutæf.) 503 (5 β) = Kernerianus, cfr. A 105
anemonoides Zahlbr. A 105
angulatus Presl = intermedius
angustifolius Wallr. (*Flammula*) 505 (13 α d)
angustilobus DC. (*monspeliac.*) 509 (24 α)
angustisectus Celak. (*nemoros.*) A 106 (33 γ for.)
angustisectus Schur (acer) = multifidus
apenninus DNtrs. (*lanuginos.*) A 106 (35 α b)
apenninus Chiov. (montan.) = seg.
apenninus Fiori (*geraniifol.*) 512 (32 ζ), A 106
apiifolius St.-Lag. = sceleratus
aquaticus Nock. = seg.
aquatilis L. 501 (2), A 104
arbascensis Timb. (montan.) = montanus
arvensis L. 516 (41)
asarifolius Diard. = hederaceus
asiaticus L. 508 (22)
aureus Schleich. = nemor. c. pauciflor.
auricomus L. 510 (28 β), A 106
aurimontanus Brig. (*geraniifol.*) A 213 (32 β')
Backii Wirtg. 502 (2 θ b)
Balbisii Moris 515 (38 δ)
baldensis Rigo (anemonoides) = Kernerianus
Baudotii Godr. 501 (2 β)
Berardi Vill. = rutæfolius
Bertolonii Hausm. = bilobus
bilobus Bert. 508 (6 β)
binatus Kit. = auricomus
Boræanus Jord. = acer (α a)
brachyphyllus Ten. = brevifolius
bracteatus Schleich. = bulbosus
brevifolius Ten. 507 (19 β)
breyninus Crantz = nemorosus?
breyninus Kern., Rouy et Fouc. = Villarsii
brutius Ces. = serbicus?
brutius Ten. 511 (31)
bulbosus L. 513 (37), A 107
bulboso × velutinus Fouc. et Sim. = petiolulatus
bullatus L. 507 (17), A 105
bupleurifolius DC. A 105 (3 γ b)
bupleuroides Lap. ex Nym. = prec.
cæspitosus Thuill. = fœniculaceus
calabrus Ten. (acer) = serbicus
Calcaræ Tin. 515 (38 γ b)
calthæfolius Jord. = ficariæformis
Canuti Coss. 510 (26 β b)
capillaceus Thuill. 502 (2 ε c)
capillaris Gater. = aquatilis
Capillus-naidis Arv.-T. = confervoides
carinthiacus Hpe. = gracilis
carnosus Wall. = sceleratus

RANUNCULUS I 500 (429)
cassubicus L. 510 (28), A 106
castrovillarensis N. Terr. (*monspeliac.*) 509 (24 α b)
caucasicus M. B. 511, A 106
caucasicus B Ten. = serbicus
cengialti Kern. = Aleæ
Cesatianus Cald. 502 (2 ε b), A 105
chærophylloides Jord. = dimorphorrhizus
chærophyllus L. = flabellatus et millefol.
chærophyllus Trim. = dimorphorrhizus
chius DC. 515 (39 β), A 107
christifolius Rchb. (*glacialis*) A 105 (8 e)
circinnatus Sibth. = fœniculac.
cœnosus Guss. = homœophyll.
collinus R. Br. = parviflorus
Columnæ All. = Seguieri
commutatus Badaro = aquatilis (for.?)
confervoides Fr. A 105 (2 var.)
confusus Gr. et Godr. 501 (2 β c)
constantinopolitanus Sang. (non Urv.) = velutinus
cordatus Clairv. = parnassifol.
cordifolius Bast. = ophioglossifol.
cordiformis Dulac = parnassifol.
cordiger Viv. 515 (38 β), A 107
corsicus DC. = macrophyllus
Crantzii Hedw. = nemorosus
crassicaulis DC. (*aconitifol.*) 504 (10 α c)
crenatolobus Strobl (*ficariæformis*) A 105 (16 β b)
crenatus Bert. = bilobus
crenatus W. et K. 503 (7), A 105
cuneatus DC. (*monspeliacus*) 509 (24 β b)
curvirostratus Bert. = arvensis
cyclophyllus Jord. = saxatilis
cylindricus Jord. = monspeliac. (α)
cymbalarifolius Balb. = Balbisii
declinatus Gilib. = Flammula
degeneratus Schur (*repens*) A 213 (29 f)
Delpontii Pons = glacial. × rutæfol.
demissus Auct. it. (non DC.) = Marschlinsii
dentatus Freyn (*Aleæ*) A 107 (37 β for.)
depressus A. Terr. (*muricatus*) A 107 (40 b)
digitatus Gilib. = sceleratus
dimorphorrhizus Brot. 509 (25 b)
divaricatus Schrank = fœniculac.
divergens F. Schultz (*Ficaria*) A 105 (16 α for.)
diversifolius Gilib. 501 (2 α)
Drouetii F. Schultz 502 (2 ζ b)
echinatus Crantz = arvensis

RANUNCULUS I 500 (429)
echinatus Vent. = muricatus
elatus Bég. (*ophioglossifol.*) A 105 (14 α a)
elongatus Hiern. (*aquatil.*) 501 (2 α g)
erectus DC. (*repens*) 510 (29 b)
erinifolius Ten. = fontanus
falcatus L. = Ceratocephalus falc.
fallax Wimm. et Grab. (*auricom.*) 510 (28 β b)
Ficaria L. 506 (16), A 105
ficariæformis F. Schultz 506 (16 β), A 105
fistulosus Brign. = ophioglossifol.
flabellatus Desf. 509 (25), A 106
flammeus S. F. Gray = Flammula
Flammula Biv. = ophioglossifol.
Flammula L. 505 (13)
flammuloides Raf. = prec.
floribundus Bab. 501 (2 α f)
fluitans Bég. (*paucistamin.*) A 105 (2 ζ a)
fluitans Lam. 502 (2 θ)
fluviatilis Weber = fluitans
fœniculaceus Gilib. 502 (2 η)
fœniculaceus Lojac. = trichophyllus
fontanus Presl 506 (14 β), A 105
Frieseanus Jord. 513 (34 β b), A 106
fumariæfolius Desf. = millefoliatus
garganicus Ten. 510 (26 β), A 106
gelidus Hoffgg. = glacialis
geraniifolius DC. (*lanuginos.*) 513, A 107 (35 α c)
geraniifolius Pourr. 511 (32), A 106, 213
giganteus DNtrs. (*nemoros.*) A 106 (33 γ d)
glabratus Lojac. (*heucherifol.*) 514 (37 δ b)
glabrescens Chiov. (*Aleæ*) 514 (37 β b)
glacialis L. 504 (8), A 105
glacialis × rutæfolius Pons 504 (nota)
Godronii Gren. 501 (2 β d)
Gouani Auct. it. (non W.) = aduncus
gracilis Babey (Philonot.) = parvulus
gracilis Clarke, DC. (non Schleich.) = Agerii
gracilis Schleich. 511 (32 α b)
gramineus Habl. = illyricus
gramineus L. 505 (11)
graminifolius Salisb. = prec.
grandiflorus Gr. et Godr. (*Marschlinsii* 512 (32 η b)
grandiflorus Lamotte (*Ficaria*) A 105 (16 α for.)
grandiflorus Payot (non L.) = quid?
granulatus Fiori (*intermedius*) A 107 (38 ε b)

Digitized by Google

RANUNCULUS I 500 (429)
granulatus Guss. (angulatus) = prec.
gregarius Brot. = flabellatus
Grenierianus Jord. = Villarsii
Haarbachii DNtrs. = velutinus
hederaceus L. 500 (1)
hederæfolius Salisb. = prec.
Heldreichianus Jord. A 106 (25 d)
heterophyllus Coss. et Germ. (aquatil.) = diversifol.
heterophyllus Freyn (trichophyll.) = Godronii
heterophyllus Lap. = crassicaulis
heterophyllus Lojac. (dubius) = macranthus
heterophyllus Weber = diversifol.
heucherifolius Presl 514 (37 δ)
hirsutus Curt. 514 (38 α d)
hirsutus Venanzi (acer) 513 (34 α c)
hirsutus Wimm. et Grab. (repens) = villosus
hololeucos Lloyd 501 (2 γ)
holosericeus Gaud. (glacialis) 504 (8 b)
homœophyllus Ten. 501 (1 β)
Hornschuchii Hpe. = Villarsii
hortensis Pers. = asiaticus
hortensis Schur = degeneratus
humilis Huet exs. = Xatartii
hybridus Biria 507 (19)
hybridus Payot = aconitifol. (a × β)
illyricus L. 509 (23)
illyricus Poir. = flabellatus
illyricus Vill. = monspeliacus
illyricus β Bert. = monspeliac. (α)
incrassatus Guss. = chius
incumbens F. Schultz (Ficaria) A 105 (16 α for.)
inermis Babey (sardous) 515 (38 α f)
inermis Koch (arvens.) = reticulatus
infestus Salisb. = repens
insubricus Ces. = procerus
insularis Viv. = flabellatus
intermedius Ball (Philonot.) = Xatartii
intermedius DC. (aconitifol.) 504 (10 α b)
intermedius Phil. = amplexicaulis
intermedius Poir. 515 (38 ε), A 107
intermedius Rouy et Fouc. (ophioglossifol.) 506 (14 α b)
isophyllus Freyn (aquatil.) 501 (2 α e)
isthmicus Boiss. 508 (20 β oss.)
Kernerianus Bolzon (rutæfol.) A 105 (5 β)
Kernerianus Fiori = prec.
laceratus Burn. (pyrenæus) = valesiacus
lacerus Bell. = aconitifol. × pyren., aconit. × plantag.
lacerus Rchb. = valesiacus

RANUNCULUS I 500 (429)
laciniatus Freyn (Aleæ) A 107 (37 β for.)
lætus Salisb. (non Wall.) = bulbosus
lanuginosus L. 513 (35), A 106
lapponicus Soleir. = Marschlinsii
lapponicus Vill. (non L.) = Villarsii
lateriflorus DC. 506 (15), A 105
latisectus Celak. (nemoros.) A 106 (33 γ for.)
latisectus Schur, G. Beck (acer) = acer v. serotinus
lejocarpus Rchb. (sardous) = inermis
leontinensis Freyn 501 (2 β b)
leptaleus Presl (an DC.?) = millefoliatus?
levis Celak. (sardous) = inermis
levis Chab. (ophioglossifol.) = fontanus
Lingua L. 505 (12), A 105
lobatus Clairv. = aconitifol.
lobatus Mœnch = muricatus
longifolius Lam. = Lingua
lucidus Poir. = repens
lugdunensis Jord. = monspeliac. (α)
luminarius Rigo hb. = silvicola
lutulentus Perr. et Song. = confervoides
luxurians DNtrs. (bulbos.) A 107 (37 α for.)
luzulæfolius Boiss. 505 (11 c)
macranthus Tod. 501 (2 α h)
macrophyllus Desf. 514 (37 ε)
magellensis Ten. 503, A 105 (7 β)
major Dum. = acer
Marchesinii Lojac. 508 (20 β), A 105
marinus Fr. = Baudotii
Marschlinsii Steud. 512 (32 η)
marsicus Guss. et Ten. = auricomus
maximus Lanza (flabellatus) = Heldreichianus
mediterraneus Griseb. = pseudo-bulbosus
medius Bernh. = aconitifol.
meridionalis Levier (bulbos.) = Aleæ
microcarpus Bert. = muricatus
millefoliatus Vahl 509 (26), A 106
minimus Gaud. (glacialis) A 105 (8 for.)
mitis Gilib. = auricomus
monspeliacus L. 509 (24), A 106
monspessulanus Jord. = cuneatus
montanus Ard. = Villarsii
montanus W. 511 (32 β), A 106
montan. δ Bert. = Marschlinsii
multifidus DC. (acer) 513 (34 α a)
multiflorus Dulac = aconitifol.

RANUNCULUS I 500 (429)
multiflorus Gilib. = polyanthemos
muricatus L. 515 (40), A 107
muricatus Mœnch = parviflorus L.
muriculatus Fiori (umbrosus) A 107 (35 β b)
Myosurus Afzel = Myosurus minim.
nanus Bouvier (montan.) A 106 (32 β for.)
napellifolius Crantz 513 (34 α)
napulosus Cald. (bulbos.) = Aleæ
natans Bég. (paucistamin.) A 105 (2 ζ b)
neapolitanus Gr. et Godr. = Aleæ
neapolitanus Ten. 514 (37 γ), A 107
nemorosus DC. 512 (33 γ), A 106
Nendtvichii Friv. = lateriflorus
nivalis Crantz = montanus?
nodiflorus W. et K., Auct. it. (non L.) = lateriflorus
nudicaulis Rouy et Fouc. 506 (16 γ)
œnanthefolius Ten. et Guss. = repens
ololeucos, vedi hololeucos
olyssiponensis Pers. = spicatus
omiophyllus Ten., vedi homœophyll.
ophioglossifolius Vill. 506 (14), A 105
ophioglossoides W. = prec.
oreophilus M. B. = Villarsii
orientalis L. 508 (20), A 105
orientalis Neilr. (nodiflor.) = lateriflorus
ovatus DC. = seg.
ovatus Pers. (Flammula) 505 (13 α c)
pallidior Chaix = hirsutus
palmatus Clairv. = aconitifol.
paludosus Wk. (non Poir.) = flabellatus
paluster Auct. it. (an Sm.?) = macrophyllus
paluster Wk. = Aleæ
panormitanus Tod. = neapolitanus?
pantothrix Brot. = trichophyllus
Pardalianches Steud. = Thora
parnassifolius L. 508 (4)
parviflorus DC. (bullatus) = bullatus
parviflorus DNtrs. (velutinus) A 107 (36 b)
parviflorus Gouan = parvulus
parviflorus Lamotte (Ficaria) 506 (16 α b), A 105
parviflorus L. 515 (39), A 107
parvulus Chiov. (apennin.) 512 (32 ζ b)
parvulus L. 514 (38 α b)
pauciflorus DC. (nemoros.) 512 (33 γ c)
pauciflorus Spr. = parviflorus L.

Digitized by Google

RANUNCULUS I 500 (429)
pauciflorus N. Terr. (*neapolitan.*) A 107 (37 γ for.)
paucistamineus Tausch 502 (2 ζ), A 105
pectinatus Dubois = capillaceus
peduncularis Viv. = dimorphorrhizus
pedunculatus Viv. (non Lge.) = sardous
peloponnesiacus Boiss. = Agerii
Pelosianus Chiov. (*sceleratus*) 516 (42 b)
peltatus Mœnch = aquatilis
peltatus Schrank 501 (2 α a), A 104
penicillatus Hiern. (*aquatil.*) 501 (2 α d)
petiolulatus Fouc. et Sim. A 107
Petiveri Koch = confusus, tripartitus
peucedanifolius All. = aquatilis (var. ε-θ, cfr. p. 501)
peucedanifolius DC. (aquat.) = fluitans
peucedanifolius Gilib. = prec.
peucedanoides Desf. = fluitans
Philonotis Pursh = repens
Philonotis Retz., Ehrh. = sardous
Philonotis e. Guss. = inermis
phœnicifolius DC. (*gramin.*) 505 (11 b)
plantagineus All. 502 (3 β)
platanifolius L. 504 (10 β)
pleniflorus Vis. et Sacc. (repens) A 106 = degeneratus, cfr. A 213
pollinensis Chiov. 512 (32 ε), A 106
pollinensis N. Terr. (montan.) = prec.
polyanthemoides Bor. = angustisectus
polyanthemos L. 512 (33), A 106
polymorphus All. = auricomus
polymorphus Roch. = geraniifolius
polyrhizus Soleir. = Marschlinsii
præcox Salisb. = Ficaria
pratensis Presl = procerus
pratensis Wimm. et Grab. (*auricom.*) A 106 (28 β d)
procerus Moris 514 (37 ζ)
prostratus Gaud. (repens) = reptabundus
prostratus Poir. = repens
pseudo-bulbosus Schk. 514 (38 α c)
pseudo-fluitans Hiern. (aquat.) = seg.
pseudo-fluitans Rouy et Fouc. 502 (2 θ c)
pseudopsis Jord. A 106 (28 β e)
Pseudo-thora Host = hybridus
Pthora Crantz = hybridus
Pumilio R. Br. = parviflorus
pumilus Thuill. = sardous
pusillus Bég. (*ophioglossifol.*) A 105 (14 α b)
pygmæus Whlnb. 516 (nota)
RANUNCULUS I 500 (429)
pyrenæus L. 502 (3 γ), A 105
quinquelobus Koch (aquat.) = elongatus
rectus Bor. = acer v. serotinus
renifolius St.-Lag. = Thora
reniformis Gilib. = Cassubicus
repens L. 510 (29), A 106, 213
reptabundus Jord. 510 (29 d)
reptans L. 506 (13 β)
reptans Rossi (*glacialis*) 504 (8 c)
reticulatus Sch. et Reg. 516 (41 c)
Revelieri Bor. 506 (14 γ)
rhipiphyllus Bast. A 105 (2 α for.)
rhombifolius Jord. et Fourr. = bullatus
romanus Somm. (*nemoros.*) 512 (33 γ b)
Rosani Ten. = trilobus?
roseus Heg. 504 (8 d)
rotundifolius DC. (*monspeliacus*) 509 (24 β a)
rupester Guss. 503 (21 β)
rutæfolius L. 503 (5), A 105
rutæfolius Mill. = millefoliat.
rutæfolius Pollini = Kernerianus
salicifolius Stokes = Lingua
sanguineus DC. (asiaticus) = seg.
sanguineus Mill. 508 (22 β)
sardonicus Gueld. = ophioglossifol.
sardous Crantz 514 (38), A 107
saxatilis Balb. 509 (24 β), A 106
saxatilis Vill. = prec.?
scaber Presl = millefoliatus
sceleratus L. 516 (42)
Schowii Tin. in Guss. A 213
Schraderianus F. et M. = chius
scorzoneræfolius Freyn (gramineus) = phœnicifol.
scutatus W. et K. = Thora
segetalis Kit. = arvensis
Seguieri Vill. 504 (9)
semicalvus Jord. et Fourr. 506 (17 b)
serbicus Vis. 511, A 106 (30)
sericeus W. = illyricus
serotinus Ugolini (*nemoros.*) A 106 (33 γ e)
serotinus Ugolini (*repens*) A 106 (29 e)
serotinus Wimm. et Grab. (*acer*) 513 (34 α b)
serratus DC. (*Flammula*) 505 (13 α b)
sessiliflorus R. Br. = parviflorus
siculus Presl = acer?
silvaticus Gr. et Godr. = nemorosus
silvaticus Thuill. = acer
silvaticus Vill. = acer?
silvicola Wimm. et Grab. (*auricom.*) A 106 (28 β c)
spicatus Desf. 508 (21)
spicatus Presl = rupester
spretus Jord. = nemoros. c. pauciflor.
RANUNCULUS I 500 (429)
squamosus Dulac = Thora
stagnatilis Ten. = trichophyllus
stagnatilis Wallr. = fœniculaceus
Steveni Andrz. 513 (34 β), A 106
subacaulis Bréb. (repens) = reptabundus
subtuberosus Gilib. = acer
tauriensis Steud. = pyrenæus
tenellus J. Gay (non Viv.) = Marschlinsii
Tenorii Jord. = illyricus
Tenorii N. Terr. (*garganicus*) A 106 (26 β for.)
tenuifolius Wimm. et Grab. (repens) = reptabundus
Thomasii Ten. p. p. 512 (33 β), A 106
Thomasii Ten. p. p. = garganicus
Thora L. 507 (18)
Thora S. et S. = brevifolius
Thora Sturm. = hybridus
tomentosus Mœnch = illyricus
Tommasinii Rchb. 514 (37 γ b)
trachycarpus F. et M. 516 (nota)
Traunfellneri Hpe. 503 (6 δ)
trichophyllus Chaix 502 (2 ε), A 105
trilobus Desf. 515 (38 γ)
trinacrium Huet = tripartitus
tripartitus DC. 501 (2 δ)
tripartitus Nolte = confusus
triphyllus Wallr. 501 (2 α c)
truncatus Koch (*aquatil.*) 501 (2 α b), A 104
tuberculatus Celak. (sardous) = sardous (α a)
tuberculatus DC. 516 (41 b)
uliginosus Fiori (*serbicus*) A 106 (30 b)
uliginosus W., Ten. = ophioglossifol.
umbrosus Ten. et Guss. 513, A 107 (35 β)
uncinatus Freyn (*flabellatus*) 509 (25 c)
valdepubens Jord. A 107 (37 α for.)
valesiacus Sut. 502 (3 β b)
variifolius Salisb. = auricomus
velutinus Ten. 513 (36), A 107
ventricosus Vent. = muricatus
verrucosulus Poir. ex Steud. = sardous, trilobus
verrucosus Presl = sardous (α)
verruculosus Guss. (heucherifol.) = procerus
Vespertilio Lojac. 500 (1 β b)
Villarsii DC. p. p., Koch 511 (32 γ)
Villarsii DC. p. p. = adunous
villosus Lamotte (*repens*) 510 (29 c)
Xatartii Lap. 514 (38 α e)
RAPA = Brassica
Napus Mill. = B. campestris
oblonga Mill. = prec.
rotunda Mill. = B. oleracea

Digitized by Google

RAPHANISTRUM = Raphanus
arvense Wallr. = R. Raphanistr.
fugax Nym. = R. fugax
innocuum Mœnch, Medic. = R. Raphanistr.
Lampsana Gærtn. = R. Raphanistr.
Landra Rchb. = R. Landra
maritimum S. F. Gray = R. marit.
segetum Baumg. = R. Raphanistr.
silvestre Asch. = R. Raphanistr.
vulgare S. F. Gray = R. Raphanistr.
RAPHANUS I 450 (380)
albiflorus Presl = Raphanistr. (α a)
albus Bœnn. = Raphanistr.
articulatus Stokes = Raphanistr.
arvensis Asch., Rossi = Raphanistr.
caudatus L. = sativus
cheiranthifolius W. = Brassica monensis
citrinus Gaud. (Raphanistr.) = flavus
cornutus Gilib. = Raphanistr.
Erucaria J. F. Gmel. = Brassica adpressa
Erucastrum Crantz = Brassica Eruc.
erucoides L. = Brassica oleracea
flavus Sch. M. (*Raphanistr.*) A 97 (1 α c)
fugax Presl 450 (1 β b)
infestus Salisb. = Raphanistr.
intermedius Rouy et Fouc. (*microcarpus*) A 97 (1 for.)
Landra Moretti 450 (1 β)
maritimus Sm. 450 (1 b)
microcarpus Lge. A 97 (1 var.)
niger Mill. 450 (2 c)
oleifer DC. (*sativ.*) 450 (2 a)
orbicularis Mill. = sativus
Radicula Pers. 450 (2 b)
Raphanistrum L. 450 (1), A 97
rotundus Mill. = sativus
sativus L. 451 (2)
segetum Clav. = Raphanistr.
silvester Lam. = Raphanistr. (α)
RAPHIS = Andropogon
Gryllus Desv. = A. Gryllus
RAPISTRUM I 451 (381)
ægyptiacum R. Br. = Ochthodium ægypt.
arvense All. = Raphanus Raphanistr.
bursæfolium Berger. = Calepina Corvini
Cakile Berger. = Cakile marit.
clavatum DC. = rugosum
dasycarpum Caruel (rugosum) = hirsutum
diffusum Crantz = perenne
glabrum Cariot (Linnæan.) = hisp. b. glabr.
glabrum Host 451 (2 α b)
RAPISTRUM I 451 (381)
glabrum Paol. (*hispanic.*) 451 (2 β b)
hirsutum Cariot (Linnæan.) = hisp. a. hirsut.
hirsutum Host A 212 (2 α a)
hirsutum Paol. (*hispanic.*) 451 (2 β a)
hirtum Host = rugosum
hispanicum Boiss. et Reut. 451 (2 β)
hispanicum Medic. = Crambe hispan.
hypogæum Duby = Morisia hypog.
indivisum Vis. et Sacc. (*rugos.*) A 97 (2 α c)
intermedium Lamotte = hispanic.
lejocarpum Guss. (rugos.) = glabrum
Linnæanum Boiss. et Reut = hispanic.
maritimum Berger. = Cakile mar.
microcarpum Rouy et Fouc. (*orient.*) A 212 (2 γ b)
orientale DC. 451 (2 γ), A 97, 212
orientale Moris = hispanic.
paniculatum Gærtn. = Neslea panic.
perenne Berger., All. 451 (1), A 97
perfoliatum Berger. = Myagrum perfol.
Raphanistrum Crantz = Raphanus Raphan.
rugosum Berger., All. 451 (2), A 97, 212
scabrum Mœnch = Crambe hispan.
scabrum Rouy et Fouc., Paol. (rugos.) 451 (2 α a) = hirsutum, cfr. A 212
venosum Nym. = hispanic.
RAPUNCULUS = Campanula
patulus Fourr. = C. patula
persicæfolius Fourr. = C. persicæfol.
verus Fourr. = C. Rapunculus
RAPUNCULUS = Phyteuma
comosus Mill. = Ph. com.
hemisphæricus Mill. = Ph. hemisph.
orbicularis Mill. = Ph. orbic.
pauciflorus Mill. = Ph. pauc.
spicatus Mill. = Ph. spicat.
RAZOUMOWSKYA = Arceuthobium
caucasica Hoffm. = seg.
Oxycedri F. W. Schultz = A. Oxycedri
REAUMURIA I 383 (350)
mucronata Jaub. et Spach = vermicul.
stenophylla Jaub. et Spach = vermicul.
vermiculata L. 383
REBENTISCHIA = Trisetum
flavescens Opiz = T. flavesc.
REICHARDIA III 424 (951)
crassifolia Fiori (*marit.*) 425 (1 β b)
REICHARDIA III 424 (951)
Cupaniana Fiori (*picroid.*) 425 (1 α d)
denticulata Fiori (*picroid.*) 424 (1 α c)
gracilis Fiori (*intermedia*) A 193 (1 γ for.)
integrifolia Mœnch = picroides
intermedia Fiori (*picroid.*) 425 (1 γ), A 193
maritima Fiori (*picroid.*) 425 (1 β)
orientalis Fiori (*tingit.*) 425 (2 β)
picroides Roth 424 (1), A 193
pinnatifida Fiori (*picroid.*) 424 (1 α b)
runcinata Mœnch = tingitana
subacaulis Wk. (*tingitana*) A 193 (2 var.)
tingitana Roth 425 (2), A 193
vulgaris Fiori (*picroid.*) 425 (1 α)
RESEDA I 409 (356)
abortiva Bég. (*lutea*) A 87 (3 for.)
abortiva Muell. (Luteola) = virescens
alba Groves = myriophylla
alba L. 410 (2), A 87
alba Moris = sardoa
angustifolia Strobl (suffruticul.) = Tenorei
aragonensis Loscos et Pardo A 212 (4 var.)
australis Muell. (*Luteola*) A 87 (1 for.)
brevipes Muell. (*alba*) 410 (2 α c)
calycinalis Lam. = Phyteuma
canescens L. Sp. (non L. Syst.) = Astrocarpus sesam. (α)
catinensis Tin. (lutea) = quid?
crispa Mill. = lutea (for.)
crispa Moris (Luteola) = dimerocarpa
crispa Pourr. = alba (for.)
crispa Ten. (*lutea*) 411 (3 α b)
crispata Caruel = dimerocarpa
crispata Lk. 410 (1 α b)
crispata Ten., Bert. etc. = Gussonei
decursiva Forsk. p. p. = Tenorei
difformis Strobl (suffruticul.) = alba (α)
dimerocarpa Muell. (*Luteola*) 410 (1 γ)
divergens Muell. (lutea) = gracilis
firma Muell. (alba) = Tenorei
fluminensis Simonkai = quid?
fragrans Texid. (Phyt.) = aragonensis
fruticulosa L. = alba
fruticulosa c. Guss. = Tenorei
fruticulosa d. Guss. = alba for. major
glauca Eichw. (non L.) = Luteola
glaucescens Guss. (fruticul.) = Hookeri
glaucescens Ten. (undata) = prec.

Digitized by Google

RESEDA I 409 (356)
glaucescens A. Terr. (Phyt.) A 87 (4 α for.) = aragonensis, cfr. A 212
gracilis Haussm. (lutea) = seg.
gracilis Rchb. = pulchella
gracilis Ten. 411 (3 γ)
Gussonei Boiss. et Reut. 410 (1 β)
heterophylla Schur (*lutea*) A 87 (3 for.)
hispidula Muell. (*lutea*) A 87 (3 for.)
Hookerii Guss. 410 (2 β), A 87
incisa Ten. A 87 (2 α for.)
inodora Rchb. 411 (4 β)
integrifolia Texid. (*Phyt.*) A 87 (4 α for.)
Jacquini Rchb. 411 (nota)
latifolia A. Terr. (lutea) = latisecta
latisecta Schur (*lutea*) A 87 (3 for.)
latisepala A. Terr. (*Phyt.*) A 87 (4 α for.)
levigata G. Don = gracilis
ligustica A. Terr. (*Phyt.*) A 87 (4 α for.)
litoralis J. Gay = Jacquini
longifolia Ten. (*lutea*) A 87 (3 for.)
lutea L. 411 (3), A 87
lutea β L. = crispa
lutea var. Groves = pulchella
lutea b. Guss. (1827) = mucronata
lutea b. Guss. (1854) = papillosa
lutea b. Moris = maritima
Luteola L. 410 (1), A 87
Luteola Munby = Gussonei
macrantha Muell. (*alba*) A 87 (2 α for.)
major Ten. (fruticulosa) = seg.
major A. Terr. (*alba*) A 87 (2 α for.)
major A. Terr. (*lutea*) A 87 (3 for.)
maritima Muell. (alba) = Hookeri
maritima Muell. (*lutea*) 411 (3 α c)
mediterranea Jacq. = Jacquini
microsepala A. Terr. (*Phyt.*) A 87 (4 α for.)
minor Muell. (*lutea*) A 87 (3 for.)
minor Ten. (fruticul.) = Hookeri
mucronata Tin. 411 (3 β)
mucronulata Guss. = mucronata
myriophylla Ten. 410 (2 γ)
oblongifolia Moris (sesam.) = Astrocarpus — oblong.
obtusata Rouy et Fouc. (alba) = alba for. major
odorata L. 411 (4 γ)
papillosa Genn. (*lutea*) A 87 (3 for.)
pauciflora N. Terr. (*lutea*) A 87 (3 for.)
pectinata Strobl (suffruticul.) = incisa

RESEDA I 409 (356)
Phyteuma DNtrs. = ligustica
Phyteuma L. 411 (4), A 87, 212
platysepala Rouy et Fouc. (Phyt.) = latisepala
pseudo-virens Hampe = crispata
pulchella Muell. (*lutea*) 411 (3 γ b)
purpurascens L. = Astrocarpus purp.
pygmæa Scheele = Astrocarpus — alpinus
Reyeri Porta et Rigo 411 (3 δ)
salicifolia A. Gray = Luteola
sardoa A. Terr. (*alba*) A 87 (2 α for.)
scabriuscula A. Terr. (lutea) = hispidula
sesamoides All. = Astrocarpus purpurasc.
sesamoides Delarbre = Astroc. — firmus
sesamoides L. = Astroc. sesam.
spathulata Moris (sesam.) = Astrocarpus — spath
stellata Lam. = Astrocarpus sesam. (α)
stricta Muell. (*lutea*) 411 (3 β b)
subpinnata Moris (lutea) = mucronata
suffruticulosa L. = alba (α)
suffruticulosa Vis. = myriophylla
Tenorei A. Terr. (*alba*) 410 (2 α b), A 87
tenuifolia Wallr. = pulchella
tenuisecta N. Terr. (*lutea*) A 87 (3 for.)
Tournefortii Schultes = Phyteuma
undata L. = alba
undata Strobl (suffruticul.) = Hookeri
undata Ten. (non L.) = Tenorei
undulata Fiori = undata, cfr. A 87
undulata Gilib. = Luteola
undulata Rouy et Fouc. (Phyt.) = undulatifol.
undulatifolia A. Terr. (*Phyt.*) A 87 (4 α for.)
virescens Horn. 410 (1 α c)
RETAMA = Genista
Duriæi Guss. (non Webb) = G. — Gussonei
Gussonei Webb = G. — Guss.
monosperma Boiss. = G. mon.
RHABDOCHLOA = Dactyloctenium
mucronata R. et S. = D. ægyptiacum
RHABDOTHECA = Launæa
chondrilloides Schultz, Webb = L. resedifolia
resedifolia Pomel = prec.
sonchoides Cass. = prec.
RHAGADIOLUS III 387 (928)
creticus All. = Hedypn. cretica
edulis Gærtn. 387

RHAGADIOLUS III 387 (928)
hebelænus DC. (*stell.*) 387
Hedypnois All. = Hedypn. polymorpha
intermedius Ten. 387
lampsanæfolius Mirb. = seg.
lampsanoides Desf. = intermedius
leiocarpus DC. (stell.) = stellatus (α)
leiolænus Boiss. (stell.) = stellatus (α)
lyratus Lam. = edulis
radiatus All. = Hyoseris rad.
scaber All. = Hyoseris scabra
stellatus Gærtn. 387
taraxacoides All. = Robertia tarax.
Zacintha All. = Zacyntha verrucosa
RHAMNOIDES = Hippophaë
Hippophaë Mœnch = H. rhamnoides
RHAMNUS II 213 (612)
adriatica Jord. = intermedia
Alaternus L. 213 (1), A 154
alnoides S. F. Gray = Frangula
alpina L. 215 (7)
amygdalina Desf. = oleoides
amygdalina Moris = persicæfolia
angustifolia Hort. ex C. Koch = seg.
angustifolia Presl, Guss. (*Alat.*) 213 (1 b), A 154
angustifol. Rouy (*saxatil.*) A 154 (5 α c)
australis Pers. = Paliurus Spina-Christi
cathartica L. 214 (4), A 154
Clusii W. = angustifolia
collina Salisb. = Alaternus
cordata Timb. (*alpina*) 215 (7 α b)
cuneifolia Poir. = oleoides
Frangula L. 215 (9), A 155
glaucophylla Somm. 215 (7 β)
græca Groves = infectoria ?
grandifolia Goir. (*saxatil.*) A 154 (5 α d)
horrida Salisb. = Paliurus Spina-Christi
hydriensis Hacq. A 154 (4 β)
inermis Gilib. = alpina
inermis Timb. (cathartica) = hydriensis
infectoria Koch = intermedia
infectoria L. 214 (5 β), A 155
integrifolia Orph. ap. Boiss. (Alatern.) = latifolia
intermedia Steud. et Hochst. 214 (5 α b)
latifolia Paol. (*Alatern.*) 213 (1 c)
longifolia Mill. = saxatilis
longifolia Rouy (Alatern.) = angustifol.
Lotus L. = Zizyphus Lotus
lucida Salisb. = Zizyphus sativa
Lycium Scop. = saxatilis
minor Mill. = infectoria
neapolitana DC. (pumila) = pusilla

Digitized by Google

RHAMNUS II 213 (612)
neapolitana Lk. = prec.
nemoralis Salisb. = Frangula
oleoides Lam. = infectoria
oleoides L. 213 (2)
Paliurus L. = Paliurus Spina-Christi
parvifolia Arc. (*Alatern.*) A 154 (1 d)
peduncularis Goir. (*saxatil.*) A 154 (5 α e)
pentapetala Gilib. = Frangula
pentaphylla Jacq., L. = Rhus pentaph.
persicæfolia Moris 213 (3)
Porquerollensis Shuttl. hb. = integrifolia
pubescens Griseb. (infectoria) = tinctoria
pumila Carnel, Parl. p. p. = glaucophylla
pumila Cav. = valentina
pumila Turra, L. 214 (6)
pumila Wulf., Bert. p. p. = rupestris
pusilla Ten. 214 (6 d)
repens Page = pumila
rotundifolia Dum.-Cours. = seg.
rotundifolia Presl (Alat.) = latifolia
rupestris DC. (pumila) = Villarsiana
rupestris Scop. 215 (8), A 155
rupestris Vill. = Villarsiana
sanguinea Pers. = seg.
Sanguino Orteg. = Frangula
saxatilis Jacq., L. 214 (5), A 154
serotina Goir. (*Frangula*) A 155 (9 c)
silvatica Serres = hydriensis
solutina Erndt. = cathartica
Spina-Christi L. = Paliurus Sp.-Christi
spinosa Gilib. = cathartica
subrotunda Rouy (*alpina*) 215 (7 α c)
subrotunda Rouy (*Frangula*) A 155 (9 b)
tinctoria Solla = Pirus communis, cfr. A 155
tinctoria W. et K. 214 (5 γ), cfr. A 155
tripartita Ucria = Rhus oxyacantha
valentina W. 214 (6 c)
Villarsiana Rouy (*pumila*) 214 (6 b)
Villarsii Lk. = pumila
vulgaris Pers. = Zizyphus sativa
vulgaris Presl (Alat.) = Alaternus (a)
Wulfenii Hpe. = rupestris
Wulfenii Roth = pumila
Zizyphus L. = Zizyphus sativa
RHAMPHOSPERMUM = Brassica
album Andrz. = Sinapis alba
arvense Andrz. = B. Sinapistrum
orientale Andrz. = prec.
RHAPONTICUM = Centaurea
Calcitrapa Scop. = C. Calcitrapa
ciliatum Lam. = C. nigra
heleniifolium Gr. et Godr. = C. — helen.
Jacea Scop. = C. Jacea
lyratum Nym. = C. lyrata
paniculatum Scop. = C. cristata
scariosum Lam. = C. Rhapontica
RHEUM
digynum Whlnb., R. Br. = Oxyria dig.
Rhaponticum Delarbre (non L.) = Rumex alpinus
RHINANTHUS II 457 (768)
Alectorolophus Poll. 458 (1), A 171, 215
alpinus Gaud. (minor) = stenophyll.?
angustifolius Gmel. 461 (3), A 171
angustifol. Koch (alpinus) = angustifol. (α)
angustifol. Koch (major) = serotinus
angustifol. Koch, Gr. et Godr. (minor) = stenophyll.
angustifol.-montanus L. (Crista-Galli) = angustifol. (α ?)
apterus Fr. (*major*) 460 (2 α b)
aristatus Celak. = angustifol. α et β lanceol.
arvernensis Chab. (*major*) 461 (2 η), A 171
Beyeri Fiori (*major*) A 171 (2 β')
brevifolius Bég. (*subalpin.*) 461 (3 γ b), A 171
buccalis Wallr. 458 (1 α b)
Burnati Chab. (*major*) 460 (2 ε), A 171
Crista-Galli α Freyn = Freynii
Crista-Galli L. p. p. = minor
Crista-Galli γ L. = Alectorol., major
demissus Fiori (*divaric.*) A 171 (2 γ b)
divaricatus Bég. (*major*) 460 (2 γ), A 171
Elephas L. = Elephas Columnæ
Facchinii Chab. 459 (1 η), A 171
Freynii Bég. (*Alector.*) 459 (1 ε)
glaber Rchb. (major) = major (α)
glacialis Pers. = lanceolatus
goniotrichus Chab. = Burnati, mediterr.
gracilis Chab. (*angustifol.*) 461 (3 β b)
hirsutus Gr. et Godr. (major) = Alector. (α)
hirsutus Lam. = Alector. (α)
italicus Chab. 460 (2 δ b)
Kerneri Bég. (*Alector.*) 459 (1 γ)
lanceolatus Bég. (*angustifol.*) 461 (3 β)
lanceolatus Kovats (alpinus) = prec.
RHINANTHUS II 457 (768)
major Ehrh 459 (2), A 171
maximus Lam. = Bartsia viscosa
maximus W. = Bartsia Trixago
mediterraneus Bég. (*major*) 460 (2 ζ), A 171
medius Bég. (*Alector.*) 458 (1 α a)
minor Ehrh. 462 (4), A 171
modestus Chab. (*Alector.*) 459 (1 δ), A 171
montanus Chab. (non Saut.) = divaricatus
neapolitanus Fiori (*Wettstein.*) A 171 (2 θ b)
ovifugus Chab. 460 (2 β), A 171
Pampaninii Chab. A 171 (3 β')
patulus Bég. (*Alector.*) 458 (1 β), A 171, 215
ramosus Chab. (goniotrichus) = divaricatus
Reichenbachii Drejer = apterus
rusticulus Chab. (*minor*) 462 (4 α b)
serotinus Schönh. (*divaricat.*) A 171 (2 var.)
Songeoni Chab. 460 (2 δ)
stenophyllus Schur 462 (4 β), A 171
Sterneckii Bég. (*Alector.*) 459 (1 ζ)
subalpinus Bég. (*angustifol.*) 462 (3 γ), A 171
versicolor W. = Bartsia versic.
villosus Facch. = Facchinii
villosus Pers. = Alector. (α)
viscosus Lam. = Bartsia visc.
vittulatus Gremli (*minor*) 462 (4 α c)
Wettsteinii Bég. (*major*) 461 (2 θ), A 171
RHIZOBOTRYA = Cochlearia
alpina Tausch = C. brevicaulis
RHODALSINE = Alsine
geniculata Williams = A. geniculata
glabrata Williams (genic.) = A. herniariæfolia
linearifolia Williams (procumb.) = A. — extensa
Poiretiana Williams (genic.) = A. genicul. (α)
procumbens J. Gay = A. geniculata
RHODAX = Helianthemum
canus Fuss = H. canum
Chamæcistus Spach = H. Chamæcistus
vinealis Fuss = H. vin.
RHODIOLA = Sedum
integrifolia Raf. = S. roseum
minor Mill. = S. roseum
odorata Lam. = S. roseum
rosea L. = S. roseum
Scopolii A. Kern. = S. roseum (for.)
RHODODENDRON II 299 (660)
albiflorum Goir. (*hirsut.*) A 161 (1 d)
album Sweet (*ferrug.*) 299 (2 b)
Chamæcistus L. = Rhodothamnus Cham.

Digitized by Google

RHODODENDRON II 299 (660)
ciliatum Caruel (hirsut.) = intermedium
ferrugineum L. 299 (2)
ferrug. × hirsut. Grembl. = Halense
Halense Grembl. A 161 (×)
hirsutum L. 299 (1), A 161
hirsutum × ferrugineum F. Schultz = intermed.
intermedium Tausch A 161 (×)
latifolium Hpe. (hirsut.) A 161 (1 c)
microphyllum Briq. (hirsut.) 299 (1 b)
polifolium Scop. = Andromeda polifolia
RHODOTHAMNUS II 299 (661)
baldense Goir. (Chamæcist.) A 161 (b)
Chamæcistus Rchb. 300, A 161
RHUS II 225 (621)
acutifolia Arc. (Coriaria) = Sumac
amœna Salisb. = Coriaria
angustifolia Rouy (Coriaria) = Sumac
arenaria Wierzb. = Cotinus
cacodendron Ehrh. = Ailantus glandulosa
canadensis Mill. = hirta
Coriaria L. 226 (3), A 157
Coriaria b. Guss. = humilior
Cotinus L. 225 (1), A 157
cratægiformis Pers. = oxyacantha
dioica Brouss. = oxyacantha
hirta Sudw. 225 (2)
Hypselodendrum Mœnch = hirta
humilior Nic. (Coriaria) 226 (3 c), A 157
levis Wall. = Cotinus
microphylla Strobl (Coriaria) = humilior
obovatifolia Stokes = Cotinus
oxyacantha Cav. 226 (4)
oxyacanthoides Dum.-Cours. = prec.
pentaphylla Desf. 226 (5)
radicans L. 226 (nota)
simplicifolia Salisb. = Cotinus
Sumac Targ.-Tozz. 226 (3 b)
Thezera Pers = pentaphylla
toxicarium Salisb. = seg.
Toxicodendron L. 226 (nota)
tridentata W. = pentaphylla
tripartita R. et S. = oxyacantha
typhina L. = hirta
velutina Wall. = Cotinus
zizyphina Tin. = oxyacantha
RHYNCHOCORYS = Elephas
communis Benth. (Elephas) = seg.
Elephas Griseb. = E. Columnæ
RHYNCHODIUM = Psoralea
bituminosum Presl = P. bitum.
palæstinum Presl = P. palæst.
RHYNCHOSPORA I 124 (140)
alba Vahl 124 (1), A 35
fusca Dryand. in Ait. 125 (2)
fusca Vahl (alba) = prec.
RHYNCHOSTYLIS = Chærophyllum
hirsutus Tausch = C. hirsut.
RHYTIDOSPERMUM = Matricaria
inodorum Sch. Bip. = M. inodorum
RHYTISPERMUM = Lithospermum
apulum Rchb. f. = L. apul.
arvense Lk. = L. arv.
incrassatum Rchb. f. = L. incrass.
minimum Rchb. f. = L. min.
tinctorium Lk. = Alkanna tinctoria
RIBES I 542 (449)
acerrimum Roch. = petræum
acidum Ehrh. = rubrum
aculeatum Salisb. = Grossularia
album Gilib. = alpinum
alpestre Wall. = Grossularia
alpinum Del. = petræum
alpinum L. 543 (6), A 114
carpathicum Kit. = petræum
caucasicum M. B. = petræum
caucasicum M. B. = petræum
ciliatum C. Koch = petræum
crispum Dulac = Grossularia
dioicum Mœnch = alpinum
dubium Jacques = Grossularia
glabrum Koch (Grossul.) = reclinatum
glanduloso - setosum Koch (Grossul.) = Grossularia (α a)
Grossularia L. 542 (1)
grossulariæfolium Rchb. = alpinum
grossularium St.-Lag. = Grossularia
hortense Lam. = rubrum
hybridum Bess. = Grossularia
leucocarpon Moris (rubrum) 543 (5 b)
leucocladon Rchb. = alpinum
multiflorum Kit. 543 (3)
multiflorum W. = alpinum
nigrum L. 543 (2)
officinarum Dum.-Cours. = rubrum
olidum Mœnch = nigrum
opulifolium Kit. = multiflor.
pendulum Salisb. = rubrum
petræum Sm. = rubrum
petræum Wulf. 543 (4)
petræum β Bert. = multiflorum
pilosum Rchb. = alpinum
pubescens Koch (Grossul.) = Uva-crispa
reclinatum L. 542 (1 α c)
rubrum L. 543 (5)
sardoum Martelli 543 (1 β)
sativum Syme = rubrum
Scopolii Rchb. = alpinum (for.)
silvestre Syme = rubrum
spicatum Robs. = rubrum
spicatum Schult., Rchb., Vis. = multiflorum
spinosum Lam. = Grossularia
tortuosum Rchb. = alpinum
Uva-crispa L. 542 (1 α b)
RIBES I 542 (449)
vinosum Dum.-Cours. = rubrum
viridissimum Rchb. = alpinum
vitifolium Host = multiflorum
vulgare C. Koch = Grossularia
vulgare Lam. = rubrum
RIBESIUM = Ribes
nigrum Medic. = R. nigr.
rubrum Medic. = R. rubr.
RICINOIDES = Tournesolia
tinctoria Mœnch = T. tinct.
RICINUS II 292 (653)
africanus Mill., W. 292 (β)
communis Desf., S. et S. = afric.
communis L. 292
europæus T. F. Nees = prec.
medicus Forsk. = communis
microspermus Moris (comm.) = africanus
scaber Bert. 292 (β b)
vulgaris Mill., Lam. = comm.
RIDOLFIA II 156 (545)
segetum Moris 156
RINDERA = Cynoglossum
Columnæ R. et S. = C. Col.
magellensis R. et S. = C. magell.
RINOPODIUM = Scilla
bifolium Salisb. = S bif.
RIPIDIUM = Saccharum
Ravennæ Trin. = S. Raven.
strictum Trin. = S. strict.
ROBERTIA III 395 (935)
hirta Duby (taraxac.) 395 (b)
pinnatifida Spr. = Hypochæris pinn.
taraxacoides DC. 395
tricholæna DC. (taraxac.) = hirta
ROBERTIA = Eranthis
hiemalis Mérat = E. hiem.
ROBERTIUM = Geranium
lucidum Picard = G. luc.
macrorrhizum Picard = G. macrorrhiz.
minutiflorum Fourr. = G. minutiflor.
modestum Fourr. = G. modest.
purpureum Fourr. = G. purpur.
vulgare Picard = G. Robertianum
ROBERTSONIA = Saxifraga
crenata Haw. = S. umbrosa
cuneifolia Haw. = S. cun.
dentata Haw. = S. hirsuta
Geum Haw. = S. Geum
hibernica Bree = S. umbrosa
hirsuta Haw. = S. Geum
pulita Haw. = S. umbrosa
punctata Haw. = S. Geum
serrata Haw. = S. umbrosa
stellaris Lk. = S. stellaris
umbrosa Haw. = S. umbr.
ROBINIA II 88 (504)
Acacia L. = Ps.-Acacia
echinata Mill. = prec.
fragilis Salisb. = prec.
monophylla Hort. A 142 (γ)
Pseudo-Acacia L. 88, A 142
umbraculifera DC. (Ps.-Acac.) 88 (β)
umbraculif. Loud. = prec.

Digitized by Google

ROCHELIA = Lappula
deflexa R. et S. = L. defl.
Lappula R. et S. = L. Myosotis
RODIGIA = Hypochæris
alliata G. Don = H. — Alliatæ
levigata Spr. = H. Achyrophorus
RŒMERIA I 484 (418)
hybrida DC. 484
violacea Medic. = hybrida
RŒMERIA = Amarantus
polygonoides Mœnch = A. polyg.
ROMULEA I 221 (219)
angustifolia Bég. (*Columnæ*) A 208 (1 α d)
Bulbocodium Seb. et Maur. 222 (4), A 51
Bulbocodium S. et S. = Linaresii
Bulbocod. × Bert. = Requienii
collina N. Terr. (*Bulbocod.*) A 51 (4 for.)
Columnæ Seb. et Maur. 221 (1), A 51, 208
contorta Moggr. (*ramiflora*) 222 (1 γ b)
corsica Jord. et Fourr. = ramiflora? (for.)
discreta Moggr. (*Columnæ*) 221 (1 α b)
elongata Baker 222 (nota)
flaveola Jord. et Fourr. = Rollii
grandiflora Jord. et Fourr. = ligustica
grandiflora Martelli (*ligustica*) A 51 (3 β b)
grandiflora Tin. 222 (4 b)
insularis Somm. A 51 (1 bis)
ligustica Parl. 222 (3 β), A 51
Linaresiana Tod. (Bulbocod.) = Linaresii
Linaresii DNtrs. = ligustica
Linaresii Parl. 222 (3), A 51
Linaresii Rolli = Rollii
modesta Jord. et Fourr. A 51 (1 α c)
multiflora Req. = Bulbocodium
neglecta Jord. et Fourr. = ramiflora? (for.)
Parlatorei Tod. A 51 (1 γ c)
parviflora Bég. (*ligustica*) A 51 (3 β c)
pulchella Jord. et Fourr. = grandiflora
purpurascens Parl. = Parlatorei
purpurascens Ten. 222 (2), A 51
ramiflora Ten. 222 (1 γ), A 51
Requienii Parl. 222 (3 γ)
Revelieri Jord. et Fourr. = insularis?
Rollii Parl. 222 (1 β), A 51
sardoa Genn. = ligustica
subalbida Jord. et Fourr. = Columnæ
tenuifolia Tod. exs. = Rollii
uliginosa Kze. = purpurascens
violacea Somm. (*ramifl.*) A 51 (1 γ d)
RORELLA = Drosera
longifolia Gilib., All. = D. longifol.
RORELLA = Drosera
rotundifolia Gilib., All. = D. rotundifol.
RORIPA = Nasturtium
amphibia Bess. = N. amphib.
amphib. × silvestr. Neilr. = N. amphib. × silv.
anceps Fuss = N. amphib. × silv.
armoracioides Fuss = N. armorac.
austriaca Spach = N. austr.
Camelinæ Spach = N. austriac.
indivisa Rchb. (amphib.) = N. amphib. (α a)
lippizensis Rchb. = N. lippiz.
nasturtioides Spach = N. palustre
palustris Bess. = N. palustre
pusilla Gelmi (palustr.) = N. — pusill.
pyrenaica Spach = N. pyren.
rivularis Rchb. = N. rivul.
rusticana Gr. et Godr. = N. Armoracia
silvestris Bess. = N. silv.
stolonifera Rchb. ex Nym. = N. amphib.
terrestris Celak. p. p., Beck = N. amphib. × silv.
variifolia Rchb. (amphib.) = N. — variifol.
ROSA I 586 (466)
abbreviata Cornaz (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
abietina Christ = rigidula
abietina Gren. A 129
abscondita Caldesi (*agrest.*) A 130 (14 for.)
abscondita Christ (sepium) = prec.
abscondita Christ = agrestis
aciculosa R. Kell. (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
aculeata R. Kell. (*pendulina*) A 132 (25 γ)
aculeata Ser. (alp.) 594 (25 γ) = prec., cfr. A 132
addensis Cornaz (abietina) = seg.
addensis R. Kell. (*uriensis*) A 130
adenophora R. Kell. (*uriensis*) A 130
adenotricha Burn. et Gremli p. p. (canina) = hirtella
adjecta Dés. A 132 (25 for.)
admista Burn. = pimpin. × elliptica
æmula Burn. et Gremli (*sicula*) 592 (nota)
affinis Rau A 127 (7 for.)
agrestis Savi 591 (14), A 130
agrest. × gallica Christ = gall. × agr.
alba All. = sempervir.
alba L. 588 (nota)
Allionii Burn. et Gremli A 127
alpina L. 594, A 132 (25 for.)
alp. × coriifol. Christ 594 (nota) = cor. × pendulina
alp. × glauca Uechtr. 594 (nota) = glauco × pendulina
ROSA I 586 (466)
alp. × mollis Christ = toment. × pendulina
alp. × toment. Christ 594 (nota) = toment. × pendulina
alp. × pomifera Christ 594 (nota) = pomif. × pendul.
alp. × pimpinellifol. Christ = pendul. × pimp.
alpina Pollini (canina) = platyphylla
alpinoides Dés. A 133 (×)
ambigua Caldesi (*inodora*) A 130 (14 subf.)
ambigua Desv. (sepium) = prec.
amphadena R. Kell. (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
amplissima Christ (*hispanica*) A 128
andegavensis Bast. 589 (6 β)
andoræ Burn. et Gremli = pervirens
anisopoda Christ = gall. × agrest.
apennina Woods = Seraphini
apricorum Rip. A 131 (17 for.)
aretiana Cornaz = seg.
aretiana Gremli (*Chavini*) A 129
arvatica Pug. A 130 (14 for.)
arvensis Huds. 588 (3), A 125
arv. × canina Christ 588 (nota)
arv. × gallica R. Kell. = gall. × arv.
arv. × sempervir. Pons et Coste = pervirens
arv. × sepium Christ = paradoxa
arvina Krock. = gall. × arv.
Aschersonii R. Kell. (*coriifolia*) A 128 (9 η for.)
aspera Schleich. = elliptica
atrata Christ (*arvens.*) A 125 (3 for.)
atrichoclada Borb. (*Heckeliana*) 593 (22 α)
atrovirens Viv. = sempervir.
australis Kern. = pomifera?
austriaca Crantz = gallica
baldensis Kern. A 125 (3 for.)
balearica Pers. = sempervirens
Banksiæ R. Br. 595 (nota)
bathyodonta R. Kell. (*velutina*) A 133 (×)
Baumgartneri R. Kell. (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
Beatricis Burn. et Gremli A 128
bellavallis Pug. 590 (9 θ)
bernardensis R. Kell. (*glauca*) A 129 (9 for.)
bernardens. R. Kell. (pimpinellifol. × pomifera) = prec.
bibracensis Sagorski = gall. × agrest.
bibracteata Bast. A 125 (3 for.)
Bicknellii Burn. (*sempervir.*) A 125 (2 ε)
Billietii Pug. A 131 (15 for.)
biserrata Mérat A 126 (6 for.)
biserrata R. Kell. (*uriensis*) A 130
blanda Ait. 594 (nota)
Blondœana Rip. 589 (6 ζ)

Digitized by Google

ROSA I 586 (466)
Bouvieri Crép. A 131 (15 for.)
Bovernieriana Christ (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
Bovernier. Lagg. et Delasoie = prec.
brachyclada Burn. (*pendulina*) A 133 (25 for.)
brachyclada Burn. et Gremli (alp.) = prec.
bracteata Gr. et Godr. (arvens.) = bibracteata
bradycarpa Jan = Heckeliana
Braunii J. B. Kell. = pimpin. × toment.
brevepubens Coste (semperv.) = pervirens
brevistyla Gelmi (*arvens.*) A 125 (3 for.)
Broteri Tratt. (*sempervir.*) A 125 (2 var.)
burmiensis Cornaz A 129 (10 for.)
Burnati Burn. et Gremli A 127 (6 η for.)
Burnati Christ (tomentella) = prec.
Burnati R. Kell. (*micrantha*) A 130 (12 for.)
Burnati R. Kell. (*Pouzini*) A 128 (8 for.)
caballicensis Pug. A 128 (9 for.)
calabrica Huter P. et R. = glutinosa
Caldesiana Christ (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
calvescens Burn. et Gremli (*micrantha*) A 130 (12 for.)
camadræ R. Kell. (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
canescens Christ (*tomentella*) A 127 (7 for.)
canina L. 589 (6), A 126
can. × rubigin. Nitschke = agrestis
can. × toment. Nitschke = dumetorum
capitata Christ (*dumetor.*) A 127 (6 η for.)
caryophyllacea Christ, Crép. (non Bess.) 590 (9 μ) = rhætica, cfr. A 129
caudina N. Terr. A 126
cenisia R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
centifolia L. 588 (nota)
Chaberti Dés. = gall. × can.
Chavini Rap. 590 (nota), A 129
cheriensis Caldesi (inodora) = seg.
cheriensis Dés. A 131 (15 for.)
chlorophylla Ehrh. = lutea
Christii R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
Christii R. Kell. (*pomif.* × *pendulina*) A 133
ciliatopetala Bess. = mollis
ciliatopetala Ilse (toment.) = micans
cinerea Rap. 590 (9 λ), A 129
cinerea Sw. = cinnamom.
cinnamomea Caruel = villosa
cinnamomea L. (1759) 594 (24), A 132
cinnamomea L. (1753) = pendulina
clavata R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
collina All. = dumetorum ?
collina DC. = submitis
collina Jacq. = gall. × dumet.
comes R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
comosa Rip. A 131 (17 for.)
complicata Christ (alp. × glauca) = Perrieri
complicata Gren. A 128 (9 for.)
concinna Lagg. et Pug. A 127 (7 for.)
conferta Pug. = uriensis
consanguinea Gren. = rubig. × gallica
conspicua Bor. = bibracteata
coriifolia Fr. 590 (9 η), A 128
coriifol. × *pendulina R. Kell.* A 133
Cornaeii Gremli A 131 (15 for.)
Cornazii R. Kell. (*glauca*) A 128 (9 for.)
coronata Crèp. = pimpin. × toment.
corrugata Caldesi A 125
corsica Gr. et Godr. (graveol.) = Seraphini
corymbifera Ard. (an Borck.?) = canina
Crepini Cornaz (*montana*) A 129 (10 for.)
Crepini Mièg. 590 (9 ζ)
Crepiniana R. Kell. (*pomif.* × *pimpinellifol.*) A 133
cretica Ser. (rubigin.) = glutinosa
cristata Christ (*toment.*) A 132 (20 for.)
cymosa Schleich. = elliptica
dalmatica Kern. = glutinosa
damascena Mill. 588 (nota)
Delasoiei Lagg. et Pug. 590 (9 ε)
Dematranea Lagg. et Pug. A 129
denticulata R. Kell. (*glauca*) A 128 (9 for.)
Deseglisei Bor. 589 (6 θ)
diodus R. Kell. (*glauca*) A 128 (9 for.)
discosa Caldesi (*agrestis*) A 130 (14 for.)
discosa Christ (sepium) = prec.
distans R. Kell. (*velutina*) A 133 (×)
Duffortii Pons et Coste = pervirens
dumalis Bechst. 589 (6 γ)
dumetorum Gaud. (tomentosa) = tomentella
dumetorum Thuill. 589 (6 η), A 127
dumosa Pug. A 132 (20 for.)
eglandulosa Christ (abietina) = Friesii
Eglanteria L. (1758) = rubiginosa
Eglanteria L. (1771) = lutea
Eglanteria N. Terr. = villosa
elata Christ (*gallica*) A 126 (5 β for.)
elliptica Tausch A 131 (15)
ellipt. × pimpinellifol. R. Kell. = pimp. × ellipt.
engolismensis Dés. et Guill. = pervirens
eriostyla Gelmi (gallica), err. pr. leiostyla
eriostyla R. Kell. (*gallica*) A 126 (5 α)
eriostyla Rip. et Dés. A 126 (6 for.)
erronea Rip. et Crép. = levipes
falcata Pug. A 128 (9 for.)
fallax R. Kell. (*micrantha*) A 130 (12 for.)
fallax R. Kell. (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
fallens Dés. = canina (α)
farinulenta Caldesi (*agrestis*) A 130 (14 for.)
farinulenta Christ (sepium) = prec.
faventina Burn. et Gremli 589 (nota)
ferruginea Auct. = rubrifolia
ferruginea Vill., cfr. p. 591 (nota)
fimbriata Gremli = toment. × gallica
flaccida Christ (*sempervir.*) A 125 (2 var.)
florentina Arc. (*Pouzini*) A 128 (8 for.)
florentina Christ (hispanica) = prec.
floribunda Guss. (*sempervir.*) A 125 (2 β b)
fœcundissima Muench. 594 (24 b)
fœtida Gren. (non Bast.) = abietina
fœtida Herrm., All. = lutea
formosula Gren. = gall. × agrest.
Forsythii Christ (*agrestis*) A 130 (14 for.)
Franzonii Christ 593 (nota), A 132 (21 β for.)
fraxinifolia C. C. Gmel. = blanda
Friedlænderiana Bess. A 127 (7 for.)
Friesii Lagg. et Pug. 590 (9 ι)
frutetorum Bess. A 129 (9 η for.)
fugax Gren. 590 (9 δ)
gallica L. 588 (5), A 126
gall. × *agrestis Crép.* 588 (nota), A 126
gall. × *arvens. Crép.* 588 (nota), A 126
gall. × *canina Crép.* 588 (nota), A 126
gall. × *dumetor. Crép.* 588 (nota)
gall. × *sempervir. Christ* A 126
gall. × sepium Crép. = gall. × agrest.
gallica-hybrida Gaud. = gallico × arvensis

Digitized by Google

ROSA I 586 (466)
gallicoides Baker (stylosa) = seg.
gallicoides Burn. et Gremli (arvens.) = paradoxa
gallicoides Dés. A 125 (3 for.)
Gallinariæ Burn. et Gremli A 128
Gaudini Pug. A 132 (21 β for.)
geminata Rau 126 (×)
Gennarii Huet = coriifolia (?)
gentilis Dés. = pendul. × pimpinell.
gentilis Maratti = pendulina ?
gentilis Sternb. A 133 (25 for.)
Gibellii R. Kell. (*pomif.*) A 132 (21 β for.)
Gibellii R. Kell. (villosa) = prec.
Giorgii Kell. et Chen. (*can.*) A 126 (6 for.)
glaberrima Dum. A 126 (6 for.)
glabrescens R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
glabriuscula R. Kell. (*uriensis*) A 130
glandulifera Crép. A 126 (3 for.)
glandulifera R. Kell. (*uriensis*) A 130
glandulifera Woods (canina) = andegavensis
glandulosa Bell. = pendulina
glandulosa Bess. = Jundzillii
glandulosa Christ (*dumetor.*) A 127 (6 η for.)
glandulosa Gren. (canina) = andegavensis
glandulosa Koch = montana
glandulosa Rau (canina) = dumalis
glauca Pourr. = rubrifolia
glauca Vill. 590 (9), A 128
glaucescens Desv. A 126 (6 for.)
glaucescens Ser. (canina) = glauca
glaucescens Wulf. A 130 (11 for.)
glauco × pendulina R. Kell. A 133
globosa Desv. (alp.) = alpina
glutinosa Guss. = Thuretii
glutinosa S. et S. 592 (18)
gracilens Crép. (mont.) = rubig. × mont.
grajica R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
grajica R. Kell. (*montana*) A 129 (10 for.)
grandidentata Desv. (canina) = andegavensis
grandiflora Rap. (sepium) = gall. × agrestis
graveolens Gren. 591 (15) = elliptica, cfr. A 131
graveolens β Gr. et Godr. = Pouzini
graveol. × rubigin. Cornaz = Cornazii
graveol. × rubigin. M. Schulze = rubig. × elliptica
Gremlii Christ = seg.
Gremlii Christ (*rubigin.*) A 131 (17 for.)

ROSA I 586 (466)
Grenieri Dés. A 132 (21 β for.)
Gussonii Burn. (*sicula*) A 132 (19 γ)
Hausmannii Gelmi (*pomif.*) A 132 (21 β for.)
Heckeliana Tratt. 593 (22)
hemitricha Rip. A 127 (6 η for.)
Hermaniæ Borzì (*arvens.*) A 126 (3 for.)
herporhodon Ehrh., W. A 126 (3 for.)
heteracantha R. Kell. (*uriensis*) A 130
hirtella Rip. A 126 (6 for.)
hirtifolia Braun A 129 (9 η for.)
hispanica Boiss. et Reut A 128 = Pouzini
hispida Desv. (canina) = andegavensis
hispida R. Kell. (*elliptica*) A 131 (15 for.)
hispida Caldesi (*Klukii*) A 131 (15 subf.)
hispidior R. Kell. (*tomentella*) A 127 (7 for.)
hispidissima R. Kell. (*uriensis*) A 130
hispido-caballicensis R. Kell. (*glauca*) A 128 (9 for.)
hispidula Rip. p. p. A 127 (6 for.)
hispidula Ser. (rubrifol.) = glaucesc.
Hoffmannii R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
homœacantha Burn. et Gremli (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
hybrida Schl. A 126 (×)
iberica Boiss. (rubigin.) = Klukii
Ilseana Crép. = rubrifolia
imitans R. Kell. A 131 (17 for.)
impariserrata Beyer = glauco × pendulina
imponens Rip. 590 (9 γ)
incanescens Borzì (*dumetor.*) A 127 (6 η for.)
incarnata Mill. A 126 (5 α for.)
inconsiderata Dés. = Pouzini
incurva Torn. = canina (?)
inermis R. Kell. (*uriensis*) A 130
inermis Turra = pendulina
infesta Kmet = gall. × agrest.
inodora Fr. A 130 (14 for.)
inodora Hook. = tomentella
insubrica Christ (*glaberrima*) A 126 (6 subf.)
insubrica R. Kell. (*abietina*) A 129
intermedia Fiori (*pendulina*) A 133 (25 for.)
intermedia Gr. et Godr. (alp.) = prec.
intermedia Gren. (Reuteri) = complicata
intermedia Tin. A 133
intromissa R. Kell. (*montana*) A 129 (10 for.)

ROSA I 586 (466)
involuta Sm. = pimpin. × toment.
irregularis Dés. et Guill. = pervirens
ischiana Crép. 589 (nota)
Jaccardii R. Kell. (*glauca*) A 128 (9 for.)
Janii Burn. et Gremli 592 (nota)
jenensis M. Schulze (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
Jordani Ard. = agrestis et elliptica
Jordani Dés. A 131 (15 for.)
jurana Gaud. (rubrifol.) = glaucesc.
Jundzilliana Bess. = seg.
Jundzillii Bess. 593 (23), A 23
Kelleri Crép. (*rubrifol.*) A 130 (11 for.)
Killiasii Christ (caryophyll.) = seg.
Killiasii Gremli (*rhætica*) A 129 (9 μ for.)
Klukii Bess. A 131 (15 for.)
Klukii Gren. = gall. × agrestis
Kosinsciana Ard. (non Bess.) = glauca
lactea R. Kell. (*rubigin.*) A 131 (17 subf.)
lagenaria Vill. A 133 (25 for.)
lagenoides Favrat (*pomif.*) A 132 (21 β for.)
lagenoides R. Kell. (*glauca*) A 128 (9 for.)
lagenoides R. Kell. (*pimpin.*) A 133 (26 α for.)
lagynoides R. Kell. (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
lantoscana Burn. et Gremli = meridionalis
lasiostylis Borb. (*canina*) A 127 (6 for.)
latibracteata Christ (mont.) = seg.
latibracteata R. Kell. (*Chavini*) A 129
latifolia Favrat (*elliptica*) A 131 (15 for.)
latifolia R. Kell. (*pendulina*) A 133 (25 for.)
latifolia Red. (sempervir.) = Broteri
latifolia Ser. (alp.) = pendulina for. latifol.
laxa R. Kell. (*Christii*) A 133 (×)
lejoclada Christ (*glut n.*) 592 (nota)
lejostyla Gelmi (*gallica*) A 126 (5 β)
lejostyla R. Kell. (graveol.) = elliptica f. liostyla
lejostyla Koch (sempervir.) = prostrata
leucantha Bast. = obtusifolia
leucantha R. Kell. (*micrantha*) A 130 (12 for.)
leventina R. Kell. (*dumetor.*) A 127 (6 η for.)
leventinensis R. Kell. (*pomif.*) A 132 (21 β for.)

Digitized by Google

ROSA I 586 (466)
Levieri Christ (caryophyll.) = seg.
Levieri Gremli (*rhaetica*) A 129 (9 μ for.)
levipes Gremli, Rouy (*arvens.*) A 126 (3 for.)
levis R. Kell. (*pendulina*) A 132 (25 α)
levis Ser. (alp.) 594 (25 α) = prec., cfr. A 132
libanotica Boiss. = glutinosa
Libertiana Tratt. = nemorosa
ligustica Burn. et Gremli (*sicula*) A 132 (19 α b)
ligustica Christ (Seraphini) = prec.
liostyla Christ (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
liostyla R. Kell. (*elliptica*) A 131 (15 for.)
Longae Cornaz (*tomentella*) A 127 (7 for.)
longepedunculata De la Soie = montana
longicruris Christ (pomifera) = seg.
longicruris R. Kell. (*Christii*) A 133 (×)
longipedunculata R. Kell. (*uriensis*) A 130
longistyla Burn. et Gremli (*dumetor.*) A 127 (6 η for.)
lucida Braitker (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
Lucomagni R. Kell. (*micrantha*) A 130 (12 for.)
lugdunensis Dés. A 131 (15 for.)
lutea Mill. 595 (27)
lutetiana Lém. 589 (6 α)
Maassii M. Schulze = rubigin. × agrestis
macrocarpa Caldesi (*Klukii*) A 131 (15 subf.)
macrocarpa Mérat = dumalis
macrophylla Favrat (*glauca*) A 128 (9 for.)
majalis Herrm. = cinnamom.
malmundariensis Lej. A 127 (6 for.)
Malyi Kerner A 133 (25 for.)
marginata Wallr. = gallico × canina
marsica Burn. et Gremli (montana) = mutata
marsica Godet = montana
Mayeri H. Braun A 128 (9 for.)
mediterranea Christ (rubella) = seg.
mediterranea R. Kell. (*pendul.* × *pimpin.*) A 133
mentita Dés. A 130 (14 for.)
meridionalis Burn. et Gremli A 130 (12 for.)
micans Dés. A 132 (20 for.)
micrantha DC. = Pouzini
micrantha Sm. 591 (12), A 130
micrantho × *rubiginosa M. Schulze* 591 (nota)
microphylla Caldesi (*Burnati*) A 127 (6 η subf.)
microphylla Caldesi (*provincial.*) A 126 (5 for.)
microphylla Crép. (*pomif.*) A 132 (21 β for.)
microphylla DC. (*sempervir.*) A 125 (2 δ)
microphylla Desf. (non Roxb.) = sempervir.
microtricha Borb. (*sempervir.*) A 125 (2 var.)
militaris R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
minor Guss. (sempervir.) = microphylla DC.
mollis Sm. 593 (21 α)
mollissima Fr. = mollis
mollissima W. = tomentosa
molvenoënsis Evers A 134
monregalensis Burn. et Gremli (*tomentella*) A 127 (7 for.)
montana Chaix 590 (10), A 129
mont. × canina,, cfr. Chavini
mont. × glauca, cfr. Chavini
mont. × rubigin. R. Kell. = rubig. × mont.
Morthieri Godet (Reuteri) = complicata
moschata Colla = sempervir.
moschata Herrm. 587 (1)
moschata Mutel = scandens
multiflora Bor. (arvens.) = bibracteata
multiflora Thunb. 587 (nota)
Murithii Pug. A 132 (21 β for.)
mutata Burn. (*Chavini*) A 129
mutata Burn. et Gremli (glauca) = prec.
myriacantha DC. 594 (26 γ)
myriodonta Christ (Reuteri) = seg.
myriodonta R. Kell. (*glauca*) A 128 (9 for.)
nebrodensis Guss. = canina var. (?)
nebrodensis Strobl exs., Christ = Strobliana
nemoralis Thory (rubigin.) = micrantha
nemorosa Dum. (rubigin.) = micrantha
nemorosa Libert A 130 (12 α)
nevadensis Boiss. et Reut. (*hispanica*) A 128
nevadensis Christ (hispanica) = meridionalis
nicaeensis Burn. et Gremli (*sempervir.*) A 125 (2 var.)
nitens Desv. A 127 (6 for.)
obovata Lagger et Pug. = rigidula
obtusifolia Desv. 589 (7 β), A 127
odoratissima Scop. = pendulina
oenensis Kern. A 127 (6 for.)
ogensis Cornaz (*pomif.*) A 132 (21 β for.)
oneliensis Burn. et Gremli (dumetor.) = seg.
oneliensis R. Kell. (*Pouzini*) A 128 (8 d)
orfanensis R. Kell. (*tomentella*) A 127 (7 for.)
orthacantha Burn. et Gremli (*canina*) A 127 (6 for.)
orthacantha R. Kell. (*dumetor.*) A 127 (6 η for.)
ovata Lej. A 126 (3 for.)
panormitana Tod. p. p. = moschata
paradoxa Burn. et Gremli A 126 (3 for.)
parcensis R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
Parnassi Burn. et Gremli (*Heckeliana*) 593 (22 β)
parvifolia Ser. (rubigin.) = Pouzini
parvula Guss. = rubiginosa
pastoralis R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
pauciflora Strobl (*sempervir.*) A 125 (2 β a)
pauciglandulosa Burn. et Gremli (*Pouzini*) A 128 (8 b)
pedemontana Burn. et Gremli (*tomentella*) A 127 (7 for.)
pendula Christ (rubella) = seg.
pendula R. Kell. (*pendulina* × *pimpin.*) A 133
pendula Maratti = pendulina?
pendula Salisb. = pimpinellif.
pendulina L. A 132 (25)
pendul. × *pimpinellifol. R. Kell.* A 133
permixta Dés. A 130 (12 for.)
Perrieri Songeon A 133 (×)
personata Gremli = pomifera
pesiana Burn. et Gremli (*dumetor.*) A 127 (6 η for.)
pervirens Gren. A 126 (×)
philophylla R. Kell. (*Christii*) A 133 (×)
pilosula Ser. (sempervir.) = ruscinonensis
pimpinellifolia L. 594 (26), A 133
pimpin. × alpina Reut. 594 (nota) = pendul. × pimpin.
pimpin. × *elliptica Burn.* A 133
pimpin. × graveolens Crép. = prec.
pimpin. × pomif. Crép. = pomif. × pimpin.
pimpin. × *tomentosa Christ* 594 (nota)
pinnatifida Ser. (rubrifolia) = glauca
platyphylla Burn. hb., Crép. (dumetor.) = oneliensis
platyphylla Rau A 127 (6 η for.)
plicata Burn. et Gremli (*micrantha*) A 130 (12 subf.)
Polliniana Spr. 126 (×)
Pollinii Poll. (pumila) = prec.
polyacantha Borb. A 130 (12 for.)
polyadena Burn. et Gremli A 128 (8 e)
pomifera Herrm. 593 (21 β), A 132
pomif. × coriifolia Christ = semproniana
pomif. × ferruginea Christ = Franzonii
pomif. × *glauca R. Kell.* A 132

Digitized by Google

ROSA I 586 (466)
pomif. × *pendulina R. Kell.* A 133
pomif. × *pimpinellifol. R. Kell.* A 133
Pouzini Tratt. 590 (8), A 128
prostrata DC. = seg.
prostrata Desv. (*sempervir.*) 588 (2 γ), A 125
provincialis Ait. 588 (nota), A 126 (5 var.)
pseudo-graveolens Moutin 591 (nota), A 131 (15 for.)
pseudo-mentita R. Kell. (*agrestis*) A 130 (14 for.)
pseudo-montana R. Kell. A 128 (9 for.)
pseudopsis Gremli A 129 (9 η for.)
pseudo-vestita R. Kell. (*velutina*) A 133 (×)
psilophylla Rau = gallico × canina?
pubescens Bouvier (salævens.) = coriifol. × pendulina
pubescens Coste (semperv.) = pervirens
pubescens Crép. (*Pouzini*) A 128 (8 o)
pubescens R. Kell. (ferruginea) = Kelleri
pubescens R. Kell. (*pendulina*) A 133 (25 for.)
pubescens R. Kell. (*uriensis*) A 130
pubescens Koch (alp.) = prec.
pubescens Rap. A 130 (14 for.)
pulchra Beyer = pomif. × pendulina
pulverulenta M. B. = glutinosa
pulvinaris Christ (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
pumila Christ (alp.) = seg.
pumila Fiori (*pendulina*) A 133 (25 for.)
pumila Jacq. A 126 (5 α for.)
pumila Scop. = gallica (?)
pustulosa Bert. = glutinosa
pyrenaica Gouan, Auct. 594, A 132 (25 β)
recondita Pug. A 132 (21 β for.)
recurva Christ (rubella) = seg.
recurva R. Kell. (*pendul.* × *pimpin.*) A 133
repens Scop. = arvensis
Reuteri Godet = glauca
Reuteri Godet (rubrifol.) = prec.
reversa W. et K. = pendul. × pimpinellifol.
Reynieri Hall. f. = montana
rhætica Gremli A 129 (9 μ)
Rhodani Chab. = gallico × arven.
rhoënsis R. Kell. (*pomif.*) A 132 (21 β for.)
rhoënsis R. Kell. (*villosa*) A 132 (21 β for.)
rigidula Pug. 590 (9 κ)
robusta Christ (Seraphini) = Gussonii
robusta Christ (sepium) = seg.
robusta R. Kell. (*agrestis*) A 130 (14 for.)

ROSA I 586 (466)
Rochemollensis R. Kell. (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
rosea Koch (*pimpin.*) A 133 (26 α for.)
rubella Auct. (an Sm.?) = pendul. × pimpinellifol.
rubelliflora Rip. = dumalis
rubicunda Hall. f. = rubrifolia
rubiginosa DNtrs. = agrestis et elliptica
rubiginosa L. 592 (17), A 131
rubiginosa β Bert. = agrestis
rubigin. × *agrestis R. Kell.* A 131
rubig. × *elliptica R. Kell.* A 132
rubig. × *gallica Christ* 592 (nota)
rubig. × micrantha R. Kell. = micr. × rubig.
rubig. × *montana R. Kell.* A 131
rubig. × *tomentella R. Kell.* A 131
rubrifolia Vill. 591 (11), A 130
rupestris Crantz = pendulina
ruralis Dés. A 126 (5 α for.)
ruscinonensis Dés. A 125
Sabini Woods = pimpin. × tomentosa
salævensis Rap. = glauco × pendulina
sanguisorbella Christ (mont.) = seg.
sanguisorbella De la Soie = rubig. × mont.
sarmentosa Godet (canina) = dumalis
scabrata Crép. 589 (6 ε)
scabriuscula Winch in Sm. A 132 (20 for.)
scandens Mill. 587 (2 β), A 125
Schleicheri Br. = hybrida
sclerophylla Scheutz A 127 (7 for.)
scotica Mill. = pimpinellifolia
semiglabra Rip. A 127 (6 η for.)
sempervirens L. 587 (2), A 125
semperv. × *arvensis Duff.* 587 (nota), A 126
semproniana Favrat et Schimp. f. (*pomif.*) A 132 (21 β for.)
seperina Sauzè = ovata
sepium Thuill. = agrestis
Serafini Viv. = Seraphini
Seraphini Guss. = Gussonii
Seraphini Viv. 591 (13), A 130
serpens Wibel = arvensis
serrata Christ (*micrantha*) A 130 (12 for.)
setosa R. Kell. (*pendulina*) A 133 (25 for.)
setosa Ser. (alp.) = prec.
sicula Christ (glutin.) = Thuretii
sicula Tratt. 592 (19), A 132
silvatica Bor. (an Tausch?) = gallico × arvensis
silvestris Herrm. = arvensis
simplicidens R. Kell. (*uriensis*) A 130
sinuatidens Christ (*tomentella*) A 127 (7 for.)

ROSA I 586 (466)
sospitelli Burn. (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
sphærica Ard. p. p. (non Gren.) = glauca
spinosissima Auct. 594 (26 β)
spinosiss. L. = pimpinellifolia
spinulifolia Dem. = toment. × pendulina
spreta Dés. = pimpinellifolia
stenosepala Christ A 133 (×)
Strobliana Burn. et Gremli 592 (16)
stylosa Desv. 588 (4), A 126
subbiserrata Borb. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
subcanina Christ (Reuteri) = seg.
subcanina R. Kell. 590 (nota), A 128 (9 for.)
subcinerea Gentil = dumetor.
subcollina Christ (*coriifolia*) 590 (nota), A 129 (9 η for.)
subcuneata Burn. (*rubigin.*) A 131 (17 for.)
subdola Dés. = gall. × agrest.
subhispida R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
subglobosa Ard. = pomifera
subglobosa Sm. A 132 (20 for.)
submitis Gren. A 127 (6 η for.)
subspoliata Dés. et Oz. p. p. = calvescens
sulphurea Ait. 595 (nota)
surculosa Woods = canina
syntrichostyla Rip. A 127 (6 η for.)
systyla M. et K. = stylosa
taraspensis Christ (caryophyll.) = seg.
taraspensis R. Kell. (*rhætica*) A 129 (9 η for.)
Tendæ Burn. et Gremli (dumetor.) = seg.
Tendæ Crép. (*Pouzini*) A 128 (8 f)
thermalis Cornaz A 129 (9 μ for.)
Thomasii Pug. A 129
Thuillieri (dumetor.) = submitis
Thureti Burn. et Gremli 592 19 (β), A 132
Thureti Burn. et Gremli (calabrica) = prec.
thuringiaca Crép. = micans
tiranensis Cornaz (*tomentella*) A 127 (7 for.)
tomentella Ard. p. p. = agrestis
tomentella Lém. 589 (7), A 127
tomentella × *coriifolia R. Kell.* A 127
tomentelloidea Crép. 589 (6 ι)
tomentosa Gaud. (canina) = coriifolia
tomentosa Sm. 593 (20), A 132
toment. × *gallica Borzì* 593 (nota)
toment. × *pendulina R. Kell.* A 133
toment. × pimpinell. R. Kell. = pimp. × tomentosa

Digitized by Google

ROSA I 586 (466)
trachyphylla Rau A 182 (28 for.)
transalpina Christ A 126 (8 for.)
transiens R. Kell. (*montana*) A 129 (10 for.)
transiens Kern. 590 (9 β)
transitoria R. Kell. (*canina*) A 127 (6 for.)
transitoria R. Kell. (*Chavini*) A 129
trichoneura Rip. A 127 (6 η for.)
tridentina Gelmi (*gallica*) A 126 (5 β for.)
tridentina Gelmi (*tomentella*) A 127 (7 for.)
trinacrinæ Burn. et Gremli 592 (nota)
ucenensis Boullu = sicula (α)
umbellata Godet (arvens.) = bibracteata
umbellata Guss. (*can.*) A 127 (6 for.)
umbellata Leers A 181 (17 for.)
uniserrata R. Kell. (*uriensis*) A 180
urbica Lém. A 127 (6 η for.)
uriensis Lagg. A 180
Vaccarii R. Kell. (*agrestis*) A 181 (14 for.)
Vaccarii R. Kell. (*coriifolia*) A 129 (9 η for.)
velutina Chab. = micans
velutina R. Kell. (*pomif.* × *pendulina*) A 188 (×)
venosa Sw. = glauca (for.)
veridica Burn. et Gremli (*sicula*) A 182 (19 α)
veridica Christ (Seraphini) = prec.
verticillacantha Mérat 589 (6 δ)
vestita Godet = toment. × pendulina
villosa L. 593 (21), A 182
villosiuscula Boullu = hemitricha
viscida Ard. (non alior.) = graveolens
viscosa Jan = Seraphini ?
vogesiaca Dés. = seg.
vosagiaca Desp. = glauca
Waitziana Tratt. = gallico × canina
ROSMARINUS III 14 (778)
albiflorus Bég. (*offic.*) 14 (e)
angustifolius Guss. (*offic.*) (14 c)
angustifolius Mill. = offic.
angustissimus Fouc. et Mand. (offic.) = angustifol.
erectus Pasq. (*offic.*) 14 (a)
humilis Ten. (*offic.*) 14 (b)
latifolius Mill. 14 (d)
officinalis L. 14
rupestris Pasq. (offic.) = humilis
ROSSOLIS = Drosera
rotundifolia Mœnch = D. rot.
septemtrionalis Scop. = prec.
ROSTRARIA = Kœleria et Trisetum
levis Trin. = Tr. paniceum
pubescens Trin. = K. phleoides
ROTALA II 127 (524)
filiformis Hiern. 127
ROTHIA = Andryala
cheiranthifolia Roth = A. integrifol.
runcinata Roth = A. sinuata
tenuifolia Tin. = A. tenuifol.
ROTTBŒLLIA
altissima Poir. = Hemarthria fasciculata
ascendens Brot. = Lepturus cylindric.
compressa L. p. p. = Hemarthria fascicul.
cylindrica W. = Lepturus cyl.
erecta Savi = Lepturus filif.
fasciculata Lam., Desf. = Hemarthria fasc.
filiformis Roth = Lepturus filif.
incurvata L. f. = Lepturus incurv.
incurvata S. et S. = Lepturus cylindric.
incurvata β Lam. = Lepturus filiformis
loliacea Bory et Chaub. = Lolium subulatum
monandra Cav. = Psilurus aristatus
spathacea Ten. = Hemarthria fascicul.
subulata Savi = Lepturus cylindr.
ROUBLÆVA I 318 (290)
Botrys Fuss = Chenopod. Botr.
multifida Moq. 318, A 65
ROUCELA = Campanula
Erinus Dum. = C. Erinus
ROUYA = Thapsia
polygama Coincy = Th. polyg.
RUBEOLA = Crucianella
angustifolia Fourr. = C. ang.
heterophylla Mœnch = seg.
latifolia Fourr. = C. lat.
linearifolia Mœnch = C. angustifol.
maritima Mœnch = C. mar.
RUBIA III 108 (817)
anglica Huds. = peregrina
angustifolia Guss. (peregr.) = peregrina (α)
angustifolia L. 108 (1 γ)
Aparine Baill. = Galium Apar.
australis Guss. (peregr.) = peregrina (α)
Bocconi Petagna = lucida
borealis Baill. = Galium bor.
Cruciata Baill. = Galium Cruc.
intermedia Gr. et Godr. (peregr.) = peregrina (α)
latifolia Gr. et Godr. (peregr.) = lucida
leviuscula Nic. (peregr.) = peregrina (α)
longifolia Poir. = angustifol.
lucida L. 108 (1 β)
Mollugo Baill. = Galium Moll.
palustris Baill. = Galium pal.
peregrina L. 108 (1)
pusilla Gill. = Galium pusill.
Requienii Duby = angustifol.
silvestris Mill. = seg.
tinctoria Salisb. = seg.
RUBIA III 108 (817)
tinctorum L. 108 (2)
tricornis Baill. = Galium tric.
vera Baill. = Galium verum
RUBUS I 578 (462)
acheruntinus Guss. = acher. subf. hypoleucos
acheruntinus Ten. 580 (3 ν b), A 122
adscitus Genev. = hypoleucos Lefèvre et P. J. Muell.
sætneus Torn. = hypoleucos Vest.
sætnicus Tin. ex Lojac. = tomentos.
agrestis W. et K. = cæsio × toment.
agrestis Weihe et Nees (cæsius) = arvalis
albidus Merc. = toment. × ulmifol.
amœnus Portsch. = dalmatinus
anomalus Arrhen. (Idæus) = obtusifol.
aquaticus Weihe et Nees (*cæsius*) 580 (3 ν c)
arvalis Rchb. (*cæsius*) 580 (3 ν a)
atlanticus Pomel = incanescens
australis Kern. = siculus
Bænitzii Utsch = Radula
baldensis Kern. = toment. × ulmifol.
Bayeri Focke 581 (3 υ c)
Bayeri Schm. (non Focke) = saltuum
Bellardi Weihe et Nees 581 (3 c)
Betckei Marss. 581 (3 φ b)
Bicknellii Burn. et Gremli in Bickn. = fruticos. (var.)
bifrons Vest 579 (3 γ)
bifrons × cæsius Gremli = cæsio × bifrons
brachyandrus Gremli 581 (3 υ b) = chlorostachys, cfr. A 122
brachybotrys Focke 580 (3 μ), A 122
brentonicus Evers A 123
brigianorum Focke (vagus) = seg.
brigianorum Gremli hb. A 122 (3 ι' c)
bruginoënsis Evers A 123
brutius N. Terr. (*cæsius*) A 122 (3 ν for.)
Burnati A. Favrat 581 (3 τ b)
cæsius Guss. = acher. subf. hypoleucos
cæsius L. 580 (3 ν), A 122
cæsio × bifrons P. J. Muell. 582 (nota)
cæsio × brachybotrys Sard. in Gelmi 582 (nota)
cæsio × Idæus P. J. Muell. = Idæo × cæsius
cæsio × macrostemon Focke 582 (nota)
cæsio × sulcat. Evers = maranzæ
cæsio × toment. Focke 582 (nota), A 123
cæsio × ulmifol. Focke 582 (nota)
calcareus Rip. 582 (nota)

Digitized by Google

RUBUS I 578 (462)
Caldesianus Focke 579 (3 ζ c), A 121
cancellatus Kern. = toment. × hirtus
candicans Guss. = collinus
candicans Weihe 579 (3 ζ a)
canescens DC. 580 (3 κ a)
canescens Wirtg. (toment.) = prec.
carpinetorum Freyn A 122 (3 var.)
carpinetor. × tomentos. Freyn = mortuorum
carpinifolius Weihe et Nees 582 (nota)
cercophyllus Focke A 122 (3 τ for.)
chlorostachys P. J. Muell. A 122 (3 υ b)
cinereus Carnel (discolor) = thyrsoideus
cinereus Rchb = canescens
clathrophilus Focke (Maassii) A 122 (3 var. b)
clathrophilus Sudre (vulgar.) = prec.
coarctatus P. J. Muell. = candicans
cognolensis Evers A 123
collinus DC. 580 (3 λ)
coloratus Gremli 581 (3 υ d)
corylifolius Sm. 580 (3 ξ)
cuneifolius Merc. (non Pursh.) = toment. × ulmifol.
Cupanianus Guss. 581 (3 σ b)
dalmaticus Guss. = rusticanus
dalmatinus Tratt. 579 (3 α b)
decumbens Evers A 123
deltoideus P. J. Muell. = cæsio × toment.
denudatus Schimp. (Idæus) A 121 (2 c)
discolor Weihe et Nees = fruticosus (var. α - ι)
discolor × toment. Evers = brentonicus
dissectus Ten. A 122 (3 κ d)
diversifolius Tin. (non Lindeb.) = discolor
dumetorum Weihe = corylifol.
dunensis Nœld. (cæsius) = acheruntinus
echinatus G. Br. (Idæus) A 121 (2 b)
euprepes Focke A 122 (3 var. c)
fasciculatus P. J. Muell. = cæsio × toment.
fastigiatus Weihe et Nees = suberectus, sulcatus
flexicaulis Genev. 582 (nota)
Francipani Tin. 579 (3 α c)
fruticosus Godr. = sulcatus
fruticosus Guss. = rusticanus
fruticosus L. 578 (3), A 121, 218
fruticosus Smith, Bert. = ulmifolius
fruticosus Weihe et Nees = thyrsoideus
frutic. × Idæus Gremli = suberectus
glabratus Godr. (toment.) = hypoleucos Vest
glandulosus Bell. A 122 (3 τ)
glandulos. β Bert. = Cupanianus
gorizianus Kern. A 122 (3 var.)
Guentheri Weihe et Nees 581 (3 υ), A 122
Gussonei Lojac. 580 (3 λ b)
hebes Boulay et Luc. = obtusangulus
hirtus Merc. = Villarsianus
hirtus W. et K. 581 (3 τ) = glandulosus, cfr. A 122
hirto × tomentos. Focke = toment. × hirtus
hybridus Vill. = glandulos.?
hypoleucos Guss. (toment.) = siculus
hypoleucos Lefèvre et P. J. Muell. A 122 (3 var.)
hypoleucos Strobl (acheruntinus) A 122 (3 ν b subf.)
hypoleucos Vest 580 (3 κ b)
Idæus L. 578 (2), A 121
Idæo × cæsius G. F. W. Mey A 121
incanescens Bert. 579 (3 ι), A 122
incanescens DC. (glandulos.) = prec.
inermis G. Br. (Idæus) A 121 (2 a)
insubricus Focke (vagus) A 122 (3 ι' a)
Kaltenbachii Metsch. A 122 (3 τ for.)
Karstianus Borb. = macrostemon
laciniosus Focke (Caldesianus) A 121 (3 ζ subf.)
lamprophyllus Gremli 581 (3 τ c)
Leesii Bab. = obtusifolius
Lejeunei Weihe et Nees A 122 (3 var.)
leucostachys Schleich. p. p. = vestitus
levis Bauch (Idæus) = inermis
ligusticus Burn. et Gremli in Bickn. = fruticos. (var.)
Linkianus Guss. (non Ser.) = discolor
Lloydianus Genev. 580 (3 κ c)
loppiensis Evers A 123
Maassii Focke A 122 (3 var.)
macroacanthos Weihe et Nees 582 (nota)
macrostemon Focke 579, A 121 (3 ε b)
macrostemon × hirtus Sard. in Gelmi 582 (nota)
macrostemonides Fritsch = cæsio × macrostemon
maranzæ Evers A 123
maritimus DNtrs. 579 (3 α d) = incanescens, cfr. A 122
meridionalis Kern. (toment.) = canescens
micans Quest. = hypoleucos Lefèvre et P. J. Muell.
microacanthus Kalt. = suberectus
Moggridgei Burn. et Gremli in Bickn. = fruticos. (var.)
molveno Evers hb = Vestii × cæsius
mortuorum Freyn = fruticos. (var.)
myrianthus Freyn A 121 (3 α for.)
napæus Focke A 122 (3 var. b.)
nemorivagus Rip. = corylifolius
nemorosus Hayne 580 (3 ξ a)
nemorosus Merc. = cæsio × toment.
Nessensis W. Hall = suberectus
nitidus Weihe et Nees A 122 (3 π')
Notarisii Burn. = incanescens
numidicus Focke = incanescens
nutans Vest = suberectus
obtusangulus Gremli 580 (3 η b)
obtusatus P. J. Muell. 582 (nota)
obtusifolius W. 121 (2 d)
oreteus Lojac. = cæsius
pallidus Weihe et Nees 582 (3 ψ)
panormitanus Tin. 579 (3 β)
patens Merc. 582 (nota) = cæsio × ulmifol.
pentamerus Borb. (sulcat.) 581 (3 ρ b)
pesianus Focke (vagus) = seg.
pesianus Gremli hb. A 122 (3 ι' b)
phyllostachys P. J. Muell. A 121 (3 ζ for.)
plicatus Weihe et Nees 581 (3 π)
præcox Bert. (non Weihe) 579 (3 δ)
præcox A. Kern. = sulcatus
pseudo-cæsius Weihe et Nees = Idæo × cæsius
pseudo-Idæus P. J. Muell. = suberectus
pseudo-Idæus Weihe et Nees (cæsius) = Idæo × cæsius
pubescens Burn. (non Weihe) = macrostemon
Questierii Lefèvre A 122 (3 var.)
Radula Weihe 579 (3 θ), A 121
Radula × ulmifol. Gremli 582 (nota)
reticulatus A. Kern. (non Wall.) = toment. × hirtus
robustus P. J. Muell. = macrostemon
rusticanus Merc. A 121 (3 α a)
rusticano × cæsius Evers A 123
rusticano × discolor Evers = tridentinus
saltuum Focke 581 (3 ϑ), A 122
saxatilis L. 578 (1)
setoso-glandulosus Wirtg. (toment.) A 122 (3 κ for.)
siculus Presl 580, A 122 (3 κ for.)
simplicifolius Vis. et Sacc. (glandul.) A 122 (3 τ d)
speciosus P. J. Muell. = bifrons
sphenoides Focke = toment. × ulmifol.

Digitized by Google

RUBUS I 578 (462)
suberectus Anders. 581 (30), A 122
subinermis Rupr. = suberectus
sublustris Lees (corylifol.) = corylifol.
sulcatus Vest 581 (3 ρ), A 122, 213
sulcato × rusticanus Focke = gorizianus
teretiusculus Kalt. 579 (3 η b)
thyrsanthus Focke 579 (3 ζ b)
thyrsoideus Wimm. 579 (3 ζ), A 121
tomentosus Borkh. 580 (3 κ), A 122
toment. × discolor Evers = cognolensis
toment.-glaber × *cæsius Evers* A 123
toment.-glaber × dalmatinus Evers = bruginoënsis
toment. × *hirtus Gelmi* 582 (nota)
toment. × rusticanus Focke = toment. × ulmifol.
toment. × *ulmifol. Gremli* 582 (nota), A 123
tridentinus Evers A 123
trifoliolatus Freyn (villicaul.) = carpinetorum
triphyllus Bell. (non Thunb.) = tomentos.
ulmifolius Schott 579 (3 α)
ulmifol. × cæsius Rouy et Cam. = cæs. × ulmif.
ulmifol. × toment. Kern. = toment. × ulmifol.
umbrosus Rchb. (cæsius) = aquaticus
vagus Focke A 122 (3 ι')
Vestii Focke A 213 (3 ρ c)
Vestii × *cæsius Evers* A 123
vestitus Weihe et Nees 579 (3 η)
vezzanensis Evers A 123
Villarsianus Focke 581 (3 φ)
viridis Doell (Idæus) = denudatus
viridulus Freyn 580 (3 ξ c)
Vrabelyianus Kern. = cæsio × toment.
Wahlbergii Arrh. 580 (3 ξ b)
Weiheanus Rip. = ulmifolius
RUDBECKIA III 300 (895)
digitata Mill. 300
laciniata L. 300
RUMEX I 297 (284)
Acetosa L. 301 (14), A 63, 211
Acetosa α Bert. = hortensis
Acetosella L. 300 (12), A 63
acetoselloides Ball 300 (12 c)
acidus Salisb. = Acetosa
aculeatus L. 300 (1 b)
acuminatus Campd. = Acetosa
acutus Curt. = sanguineus
acutus Kit. = silvester
acutus L. = crispo × obtusifol.
acutus Pollich = maritimus
acutus Schultz = maximus
acutus Sm. = conglomerat.
acutus Whlnb. = Hydrolapath.
adulterinus Wallr. = crispo × obtusif.
RUMEX I 297 (284)
ætnensis Presl 302 (16 β)
agrestis Fr. (*obtusifol.*) A 211 (8 β)
Allionii Lk. = arifolius
alpestris Jacq. = scutatus
alpinus Boiss. (*Acetosa*) 301 (14 δ), A 64
alpinus Gaud. (Acetosella) = minimus
alpinus L. 298 (1)
ambiguus J. Gay = crispo × obtusif.
amplexicaulis Lap. A 64, 211 (14 β for.)
angiocarpus Celak. (*Acetosella*) A 63 (12 a)
angiocarpus Murb. = prec.
angustatus Schur (Acetosella) = linifolius
angustifolius Koch (Acetosella) = linifolius
angustifolius Tausch (obtusifol.) = crispo × obtusif.
Anthoxanthus Murr. = maritimus
antiscorbuticus Salisb. = Hydrolapath.?
aquaticus Campd. = maximus
aquaticus L. 298 (2)
aquaticus Sm. = Hydrolapath.
aquat.-Hydrolapathum Mey. = maximus
arifolius All. 301 (14 β), A 64, 211
arvensis Dulac = Acetosella
auratus Sm. = sanguineus?
aureus Mill. = maritimus
bracteatus Doell (Nemolapath.) = conglomer.
britannicus Huds. (non L.) = Hydrolapath.
bucephalophorus L. 300 (11), A 63
campestris Savi (*non L.*) A 63 (6 b)
coloratus Gr. et Godr. (nemoros.) = sanguin.
Commersonii Campd. = Acetosa
condylodes M. B. = viridis
conglomeratus Murr. 299 (6), A 63
cretious Boiss. = tuberosus
crispus L. 298 (4), A 63
crispo × *obtusifolius Mey.* 299
cristatus Wallr. = crispo × obtusifol.
daghestanicus C. Koch = sanguineus
densiflorus Metsch (obtusifol.) = silvester
dentatus L. A 63
denticulatus C. Koch = pulcher
dictyocarpus Boiss. et Buhse = silvester
digynus L. = Oxyria dig.
divaricatus Bluff et Fing. (conglom.) = campestris
divaricatus Fr. = agrestis
divaricatus Hartm. (obtusifol.) = agrestis
divaricatus L. 299 (9 γ), A 211
divaricatus B Ten. = hirsutus
divaricatus Thuill. = campestris
RUMEX I 297 (284)
dubius Gunn. = maritimus
dubius Retz = conglomerat.
ebracteatus Doell (Nemolapath.) = sanguin.
echinatus Meisn. (pulcher) = suffocatus
Ehrenbergii Meisn. = dentatus
elongatus Guss. 298 (4 β), A 63
exsanguis Kit. = viridis
falcarius W. = Acetosella
ferrugineus W. = conglomer.?
Fischeri Rchb. = crispus
fissus Doell (Acetosella) = multifidus
fissus Koch (*Acetosa*) 301 (14 α c)
Friesii Gr. et Godr. = agrestis
gentilis Lœnnr. = crispo × obtusif.
glaber Forsk. = Emex spinosa
glaucescens Guss. (scutatus) = glaucus
glaucus Jacq. 302 (16 α c)
glomeratus Schreb. = conglom.
gracilis Eckstr. = crispo × obtusif.
gracilis Meisn. (*Acetosella*) A 63 (12 f)
Gussonei Arc. = alpinus
gymnocarpus Celak. (Acetosella) = acetoselloides
hastatus Lk. (non Don) = scutatus
hastifolius Guss. (non M. B.) = alpinus
hastifolius M. B. = scutatus
Helolapathum Drej. = aquaticus
heterophyllus Schultz = maximus
Hippolapathum Fr. = aquaticus et domesticus
hirsutus Ten. A 211 (9 γ c)
hirtulus Freyn (*Acetosa*) 301 (14 α b)
hirtus Gr. et Godr. (pulcher) = divaricatus
hispanicus C. C. Gmel. = arifolius
hispanicus Koch = hortensis
hortensis Vis. 301 (14 γ)
Hydrolapathum Huds. 298 (3)
infestus Salisb. = Acetosella
intermedius DC. 301 (15 β), A 64
intermedius Guss. = thyrsoides (α)
intermedius Sturm = fissus
Klotzschianus Meisn. = dentatus
lacerus Wallr. (Acetosella) = multifidus
latifolius Mey. = aquaticus
latifolius Trimen (Hydrolapath.) = maximus
latifolius Whlnb. (acutus) = maximus
levigatus W. = silvester
limosus Thuill. A 63 (10 β)
linifolius G. F. W. Mey. (*Acetosella*) A 63 (12 γ)
Luederi Muent. = crispus
Lunaria L. 302 (17)
luxurians Pourr. = arifolius

Digitized by Google

RUMEX I 297 (284)
maritimus L. 300 (10), A 63
maritimus With. = limosus
maximus Campd. = alpinus
maximus Gmel. = Hydrolapath.
maximus Schreb. 298 (3 β)
membranaceus Poir. = bucephalophorus
micranthus Campd. = Acetosa
microcarpus Dœll (obtusifol.) = silvester
minimus Wallr. (*Acetosella*) A 63 (12 e)
montanus Desf., Poir. = arifol.
multifidus All. 301 (15 β b)
multifidus L. 300 (12 b)
nebroides Campd. = alpinus
Nemolapathum Ehrh. = conglomerat. et sanguineus
Nemolapathum Wallr. = sanguineus
nemorosus Schrad. = viridis
nivalis Heg. et Heer 301 (14 s)
obtusifolius L. 299 (8), A 210
obtusifolius Wallr. = agrestis
olympicus Boiss. = Patientia?
oravicensis Wierzb. = sanguineus
oxylapathum Gueld. = agrestis
oxylapathum Wallr. = crispo × obtusifol.
paludosus With. = conglomer.
paluster Fr. (Hippolapathum) = aquaticus
paluster Sm. 300 (10 β) = limosus, cfr. A 63
Patientia L. 298 (5), A 63
polygamus Cav. = Lunaria
pratensis Dulac = Acetosa
pratensis M. et K. = crispo × obtusifol.
procurrens Wallr. (Acetosella) = repens
Pseudo-Acetosa Bert. = Acetosa (α)
pseudo-alpinus Hœfft = alpinus
pubescens Ambrosi (*pulcher*) A 63 (9 γ b)
pubescens Guss. (*scutatus*) 302 (16 α b)
pubescens N. Terr. (*thyrsoides*) A 64 (15 α b)
pulcher L. 299 (9), A 63, 211
pusillus Delarb. = campestris
pyonocarpus Wallr. = campestris
pygmæus Kittel (Acetosella) = minimus
quadridentatus Ehrenb. = dentatus
Regeli F. Schm. = crispus
reniformis Marches. (*scutatus*) A 64 (16 γ)
reniformis Radde = Oxyria digyna
repens DC. (*Acetosella*) A 63 (12 d)
Rugelii Meisn. = obtusifol.
sagittifolius Campd. = Acetosa
sanguineus L. 299 (7), A 63
scutatus L. 302 (16)
sepium M. B. = silvester
silvaticus Herb. = sanguineus
silvester Wallr. = A 210 (8 α)

RUMEX I 297 (284)
spinosus L. = Emex spin.
stenophyllus Timb. et Jeanb. (non Ledeb.) = Acetosa
strictus Lk. = dentatus
subalpinus Schur (obtusifol.) = silvester
subalpinus Simk. = prec.
subcordatus Dœll (scutatus) = triangularis
suffocatus Moris 299 (9 δ)
supinus Campd. = repens?
syriacus Meisn. = obtusifol.
thyrsoides Desf. 301 (15), A 64
thyrsoides Gr. et Godr. = intermedius
Tournefortii Campd. = intermedius
triangularis DC. = Acetosa (α)
triangularis Guss. = alpinus
triangularis Koch (*scutatus*) A 64 (16 α d)
tuberculatus C. Koch = pulcher
tuberosus L. 300 (18), A 64
tuberosus Ten. = alpinus
turcicus Boiss. = elongatus
uliginosus Guss. = limosus
uncinatus Boiss. (bucephaloph.) = aculeatus
uncinatus Ehrenb. = pulcher
undulatus Bess. = aquaticus
undulatus Schrank = conglomer.
verticillatus Ucria = conglomer.?
vesicarius L. 302 (18)
vinealis Timb. et Jeanb. = Acetosa
virgatus Haenke = conglomer.
viridis Mey. (marit.) = limosus
viridis Sm. (*sanguineus*) 299 (7 b), A 63
viridis Steud. = prec.
Wallrothii Nym. = agrestis
Winterlii Zuccagni = campestris
Woodsii DNtrs. 299 (9 β)
RUMINIA = Leucojum
hiemalis Parl. = L. hiem.
nicæensis Jord. et Fourr. = L. hiemale
RUPPIA I 155 (157)
brachypus J. Gay 155 (δ) = brevirostris, cfr. A 40
brevirostris Agardh (*marit.*) A 40 (δ)
drepanensis Tin. 155 (β)
maritima L. 155, A 40
maritima Rodr. = brevirostris
minor M. et K. (marit.) = rostellata
obliqua Meyer = rostellata
recta Moris (marit.) = brevirostris
rostellata Koch 155 (γ), A 40
rostrata Agardh (marit.) = prec.
spiralis L. hb., Dum. 155 (α)
trichodes Dur. = drepanensis
RUSCUS I 209 (209)
aculeatus L. 210 (1), A 207
angustifolius Boiss. (*aculeat.*) 209 (1 b)
angustifolius Parl. (Hypogloss.) = microglossus

RUSCUS I 209 (209)
Barrelieri Goir. (*aculeat.*) 209 (1 c)
Hypoglossum L. 210 (2 β)
Hypophyllum L. 210 (2)
loricatus Goir. (*aculeat.*) A 207 (1 d)
macroclados Goir. (*aculeat.*) A 208 (1 f)
microclados Goir. (*aculeat.*) A 207 (1 e)
microglossus Bert. 210 (2 β f)
minutissimus Goir. (*aculeat.*) A 208 (1 g)
stenoclados Goir. (aculeat.) = angustifol.
RUTA II 255 (684)
altera Mill. = graveolens
angustifolia Pers. = chalepensis
bracteosa DC. 255 (1 β)
chalepensis L. 255 (1), A 159
chalepensis S. et S. = bracteosa
ciliata Mill. = graveolens
corsica DC. 255 (2)
crithmifolia Moric. 256 (4 c)
divaricata Salzm. = corsica
divaricata Ten. 256 (4 b)
graveolens L. 256 (4), A 159
hortensis Mill. = graveolens
latifolia Salisb. = chalepensis
latisecta Goir. (*graveol.*) A 159 (4 d)
legitima All. = montana
macrophylla Sol. = bracteosa
minor All. (graveol.) = chalepensis
montana L. (graveol.) = seg.
montana Mill. 256 (3)
officinalis Pall. = graveolens
patavina L. 256 (5)
punctata Presl = chalepensis
silvestris Mill. = montana
tenuifolia Vill., Gouan. = montana
virens Goir. (*graveol.*) A 159 (4 e)
RUYSCHIANA = Dracocephalum
fasciculata Clairv. = D. Ruyschiana
laciniata Mill. = D. austriacum
spicata Mill. = D. Ruyschiana
RYNCHOSPORA = Rhynchospora

SABBATIA = Satureja
corymbosa Mœnch = S. Juliana
SABINA = Juniperus
Lycia Ant. = J. phœnicea
officinalis Garcke = J. Sabina
phœnicea Ant. = J. phœn.
prostrata Ant. = J. Sabina
sterilis Dur. = J. Sabina
turbinata Ant. = J. turbin.
virginiana Ant = J. virg.
vulgaris Ant. = J. Sabina
SABULINA = Alsine
austriaca Rchb. = A. austr.
biflora Rchb. = A. bifl.
capillacea Rchb. = A. liniflora
cherlerioides Rchb. (lanceol.) = A. — cherler.
conferta Fourr. = A. mediterr.

Digitized by Google

SABULINA = Alsine
dalmatica Rchb. (graminifol.) = A. — dalm.
fastigiata Rchb. = A. fasciculata
Gerardi Rchb. = A. Ger.
graminifolia Rchb. = A. gram.
hybrida Fourr. = A. hybr.
lanceolata Rchb. = A. lanc.
laricifolia Rchb. = A. liniflora
macrocarpa Rchb. = A. Kitaibelii
mediterranea Rchb. = A. medit.
mucronata Rchb. = A. mucr.
polygonoides Rchb. = Mœhringia polyg.
Ponæ Rchb. = Mœhringia Ponæ
recurva Rchb. = A. recurva
rostrata Rchb. = A. mucronata
striata Rchb. = A. laricifolia
tenella Schur = A. verna
tenuifolia Rchb. = A. tenuif.
verna Rchb. = A. verna
Villarsii Rchb. = A. Villars.
viscidula Rchb. (tenuif.) = A. hybrida
SACCHARUM I 46 (46)
adpressum Kit. = strictus
ægyptiacum W. 46 (1)
biflorum Forsk. = ægyptiac.
cylindricum Lam. = Imperata cylindr.
europæum Pers. (cylindr.) = prec.
laguroides Pourr. = prec.
Ravennæ Murr. 47 (2), A 13
Siska Cav. = prec.
spontaneum L. p. p. = ægyptiac.
strictum Arc. (non Nutt.) = seg.
strictum Spr. 47 (3)
Teneriffæ L. f. = Tricholæna Tener.
SAFRAN = Crocus
officinarum Medic. = C. sativus
SAGINA I 340 (328)
alpina Fr. (stricta) = stricta
ambigua Bischoff (apet.) = barbata
apetala Ard., L. 340, 610 (1 β), A 68
arenarum Bég. (*apetala*) A 68 (1 β for.)
barbata Fenzl (*apetala*) A 68 (1 β for.)
Baumgarteni Simk. = Linnæi b. glandul.
breviflora Gilib. = procumbens
bryoides Frœl. 340 (1 α b)
cæspitosa Fouc. et Mand. (*pilifera*) A 69 (2 δ for.)
ciliata Fr. 340, A 68 (1 β')
ciliata Neilr. (proc.) = bryoides
corollina Fenzl (proc.) = procumb. (a)
corsica Fouc. et Sim. (*marit.*) A 68 (1 γ for.)
corsica Gr. et Godr. (glabra) = pilifera
corsica Jord. 340 (1 α c)
debilis Jord. A 68 (1 γ for.)
SAGINA I 340 (328)
decandra Fenzl (Linnæi) = Linn. (α)
decumbens Horn. (apet.) = ciliata
densa Jord. A 68 (1 γ for.)
depressa Schultz = ciliata
elongata Gr. et Godr. (marit.) = debilis
erecta Celak. (nodosa) = nodosa
erecta Lam. = apetala
erecta L. = Cerastium erect.
erecta O. F. Muell. = marit.
filicaulis Jord. A 68 (1 β' for.)
filiformis Pourr. = marit.
glaberrima Gürke (*ciliata*) A 68 (1 β' for.)
glaberrima Neilr. (proc.) = procumb. (a)
glaberr. F. W. Schultz (apetala) = cil. for. glaberr.
glabra Fenzl 341 (2 γ), A 69
glabra Rouy et Fouc. (nodosa) = nodosa
glabrata F. W. Schultz (apet.) = imberbis
glabrata Rouy et Fouc. (*subul.*) A 68 (2 β c)
glacialis Fouc. et Mand. (*procumb.*) A 68 (1 α d)
glandulifera G. Beck (Linnæi) = Linn. b. glandulosa
glandulosa Gürke (*glabra*) A 69 (2 γ b)
glandulosa Lge. (*Linnæi*) 340 (2 α b)
glandul. Rouy et Fouc. (repens) = glabra b gland.
glandul. F. W. Schultz (apet.) = ciliata
glandul.-ciliata F. W. Schultz (apet.) = barbata
glandul.-pubescens Lge. (apet.) = barbata
glauca Strobl (*marit.*) A 68 (1 γ for.)
gracilis Fouc. et Sim. (*subul.*) A 69 (2 β for.)
imberbis Fenzl (*apetala*) A 68 (1 β a)
inconspicua Rossm. = apetala
intermedia Bég. (*apetala*) A 68 (1 β for.)
Linnæi Bolzon = stricta Somm.
Linnæi Presl 340 (2), A 68
macrocarpa Maly 340 (2 α c)
maritima D. Don 340 (1 γ), A 68
melitensis Gulia = ciliata
muscoides Koch = bryoides
nevadensis Boiss. et Reut. A 68 (2 α for.)
nodosa Fenzl 341 (3)
nodosa Nolte (proc.) = procumb. (a)
octandra Zis = Cerastium — octandrum
patula Jord. = ciliata
pilifera Fenzl 341 (2 δ), A 69
præcox Bœnn. (proc.) = procumb. (a)
procumbens L. 340 (1), A 68
quaternella Schloss. = apetala
SAGINA I 340 (328)
repens Burnat = glabra
Reuteri Lojac. (non Boiss.) = ciliata
Revelieri Jord. et Fourr. 340 (2 β b)
Rodriguezii Lojac. (non Wk.) = maritima
ruderalis Bég. (apetala) = imberbis
saginiformis St.-Lag. = Linnæi
saginoides Dalla Torre = Linnæi
saxatilis Wimm. = Linnæi
Spergella Fenzl = Linnæi
stricta Fr. A 68 (1 γ for.)
stricta Somm. (*subul.*) A 68 (2 β d)
subulata Presl 340 (2 β), A 68
urceolata Viv. = marit.
viridis Strobl (*marit.*) A 68 (1 γ for.)
SAGITTARIA I 160 (168)
acuminata Sm. = sagittæfol.
aquatica S. F. Gray = sagitt.
Bollei Asch. et Græbn. (*sagitt.*) A 41 (b)
butomoides Asch. et Græbn. (*sagitt.*) A 41 (b subf.)
Doniana Sweet = sagittæfol.
edulis Schl. = sagittæfol.
gracilis Bolle (non Torrey) (sagitt.) = Bollei
hastata D. Don = sagittæfol.
heterophylla Schreb. A 41 (c)
macrophylla Bunge = sagitt.
major Scop. = sagittæfol.
minor Mill. = sagittæfol.
monoica Gilib. = sagittæfol.
obtusa Bolle (*sagitt.*) A 41 (d)
pumila Asch. et Græbn. (*sagitt.*) A 41 (a subf.)
sagittæfolia L. 160, A 40
sinensis Sims = sagittæfol.
trifolia L. = sagittæfol.?
stratiotoides Bolle (*sagitt.*) A 41 (e subf.)
vallisneriifolia Coss. et Germ. (*sagitt.*) A 41 (e)
vulgaris Gülden. = sagittæfol.
SAGMEN = Centaurea
jaceoides Hill = seg.
Scabiosa Hill = C. Scab.
sempervirens Hill = C. semp.
SALICARIA = Lythrum
hyssopifolia Lam. = L. hyssop. (α)
spicata Lam. = L. Salicaria
Thymifolia Lam. = L. Thym.
virgata Mœnch = L. virgat.
vulgaris Mœnch = L. Salicaria
SALICORNIA I 316 (296)
acetaria Pall. = herbacea
Alpini Lag. = fruticosa
ambigua Michx. = fruticosa
amplexicaulis Vahl = Halopeplis ampl.
anceps Lag. = fruticosa
annua Sm. = herbacea
arabica L. = fruticosa
Arbuscula DC. = fruticosa
californica Nutt. = fruticosa
cruciata Coqueb. = herbacea

Digitized by Google

SALICORNIA I 316 (296)
cruciata Forsk. = Halocnemum strob.
densiflora Ung. (frutic.) 316 (2 b) = humilis, cfr. A 65
drepanensis Tin. ex Ung. = Halocnemum strobilac.
equisetifolia Moq. = fruticosa
europæa L. = fruticosa et herbacea
frutescens Friedr. = fruticosa
fruticosa L. 316 (2), A 65
fruticosa L. (europ.) = prec.
fruticosa Ten. = Arthrocnemum glaucum
fruticulosa Tin. = fruticosa
glauca Del. = Arthrocnemum glauc.
glauca Sieb. ex Ung. = Halocnemum strobilac.
glauca Stokes = fruticosa
glaucescens Ten. (*frutic.*) A 65 (2 a)
herbacea L. 316 (1), A 65
herbacea L. (europ.) = prec.
humilis Ten. (*frutic.*) A 65 (2 c)
intermedia Ten. (*frutic.*) A 65 (2 b)
intermedia Woods = herbacea
macedonica Bunge = herbacea
macrostachya Moric. = Arthrocnemum glaucum
mucronata Lag. = Arthrocnemum glaucum
Neei Lag. = fruticosa
nodulosa Del. = Halopeplis amplexicaul.
pachystachya Koch (frutic.) = Arthrocnemum glaucum
perennans W. = herbacea
peruviana Kth. = fruticosa
radicans Sm. = fruticosa (var.)
ramosissima Woods = herbacea
remotiflora Ung. (frutic.) = intermedia
Salsola Coqueb. = herbacea
sempervirens Sauvag. = fruticosa
strobilacea Del. = Halopeplis amplexicaul.
strobilacea Pall. = Halocnemum strobilac.
virginica Forsk. = Arthrocnemum glaucum
virginica L. p. p., Leyser = herbacea
SALIX I 255 (248)
acuminata Mill. = cinerea
acuminata Schl. (nomen) = grandifolia.
adscendens Sm. = repens
ægyptiaca L. = pedicellata ?
affinis Schur = incana
Ahlbergi Behm = glauco × Myrsinit.
alba L. 256 (2)
alba × fragilis Ritschl = frag. × alba
albo × pentandra Gürke = pent. × alba
alba × triandra Gürke = triandra × alba
alopecuroides Celak. = speciosa
SALIX I 255 (248)
alpestris Host = fœtida
alpina Scop. = Jacquinii vel Arbuscula
alpina Sut. = fœtida
ambigua Ehrh. 260, A 56 (×)
ambigua Pollini = cinerea
Ammaniana W. = nigricans
amygdalifolia Gilib. = seg.
amygdalina L. 256 (4 c), A 56
amygdalino × fragilis Wimm.? A 56
Andersoniana Sm. = nigric.
androgyna Hpe. = amygdalina
angustifolia Kern. (*grandifol.*) A 56 (13 γ b)
angustifolia Poir. = lavandulæfolia
angustifolia Wulf. = rosmarinifolia
Ansoniana Forb. = nigricans
appendiculata Vill. = grandifol. ?
apennina Borzì (*nigric.*) 258 (12 β b)
Arbuscula L. 261, A 57 (16 γ)
Arbusc. × grandifolia Gürke = grandif. × Arbusc.
Arbusc. × helvetica Gürke A 57
Arbusc. × purpurea Auct. = cæsia ?
arbutifolia W. = Myrsinit.
arenaria L. = repens
arenaria Sm. = Lapponum
arenaria W. = helvetica
atrocinerea Brot. = cinerea
atropurpurea Forb. = nigric.
aurea Salisb. = alba
auriculata Mill. = triandra
aurigerana Lap. = caprea
aurita Host = nigric.
aurita L. 259 (13), A 56
aurita × repens Wimm. = ambigua
Ausserdorferi Huter = glauco × retusa
austriaca Host = purpur. × grandifol.
babylonica L. 255 (1)
badensis Dœll = capreo × nigric.
Baumgarteniana Schur = purpurea
Beckeana Beck = purpur. × nigric.
bicolor Ehrh = phylicifol.
bifurcata Chev. = purpur. × viminal.
bigemmis Hoffm. = daphnoides
Borreri S. F. Gray = phylicifol.
Borreriana Sm. = phylicifol.
Brayi Baer. = Myrsinit.
brevifolia Borzì (*triandra*) 256 (4 b)
buxifolia Schl. = glauco × retusa
cærulea Sm. 255 (2 b)
cæsia Vill. 257 (7)
calva Mey. (alba) = cærulea
canaliculata Bess. = rosmarinifol.
SALIX I 255 (248)
capnoides A. et J. Kern. = incan. × cinerea
caprea L. 259 (13 β)
capreo × incana Gürke = inc. × caprea
capreo × nigricans Brunn. A 56
capreo × purpurea Gürke = purp. × capr.
caprina Dulac. = caprea
carinata Sm. = prunifolia
carniolica Host 257 (6 c)
cerasifolia Nocc. et Balb. = nigric.
chlorocarpa Schur = fragil. × alba
cinerea L. 259 (13 δ)
cinerea W. = daphnoides
ciner. × incana Gürke = inc. × cinerea
cinereo × nigricans 259
cinereo × purpurea Wimm. = purpur. × ciner.
cinerescens W. = grandifol. ?
cinnamomea Schl. exs. = aurita (α)
concolor DC. (helvet.) = glauco × retusa
concolor Host = purpur. × viminal.
concolor Koch (*nigric.*) A 56 (12 β c)
concolor Ser. (nivea) = glauco × retusa
concolor Wimm. et Grab. (triandra) = triandra (a)
conifera Wangenh. = phylicifol. ?
constricta Guss. = cinerea
coruscans Sturm. (an Jacq. ?) = Arbuscula
coruscans W. = glabra
cotinifolia Sm. = nigric.
cratægifolia Bert. 259 (12 γ)
Croweana Sm. = phylicifol.
cuspidata Schultz = pentandro × fragil.
cyllenea Boiss. et Orph. = incana
damascena Forb. = nigric.
daphnoides Vill. 258 (10), A 56
daphn. × incana Gürke = inc. × daphnoid.
dasycarpa Turcz. = Jacquinii
Davalliana Sm. = phylicifol.
decumbens Forb. = repens
depressa Hoffm. (non L.) = repens
discolor Host (non Whlnb.) = purpur. × caprea
discolor Wimm. et Grab., Koch (triandra) = amygdalina
diversifolia Roch. = rosmarinifol.
dubia Anderss. = purpur. × nigric.
dubia Sut. = Myrsinites
dumetorum Sut. = cinerea
eburnea Borzì (*purpur.*) 257 (6 d)
eburnea Dipp. = prec.
Ehrhartiana Sm. = pentandro × alba

Digitized by Google

SALIX I 255 (248)
elæagnoides Schl. = glauco × retusa
Elæagnos Scop. = incana?
elegans Host = hastata
elliptica Ser. = amygdalina
erecta Anderss. (Arbusc.) = Waldsteiniana
eriantha Schleich. = hastata
eriolepis Less. = hastata
fissa Dum. = pentandra
fissa Hoffm. = purpur. × viminal.
fissa Reut. = incan. × daphnoid.
fissa Whlnb. = purpurea
flavescens Host = Arbuscula
flexibilis Gilib. = vitellina
floribunda Forb. = phylicifol.
Flueggeana W. = incano × caprea
fœtida Schl. in DC. A 57 (16 γ b)
fœtida Sm. (non Schl.) = repens
Forbesiana Loud. = phylicifol.
formosa W. = Arbuscula
Forsteriana Sm. = nigric.
fragilior Host = seg.
fragilis L. 256 (3), A 56
fragilis × alba Wimm. 256
fragilis × pentandra Neilr. = pent. × frag.
fragilissima Host = fragilis
fragrans Salisb. = pentandra
Friesii Kern. = pentandro × fragil.
fruticosa Schur (alba) = cærulea
fruticulosa Kern. = grandifol. × Arbusc.
fusca Jacq. (non W.) = Jacquinii
fusca L. = repens
gemmata Wimm. = incano × caprea
glabra Scop. 259 (12 β)
glauca L. 260, A 57 (15 γ)
glauca Sm. = helvetica
glauca W. = Arbuscula
glauco × hastata Gürke A 57
glauco × herbacea Anderss. 261
glauco × Myrsinites Anderss., Gürke A 57
glauco × retusa Wimm. 261
glaucescens Host = nigric.
glaucescens Mœnch = Arbuscula
glaucoides Anderss. = glauco × Myrsinit.
glaucophylla Bess. = Lapponum
glaucophylla Mey. (triandra) = amygdal.
grandifolia Ser. 259 (13 γ), A 56
grandif. × Arbuscula Kern. A 56
grandif. × incana J. Kern. = inc. × grandif.
grandif. × purpurea Gürke = purp. × grandif.
Grenieriana Anderss. (Pontederana) = purpur. × caprea
grisonensis Forb. = nigric.
guseniensis Forb. = purpur. × nigric.?
hastata Hpe. = nigric.
hastata L. 258 (11), A 56
hastato × glauca Floder = glauc. × hast.
hastato × helvetica Kern. A 57
hastato × Lapponum 260 = hast. × helvetica, cfr. A 57
Hechenbergiana Hint. = grandifol.
Hegetschweileri Heer = phylicifol. × hastata?
Helix L. 257 (6 f)
helvetica Forb. = nigric.
helvetica Vill. A 57 (15 β)
helvet. × Myrsinites Kern. = Arbusc. × helvet.
helvet. × retusa Wolosz. in Kern. 261
herbacea L. 261 (18)
hermaphroditica L. = pentandra
heterophylla Bray = alba
heterophylla Host = aurita (α)
heterophylla Schultz = rosmarinifol.
heterophylla Schur = hastata
hexandra Ehrh. = pentandro × alba
hirta Sm. = nigricans
Hoffmanniana Bluff et Fing. = cinerea
Hoffmanniana Sm. = triandra
holosericea Ser. exs. = incano × caprea
Hoppeana W. = amygdalina
Hosteana W. = Arbuscula
humilis Anderss. (Arbusc.) = fœtida
Huteri Kern. = hastato × helvet.
hybrida Hoffm. = nigricans
hybrida Vill. = caprea
incana Fiori (Jacquinii) A 57 (16 β b)
incana Rchb. (Myrsinit.) = prec.
incana Schrank 257 (8), A 56
incano × caprea Wimm. 260
incano × cinerea Anderss., Neilr. 260
incano × daphnoides Wimm. 258
incano × grandifolia Anderss. 260
incanescens Forb. = cinerea
incerta Lap. = triandra
incubacea L. = repens
integrifolia M. Gortani (Arbusc.) A 57 (16 γ d)
integrifolia Neilr. (Myrsinit.) = Jacquinii
intermedia Host = incano × grandifol.
iserana J. et C. Presl. = aurita (α)
Jacquiniana W. = seg.
Jacquinii Host 261, A 57 (16 β)
japonica Bl. (non Thunb.) = babylonica
Kanderiana Ser. exs. = incano × caprea
Kitaibeliana W. 261 (19 α for.)
lactea Bray = Lapponum
læta Schultz = rosmarinifol.
Lambertiana Sm. 257 (6 e)
lanata Koch (Myrsinit.) 261, A 57 (16 α b)
lanata Vill. (non L.) = cinerea
lanceolata Ser. = incano × caprea
lantana Hartm. = ambigua
Lapponum All. = glauca
Lapponum L. 260 (15), A 57
Lappon. × Arbuscula Wimm. 260 = Arbusc. × helvet., cfr. A 57
Lappon. × retusa 261 = helvet. × retusa, cfr. A 57
latifolia Forb. = capreo × nigric.
laurifolia Wesm. = pentandra
lavandulæfolia Lap. A 56 (8 b)
lejocarpa Koch (Myrsinit.) A 57 (16 α c)
leucophylla W. = Lapponum
laxiflora Bor. = phylicifol.
levis Sm. = Myrsinit.
ligustrina Host = triandra
ligustroides Schleich. = hastata
limosa Whlnb. = Lapponum
linearis Forb. = incana
lithuanica Bess. = nigricans
littoralis Host = rosmarinifol.
longifolia Lam. = viminalis
lucida Forb. = pentandra
Ludwigii Bonj. ex Bert. = nigric.
macrocarpa Anderss. = phylicifol.
majalis Whlnb. = phylicifol.
mauternensis Kern. = purpur. × caprea
membranacea Thuill. = purpur. × viminal.
menthæfolia Host = nigric.
Meyeriana Rostk. = pentandro × fragil.
mirabilis Host = purpurea
mollis Schl. exs. = aurita (α)
mollissima Whlnb. = purpur. × viminal.
monadelpha Koch (purpur.) = carniolica
monandra Ard. = purpurea
monandra Host = grandifol.
monspeliensis Forb. = fragilis
montana Forb. = fragil. × alba
montana Mey. (caprea) = sphacelata
mutabilis Host = purpurea
myrsinifolia Salisb. = nigric.
Myrsinites Hoffm. = nigric.
Myrsinites L. 261 (16), A 57
myrtilloides Vill. (non L.) = fœtida
myrtilloides W. = cæsia
Napoleonis F. Schultz = babylonica
Neilreichii Kern. = purpur. × grandifol.
nigricans Sm. 258 (12 β), A 56
nigric. × cinerea Wimm. = cin. × nigric.
nigric. × purpurea Gürke = purp. × nigr.

Digitized by Google

SALIX I 255 (248)
nitens Gilib. (non Gr. et Godr.) = Lapponum
nivea Ser. = helvetica
Normani Anderss. = glauco × Myrsinit.
obscura Gr. et Godr. (Smithiana) = incano × caprea
obtusa Schl. exs. = cinerea
oleæfolia Sm. = cinerea
oleæfolia Vill. = incano × cinerea
olivacea Thuill. = purpur. × viminal.
oppositifolia Host = Lambertiana
ovata Ser. = glauco × herbacea
ovata Spr., Host = nigric.
pallida Salisb. = alba
paludosa Lk. = aurita (α)
parietariifolia Host = nigric.
parvifolia Sm. = repens
patens Forb. = phylicifolia
pedemontana Beyer (*retusa*) A 57 (19 γ)
pedicellata Desf. 259 (18 ε)
pedicell. × *purpurea Borzì* 257
peloritana Prestandrea = pedicell. × purpur.
pendula Mœnch = babylonica
pendula Ser. = fragil. × alba
pentandra L. 256 (5)
pentandro × *alba Ritschl., Kern.* 256
pentandro × *fragilis Wimm.* 256
persicifolia Schl. = fragilis
petræa Forb. = nigricans
phillyreifolia Bor. = phylicifol.
phylicifolia L. 258 (12), A 56
phylicifol. × *hastata Wimm.?* 260
phylicifolia Wulf. in Jacq. = glabra
pilosa Bray = nigricans
pilosa Rchb. (Myrsinit.) = lanata
pilosa Schl. = Myrsinites
plicata Fr. = ambigua
Pokornyi Kern. = pentandro × fragil.
polymorpha Ehrh. = repens
polymorpha Host = cinerea
polymorpha Pollini = grandifol.
Pontederæ Bell. = glabra
Pontederæ Vill. = hastata
Pontederana Lois. = hastata
Pontederana W., Koch = purpur. × ciner.
præcox Hpe. = daphnoides
præcox Salisb. = caprea
pratensis Host = repens
pratensis Scop. = Lambertiana?
procumbens Forb. = Myrsinit.
propendens Ser. = babylonica
propinqua Bor. = phylicifol.
prostrata Ehrh. = cæsia
prostrata Sm. = repens
prunifolia Host = nigricans
prunifolia Sm. A 57 (16 γ c)

SALIX I 255 (248)
puberula Doell = cinereo × nigric.
pulchella Host = Arbuscula
pumila Salisb. = herbacea
purpurea L. 257 (6), A 56
purp. × *aurita et var.* 257, A 56
purp. × *caprea* A 56
purp. × *cinerea Kern.* A 56
purp. × *grandifolia Kern.* A 56
purp. × *nigricans Wimm.* A 56
purp. × *viminalis Wimm.* 257
radicans Schur = triandra
radicans Sm. = phylicifol.
recondita Ausserd. = helvet × retusa
rectijulis Trautv. = Myrsinit.
reflexa Forb. = nigricans
repens L. 260 (14)
reticulata L. 261 (17)
retusa L. 261 (19), A 57
retusa With. = Myrsinit.
riparia W. = incana
rivalis Host = nigricans
rosea S. F. Gray = purpurea
rosmarinifolia Gouan. (non L.) = incana
rosmarinifolia L., W. 260 (14 b)
rostrata Thuill. = repens
Rothii Schk. = cinerea
rotundata Forb. = nigricans
rotundato-obovata R. Kell. (*retusa*) A 57 (19 α b)
rubens Mey (alba) = fragil. × alba
rubens Schrank = fragil. × alba
rubra Huds. = purpur. × viminal.
Rudbeckiana Fr. = nigricans
rufinervis DC. = cinerea
rugosa Ser. = aurita (α)
rupestris Sm. = nigricans
Russeliana Sm. = fragilis × alba
salviæfolia Brot., Lk. = incano × cinerea
Schultziana W. = rosmarinifol.
semicordata Dulac = phylicifol.
semperflorens Host = amygdalina
septentrionalis Lodd. = nigric.
sericea Koch (*purpur.*) 257 (6 b)
sericea Vill. = glauca
Seringiana Gaud. = incano × caprea
serotina Schur = amygdalina
serpyllifolia Scop. 261 (19 β)
serrata Neilr. (Myrsinit.) = Myrsinit. (α)
serrulata Roch. (retusa) = Kitaibeliana
sicula Strobl (*fragilis*) 256 (8 b)
sordida Kern. = purpur. × ciner.
spadicea Chaix in Vill. = cinerea? vel nigric.?
spathulata W. = ambigua
speciosa Host A 56 (×)

SALIX I 255 (248)
spectabilis Host = amygdalina
sphacelata Lois. = grandifol.
sphacelata Sm., W. 259 (18 β b)
spiræifolia W. (non Schl.) = nigric.
spuria Schl., W. = Arbusc. × helvet.
stipularis Ser. (non Sm.) = grandifol.
stollbergensis Wallr. = hastata
Stuartiana Sm. = Lapponum
stylaris Ser. = nigricans
stylosa DC. = nigricans
subcæsia Bruegg. = cæsia
subconcolor Ser. (nivea) = Arbusc. × helvet.
sudetica Host = Lapponum
syntriandra Beck = purpur. × caprea
tenuiflora Host A 56 (4 d)
tenuifolia Sm. = phylicifol.
tenuior Bor. = phylicifol.
tenuis Host = rosmarinifol.
tetrandra Fr. (pentandra) = pent. × fragil.
Timmii Schk. = cinerea
tinctoria Sm. = pentandra
tomentosa Host = helvetica
tomentosa Ser. = caprea
tortuosa Host = cinerea
triandra L. 256 (4), A 56
triandra × *alba Wimm.* 256
uliginosa Schl. = grandifol.
ulmifolia Thuill. = caprea
ulmifolia Vill. = aurita (α)
vacciniifolia Sm. = fœtida
varia Host = amygdalina
vaudensis Kern. = purpur. × nigric.
velutina Ser. (*helvet.*) A 57 (15 β b)
venulosa Sm. = prunifolia
venusta Host = amygdalina
versicolor Forb. = repens
versifolia Ser. = ambigua
viadrina Wimm. = viminalis
Villarsiana Fluegge in W. = amygdal.
viminalis L. 257 (9)
virescens Vill. = viminalis
viridis Fr. = fragil. × alba
vitellina L. 255 (2 c)
Waldsteiniana W. A 57 (16 γ a)
Wargiana Lej. = fragilis
Weigeliana W. = phylicifol.
Willdenowiana Dipp. = rosmarinifol.
Willdenowiana Forb. = nigric.
Wimmeri Kern. = incano × daphnoid.
Wimmeriana Gr. et Godr. = purpur. × caprea
Woolgariana Borr. = Lambertiana
Wulfeniana Sm. = phylicifol.
Wulfeniana W. = glabra
SALMASIA = Aira
corymbosa Bubani = A. intermedia
SALPICHROA A 168 (748 bis)
rhomboidea Miers. A 168, 215

Digitized by Google

SALPICHROMA = Salpichroa
SALSOLA I 317 (300)
acicularis Salisb. = Kali
agrigentina Guss. = vermicul.
annularis Poir. = Suæda frutic.
arenaria W. et K. = Kochia aren.
atriplicifolia Spr. = Cycloloma platyphyll.?
Atriplicis Schult. = Cycloloma platyphyll.
brevifolia Desf. = microphylla
brevimarginata Koch (Kali) = Tragus
calvescens Gr. et Godr. (Kali) = Tragus
chenopodioides Hort. = Cycloloma platyphyll.
controversa Tod. = Kali
crassifolia Fenzl (Kali) = Kali
dasyantha Pall. = Kochia arenaria
decumbens Lam. = Kali
divaricata Mass. = longifolia
ennæa Jan = vermiculata
flavescens Cav. = vermiculata
fruticosa Cav. = longifolia
fruticosa L. = Suæda frut.
glabra Deth. (Kali) = Tragus
glabrescens Moq. (vermicul.) = microphylla
Helenæ Bory = Suæda frutic.
hirsuta Horn. (Kali) = Kali
hirsuta L. = Kochia hirs.
Hostii Tratt. = Suæda marit.
hyssopifolia Pall. = Kochia hyssop.
indica W. = Suæda marit.
inermis Fourr. = Soda
Kali L. 318 (3)
Lana Edgew. = Suæda frutic.
lanata Pollich = Kochia prostrata
lanata Vahl = Kochia hyssopifol.
laniflora S. G. Gmel. = Kochia arenaria
latifolia Hort. par. = Cycloloma platyphyll.
longifolia Forsk. 318 (1)
longifolia Lam. = Soda
marginata Celak. (Kali) = Tragus
maritima M. B. = Suæda mar.
microphylla Cav. 318 (2 β)
mutica C. A. Mey. = Soda
oppositiflora Jan = longifolia
oppositifolia Desf. = longifolia
pilosa Guss. (vermicul.) = vermiculata (α)
platyphylla Michx. = Cycloloma plat.
polyclonos L. = an Labiata?
pontica Pall. (Kali) = Kali
prostrata L. = Kochia prostr.
pubescens Moq. (vermicul.) = vermiculata (α)
radiata Desf = Cycloloma platyphyll.
rosacea Auct. (non L.) = Tragus
salsa Jacq. (non L) = Suæda Jacquini
salsa Roxb. = Suæda frutic.
SALSOLA I 317 (300)
sativa S. G. Gmel. = Suæda marit.
sativa L. = Halogeton sat.
scariosa Stokes = Kali
scoparia M. B. = Kochia scop.
sedifolia Salisb. = Suæda frut.
setifera Lag. = Halogeton sativa
setigera Steud. = Suæda splendens
Sieversiana Steud. = Kochia scoparia
Soda L. 318 (5)
Soda Weinm. = Kali
Souda Lœfl. = Halogeton sativa
spinosa Lam. = Tragus
splendens Pourr. = Suæda splendens
tenuifolia M. B. = Kochia aren.
Tragus L. 318 (4)
vermiculata L. 318 (2)
SALTZWEDELIA = Genista
sagittalis Gærtn. M. et S. = G. sagitt.
tetragona Fourr. = prec.
SALVIA III 48 (797)
acutata Brot. = Verbenaca
Æthiopis Brot. = argentea
Æthiopis L. 50 (6)
agrestis L. = pratensis
agrestis Vill. = Verbenaca
albiflora Pamp. (*Saccardiana*) A 174 (11 β' c)
albiflora Strobl (*clandestina*) 53 (12 β b)
albiflora Zersi (*pratens.*) 52 (11 α for.)
amplexicaulis Lam. = virgata
angustifolia Bég. (*offic.*) 49 (1 c)
argentea Guss. = Gussonei
argentea L. 50 (7), A 173
auriculata Bég. (offic.) 48 (1 b) = confusa, cfr. A 173
auriculata Mill. = triloba
aurita Schult. (non Thunb.) = offic.
australis Caruel (Verben.) = clandest. et multif.
baccifera Etling. = triloba
Barrelieri Ten. = hæmatodes
Bertolonii Vis. 52 (11 β)
betonicæfolia Lam. = oblongata
bracteata Sims = Sclarea
campestris M. B. 51 (9 β)
canariensis L. 49 (3)
candidissima Guss. (non Vahl) = Gussonei
ceratophylla Ten. (non L.) = seg.
ceratophylloides Ard., L. 52 (11 δ)
ceratophyll. Vahl = Verbenaca
clandestina L. 53 (12 β)
clandestina S. et S. = controversa
clandestinoides Lk. = Verbenaca
Clusii Jacq. = triloba
collina Salisb. = silvestris
colorata Thore = Horminum
comosa Salisb. = Horminum
SALVIA III 48 (797)
confusa Benth. A 173 (1 b)
controversa Ten. 53 (12 γ b)
dubia C. Koch = pratensis
dubia Lowe = Verbenaca
dumetorum Auct. pl. (non Andrz.) = pratensis (α a)
elata Host = campestris?
erosa Desf. = Verbenaca
fruticosa Mill. = triloba
garganica Ten. 51 (10 b)
glutinosa L. 51 (8)
grandidentata Ten. = virgata
grandiflora Goir. (*pratens.*) A 173 (11 α for.)
grandiflora Ten. = officin.
grandifolia Bolzon (*verticill.*) A 174 (13 b)
Gussonii Boiss. 50 (7 β), A 173
hæmatodes L. 52 (11 γ)
hæmatodes Scop. = Sclarea
hiemalis Brot. = clandestina
hirsuta Bég. (*Sclarea*) 50 (5 c)
hispanica L. 53 (nota)
hispanorum Auct. (non Lag.) = angustifol.
horminoides Pourr. 53 (12 β c)
Horminum L. 49 (4). A 173
illyrica Schult = Verbenaca
intermedia Briq. (*Hormin.*) 49 (4 α b)
lanigera Poir. (non Desf.) = controversa
latifolia Posp. (*Bertolonii*) 52 (11 β b)
lavandulæfolia Auct. (non Vahl) = angustifol.
longiflora N. Terr. (*viridis*) A 173 (4 β b)
micrantha Goir. (*pratens.*) A 173 (11 α for.)
mixta Timb. = clandestina
modesta Briq. (*pratens.*) 52 (11 α b)
mollis Donn = verticillata
multifida S. et S. 53 (12 γ)
napifolia Bergam. = verticillata
napifolia Jacq. 54 (nota)
neglecta Ten. = oblongata
nemorosa Rchb. (an L.?) = campestris
nicæensis Briq. (*pratens.*) 52 (11 α c)
oblongata Vahl 53 (12 α b)
oblongifolia Benth. (Verben.) = oblongata
oblongifolia Posp. (*Bertolonii*) 52 (11 β a)
obtusata Brot. (non Thunb.) = Verbenaca
officinalis L. 49 (1), A 173
oligostachya Gasp. = quid?
pallidiflora Caldesi = virgata
pallidiflora St.-Am = clandestina
parviflora Brot. = Verbenaca
pendula Vahl 54 (nota)
pinnata L. 53 (nota)
polymorpha Hoffgg. et Lk. = Verbenaca
præcox Lois. = virgata
præcox Savi (non Vahl) = clandestina

Digitized by Google

SALVIA III 48 (797)
pratensis L. 51 (11), A 173
pumila N. Terr. (*viridis*) A 173 (4 β c)
pyramidalis Petagna 50 (5 b)
Rosani Ten. = viridis
rosea Bég. (*pratens.*) 52 (11 α for.)
rosea Pamp (*Saccardiana*) A 174 (11 β' b)
Rosmarinus Schleid. = Rosmarinus offic.
rostrata Schm. 52 (11 α d)
rubra Spr. = virgata
rugosissima Zucc. = controversa
Saccardiana Pamp. (*pratens.*) A 173 (11 β')
saccata Pourr. = argentea
scabrida Bert. (non Pohl) = Bertolonii
scapigera Posp. (*Bertolonii*) 52 (11 β c)
Sclarea L. 50 (5)
Sclarea b Guss. = hirsuta
serotina Boiss. (Verben.) = Verbenaca (α)
Sibthorpii S. et S. = campestris?
silvestris L. 51 (9)
silvestris Vis. = Bertolonii
sinuata Vis. (Verben.) = Verbenaca (α)
sipylea Lam. = triloba
Spielmanni Scop. = viridis
Spielmanni W. = Verbenaca
Tenorii Spr. = hæmatodes
tetragona Mœnch = hispanica
tiberina Mauri = virgata?
triloba L. f. 49 (2)
truncata W. = viridis
variabilis Lois. = Verbenaca
variegata Kit. (*pratens.*) 52 (11 α for.)
variegata Pamp. (*Saccardiana*) A 174 (11 β' d)
Verbenaca L. 52 (12)
verbenacoides Brot. = clandestina
verbenæfolia Salisb. = Verbenaca
vernalis Boiss. p. p. (Verben.) = multifida
verticillata Bolzon (*pratens.*) A 173 (11 α for.)
verticillata L. 53 (13), A 174
virgata Jacq. 51 (10)
viridis L. 49 (4 β), A 173
viscosa Jacq. 54 (nota)
viscosa Rchb., Caruel = Saccardiana
Viviani Sieb. = Verbenaca
vulgaris Caruel (pratens.) = pratensis (α)
vulgaris Caruel (Verben.) = Verbenaca (α)
vulgaris Rchb. (*pratens.*) 52 (11 α a)
xerophila Bég. (*pratens.*) A 173 (11 α for.)
SALVINIA I 18 (23)
natans All. 18 (1)
vulgaris Rupr. = natans
SALZWEDELIA = Saltzwedelia
SAMBUCUS III 125 (824)
arborescens Gilib. = nigra
decussata Gillot (*nigra*) 125 (2 c)
Ebulus L. 125 (1)
florida Salisb. = nigra
herbacea Gilib. = Ebulus
humilis Mill. = Ebulus
laciniata Koch (*racemosa*) 125 (3 b)
laciniata L. (*nigra*) 125 (2 b)
laciniata Mill. = prec.
laciniata Vis. (*Ebul.*) 125 (1 b)
leucocarpa Koch (*nigra*) 125 (2 e)
medullosa Gilib. = nigra
nigra L. 125 (2)
racemosa L. 126 (3)
variegata Wohlfarth (*nigra*) 125 (2 f)
virescens Desf. 125 (2 d)
vulgaris Neck. = nigra
SAMOLUS II 326 (688)
aquatious Lam. = Valerandi
bracteatus Stokes = Valerandi
caulescens W. = Valerandi
elatior Goir. (*Valerandi*) A 163 (b)
geniculatus Dulac. = Valerandi
humilior Goir. (*Valerandi*) A 163 (c)
Valerandi L. 326, A 163
SANAMUNDA = Thymelæa
tomentosa Zumagl. = Th. hirsuta
SANGUISORBA = Poterium
altissima Mœnch = P. officinale
auriculata Scop., All. = P. sabaudum
dictyocarpa Franch. = P. dictyocarpum
dodecandra Moretti = P. dodecandrum
eriocarpa A. Br. = P. gargan.
garganica Bert. = P. gargan.
glaucescens Garcke (minor) = P. glauc.
hispanica Mill. = P. officinale
macrostachya Com. et Jan. = P. dodecandrum
major Gilib. = P. officinale
minor Bert. = P. polygamum
minor Scop. = P. Sanguisorba
montana Jord. = P. — mont.
muricata Franch., Focke = P. muric.
officinalis L. = P. officinale
Pimpinella Spenn. = P. Sanguisorba
polygama Nyl., Beck = P. polygamum
Poterium Weber = P. Sanguisorba
præcox Bess. = P. — montanum
rupicola A. Br. = P. rupicol.
sabauda Mill. = P. — sab.
Sanguisorba Asch. et Græbn. = P. Sang.
spinosa Bert. = P. spinosum
Vallistellinæ Bert. = P. dodecandrum
verrucosa A. Br. = P. polyg.
SANICULA II 151 (541)
europæa L. 151
officinalis Gouan. = europ.
officinarum Neck. = prec.
silvatica Salisb. = europ.
trilobata Gilib. = europ.
vulgaris Fr., Koch = europ.
SANTIA = Polypogon
maritima Fiorini = P. mar.
monspeliensis Parl. = P. monsp.
plumosa Savi = prec.
unioloides Raf. = Catapod. siculum
SANTOLINA III 269 (875)
Ageratum Baill. = Achillea Ageratum
alpina L. = Anthemis mont. ζ alpina
annua L. = Lonas inodora
anthemoides L. = Anthemis cretica
atrata Baill. = Achill. atr.
brevidentata Stokes = seg.
Chamæcyparissus L. 270
Chamæcypar. α et β Bert. p. p. = pectinata
corsica Jord. et Fourr. = insularis?
cuneifolia Baill. = Achill. Herba-rota
ericoides Poir. = squarrosa
flava Forsk. = Anthem. tinctoria
grandiflora Pourr. = pectinata
incana Lam. 270 (α a)
insularis Gennari hb. (*pectin.*) 270 (β c)
leucantha Bert. = pinnata
macrophylla Baill. = Achill. macr.
maritima Crantz = Diotis mar.
Millefolium Baill. = Achill. Millefol.
moschata Baill. = Achill. moschata
muricata DC. = Anthem. muricata
neapolitana Jord. et Fourr. = semivirescens?
nobilis Baill. = Achill. nobil.
pallida Salisb. = Chamæcyp.
pectinata Benth. 270 (β)
pinnata Viv. 270 (γ)
Ptarmica Baill. = Achill. Ptarmica
rigida S. et S. = Anthem. cretica
rosmarinifolia L. 270 (*nota*)
semivirescens Fiori (*pectin.*) 270 (β b)
squarrosa Moris (non L.) = tomentosa
squarrosa Ten. = pectinata
squarrosa W. 270 (α c)
suaveolens Pursh = Matricaria suaveol.
tomentosa Lam. = Diotis maritima
tomentosa Pers. 270 (α b)
villosa Mill. = Chamæcyp.
SAPONARIA I 371 (842)
ætnensis Raf. = depressa
albiflora Goir. (*ocym.*) A 77 (2 α d)

Digitized by Google

SAPONARIA I 371 (342)
alpestris Fenzl = Silene alpestris
alsinoides Viv. 371 (2 α b)
amplissima Mill. = Vaccaria
aspera Saut. (offic.) = hirsuta
bellidifolia Sm. 372 (4), A 77
cæspitosa Biv. (non DC.) = depressa
cæspitosa Goir. (*ocym.*) A 77 (2 α c)
calabrica Guss. 372 (2 β)
cretica L. = Tunica cret.
depressa Biv. 372 (3)
diffusa Lam. = Gypsophila repens
dioica Mœnch = Lychnis alba et rubra
diurna Fenzl = Lychnis rubra
Elisabethæ Fenzl = Silene Elisabethæ
fastigiata Lam. = Gypsophila fastigiata
glaberrima Ser. (*offic.*) 371 (1 b)
glabrata Wirtg. (offic.) = glaberrima
gracilior Bert. (ocym.) = alsinoides
grandiflora Fisch. (*Vaccar.*) A 77 (6 b)
hirsuta Wierzb. (*offic.*) A 77 (1 c)
hirta Wirtg. (offic.) = hirsuta
hispida Posp. (offic.) = hirsuta
hybrida Mill. = officin.
illyrica Ard., L. = Tunica ill.
inclusa C. Koch = Vaccaria?
lutea L. 372 (5), A 211
minor Goir. (*Vaccar.*) A 77 (6 c)
muralis Lam. = Gypsophila mur.
nervosa Gilib. = officin.
noctiflora Fenzl = Silene noct.
ocymifolia Salisb. = seg.
ocymoides L. 371 (2), A 77
officinalis L. 371 (1), A 77
officinarum Rupr. = officinalis
pentagona Hort. = Vaccaria
perfoliata Gilib. = Vaccaria
porrigens L. = Gypsophila porrigens
puberula R. Br. (offic.) 371 (1 c) = hirsuta, cfr. A 77
pubescens Wirtg. (offic.) = hirsuta
Pumilio Br. (non Boiss.) = Silene Pum.
quadrifida Fenzl = Silene quadrifida
repens Lam. = ocymoides
rubra Lam. = Vaccaria
segetalis Neck. = Vaccaria
sicula Raf. = depressa
Vaccaria L. 372 (6), A 77
vespertina Fenzl = Lychnis alba
viscosa Dulac = ocymoides
vulgaris Pall. = officin.
SARCATHRIA = Halocnemum strobilacea Raf. = H. strob.
SARCOCA = Phytolacca dioica Raf. = Ph. dioica
SARCOCAPNOS
enneaphylla DC. I 481 (nota)
SARCOPOTERIUM = Poterium spinosum Spach = P. spin.
SAROTHAMNUS = Cytisus purgans Gr. et Godr. = Genista purg.
scoparius Koch = C. scop.
vulgaris Wimm. = prec.
SAROTHRA = Hypericum blentinensis Savi f. = H. mutilum
parviflora Raf. = prec.
SATUREJA III 54 (798)
acinifolia Bég. (*Nepeta*) 60 (15 α e)
Acinos Scheele 62 (17)
albiflora Bég. (*vulg.*) 61 (16 d)
albiflora Fiori (*nepetoides*) A 174 (15 γ c)
alpina Scheele 62 (18)
angustifolia Presl = consentina?
angustifolia Ten. = congesta
angustifolia Vis. (*Juliana*) 57 (5 c)
approximata Biv. = fasciculata
ascendens Briq. (*Calamintha*) 60 (14 β)
athonica Bég. (*Nepeta*) 60 (15 α d)
Baumgarteni Bég. (*alp. b latior*) 62 (18 α b subf.)
brachiata Stokes = hortensis
Calamintha Scheele 60 (14), A 174
canescens Bég. (*Nepeta*) 60 (15 α c)
canescens Guss. 58 (6 ε)
canescens Guss. (*Juliana*) 56 (5 b)
capitata Desf. = nervosa
capitata L. = Thymus cap.
Chamæbuxus Briq. (*montana*) 56 (3 α d)
cleistogama Armit. (*microphylla*) 58 (8 c)
Clinopodium Caruel = vulgaris
collina Salisb. = Thymbra
communis Vis. (*montana*) 56 (3 α)
congesta Horn. 57 (6 β)
consentina Ten. 57 (6 α b)
cordata Moris in Bert. 58 (9 β)
corsica Caruel 63 (19)
cristata Nym. 63 (nota)
cuneata Rchb. = seg.
cuneifolia Ten. 56 (4)
elliptica Briq. (*Acinos*) 62 (17 α b)
fasciculata Raf. 58 (6 ζ)
fasciculata Tausch = cuneifol.
Fenzlii Nym. = subnuda
filiformis Desf. = microphylla
filiformis Nym. 58 (9)
filiformis Ten. = nervosa
fruticosa Bég. 59 (10)
garganica Briq. (*græca*) 58 (6 δ)
glabriusc ula Bég. (*microphylla*) 58 (8 a)
glandulosa Caruel 61 (15 β)
glomerata A. Terr. (græca) = congesta
SATUREJA III 54 (798)
gracilis Guss. (fascicul.) = inodora
græca L. 57 (6)
granatensis Briq. (*alpina*) 62 (18 α a)
grandiflora Scheele 60 (13)
graveolens Caruel 62 (17 β)
Gussonei Bég. (*vulg.*) 61 (16 b)
hirsuta J. et C. Presl = Jul. b. canescens?
hirta Host = cuneifolia
hirtella Paolucci (*montana*) 56 (3 α e)
hortensis L. 55 (2)
Hostii Caruel 33 (nota)
hyssopifolia Bert. = montana
humifusa Marches. (*montana*) 56 (3 α b)
illyrica Host = subspicata
inodora Bég. (*fascicul.*) 58 (6 ζ c)
Juliana L. 57 (5)
lancifolia Briq. (*Acinos*) 62 (17 α c)
latifolia Vis. (*Juliana*) 57 (5 d)
latior Briq. (*alpina*) 62 (18 α b)
laxiflora C. Koch = hortens.
leptobia Briq. (*congesta*) 57 (6 β b)
longiflora Presl 58 (6 γ)
marifolia Caruel = fruticosa
micrantha Bég. (*Nepeta*) 60 (15 α f)
micrantha Hoffgg. et Lk. 57 (6 α d)
microphylla Guss. 58 (8)
mollis Bég. (*nepetoides*) 61 (15 γ b)
montana L. 56 (3)
Moschatella Fiori (*Calamintha*) A 174 (14 α for.)
mucronifolia Stokes = montana
nebrodensis Briq. (*alpina*) 63 (18 α c)
Nepeta Briq. (Calam.) = seg.
Nepeta Scheele 60 (15), A 174
nepetoides Bég. (*Nepeta*) 61 (15 γ), A 174
nepetoides Briq. (Calam.) = prec.
nervosa Desf. 58 (7)
oblongifolia Bég. (*vulg.*) 61 (16 c)
oblongifolia Briq. (Clinopod.) = prec.
officinarum Crantz = hortensis
parviflora Presl (non Vis.) = Juliana
Piperella Bert. 59 (12)
plumosa Hampe = nervosa
pusilla Goir. (*hortensis*) 55 (2 b)
pygmæa Sieb. = subspicata
rupestris Wulf. = thymifolia
scabra Presl = quid?
sessiliflora Presl = congesta
sicula Arc. (græca) = seg.
sicula Guss. = longiflora
spicata Crantz = Juliana
spicata Vis. = cuneifolia
stenophylla Boiss. (*montana*) 56 (3 α c)

Digitized by Google

SATUREJA III 54 (798)
suaveolens Briq. (*alpina*) 63 (18 β)
subnuda Bég. (*Nepeta*) 61 (15 δ)
subspicata Bartl. 56 (3 γ)
subspicata Vis. (montana) = prec.
tenuiflora Bég. (*Nepeta*) 60 (15 α b)
tenuifolia Ten. = congesta
Thymbra L. 55 (1)
thymifolia Scop. 59 (11)
thymoides Nym. 57 (6 α c)
Tragoriganum Tausch = Thymbra
trifida Mœnch = montana
variegata Host 56 (3 β)
villosa Bég. (*Acinos*) 62 (17 α d)
villosa Bég. (*microphylla*) 58 (8 b)
viminea Burm. f. = hortensis
virescens Guss. (sicula) = consentina?
virgata Stokes = Juliana
virgata Vis. = cuneifolia
viridis Briq. (*suaveol.*) 63 (18 β b)
vulgaris Fritsch, Bég. 61 (16)
SATURNIA = Allium
cernua Maratti = seg.
Chamæmoly Salisb. = A. Cham.
etrusca Jord. et Fourr. = prec.
SATYRIUM
albidum L. = Gymnad. alb.
alpinum Pers. = Herminium alp.
alpinum Schm. = Cœlogloss. viride
anthropophorum Pers. = Aceras anthr.
bifolium Whlnb. = Platanth. bifolia
bracteale Salisb. = seg.
bracteatum Pers. = Cœlogloss. bract.
conopseum Whlnb. = Gymnad. conops.
densiflorum Brot. = Orchis intacta
diphyllum Lk. = Cœlogloss. diphyll.
Epipogium L. = Epipogium aphyllum
ferrugineum Schm. = Cœlogloss. viride
fuscum Huds. = Cœlogloss. viride
hircinum L. = Loroglossum hircinum
hirsutum Gilib. = Goodyera repens
maculatum Desf. = Orchis intacta
Monorchis Pers. = Herminium Mon.
nigrum L. = Nigritella nigra
odoratissimum Whlnb. = Gymnad. odor.
repens L. = Goodyera rep.
scanense L ex Steud. = Gymnad. albida
spirale Hoffm. = Spiranthes autumn.
SATYRIUM
viride L. = Cœlogloss. vir.
SAUSSUREA III 315 (908)
alpina DC. 315 (1)
angustifolia DC. = alpina
compacta Facch. (alp.) = depressa
depressa Gren. 315 (1 α c)
discolor DC. = lapathifolia
glacialis Wk. (alp.) = depressa
lapathifolia G. Beck 315 (1 β)
latifolia Ledeb. = macrophylla
macrophylla Sauter 315 (1 α b)
mollis Spr. = Jurinea moll.
monocephala Cass. = pygmæa
nervosa Briq. (*alp.*) 315 (1 α a subf.)
pygmæa Spr. 316 (2)
subdepressa Rchb. (alp.) = depressa
SAXIFRAGA I 532 (446)
acaulis Gaud. = pygmæa
acaulis Rod. et Ven. (stellar.) 537 (18 b) = pauciflora, cfr. A 111
acaulis St.-Lag. (petræa) = Bellardi
acaulis L. Vacc. (*purpurea*) A 112 (37 α a)
adscendens L. 533 (3 β), A 110
Aizoon Jacq. 539 (29), A 112, 213
Aizoon Savi = australis
Aizoon × Cotyledon Bruegg. 539 (nota)
Aizoon × elatior Huter A 112
aizoides L. 537 (20 b)
aizoides × cæsia Gremli = cæsia × autumnal.
aizoides × mutata Reg. = autumnal. × mutata
ajugifolia L. 541 (nota)
Allionii Baumg., A. Terr. = pedemontana
alpicola Moric. (tridactyl.) = adscendens
alpina Evers (*Burseriana*) A 112 (36 b)
alpina L. (tridactyl.) = adscendens
ampullacea Ten. 536 (17 c)
androsacea Comolli = sedoides (α)
androsacea L. 536 (14), A 111
angustifolia Hall. = Seguieri
annua Lap. = tridactylites
apennina Bert. f. = seg.
apennina Bert. f. (*cuneifol.*) 538 (22 c)
aphylla Sternb. 535 (10 β), A 111
aphylla Ten. = sedoides (α)
aquatica Lap. A 111
arachnoidea Sternb. 534 (5)
arenarioides Brign. = tenella
aretioides Bluff. et Fingh. = cæsia × autumnal.
aretioides Lap. A 112
aspera L. 537 (21 β)
atropurpurea Koch (*muscoides*) 535 (12 α b)
atropurpurea Sternb. (aizoides) = atrorubens
atropurpurea Wulf. 536 (17 h)
SAXIFRAGA I 532 (446)
atrorubens Bert. 537 (20 c)
augustana L. Vacc. (*purpurea*) A 113 (37 β)
augustana L. Vacc. (retusa) = prec.
australis Moric. 538 (27 c)
autumnalis Jacq. = Aizoon
autumnalis L. 537 (20)
autumn. × mutata Paol. 537 (nota), A 111
Baumgarteni Schott = Wulfeniana
Bellardiana Ser. (controversa) = Bellardi
Bellardi All. 533 (3 γ), A 110
Bellardi Sternb. (adscendens) = prec.
Bellardi Sternb. (lingul.) = lingulata (a)
berica Bég. (*petræa*) A 111 (4 β)
Besleri Sternb. = Hostii
biflora All. 541 (38), A 113
biflora × Murithiana L. Vacc. A 113
biflora × oppositifol. Kern. = oppositifol. × biflora
Boryi Boiss. et Heldr. = marginata
brachyphylla Shuttlew. A 213 (29 α c)
brevicaulis Somm. (*granulata*) 534 (7 b)
brevifolia Sternb. (*Aizoon*) A 112, 213 (29 α)
brevipes Sternb. (sedoides) = Hohenwartii
bryoides L. 537 (21), A 111
bryoides Scop. = Vandellii
bulbifera Gunn. = cernua
bulbifera L. 534 (8)
Burseriana L. 541 (36), A 112
Burseriana var. L. = Vandellii
cærulea Lap. = oppositifolia
cæsia L. 540 (34), A 112
cæsia L. Mant. = media
cæsia Scop. = squarrosa
cæsia × aizoides Rchb. = seg.
cæsia × autumnalis Paol. 540
cæspitosa Scop., All. (an L.?) = moschata
cæspitosa Whlnb. = exarata
cæspitosa Wulf. = pedemontana
callosa Sm. = crustata
calycifiora Lap. = media
Candollii Salzm. = cervicornis
capillipes Rchb. = subintegra
carinthiaca Schott A 112 (29 β b)
carpathica A. Terr. p. p. = marginata
caulescens L. Vacc. (*purpurea*) A 112 (37 α c)
ceratophylla Dryand = trifurcata
cernagorica A. Terr. = media
cernua L. 534 (6), A 111
cervicornis Viv. 536 (15 c), A 111
chrysosplenifolia Boiss. A 213 (2 d)

Digitized by Google

SAXIFRAGA I 532 (446)
Churchilli Huter = Aizoon (for.), cfr. p. 539
citrina Heg. A 111 (12 α c)
Clarionii Sternb. (lingul.) = australis
Clusii Gouan 537 (18 d)
cochlearis Rchb. 539 (28 β)
colorata Sternb. (*sedoides*) 535 (10 α c)
compacta Heg. = Aizoon (α)
compacta M. et K. (muscoides) = pygmæa
compacta Sternb. = valdensis
controversa Sternb. = adscendens
corsica Duby (*granulata*) 534 (7 c)
corsica Gr. et Godr. = prec.
Cotyledon All. = Cotyledon et lingulata
Cotyledon L. 539 (30), A 112
Cotyledon s L. = Aizoon
Cotyledon Ten. = marginata
Cotyledon Wulf., Savi = Aizoon
crassifolia Gaud. (muscoides) = pygmæa
crocea Gaud. 536 (17 g)
crocea Gaud. (aizoides) = atrorubens
crustata Vest 539 (28)
crustata × *Hostii Engl.* A 112
cuneifolia L. 538 (22), A 111
cymbalariæfolia Ehrenb. = hederacea
cymosa Wk. = pedemontana
daurica Schleich. = subintegra
dentata Lk. = hirsuta
denticulata Ten. hb. = marginata
depressa Sternb. = androsacea
diapensioides Bell. 540 (33)
diapensioides Lap. = media (α)
dilatata Schott = Aizoon
elatior M. et K. = Hostii
elongata DC., Gaud. (aspera) = aspera
elongata Engl. (Aizoon) = carinthiaca
elongella Haw. = laxa
Engleri Dalla Torre = stellar. c. robusta
erubescens Obrist = quid?
exarata Vill. 536 (16), A 111
excavata Kze. = cuneifolia
exilis Pollini 533 (8 α b)
Facchinii Koch 535 (12 β)
florulenta Moretti 538 (25)
florulenta Schott = lantoscana
foliosa Ors. hb. = androsacea
Friderici-Augusti Bias. = porophylla
Gaudini Bruegg. = Aizoon × Cotyled.
geranioides Host = petræa
geranioides L. 541 (nota)
Geum L. 538 (24)
Girtaneri Bruegg. = mutata × aizoides
glabella Bert. 536 (13)
glabrata Sternb. (*stellar.*) A 111 (18 e)
glabrata L. Vacc. (retusa) = Wulfeniana
glandulosa Griseb. (*rotundifol.*) A 110 (2 c)
glandulosa St.-Lag. (oppositifol.) = Rudolphiana
glandulosissima Engl. (*cæsia*) A 112 (34 α d)
glauca Murrith = diapensioides
gracilis Engl. (Aizoon) = carinthiaca
græca Boiss. et Heldr. 534 (7 d)
granulata L. 534 (7), A 111
granulata Pollini = bulbifera
Hausmanni Kern. = mutata × aizoides
hederacea L. 533 (1), A 110
hemisphærica Sternb. (muscoides) = pygmæa
heterophylla Sternb. 536 (15 b)
Hirculus L. 537 (19)
hirsuta L. 538 (24 b)
hirsuta Sternb. (rotundifol.) = repanda
hispidula Roch. (*stellar.*) A 111 (18 f)
Hoguenini Bruegg. 541 (nota)
Hohenwartii Vest 535 (10 α b)
Hornungii Shuttlw. = biflora
Hostii Tausch 539, A 112 (29 γ)
humilis Rouy et Cam. (cervicornis) = pulvinaris
Huteri Ausserd. in Kern. A 113 (39 δ)
Huteri Ausserd. p. p. A 113 (×)
hybrida Kern. A 113 (×)
hypnoides All. = exarata
hypnoides L. 536 (nota)
hypnoides Scop. = adscendens
imbricata Bert. = squarrosa
imbricata Lam. = purpurea
inclinata A. Kern. = autumn. × mutata
insubrica Rota (*bulbifera*) 534 (8 b)
intacta W. = Aizoon (α a)
integrifolia Gaud. (petræa) = Scopolii
integrifolia Koch (muscoid.) = seg.
integrifolia Paol. (*moschata*) 536 (17 d)
intermedia Fiori (*adscendens*) A 110 (8 β c)
intermedia Heg. A 111 (21 α b)
intermedia Rouy (patens) = patens
intermedia L. Vacc. (controversa) = adsc. c. interm.
Kochii Hornung. pp. A 113 (×)
Kochii Hornung. p. p. = macropetala
Kochii Paol. (biflora) 541 (38 b) = prec., cfr. A 113
ladanifera Balb. = cervicornis
læta Schott = Aizoon (α a)
lanceolata Kit. = androsacea
lantoscana Boiss. et Reut. 538 (27 b)
lasiophylla Schott Nym. et Ktky. = repanda
latifolia Sternb. (androsac.) = pyrenaica
latifolia Wk. (stellar.) = stellaris (a)
laxa Paol. (*moschata*) 536 (17 e)
laxa Sternb., Koch (muscoid.) = prec.
leptophylla Frœl. = aphylla
leucantha Thom. = exarata
leucanthemifolia Hausm. (stellaris) = robusta Engl.
leucanthemifolia Lap. = Clusii
lineata Sternb. (muscoid.) = laxa
linguiformis Rouy et Cam. (Aizoon) = recta
lingulata Bell. 538 (27), A 112
Linnæi Boiss. = adscendens
longifolia Colla (non Lap.) = lingulata
longifolia Comolli = recta
longifolia Host = Hostii
longifolia Ten. = australis
longipetala St.-Lag. (biflora) = macropetala
lutea Gilib. = Hirculus
luteola Fiori (*cæsia*) A 112 (34 α c)
macrantha L. Vacc. (*oppositifol.*) A 113 (39 α b)
macrantha L. Vacc. (*Rudolphiana*) A 113 (39 γ b)
macropetala Kern. A 113 (38 b)
maculata Rchb. (*exarata*) A 111 (16 α b)
major Koch (Aizoon) = robusta
major Ser. (exarata) = exarata (α a)
Malyi Schott = recta
marginata Sternb. 540 (32)
media Gouan 539 (31), A 112
media Sternb. (longifol.) = Hostii
meridionalis Hayek = seg.
meridionalis A. Terr. (*oppositifol.*) 541, A 113 (39 ε)
minor Koch (Aizoon) = brevifolia
minor Ten. (marginata) = marginata
mixta Lap. 541 (nota)
moschata Pollini = Pollinii
moschata Wulf. 536 (17)
multiflora Ehrh. = Cotyledon
Murithiana Tiss. A 113 (39 β)
muscoides All. 535 (12), A 111
muscoides Wulf. = pygmæa
mutata All. (1789) = florulenta
mutata L. 538 (26)
mutata × aizoides Girt. = autumnal. × mutata
mutata × *aizoides Kern.* A 112
neglecta Ten. = stabiana
neglecta B Ten. = marginata
nitida Schreb. ex Sternb. = tenella
notata Schott = Aizoon
obovata Engl. (*stellar.*) A 111 (18 g)
olympica S. et S. = porophylla
oppositifolia L. 541 (39), A 113

Digitized by Google

SAXIFRAGA I 532 (446)
oppositifolia × *biflora Kern., Engl.* A 113
paradoxa Kit. = pygmæa
paradoxa Sternb. = Zahlbrucknera par.
parviflora Biv. = hederacea
patens Gaud. = cæsia × autumnal.
patens Sternb. = valdensis
pauciflora Engl. (*stellar.*) A 111 (18 b)
pedemontana All. 536 (15), A 111, 213
perporosa Schur = Wulfeniana
petræa DC., Gaud., Ten. = adscendens
petræa L. 534 (4), A 111
planifolia Lap. = muscoides
Pollinii Paol. (*sedoides*) 535 (10 α c)
polypetala Sternb. (*cuneifol.*) A 111 (27 d)
Ponæ Sternb. = petræa
porophylla Bert. 540 (31 β), A 112
præcox Bernh. = exilis
procumbens Rota (*tridactylites*) 533 (3 α c)
propinqua B. Br. = Hirculus
pubescens L. Vacc. (*Murithiana*) A 113 (39 β b)
pubescens L. Vacc. (*purpurea*) A 112 (37 α b)
pulvinaris Briq. (*cervicornis*) A 111 (15 c subf.)
pumila Guss. (*hederac.*) 533 (1 c)
punctata Gunner = cuneifolia
pungens Clairv. = Vandellii
purpurata Gaud. (*Cotyledon*) A 112 (30 b)
purpurea All. A 112 (37)
purpurea Hayek = augustana
purpurea Sternb. (muscoid.) = atropurpurea
pygmæa Haw. 536 (17 b)
pygmæa B Moretti = ampullacea
pyramidalis Lap. = Cotyledon (for.)
pyramidalis Ten. = australis
pyramidata Mill. = Cotyledon
pyrenaica Scop. A 111 (14 b)
pyrenaica Vill. = pygmæa
ramosa Guss. (*hederac.*) 533 (1 b)
ramosissima Schur = adscendens
recta Lap. 539, A 112 (29 β)
recta Ten. = stabiana
recurvifolia Lap. = cæsia
Regelii Kern. = mutata × aizoides
reniformis Vis. et Sacc. (*rotundifol.*) A 110 (2 for.)
repanda W. 533 (2 b)
retusa Gouan 541 (37) = purpurea (α), cfr. A 112
retusa Lap., Bert. = augustana
rhætica Kern. = Hostii (for.)
Rhei Schott = laxa
robusta Engl. (*stellar.*) 537 (18 c)

SAXIFRAGA I 532 (446)
robusta Schott A 112 (29 β a)
Rocheliana Sternb. 540 (nota), A 112
rosea Lap. = biflora
rosularis Schleich exs. = Aizoon × Cotyledon
rotundifolia L. 533 (2), A 110, 213
Rudolphiana Auct. = Murithiana
Rudolphiana Hornsch. 541, A 113 (39 γ)
rupestris Lap. = adscendens
rupestris Thom. exs. = valdensis
rupestris W. = petræa
Russi Engl. (granulata) = corsica
Russi Presl = bulbifera (sec. Guss.)
saginoides Frœl. = sedoides (α)
sarmentosa L. A 114
Scopoliana Ser. (controversa) = seg.
Scopolii Vill. A 110 (8 β b)
scotophila Boiss. = hederacea
scrobiculata Schur = Wulfeniana
secunda Moretti 536 (17 f)
sedoides L. 535 (10), A 111
Seguieri Spr. 535 (11), A 111
sempervivum C. Koch = media (α)
sibirica Sternb., Pollini (non L.) = arachnoidea
spathularis Brot. = umbrosa
spuria Kern. = biflora × Murithiana
squarrosa Sieb. 540 (34 β)
squarrosa × *aizoides Engl.* A 112
stabiana Ten. 539, A 112 (29 α b)
stellaris L. 537 (18), A 111
stenopetala Gaud. = aphylla
striata Hall. = exarata
Sturmiana Schott = Aizoon
subintegra Ser. (*cuneifol.*) 538 (22 b)
sulphurea Arv.-T. = cæsia × autumnal.
tenella Wulf. 535 (9)
tenera Sternb. = androsacea
tenera Sut. = muscoides
tenerrima Wk. = exilis
Tenorei A. Terr. (carpathica) = marginata
Tenorei Sternb. = ampullacea
thessalica Schott = porophylla
tombeanensis Boiss. A 112 (35 β)
trichodes Scop. = sedoides (α)
tridactylites β et γ Bert. = adscendens
tridactylites L. 533 (3), A 110
tridens Jan A 111 (14 c)
tridentata Gaud. (androsacea) 536 (14 b) = pyrenaica, cfr. A 111
trifida Gilib. = tridactylites
trifida Haw. (androsac.) = pyrenaica
trifurcata Schrad. 541 (nota)

SAXIFRAGA I 532 (446)
umbrosa L. 538 (26)
uniflora Frœl. = aphylla
uniflora Gaud. (muscoides) = pygmæa
Vahlii Ram. = adscendens
valdensis DC. 540 (34 α b), A 112
valida Rouy et Cam. (Aizoon) = robusta
Vandellii Sternb. 540 (35), A 112
varians Sieb. = moschata
veronicæfolia Pers. = bulbifera
Vetteri Burn. A 111 (16 β)
Villarsii Sternb. (adscend.) = Scopolii
vivipara Vest = bulbifera
Wulfeniana Schott A 112 (37 α)
SCABIOSA III 148 (836)
acuminata Opiz = Knautia silvatica
acutiflora Rchb. 152 (7 β e)
affinis Gr. et Godr. 150 (5 α), A 178, 216
africana S. et S. (non L.) = cretica
agrestis Lang. = Scopolii
agrestis Schm. = Knaut. arvens.
agrestis W. et K. 150 (5 β)
alba Scop. = argentea (α)
albescens W. = Cephalar. leucantha
Aleutrensis Porta (*vestina*) 150 (3 β b)
alpina L. = Cephalaria alp.
ambigua Avé-Lall. = pyrenaica
ambigua Ten. p. p. = grandiflora
ambigua B Ten. = divaricata
amplexicaulis L. = Knaut. amplexic.
angulata Raf. = Cupani?, cephalarioides?
angustifolia Goir. (*graminif.*) A 179 (10 i)
angustif. Posp. (integrif.) = Knaut. integrif.
angustif. Salisb. = Cephalar. syriaca
argentea Guss. = eburnea
argentea L. 155 (14)
arvensis L. = Knaut. arv.
arvensis β Bert. (1819), Poll. (1822) = Kn. Rossmanni
atropurpurea L. 152 (7), A 179
australis Wulf. = Succisa austr.
bellidifolia Lam. = Kn. integrifolia
bellidis-folia Gilib. = Columb.
bidens S. et S. = Knaut. bid.
borealis Salisb. = Succisa pratens.
brachiata S. et S. 149 (1)
calva Pasq. (*Columb.*) 151 (6 β d)
campestris Bess. = Knaut. — camp.
candicans Jord. 151 (5 δ a)
canescens Bég. (*marit.*) 152 (7 β b)

Digitized by Google

SCABIOSA III 148 (836)
canesc. Guss. (grandifl.) = prec.
canescens W. et K. 150 (3), A 178
carpathica Fisch. (arvens.) = Knaut. carp.
carpathica Spr. = prec.
centaurifolia Posp. (collina) = Knaut. rigidiuscula
cephalarioides Lojac. A 179
ceratophylla Ten. = mollis
chlorophylla Saut. (*graminif.*) A 179 (10 d)
ciliata Rchb. = Knaut. drymeia
cinerescens Jord. 151 (5 ε a)
cinerea Lam. = pyrenaica
collina Gaud. (arvens.) = Kn. — pseudo-collina
collina Heg. = pseudo-collina
collina Req. (non Schm.) = Knaut. purpurea
collina Vis. (arvens.) = Knaut. purpurea
Columbaria L. 151 (6), A 179
Columnæ Ten. 151 (6 β c)
Cornucopia Viv. 155 (*nota*)
crenata Cyr. 154 (13), A 179
crenata β Bert. = glabriuscula
crenata C Ten. = nana
cretica L. 153 (9)
Cupani Guss. 152 (7 γ)
decumbens Jan = Knaut. integrifolia
dichotoma Lam. = Cephal. syriaca
dichotoma Ucria, W. 149 (2)
dipsacifolia Host = Knaut. dipsaciformis
divaricata Bég. (*marit.*) 152 (7 β c)
divaricata Jacq. = argentea
divaricata Lam. = Picnocomon rutæfol.
dubia Mœnch = Knaut. arvens.
eburnea Boiss. (ucranica) = seg.
eburnea S. et S. 155 (14 β)
eburnea β Bert. = eburn. b. integrata
elata Lojac. (*mar.*) A 179 (7 β for.)
elatior Goir. (*graminif.*) A 179 (10 f)
eradiata Neilr. (arvens.) = Kn. — campestris
Fleischmanni Hladn. et Rchb. = Knaut. Fleischm.
flore-albo Pollini (Succisa) = Succisa — flore-albo
frutescens Mill. = cretica
garganica Porta et Rigo (*holoser.*) 151 (5 ε c)
glabra Arc. (*graminif.*) 153 (10 b)
glabrata Nym. (graminifol.) = prec.
glabrata Schott = Succisa — glabrata
glabrescens Bég. (*cretica*) 153 (9 α b)
glabriuscula Ten. (*crenata*) 154 (13 β)
graminifolia L. 154 (10), A 179
graminif. β Bert. = gram. b. glabra
gramuntia L. 150 (5), A 178, 216
grandiflora Guss. = Cornucopia
grandiflora Scop. 152 (7 β f)
Gussonii Tod. = cren. b. hirsuta
Hacquetii Lam. = Cephal. transylv.
heterophylla Hladn. et Rchb. (Fleischmanni) = Kn. rigidiuscula
heterophylla Pasq. (*cretica*) 153 (9 β)
hirsuta Biv. (coronopifol.) = cren. b. hirs.
hirsuta Guss. (*crenata*) 154 (13 α b)
hirsuta Klett. et Richt. (*canesc.*) 150 (3 α d)
hirsuta Lap. = Knaut. — hirs.
hirta W. = argentea
Hladnikiana Host 151 (6 γ)
holosericea Bert. 151 (5 ε)
holosericea DC. = lucida
holosericea β Bert. = integrif.
humilior Goir. (*graminif.*) A 179 (10 g)
humilis Lojac. (*mar.*) A 179 (7 β for.)
hybrida All. = Knaut. amplexicaulis
hymettia Boiss. et Sprun. 153 (9 β for.)
indivisa Vis. (arvens.) = Kn. magnifica b. indiv., cfr. A 178
integrata Bég. (*eburnea*) 155 (14 β b)
integrata Sacc. (*Columb.*) 151 (6 α b)
integrifolia Bég. (*holoser.*) 151 (5 ε b)
integrifolia L. = Knaut. integr.
integrifol. M. et K. = Knaut. arv. α c. integr.
integrifolia Savi = Knaut. silvat.
intermedia Ugolini (*graminifol.*) A 179 (10 c)
isetensis L. 155 (*nota*)
joppensis Rchb. = seg.
joppica Ten. = Cephalaria joppica
latifolia Goir. (*graminifol.*) A 179 (10 h)
latifolia Lap. (arvensis) = Kn. silvat.
lejocephala Hpe. 150 (5 β b)
leucantha L. = Cephal. leuc.
leucocephala Lk. = prec.
Levieri Huter P. et R. 155 (*nota*)
lilacina Tanf. (atropurp.) = marit.
limonifolia Vahl 153 (8)
longifolia DC. (silv.) = seg.
longifolia W. et K. = Knaut. longifol.
lucida Vill. 152 (6 ζ)
lucida × *Succisa pratensis* 155 (nota)
luteola Paolucci (*marit.*) 152 (7 β d)
lutescens Gilib. = ochroleuca
lyrata Lam. (non Forsk.) = amplexicaulis
macrocephala Sang. (marit.) = grandiflora
magellensis Parl. 151 (5 δ b), A 179
maritima L. 152 (7 β), A 179
maritima Vill. = pyrenaica
marit. Wulf. = argentea (α)
media Opiz = Kn. silvatica
mediterranea Viv. = Cephal. leucanthema
mixta DNtrs. = stellata
moldavica Hort. ex R. et S. = Knaut. amplexicaulis
mollis W. 151 (5 γ)
mollissima DC. = pyrenaica et holosericea
mollissima Viv. 155 (*nota*)
monspeliensis Jacq. = stellata
montana L. (silvat.) = Knaut. pannonica
montana Mill. = prec.?
montana Sang. (crenata) = glabriuscula
multiseta Vis. = Sibthorpiana
nana Marcello (*crenata*) A 179 (13 α c)
neglecta Horn. = quid?
norica Vest = lucida
nudicaulis Lam. = Columb.
ochroleuca L. 152 (6 δ), A 179
odora Salisb. = maritima
officinarum-arvensis Crantz. = Knaut. arvens.
pachyphylla Gaud. (*Columb.*) A 179 (6 c)
pallida Salisb. = cretica
pannonica Scop., Jacq. = Kn. drymeia
parviflora Desf. = dichotoma
patens Jord. = pachyphylla
pauciseta DC. 151 (6 β b)
pilosa R. et S., Guss. = argentea (α)
polymorpha Schm. = Knaut. arvensis
polymorpha Weig. = Columbaria
Portæ Kern. = magellensis, cfr. A 179
præmorsa Gilib. = Succisa pratens.
prolifera Guss. (*marit.*) 155 (nota)
prolifera L. 155 (*nota*)
prolifera Lojac. (*mar.*) A 179 (7 β for.)
pterocephala Petagna (non L.) = crenata
purpurea Vill. = Knaut. purp.
pyrenaica All. 151 (5 δ), A 179
pyren. All. p. p. = holosericea
pyren. β Bert. = magellensis
repens Brignoli = Succisa australis
rigida Mill. (non L.) = Cephal. leucantha
rosiflora Fiori (*graminif.*) A 179 (10 e)

Digitized by Google

SCABIOSA III 148 (886)
rutæfolia Vahl = Pycnocomon rutæf.
sabauda Gremli (lucida) = villosa
Saviana Rchb. = grandiflora
Scopolii Lk. 152 (6 ε)
serrata Lam. = Knaut. integrifolia
sibirica Lam. = Cephal. syriaca
Sibthorpiana S. et S. 149 (1 β)
sicula Coult. (ucranica) = seg.
sicula L. 154 (12)
silenifolia W. et K. 150 (4)
silvatica Host = Knaut. drymeia
silvatica L. = Knaut. silv.
simplex Arc. (pyren.) = magellensis
simplex Desf. 154 (11 b)
simplex Gelmi (gramuntia) 150 (5 α b)
stellaris Salisb. = seg.
stellata L. 154 (11)
stricta W. et K. = lucida
suaveolens Desf. = canescens
subglabra Lojac. (mar.) A 179 (7 β for.)
subpinnatifida Dœll. (canesc.) 150 (3 α b)
Succisa L. = Succisa pratens.
syriaca L. = Cephalaria syr.
tenuifolia Roth = ochroleuca
tenuifol. Savi = gramuntia
tomentosa Arc. (gramunt.) = mollis
tomentosa Koch (gramunt.) = pyrenaica
toment. J. F. Gmel. (non Cav.) = prec.
transylvanica L. = Cephal. trans.
trenta Hacq. = prec.
triandra L. = gramuntia
trichotoma Mœnch = Knaut. amplexicaulis
Triumfetti Moretti = Succisa austral.
trivialis Rchb. = Knaut. rigidiuscula
trivialis Schm. = Knaut. arvens.
ucranica All., Koch et Auct. pl. = argentea (α)
uniseta Savi 151 (6 β)
urceolata Desf. = Pycnocomon rutæfol.
Vaillantii M. B. = Cephal. syriaca
varia Gilib. = Knaut. arvensis
variabilis F. Schultz = prec.
variifolia Boiss. 153 (9 β for.)
vestina Facch. 150 (3 β)
vestita Jord. 151 (5 δ c)
villosa Coss. (marit.) = mar. b. canescens
villosa Rota (lucida) 152 (6 ζ b)
virens Wallr. (canesc.) 150 (3 α c)
virescens Nym. = glabra
Virga-pastoris Mill. = canescens?
Wulfenii R. et S., A. Kern. 155 (14 α)

SCANDIX II 197 (589)
affinis C. Koch = grandifl.
Anthriscus L. = Anthrisc. vulg.
aromatica Whlnb. = Chærophyll arom.
aurea Roth = Chærophyll. aur.
australis L. 197 (1)
brachycarpa Guss. 198 (2)
brevirostris Boiss. (Pect.-Ven.) = macrorrhyncha
Bulbocastanum Mœnch = Bunium Bulboc.
bulbosa Roth = Chærophyll. bulb.
Cerefolium L. = Anthrisc. Cerefol.
cornuta Gilib. = Pect.-Vener.
cretica Mill. = Pect.-Vener.
fumarioides W. et K. = Anthrisc. fum.
grandiflora L. 197 (1 β)
hirsuta Scop. = Chærophyll. hirs.
hispanica Boiss. = macrorrhyncha
hispida Gilib. = Anthriscus vulgaris
hispidula Bert. = pinnatifida
infesta Jacq. = Torilis neglecta
infesta L. = Torilis arvens.
læta Salisb. = Anthriscus vulgaris
macrorrhyncha C. A. Mey. 198 (3 c)
nodosa L. = Physocaulis nodosa
nutans Mœnch = Chærophyll. temulum
odorata L. = Myrrhis odor.
orientalis Griseb. = grandifl.
Pecten Scop. = seg.
Pecten-Veneris L. 198 (3)
pinnatifida Vent. 198 (3 d)
radiata Salisb. = australis
rostrata Salisb. = Pect.-Veneris
stellata Sol. in Russ. = pinnatifida
temula Roth = Chærophyll. tem.
tenuifolia Salisb. = Anthrisc. Cerefol.
tinctoria Scop. = Chærophyll. aromaticum
umbrosa Bég. (Pect.-Ven.) 198 (3 b)
vulgaris S. F. Gray = Pect.-Veneris
SCARIOLA = Lactuca
viminea Schm. = L. vim.
SCHEDONORUS = Bromus
asper Fr. = B. ramosus
Benekeni Lge. = B. Benekeni
erectus Fr. = B. erectus
inermis Fr. = B. inermis
poæformis R. et S. = Poa violacea
serotinus Rostr. = B. ramosus
sterilis Fr. = B. sterilis
tectorum Fr. = B. tector.
violaceus Lk. = Poa violacea
SCHEDONORUS = Festuca
cærulescens R. et S. = F. cærul.
SCHEDONORUS = Festuca
calamarius R. et S. = F. altissima
compressus R. et S. = F. spadicea
divaricatus R. et S. = Sclerochloa divar.
elatior P. B. = F. arundinacea
exaltatus Schult. = F. exaltata
inermis P. B. = Bromus inerm.
loliaceus R. et S. = F. elatior × Lolium perenne
phœnicoides R. et S. = Brachypod. phœn.
Scheuchzeri R. et S. = F. pulchella
silvaticus Hpe. = F. altissima
spadiceus R. et S. = F. spadicea
violaceus R. et S. = F. violaceus
SCHELLHAMMERIA = Carex
capitata Mœnch = seg.
cyperoides Rchb. = C. cyp.
SCHENODORUS = Schedonorus
SCHERARDIA = Sherardia
SCHEUCHZERIA I 163 (173)
asiatica Miq. = palustris
palustris L. 163
paniculata Gilib. = palustris
Pseudo-Asphodelus Scop. = Tofieldia calyculata
SCHINUS
molle L. 226 (nota)
SCHISANTHES = Narcissus
orientalis Haw. = N. orient.
SCHISMUS A 22
calycinus Coss. et Dur. A 22
Gouani Trin. = Deschampsia media
marginatus P. B. = calycinus
Villarsii Trin. = Deschamp. media
SCHIZONOTUS = Spiræa
Lindleyanus Wall. = seg.
sorbifolius Lindl. = S. sorb.
SCHIZOTHECA = Atriplex
Halimus Fourr. = A. Hal.
hastata Fourr. = A. hast.
laciniata Fourr. = A. tataricum
litoralis Fourr. = A. lit.
macrotheca G. Beck (patula) = A. patulum
microtheca G. Beck (patula) = A. erectum
patula Fourr. = A. patulum
rosea Fourr. = A. roseum
tatarica Celak. = A. oblongif.
SCHLAGINTWEITIA = Hieracium
intybacea Griseb. = H. intyb.
SCHMIDTIA = Coleanthus
subtilis Tratt. = C. subt.
utriculata Presl = prec.
utriculosa Sternb. = prec.
SCHMIDTIA = Tolpis
ambigua Cass. = T. virgata
quercifolia Rchb. = T. umbellata
SCHOBERIA = Suæda
Clemente Steud. = S. splendens
Dumortieri Steud. = S. marit.

Digitized by Google

SCHOBERIA = Suæda
fruticosa C. A. Mey. = S. frut.
indica Kostel = S. marit.
linifolia Nutt. = S. Jacquini
maritima C. A. Mey. = S. marit.
montana Nutt. = S. Jacquini
Pallasiana C. A. Mey. = Kochia hirsuta
salinaria Schur = S. marit.
setigera C. A. Mey. = S. splendens
SCHNIZLEINIA = Trochiscanthes
nodiflora Steud. = T. nodifl.
SCHŒNISSA = Allium
caucasica Salisb. = A. globosum
Schœnoprasa Salisb. = A. Schœn.
SCHŒNODORUS = Diplachne
serotinus R. et S. = D. serot.
SCHŒNOPLECTUS = Scirpus
carinatus Palla = S. lacustri × triquetrus
lacuster Palla = S. lac.
litoralis Palla = S. lit.
mucronatus Palla = S. mucr.
pungens Palla = S. americanus
supinus Palla = S. sup.
Tabernæmontani Palla = S. Tabern.
triquetrus Palla = S. triq.
SCHŒNOPRASUM = Allium
vulgare Fourr. = A. Schœnoprasum
SCHŒNUS I 124 (138)
aculeatus L. = Crypsis acul.
albus L. = Rhynchospora alba
Cladium Sw. = Cladium Mariscus
compressus L. = Scirpus compressus
compressus Presl = nigricans
effusus Sw. = Cladium Marisc.
ferrugineus Krock. = Juncus capitatus
ferrugineus L. 124 (2)
fuscus L. = Rhyncospora fusca
junceus W. = Scirpus supinus
Mariscus L. = Cladium Mar.
minimus Forst. = Juncus capitatus
monoicus Sm. = Kobresia bipartita
mucronatus L. = Cyperus ægyptiacus
nigricans L. 124 (1)
setaceus Thuill. = Rhynchospora fusca
SCHOLLERA = Oxycoccus
europæa Steud. = seg.
Oxycoccos Roth = O. quadripetalus
paludosa Baumg. (1816) = prec.
palustris Steud. = prec.
SCHRADERIA = Salvia
hastata Mœnch = S. canariensis
SCHRANKIA = Rapistrum
divaricata Mœnch = R. perenne
rugosa Medic. = R. rugos.
sulcata Mœnch = R. orientale
SCHWEYCKERTA = Limnanthemum
nymphoides C. C. Gmel. = L. nymph.
SCILLA I 188 (190)
albiflora Fiori (*bifolia*) A 207 (6 c)
alpina Schur = nivalis
amœna L. 190 (7), A 47
autumnalis L. 188 (1)
Bertolonii Duby = italica
bifolia L. 189 (6), A 47, 207
bifolia β Pollini, Goir. = albiflora
bifolia γ Goir. = pleniflora
bracteata Tomasch. (*bifolia*) A 47 (6 c)
byzantina Poir. = italica?
campanulata Ait. = hispanica
campestris Savi = Ornithogal. umbell.
candida Guss. 189 (4 β c)
cernua Janka = bifolia
cernua Red. = sibirica
Clusii Parl. 189 (4 β b) = glabra, cfr. A 47
comata Hoffgg. = sicula
corsica Boullu 188 (1 b)
Cupaniana Schult. = seg.
Cupanii Guss. 189 (4 δ)
dubia C. Koch = nivalis
elongata Parl. 189 (4 α)
eriophora Mill. = hyacinthoides
fallax Steinh. = obtusifolia
fastigiata Viv. = Hyacinthus fastigiatus
festalis Salisb. = non-scripta
Filangeri Hort. = peruviana
fistulosa Raf. = Cupanii?
fugax Munby, Nym. = Urginea fug.
gallica Tod. = autumnalis
glabra Boiss. (*sicula*) A 47 (4 β b)
hemisphærica Boiss. = peruviana
hispanica Mill. 190 (8), A 48
Hohenackeri Janka = bifolia
Hughii Tin. 189 (4 γ)
hyacinthoides L. 189 (5), A 47
hyacinthoides Jacq. = non-scripta
intermedia Guss. 189 (2 β)
italica L. 189 (3)
Jacquini Gmel. = hispanica
lanceolata Viv. = Urginea maritima
macrogona Lk. = hispanica
maritima L. = Urginea mar.
minor C. Koch = nivalis
montana Savi = Ornithog. narbon.
nivalis Boiss. 189 (6 b)
non-scripta Hoffgg. et Lk. 190 (9)
nutans Sm. = non-scripta
obtusifolia Moris et Auct. it. = intermedia
obtusifolia Poir. 188 (2)
Pancration Nym. = Urginea Pancr.
patula DC. = hispanica (for.)
permixta Ten. = sicula
SCILLA I 188 (190)
peruviana L. 189 (4), A 47
pleniflora Fiori (*bifolia*) A 207 (6 d)
purpurea Mill. = italica (for.)
romana Ker.-Gawl. = Hyacinthus rom.
serotina Ker.-Gawl. = Dipcadi serotinum
sibirica Andr. 189 (7 oss.)
sicula Tin. 189 (4 β)
silvatica Czetz = bifolia
silvestris Savi = Ornithog. pyren.
subnivalis Nym. = nivalis
undulata Desf. = Urginea und.
verna Moris = Hyacinthus fastigiatus
Vivianii Bert. = elongata
SCIOPHILA = Majanthemum
convallarioides Wib. = M. bifolium
SCIRPIDIUM = Heleocharis
acicular Nees = H. acicularis
SCIRPUS I 117 (135)
acicularis L. = Heleoch. acic.
acicularis Ucria = cernuus
acutus M. Gort. (*Holoschœn.*) A 34 (5 α b)
ægyptiacus Decne. = litoralis
affinis Roth = maritimus
alpinus Schleich. 121 (15), A 35
altissimus Gilib. = lacuster
americanus Pers. A 34 (9)
annuus All. = Fimbrist. annua
annuus Desf. etc. = Fimbrist. dichotoma
annuus Thuill. = Heleoch. ovata
atropurpureus Retz. = Heleoch. atrop.
australis Murr. 119 (5 δ)
austriacus Asch. et Græbn. (*cæspitosus*) A 34 (14 β)
Bœothryon Ehrh. in L. f. = pauciflorus
Bœothryon Wahl. = Heleoch. palustris
Bellardi Whlnb. = Kobresia myosuroides
biumbellatus Forsk. = Fimbrist. dichot.
brevis Urv. = cernuus
caducus Del. = Heleoch. cad.
cæspitosus L. 120 (14), A 34
cæspitosus Tornab. 120 (nota)
campanus Fiori (*cernuus*) A 205 (12 β c)
campanus A. Terr. (nervosus) = prec.
campester Roth = pauciflorus (for.)
capitatus Schreb. = Heleoch. ovata
caricinus Schrad. = Caricis
Caricis Retz. 118 (4)
carinatus Sm. = lacustri × triquetr.
carniolicus Neilr. = Heleoch. carn.
cernuus Vahl A 34 (12 β), A 205

Digitized by Google

SCIRPUS I 117 (135)
Chæta Schult. = Heleoch. acicularis
ciliaris Pers. = Fuirena pubescens
clathratus Rchb. 120 (12 α b)
comosus Dum. = Heleoch. acicularis
compactus Hoffm., Krock. 118 (3 b)
compressus Mœnch = Heleoch. ovata
compressus Pers. = Caricis
congestus Dœll (marit.) = compactus
corymbosus Forsk. = maritimus
cyperoides Lam. = maritimus
dichotomus L. = Fimbrist. dich.
digynus N. Terr. hb. (Savii) = campanus
diphyllus Retz. = Fimbrist. annua
Duvalii Hpe. = lacustri × triquetr.
erectus Poir. = supinus
erraticus Rota in DNtrs. = Heleoch. atropurpurea
exilis Poir. = Fimbrist. exilis
filiculmis Asch. et Græbn. (palustr.) = Heleoch. filicul.
filiformis Savi (non Lam.) = cernuus
fimbrisetus Del. = litoralis
fluitans L. 120 (13), A 34
fluitans Spr. = parvulus
glaucus Lam. = maritimus
glaucus Sm. = Tabernæmontani
globifer L. f. 119 (5 β)
glomeratus Scop. = mucronatus
gracilis Koch = cernuus
gracilis Rchb. = Heleoch. carniolica
gracilis Savi = Fimbrist. squarrosa
gracillimus Kohts = clathratus
gramineus Neck. = silvaticus
Halleri Vill. = pauciflorus
Halleri Vitm. = supinus
hispidulus Vahl = Fimbrist. exilis
Holoschœnus L. 118 (5), A 34
humilis Lge. (marit.) = compactus
humilis Wallr. = parvulus
intermedius Poir. = romanus
intermedius Thuill. = Heleoch. uniglumis
intricatus L. = Cyperus aristatus
Kalli Forsk. = Cyperus ægyptiacus
lacuster L. 119 (6)
lacustri × Pollichii Buchen. = lac. × triquetrus
lacustri × triquetrus Gr. et Godr., Neilr. 119, A 34
lætevirens Schrad. = Heleoch. atropurpurea
lateralis Retz. = supinus
lateriflorus Gmel. = supinus
latifolius Gilib. = silvaticus
leptaleus Koch = cernuus

SCIRPUS I 117 (135)
Lereschii Thom. = Heleoch. atropurpurea
Linnæi Asch. et Græbn. (Holosch.) = Holoschenus (α)
litoralis Schrad. 119 (7)
longicaulis Desmaz. (acicul.) = Heleoch. — fluitans
luteus Gilib. = cæspitosus
macrostachys W. 118 (3 c)
major Baumg. (palustr.) = Heleoch. pal. c. major
maritimus L. 118 (3)
megastachys Steud. = macrostachys
melanostachys Urv. = Heleoch. palustris
Michelianus Gouan = Juncus capitatus
Michelianus L. 118 (1)
Minaæ Tod. 120 (12 β b)
minor Guss. (palustr.) = Heleoch. nebrodensis
minor Hausm. (marit.) A 34 (3 d)
minor Schrad. (palustr.) = Heleoch. pal. b. minor
minutus Fouc. et Mand. (cæspitosus) A 35 (14 γ)
monostachyus G. F. W. Mey. (marit.) A 34 (3 e)
mucronatus All. = americanus
mucronatus L. 120 (10)
mucronatus Pollich = triquetrus
multicaulis Gmel. = Heleoch. ovata
multicaulis Sm. = Heleoch. mult.
nanus Spr. (non Poir.) = parvulus
natans Schrad. (acicul.) = Heleoch. — fluitans
nebrodensis Asch. et Græbn. (palustr.) = Heleoch. nebrod.
nervosus Bœck., vedi campanus
niloticus Gmel. = Fimbrist. dichot.
ovatus Roth = Heleoch. ov.
palustris L. = Heleoch. pal.
panormitanus Parl. 119 (5 δ b)
Parlatoris Biv. = globifer
parvulus R. et S. 121 (17)
pauciflorus Lightf. 121 (16)
Philippi Tin. A 34 (7 β)
pollicaris Del. = parvulus
Pollichii Gr. et Godr. = triquetrus
Pollichii × lacuster Rosellini in Ces. = lac. × triquetrus
Preslii Dietr. = mucronatus
pubescens Lam. = Fuirena pub.
pungens Vahl 119 (9) = americanus, cfr. A 34
pusillus Vahl = parvulus ?
quinqueflorus Vitm. = pauciflorus
radicans Schk. 118 (2 β)
reptans Thuill. = Heleoch. palustris
romanus L. 119 (5 γ)
romanus β L. = australis
Rosellinii Ces. = lacustri × triquetrus
Rothii Hpe. = americanus

SCIRPUS I 117 (135)
Savii Rota = Heleocharis atropurpurea
Savii Seb. et Maur. 120 (12 β) = cernuus, cfr. A 34
sepium Honck. = pauciflorus
setaceus L. (1753) 120 (12), A 205
setaceus L. (1771) = cernuus
siculus A. Terr. (nervosus) = cernuus
silvaticus L. 118 (2), A 34
simplex Tausch in Posp. (marit.) A 34 (3 e)
soloniensis Dub. = Heleoch. ovata
speciosus Posp. (marit.) = macrostachys
stolonifer Roth = fluitans
supinus L. 120 (11)
Tabernæmontani C. C. Gmel. 119 (6 b)
tenuifolius DC. = americanus
tenuis Schreb. = Heleoch. uniglumis
Todaroanus A. Terr. (Savii) = Minæ
translucens Le Gall. = parvulus
triangularis Pers. (triquetrus) = americanus
triangularis Steud. = prec.
trichodes Muehlenb. = parvulus
trichophorum Asch. et Græbn. = Eriophorum alpinum
trigonus Nolte = lacustri × triquetrus
trigonus Roth = triquetrus
triquetrus Gr. et Godr. etc. = litoralis
triquetrus L. 119 (8)
triquetrus Roth = americanus
tuberosus Desf. = compactus
turgidus Pers. = Heleoch. ovata
uniglumis Lk. = Heleoch. unigl.
varius Schreb. = Heleoch. palustris
SCLAREA = Salvia
Æthiopis Mill. = S. Æth.
argentea Mill. = S. arg.
decidua Mœnch. = S. Verbenaca
glutinosa Mill. = S. glut.
lanata Mœnch = S. Æthiopis
nemorosa Mill. = S. silvestris
pratensis Mill. = S. prat.
silvestris Mill. = S. silv.
tomentosa Mill. = S. canariensis
triloba Raf. = S. tril.
tuberosa Mill. = S. pratensis
vulgaris Mill. = S. Sclarea
SCLERANTHUS I 332 (318)
ætnensis Strobl A 67 (1 var.)
ætnæus Hogg (1842) = perennis
ætnicolus Strobl (marginat.) = vulcanicus
annuus L. 332 (1), A 67
annuo × perennis Lasch A 67
arenarius Schur = annuo × perenn.
biennis Fr. (ann.) = hibernus et ann. × perenn.
biennis Reut. = hibernus

Digitized by Google

SCLERANTHUS I 332 (318)
cæspitosus Neilr. (ann.) = hibernus
campestris Schur = cymosus
Candolleanus Delort = collinus
collinus Horng. A 67 (1 β)
collinus Schur = cymosus
confertiflorus Boiss. (perenn.) = neglectus
cymosus Fenzl (ann.) 332 (1 α)
cymosus Posp. = prec.
Delorti Gren. A 67 (1 var.)
densiflorus Beckh. (ann.) = hibernus
elegans Barth = cymosus
fasciculatus Gill. et Coste (ann.) = hibernus
hibernus Rchb. (ann.) A 67 (1 var.)
hirsutus J. et C. Presl A 67 (1 var.)
intermedius Kitt. = annuo × perennis
marginatus Guss. 332 (2 b) = neglectus cfr. A 67
neglectus Roch. A 67 (2 b)
perennis L. 332 (2), A 67
polycarpus DC. (an L.?) = collinus
præcox Wallr. = collinus
pseudo-polycarpus Delacr. = collinus
repens Jan hb. = neglectus
repens Strobl (perenn.) = prec.
Strobli Rchb. A 67 (2 var.)
tauricus Presl = cymosus
venustus Rchb. A 67 (1 var.)
verticillatus Tausch 332 (1 β) = collinus, cfr. A 67
vulcanicus Strobl A 67 (2 var.)
SCLEROCHLOA I 96 (119)
articulata Lk. = divaricata
Borreri Bab. = Glyceria Borreri
dichotoma Lk. = maritima
distans Bab. = Glyceria dist.
divaricata Lk. 97 (8)
divaricata P. B. = Sphenopus divaricatus
dura P. B. 96 (1)
expansa Lk. = Sphenopus divaricatus
filiformis Torn. 97 (5 α b)
glaucescens Guss. (rigida) A 204 (5 c)
hemipoa Guss. 97 (5 β)
loliacea Fiori (marit.) A 29 (2 b)
loliacea Woods = Catapodium loliaceum
maritima Lindl. = Glyceria mar.
maritima Sweet 97 (2)
patens Presl A 204 (5 d)
procumbens P. B. 97 (4)
rigida P. B., Lk. 97 (5), A 204
robusta Fiori (rigida) A 204 (5 e)
umbrosa Ball (rigida) = patens
Zwierleinii Lojac. = glaucescens
SCLEROPHYLLUM = Crepis
pulchrum Gaud. = C. pulchra
SCLEROPOA = Sclerochloa
divaricata Parl. = S. divar.
hemipoa Parl. = S. hemipoa
loliacea Gr. et Godr. = Catapodium loliac.
maritima Parl. = S. mar.
patens Coss. et Dur. (rigida) = S. patens
procumbens Parl. = S. proc.
rigida Griseb. = S. rig.
robusta Duv.-Jouv. (rigida) = S. — robusta
SCLEROSTEMMA = Scabiosa
agreste Schott = S. gramuntia
argenteum Schott = S. arg.
atropurpureum Schott = S. atrop.
Columbarium Schott = S. Col.
lucidum Schott = S. luc.
pyrenaicum Schott = S. pur.
Scopolii Schott = S. Scop.
siculum Schott = S. sic.
SCOLOCHLOA = Arundo
arundinacea M. et K. = seg.
Donax Gaud. = A. Donax
SCOLOPENDRIUM I 13 (10)
bifidum Fée (offic.) = seg.
bifidum Trevis. (vulg.) A 7 (1 d)
breve Bert. = Hemionitis
Ceterach Roth = Ceterach officinarum
cordatum Fée = Hemionitis
cornutum Moore (vulg.) A 7 (1 f)
crispum W. (vulg.) A 7 (1 c)
dædalum W. (vulg.) A 7 (1 e)
fructuosum Christ (vulg.) A 7 (1 b)
furcatum Goir. (vulg.) = bifidum
hastatum Milde = Hemionitis
Hemionitis Sw. 13 (2), A 7
minus Fée A 202 (1 h)
obcordatum Bory = Hemionitis
officinale DC. = vulgare
officinarum Sw. = vulgare
Phyllitis Roth = vulgare
platyphyllum Goir. et Ton. (vulg.) A 202 (1 i)
sagittatum DC. = Hemionitis
Scolopendrium Karsten = seg.
vulgare Sm. 13 (1), A 7, 202
SCOLYMUS III 383 (924)
angiospermus Gærtn. = hispan.
annuus Gerard = maculat.
congestus Lam. = hispanicus
grandiflorus Desf. 384 (3)
gymnospermus Gærtn. = maculat.
hispanicus L. 383 (2)
maculatus All. = hispanicus
maculatus L. 383 (1)
paniculatus Ucria = maculatus
pectinatus Cass. = maculatus
perennis Gerard = hispan.
vivax Sauvag. = hispan.
SCOPOLIA II 395 (739)
atropoides Bercht. et Presl = seg.
carniolica Jacq. 395
Hladnikiana Fleischm. 395 (β)
longifolia Dun. (carniol.) 395 (α)
trichotoma Mœnch = carniol.
SCOPOLINA = Scopolia
atropoides Schult. = seg.
carniolica Schur = S. carniol.
Hladnikiana Freyer = S. Hladnikiana
viridiflora Freyer = prec.
SCORDIUM = Teucrium
officinale Gueld. = T. Scordium
palustre Fourr. = prec.
scordioides Fourr. = T. scordioid.
spinosum Cav. = T. spinos.
SCORODONIA = Teucrium
Arduini Rchb. = T. Arduini
Botrys Ser. = T. Botr.
cordata Mœnch = T. massiliense
heteromalla Mœnch = T. Scorodon.
massiliensis Lk. = T. massil.
sicula Raf. = T. siculum
silvestris Lk. = T. Scorodon.
solitaria Stokes = T. Scorodon.
spinosa Lk. = T. spinos.
trivialis Raf. = T. Scorodon.?
SCORPIOIDES = Myosotis
glaber Gilib. = M. palustris
hirsutus Gilib. = M. intermedia
SCORPIOIDES = Scorpiurus
muricata Medic. = S. muric.
sulcata Medic. = S. sulc.
vermiculata Medic. = S. verm.
SCORPIURUS II 89 (506)
acutifolius Viv. 89 (1 γ)
breviaculeatus Batt. et Trab. (subvill.) = acutifolius
echinatus Lam. = muricatus
eriocarpus Fiori (sulcatus) 89 (1 β b)
eriocarpus Moris (subvill.) = prec.
eriocarpus Rouy (breviaculeat.) = acutifol.
eriocarpus Ten. (subvill.) 89 (1 δ b)
glochidiatus Dur. = prec.
leiocarpus Fiori (acutifol.) 89 (1 γ b)
leiocarpus Rouy (breviaculeat.) = prec.
muricatus L. 89 (1), A 142
pusillus N. Terr. (vermicul.) 89 (2 b)
subvillosus L. 89 (1 δ), A 142
subvillosus Moris p. p., Gib. = sulcatus
sulcatus L. 89 (1 β)
sulcatus S. et S. = acutifolius
vermiculatus L. 89 (2)
SCORPIUS = Coronilla
scorpioides Medic. = C. scorp.
SCORPIUS = Genista
anglicus Pourr. = G. angl.
Clusii Mœnch = G. german.
hispanicus Pourr. = G. hisp.
spinosus Mœnch = G. german.
vulgaris Pourr. = G. Scorpius
SCORZONERA III 409 (942)
acaulis W. = Taraxac. palud.
alpina Hpe. = aristata
angustifolia Huter P. et R. (trachysp.) 412 (4 γ c)

Digitized by Google

SCORZONERA III 409 (942)
angustifolia Rchb. (non L.) = stenophylla
angustif. Scop. = stenophylla?
angustif. Weber = humilis (α)
angustif. W. et K., Ten. = villosa (α)
aristata Ram. 412 (5)
asphodeloides Wallr. = seg.
asphodeloides Wallr. (*glastifol.*) 412 (4 β b)
austriaca DC. (humilis) = austr. (α)
austriaca W. 412 (7)
autumnalis Lam. = Leontod. autumn.
bohemica Schm. = humilis
cærulea Saut. = Lactuca perennis
calcitrapifolia Vahl 410 (1 ζ), A 192
callosa Moris 411 (3 β)
Candollei Vis. = humilis (α)?
ciliata Forsk. = Reichardia tingitana
Columnæ Guss. 411 (3 α b)
Columnæ Guss. (lacin.) = sicula
Columnæ Moris = callosa
Columnæ Porta et Rigo exs. = trachysperma
corniculata Fiori (*intermedia*) 410 (1 δ c)
dalmatica Host = villosa (α)
decumbens Guss. 410 (1 ε)
decumbens Guss. (calcitrapif.) = prec.
decumbens Ten. (octangularis) = prec.
deliciosa Guss. 413 (9)
denticulata Lam. 412 (4 α)
dubia Ten. (trachysp.) = aristata?
edulis Mœnch = hispan. (α)
elata Ten. (lacin.) = lacin. (α)
elongata Guss. (*intermedia*) 410 (1 δ b)
eriosperma Gouan (non M. B.) = hirsuta
flore-albo Guss. (*deliciosa*) 413 (9 c)
glabra Ten. (trachysp.) = austriaca?
glastifolia W. 412 (4 β)
glastifolia γ Bert. = asphodeloides
glauca Salisb. = Reichardia tingitana
graminifolia All. = aristata
graminifolia Hoffm. et Auct. it. (non L.) = glastifol.
grandiflora Lap. = aristata
hirsuta Guss., Ten. p. p. = villosæformis
hirsuta L. 411 (2)
hirsuta Wulf. = villosa
hispanica L. 411 (4)
Hoppeana Sieb. = aristata
humilis Fiori (*Tenorii*) 410 (1 γ b)
humilis Kram., Jacq. = austriaca
humilis L. 412 (6)
humilis Ten. (lacin.) = humilis Fiori
intermedia Guss. 410 (1 δ)
Jacquiniana Boiss. 410 (1 β)
julia Vest. = villosa (α)
laciniata Jacq. = Jacquiniana
laciniata L. 409 (1), A 192
lanata Schrank = humilis
lanigera Huter P. et R. (*austr.*) 413 (7 α b)
latifolia DC. (humilis) = platyphylla
latifolia Koch (hisp.) = hispanica (α)
latifolia Neilr. (humilis) = latifrons
latifolia Vis. (non DC.) = platyphylla
latifrons G. Beck (*humilis*) 412 (6 β)
macrorrhiza Schleich. = humil.
major Ten. (graminifol.) = tenuifol.?
minor N. Terr. (hirs.) = villosæformis?
montana Mutel = glastifol.
multiceps G. Beck (*Jacquin.*) 410 (1 β a)
muricata Balb. 409 (1 α b)
nervosa Lam. (non Trevir.) = humilis
oblongifolia Vis. (*austr.*) 413 (7 α)
octangularis W. 410 (1 α d)
orientalis L. = Reichardia — orient.
paucifida Lam. = laciniata (α)
petiolaris Lap. = laciniata (α)
picroides L. = Reichardia picr.
pinifolia Gouan = subulata?
plantaginea Gaud. = seg.
plantaginifolia Schleich. 412 (6 α)
platyphylla G. Beck (*austr.*) 413 (7 γ)
plurifida Lam. = calcitrapifol.
pubescens Guss. (*trachysp.*) 412 (4 γ b)
purpurea L. 413 (8)
purpurea Poir. = deliciosa
resedifolia L. = Launæa resedifolia
resedifolia Retz., Gouan = calcitrapifol.
rosea W. et K. 413 (8 β)
sardoa Spr. = callosa
sativa Gater. = hispan. (α)
sicula Fiori (*Jacquin.*) 410 (1 β c)
sicula Guss. (lacin.) = prec.
simplex G. Beck (*Jacquin.*) 410 (1 β b)
sinuata Wallr. (hisp.) = hispan. (α)
stenophylla G. Beck (*austr.*) 413 (7 β)
subulata Lam. 410 (1 α c)
Taraxaci Roth = Taraxac. paludosum
taraxacifolia Jacq. = Hypochæris Balbisii
Tenorii Presl, Guss. 410 (1 γ)
tenuifolia Bert. = aristata
tenuifolia Schrad. 412 (4 β b) (?) = humilis (α)?
tingitana L. = Reichardia tingitana
trachysperma Guenth. 412 (4 γ)
undulata Guss. (*trachysp.*) 412 (4 γ d)
undulatifolia Guss. (*deliciosa*) 413 (9 b)
variifolia Salisb. = Reichardia picroid.
villosa Scop. 411 (3)
villosa Zersi = hirsuta?
villosæformis Fiori (*hirs.*) 411 (2 β)
SCORZONEROIDES = Leontodon
autumnalis Mœnch = L. autumn.
SCRIBÆA = Cucubalus
baccifera Schur = C. baccifer.
Cucubalus Borkh. = prec.
divaricata Gærtn. = prec.
SCROPHULARIA II 427 (754)
alata Gilib. 429 (4 β), A 169
albiflora Goir. (*canina*) 430 (8 α d)
albiflora Zersi (*Hoppei*) 430 (8 β c)
appendiculata Balb. ex Wydl. = auricul.
appendicul. Jacq. = trifolia
aquatica Koch et Auct. = alata
aquatica L. 429 (4), A 169
atropurpurea Moretti = canina
auriculata L. 429 (4 δ)
auriculata Scop. = Scopolii
Balbisii Horn. 429 (4 α)
betonicæfolia Viv. = aquatica
betonicifolia L. = Scorodonia
bicolor S. et S. 430 (8 α c)
brachycarpa Bég. (*vernalis*) 428 (1 β)
canina Hpe. = Hoppei
canina L. 430 (8)
chrysanthemifolia W., M. B. = bicolor
cordata Mill. = Scorodonia
cordata W. et K. = vernalis
Ehrharti Stev. = alata
filicifolia S. et S. 430 (7 β)
frutescens DC. (non L.) = ramosissima
geminiflora Lam. = peregrina
glandulifera Clark. = Scopolii?
glandulosa W. et K. = Scopolii
grandidentata Ten. 429 (3 β)
Gussonei Nym. = pinnatifida
hirsuta Horn. = Scopolii
Hoppei Koch 430 (8 β)
italica Mill. = nodosa
laciniata W. et K. 430 (7 γ)
lancifolia Presl = quid?
latifolia Host = vernalis
lucida All. = canina
lucida Guss. = filicifolia
lucida L. 430 (7)
lutea S. F. Gray = vernalis
majellensis Huet (*grandiflora*) 429 (3 β b)
melissæfolia Salisb. = Scorodonia

Digitized by Google

SCROPHULARIA II 427 (754)
mellifera Lois. (non Ait.) = trifoliata
meridionalis Presl = peregrina
minor Savi = peregrina
multifida Goir. (*Hoppei*) 430 (8 β b)
multifida Lam. (non W.) = canina
Neesii Wirtgen 429 (4 γ)
nodosa L. 429 (5)
oblongifolia Lois. = aquatica
paniculata Seenus = seg.
peregrina L. 428 (2)
pinnata Mill. = canina
pinnatifida Brot. 430 (8 α b)
pubescens Caruel (aquatica) = auriculata
pumila Goir. (*vernalis*) 428 (1 α b)
pyramidalis Wydl. = canina
ramosissima Lois. 431 (8 γ)
rivularis Moris = aquatica
rugosa W. = Scopolii
sambucifolia Auct. (non L.) = trifoliata
Scopolii Hpe. 428 (3)
Scorodonia Host = Scopolii
Scorodonia L. 431 (nota)
sexangularis Mœnch = peregrina
Sibthorpiana Spr. = laciniata
silaifolia Clarke = prec.
subaptera Goir. (*alata*) A 169 (4 β b)
subverticillata Moris = auricul.
sulphurea Mill. = auricul.
trifoliata Hoffgg. et Lk. = auricul.
trifoliata L. 429 (6)
umbrosa Dum. = aquatica
umbrosa Salzm. = auricul.
verna Mill. = seg.
vernalis L. 428 (1)
verticillata Moris = auricul.
SCUTELLARIA III 15 (780)
alpina L. 16 (1), A 172
altissima L. 16 (2 β)
altissima A. Ham. et Auct. = Columnæ
Columnæ All. 16 (2 γ)
Columnæ Host = altissima
commutata Guss. = altiss.
compressa A. Ham. = alpina
epilobiifolia A. Ham. = seg.
galericulata L. 17 (4), A 172
glaberrima Benth. (*galeric.*) A 172 (4 c)
Gussonei Ten. 16 (2 γ b)
hastifolia L. 17 (3)
hirsuta Kit. = Columnæ
humilior Goir. (*galeric.*) 17 (4 b)
lateriflora Benkö (non L.) = altissima
Linneana Caruel 16 (2 α)
lupulina L. = alpina
minor Huds., L. 17 (5)
pallida Guss. (non M. B.) = Gussonei
peregrina L. 16 (2)
peregrina S. et S. = Gussonei
peregrina W. et K. = altissima
SCUTELLARIA III 15 (780)
pubescens Martr. = galericul.
pumila Salisb. = minor
Sibthorpii Benth. (Columnæ) = Gussonei
variegata Spr. f. = alpina
SECALE I 109 (129)
barbatum Mœnch = seg.
cereale L. 110
montanum Guss. 110 (β)
strictum Presl = montanum
villosum Huds. = Elymus europæus?
villosum L. = Triticum vill.
SECALIDIUM = Agropyrum
pectinatum Schur = A cristatum
SECURIDACA = Bonaveria
legitima Gærtn. = B. Securidaca
lutea Mill. = prec.
vera Hort. = prec.
SECURIGERA = Bonaveria
Coronilla DC. = B. Securidaca
legitima Desv. = prec.
Securidaca Jacks. = prec.
SECURILLA = Bonaveria
Securidaca Gærtn. = B. Secur.
SECURINA = Bonaveria
lutea Medic. = B. Securidaca
SEDUM I 547 (453)
acre L. 549 (11 β), A 115
acre Moris = alpestre
æstivum All. = annuum
ætnense Tin. 551 (20)
albescens Haw. 548 (8 d)
album L. 549 (12), A 115
album L. (*Telephium*) 547 (2 a)
alpestre Vill. 549 (10), A 115
alsinæfolium All. 550 (17)
altissimum Poir. = nicæense
altum Clarke = prec.
amplexicaule DC. = tenuifol.
Anacampseros L. 548 (4)
andegavense DC. 552 (29)
anglicum Auct. it. (non Huds.) = dasyphyllum
anopetalum DC. 548 (8 b)
annuum All. = alpestre
annuum L. 551 (22)
aristatum Ten. (non Vill.) = hispanic.
atratum Bast. = andegavense
atratum L. 551 (23)
atratum Pucc. = alpestre
atratum Rom., Trev. = rubens
atratum Sacc. et Bizz. = hispanic.
aureum Wirtg. = Forsterianum
azureum Desf. = heptapetalum
boloniense Lois. = mite
brevifolium DC. 550 (14 γ)
brutium N. Terr. 550 (15 b), A 116
Burnati Briq. A 115 (14 α for.)
cæruleum Caruel = dasyphyllum
cæruleum Vahl, Auct. it. = heptapetalum
cæspitosum DC. 552 (28), A 116
calabricum Ten. ex Steud. = quid?
carinatum Lk. = tenuifol.
SEDUM I 547 (453)
Cepæa L. 551 (18)
Clusianum Guss. 549 (12 c)
collinum W., Ten. = glaucum
complanatum Gilib. = Telephium
corsicum Duby 550 (14 α d) = glandulifer, cfr. A 116
corsicum Rouy et Cam. (*maxim.*) A 115 (1 b)
cristatum Schrad. = rupestre
cruciatum Desf. = monregalense
dasyphyllum Bert. p. p., Zum. = hirsutum
dasyphyllum Desf. = glanduliferum
dasyphyllum L. 550 (14), A 115
decumbens Lucé = Telephium
deltoideum Ten. = stellatum
divaricatum Lap. = annuum
dioicum Donn = nicæense
dioicum Stokes = roseum
divaricatum Lap. = annuum
Donatianum Vis. et Sacc. (*dasyphyll.*) 550 (14 β)
droseræfolium Bell. (*non Wats.*) 550 (14 α a)
elegans Lej. = Forsterianum
eriocarpum S. et S. 552 (26 b)
Fabaria Auct. pl. = purpureum
Fabaria Koch 547 (3)
Forsterianum Sm. 549 (9 b)
Forsterianum Rchb. = spirale
fruticulosum Brot. = nicæense
galioides Pourr. in All. = Cepæa (for.)
glanduliferum Guss. 550 (14 α b), A 116
glandulosum Moris 551 (24 b)
glaucum Donn, Sm. 548 (8 a)
glaucum Lam. = dasyphyll.
glaucum W. et K., Ten. = hispanic.
globiferum Pourr. = brevifol.
globulifolium Moris in Sweet = prec.?
granulatum Salisb. = dasyphyll.
Guetardi Vill. p. p., Balb. = alpestre
hæmatodes Scop. = atratum
heptapetalum Poir. 552 (25), A 213
hirsutum All. 549 (13)
hirsutum DNtrs. = glanduliferum
hirsutum Ten. = dasyphyllum
hispanicum DC. = anopetalum
hispanicum L. 552 (26)
hispidum Poir. (non Desf.) = hirsut.
hungaricum Poir. = hispanic.
insipidum Godet = mite
insulare Moris = quid?
Jacquinii Haw. = nicæense
latifolium Bert. = maximum
latifolium Rouy et Cam. (altissimum) = soluntinum
Lejeunianum Hornung = Forsterian.
litoreum Guss. 551 (21), A 116
lusitanicum Brot. = nicæense

Digitized by Google

SEDUM I 547 (453)
luteo-virens Briq. A 115 (14 α for.)
magellense Ten. 550 (15), A 116
Marichalii Lloyd = litoreum
maximum Hoffm., Sut. 547 (1), A 115
maximum L. (Telephium) = prec.
mediterraneum Rouy et Cam. (*rubens*) A 116 (27 b)
micranthum Bast. 549 (12 d)
mite Gilib. 549 (11 α)
monregalense Balb. 550 (16)
neapolitanum Ten. 550 (14 α e)
nebrodense Gasp. 550 (14 α c)
neglectum Ten. 549 (11 β b)
nicæense All. 548 (7), A 115
Notarjanni Ten. 552 (nota)
ochroleucum Chaix = anopetalum
ochroleucum Vill. = nicæense
olympicum Boiss. = magellense
ovalifolium N. Terr. (*dasyphyll.*) A 115 (14 α for.)
pallidiflorum Rouy et Cam. (rubens) = rubens (a)
pallidum Ten. (non M. B.) = hispanic.
paniculatum Lam. = Cepæa
populifolium Pall., L. 552 (nota)
pruinatum Lk. in Brot. 549 (9), A 115
pseudo-hispanicum Strobl = hispanic.
puberulum DC. = hispanic.
purpurascens Goir. (*album*) A 115 (12 e)
purpurascens Koch = Telephium
purpureum L. (*Telephium*) 547 (2 b)
purpureum Lk. = prec.
reflexum Friv. = tenuifol.
reflexum L. 548 (8 c)
repens Schleich. = alpestre (for.)
Rhodiola DC. = roseum
rhodioloides Raf. = prec.
roseum Scop. 548 (5)
rostratum Ten. = tenuifol.
rotundifolium Lam. = Anacampseros
rubens Hænke = alpestre
rubens Jacq. = atratum
rubens L. 552 (27), A 116
rubens Pollini = hispanic.
rufescens Ten. = nicæense
rupestre Hacq. = alpestre
rupestre L. 549 (8)
rupestre Vill. = anopetalum
salonitanum Bert. = soluntinum
saxatile All. = alpestre
saxatile DC. = annuum
saxatile Moris = litoreum
Scheuchzeri Schleich. = alpestre
schistosum Lej. = mite
Scopolii Rouy et Cam. (Rhodiola) = roseum (for.)

SEDUM I 547 (453)
sexangulare L. 549 (11), A 115
Smithianum Rouy et Cam. (rupestre) = glaucum
soluntinum Tin. 548 (7 b)
Sommierianum Palanza A 116 (28 bis)
spathulatum W. et K. = Cepæa
sphæricum Lap. = brevifolium
spirale Haw. = acre (for.)
stellatum L. 551 (19)
stellatum Urv. = litoreum
tectorum Scop. = Semperv. tect.
Telephium L. 547 (2)
Teleph. γ L. = Fabaria
Teleph. δ L. = maximum
Teleph. Rchb. = Fabaria
tenuifolium Strobl 548 (6)
teretifolium Lam. = album
turgidum Ram. 549 (12 b)
turgidum Salzm. = brevifol.
uniflorum Raf. = Cepæa (for.), cfr. p. 551
verticillatum Latour. (non L.) = galioides
villosum L. 552 (24)
virens Ait. = rupestre
virescens W. = prec.
vulgare Lk. = Telephium
SEIDLIA = Scirpus
radicans Opiz = S. radic.
silvatica Opiz = S. silvat.
SELAGINELLA I 23 (23)
ciliata Opiz = spinosa
denticulata Spring 24 (8)
helvetica Spring 24 (2)
hortensis Metten. = Kraussiana
Kraussiana Kunze in A. Br. 24 (nota)
Selaginoides Lk. = spinosa
spinosa P. B. 23 (1)
spinulosa A. Br. = spinosa
SELAGO = Lycopodium
vulgaris Schur = L. Selago
SELENOPSIS = Laurentia
Bivoneana Presl = L. tenella
Laurentia Presl = L. Michelii
Salzmanniana Presl = prec.
SELINUM II 170 (561)
acutangulum Gilib. = Carvifol.
affine Zum. = Peuced. Oreoselinum?
Anethum Roth = Anethum graveolens
Angelica Roth = Angel. silvestris
angulatum Lam. = Carvifolia
annuum Steud. = Seseli ann.
apioides Arc. = Cnidium silaifol.
appuanum Viv. = Carum rigidulum
Archangelica Lk. = Angelica Archang.
argenteum Crantz, All. = Peuced. austriacum (α a)
aristatum Ait. = Ligustic. pyrenæum
austriacum Jacq. = Peuced. austr.
Bellardi Balb. = Peuced. rablense
carniolicum Hpe. = prec.

SELINUM II 170 (561)
Carvifolia Gib. et Pir. = Cnidium silaifol.
Carvifolia L. 170
carvifolium Crantz = Peuced. carvifol.
Cervaria L. = Peuced. Cerv.
cervicaria Roth = prec.
Chabræi Bert. = Peucedanum Schottii
Chabræi Jacq., DC. = Peuced. carvifolia
decussatum Clairv. = Peuced. carvifol.
densiflorum Salisb. = Cnidium Monnieri
dimidiatum DC. = Seseli annuum
elegans Balb. = Peuced. austriac.
glaucum Lam. = Peuced. Cervaria
Imperatoria Crantz, All. = Peuced. Ostruthium
imperatorioides Lk. = Peuced. angustifol.
intermedium Bess. = Peuced. palustre
lactescens Gilib. = Peuced. palustre
lactescens Lam. = Peuced. carvifol.
lineare Spr. = Peuced. rablense
membranaceum Vill. = Carvifolia
Monnieri L. = Cnidium Monn.
montanum Schl. = Peuced. mont.
nigricans Gaud. = Peuced. montan.
nigrum Lam. = Peuced. austriacum
Opopanax Crantz = Pastinaca Opop.
Oreoselinum Crantz = Peuced. Oreosel.
Ostruthium Wallr. = Peuced. Ostruth.
palustre Crantz = Carvifolia
palustre L. = Peuced. pal.
palustre Thuill. = Peuced. carvifolium
Pastinaca Crantz = Pastinaca sativa
peregrinum W. = Cnidium silaifol.
peucedanoides Desf. = Peuced. montanum
Peucedanum Crantz = Peuced. officinale
Peucedanum Crantz = Peuced. offic.
podolicum Bess. = Peuced. carvifolium
polymorphum Spr. = Peuced. montanum
Pseudo-carvifolia All. = Carvifolia
pubescens Mœnch = Angelica silvestr.
rablense Spr. = Peuced. rabl.
rigidulum Viv. = Carum rigidul.
Seguieri Baumg. = Carvifolia

Digitized by Google

SELINUM II 170 (561)
Seguieri Jacq. = Ligusticum Kochianum
silvestre Crantz = Angelica silv.
silvestre Jacq. et Auct. it. (non L.) = Peuced. palustre
spinulifolium Stokes = Peuced. Cervaria
sublactescens Gilib. = Peuced. palustre
sulcatum Bert. = Peucedanum montanum
tenuifolium Salisb. = Carvifol.
Thysselinum Crantz = Peuced. palustre
venetum Spr. = Peuced. venet.
verticillare Lk. = Peuced. vert.
SEMIDOPSIS = Alnus
viridis Zum. = A. Alnobetula
SEMPERVIVUM I 545 (452)
acuminatum Schott (non Jacqm.) = Schottii
affine Lamotte A 115 (8 for.)
alpestre Lamotte A 114 (5 for.)
alpinum Gris. et Schk. 547 (8 d)
alpinum Vis. et Sacc. = Mettenianum
angustifolium A. Kern. 546 (6 b)
angustifolium Dœll (tector.) = Mettenianum
angustifolium Leyb. (tector.) = dolomiticum
anomalum Lk. = Sedum tenuifolium
arachnoideum L. 546 (3), A 114
arachnoid. × *montan. Bruegg.* A 114
arboreum L. 545 (1)
arenarium Koch A 114 (2 c)
barbulatum Schott = mont. × arachn.
Boutignyanum Bill. et Gren. = alpinum
brachiatum Lamotte A 115 (8 for.)
Braunii Auct. it p. p. = Gaudinii
Braunii Facch. = Wulfen. × mont.
Braunii Funck 546 (6)
calcareum Jord. = glaucum
Candollei Rouy et Cam. = montan.
Cand. × arachn. Rouy et Cam. = mont. × arachn.
Cerdanum Gaut. = mont. × arachn.
Christii Wolf = Gaudinii × mont.
Clusianum Ten. = tectorum ?
Comollii Rota = Wulfen. × tector.
debile Schott A 114
Dœllianum C. B. Lehm. A 114 (3 β)
Dœllian. × *montan. Bruegg.* A 114
dolomiticum Facch. 546 (5 b)
fimbriatum Schnittsp. et Lehm. = mont. × arachn.
SEMPERVIVUM I 545 (452)
Fontanæ Bruegg. = Metten. × Dœllian.
Foucaudi Gaut. = mont. × arachnoid.
frigidum Lamotte A 114 (5 for.)
Funckii F. Braun 546 (4), A 114
Funckii Facch. = alpinum
Funkii Auct. pl. = Funckii
Gaudinii Christ A 114 (6 bis)
Gaudin. × *arachnoideum Wilczek* A 114
Gaudin. × *Funckii Chenev.* A 114
Gaudin. × *montan. Wolf* A 114
glabrescens Wk. (arachnoid.) = Dœllianum
glabriusculum Caruel (hirtum) = soboliferum
glaucum Ten. 546 (8 b)
globiferum Comolli = Wulfen. × tector.
globiferum Gaud. et Auct. pl. = Gaudinii
globiferum Rchb. = soboliferum
globiferum Wulf. in Jacq. (an L.?) = Wulfenii
grandiflorum Haw. = Gaudinii
heterotrichum Favre = arachnoideum?
hirtum Jacq. = soboliferum
hirtum L. 546 (2), A 114
hirtum Sternb. = arenarium
hirtum β Bert. = arenarium
Huteri A. Kern. = Wulfen. × mont.
Huteri Hausm. (*montan.*) A 114 (5 for.)
hybridum Bruegg. = Dœlliano × mont.
Kochii Facch. = arenarium
Mettenianum Schnittsp. et Lehm. A 115 (8 for.)
Metten. × arachn. Bruegg. = Metten. × Dœllian.
Metten. × *Dœllian. Wohlf.* A 115
minimum Timb. A 114 (5 for.)
montanum L., Jacq. 546 (5), A 114
montanum L. p. p. = alpinum
montanum M. et K. = Funckii
montan. × *alpinum Bruegg.* A 114
montan. × *arachnoid. Focke* A 114
oligotrichum Dalla Torre (non Bak.) = dolomiticum
parviflorum Wk. (tector.) = Mettenianum
piliferum Jord. 546 (3 b) = tector. × arachn, cfr. A 115
pruinatum Spr. = Sedum pruinatum
pygmæum Jeanb. et Timb. = minimum
rhæticum Bruegg. = mont. × alpin.
rhæticum Rota = Wulfen. × tector.
SEMPERVIVUM I 545 (452)
rigidum Jord. et Fourr. = speciosum
roseum Hut. et Gand. = Wulfen. × arachn.
rupestre Rouy et Cam. = tectorum (a)
rupestre × arachn. Rouy et Cam. = tector. × arachn.
rupicolum Chenev. et Sch. (non Kern.) = Gaudin. × mont.
saxosum Jord. et Fourr. = brachiatum
Schottii Bak. 546 (8 c), A 115
sediforme Jacq. = Sedum nicæense
speciosum Lamotte A 115 (8 for.)
soboliferum Sims 546 (2 b), A 114
tectorum L. 547 (8), A 115
tector. × *arachnoid. Fiori* A 115
tector. × arachnoid. Gremli = Metten. × Dœllian.
tenuifolium S. et S. = Sedum tenuifol.
Theobaldii Bruegg. = Wulfen. × mont.
Vaccarii Wilczek = Gaudin. × arachnoid.
Widderi Lehm. et Schnittsp. = Wulfen. × mont.
Wolfianum Chenev. = Gaudin. × Funckii
Wulfenii Auct. it. p. p. = Gaudinii
Wulfenii Bert. p. p. = Braunii
Wulfenii Hpe. 546 (7)
Wulfen. × *arachnoid. Hut. et Gand.* A 114
Wulfen. × *montan. A. Kern.* A 114
Wulfen. × *tectorum Dalla Torre* A 115
SENCKENBERGIA = Lepidium
ruderalis Gærtn. M. et S. = L. ruderale
SENEBIERA = Coronopus
Coronopus Poir. = C. procumbens
didyma Pers. = C. didymus
incisa W. = prec.
pectinata DC. = prec.
pinnatifida DC. = prec.
SENECIO III 208 (858)
abrotanifolius L. 213 (11)
acanthifolius Kostel. = Cineraria
ægyptius L. A 181
ætnensis Jan 213 (10 γ)
alpester DC. 219 (22)
alpester Auct. it. = subcordatus
alpester Gaud. = Fuchsii
alpinus Scop. 218 (21)
altissimus Mill. = Doria
ambiguus DC. 215 (14 δ), A 181
angustifolius Pirona (*Doria*) A 181 (18 b)
angustifol. Spenn. 217 (19 β b)

Digitized by Google

SENECIO III 208 (858)
angustisectus Fiori (*barbar.*) 218 (12 β a)
anthemifolius Sieb. = Badaroi
anthoræfolius Rchb.(non Presl) = præaltus
apenninus Tausch 218 (20 β)
appendiculatus Sacc. (*alpin.*) 219 (21 β)
apuanus Fiori (*nemor.*) 217 (19 α d)
apuanus Tausch ex Rchb. = quid?
apulus Ten. = vernus
aquaticus Hill, Huds. 214 (12 γ), A 181
aquaticus Ten. = barbareæfolius?
arachnoideus Sieb. 218 (20 ε)
arenarius Salzm. (non M. B., nec Thunb.) = pedunculosus
aurantiacus Less., DC. 221 (23 β)
auriculatus Rchb. (*alpin.*) 219 (nota)
auriculat. Steud. = prec.
auriculat. Ten. (alpin.) = appendiculatus
auriculatus W. Meyer (*silvat.*) 210 (8 b)
Badaroi Moretti 210 (5 c)
Balbisianus DC. 220 (22 θ)
baldensis Poir. = alpinus (α)
baldensis Ten. = samnitum
barbareæfolius Krock. 214 (12 β), A 181
barbareæfol. Rchb. = pratens.
Barrelieri Gouan 218 (20 α b)
Barrelieri Hpe. = nemorens.
bicolor Huter P. et R. (chrysanth.) = gibb. v. chrysanth.
bicolor Tod. 215 (14 β)
bohemicus Tausch = paludosus a. glabratus
borysthenicus Andrz. = præaltus
brachychætus DC. 220 (22 η)
Cacaliaster Lam. 217 (19 δ)
calabrus Fiori (*nebrod.*) 212 (9 γ)
calvescens Moris et DNtrs. = Ciner. × erraticus
calvus Fiori (*brachych.*) 220 (22 η c)
campester DC. 221 (23), A 181
candidus DC. = Ciner. v. nebrodensis
canescens Bernh. = erucifolius
capitatus DC. (*aurant.*) 221 (23 β c)
carniolicus W. 216 (15 β)
carnosus Lam. = Doria
carnosus Posp. (*vulg.*) 209 (1 γ)
carnosus Presl (non Thunb.) = sætnensis
ceratophyllus Fiori (*Cineraria*) 215 (14 α b)
chamædrioides Lojac. (*vernus*) A 181 (8 ζ b)
chrysanthemifolius Fiori (*gibbosus*) 215 (14 γ b)
chrysanthemifolius Moretti = præaltus
SENECIO III 208 (858)
chrysanthemifolius Poir. 212 (10 α)
chrysanthemoides Schrank = prec.
Cineraria DC. 214 (14), A 181
Cineraria × erraticus 215
Cinerariæ Spr. = præaltus
cinerarioides Viv. (*non Rich.*) 214 (18 α b)
Clusianus Rchb = ovirensis
Clusii Sch. Bip. = Doronicum hirsut.
commutatus Hell. = angustif.
cordatus Koch = alpin. (α)
cordatus Pirona = pseudo-crispus
cordifolius Lk. (non L. f.) = seg.
cordifolius Rchb. (*alpinus*) 218 (21 α)
cordifolius Ten. (alpin.) = samnitum
coronopifolius Desf. 210 (7), A 181
corsicus Sch. Bip. = Doronic. cors.
corymbosus Dalla Torre (non Wall.) = incanus
crassifolius Fiori (*ovirensis*) 219 (22 β b)
crassifolius Guss. p. p. = leuc. v. pinnatifidus
crassifolius Rchb. f. = Reichenbachii
crassifolius W. 211 (8 θ)
crinitus Bert. = Badaroi
crispatus DC. 220 (22 δ)
crispus Kitt., Kern. (non Thunb.) = crispatus
crithmoides Scop. = Inula crithm.
croaticus W. et K. = Cacaliaster
Cupanii Fiori (*nebrod.*) 215 (14 ε b)
delphinifolius Rchb. = erucifol.
delphinifolius Vahl 210 (5)
denticulatus Nolte (non Muell.) = radiatus
desquamatus W., Lk. = gallicus
difficilis Duf. 210 (6 a)
discoideus Boiss. (*ægyptius*) A 180
discoideus Pirona (*erraticus*) 214 (12 β c)
Doria L. 217 (18), A 181
Doronicum L. 218 (20), A 181
dumetorum G. Beck (*alpester*) 219 (nota)
eradiatus Fiori (*Gaudini*) 220 (22 ζ b)
erraticus Bert. 214 (12 β b)
erratic. × Cineraria 215
erucifolius L. 214 (13)
erucoides Fiori (*Jacob.*) 213 (12 α)
exsquameus Brot. 210 (6 b)
ficoides Sch. Bip. A 181
flabellatus Viv. = Badaroi
floccosus Fiori (*arachn.*) 218 (20 ε b)
flosculosus Gilib. = vulgaris
SENECIO III 208 (858)
fluviatilis Wallr. 217 (19 γ)
fœniculaceus Ten. 209 (2 b), A 181
fontanus Wallr. = Jacquinianus
frondosus Tausch = germanicus
Fuchsii C. C. Gmel. 217 (19 β), A 181
gallicus Chaix 210 (6)
Gaudini Gremli 220 (22 ζ)
Gerardi Arc. (Doronic.) = subtomentosus
germanicus Wallr. 217 (19 α a)
gibbosus DC. 215 (14 γ)
glaber Clairv. = Adenostyles glabra
glaber Ucria 213 (10 β)
glabratus DC. (*aurant.*) 221 (23 β a)
glabratus DC. (*camp.*) 221 (23 α d)
glabratus DC. (*incanus*) 216 (15 α b)
glabratus DC. p. p., Guss. (*nebrod.*) 212 (9 α b)
glabratus Fiori (*ambiguus*) A 181 (14 δ b)
glabratus Heg. (Doronic.) = Doronic. (α a)
glabratus Koch (*palud.*) 216 (17 a)
glabratus Ten. (*alpin.*) 219 (21 δ)
glabrescens Fiori (*alpinus*) 218 (21 α b)
glabrescens Hausm. (*carniol.*) 216 (15 β c)
glabrum Evers (*Doronic.*) A 181 (20 α a)
glaucescens Spr. = glaber
glacialis Sch. Bip. = Doronic. glaciale
glaucescens Spr. = squalidus
glaucus DC. = leucanthemifolius
graniticus G. Beck (*Fuchsii*) 217 (19 β c)
hirsutus Clairv. = Adenostyles Alliariæ
Hoppeanus G. Beck (*alpester*) 219 (22)
humilis DC. (*camp.*) 221 (23 α a)
humilis Desf. 211 (8 α b)
humilis Duby = pedunculosus
humilis Goir. (*nemorens.*) A 181 (19 α f)
incanescens A. Kern. (*carniol.*) 216 (15 β b)
incanus Bœber = erucifolius
incanus L. 215 (15)
incanus Scop. = carniolicus
incano × abrotanifolius 221 (nota)
incisus DC. (sætnensis) = seg.
incisus Presl (non Thunb.) = glaber
incrassatus Guss. 211 (8 γ), A 181
infestus Salisb. = Jacobæa
integrifolius A. Kern. (non Nutt.) = campester

Digitized by Google

SENECIO III 208 (858)
intercedens G. Beck (*nemor.*) 217 (19 α b)
intermedius Fiori (*delphinifol.*) 210 (5 b)
intermedius Jan (squalidus) = glaber
italicus Pers. (*incanus*) 216 (15 γ)
Jacobæa L. 213 (12), A 181
Jacobæa Moris et DNtrs. = barbareæfol.
Jacobæa Rchb. f. = angustisectus
Jacobæa A Ten. = angustisectus?
Jacobæa B. et Bb Ten. = Jacobæa (α)?
Jacquinianus Rchb. 217 (19 α c)
Jæggianus Chenev. (*Doronic.*) A 181 (20 α d)
Kerneri Venzo hb. = Crepis — Kerneri
laciniatus Bert. = rupestris, sardous
laciniatus Vis., Rchb. f. (nebrod.) = nebrod. v. pinnatifidus
lactescens Brot. = Crepis fœtida
lanatus Scop. (non L.) = arachnoideus
latilobus DC. (Chrysanth.) = gallicus
laxiflorus Guss. (gallicus) = coronopifol.
laxiflorus Viv. 210 (6 c)
laxus DC. (*delphinifol.*) 210 (5 d)
leucanthemifol. Moris p. p. = leuc. v. pinnatifidus
leucanthemifolius Poir. 211 (8), A 181
leucanthemifol. Somm. et Biondi hb. = sardous
linifolius Ucria (non L.) = ætnensis
littoralis Scop. (non Gaudich.) = Inula viscosa
lividus L. 209 (2), A 181
lividus Nolte = auriculatus
lividus Sm. = viscosus
livido-vulgaris Lojac. A 181
lycopifolius Desf., Guss. 214 (13 β)
lyratifolius Rchb. 221 (nota)
magellensis Ten. A 181 (23 for.)
maritimus Rchb. (non L. f.) = Cineraria
Marmoræ Moris 211 (8 δ)
microglossus DC. (*squalidus*) 212 (10 α b)
minutus Lojac. (*coronopifol.*) A 181 (7 b)
mikanioides Otto 221 (nota)
montanus Lam. = Doronicum
montanus W. = nebrodensis
multifidus W. = tenuifol.
napifolius Schrad. = erucifol.
neapolitanus Evers = Ciner. × erraticus
nebrodensis Fiori (*Cineraria*) 215 (14 ε)
nebrodensis Guss. = nebrod. α siculus
nebrodensis L. 212 (9), A 181
nebrodensis α et β Vis., Rchb. f. = rupestris
neglectus Paolucci (Doronic.) = apenninus
nemophilus Dum. = Fuchsii
nemoralis Genn. (leucanth.) = sardous
nemorensis Jacq. = Jacquinianus
nemorensis Led. = octoglossus
nemorensis L. 217 (19), A 181
nemorensis D Ten. = Cacaliaster
nemorensis Rchb. = intercedens
octoglossus DC. 217 (19 α e)
octonarius G. Beck (*Fuchsii*) 217 (19 β e)
odorus Koch (nemor.) = Jacquinianus
orientalis Ten. (non W.) = apenninus
ovatus W. 217 (19 β a)
ovirensis DC. 220 (22 β)
paludosus L. 216 (17)
palustris Posp. (barbar.) = aquaticus
palustris Spenn. (Jacob.) = aquaticus
papposus Less. 220 (22 γ)
paradoxus Hpe. A 181 (9 δ b)
parviflorus All., DC. 216 (15 α c)
pauciflorus Fiori (*samnitum*) 219 (21 γ c)
pauciflorus Guss. (*nebrod.*) 212 (9 α c)
pauciflorus N. Terr. (cordif.) = samnitum c. paucifl.
pectinatus Guss. (*leucanth.*) 211 (8 β)
pedunculosus DC. (humilis) = seg.
pedunculosus Fiori (*leucanth.*) 211 (8 η)
Persoonii DNtrs. = italicus
pinnatifidus Fiori (*leucanth.*) 211 (8 ε)
pinnatifidus Fiori (*nebrod.*) 212 (9 ε)
pinnatifidus Gr. et Godr. (aquat.) = pratensis
polycephalus DC. p. p. (Doronic.) = Barrelieri
prœaltus Bert. 214 (18 δ)
pratensis DC. 220 (nota)
pratensis Richter 214 (12 γ b), A 181
procerus G. Beck (*campester*) 221 (23 α c)
procerus Salisb. = fluviatilis
pseudo-arachnoideus Fiori (*Doronic.*) 218 (20 δ)
pseudo-auriculatus Fiori (*appendicul.*) 218 (21 β b)
pseudo-crispus Fiori (*alpester*) 220 (22 ε)
pseudo-silvaticus Lojac. hb. = ægyptius v. discoideus
pygmæus DC. 212 (8 λ)
radiatus Guss., Koch (*vulg.*) 209 (1 α c)
Reichenbachii Fiori (*leucanth.*) 211 (8 ι)
repens Stokes = fluviatilis
riparius Salisb. = Doria
riparius Wallr. 216 (17 b)
rivularis DC. 220 (22 δ b)
rotundifolius Lap. A 181 (20 α e)
rupestris W. et K. 212 (9 δ), A 181
Sadleri Láng = palud. b. riparius
salicetorum Godr. = fluviatilis
salicifolius Wallr. (non Pers.) = angustifol.
sardous Fiori (*nebrod.*) 212 (9 β)
sarracenicoides Ambrosi = Fuchsii
sarracenicus L. et Auct. = Fuchsii, fluviatilis
scandens DC. = mikanioides
Schouwii DC. (*ambig.*) 215 (14 δ b)
Scopolii Hpe. et Hornsch. = arachnoid.
scorpioides Sch. Bip. = Doronicum — medium
semperflorens Stokes = vulgaris
siculus All., Ces. P. et G. = squalidus (α)
siculus Fiori (*nebrod.*) 212 (9 α)
siculus Guss. (*vulg.*) 209 (1 β)
siculus Jan = lycopifolius
silensis Fiori (*glabratus*) 219 (21 δ b)
silvaticus L. 210 (3)
sonchoides Lojac. A 181
sordidus Peterm. (*vulg.*) 209 (1 α b)
spathulæfolius Auct. it. = Gaudini
spathulæfolius DC. 220 (nota)
spathulatus Fiori (*papposus*) 220 (22 γ b)
squalidus L. 212 (10)
squalidus All., W. = gallicus
squalidus Urv. = coronopifol.
squalidus α Guss. = glaber
squalidus β Bert. = gallicus, coronopifolius
squalidus var. Arc. hb. = calabrus
stipulatus Fiori (*samnitum*) 219 (21 γ b)
stipulatus Ten. (alpin.) = prec.
suaveolens Gilib. = erucifol.
subalpinus Auct. it. = appendicul.
subalpinus Koch = alp. v. auricul.
subcordatus Fiori (*brachych.*) 220 (22 η b)
subtomentosus Fiori (*Doronic.*) 218 (20 α c)
succulentus Forsk. (non DC.) = Inula crithmoides
Tenorei Fiori (*camp.*) 221 (23 α b)

Digitized by Google

SENECIO III 208 (858)
tenuifolius B Ten. = lycopifol.
tenuifolius Jacq. 214 (18 γ)
tenuifolius Rchb. (spathul.) = Gaudini
tirolensis A. Kern. (*abrotan.*) 213 (11 b)
tirolensis Venzo hb. = Crepis — Kerneri
tomentosus Clairv. = Adenostyles leucophylla
tomentosus DC. (*aurant.*) 221 (28 β b)
tomentosus DC. (*Doronic.*) 218 (20 γ), A 181
tomentosus Host = riparius
tomentosus Koch (palud.) = prec.
trilobus L. = lividus
uniflorus All. 216 (16)
valesiacus Beck (sarracenicus) = seg.
valesiacus Fiori (*Fuchsii*) A 181 (19 β f)
vernalis Raf. = vernus
vernalis W. et K. 221 (nota)
vernus Biv. 211 (8 ζ), A 181
villosus Fiori (*Fuchsii*) 217 (19 β d)
viscosus L. 210 (4)
vulgaris L. 209 (1)
SENECIUNCULUS = Senecio
viscosus Opiz = S. visc.
SERAPIAS I 237 (227)
abortiva Scop. = Limodorum abort.
ambigua Rouy = cordig. × Lingua
anthropophora Jundz. = Aceras anthr.
atrorubens Hoffm. = Epipactis rubiginosa
Barlæ Richter = Lingua × O. papilion.
cordigera L. 239 (4), A 54
cordigera M. B. = longipetala
cordig. × Lingua Laramb. et Timb. 238
cordigera × O. laxiflora Noul. 237
cordigera × O. papilionacea 237
Debeauxii G. Cam. = cordig. × O. papilion.
elongata Tod. (1 β)
ensifolia Ehrh. (grandifl.) = Cephalanth. ensif.
ensifolia Murr. = prec.
Fontanæ Rigo et Goir. = longipet. × O. Morio
glabra Lap. = Lingua
grandiflora L. = Cephalanth. ensifolia et pallens
grandiflora Poir. = Cephalanth. ensifol.
grandiflora Schm. = Cephalanth. rubra
grandiflora Scop. = Cephalanth. pallens
Grenieri Richter = longipet. × Lingua
Helleborine L. = Cephalanth. ensifolia?, Epipactis palustr. et latifol.
SERAPIAS I 237 (227)
Helleborine δ L. = Cephalanth. rubra
hirsuta Lap. = longipetala
intermedia Forest. = longipet. × Lingua
lancifera St.-Am. = longipetala
lancifolia Roth = Cephalanth. pallens
latifolia Huds. = Epipactis lat.
latifolia L. (Helleborine) = Epipactis lat.
laxiflora Rchb. f. (an Chaub.) = occultata
laxifloro × cordigera Timb. = cordig. × O. laxiflora
laxifloro × longipetala Timb. = longipet. × O. laxiflora
Lingua L. 238 (1), A 53
Lingua α L. p. p. = longipetala
Lingua β L. = elongata
Lingua × longipetala Gren. et Phil. = longip. × Lingua
Lingua × O. laxiflora Laramb. et Timb. 237 (nota)
Lingua × O. papilionacea Richter A 53
Lloydii Richter = cordig. × O. laxiflora
Lœselii Hoffm. = Liparis Lœs.
Lonchophyllum L. f. = Cephalanth. pallens
longiflora Asso = Epipactis palustris
longifolia Huds., L. = Epipactis palustris
longifolia L. (Helleborine) = Cephalanth. ensifol.?
longifolia Scop. = Cephalanth. ensifol.
longipetala Pollini 238 (3), A 54
longipet. × Lingua Gren. 238
longipet. × O. coriophora Kern. 238
longipet. × O. fragrans Richter = longip. × O. coriophora
longipet. × O. laxiflora Noul. 238, A 53
longipet. × O. Morio Rigo et Goir. 238
longipet. × O. papilionacea 237 (nota)
maculata Zodda (*Lingua*) A 53 (1 γ)
maculata Zodda (*longipetala*) A 54 (3 c)
microphylla Ehrh. = Epipactis micr.
neglecta DNtrs. 239 (4 α b)
neglecta Forest. = longipet. × Lingua
neglecta × O. laxiflora Levier 237
neglecta × O. papilionacea 237
nivea Desf. = Cephalanth. ensifol.
nivea Vill. = Cephalanth. pallens
Nouletii Rouy = cordig. × O. laxiflora
SERAPIAS I 237 (227)
occultata J. Gay 238 (2), A 54
ovalis Rich. = cordigera
oxyglottis Lindl. = occultata
oxyglottis Rchb. = longipetala
oxyglottis W., Bert. = Lingua
pallens Borzi (occultata) = cord. β pall.
pallens Jundz. = Cephalanth. pall.
pallens Zodda (*cordigera*) A 54 (4 β)
pallida Borzi (occultata) = prec.
pallida Tod. (*Lingua*) A 53 (1 α c)
pallida Whlnb. = Cephalanth. pallens
palustris L. (Helleborine) = Epipactis pal.
palustris Mill., Scop. = Epipactis pal.
papilionacea × Lingua Barla = Lingua × O. papil.
parviflora Parl. = occultata
pseudocordigera Moric. = longipetala
purpurea Doumenj = longipet. × O. laxiflora
refracta Fiori (*longipetala*) A 54 (3 var.)
refracta Murr (hirsuta) = prec.
repens Vill. = Goodyera rep.
Roselliniana Goir. = longipet. × O. coriophora
Reusii Dupuy = longipet. × O. laxiflora
rubra L. = Cephalanth. rubra
silvestris Pers. (latifol.) = Epipactis — varians
spiralis Scop. = Spiranthes autumn.
Todaroi Tin. 238 (1 α b)
Tommasinii A. Kern. = longipet. × O. coriophora
triloba Dupuy = longipet. × O. laxiflora
triloba Koch × longipet. × O. coriophora
triloba Lloyd = cordig. × O. laxiflora
triloba Tomm. = longipet. × O. laxiflora
triloba Viv. = cordig. × O. papilion.
viridiflora Hoffm. = Epipactis — varians
Xiphophyllum L. f. = Cephalanth. ensifol.
SERIDIA = Centaurea
Adami Sweet = C. Adami
aspera Sweet = C. asp.
auriculata Sweet = C. Seridis
Isnardi Sweet = C. aspera
latifolia Sweet = C. Seridis
megacephala Cass. = C. Seridis
melitensis Sweet = S. mel.
microcephala Cass. = C. aspera
napifolia Sweet = C. nap.
prætermissa Fourr. = C. — subinermis
romana Sweet = C. napifol.
sicula Sweet = Schouwii?
sonchifolia Sweet, Cass. = C. sonchif.

Digitized by Google

SERIDIA = Centaurea
sphærocephala Webb = C. sphær.
SERIOLA = Hypochæris
ætnensis L. = H. ætnensis
albicans Tin. = H. albicans
Alliatæ Biv. = H. — Alliatæ
cretensis Biv., Guss. = H. hispida
cretensis Desf. = H. — oxyodonta
cretensis L. = H. creten.
depressa Viv. = H. — depressa
glabrata Guss. (creten.) = H. — glabrata
glauca Tin. = H. glauca
grandiflora Lojac. (levig.) = prec.
hispida Mœnch = H. ætnensis
levigata L. = H. Achyrophorus
media Lojac. (levigata) = H. — media
montana Lojac. (levig.) = H. albicans
rubescens Tin. = H. albicans
taraxacifolia Salzm. = H. radicata
taraxacoides Lois. = Robertia tarax.
uniflora Biv. = prec.
urens All., Viv. = H. ætnensis
urens Lam. = Crepis aspera
urens S. et S. (an L.?) = H. — urens
SERPICULA = Helodea
canadensis Eaton = H. canad.
occidentalis Pursh = prec.
verticillata Muehlenb. (non L. f.) = prec.
SERPYLLUM = Thymus
angustifolium Fourr. = T. ang.
citri-odora Pall. = T. Serpyll.
lanuginosum Fourr. = T. lan.
vulgare Fourr. = T. Serpyll.
SERRAFALCUS = Bromus
alopecuroides Parl. = B. Alopecurus
arvensis Godr., Parl. = B. arvensis
cæspitosus N. Terr. (arvensis) = B. — cæspit.
Cavanillesii Wk. = B. scoparius
chiapporianus DNtrs. = B. japon. b. velutinus
commutatus Bab. = B. comm.
contortus Parl. = B. Alopecurus
divaricatus Arc. (macrostachys) = B. lanuginosus
Hughi Tod. = B. Hughi
intermedius Parl. = B. interm.
lanceolatus Parl. = B. macrostachys
Lloydianus Gr. et Godr. = B. molliformis
macrostachys Parl. = B. macr.
minor Gr. et Godr. (macrostachys) = B. — minor
molliformis F. Schultz = B. mollif.
mollis Parl. = B. mollis
nanus Parl. (mollis) = B. nanus
SERRAFALCUS = Bromus
neglectus Parl. = B. neglectus
patulus Parl. = B. japonicus
racemosus Parl. = B. racem.
scoparius Parl. (1840) = B. Alopecurus
scoparius Parl. (1845) = B. scoparius
secalinus Bab. = B. secal.
squarrosus Bab. = B. squarr.
submuticus Parl. (secalinus) = B. secal. c. submut.
velutinus Bab. (secalinus) = B. velutinus Schrad.
velutinus Parl. = B. neglectus
velutinus Parl. (patulus) = B. japon. b. velut.
SERRATULA III 318 (912)
alpina Gr. et Godr. (tinct.) = Vulpii
alpina L. = Saussurea alpina
alpina Vill. = Saussurea depressa
arvensis L. = Cirsium arvense
antarctica Poir. = Cirs. heterophyll. × spinosiss.
Bocconi Guss. = Jurinea humilis
campestris Schweigg. = Cirs. arvense
carniolica Poir. = Cirs. carniol.
centauroides M. B., Host (non L.) = radiata
cichoracea DC. 320 (5)
ciliata Vahl = Cirsium incanum
cirsioides Ten. = nudicaulis
complanata Schweigg. = Cirsium — mite Wimm. et Grab.
complicata Koch = prec.
conica Lam. = Stœhelina dubia
conifera Brot. = Centaur. conifera
coronata L. Sp. ed. II p. p., Colla, Zum. = prealta
Crupina Vill. = Crupina vulgaris
cyanoides Gærtn. = Jurinea mollis
cynoglossifolia L. (alpina) = Saussurea alpina (α)
Cyrilli Fiori (*cichor.*) 320 (5 α b)
discolor W. = Saussurea lapathifol.
dissecta Wallr. (*tinct*) 318 (1 α a)
dubia Brot. = Stœhelina dubia
germanica Wiesb. 318 (1 α b)
Gmelini Tausch (non Ledeb.) = radiata
heleniifolia Sch. Bip. = Centaurea — heleniifol.
heterophylla Desf. = lycopifol.
heterophylla Vill. = radiata
heterophylla Wallr. (*tinct.*) 319 (1 β b)
humilis Desf. = Jurinea hum.
humilis Presl = Jurinea Bocconi
Huteri Fiori (*Vulpii*) 319 (1 γ b)
SERRATULA III 318 (912)
incana Gmel. = Cirs. incan.
indivisa Poir. 319 (1 β)
inermis Gilib. = tinctoria
integrifolia Wallr. (tinct.) = indivisa
lanata Poir. = Cirs. arvense
lancifolia S. F. Gray (tinct.) = prec.
lapathifolia L. (alpina) = Saussurea lapathifol.
lycopifolia Fiori 320 (3)
leucantha Goir. (*tinct.*) A 186 (1 for.)
macrocephala Bert. 319 (1 δ)
mollis Cav. = Jurinea humilis
mollis Koch = Jurin. moll.
montana Poir. = Cirs. tricephalodes
monticola Bor. = Vulpii
moschata Ten. (simplex) = Jurinea mosch.
mucronata Desf. 320 (5 β)
nitida Bess. (non Fisch.) = lycopifol.
nudicaulis DC. 320 (4)
oleracea Neck., Poir. = Cirs. olerac.
orientalis Poir. = Lupsia Galact.
palustris Neck. = Cirs. pal.
palustris Posp. (tinct.) = indivisa (a)
pannonica Spr. = Cirs. pann.
pinnata Kit. 319 (1 α)
pinnatifida Desf. (non Poir.) = radiata
pontina Bég. (*tinct.*) 319 (1 β c)
prealta L. (*tinct.*) 319 (1 δ)
pumila Thore 319 (1 β d)
pusilla N. Terr. (*cichor.*) 320 (5 α c)
pygmæa Hampe (tinct.) = pumila
pygmæa Jacq. = Saussur. pygmæa
radiata M. B. 319 (2)
Rhapontica DC. = Centaur. Rhap.
rosmarinifolia Nym. = Stœhelina dubia
setosa W. = Cirsium setosum
sicula Fiori (*mucronata*) 320 (5 β b)
simplex DC. = Jurinea mollis
spathulata Janka = Centaurea crassifolia
spinosa Gilib. = Cirs. arvense
subacaulis Labill. = Saussurea depressa
subacaulis Poir. = Jurinea humilis (α)
tinctoria L. 318 (1), A 186
tuberosa Neck. = Cirs. tub.
variifrons G. Beck (tinct.) = heterophylla
Vulpii Fisch.-Oost. 319 (1 γ)
Vulpii Huter et Porta = Huteri
SESAMELLA = Astrocarpus
spathulata Rchb. = A. — spathul.
Tournefortii Rchb. = A. sesamoides (α)

Digitized by Google

SESELI II 166 (558)
Ægopodium Scop. = Ægopod. Podagraria
Ammi Savi = Apium leptophyllum
Ammi Stend. = seg.
ammoides L. = Petrosel. amm.
Amomum Scop. = Sison Amom.
annuum L. 168 (5), A 151
aristatum Ait. = Ligustic. pyrenæum
articulatum Crantz = Hippomarathrum
Athamantha Ces. = Atham. cretensis
austriacum Drude A 151 (2 bis)
bienne Crantz = annuum
Bocconei Guss. 168 (4)
Bunius Vill. = Falcaria saxifraga
Carum Scop. = Carum Carvi
Carvi Spr. = prec.
Carvifolia L. = Peuced. Carv.
carvifolium Vill. 168 (6)
coloratum Ehrh. = annuum
corsicum Lk. = Petrosel. ammoides
daucifolium Paol. (*Liban.*) 168 (8 b)
dimidiatum DC. = annuum
dioicum Vill. = Trinia dioica
elatum Gouan (*an L.?*) 167 (2 δ)
elatum Paol. p. p. (montan.) = elatum et austriac.
elatum Rchb. = glaucum
Falcaria Crantz = Falcaria vulg.
ferulaceum Stev. = annuum
filiforme Gilib. = Falcaria saxifraga
flexuosum Ors. = tortuosum
glaucescens Jord. = montanum
glaucum Jacq. (*an L.?*) 167 (2 γ)
glaucum Lam. = Trinia glauca
glaucum Sang. = tortuosum
globiferum Vis. 169 (nota)
Gouani Koch = austriacum
Gouani Rchb. f. = elatum, austriacum
gracile W. et K. 169 (nota)
graveolens Scop. = Apium grav.
Hippomarathrum Jacq., L. 169 (nota)
inæquale N. Terr. 167 (2 β)
inundatum Crantz = Apium inun.
lejocarpum Rouy et Cam. = daucifolium
Libanotis Koch 169 (8)
litorale Wk. = tortuosum (for.)
lucanum Barbazita = ramosissimum
macedonicum Arc. = Athamantha mac.
maritimum Guss. (*tortuos.*) 168 (3 b)
Meum Scop. = Meum athamanthicum
montanum Koch = Tommasinii
montanum L. 167 (2), A 151
SESELI II 166 (558)
montanum Parl. = carvifolium
multicaule Jacq. = montanum
Mutellina Steud. = Meum Mut.
nodiflorum Scop. = Apium nodiflorum
osseum Crantz = glaucum
patens Gueld. = tortuosum
peucedanifolium Mérat = montan.
pimpinelloides L. = Cnidium silaifol.
pimpinelloides Spr. = Peuced. Carvifol.
polyphyllum Ten. 167 (2 α c)
pratense Crantz = Silaus flavescens
prolifer Orsini = seg.
proliferum Brocchi = Trinia glauca
pumilum L. = Trinia carniolica?
purpureum Gilib. = annuum
pusillum Brot. = Petrosel. ammoides
ramosissimum Ces. 168 (7)
samniticum Arc. (*Liban.*) 168 (8 c)
saxifragum L. = Falcaria saxifraga
segetum Crantz = Petrosel. seg.
selinoides Jacq. = Silaus flavescens
simplex Poir. = annuum
tomentosum Vis. 167 (1)
Tommasinii Rchb. f. 167 (2 α b)
tortuosum L. 168 (3), A 151
tortuosum Pollich = annuum
Turbith L. = Athamantha Matthioli
Turbith Ten. = Petrosel. ammoides
varium Hausm. (non Trev.) = glaucum
verticillatum Crantz = Carum vertic.
verticillatum Desf. = Petrosel. ammoides
viviparum Goir. (*annuum*) A 151 (5 b)
SESELINIA = Seseli
austriaca G. Beck = S. austr.
elata G. Beck = S. elatum
SESLERIA I 77 (98)
alba S. et S. = argentea
albida Gaud. (sphæroceph.) = Wulfeniana
Arduini Desf. = cærulea
argentea Savi 77 (1 γ), A 19
autumnalis F. Schultz A 19 (1 γ b)
cærulea Ard. 77 (1), A 19
cærulescens Rchb. (*sphær.*) A 20 (3 a)
calcarea Celak. (*cærul.*) A 19 (1 α a)
calcaria Pers. = prec.
circeana Bég. (*tenuifol.*) A 20 (2 d)
cylindrica DC. = argentea
disticha Pers. 78 (5), A 20
dura Kth. = Sclerochloa dura
SESLERIA I 77 (98)
echinata Lam. = Echinaria capitata
elongata Host 77 (1 γ b) = autumnalis, cfr. A 19
fallax Beck = nitida
filifolia Hpe. = tenuifolia
insularis Somm. A 19 (1 bis)
interrupta Vis. A 20 (2 b)
juncifolia Suffr. in Host A 20 (2 c)
leucocephala DC. = Wulfeniana
microcephala DC. 78 (4) = ovata, cfr. A 20
mutica Bad. 77 (1 α b)
nitida Ten. 77 (1 β)
ovata Kern. A 20 (4)
pedemontana Reut. 78 (5 β), A 20
sphærocephala Ard. 78 (3), A 20
tenella Host = ovata
tenuifolia Schrad. 78 (2), A 20
uliginosa Opiz A 19 (1 γ c)
varia Wettst. = cærulea
variegata Clairv. = Kœleria setacea
Wulfeniana Asch. et Græbn. (*sphær.*) A 20 (3 b)
SETARIA I 48 (50)
ambigua Guss. 49 (4 β)
bracteata Bolzon et De Bonis (*glauca*) A 18 (2 b)
chlorantha Schur = viridis
decipiens C. Schimp. = ambigua
fallax Tod. = viridis
germanica P. B. 48 (1 β)
glauca P. B. 48 (2), A 18
glauco × viridis A 18
humifusa Dum. = glauca
italica P. B. 48 (1)
major Posp. (*viridis*) A 18 (3 c)
multiseta Dum. = italica
nana Dum. = viridis
nodiflora Sacc. (*viridis*) A 18 (3 b)
pumila R. et S. = glauca (for.)
rubicunda Dum. = viridis
verticillata P. B. 48 (4)
viridis P. B. 48 (3), A 18
SHERARDIA III 117 (820)
ætnensis Torn. (*arv.*) 118 (α b)
agraria Torn. = arvensis (α?)
albiflora Nym., Goir. (*arv.*) 118 (α c)
arvensis L. 118, A 176
fœtida Lam. = Putoria calabr.
fœtidissima Cyr. = prec.
hirta Uechtr. (*arv.*) 118 (α d)
imbricata Goir. (*arv.*) A 176 (α e)
maritima Gris. (*arv.*) 118 (β)
muralis L. = Galium mur.
mutica Wirtg. (arv.) = marit.
neglecta Guep. = albiflora
umbellata Gilib. = arvensis
Walvareni Baguet (arv.) = marit.
SIBBALDIA = Potentilla
cuneata Horn. = P. Sibbaldii
octopetala Mill. = prec.

Digitized by Google

SIBBALDIA = Potentilla
procumbens L. = prec.
SICYOS III 168 (843)
angulatus L. 168
SIDA
Abutilon L. = Abutilon Avicennæ
Sherardiana Benth. 268 (nota)
SIDERITIS III 20 (783)
Alopecuros Scop. = Stachys Alopec.
alpina Briq. (*hyssopifol.*) 21 (2 α)
alpina Ces. P. et G. (hirsuta) = seg.
alpina A All., Pourr. = hyssopifol. (α)
angustifolia Benth. = hyssopifol. (α)
approximata Gasp. (*romana*) 22 (4 c)
approximata Guss. = prec.
brutia Ten. 21 (1 b)
decumbens Mœnch = sicula
ebracteata Asso = montana
hirsuta Gouan = Stachys recta (α)
heraclea Col. = Stachys her.
hirsuta Gouan = Stachys recta
hirsuta L. 22 (3)
hirsuta Sieb. = Stachys italica
hispanica Mill. = hirsuta
hyssopifolia L. 21 (2)
incana L. 22 (nota)
maculata Gilib. = Stachys recta
montana L. 22 (5)
Ocymastrum L. = Stachys hirta
pauciflora Nic. (*romana*) 22 (4 b)
perfoliata L. 22 (nota)
Peyrei Timb. 21 (2 β)
Pourretii Briq. (*hirsuta*) 21 (3 b)
romana L. 22 (4)
scordioides Benth., Koch (non L.) = hyssopifol. (α)
scordioides DNtrs. = hirsuta
sicula Ucria 21 (1)
spathulata Lam. = romana
tomentosa Pourr. = Pourretii
tomentosa Ucria in Rœm. = quid?
trinervia Gilib. = Stachys annua
vulgaris Wk. (*hirsuta*) 21 (3 a)
SIEBERA = Alsine
argentea Steud. = A. octandra
cherlerioides Schrad. = prec.
imbricata Ser. = prec.
SIEBOLDIA = Simethis
bicolor Heynh. = S. Mattiazzi
SIEGESBECKIA III 299 (893)
orientalis L. 299
SIEGLINGIA = Triodia
decumbens Bernh. = T. decumbens
SIEVERSIA = Geum
atlantica G. Don. = G. silvaticum
micropetala Nym. = G. micropetalum
montana R. Br. = G. montan.
SIEVERSIA = Geum
reptans R. Br. = G. reptans
rhætica Nym. = G. mont. × reptans
SILAUS II 169 (559)
carvifolius C. A. Mey. = Fœniculum peucedanoides
flavescens Bernh. 169, A 151
Gasparrinii Nym. = Fœniculum peucedanoides
peucedanoides Boiss. = Fœniculum peuc.
pratensis Bess. = flavescens
selinoides Beck = flavescens
virescens Boiss. = Fœniculum peucedanoides
SILENE I 358 (840)
acaulis R. Kell. (*nutans*) A 76 (43 h)
acaulis L. 361 (8), A 74
ætnensis Fiori (*vulgar.*) A 74 (1 var.)
ætnensis Strobl (inflata) = prec.
agrestina Jord. et Fourr. A 76 (34 for.)
agrigentina Lojac. = fruticosa
alba Otth (*acaul.*) A 74 (8 α e)
alba Otth (*Armeria*) 362 (15 b)
alpestris Goir. (nutans) = nut. for. alpina
alpestris Gürke = Campanula
alpestris Jacq. 360 (6), A 74
alpestris W. = rupestr. c. major
alpina S. F. Gray = acaulis
alpina Pall. = alpestris
alpina Reyn. (*nutans*) A 76 (43 j)
alsinoides Viv. = Saponaria alsin.
ambigua Rouy et Fouc. (alpina) = microphylla
ambigua Salisb. = Behen
amblevana Lej. = nut. c. glabra
amœna L. = maritima
amœna Ucria = colorata
anglica L. 367 (34 β)
angustifolia DC. (inflata) = seg.
angustifolia Guss. 359 (1 α b), A 73
angustifolia Koch (*alpina*) 359 (1 γ b)
angustifolia Moris (sericea) = sericea
angustifolia Otth (clandestina) = portensis
angustifolia Rouy et Fouc. (*paradoxa*) A 76 (42 for.)
angustissima Bor. A 74 (1 α for.)
annulata Thore 368 (19 α b)
anomala Duf. = apetala
antelopum Steud. A 74 (1 γ for.)
apetala Bad. ex Rchb. (nocturna) = brachypetala
apetala Batt. et Trab. (rubella) = turbinata
apetala Host = brachypetala
apetala W. 366 (29), A 75
arenaria Desf. = nicæensis
arenicola Presl 364 (22 b)
argillosa Munby = rubella
armena C. Koch (inflata) = commutata
SILENE I 358 (840)
Armeria Asso = rubella
Armeria L. 363 (15)
articulata Kunze = fuscata
arvensis Salisb. = anglica
aspera A. Br. ex Asch. = Lychnis asp.
athoa Gris. (inflata) = commutata
atropurpurea Strobl (saxifr.) = fusca
auriculata Rchb. = lanuginosa
auriculata S. et S. 359 (2)
austriaca Hort. ex Steud. = alpestris
babylonica Boiss. et Noë = rubella
baccifera Roth = Cucubalus bacc.
Bailleti Timb. = carneiflora
Baldaccii A. Terr. (alpina) = microphylla
bassanensis Sternb. = italica
Behen L. 363 (16)
Behen Wirzén = vulgaris (α)
bellidifolia Jacq. = vespertina
Bergeri Schott = echinata
bicolor Mœnch = nocturna
bicolor Thore = portensis
bifida Retz. = colorata
biflora W. ex Rohrb. = ciliata
bipartita Auct. mult. = sericea
bipartita Desf. = colorata
Boissieri Tin. = decumbens
Boræana Rouy et Fouc. 359 (1 β)
bosniaca G. Beck (Cucubal.) = pubescens
Bourgeani Webb = nut. c. glabra
brachyantha Schur = alpina
brachypetala Moris (rubella) = turbinata
brachypetala Rob. et Cast. 367 (33 β), A 75
bracteosa Bert. A 75 (17 c)
Broussonetiana Schott = nut. c. glabra
bryoides Jord. 361 (8 for.)
Burnati Briq. (*pauciflora*) A 76 (41 δ b)
cæsia Jan = sicula
cæspitosa Salisb. = acaulis
calabra Fiori (*vulgar.*) A 74 (1 α for.)
calabra N. Terr. (inflata) = prec.
calycina Presl = quid?
campana N. Terr. (*saxifr.*) A 75 (9 var.)
Campanula Pers. 362 (10)
Campelli Sang. = catholica
cana Otth = floccosa
Candollei Jord. in Guss. = litoralis
canescens Ten. = decumbens
caprariæ Somm. A 75 (33 γ b)
capsiriensis Jeanb. et Timb. vulgaris (α)
carnea Salisb. = fruticosa
carneiflora Fiori (*angustifol.*) A 73 (1 α b subf.)
carneiflora Le Grand (Tenoreana) = prec.

Digitized by Google

SILENE I 358 (340)
catholica Ait. 370 (45)
caulescens L. Vacc. (*exscapa*) A 74 (8 β b)
cerastioides All. et Auct. it. (non L.) = gallica
cerastioides Guss. inar. = sericea
chia Spr. = quinquevulnera
chilensis Cham. et Schl. = gallica
chlorophylla Rchb. (inflata) = alpina
ciliata Lge. (inflata) = pubescens
ciliata Pourr. 362 (14)
ciliata Strobl (*commutata*) A 74 (1 α c subf.)
ciliata W. = decumbens
clandestina Duby = annulata
clavæcarpa Roch. = floccosa
clavata Mœnch = vallesia
Cœli-rosa A. Br. = Lychnis Cœli-rosa
colorata Poir. 366 (30 d)
commutata Guss. 359 (1 α c), A 74
congesta Godr. (*apetala*) A 75 (29 b)
congesta Griseb. = Rœmeri
conica L. 365 (28 β), A 75
conoidea Huds., Rchb. = conica
conoidea L. 365 (28), A 75
cordifolia All. 362 (12)
Coronaria Clairv. = Lychnis Coron.
corsica DC. 362 (11 β)
corymbifera Bert. 368 (17 b)
Coulteriana Otth = angustifolia Guss.
crassifolia Moris (*sericea*) 366 (30 c)
cretica L. 368 (19), A 75
crispa Mœnch = pendula
crispa Poir. = rubella
crispata Stev. = vulgaris (α)
cruentata Jord. et Fourr. = quinquevulnera
Cucubalus Wib. = vulgaris
cuneifolia J. F. Gmel. = gallica
cuprea Hort. = livida
cylindriflora Otth = conoidea
decipiens Barcelo = apetala
decumbens Biv. 366 (30 b)
dianthifolia Rchb. (*acaul.*) A 74 (8 α c)
dichotoma Ehrh. 368 (36)
dichotoma Gilib. = noctiflora
diffusa Otth (non Forsk.) = colorata
diffusa Ross (*neglecta*) A 76 (33 bis b)
dioica Clairv. = Lychnis alba
dioica F. et M. = conoidea
discolor Retz. = nutans
distachya Brot. A 75 (30 for.)
diurna Godr. = Lychnis rubra
divaricata Gr. et Godr. (gallica) = anglica
divaricata Otth = fuscata
diversifolia Otth = rubella
Duriæi Spach = distachya
echinata Otth 365 (26)
elatior Briq. (Loiseleurii) = Lychnis — elatior
Elisabethæ Jan 360 (3)
elongata Bell. A 74 (8 α b)
eranthema Wibel = linicola
erecta Ross (*neglecta*) A 76 (33 bis a)
erectiflora Otth (pendula) = pendula
erigens W. = rubella
eriocaulon Boiss. (bipartita) = decumbens
eriophora W. = distachya
eriophylla Juratzka = Veselskyi
exaltata Nees = colorata
exscapa All. 361, A 74 (8 β)
Fabaria Bert. (non S. et S.) = commutata
filiformis Lowe = inaperta
Fischeri Steud. = pubescens
fissa Salisb. = Cucubalus baccifer
fistulosa G. Don = italica
floccosa Rohrb. (*italica*) 369 (41 β), A 76
Flos-cuculi Clairv. = Lychnis Flos-cuc.
Flos-Jovis Clairv. = Lychnis Flos-Jov.
fontana Ten. = quadrifida
fruticosa DC. = Requienii
fruticosa L. 368 (33), A 76
fruticulosa Sieb. 361 (9 β)
fusca Evers (*saxifr.*) A 74 (9 α c)
fuscata Lk. 365 (24)
gallica L. 367 (34), A 76
Gallinyi Heuff. = trinervia
Giraldii Guss. 367 (34 γ)
Githago Clairv. = Agrostemma Githago
glaberrima Strobl (*commutata*) A 74 (1 α c subf.)
glabra Bert. (cerastioides) = Giraldii
glabra Guss. (sericea) = Mandraliscæ
glabra Schk. (*nutans*) 369 (43 c)
glabrata Hartm (nutans) = nut. c. glabra
glandulosa Bert. = gallica
glandulosa Cald. (*conica*) 365 (28 β b)
glareosa Jord. = alp. f. minor
glauca Rchb. (inflata) = alpina
glauca Salisb. = Armeria
glauca Sm. = alpina
glomerata C. Gay = gallica
glutinosa Duf. = rubella
glutinosa Pers. = catholica
glutinosa Zois (non Pers., nec Duf.) = Veselskyi
Græfferi Guss. = ciliata
graminea Vis. 362 (14 b)
gymnotheca Panc. = fruticulosa
Hænkeana Presl = gallica
Heufleri Hausm. = Veselskyi
hirsuta Poir. (non Lag.) = vespertina
hirsuta Presl = lusitanica
hirsuta Strobl (*gallica*) A 76 (34 for.)
hirta W. = sericea
hispanica Jacq. = colorata
hispida Desf. = vespertina
humilis Ten. (*italica*) A 76 (41 α d)
iberica M. B. = dichotoma
ignobilis Lowe = Behen
inaperta DC. = rubella
inaperta L. sp. 364 (20), A 75
inaperta L. hb., S. et S. = multicaulis
incana Ser. in DC. (*nutans*) 369 (43 d)
inclusa Horn. = nocturna
inflata Sm. = vulgaris
infracta W. et K. = glabra
italica Pers. 369 (41), A 76
italica Pollini = livida
italica Viv. = Salzmanni
juvenalis Arc. (conica) = con. b. glandulosa
Kaulfussii Spr. = rupestris
læta Ait. = Lychnis læta
lagunensis C. Sm. = glabra
lanceolata Huter P. et R. (*saxifr.*) A 75 (9 var.)
lancifolia Rouy (Cucubal.) = angustifol. Guss.
lanuginosa Bert. 359 (2 b)
latifolia Bolzon (*rupestris*) A 74 (7 b)
latifolia Poir. (non Horn.) = italica
lasiocalyx Soy-Will. et Godr. (*nocturna*) 367 (33 α b)
lasiocalyx Soy.-Will. (bipartita) = distachya
laxiflora Neilr. (italica) = pilosa
lepinensis A. Terr. (*pendula*) A 75 (31 b)
leucojifolia Ors. = multicaulis
leucophæa S. et S. = nicæensis
linearis Sweet = angustissima
linicola C. C. Gmel. 363 (18)
linoides Sol. ex Rohrb. = inaperta
litoralis Jord A 76 (34 for.)
litoralis Pourr. = nicæensis
livida W. 370 (43 e)
Loiseleurii Gr. et Godr. = Lychnis corsica
longifolia D. Dietr. = nutans
longifolia Lge. (inflata) = angustifol. Guss.
lurida Hort. = livida
lusitanica L. 367 (34 α b)
lusitanica S. et S. = vespertina
lychnidiflora Otth = annulata
macrophylla Otth (Otites) = Pseudo-Otites
major Gaud. (*rupestris*) A 74 (7 c)
Mandraliscæ Parl. 366 (30 for.)
marginata Rouy et Fouc. (*alpina*) A 74 (1 γ for.)
marginata Schott = quinquevulnera
maritima Reverch. (paradoxa) = italica

Digitized by Google

SILENE I 358 (340)
maritima Tod. (bipartita) = decumbens
maritima With. 359 (1 δ)
matutina Presl 367 (33 α c)
megalosperma Sartori = microphylla
membranacea Poir. = dichotoma
micrantha Wk. (nocturna) = brachypetala
microloba Schott Nym. et Kotsch. = marginata
micropetala Ten. (non Lag.) = gallica
microphylla Boiss. (inflata) = seg.
microphylla Fiori (alpina) A 74 (1 γ for.)
Minæ Strobl A 75
minor Fiori (alpina) A 74 (1 γ for.)
minor Fiori (Boræana) 359 (1 β b)
minor Gaud. (inflata) = alp. f. minor
minor Moris (inflata) = Boræana f. minor
minor Moris (succulenta) = corsica
minutiflora Jord. et Fourr. A 76 (34 for.)
modesta Jord. et Fourr. A 76 (34 for.)
mollissima DC. (italica) = pilosa
mollissima Otth = pilosa
mollissima S. et S. 369 (40)
monachorum Vis. ex Rohrb. 360 (5 β), A 74
montana Guss. (italica) = sicula
multicaulis Guss. 361 (9 γ)
multiflora Ten. (non Pers.) = Rœmeri
muscipula L. 363 (17), A 73
Mussini Horn. = catholica
mutabilis L. 367 (33 α e)
nebrodensis Jan = sicula
neglecta Ten. A 75 (33 bis)
neglecta A Ten. = erecta
neglecta B Ten. = diffusa
nemoralis W. et K. = floccosa
Nentvichii Friv. = Rœmeri
nicæensis All. 364 (22)
nitida Lag. = fruticosa
noctiflora L. 365 (27)
nocturna L. 367 (33), A 75
nocturna β Bert. = neglecta
nodulosa Viv. (non Boiss.) = pauciflora
norvegica Pers. = acaulis
Notarisii Ces. 361 (9 γ b)
nutans L. 370 (43), A 76
nyctantha W. 367 (33 α d)
oblongifolia Otth = rubella
occitanica Jord. et Fourr. A 76 (34 for.)
ocimoides Desf. = italica
oleracea Bor. A 74 (1 α for.)
oleracea Ficin. (inflata) = prec.
olympica Panc. = fruticulosa
oppositifolia S. G. Gmel. = conica

SILENE I 358 (340)
Orsiniana Rchb. = multicaulis
Otites Sm. 370 (46), A 76
paniculata Otth = floccosa
paniculata Schur (Otites) = Pseudo-Otites
panormitana Parl. ex Bert. = tenuiflora
paradoxa Lap. = nutans
paradoxa L. 369 (42), A 76
parnassica Boiss. et Sprun. = fruticulosa
parviflora Hampe = Rœmeri
parviflora Mœnch = cretica
parviflora Otth in DC. (acaul.) = exscapa
parviflora Pers. A 76 (46 d)
parvula Jord. et Fourr. A 76 (34 for.)
patens Peete = italica
patula Desf. = italica
patula Lag. = rubella
pauciflora Beyer (1891) (inflata) = seg.
pauciflora Fiori (vulgar.) A 74 (1 α for.)
pauciflora Guss. (italica) = sicula
pauciflora Kit. = noctiflora
pauciflora Moris (italica) = seg.
pauciflora Salzm. 369 (41 δ), A 76
pauciflora Ucria = viridiflora
pedemontana Burn. et Barb. (nemoralis) = flocc. b. pedem.
pedemontana Favre (acaul.) A 74 (8 α d)
pedemontana Fiori (floccosa) 369 (41 β b)
pedemontana Gürke (italica) = prec.
pedicellata Poir. = italica
pedunculosa Rchb. (acaul.) 361 (8 b) = elongata, cfr. A 74
pelidna Rchb. = livida
pelidna Ten. = nutans
pendula L. 366 (31), A 75
permixta Jord. 367, A 75 (33 γ)
pernoctans Lk. = colorata
Persoonii Schott = alpina
petracea W. et K. A 75 (9 var.)
picta Desf. (non Pers.) = portensis
pilosa Spr. 369 (41 α b)
pinguis Vahl = nocturna
platypetala Griseb. (nemoralis) = pilosa
plena Otth in DC. (acaul.) A 74 (8 α f)
Pollinii Nym. 370 (43 g)
polygama Stokes = saxifraga
polyphylla L. = portensis
polyphylla Vill. = inaperta
polytricoides Zum. A 74 (8 β c)
Porcari Tin. in Lojac. = monachorum
porrigens Gouan = Gypsophila porr.
portensis Friv. = tenuiflora
portensis L. 364 (21)
Pourretii Poir. = ciliata
pratensis Gr. et Godr. = Lychnis alba

SILENE I 358 (340)
pratensis Neilr. (inflata) = vesicaria
prostrata Gaud. (inflata) = alpina
prostrata Welw. (bipartita) = decumbens
Pseudo-Atocion Guss. (non Desf.) = fuscata
Pseudo-Behen Boiss. = Behen
Pseudo-Behen Schur = vulgaris (α)
Pseudo-Otites Bess. 370 (46 c)
Pseudo-linum Ram. = rubella
puberula Jord. = pubescens
pubescens DC. (inflata) = seg.
pubescens Fiori (vulgar.) 359 (1 α d)
pubescens Lois. = sericea
pubescens Schur (Otites) = parviflora
pubicalycina Fenzl (vespertina) = colorata
pudibunda Hoffgg. 360 (5 α b)
pumila Friv. = pudibunda
pumila St.-Lag. = Pumilio
pumila N. Terr. (saxifr.) = lanceolata?
Pumilio Wulf. 360 (4)
pungens Ces. (saxifr.) 361 (9 α b)
purpurea Schur (nutans) = rubens
pusilla W. et K. = quadridentata
pygmæa Herd. = gallica
pygmæa L. Vacc. (nutans) A 76 (43 i)
pyrenaica Pourr. = colorata
pyrenaica Wk. (ciliata) = ciliata
quadridentata DC. = quadrifida
quadrifida L. 360 (5), A 74
quadrifida Otth = Pollinii
quadrifida Rohrb. (nutans) = Pollinii
quadriloba Turcz. = viscosa
quinquevulnera L. 367 (34 α c)
ramosa Otth = sedoides
ramosissima S. et S. = sedoides
reflexa Auct. it. (an L.?) 367 (33 δ) = neglecta, cfr. A 75
reflexa Mœnch = lusitanica
remotiflora Wk. (gallica) = anglica
Requienii Otth 368 (39)
Rigoi Boiss. = apetala
Rœmeri Friv. 370 (47)
Rœseri Boiss. et Heldr. = ciliata
rosea Tornab. (fruticosa) A 76 (38 b)
rosella Jord. et Fourr. A 76 (34 for.)
Royeni Pers. = viscosa
rubella Auct. fl. sic. = turbinata
rubella Evers (nemoralis) = seg.
rubella Fiori (floccosa) A 76 (41 β c)
rubella L. 365 (25), A 75
rubella Neilr. (saxifr.) = saxifraga (α)

Digitized by Google

SILENE I 358 (340)
rubella Suffr. = cretica
rubens Vest A 76 (43 l)
rubriflora Goir. (saxifr.) = fusca
rubriflora Otth (*italica*) A 76 (41 α c)
rugosa Pers. = Lychnis aspera
rupestris Jacq. = alpestris
rupestris Kit. = quadrifida
rupestris L. 361 (7), A 74
rupicola Bor. = Borsæana
rupicola Huet = multicaulis
sabuletorum Duby = vespertina
Salzmanni Bad. 369 (41 γ), A 76
Salzmanni Otth = mollissima
Saponaria Fr. = Sapon. officin.
sardoa Moris ex Rchb. = lusitanica
Sassiana Bert. 364 (24 b)
saxifraga L. 361 (9), A 74
scabra Bert. 364 (20 b)
scabra Fisch. = pubescens
scabra Kit. = quadrifida
scabriflora Brot. = pendula
sciotica Otth = quinquevulnera
secundiflora Genn.? = sericea
sedoides Poir. 364 (23)
Seguierii Rchb. (*saxifr.*) A 74 (9 d)
semiglabrata Jord. et Fourr. A 76 (34 for.)
sericea Auct. mult. = colorata
sericea All. 366 (30), A 75
sicula Bert. ex Rohrb. = fuscata
sicula Ker-Gawl. = colorata
sicula Ucria, Presl 369 (41 s)
silvestris Clairv. = Lychnis rubra
silvestris Schott = gallica
simplicicorona Mutel = fuscata
spathulæfolia Jord. 369 (43 b)
spicata DC. = nocturna
staminea Ten. = Rœmeri
stellata Lap. = ciliata
stenophylla Duf. = scabra
stenophylla Plan. = maritima
stricta Guss. (non L.) = muscipula
stricta Lap. = muscipula
stricta Spr. = linicola
subacaulis Vill. ex Steud. = elongata
subdensiflora Neilr. (italica) = floccosa
subnutans Miq. = nutans
suboccultata Jord. et Fourr. A 76 (34 for.)
subvinosa Delil. = nicæensis
succulenta Forsk. 362 (11)
tenella Huet = quadrifida
Tenoreana Colla = angustifol.
tenuicaulis Rouy et Fouc. (*paradoxa*) A 76 (42 for.)
tenuiflora Guss. 364 (19 β)
tenuifolia Ser. in DC. (*paradoxa*) 369 (42 b)
tergestina Jord. et Fourr. = gallica
tomentosa Otth = mollissima

SILENE I 358 (340)
tomentosa Rouy et Fouc. (italica) = pilosa
Tommasinii Wk. (non Vis.) = sedoides
trichocalycina Fenzl (vespertina) = distachya
tridentata Ram. = gallica
trifida Ten. ex Steud. = quid?
trinervia Seb. et Maur. 366 (32)
trinervis Sol. = dichotoma
tubiflora Duf. = colorata
turbinata Guss. 365, A 75 (25 β)
umbellata Gilib. = Armeria
umbellata Otth (*Otites*) 370 (46 b)
undulæfolia Sweet = fuscata
undulatifolia Moris = fuscata
uniflora Bég. (*brachypetala*) A 75 (33 β b)
uniflora Bert. = alpina
uniflora Otth in DC. (inflata) = alpina
uniflora Roth = maritima
uniflora β DC. = alpina
vallesia Bory et Chaub. = paradoxa
vallesia L. 362 (18), A 75
vallesia β Poir. = corsica
vallesia Pollini = Elisabethæ
velutina Pourr. = mollissima
venosa Asch. = vulgaris
vernalis Pœpp. = gallica
Veselskyi Fiori (*quadrif.*) 360 (5 δ)
vesicaria Schrad. 359 (1 α)
vespertina Auct. pl. = sericea
vespertina Rchb. etc. = colorata
vespertina Retz. 368 (35)
vilipensa Kunze = scabra
vilis Fenzl = apetala
vilis Kunze = scabra
villosa Forsk. = gallica
villosa Gelmi (*quadrif.*) 360 (5 γ)
villosa Mœnch = nicæensis
viridella Lk. = seg.
viridella Otth (*nutans*) 370 (43 f)
viridiflora L. 370 (44), A 76
Viscaria Jessen = Lychnis Viscaria
viscida Mœnch = noctiflora
viscida Spr. = alpestris
viscosa Pers. 368 (37)
viscosissima Roch. = floccosa
viscosissima Ten. = nicæensis
viscoso-villosa Schur (italica) = pilosa
vulgaris Garcke 359 (1), A 73
Wallichiana Klotzsch = vulgaris (α)
Willdenowii Sweet = alpina
xeranthema Viv. = Requienii

SILER II 189 (580)
alpinum Baumg. = Laserpit. alp.
aquilegifolium Gærtn. = trilob.
Chironium Crantz = Pastinaca Opopanax
gallicum Crantz = Laserpit. gall.

SILER II 189 (580)
lancifolium Mœnch = Laserpit. Siler
montanum Crantz = Laserpit. Siler
trilobum Crantz, Scop. 189

SILIQUASTRUM = Cercis
Arbor-Judæ Medic. = C. Siliquastrum
orbiculatum Mœnch = prec.

SILYBUM III 380 (921)
eburneum Cass. A 191
hispanicum Loscos et Pardo = seg.
hispanicum Wk. (*eburneum*) A 191
maculatum Mœnch = Marianum
Mariæ S. F. Gray = seg.
Marianum Gærtn. 380
pygmæum Cass. 380 (b)

SIMBULETA II 427 (758)
bellidifolia Wettst. 427, A 169
laxiflora Wettst. 427 (β), A 169

SIMETHIS I 204 (199)
bicolor Kth. = Mattiazzi
Mattiazzi Sacc. A 49
planifolia Gr. et Godr. 205 = prec., cfr. A 49

SINAPIS I 442 (875)
acutifolia Moris (incana) = Brassica — acutifol.
adpressa Schloss. et Vukot. = Brass. adpr.
alba L. 442 (2), A 96
Allionii Jacq. = oleracea
amplexicaulis DC. = Brass. amplex.
apula Ten. = Diplotax. ap.
arvensis L. = Brass. Sinapistr.
bœtica Boiss. = Brass. bœt.
Condollei Rouy et Fouc. (Cheiranth.) = Brass. montana
caspica W. = Brass. Tournefortii
Cheiranthus M. et K. = Brass. monensis
Choulettiana Coss. = procumb.
circinata Desf. = Brass. — circ.
communis Nor. = Brass. campestr.
crassifolia Moris (incana) = Brass. — crass.
crassifolia Raf. = Diplotax. Harra
dissecta Lag. 443 (3)
elongata Spach = Brass. elong.
Eruca Clairv. = Eruca sativa
Erucastrum Ruch. = Brass. Eruc.
erucoides L. = Diplotax. eruc.
foliosa W. = alba
geniculata Desf. = Brass. — genic.
glabrata Guss. (pubesc.) = Brass. — circinata
Harra Forsk. = Diplotax. Harra
heterophylla Guss. (non Lag.) = Brass. — acutifolia
hispida Balb. = Brass. Sinapistr.
incana L. = Brass. adpressa
levigata Torn. (an L.?) = Brass. adpressa
maritima All. = Sisymbr. erysimifol.

Digitized by Google

SINAPIS I 442 (875)
mesopotamica Spr. = Moricandia arvensis
monensis Bab. = Brass. mon.
montana Bourg. = Brass. mont.
montana Gr. et Godr. p. p. (Cheiranth.) = Brass. mont.
muralis R. Br. = Diplotax. mur.
Napus Brot. = Brass. Nap.
nasturtiifolia Poir. = Brass. Erucastr.
nigra L. = Brass. nigra
oleracea Presl = Brass. fruticul.
Oliveriana DC. = Sisymbr. pannonicum
orientalis L. = Brass. — orient.
paniculata Desf. = Brass. adpressa
panormitana Spr., Guss. = Brass. — inflexa
procumbens Poir. 442 (1)
pubescens L. = Brass. pub.
pyrenaica L. = Sisymbr. acutangul.
radicata Desf. = Brass. fruticul.
Rapa Brot. = Brass. Rapa
Raphanistrum Gueld. = Raphanus Raphan.
rectangularis Rouy et Foue. (Cheiranth.) = Brass. rect.
recurvata All. = Brass. recurv.
retrohispida Bor. = Brass. — villosa Fiori
Schkuhriana Rchb. = Brass. Sinapistr.
serrata Porta et Rigo = Brass. — serr.
sicula Bert. = Brass. bœtica
taurica Fisch., DC. = Brass. Sinapistr.
taurica M. B. = Brass. adpressa
tenuifolia R. Br. = Diplotax. tenuifol.
tetrædra Presl = Brass. nigra
torosa Gilib. = Brass. Sinapistr.
Tournefortii All. = Brass. monensis
tuberosa Poir. = Brass. Rapa
villosa Mérat = Brass. — vill. Fiori
virgata J. et C. Presl (non Cav.) = Brass. bœtica
SINAPISTRUM = Brassica
arvense Spach = B. Sinapistr.
SISARUM = Sium
germanorum Schur = S. latifol.
macrophyllum Schur = prec.
SISON II 163 (553)
Ammi Jacq. (an L.?) = Apium leptophyllum
Ammi Ucria (an L.?) = Petrosel. ammoides
Amomum L. 163
Anisum Spr. = Pimpinella Anis.
arvense Brot. = Petrosel. segetum
carvifolium Bert. ex DC. = Carum carvifol.
cernuum Salisb. = Petrosel. segetum
erectum Salisb. = Amomum
flexuosum Dum. = Bunium flex.
flexuosum Ten. = Carum carvifol.
SISON II 163 (553)
Gussoneanum Balb. = Petagnia saniculæfol.
Gussonii Spr. = prec.
heterophyllum Mœnch = Amomum
inundatum L. = Apium inund.
lateriflorum Bert. = Apium leptophyllum
majus Eaton et Wright = Ammi majus
nodiflorum Brot. = Apium nod.
Podagraria Spr. = Ægopod. Podagr.
proliferum Brochi = Carum carvifol.
Ruta Burm. f. = Apium graveol.
segetum L. = Petrosel. seg.
silvaticum Brot. = Physosperm. aquilegifol.
Thomasii Ten. = Cryptotænia Thom.
verticillatum L. = Carum vert.
SISYMBRELLA = Nasturtium
aspera Spach = N. asper.
silvestris Spach = N. silv.
SISYMBRIUM I 431 (866)
absinthoides S. F. Gray = Sophia
acaule Sieb. ex Steud. = quid?
acre Lam. = Diplotaxis tenuifol.
acutangulum DC. 432, A 91 (5 δ)
Alliaria Scop. = Alliaria offic.
alliariaceum Salisb. = prec.
alpinum Fourn. = Braya alpinum
alpinum Neck. = strictissim.
altissimum L. 432 (8), A 91
altissimum L. p. p. = Columnæ
amarum Salisb. = Nasturt. officinale
amphibium L. = Nasturt. amph.
amphib. × terrestre Ehrh. = Nasturt. amph. × silv.
amplexicaule Desf. = Brassica amplex.
amplexicaule Jan = Moricandia arvens.
anceps Whlnb. = Nasturt. amph. × silvestre
apenninum Bubani = Zanonii
aquaticum Mill. = Nasturt. amphib.
arenosum L. = Arabis aren.
asperum L. = Nasturt. asper.
augustanum Gaud. (acutangul.) = Tillieri
austriacum Jacq. 432 (5), A 91
austriacum c. Arc. = acutangulum
Barbarea Crantz = Barbar. vulg.
Barbareæ All. (non L.) = Barbarea verna
Barrelieri All. (non L.) = Diplotax. muralis?
Bellianum Valbusa (*Tillieri*) A 91 (5 β b)
binerve C. A. Mey. = Malcolmia nana
Boissieri Nym. = Nasturt. asperum
SISYMBRIUM I 431 (866)
brevicaule Wib. = Diplotax. viminea
bursifolium Gouan = dentatum
bursifolium L. = Barbarea dentata
cæruleum Gilib. = Arabis arenosa
capillaceum Gilib. = Nasturt. palustre
cardaminefolium Gilib. = Nasturt. offic.
Columnæ Jacq. 432 (7), A 91
compressum Mœnch = austriacum
confertum Stev. = polyceratium
corniculatum Lam. = polyceratium
dentatum All. 431 (2)
dentatum Vitm. p. p. = Zanonii
diversifolium Stokes = Nasturt. amphib.
domingense Pourr. = Nasturt. pyrenaic.
eckartsbergense W. = austriacum
entelicum Biv. f. = quid?
eriocarpum N. Terr. (*polycerat.*) A 91 (11 b)
erucæfolium Gilib. = Irio
Erucastrum Gouan = Diplotax. muralis
Erucastrum Pollich = Brassica ochroleuca et Erucastrum
erucoides Desf. = Diplotax. erucoides
erysimastrum Lam. = Irio et orientale
erysimifolium Pourr. A 91 (5 γ)
erysimoides Desf. 433 (13)
filiforme Dulac = Irio
fluviatile Vell. = Nasturt. offic.
gallicum Lois. = Brassica Erucastrum
gallicum W. = xerophilum
glabrum W. = Irio (a)
glaucescens Jord. = erysimifolium
Harra Steud. = Diplotax. Harra
heterophyllum Goir. (*Sophia*) A 91 (10 b)
hieracifolium Trautv. = Erysimum hierac.
hirsutum Gilib. = Lœselii
hirtum Host = Brassica ochroleuca
hispanicum Ard. (non Jacq.) = erysimifolium
hispidum Mœnch = Lœselii
hispidum Poir. = Nasturt. palustre
hispidum Vahl = Diplotax. hisp.
hungaricum Lumn. = pannonicum
hybridum Thuill. = Nasturt. palustre
hygrophilum Fourn. (Irio) = Irio (a)
hyoseridifolium Gaud. (acutangul.) = erysimifol.

Digitized by Google

SISYMBRIUM I 431 (366)
integrifolium Gilib. (non L.) = Nasturt. amphib.
Irio L. 432 (4), A 91
islandicum Œd. = Nasturt. palustre
jacobeæfolium Berger. = Brassica Erucastrum
lejocarpum DC. (*offic.*) A 212 (12 b)
lejocarpum Jord. = prec.
levigatum W. = Diplotax. tenuifol.
latifolium S. F. Gray = Irio
ligusticum DNtrs. (*Columnæ*) 432 (7 b)
lippizense Wulf. = Nasturt. lippiz.
Lœselii L. 432 (6)
minus Bolzon (*Sophia*) A 91 (10 c)
minus Lam. = Diplotax. mural.
monanthos Viv. = Morisia hypogæa
monense L. = Brassica mon.
monense Vill., All. = Brassica repanda
monense W. K. = Diplotax. tenuifol.
multifidum Gilib. = Sophia
multisiliquosum Hoffm. = austriacum
murale L. = Diplotax. mur.
nanum Coss. p. p., Bonnet et Bar. = Malcolmia confusa
nanum DC. = Malcolmia nana
nasturtiifolium Gilib. = Nasturt. silvestre
Nasturtium Thunb. = seg.
Nasturtium-aquaticum L. = Nasturt. offic.
nebrodense Poir. = Lepidium nebrod.
obtusangulum Lap. p. p. = Brassica montana
obtusangulum Schleich. = Brassica Erucastrum
officinale Scop. 433 (12), A 212
officinarum Crantz = prec.
orientale Auct. it. (an L.?) = Columnæ
pachypodium Caruel (*Irio*) 432 (4 c)
pallescens Jord. = erysimifolium
palustre Pollich, Leyss. = Nasturt. pal.
pannonicum Bad. = ligusticum
pannonicum Jacq. 432 (8 b)
parviflorum Lam. = Sophia
pendulum Desf. = Diplotax Harra
petræum Delarb. = Arabis petræa
pinnatifidum Bert. f. = Zanonii
pinnatifidum DC. = dentatum
pinnatifidum Forsk. = Irio
pinnatifidum Pirona (Thalian.) = Arabis — pinnatif.
polyceratium L. 433 (11) A 91
pumilum Lam. = Diplotax. viminea

SISYMBRIUM I 431 (366)
pusillum Vill. = Nasturt — pusill.
pyrenaicum L = Nasturt pyrenaicum
pyrenaicum Vill. = acutangulum
ramulosum Poir. (non Desf.) = Irio
repandum W. = Brassica rep.
rigidulum Lag. = erysimoides
Roripa Scop. = Nasturt. amphib.
ruderale Jord A 212 (12 c)
sagittæfolium Wulf. = Brassica Napus
septulatum DC. = altissimum
serratum Thunb. = Lepidium ruderale
silvestre L. = Nasturt. silv.
simplicissimum Gmel. = Arabis Thaliana
simplicissimum Lap. = Arabis glabra
sinapioides R. Br. = acutangulum
Sinapios Retz. = altissimum
Sinapistrum Crantz = altissimum
Sophia L. 433 (10), A 91
stoloniferum J. et C. Presl = Nasturt. amphib.
strictissimum L. 431 (1)
subhastatum Horn., W. = Columnæ
supinum Ten. (non L.) = quid?
tanacetifolium L. 433 (9)
tenuifolium L. = Diplotax. ten.
tenuifolium Salisb. = Sophia
terrestre With. = Nasturt. palustre
Thalianum J. Gay = Arabis Thaliana
Tillieri Bell. A 91 (5 β)
Tournefortii Schleich. = Brassica Erucastrum
truncatum Dulac = Alliaria offic.
valentinum L. = Brassica valent.
Villarsii Jord. = acutangulum
villosum Mœnch = Columnæ
vimineum L. = Diplotax. vim.
vineale Gater. = Diplotax. viminea
vulgare Pers. = Nasturt. silv.
Waltheri Crantz = Irio
xerophilum Fourn. (*Irio*) 432 (4 b), A 91
Zanonii J. Gay 432 (8)
Zeæ Spr. = erysimoides

SIUM II 162 (551)
Amomum Roth = Sison Amom.
angustifolium L. = erectum
annuum Roth = Seseli ann.
Apium Roth = Apium graveolens
aquaticum Gueld. = latifol.
aromaticum Lam. = Sison Amom.
Berula Gouan = erectum
Bulbocastanum Spr. = Bunium Bulbocast.
Carum Weber = Carum Carvi

SIUM II 162 (551)
Carvi Bernh. = prec.
Cicuta Weber = Cicuta virosa
Cordiennii Lois. = Fœniculum peucedanoides
crassipes Spr. = Apium crass.
erectum Huds. 162 (1)
Falcaria L. = Falcar. vulg.
falcatum Dubois = prec.
FerulaRæusch. = erectum
græcum L. = Bonannia græca
graveolens Vest = Apium grav.
incisum Pers. = erectum
intermedium Ten. = Apium — stoloniferum
inundatum Lam. = Apium inund.
lancifolium Schrank (non M. B.) = seg.
latifolium L. 162 (2), A 151
latifol. β L. = erectum
limosum Moris ex DC. = Apium crassipes
nodiflorum L. = Apium nod.
nodiflorum Œd. = erectum
peucedanoides Spr. = Fœniculum peuc.
Podagraria Weber = Ægopod. Pod.
radiatum Viv. = Apium nodifl.
repens Jacq., L. f. = Apium rep.
saxifragum Roth = Falcaria saxifr.
segetum Lam. = Petrosel. seg.
siculum L. = Kundmannia sic.
Silaus Roth = Silaus flavescens
stoloniferum Guss. = Apium — stolon.
sulcatum Pers. = latifol.
tortuosum Roth = Seseli annuum
verticillatum Lam. = Carum vert.
virescens Spr. = Fœniculum peucedanoides
Visnaga Stokes = Ammi Visn.
vulgare Bernh. = Ægopod. Podagr.
vulgare Gueld. = latifolium

SMEGMANTHE = Saponaria
ocymoides Kitt = S. ocym.

SMEGMATHAMNIUM = Saponaria
bellidifolium Rchb. = S. bellid.
luteum Rchb. = S. lutea

SMELOWSKIA = Hutchinsia
alpina C. A. Mey = H. alp.
brevicaulis Steud. = H. brevic.

SMILACINA = Majanthemum
bifolia Desf. = M. bifol.
cordifolia Becker = prec.

SMILAX I 210 (210)
altissima Moris et DNtrs. (aspera) = mauritanica
angustifolia DC. (*aspera*) 210 (α b)
aspera L. 210, A 49
aspera β L. = mauritanica
catalonica Poir. = mauritanica
hastata W. = aspera
mauritanica Desf. 210 (β)
nigra W. 210 (α c)

Digitized by Google

SMYRNIUM II 203 (598)
Dioscoridis Spr. = perfoliatum
Dodonæi Spr. = rotundifol.
laserpitioides Crantz = Prangos ferulacea
maritimum Salisb. = Olusatrum
Matthioli Presl = rotundifol.
nodiflorum All. = Trochiscanthes nod.
nudicaule M. B. = Physosperm. aquilegifol.
Olusatrum L. 203 (1), A 154
perfoliatum L. 203 (2)
ramosum Urv. = rotundifol.
rotundifolium Mill. 203 (2 β)
verticillatum Caruel = Physosperm. vert.
vulgare S. F. Gray = Olusatr.
SOLANUM II 399 (743)
aculeatum Dun. (*esculent.*) 401 (4 α a)
alatum Mœnch. = miniatum
albiflorum Dun. (*Dulcam.*) 399 (1 c)
angulatum Guss. = seg.
angulatum Guss. (*miniatum*) 400 (3 ι b)
atriplicifolium Desp. 400 (3 α b)
atriplicifolium Fiori (*villosiss.*) 400 (3 λ b)
atriplicifol. Guss. (miniatum) = prec.
atriplicifolium Guss. (nigrum) = moschat.
aviculare Forst. 402 (nota)
bonariense L. 402 (nota)
chlorocarpum Schur = seg.
chlorocarpum Spenn. (nigrum) = ochroleucum
citrullifolium A. Br. 402 (nota)
Dillenii Schult. 400 (3 ε)
Dulcamara L. 399 (1)
esculentum Dun. 401 (4 α)
flavum Kit. 400 (3 η b)
fruticulosum Guss. = seg.
fruticulosum Guss. (nigrum) = vulgare
grossidens Luescher (*nigrum*) A 168 (3 α for.)
Hermanni Dun. 401 (5 β)
hirsutum Dun. (Dulcam.) = litorale
humile Bernh. 400 (3 ζ)
hyoscyamifolium Guss. = seg.
hyoscyamifol. Guss. (miniat.) = miniatum
inerme Dun. (*esculent.*) 401 (4 α c)
insanum L. 401 (4 β)
laciniatum Ait. = aviculare
litorale Raab 399 (1 b)
luteo-virescens C. C. Gmel. = humile
luteum Mill. = villosum
Lycopersicum L. 401 (6)
Lycopersicum β L. = Pseudo-Lycopers.
macrophyllum Fiori (*Lycopers.*) 402 (6 β)
marginatum L. f. 402 (nota)
mediterraneum Dun. (*sodom.*) 401 (5 α)
SOLANUM II 399 (743)
melanocarpum Dun. = insanum
Melongena L. 401 (4)
miniatum Bernh. 400 (3 ι)
molle Guss. = seg.
molle Guss. (*nigrum*) 400 (3 δ)
moschatum J. et C. Presl 400 (3 β)
nanum Dun. (*Lycopers.*) 401 (6 α b)
nigrocarpum Luescher (*villos.*) A 168 (3 θ for.)
nigrum L. 399 (3), A 168
oblongo-cylindricum Dun. (*ovigerum*) 401 (4 γ b)
ochroleucum Bast. 400 (3 η)
oleraceum Rchb. = Reichenbachii
ovigerum Dun. = seg.
ovigerum Lam. (*Melongena*) 401 (4 γ)
parviflorum Bad. 400 (3 γ)
patulum Guss. = seg.
patulum Guss. (nigrum) = moschat.
physalidifol. Guss. 400 (3 κ)
physalidifolium Guss. (miniatum) = prec.
piriforme Poir. 402 (6 γ)
pomiferum Cav. = piriforme
Pseudo-Lycopersicum Jacq. 402 (6 δ)
pterocaulon Rchb. = stramonifol.
pubescens R. et S. (Dulcam.) = litorale
punicum C. C. Gmel. = miniatum
Reichenbachii Guss. 400 (3 β b)
Reichenbachii Guss. (nigrum) = prec.
rubrum Rchb. (non Mill.) = physalidifol.
sodomæum L. 401 (5), A 168
spurium Balb. = piriforme
spurium J. F. Gmel. = Pseudo-Lycopers.
stenopetalum A. Br. 400 (3 α c)
stramonifolium Guss. 400 (3 γ b)
stramonifolium Guss. (nigrum) = prec.
subinerme Dun. (*esculent.*) 401 (4 α b)
tomentosum Koch (Dulcam.) = litorale
tuberosum L. 399 (2)
villosissimum Dun. (*nigrum*) 400 (3 λ)
villosissimum Guss. = prec.
villosum DC. = villosissim.
villosum Lam. = seg.
villosum L. (*nigrum*) 400 (3 θ), A 168
villosum Mill. = miniatum
vulgare Heg. = seg.
vulgare L. (*nigrum*) 400 (3 α), A 168
vulgatum L. (nigrum) = prec.
SOLDANELLA II 320 (679)
albiflora Goir. (*alpina*) A 162 (α b)
alpina L. 320, A 162
alpina F. W. Schm. = mont.
SOLDANELLA II 320 (679)
alpino × minima Huter 321
alpino × pusilla Kern. 321
austriaca Vierh. = minima
Clusii Curtis = montana
Clusii Gaud. = pusilla
Clusii F. W. Schm. = alpina (α)
cyclophylla Beck. (alp.) = minima
cyclophylla Vierh. = prec.
Ganderi Huter = alpino × minima
hybrida Kern. = alpino × pusilla
major Neilr. (alp.) = montana
major Vierh. = montana
media Bruegg. = alp. × pusilla
minima Hpe. 321 (δ)
minor Neilr. (alp.) = alpina (α)
montana W. 321 (β)
occidentalis Vierh. = alpina (α)
pusilla Baumg. 321 (γ)
villosa Darr. = montana
Wettsteinii Vierh. = alp. × minima
SOLEIROLIA = Parietaria
corsica Gaudich. = seg.
repens O. Ktze. = P. Soleirolii
SOLENANTHUS = Cynoglossum
apenninus Hohen. = C. apenn.
SOLIDAGO III 230 (865)
alpestris Jan (Virga-aur.) = pygmæa
alpestris W. et K. 231 (3 γ)
alpina L. = Senecio alp.
alpina Salisb. = minuta
altissima L. = canadensis
angustifolia Gaud. (Virga-aur.) = ericetorum
angustifolia Mill. = Senecio fluviatilis
australis Posp. (*Virga-aur.*) 231 (3 α d)
Bertiana DNtrs. (*Virga-aur.*) 231 (3 α i)
cambrica Huds. 231 (3 γ b)
canadensis L. 230 (1), A 182
deflexa Mœnch = serotina
Doronicum L. = Senecio Doronicum
elatior Fiori (*alpestris*) 231 (3 γ d)
ericetorum Duby (*Virga-aur.*) 231 (3 α e)
flexuosa Gilib. = Virga-aurea
foliosa Fiori (*Virga-aur.*) 231 (3 α h)
glabra Desf. = serotina
graveolens Lam. = Inula graveol.
latifolia Koch (*Virga-aur.*) 231 (3 α f)
latifolia Moris (Virga-aur.) = nudiflora
litoralis Savi 231 (3 ε)
longifolia Schrad. = canadensis
minuta Puccin. = pygmæa
minuta L. 231 (3 δ), A 182
minuta Thore = ericetorum
montana L. = Senecio Cacaliaster
montana Poir. = Virga-aurea

Digitized by Google

SOLIDAGO III 230 (865)
montana N. Terr. (*alpestris*) 231 (3 γ c)
monticola Jord. 231 (3 α b)
nudiflora Viv. 231 (3 α c)
pumila Crantz = minuta
pumila Gaud. (Virga-aur.) = cambrica
pygmæa Bert. 231 (3 β)
serotina Ait. 230 (2)
serratifolia Gilib. = Senecio paludos.
vallesiaca Jord. 231 (3 α g)
Virga-aurea L. 231 (3), A 182
Virga-aurea B Ten. = monticola
viscosa Lam. = Inula viscosa
vulgaris Mill., Lam. 231 (3 α)
SOLSTITIARIA = Centaurea
flava Hill = C. solstitialis
melitensis Hill = C. melit.
solstitialis Hill = C. solst.
SOMERA = Scilla
italica Salisb. = S. ital.
SOMERAUERA = Alsine
quadrifaria Hpe. = A. octandra
quadrifida M. et K. = prec.
SONCHIDIUM = Sonchus
maritimum Pomel = S. mar.
palustre Pomel = S. pal.
SONCHUS III 416 (946)
alpestris Clairv. = seg.
alpinus L. = Mulgedium alp.
angustifolius Bischoff (*marit.*) 418 (4 γ a)
angustifolius Neck. = marit.
annuus Lge. (*tenerr.*) 417 (1 b)
aquatilis Pourr. = marit.
arvensis L. 418 (4), A 193
arven. β Koch = subintegrifol.
arven. var. Paolucci = pinnatifidus
asper Hill 417 (2 β), A 193
asper L. (olerac.) = prec.
Bocconi Jan = Launæa resedifolia
cæruleus Sm. = Mulgedium alpinum
chondrilloides Desf. = Launæa resedifolia
chondrilloides S. et S. = Reichardia picroides (α)
ciliatus Lam. = levis
decipiens DNtrs. (fallax) = seg.
decipiens Fiori (*asper*) 418 (2 β d), A 193
decorus Lojac. (non Rob. et Cast.) = glaucescens
fallax Wallr. = asper
flocculosus Nym. (arven.) = pungens
glaber Gilib. = oleraceus
glaber Schult. = arvensis
glandulosus Ambrosi (olerac.) = Royleanus
glaucescens Jord. 417, A 193 (4 γ)
græcus Reut. = glaucescens
Gussonei Fiori (*tenerr.*) 417 (1 d)
hispanicus Jacq. = Reichardia tingitana (α)
hispidus Gilib. = arvensis
SONCHUS III 416 (916)
inermis Bischoff (*asper*) 417 (2 β a)
integrifolius Wallr. (*olerac.*) 417 (2 α b)
intermedius Bruckn. = uliginosus
intermedius Jan = Reichardia — interm.
italicus Spr. 417 (1 e)
lacerus W. 417 (2 α c)
latifolius Bischoff (marit.) = litoralis
levipes Koch (arven.) = uliginosus
levis Bartal., Vill. 417 (2 α)
levis L. (olerac.) = prec.
litoralis Freyn (*glaucescens*) 418 (2 β e subf.)
litoralis Rchb. 418 (4 γ b)
macrophyllum W. = Mulgedium macr.
major Neilr. (*arvens.*) A 193 (4 α for.)
maritimus L. 419 (4 γ)
maritimus L. Amœn. = uligin.
minor Neilr. (*arvens.*) A 193 (4 α for.)
montanus Lam. = Mulgedium alpin.
multiflorus Desf. = prec.
nigricans Tausch = quid?
nitidus Vill. = arvens. (α)
Nymani Tin. = pungens
oleraceus L. 417 (2), A 193
olerac. α et β L. = levis
olerac. γ et δ L. = asper
paludosus Gueld. = seg.
paluster L. 418 (3)
pectinatus DC. 417 (1 c)
picroides Lam., All. = Reichardia picr. (α)
picroides S. et S. = Reichardia — intermedia
picroides b. Guss. = Reichardia — Cupaniana
pinnatifidus Fiori (*arven.*) 418 (4 α b)
pinnatisectus Lojac. (asper) = decipiens?
pungens Bischoff (*asper*) 417 (2 β c)
racemosus Lam. = Mulgedium alpin.
Royleanus DC. 417 (2 α e)
Royleano-lacerus Caldesi (*olerac.*) 417 (2 α f)
runcinatus Fiori (*asper*) 417 (2 β b)
runcinatus Koch (olerac.) = triangular.
sagittatus Mœnch = paluster
sespedalis Gilib. = prec.
spinosus Lam. = asper
squamosus Lam. = Reichardia picroides (α)
subintegrifolius Cocc. (*arven.*) 418 (4 α c)
subbipinnatifidus Fiori (*olerac.*) 417 (2 α d)
subbipinnatifidus Guss. (ciliatus) = prec.
tener Salisb. = seg.
tenerrimus L. 417 (1)
SONCHUS III 416 (946)
tenerr. b. Guss. = Gussonei
tenerr. c. Guss. = italicus
tingitanus Lam. = Reichardia ting.
triangularis Wallr. (*olerac.*) 417 (2 α a)
uliginosus M. B. 418 (4 β)
SOPHIA = Sisymbrium
Lobelii Rupr. = S. Sophia
multifida Gilib. = prec.
vulgaris Fourr. = prec.
SOPHORA II 9 (478)
japonica L. 9
SORBARIA = Spiræa
sorbifolia A. Br. = S. sorbifolia
SORBUS = Pirus
alpestris Wimm. (Aucup.) = P. — glabra
alpina Blytt (Aucup.) = P. — glabra
Amelanchier Crantz = Amel. vulgar.
Aria Crantz = P. Aria
Aria × tormin. Bechst. = P. Aria × torm.
Aucuparia L. = P. Aucup.
Chamæmespilus Crantz = P. Chamæm.
confusa Gremli = P. Aria × tormin.
cretica Fritsch = P. græca
domestica L. = P. domest.
edulis C. Koch = P. edulis
fennica Kalm = Aria × aucuparia
florentina Nym. = P. tormin. × Malus
glabra Gilib. = P. — glabra
glabrata Wimm. et Grab. (Aucup.) = P. — glabra
græca Lodd. ex Steud. = P. græca
Hostii Heynh. = P. Aria × Chamæmesp.
hybrida Koch = P. Aria × Aucup.
hybrida L. = P. Aucup. × suecica, cfr. A 135
incisa Lojac. (Aria) = P. græca
lanuginosa Kit. = P. Aucup. a. lanug.
latifolia Pers. = P. Aria × tormin.
longifolia Hedl. = P. edulis
meridionalis Nym. = P. — græca
meridionalis Strobl (Aria) = P. — græca
pirifera Rchb. (domestica) = P. — pirif.
præmorsa Nym., Strobl = P. præm.
scandica Auct. (non Fr.) = P. Aria × tormin.
semipinnata Roth = P. Aria × Aucup.
subcalva Schur (Aucup.) = P. — glabra
sudetica Nym. = P. Aria × Chamæmesp.
thuringiaca Fritsch = P. Aria × Aucup.

Digitized by Google

SORBUS = Pirus
Tommasinii Hladn. = P. torminalis
torminalis Crantz = P. tormin.
umbellata Fritsch = P. græca
SORGHUM I 45 (45)
campanum Ten. et Guss. 46 (2 γ)
cernuum Host, W. 46 (2 ε)
Durrha Fiori (vulg.) 46 (2 ε nota)
giganteum Edgew. = halepense
glycychylum Pass. = saccharatum
halepense Pers. 46 (1)
inerme Posp. (halepense) = muticum
lejostachyum Fiori (halep.) 46 (1 c)
muticum Fiori (halep.) 46 (1 b)
nigrum R. et S. 46 (2 β d)
obovatum Fiori (sacchar.) 46 (2 β b)
rubens W. 46 (2 β c) = rubrum, cfr. A 13
rubrum Posp. (sacchar.) A 13 (2 β c)
saccharatum Mœnch, Pers. 46 (2 β)
Schreberi Ten. = halepense
technicum Fiori (vulgare) 46 (2 δ)
vulgare Pers. 46 (2), A 13
SORIA = Euclidium
syriaca Desv. = E. syr.
SOYERIA = Crepis
alpestris Mutel = C. alpestr.
alpina Gr. et Godr. = Mulgedium alpinum
aurea Mutel = C. aurea
blattarioides Monn. = C. blatt.
grandiflora Monn. = C. conyzæfolia
hieracioides Sch. Bip. = C. — succisæfolia
hyoseridifolia Koch = C. tergloviensis
montana Monn. = C. pontana
paludosa Godr. = C. palud.
præmorsa Mutel = C. præm.
SPALLANZANIA = Agrimonia
agrimonioides Pollini = A. agrim.
SPARGANIUM I 145 (146)
affine Schnizl. 146 (3 α)
alpinum D. Don = affine
boreale Læst. = affine
erectum L. 145 (1), A 39
erectum β L. = simplex
erectum Whlnb. = simplex
fluitans Gr. et Godr., A. Br. (simplex) 146 (2 b), A 39
Friesii Beurl. = natans
gramineum Wallr. = minimum
longissimum Fr. (simplex) = fluitans
minimum Fr. 146 (3 β)
natans L. 146 (3)
neglectum Beeby 146 (1 β), A 39
ramosum Huds. = erectum
ramoso × simplex A 39
rostratum Larsson = minimum
SPARGANIUM I 145 (146)
simplex Huds. 146 (2)
vaginatum Larsson = affine
SPARTIANTHUS = Spartium
americanus Steud. = seg.
junceus Lk. = Sp. junc.
SPARTINA I 75 (91)
Duriæi Parl. = versicolor
juncea Coss. et Dur. (non W.) = versicolor
phleoides Roth = Crypsis schœnoid.
pungens P. B. = stricta
stricta Roth 75 (1)
versicolor Fabre 75 (2), A 19
SPARTIUM II 22 (484)
acutifolium Lindl. = junceum
ætnense Biv. = Genista ætn.
album Desf. = Cytis. albus
americanum Meyen = junceum
angulatum Raf. = Cytisus scoparius
angulosum Gilib. = prec.
arboreum Desf. = Cytis. arbor.
aspalathoides Desf. = Gen. aspalath.
cinereum Vill. = Gen. cinerea
Clusii Spr. = Gen. monosperma
complicatum L. = Adenocarpus compl.
corsicum Lois. = Gen. corsica
creticum Desf. = Anthyllis cretica
Cupani Spr. = Gen. Cup.
dalmaticum Spr. = Gen. dalm.
decumbens Ait. = Gen. pedunculata
decumbens Jacq. = Gen. diffusa
erinaceoides Lois. = Gen. Lobelii
Gasparrinii Guss. = Gen. ephedroides
glabrum Mill. = Cytis. scoparius
Gussonei Spach = Gen. — Gussonei
gymnopterum Viv. = Gen. ephedroides
hispanicum Mill. = Gen. hisp.
humile Salisb. = Gen. germanica
infestum Presl = Calycotome infesta
junceum L. 23
Laburnum Cav. = Cytisus Lab.
lanigerum Desf. = Calycotome villosa
monospermum L. = Gen. mon.
Morisii Bert. = Gen. Mor.
nudum Spr. (non W.) = Gen. ætnensis
odoratissimum D. Don = junceum
odoratum Dulac = prec.
pilosum Roth = Gen. pil.
purgans All. (non L.) = Gen. cinerea
pusillum Salisb. = Gen. anglica
radiatum L. = Gen. rad.
rigidum Viv. = Calycotome — rigida
sagittale Roth = Gen. sag.
SPARTIUM II 22 (484)
scoparium L. = Cytis. scop.
Scorpius L. = Gen. Scorpius
sericeum Ait. = Gen. seric.
sphærocarpum Lap. (non L.) = Gen. cinerea
spinosum Asso = Gen. Scorpius
spinosum L. = Calycotome spin.
spinosum Brot. = Calyc. villosa
spinosum Ucria = Gen. Cupani
tinctorium Roth = Gen. tinct.
trispermum Sm. = Gen. ætnensis
villosum Poir. = Calycotome vill.
SPATOCYTISUS = Cytisus
sessilifolius Webb et Berth. = C. sess.
triflorus Webb et Berth. = C. trifl.
SPARTOTHAMNUS = Cytisus
sessilifolius Presl = C. sess.
SPATULARIA = Saxifraga
Clusii Haw. = S. Clusii
tellaris Haw. = S. stellaris
SPECULARIA III 188 (848)
albiflora Sacc. et Bizz. (Specul.) 188 (1 α c)
arvensis Montand., Trevis. = Speculum
calycina DC. f. (Specul.) 188 (1 α b)
calycina Lojac. (hybrida) A 180 (2 var.)
castellana Lge. A 180 (3 var.)
cordata Heynh., Cald. 189 (1 β)
cordata Vis. (Specul.) = prec.
falcata DC. f. 189 (3), A 180
falcata Pasq. (Specul.) = prec.
hirta Ces. P. et G. p. p. (Specul.) = cordata?
hirta Nym. 188 (1 α d)
hirta Tin. (falcata) = castellana
hybrida DC. f. 189 (2), A 180
pubescens DC. f. (Specul.) = hirta
Speculum DC. f. 188 (1)
vulgaris Kitt. = Speculum
SPELTA = Triticum
amylea Ser. = T. dicoccum
vulgaris Ser. = T. Spelta
SPERGELLA = Sagina
glabra Rchb. = S. glabra
macrocarpa Rchb. = S. macr.
nodosa Rchb. = S. nod.
saginoides Rchb. = S. Linnæi
saxatilis Schur = S. Linnæi
subulata Rchb. = S. sub.
SPERGULA I 339 (327)
arvensis L. 339 (1), A 68, 211
Chieuseana Pomel A 211 (1 var.)
decandra Gilib. = arvensis
filipensis Dietr. = Spergularia marina
glabra W. = Sagina glabra
glutinosa Dietr. = Holosteum glut.
glutinosa Lge. (arvens.) = laricina

Digitized by Google

SPERGULA I 339 (327)
gracilis E. Petit (*arvens.*) A 68 (1 for.)
laricina Lightf. = Sagina subulata
laricina Wulf. A 68 (1 for.)
lejosperma Celak. (arvens.) = sativa
Linnæi O. Ktze. (pentandra) = pentandra (a)
marginata Moris (arvens.) = pentandra
marina Bartl. et Wendl. f. = Spergularia mar.
media Bartl. et Wendl. f. = Spergularia media
Morisonii Bor. 339 (2 b)
nodosa L. = Sagina nod.
pentandra L. 339 (2)
pentandra Rchb. = Morisonii
pilifera DC. = Sagina pil.
puberula Cariot = Sagina glabra
pubescens Moris (saginoides) = Sagina subulata
radicans Dietr. = Spergularia radicans
repens Zum. = Sagina glabra
rubra Dietr. = Spergularia rubra
saginoides All. = Sagina glabra
saginoides L. = Sagina Linnæi
saginoides α Moris = Sagina — glabrata
sativa Bœnn. 339 (1 b)
saxatilis Wimm. = Sagina Linnæi
segetalis Vill. = Spergularia seg.
subulata Sw. = Sagina sub.
trachysperma Neilr. (arvens.) = arvensis (a)
vernalis W. = Morisoniii
vulgaris Bœnn. = arvensis
SPERGULARIA I 338 (326)
alpina Wk. A 68 (1 α for.)
arenosa Fouc. et Sim. (*rubra*) A 68 (1 α for.)
arvensis Cambess. = Spergula arvensis
atheniensis Asch. 338 (1 α b), A 67
atheniensis Heldr. et Sart. (rubra) = prec.
australis Fiori (*marina*) A 68 (1 δ for.)
austral. Gürke (salina) = prec.
austral. Lebel (Dillenii) = prec.
campestris Asch. = seg.
campestris Fenzl (*rubra*) 338 (1 α)
campestris Nym. = atheniensis
campestris Wk. et Lge. = diandra
canadensis G. Don = media
capillacea Lojac. (non Wk.) = campestris
decipiens Sarato (*atheniensis*) A 67 (1 α b subf.)
diandra Boiss. 339 (1 β)
diandra Lebel = atheniensis
Dillenii Lebel = marina
SPERGULARIA I 338 (326)
elegans Sarato (*atheniensis*) A 67 (1 α b subf.)
exilis Fenzl = segetalis
halophila Simk. (media) = urbica
heterosperma Lebel = media
insularis Fouc. et Sim. A 68 (1 γ')
Lebeliana Rouy = rupicola
macrorrhyza Heynh. 339 (1 ζ)
marginata Kitt., Bor. = media
marina Griseb. 339 (1 δ), A 68
media Boiss., Arc. = marina
media Pers. 339 (1 ε)
muralis Fiori (*marina*) A 68 (1 δ for.)
muralis Gürke (salina) = prec.
nicœensis Sarato 339 (1 γ)
oligantha Fouc. et Sim. (*rubra*) A 68 (1 α for.)
patens Hochst. = diandra
pentandra G. Don = Spergula pent.
perennis Rouy et Fouc. (Dillenii) = muralis
pinguis Fenzl (*rubra*) A 67 (1 α d)
purpurea Lebel (non G. Don) = nicœensis
radicans Presl 338 (1 α c)
rubra Pers. 338 (1), A 67
rupestris Lebel (non Camb.) = rupicola
rupicola Lebel 339 (1 ζ b)
salina J. et C. Presl = marina
salsuginea Fenzl = diandra
Saratoi Lebel = atheniensis
segetalis G. Don, Fenzl 339 (nota), A 68 (2)
semidecandra Kitt. = segetalis
Spergula G. Don = marina
stipularis Boiss. (rubra) = alpina
urbica Nym. 339 (1 δ b)
virescens Fouc. et Mand. (*rubra*) A 68 (1 α for.)
SPHACOPSIS = Salvia
verticillata Briq. = S. verticill.
SPHÆROSPORA = Gladiolus
imbricata Sweet = G. imbr.
segetum Sweet = G. seget.
SPHENOPUS I 81 (106)
divaricatus Rchb. 81
Gouani Trin. = divaricatus
SPHONDYLIUM = Heracleum
alpinum Steud., Caruel = H. alpin.
amplifolium Caruel (Branca) = H. longifol. et Orsinii
austriacum Scop. = H. austr.
Branca Scop. = H. Sphondyl.
Branca-ursina Hoffm. = prec.
conforme Mœnch = H. flavescens
decipiens Hoffm. = H. pyrenaic.
latifolium Caruel (Branca) = H. Panaces
longifolium Hoffm. = H. longifolium
medium Caruel (Branca) = H. Sphondyl. (α)
Panaces Gærtn. = H. Pan.
vulgare S. F. Gray = H. Sphond.
SPIESIA = Astragalus
campestris O. Ktze. = A. camp.
Gaudini O. Ktze. = A. — neglectus
lapponica O. Ktze. = A. lappon.
pilosa O. Ktze. = A. pil.
triflora O. Ktze. = A. — triflorus
tyrolensis Sieb. = A. sordidus
SPINACIA I 307 (287)
domestica Borkh. = oleracea
farinosa C. Koch (*olerac.*) 308 (α b)
fera Pall. = Atriplex roseum
glabra Mill. 308 (β)
inermis Mœnch = glabra
oleracea L. 308
Roxburghi Fiori (*olerac.*) 308 (α c)
sessiliflora Stokes = oleracea
spinosa Mœnch = oleracea (α)
tetrandra Roxb. (non Stev.) = Roxburghi
SPIRÆA I 561 (457)
angustifolia Pamp. (*lancifol.*) A 116 (3 α b)
Aruncus L. 564 (8)
banatica Janka = ulmifolia
bellunensis Bizz. (decumb.) = lancifolia (α)
cana W. et K. A 213 (1 bis)
chamædryfolia Jacq. = ulmifolia
chamædryfolia L. 562 (1)
cinerea Glaab (Ulmaria) = glauca
concolor Neilr. (Ulmaria) = denudata
confusa Reg. et Kœrn. = media
crenata L. (non Pall.) = hypericifolia
decumbens Koch 563 (3 β)
denudata Presl 563 (7 c)
discolor Koch (Ulmaria) = tomentosa
Filipendula L. 563 (6), A 117
flabellata Bert. 562 (2 γ)
flexuosa Rchb. (non Fischer) = decumbens
glauca Schultz 563 (7 b)
Hacquetii Fenzl = lancifolia (α)
hypericifolia L. 562 (2)
integrifolia Pamp. (*lancifol.*) A 116 (3 α c)
lancifolia Hoffgg. 562 (3), A 116
media Schm. 562 (1 β)
nivea Wallr. (Ulmaria) = tomentosa
oblongifolia W. et K. = media
pubescens DC. A 117 (6 b)
obovata W. et K. 562 (2 β)
quinqueloba Baumg. A 117 (7 d)
salicifolia L. 563 (4)
sericea Turcz. = media (for.)
sorbifolia L. 563 (5)
subdenudata Glaab (Ulmaria) = glauca
tomentosa Camb. (*Ulmaria*) 563 (7 a)
tomentosa Pœch (decumbens) = lancifolia (α)

Digitized by Google

SPIRÆA I 561 (457)
Ulmaria L. 563 (7), A 117
ulmifolia Scop. 562 (1 γ)
ulmifolia Suffr. = lancifolia
SPIRANTHES I 250 (240)
æstivalis Rich. 250 (1)
autumnalis Rich. 250 (2)
spiralis C. Koch = autumnalis
SPIROCARPUS = Medicago
minimus Opiz = M. min.
SPIRODELA = Lemna
polyrrhiza Schleid. = L. polyrrh.
SPOROBOLUS I 62 (73)
arenarius Duv.-Jouv. = pungens
pungens Kth. 62, A 16
SPORTELLA = Cotoneaster
atalantioides Hance = C. Piracantha
SQUAMARIA = Lathræa
Orobanche Scop. = L. Squamaria
SQUILLA = Urginea
insularis Jord. et Fourr. = U. — insularis
litoralis Jord. et Fourr. = U. — litoralis
maritima Steinh. = U. mar.
Pancration Steinh. = U. Pancration
STACHYS III 40 (795)
acuminata Briq. (*pal.*) 44 (8 α c)
alba Caruel (german.) = italica
alba Mill. = germanica
albiflora Bég. (*offic.*) 41 (2 α d)
albiflora Guss. (*arvens.*) 44 (12 c)
Alopecurus Benth. 42 (3), A 173
alpina Briq. (german.) = seg.
alpina Heldr. et Sart. (dasyanthes) = penicillata
alpina Huet (italica) = prec.
alpina L. 43 (7)
altissima Desf. = italica
ambigua Sm. 44 (8 β)
angustifolia Caruel (recta) = fragilis
angustifolia Gilib. = palustris
angustifolia Gr. et Godr. (recta) = stenophylla
angustifolia Ten. (*recta*) 46 (17 γ b)
annua L. 45 (14)
arenaria Vahl 46 (16)
argentea Tausch = germanica
arvensis L. 45 (12), A 173
austriaca Heynh. = palustris
Balbisii Lk. = pubescens
Ballota Ktze. = Ballota nigra
barbata Lap. = Heraclea
barbigera Viv. = prec.
Betonica Benth. = offic.
Betonica Crantz = annua
Betonica Scop. = recta (α)
betonicæfolia Pers. = Heraclea
biennis Roth = germanica
bracteata Beck. (*pal.*) 44 (8 α d)
Bufonia Thuill. = recta
calabra N. Terr. (*Heraclea*) 43 (6)
cordata Gilib. = silvatica
STACHYS III 40 (795)
colorata Guss. (*arvens.*) 44 (12 b)
corsica Pers. 44 (10)
curviflora Tausch = alpina
danica Bég. (*offic.*) 41 (2 β)
dasyanthes Raf., Schm. 43 (4 c)
densiflora Benth. 41 (1)
divaricata Viv. = hirta L.
elatior Goir. (*annua*) 45 (14 a)
erecta C. Koch = recta
fœtida Gueld. = silvatica
fragilis Vis. 46 (17 δ b)
fusca Mœnch = alpina
germanica L. 42 (4)
glabrata Bég. (*offic.*) 41 (2 α b)
glabrata Guss. (*silvat.*) 44 (9 b)
glutinosa L. 45 (13)
grandiflora Caruel (recta) = labiosa
Heldreichii Boiss. = germanica
Heraclea All. 43 (6)
heterophylla Mœnch = german.
hirta Bég. (*offic.*) 41 (2 α c)
hirta L. 45 (15), A 173
hirta Ten. (*recta*) 46 (17 γ)
humilis Goir. (*annua*) 45 (14 b)
hybrida Benth. (pal.) = ambigua
inscripta Rchb. = hirta L.
intermedia Ait. = german.
intermedia Ten. = Heraclea
italica Mill. 43 (5), A 173
Jacquini Briq. (*Alopecur.*) 42 (3 β), A 173
Janiana Ces. P. et G. = italica
labiosa Bert. 46 (17 β)
labiosa Vis. (suberenata) = Visianii
lanata Crantz (non Jacq.) = german.
lanata Vis. = italica
latifolia Fiori (*offic.*) A 173 (2 α e)
Linnæi Nic. (*dasyanthes*) 43 (4 c for.)
Lisæ Briq. (*recta*) 46 (17 α c)
lusitanica Brot. 47 (nota)
macrophylla Goir. (*annua*) 45 (14 c)
major Ten. (*recta*) 46 (17 α b)
maritima L. 47 (18)
marrubiifolia Viv. 44 (11)
micrantha Bert. (*corsica*) 44 (10 b)
neapolitana Caruel (*alpina*) 43 (7 b)
nervosa Gater. = annua
nitens Janka 46 (17 δ d)
nova Sadler = german.
oblongifolia Briq. (*pal.*) 44 (8 α b)
oblongifolia Rent. = labiosa
Ocymastrum Briq. = hirta L.
officinalis Trevisan, Franch. 41 (2), A 173
Orsiniana Briq. (*german.*) 43 (4 d)
palustris L. 44 (8)
pal. × silvatica Schiede = ambigua
pannonica Láng = german.
STACHYS III 40 (795)
penicillata Boiss. (*german.*) 43 (4 b)
penicillata Heldr. et Sart. = prec.
phlomoides W. = Heraclea
Poiretii Ten. = marrubiifolia
polystachya Ten. = german.
procumbens Lam. = recta
procumbens W. = seg.
pubescens Ten. 47 (19), A 173
pungens Soland. = italica
purpurea Poir. = arenaria
ramosissima Roch. = nitens
recta L. 46 (17), A 173
recta β Bert. = fragilis
Reuteri Schrœt. = labiosa
rubra Donn = arenaria
salviæfolia Ten. = italica
scordifolia W. = arenaria
segetum Hagen = palustris
serotina Bég. (*offic.*) 41 (2 γ), A 173
Sideritis Vill. = recta (α)
silvatica L. 44 (9)
silv. × palustris Schultz. = ambigua
spinulosa S. et S. 47 (nota)
stenophylla Spr. 46 (17 α d)
subcrenata Vis. 46 (17 δ), A 173
tomentosa Gater. = germanica
triloba Stokes = Leonurus Cardiaca
urticæfolia Tausch = alpina
valentina Lag. = Heraclea
velebitica Bég. (*offic.*) 41 (2 γ b)
viridis Caruel (german.) = germanica
Visianii Briq. (*subcrenata*) 46 (17 δ c)
STÆHELINA III 314 (907)
alpina Schrank = Saussurea alpina
dubia L. 314
rosmarinifolia Cass. = dubia
tenuifolia Presl 314 (nota)
STÆHELINIA = Bartsia
alpina Crantz = B. alp.
STAPELIA II 346 (705)
europæa Guss. 347
Gussoneana Jacq. f. = prec.
italica Ten. ex Salm-Dyck = prec.
STAPHYLEA II 220 (617)
pinnata L. 220, A 155
pinnatifida Gueld. = prec.
STAPHYLODENDRON = Staphylea
pinnatum Crantz = St. pinnata
STAPHYSAGRIA = Delphinium
levipes Spach = D. pictum
macrosperma Spach = D. Staphysagria
STATICE II 327 (690)
acutifolia Rchb. 331 (8 η)
albida Guss. 330 (7 ε)
alliacea W. (non Cav.) = Armeria — leucantha Boiss.
alpina Poir. = Armeria alp.
ambigua Tin. ex Ponzo = virgata
angustifolia Tausch = serotina
aristata S. et S. = echioides

Digitized by Google

STATICE II 327 (690)
Armeria L. = Armeria vulgaris
articulata Lois. 332 (8 ξ)
Avei DNtrs. = mucronata
bellidifolia Bert. = albida
bellidifolia Gouan 332 (9)
bellidifolia Guss. (an S. et S.?) = gracilis
Calcaræ Tod. 331 (8 μ)
cancellata Bernh. 332 (8 ρ)
canescens Host = Armeria can.
caspia W. = bellidifolia
catanensis Tin. 331 (8 ζ b)
cephalotes Bert. (non Ait.) = Armeria Morisii
confertiflora Guss. 329 (5 α b)
confusa Gr. et Godr. 329 (6 α)
cordata Desf. = virgata
cordata Guss. = cosyrensis
cordata L., All. 332 (8 π)
cordata Savi = psiloclada (α)
cordifolia Ten. = inarimensis
cosyrensis Guss. 330 (8 β)
cumana Ten. 332 (8 ο)
densiflora Guss. 329 (6 δ)
denticulata Bert. = Armeria denticulata
dichotoma Delicata = dictyoclada?
dichotoma Guss. (non Cav.) = Calcaræ
dichotoma Ten. = reticulata
dictyoclada Boiss. 332 (8 ν)
dictyophora Tausch = cancellata
dissitiflora Boiss. (*minuta*) 330 (8 α b)
Doriæ Somm. 163 (8 ε')
drepanensis Tin. 329 (5 β b)
dubia Andr. 331 (8 λ)
dubia Ten. = dictyoclada?
duriuscula Ces. P. et G. (non Gir.) = læta
echioides L. 328 (4)
elongata Hoffm. = Armeria elongata
fasciculata Vent. = Armeria fascic.
fastigiata Boiss. (*articul.*) 332 (8 ξ b)
ferulacea L. 328 (2)
furfuracea Rchb. (non Lag.) = cancellata
galioides Fiori (*acutifol.*) 331 (8 η b)
Girardiana Moris = humilis?
glabra Salis (leucantha) = Armeria — procera
glabrata Groves (cancellata) = dictyoclada
globulariæfolia DC., Boiss., Bert. p. p. (non Desf.) = confusa
globulariæfol. Sibth. = Sibthorpiana
Gmelini Koch (non W.) = serotina
Gougetiana Boiss. p. p., Ces. P. et G. (non Gir.) = Tenoreana
gracilis Boiss. (*psiloclada*) 330 (7 δ)
gracilis Tin. = dictyoclada
STATICE II 327 (690)
Gussoniana Steud. = Sibthorpiana
humilis Fiori (*oleæfol.*) 329 (6 ε)
humilis Guss. (densifl.) = prec.
inarimensis Guss. 331 (8 δ)
intermedia Guss. 330 (7 β)
japygica Groves (cancellata) = reticulata
læta Moris 329 (6 γ)
leucantha Pouz., Lois. = Armeria leucocephala
Limonium L. 329 (5)
macroclada Boiss. (Limon.) = serotina
major Guss. (*virgata*) 331 (8 θ c)
Meyeri Ces. P. et G. (non Boiss.) = confertiflora
minuta Auct. it. p. p. = reticulata
minuta L. 330 (8), A 163
minuta Ten. p. p. = Tenoreana
minuta Tomm. = suberecta
minutiflora Boiss. p. p. = inarimensis
minutiflora Guss. 331 (8 ζ)
monopetala L. 328 (1)
montana Mill. = Armeria alpina
montana Soleir. = Armeria multiceps
mucronata Avè-Lall. (*echioides*) 328 (4 b)
nebrodensis Guss. = Armeria nebrod.
obtusifolia Fiori (*humilis*) 329 (6 ε b)
obtusifolia Guss. (densifl.) = prec.
oleæfolia Bert. p. p. = minuta (α)
oleæfolia Scop. 329 (6)
oleæfolia S. et S., Bert. p. p. = virgata
oxylepis Boiss. = densiflora
panormitana Tod. 330 (7 γ)
parvifolia Tin. = dictyoclada
pauciflora Moris (dictyocl.) = pygmæa
plantaginea All. = Armeria plant.
plantaginea Guss. = Armeria Gussonei
psiloclada Boiss. 329 (7)
psiloclada Parl. in Caruel = Sommieriana?
pubescens DC. = cordata
pubescens Koch = cancellata
pubescens Salis = Armeria leucocephala
pumila Boiss. (*virgata*) 331 (8 θ b)
pungens Brot. = Armeria pung.
pusilla Salzm. (Armeria) = Armeria leucocephala (α)
pygmæa Tin. 332 (8 ν c)
remotispicula Lacaita 331 (8 ι)
reticulata Bert. = tenuicula
reticulata Rchb. (*an L.?*) 331 (8 κ)
rupicola Bad. = acutifolia
Scopoliana Bert. = densiflora
STATICE II 327 (690)
serotina Rchb. 329 (5 β)
Sibthorpiana Guss. 329 (6 β)
Sibthorpiana Steud. = gracilis
sicula Tin. hb. = minutiflora
sinuata L. 328 (3)
Smithii Ten. = virgata
Sommieriana Fiori (*minuta*) 331 (8 γ), A 163
Sommieriana Somm. = prec.
spathulata Guss. (non Desf.) = minutiflora
speciosa All. 328 (nota)
suberecta Freyn (*cancell.*) 332 (8 ρ b)
Tenoreana Guss. 331 (8 ε)
tenuicula Tin. 330 (8 β b)
tenuifolia Bert. = acutifolia
Tinei Woods = dictyoclada
undulata Bor. et Chaub. = Armeria und.
virgata W. 331 (8 θ)
STAUROGETON = Lemna
trisulcus Schur = L. trisulca
STEGIA = Lavatera
Lavatera DC. = L. trimestris
trimestris Risso = L. trim.
STEINMANNIA = Rumex
aurea Opiz = R. maritimus
flavo-virens Opiz = R. limosus
STEINREITERA = Thesium
secunda Opiz = Th. alpinum
STELLA = Astragalus
sesamea Medic. = A. sesam.
STELLARIA I 348 (333)
alpicola G. Beck (uligin.) = alpina
alpina S. F. Gray = Cerast. alpinum
alpina Gürke (*uliginosa*) A 71 (4 b)
Alsine Afzel. et Wadsb. = media
Alsine Reich. = uliginosa
alsinoides Schleich. = intermedia
angustifolia Hom. = palustris
anomala Rchb. = Cerast. anom.
apetala Bor. = pallida
apetala Gaud. (media) = seg.
apetala Ucria 348 (2 δ)
apula Palanza (*media*) A 71 (2 γ for.)
aquatica Pollich = uliginosa
aquatica Scop. = Malachium aquaticum
arvensis S. F. Gray = Cerast. arvense
arvensis Hoffm. = graminea
arvensis Scop. = Spergula arv.
australis Rouy ex Wk. (media) = apetala
biflora Host = Mœhringia ciliata
biflora L. = Alsine bifl., cfr. corr. I p. 610
Boræana Jord. 348 (2 δ b) = pallida, cfr. A 71
brachypetala Bor. A 71 (2 α for.)
brachypetala Jessen = Cerast. brach.
bracteata Fenzl in Ledeb. (*nemor.*) 348 (1 b)

Digitized by Google

STELLARIA I 348 (333)
breviflora Gilib. = uliginosa
bulbosa Wulf. 349 (8)
cæspitosa Hook. f. = palustris
cæspitosa Vest. = holostea
carinthiaca Jessen = Cerast. carinth.
cerastioides L. = Cerast. trigynum
cerastioides Sm. = Cerast. tetrandrum
Cerastium Murr. = nemorum
ciliata Gilib. = holostea
ciliata Jessen = Arenaria cil.
ciliata Scop. = Mœhringia cil.
connata Dulac = holostea
cordata Gilib. = nemorum
cucubaloides Pau = media
Cupaniana Nym. 348 (2 γ) = grandiflora, cfr. A 71
decandra Fenzl (media) = neglecta
decandra Schur = prec.
dichotoma Georgi = media
dichotoma Scop. (non L.) = bulbosa
Dilleniana Leers = uliginosa
dubia Bast. = Cerast. anomalum
elegans Ser. = Cerast. trigynum
Elisabethæ F. Schultz = neglecta
Frieseana Ser. 349 (5), A 71
glabella Nym. A 71 (2 ε for.)
glaberrima Aznav. (apetala) = glabella
glaberrima G. Beck (media) = glabra
glabra Gürke (aquat.) = Malachium — glabrum
glabra Strobl (*media*) A 71 (2 α for.)
glacialis Lagg. 349 (4 b) = alpina, cfr. A 71
glandulosa Strobl (*media*) A 71 (2 α for.)
glandulosa Strobl (*neglecta*) A 71 (2 β for.)
glareosa Turcz. = Cerast. trigynum
glauca Witth. = palustris
glochidisperma Freyn = seg.
glochidisperma Murb. (*nemor.*) A 71 (1 c)
glomerata Jessen = Cerast. glom.
graminea L. 349 (6), A 71
gramin. β L. = palustris
graminifolia S. G. Gmel. = holostea
graminifolia Lepech. = graminea
grandiflora Gilib. = graminea
grandiflora Guss. (*media*) A 71 (2 γ)
grandiflora Jessen = Arenaria grandiflora
hirsutiuscula Strobl (*media*) A 71 (2 α for.)
hispidula Goir. (*gramin.*) A 71 (6 c)
holostea L. 349 (8)
humilis Arc. (media) = seg.
humilis Sarato = pygmæa
hydrophila Kitt. (media) = neglecta
hypericifolia Weber, All. = uliginosa
intermedia Gürke (*pallida*) A 71 (2 ε for.)
intermedia Rouy et Fouc. (apetala) = prec.
lanceolata Fenzl (gramin.) = latifolia
laricifolia Scop. = Alsine lar.
lateriflora Krock. = uliginosa
latifolia DC. = neglecta
latifolia S. F. Gray = Cerast. latifolium
latifolia Pers. = nemorum
latifolia Peterm. (*gramin.*) A 71 (6 b)
litigiosa Magn. = palustris
longifolia Fr. (non Muehlenb.) = Frieseana
longifolia Turcz. = graminea
major Koch (media) = neglecta
major Rouy et Fouc. (apetala) = apetala
mantica DC. = Cerast. mant.
media Cyr. 348 (1), A 71
minor Rouy et Fouc. (apetala) = pallida
monogyna D. Don = media
montana Pierrat A 71 (1 e)
mosquensis M. B. = Frieseana
multicaulis W. = Cerast. trigynum
muscosa Jessen = Mœhringia muscosa
neglecta Weihe 348 (2 β), A 71
nemoralis Salisb. = nemorum
nemorum L. 348 (1), A 71
nodosa Scop. = Sagina nod.
oligandra Fenzl (media) = media (α)
Pallasiana Less. = Malachium aquat.
pallida Piré A 71 (2 ε)
palustris Ehrh., Retz. 349 (7), A 71
paniculata Pall. = graminea
pedicellata Rouy et Fouc. (*media*) A 71 (2 α for.)
pentagyna Gaud. = Malachium aquat.
pentandra Scop. = Spergula pent.
persica Boiss. = palustris
pilosa Dulac = media
polygonoides Jessen = Mœhringia polyg.
procera Klett (media) = neglecta
pumila Brocchi = Cerast. Thomasii
pumila S. F. Gray = Cerast. pumilum
pygmæa O. Ktze. (*media*) A 71 (2 α for.)
radicans Lap. = Cerast. trigynum
repens Scop. = Cerast. rep.
rubra Scop. = Alsine fasciculata?
rupestris Scop. = Alsine lanceolata?, cfr. A 70
sabulosa Fisch. = Cerast. anomalum
saxicola Beauverd (*nemor.*) A 71 (1 d)
saxifraga Bert. = Arenaria Bertolonii
scandens Gürke (aquat.) = Malachium — scand.
scapigera W. = graminea
semidecandra Lk. = Cerast. semidecandrum
serpyllifolia Scop. = Arenaria serp.
silvatica Jessen = Cerast. silv.
stricta C. Koch = palustris
subulata Bœber = graminea
tenella Colla = uliginosa
tenuifolia Friv. (glauca) = Cerast. manticum
tetrandra S. F. Gray = Cerast. tetrandrum
tomentosa Lk. = Cerast. tom.
triandra De Bray = Holosteum umbellatum
trivialis Lk. = Cerast. triv.
uliginosa Murr. 349 (4), A 71
umbrosa Opiz et Rupr. 348 (2 β b)
undulata Bréb. (*media*) A 71 (2 α for.)
undulata Thunb. 349 (4 c)
viscida M. B. = Cerast. anomalum
vulgata Lk. = Cerast. glomeratum
STELLARIA = Callitriche
autumnalis Weber = C. bifida
intermedia Weber = C. verna
verna Weber = C. verna
STELLARIS = Ornithogalum
bifolia Mœnch = Scilla bif.
corymbosa Mœnch = O. umbell.
erecta Mœnch = O. narbonense
minima Mœnch = Gagea arvens.
Scilla Mœnch = Urginea marit.
STELLERA = Thymelæa
annua Salisb. = Th. Passerina
Passerina L. = Th. Passer.
pubescens Guss. = Th. pubesc.
STELLINA = Callitriche
hamulata Bubani = C. ham.
STENACTIS = Erigeron
alpina Cass. = E. alp.
annua Nees = E. annuus
bellidiflora A. Br. = prec.
dubia Cass. = prec.
strigosa DC. = prec.
STENOPHRAGMA = Arabis
Burnatii Briq. (Thalian.) = A. — Burnatii
bursifolium Prantl = Barbarea dentata
pinnatifidum Prantl = Sisymbr. dentatum
Thalianum Celak. = A. Thaliana
STENOTAPHRUM A 13
americanum Schrank A 13 (β)
dimidiatum Brongn. A 13
glabrum Trin. = americ.

Digitized by Google

STEPHANOCARPUS = Cistus
monspeliensis Spach = C. monspel.
STERNBERGIA I 213 (214)
ætnensis Guss. A 50 (1 β)
citrina Ker-Gawl. = sicula
Clusiana Ker-Gawl. = colchiciflora
colchiciflora Auct. it. = ætnensis
colchiciflora W. et K. 213 (2), A 50
exscapa Tin. = ætnensis
græca Rchb. (lutea) = sicula
lutea Ker-Gawl. 213 (1)
sicula Tin. 213 (1 β)
STIPA I 55 (61)
Aristella L. 55 (2)
barbata Desf. 56 (8)
Calamagrostis Whinb. 55 (1), A 14
calatajeronensis Tin. = barbata
capensis Nees = tortilis
capillata L. 55 (3)
Fontanesii Parl. = Lagascæ
gallica Celak. A 14 (7 β b)
gigantea Lag. 55 (4)
glabra Asch. et Græbn. (*Calam.*) A 14 (1 a)
Grafiana Stev. = pulcherrima
hirsuta Asch. et Græbn. (*Calam.*) A 14 (1 b)
hispanica Trin. et Rupr. = barbata
humilis Brot. = tortilis
hyalina Nees A 14
intricata Godr. = setigera
juncea Cav. = gigantea
juncea L. 55 (5), A 14
Lagascæ Guss. = gigantea
Lagascæ R. et S. 55 (4 oss.)
mediterranea Trin. et Rupr. (*pennata*) A 14 (7 β)
paleacea S. et S. = tortilis
pennata L. 56 (7), A 14
plumosa Pourr. = barbata
pulcherrima C. Koch A 14 (7 β a)
seminuda Horn. = tortilis
setigera Presl A 24
tenacissima Ucria (non L.) = tortilis
tenella Godr. = Nassella trichotoma
tortilis Desf. 56 (6)
trichotoma Nees = Nassella trich.
vulgaris Gueld. = pennata
STIPULARIA = Spergularia
marina Haw. = S. mar.
media Haw. = S. media
pentandra Edgew. = Spergula pent.
rubra Haw. = S. rubra
STŒCHAS = Lavandula
dentata Mill. = L. dent.
officinarum Mill. = L. Stœchas
STRAMONIUM = Datura
ferox Nic. = D. ferox
fœtidum Scop., All. = D. Stramonium
leve Mœnch = D. inermis
Metel Mœnch = D. Metel
STRAMONIUM = Datura
spinosum Lam. = D. Stramon.
Tatula Mœnch = D. Tatula
vulgare Mœnch = D. Stramon.
vulgatum Gærtn. = prec.
STRATEUMA = Orchis
grandis Salisb. = O. purpurea
militaris Salisb. = O. milit.
STRATIOTES I 159 (166)
aculeatus Stokes = aloides
aloides L. 159
aquaticus Pall. = prec.
ensiformis Gilib = prec.
STREBLIDIA = Schœnus
ferruginea Lk. = S. ferrug.
STRECKERA = Leontodon
tuberosa Fourr. = L. tuber.
STREPTACHNE = Stipa
Calamagrostis Dum. = S. Calamagr.
STREPTOPUS I 207 (206)
amplexicaulis Poir., Baker = seg.
amplexifolius DC. 207
distortus Mchx. = prec.
STROPHIUM = Mœhringia
filiforme Dulac. = M. muscosa
trinervium Dulac = M. trin.
STRUTHIOPTERIS I 14 (14)
Filicastrum All. = seg.
germanica W. 14 (1), A 7
pensylvanica W. = prec.
serrata Fiori (*germ.*) A 7 (b)
STURMIA = Liparis
Lœselii Rchb. = L. Lœselii
STURMIA = Mibora
minima Hpe. = M. minima
verna Pers. = prec.
STYRANDRA = Majanthemum
bifolia Raf. = M. bifol.
STYRAX II 306 (673)
cotinifolium Salisb. = seg.
officinale L. 306
officinarum Crantz = prec.
SUÆDA I 319 (302)
æstuaria Dum. = maritima
albida Pall. = Kochia hirsuta
baccifórmis Dum. = maritima
Balansæ Boiss. = splendens
chenopodioides Pall. = maritima?
crassifolia Pall. = Kochia hirsuta
erecta Moq. (marit.) = Jacquini
filiformis Dum. = maritima
flexilis Focke (marit.) = Jacquini
fruticosa Forsk. 319 (1), A 66
gracilis Moq. = splendens
hirsuta Rchb. = Kochia hirs.
hyssopifolia Pall. = Kochia hyssopifolia
Jacquini Dum., Nym. A 66 (2 β)
Kochii Tod. exs. = Jacquini
laxifolia Lowe = fruticosa
maritima Dum. 319 (2), A 66
Pallasiana Heynh. = Kochia hirsuta
procumbens Syme (marit.) = marit. (α)
prostrata Focke (marit.) = marit. (α)
SUÆDA I 319 (302)
pruinosa Lge. = fruticosa
setifera Webb, Wk. et Lge. = Halogeton sativa
setigera Moq. = splendens
Sieversiana Pall. = Kochia scoparia
splendens Gr. et Godr. 319 (3), A 66
vulgaris Moq. (marit.) = marit. (α)
SUCCISA III 145 (334)
alpina Mœnch = Cephalaria alp.
arvensis Raf. = Knautia arv.
atropurpurea Mœnch = seg.
australis Rchb. 146 (2)
bipinnata Mœnch = Scabiosa gramuntia
Columbaria Mœnch = Scab. Columb.
dentata Hausm. (prat.) = hirsuta
dichotoma Raf. = Scab. dich.
diversifolia Spr. = Knaut. — glandulosa
flore-albo Goir. (*pratens.*) A 177 (1 e)
glabrata Sweet 145 (1 c)
graminifolia Mœnch = Scab. gram.
hirsuta Rchb. (*prat.*) 145 (1 b)
joppica Spr. = Cephal. jopp.
lanciforia Mœnch = Cephal. syriaca
leucantha Mœnch = Cephal. leuc.
macrocalycina Mœnch = Scab. argentea
palustris Sass = pratensis
pentaphylla Mœnch = Cephal. transsylvan.
pinnatifida Hausm. (*prat.*) 145 (1 d)
præmorsa Asch. = pratensis
pratensis Mœnch 145 (1), A 177
rosiflora Evers (graminifol.) = Scab. — rosiflora
stellata Mœnch = Scab. stell.
syriaca Spr. = Cephal. syr.
transylvanica Spr. = Cephal. trans.
vulgaris J. et C. Presl = pratensis
SUCCORVIA I 441 (372)
balearica Medic. 441
echinata Mœnch = prec.
SUCCUTA = Cuscuta
alba Desmoul. = C. alba
SUFFRENIA = Rotala
capensis Harv. = seg.
filiformis Bell. = R. filif.
SULLA = Hedysarum
amœna Medic. = seg.
coronaria Medic. = H. coron.
SVIDA = Cornus
sanguinea Opiz = C. sang.
SWERTIA II 348 (706)
carinthiaca Wulf. = Pleurogyne carinth.
lutea Vest = Gentiana lut.
perennis L. 348, A 164

Digitized by Google

SWERTIA = Tolpis
barbata All. = T. barbata
SYMETHUS = Convolvulus
siculus Raf. = C. sic.
SYMPHYTUM II 377 (726)
angustifolium Opiz (offic.) = uliginos.
asperrimum Ten. = quid?
australe Strobl (tuberos.) = Gussonei
bohemicum F. W. Schmidt 377 (1 α b)
brochum Bory et Chaub. = Zeyheri
bulbosum Schimp. 378 (2 δ)
Clusii C. C. Gmel. = bulbosum
Consolida Gueld. = officinale
elatum Tausch = officinale
filipendulum Bisch. = bulbosum
floribundum Shuttlew. = mediterr.
Gussonei F. Schultz 378 (2 β)
macrolepis J. Gay = bulbos.
mediterraneum Guss. = Gussonei
mediterraneum Koch 378 (2 γ)
miniatum Flori (tuberos.) 378 (2 α b)
officinale L. 377 (1)
patens Sibth. 377 (1 β)
punctatum Gaud. = bulbos.
purpureum Pers. (offic.) = patens
stenophyllum Celak. (offic.) = uliginos.
tuberosum L. 378 (2), A 167
uliginosum Kern. 377 (1 α c)
Zeyheri Schimp. 378 (2 ε)
SYNTHERISMA = Digitaria
ciliare Schrad. = D. ciliaris
glabrum Schrad. = D. filiformis
præcox Walt. = D. sanguinalis
sanguinale Dulac = prec.
vulgare Schrad. = prec.
SYRINGA II 389 (696)
alba Dietr. (vulg.) 389 (c)
albiflora Opiz = prec.
cordifolia Stokes = vulgaris
latifolia Salisb. = vulgaris
purpurea DC. (vulg.) 389 (b)
violacea Dietr. (vulg.) 389 (a)
vulgaris L. 840
SYSPONE = Genista
sagittalis Griseb. = G. sagitt.

TABACUM = Nicotiana
latissimum Bercht. et Opiz = N. latiss.
Nicotianum Bercht. et Opiz = N. Tabacum
ovatofolium Gilib. = prec.
TAGETES
erectus L. 303 (nota)
patulus L. 303 (nota)
TAMARISCUS = Tamarix
decander Lam. = Myricaria germ.
gallicus All. = T. gall. et africana
germanicus Scop. = Myricaria germ.
pentander Lam. = T. gallica
TAMARIX I 382 (348)
africana Poir. 382 (2)
canariensis W. = gallica
cylindrica Strobl (gall.) A 80 (1 a)
gallica Bad. in Moretti = africana
gallica L. 382 (1), A 80
germanica L. = Myricaria germ.
italica Avé-Lall. (davurica) = Myricaria squamosa
ligustica DNtrs. (africana) = africana
ovalis Strobl (gall.) A 80 (1 b)
parviflora DC. 382 (nota)
senegalensis DC. = gallica
TAMUS I 211 (211)
asarifolia Goir. (comm.) A 50 (b)
communis L. 211, A 50
cretica L. 211, A 50 (d)
hastifolia Goir. (comm.) A 50 (c)
subtriloba Guss. (comm.) = cretica
triloba Simonk. (comm.) = prec.
TANACETUM = Chrysanthemum
Achilleæ Sch. Bip. = Ch. Ach.
ætnicum Heldr. (vulg.) = Ch. — siculum
alpinum Sch. Bip. = Ch. alpin.
angulatum Lam. = Achillea filipendulina
annuum L. = Ch. ann.
atratum Sch. Bip. = Ch. coronopifol.
Audiberti DC. = Ch. Audib.
Balsamita L. = Ch. — tanacetoides
balsamitoides Sch. Bip. = Ch. Balsamita (α)
ceratophylloides Sch. Bip. = Ch. cerat.
chrysanthemoides Gærtn. = Ch. floscules.
cinerariæfolium Sch. Bip. = Ch. ciner.
corymbosum Sch. Bip. = Ch. corymb.
crispum Pers. (vulg.) = Ch. — crispum
crispum Steud. = prec.
discoideum Rchb. f. = Ch. disc.
elatum Salisb. = Ch. vulgare
Leucanthemum Sch. Bip. = Ch. Leuc.
macrophyllum Sch. Bip. = Ch. macroph.
maximum Rchb. f. (Leuc.) = Ch. — baldense
minimum Rchb. f. (alpin) = Ch. minim.
minimum Sch. Bip. = prec.
monocephalum Rchb. f. (corymb.) = Ch. — monoc.
montanum Sch. Bip. = Ch. mont.
Myconis Schenk = Ch. Myconis
officinale Gueld. = Ch. vulgare
officinarum Crantz = prec.
ovatifolium Stokes = Ch. Balsamita
TANACETUM = Chrysanthemum
pallens Sch. Bip. = Ch. pallens Gay
Parthenium Sch. Bip. = Ch. Parthenium
siculum Guss. (vulg.) = Ch. — siculum
siculum Strobl = prec.
simplicifolium Salisb. = Ch. Balsamita
suaveolens Hook. = Matricaria suav.
tenerius Presl (vulg.) = Ch. — siculum
tridactylites Kern. et Huter = Ch. — tridact.
umbellatum Gilib. = Ch. vulg.
virgatum Lois. = Ch. flosculos.
vulgare L. = Ch. vulg.
TAPHROGITON = Scirpus
radicans Montand. = S. rad.
silvaticum Montand. = S. silv.
TARAXACUM III 413 (943)
alpinum Guss. = apennin.
alpinum C. Koch 414 (β)
apenninum DC. 414 (δ)
arcuatum DC. (levig.) = levigat, minimum
autumnale Cast. = minim.
autumnale Gueld. = Leontod. autumnale
bulbosum Rchb. = Crepis bulb.
Caramanicæ Lojac. A 192
commune Dum.-Cours. = offic.
corniculatum DC. 414 (γ c)
corniculatum Strobl = Gasparrinii
Dens-leonis Desf. = officinale
dissectum Tausch (offic.) 414 (α b)
erectum Schrank = paludosum
erythrospermum Andrz. 414 (γ d)
Gasparrinii Tin. A 193
glaciale Huet = obovatum
glaucanthum DC. = cornicul.
glaucescens Rchb. = cornicul.
gymnanthum DC. = minimum
hibernum Stev. = prec.
intermedium DC. (palustre) = palud. (α)
lanceolatum Poir. 415 (ε c)
Leontodon Gueld., Dum. = officinale
levigatum DC. 414 (γ)
lividum Koch (offic.) = paludosum
minimum N. Terr. 415 (θ), A 192
nigricans Rchb. = alpinum
obovatum DC. 414 (γ b)
officinale Weber 414, A 192
officinarum Rupr. = prec.
Pacheri Sch. Bip. 415 (η)
paludosum Kern. 415 (ε)
palustre DC. = prec.
perincisum Rigo hb. ex Goir. (offic.) = dissectum
pygmæum Ugolini (palud.) 415 (ε d)
Raii S. F. Gray = paludosum
salinum Dum. 414 (ε a)
Scorzonera Rchb. = paludosum

Digitized by Google

TARAXACUM III 418 (943)
stipitatum Sch. Bip. = Willemetia stipit.
Sturmii G. Beck (*palud.*) 415 (ε b)
taraxacoides Koch (offic.) = levigat.
taraxacoides Wk. = prec.
tenuifolium Koch 415 (ζ), A 192
triviale Heg. = offic.
vulgare Schrank = offic.
TAXUS I 31 (36)
baccata L. 31
TECOMA II 487 (775)
radicans Juss. 487
TEESDALEA I 470 (409)
Iberis DC. 470 (β)
irregularis S. F. Gray = nudicaul.
Lepidium DC. = regularis
nudicaulis R. Br. 470, A 101
nudicaulis R. Br. (sens. stricto) = Iberis
petræa Rchb. = Hutchinsia petr.
regularis Sm. 470 (α)
TELEKIA = Buphthalmum
cordifolia DC. = seg.
ovata C. Koch = seg.
speciosa Baumg. = B. specios.
speciosissima DC., Less. = B. speciosiss.
TELEPHIUM I 330 (316)
alternifolium Mœnch = Imperati
Imperati L. 330
repens Lam. = Imperati
TELEPHIUM = Sedum
maximum Eichw. = S. max.
purpureum Eichw. = S. purpureum
triphyllum Eichw. = S. Telephium
TELINARIA = Genista
anglica Presl = G. angl.
aprutia Presl = G. Michelii ?
aspalathoides Presl = G. aspal.
candicans Presl = Cytisus monspessul.
cinerea Presl = G. ciner.
hispanica Presl = G. hisp.
holopetala Presl = G. holop.
linifolia Presl = Cytisus linif.
Lobelii Presl = G. Lobel.
pilosa Presl = G. pil.
radiata Presl = G. rad.
sagittalis Presl = G. sag.
Salzmanni Presl = G. Salz.
sericea Presl = G. ser.
triquetra Presl = G. triq.
TELINE = Cytisus
candicans Medic. = C. monspessulanus
linifolia Webb et Berth. = C. linifolius
monspessulana C. Koch = C. monsp.
TELMATOPHACE = Lemna
arrhiza Schur = L. gibba
gibba Schleid. = prec.
orbicularis Schur = L. polyrrhiza
polyrrhiza Godr. = prec.
TELOXYS = Chenopodium
aristata Moq. = C. arist.
TENAGEJA = Juncus
bufonia Fourr. = J. bufon.
bulbosa Fourr. = J. supinus
Gerardi Fourr. = J. Ger.
multiflora Fourr. = J. subulatus
ranaria Fourr. = J. ranar.
squarrosa Fourr. = J. squarr.
Vaillantii Rchb. = J. Tenageja
TENDANA = Satureja
Piperella Rchb. = S. Piper.
TENORIA = Bupleurum
baldensis Spr. = B. ranunculoides
fruticescens Spr. = B. fruticescens
fruticosa Spr. = B. fruticos.
romana Schk. = Fœniculum vulg.
spinosa Spr. = B. spinos.
TEREBINTHUS = Pistacia
Lentiscus Mœnch = P. Lent.
vulgaris Fourr. = prec.
TEREJANTHES = Reseda
alba Raf. = R. alba
fruticosa Raf. = R. alba
undata Raf. = R. alba
TEROGIA = Ortegia
dichotoma Raf. = O. hispanica
TERTRIA = Chamæbuxus
Chamæbuxus Schrank = Ch. alpestris
TESSENIA = Erigeron
muralis Bubani = E. acer
TETRACELLION = Nasturtium
ellipsoideum Turcz. = N. palustre
globosum Turcz. = N. austriacum
TETRAGONIA I 325 (309)
cornuta Gærtn. = seg.
expansa Murr. 325
quadricornis Stokes = prec.
TETRAGONOLOBUS = Lotus
biflorus Ser. = L. biflor.
coniugatus Boiss. = L. Requienii
coniugatus Lk. = L. coniug.
edulis Lk. = L. Tetragonolobus
maritimus Roth = L. mar.
prostratus Mœnch = L. siliquosus
purpureus Mœnch = L. Tetragonolobus
Requienii F. et M. = L. Req.
Scandalida Scop. = L. siliquosus
siliquosus Roth = L. siliq.
TETRAHIT = Galeopsis
grandiflorum Gilib. = G. Tetrahit
Ladanum Mœnch = G. Lad.
longiflorum Mœnch = G. dubia
nodosum Mœnch = G. Tetrahit
præcox Fourr. = G. præcox
purpurascens Gilib. = G. Tetrahit
Reichenbachii Fourr. = G. Reich.
sulfureum Fourr. = G. sulf.
TETRAHITUM = Stachys
hirtum Hoffgg. et Lk. = S. hirta
TEUCRIUM III 9 (777)
albiflorum Nic. (*siculum*) 10 (3 b)
album Poir. = Polium
alpinum L. = Botrys
angustifolium Benth. (*Polium*) 13 (15 α d)
angustifol. Pirona (montan.) = supinum
angustifol. Salisb. = fruticans
angustifol. Steud. = Polium
angustissimum Schreb. = capitatum
Arduini L. 9 (1)
arvense Salisb. = Ajuga Chamæpitys
aureum Schreb. = luteum
Belion Schreb. = Polium
Botrys L. 11 (9)
campanulatum L. 11 (8)
canum Fisch. et Mey. 12 (13 c)
capitatum Auct. pl. = intermedium
capitatum Fouc. et Mand. (*Marum*) 12 (11 b)
capitatum L. 13 (15 β)
Chamædrys L. 12 (13)
Chamæpitys L. = Ajuga Cham.
cœleste Schreb. = Polium
crenatifolium Guss. (Scorod.) = siculum
creticum L. 11 (7)
densiflorum Vis. = Arduini
diversiflorum Mœnch = campanulat.
euganeum Vis. 10 (3 c)
flavescens Schreb. = Polium
flavicans Lam. = luteum
flavum L. 12 (12), A 172
fruticans L. 10 (6)
fruticans γ Schreb. = latifolium
garganicum Fisch. ex Steud. = quid ?
Gasparrinii Nym. = siculum (for.)
genevense Crantz = Ajuga genevensis
glaucum Bég. = seg.
glaucum Fouc. et Sim. (*flavum*) 12 (12 b)
Gussonii Nym. = capitatum (for.)
hirsutum Celak (*Chamædr.*) 12 (13 b)
hyssopifolium Schreb. = creticum
inarimense Guss. (Scorod.) = siculum
intermedium Celak (*Polium*) 13 (15 γ)
intermedium Guss. (*frutic.*) 10 (6 α b)
Iva L. = Ajuga Iva
lanuginosum Hoffgg. et Lk. 12 (10 β)
latifolium Bég. (*Polium*) 13 (15 α c)
latifolium L. 11 (6 β)
longifolium Rota (*montan.*) 14 (16 c)

Digitized by Google

TEUCRIUM III 9 (777)
lucidum L. 18 (14)
luteum Briq. (*Polium*) 18 (15 δ)
maritimum Lam. = Marum
Marum L. 12 (11)
Marum × *Polium?* 12 (11 b)
massiliense L. 9 (2)
montanum L. 14 (16)
moschatum Mill. = Ajuga Iva
myrtifolium Desf. = Marum
mucronatum L. = spinosum
ochroleucum Jord. = montanum
odoratum Lam. = massiliense
odorum Salisb. = Marum
officinale Lam. = Chamædrys
palustre Lam. = Scordium
Polium L. 18 (15)
Pseudo-hyssopus Schreb. = Polium
Pseudo-Scorodonia Ces. P. et G. (an Desf.?) = siculum
Pseudo-Scorod. Gasp. = Gasparrinii
pyramidale Crantz = Ajuga pyram.
reptans Salisb. = Ajuga rept.
revolutum Stokes = montan.
rosmarinifolium Lam. = creticum
rufescens Parl. (frutic.) = latifolium
salviæfolium Salisb. = Scorodonia
Scordium L. 11 (10), A 172
Scorodonia L. 10 (8)
siculum Guss. 10 (4)
silvestre Lam. = Scorodonia
spinosum L. 10 (5)
subspinosum Pourr. 12 (11 c)
supinum L. 14 (16 b)
Teuthrion Schreb. = Polium
tomentosum Lam., Vill. = luteum
tomentos. Mœnch = fruticans
valentinum Guss. = Gussonii
valentinum Schreb. = Polium
veronicæfolium Salisb. = Chamædrys
villosum Moris (Scordium) = scordioides
virescens Guss. (*Polium*) 18 (15 α d)
vulgare Benth. (*Polium*) 18 (15 α b)
TEUTLIOPSIS = Atriplex
hastata Celak. = A. hast.
oblongifolia Celak. = A. obl.
rosea Celak. = A. ros.
tatarica Celak. = A. tat.
THALICTRUM I 492 (424)
alpestre Gaud. 498 (4 α b)
alpestre Rikli (*aquilegifol.*) A 108 (1 e)
alpinum L. 498 (8)
angustifolium L. 498 (5), A 108
angustifol. Jacq. = mediterr.
angustifol. F. Schultz (Nestleri) = galioides
angustissimum Crantz = angustifol.
aquilegifolium L. 492 (1), A 108
aquilegifol. Ucria = calabricum
THALICTRUM I 492 (424)
atropurpureum Jacq. 492 (1 b)
Bauhini Crantz 498 (5 α)
brachycarpum Timb. A 108 (4 β for.)
calabricum Spr. 492 (2)
calabrum Ten. = prec.
collinum Wallr. A 108 (4 β for.)
elatum Jacq. 493 (4 γ)
exaltatum Gaud. 494 (5 γ), A 108
exstipellatum Beyer (Jaquin.) = Jaquinian.
flavum L. 494 (5 δ)
flexuosum Bernh., Rchb. A 108 (4 β for.)
fœtidum L. 498 (4), A 108
fulgidum Gren. = mediterran.
galioides Nestl. 493 (5 α b)
glabrum Koch (fœtid.) = alpestre
glabrum Rikli (*exaltatum*) A 108 (5 γ for.)
glandulosum Koch (minus) = seg.
glandulosum Lois. = pubescens
glaucum Auct. it. (non Desf.) = flavum
Grenieri Arv.-T. = odoratum
heterophyllum Lej. 494 (5 δ b)
Jacquinianum Koch 493 (4 β e)
Laggeri Jord. 498 (4 β b)
lucidum L. = mediterr., heterophyll.
lucidum Ten. = mediterran.
macrophyllum Goir. (*aquilegifol.*) A 108 (1 d)
majus Jacq. 496 (4 γ b)
majus Ten. = aquilegifol.
mediterraneum Jord. 494 (5 γ b)
medium Jacq. 494 (5 β b)
minus L. 493 (4 β), A 108
Nestleri F. Schultz p. p. = galioides
nigricans DC., Ten. = mediterr.
nigricans Jacq. = flavum
nutans Desf. = minus
odoratum Gr. et Godr. A 108 (4 β for.)
pauperculum Arc. (*flavum*) 494 (5 δ c)
polyspermum Arv.-T. = odoratum
pubescens Schleich. 498 (4 β d)
saxatile DC. = Laggeri
saxatile Vill. = fœtidum
silvaticum Koch 498 (4 β c)
simplex L. 494 (5 β)
speciosum Mill. = angustifol. (?)
styleideum L. f. = fœtidum
umbelliforme Costa (*aquilegifol.*) A 108 (1 c)
Verloti Arv.-T. = odoratum
THAPSANDRA = Celsia
cretica Griseb. = C. cretica
THAPSIA II 192 (582)
altissima Mill. 192 (nota)
apulia Mill. = seg.
Asclepium L. = Elæoselinum Asclep.
THAPSIA II 192 (582)
garganica L. 192 (1)
glaucescens Guss. (*gargan.*) 192 (1 c)
Laserpitii Spr. = Prangos ferulacea
maxima Mill. = villosa
meoides Guss. = Elæoselinum meoid.
messanensis Guss. (*gargan.*) 192 (1 b)
polygama Desf. 192 (2)
Sylphium Viv. = garganica
tenuifolia Lge. = Elæoselinum tenuifol.
villosa L. 192 (nota)
THAPSUS = Verbascum
THAUMURIA = Parietaria
cretica Gaudich. = P. cret.
THELAIA = Pirola
chlorantha Alef. = P. chlor.
rotundifolia Alef. = P. rot.
THELYGONUM I 324 (306)
alsinoideum Lam. = seg.
Cynocrambe L. 324
THELYSIA = Iris
alata Parl. = I. planifolia
grandiflora Salisb. = I. planifolia
THESIUM I 285 (274)
adulterinum Mont. = pratense
alpinum L. 285 (8), A 62, 210
altissimum Beyer (*alpinum*) A 62 (8 var.)
ambiguum Ten. = intermedium, cfr. A 210
asperulum Boiss. et Buhse = ramosum
bavarum Schrank = montanum
breviolle J. et C. Presl = pratense
comosum Roth = ebracteatum
decumbens Gmel. = pratense
divaricatum Jan 286 (4 α)
ebracteatum Hayne 286 (nota)
ebracteatum Pirona = divaricatum
elegans Roch = Comandra elegans
expansum Boiss. et Heldr. (divaricat.) = ramosum
fulvipes Griessel. A 62 (4 γ b)
garganicum Kern. in sched. = divaricatum
græcum Zucc. 285 (2 b)
humifusum DC. 286 (4 α b)
humile Caruel = leve, cfr. A 210
humile Vahl 285 (2), A 62
intermedium Caruel p. p. = leve
intermedium Guss., Ten. = Parnassi, cfr. A 210
intermedium Moris = italicum
intermedium Schrad. 286 (4 γ), A 62, 210
italicum A. DC., Moris A 62, 210 (4 γ c)
italicum A. DC. p. p. = leve, Parnassi
leve Somm. (*ramosum*) A 210 (4 β' b)
linearifolium Gilib. = intermedium

Digitized by Google

THESIUM I 285 (274)
linifolium Schrank = intermedium
linophyllum DC. = pratense
linophyllum L. 286 (4), A 62, 210
linophyllum Moris = italicum
majus Neilr. (linophyll.) = montanum
minus Neilr. (linophyll.) = intermedium
montanum Ehrh. 286 (4 δ), A 62
Orsinii Narducci hb. = alpinum
palatinum Roth = ramosum
Parnassi A. DC. 286 (4 β), A 62, 210
pratense Ehrh. 286 (3 γ), A 62, 210
pumilum Guss. ex Arc. (*intermed.*) A 62 (4 γ d)
ramosum Griseb. = Parnassi
ramosum Hayne 286, A 210 (4 β')
refractum Kar. et Kir. = ramosum
rostratum M. et K. 285 (1)
serrulatum Ten. ex Arc. (*montan.*) A 62 (4 δ b)
subreticulatum A. DC. (humile) = græcum
tenuifolium Saut. 285 (3 β)
transsilvanicum Schur = intermedium
Weikerianum Opiz = alpinum
THLASPI I 470 (410)
africanum Burm. f. = Lepidium ruderale
alliaceum L. 471 (2)
alpestre C. C. Gmel. = perfoliatum
alpestre Jacq. = alpinum
alpestre L. 472 (5)
alpestre Moris = rivale
alpestre Vill. = virgatum
alpinum Bonj. (Burs.-past.) = Capsella — alpina
alpinum Crantz 472 (6 γ)
alpinum Gr. et Godr. = silvium
alpino × corymbosum A 101
amarum Crantz = Iberis amara
apenninus A. Terr. (præcox) = italicum
arvense L. 471 (1)
beugesiacum Jord. = montanum
brachypetalum Jord. = virgatum
brevistylum Jord. 472 (7 b)
brevistylum Mutel = Hutchinsia alpina
Bursa Thunb. = seg.
Bursa-pastoris L. = Capsella Burs.-past.
Bursetta Berg. = prec.
Camelina Crantz = Chamælina sativa
campestre L. = Lepid. camp.
cenisium Rouy et Fouc. (*rotundifol.*) 473 (8 c)
cepeæfolium Koch 473 (8 d)
THLASPI I 470 (410)
cepeæfol. Moritzi = corymbosum
collinum M. B. = arvense
commutatum Roch. = alpestre, mont., præcox
corsicum Soleir. = Lepid. nebrodense
corymbosum Gaud. (*rotundifol.*) 473 (8 b)
cuneatum Stokes = Capsella Burs.-past.
graminifolium Poir. = Lepid. gram.
grandiflorum Bory et Chaub. = Capsella grandifl.
heterophyllum Cav. = perfoliatum
heterophyll. DC. = Lepid. hirtum
hirsutum Lam. = Lepid. campestre, hirtum
hirtum L. = Lepid. hirt.
hirtum Schrank = Capsella — Schrankii
humifusum Lois. = Lepid. hum.
incanum Gilib. = Lepid. campestre
infestum Salisb. = Capsella Burs.-past.
italicum Chiov. (*montan.*) A 101 (6 β b)
Kerneri Huter 472 (6 γ b)
latifolium Opiz = arvense
Lereschianum Burn. (*rotundifol.*) 473 (8 f)
lutescens Gilib. = arvense
luteum Biv. = Bivonæa lutea
marginatum Lap. = Æthion. ovalifol.
minimum Ard. = alpinum
minus Moris (rivale) = brevistylum
montanum Huds. = alpestre
montanum L. 472 (6), A 101
montanum Poir. = Lepid. campestre
Mureti Gremli A 101
Nasturtium Berg. = Lepid. sativum
nudicaule Desf. = Teesdalea regularis
Pastorsæa Janka = Bivonæa albiflora
peregrinum L. = Æthion. saxat.
perfoliatum L. 471 (3), A 101
petræum Ces. P. et G. = Hutchins. petr.
pinnatum Beck. = Hutchins. petræa
pinnatum Noulet = Iberis pinn.
Pollichii Poir. = Lepid. graminifol.
polymorphum Gilib. = Capsella Burs.-past.
præcox Schleich. = alpestre
præcox Wulf. 472 (6 β), A 101
procumbens Lap. = Hutchins. proc.
Prolongi Boiss. = Bivonæa Prolongi
pubescens Guss. = Lepid. nebrodense
THLASPI I 470 (410)
pumilum Gaud. (alpestre) = Mureti
pygmæum Jord. = brevistylum
rivale Moris = brevistylum
rivale Presl 472 (7)
rotundifolium Gaud. 473 (8)
rotundifolium Tin. = Tinei
rubellum Bill. = Capsella rubella
ruderale All. = Lepid. rud.
sativum Crantz = Lepid. sat.
saxatile L. = Æthion. sax.
scapiflorum Viv. = Lepid. humifusum
scapigerum pr. err. = prec.
Schrankii J. F. Gmel. = Capsella — Schrankii
silvium Gaud. 472 (6 γ c)
stylosum Mutel = silvium
stylosum Nym. 473 (8 e)
tenuifolium Lam. = Lepid. ruderale
Tineanum Huet = Tinei
Tinei Nym. 471 (3 b)
umbellatum Crantz = Iberis umbell.
virens Jord. = Mureti ?
virgatum Gr. et Godr. 471 (4), A 101
virginianum Poir. = seg.
virginicum Cav. = Lepid. virg.
vulgatum Roucell = Lepid. campestre
THLASPIDEA = Thlaspi
arvensis Opiz = Th. arv.
THLASPIDIUM = Biscutella
hieracifolium Medic. = B. didyma
levigatum Medic. = B. levig.
saccatum Mœnch = B. auriculata
sativum Spach = Lepid. sat.
THLIPSOCARPUS = Hyoseris
bæticus Kunze = H. bætica
THORA = Ranunculus
venefica Fourr. = R. Thora
THRINCIA = Leontodon
glabra Schleich. = L. — glaber
glabra Ten. (nudicalyx) = prec.
grumosa Brot. = L. tuberosus
hirta Roth = L. hirtus
hispida DC., Rchb. = L. hirtus
hispida Roth = L. Rothii
isocarpa Bischoff (tuber.) = L. — isocarpus
lejolæna Bischoff (hirta) = L. — nudicalyx
Leysseri Wallr. = L. Leyss.
major Peterm. = L. — major
mauritanica Spr. p. p. = L. Rothii
Muelleri Nym. = L. Muell.
nudicalyx Lag. = L. — nudicalyx
Oliverii DC. (tuber.) = L. — Oliverii
psilocalyx DC. (hirta) = L. — nudicalyx
psilocalyx Lag. = L. Rothii
pygmæa Pers. = L. saxatil.
taraxacoides Gaud. = L. saxatil.
tuberosa DC. = L. tuberosus

Digitized by Google

THUYA I 29 (33)
articulata Vahl = Callitris quadrivalvis
orientalis L. 29
THYLACITIS = Gentiana
angustifolia Fourr. = G. angustifolia
Clusii Fourr. = G. Clusii
grandiflora Delarb. = G. acaulis
THYMBRA = Satureja
capitata Guss. = Thymus cap.
ciliata Ten. (non Desf.) = Thymus Serpyll.
hirsuta Pers. = S. Thymbra
THYMELÆA I 283 (272)
alpina All. = Daphne alp.
argentea Endl. = Tartonraira
arvensis Lam. = Passerina
Bauhini Endl. = Sanamunda
candida Scop. = Daphne alpina
Cneorum Rchb. = Sanamunda
Cneorum Scop., All. = Daphne Cneorum
dioica All. 284 (2)
Gnidium All. = Daphne Gnid.
Gussonii Bor. = pubescens
hirsuta Endl. 284 (4), A 61
Laureola Scop., All. = Daphne Laureola
Mezereum Scop., All. = Daphne Mezereum
Passerina Lge. 284 (1)
præcox Gilib. = Daphne Mezereum
pubescens Ces., P. et G. (*Passer.*) 283 (1 b)
pubescens Meisn. (arvens.) = prec.
Sanamunda All. 284 (nota)
spoliata Ces. (*Passer.*) 284 (1 c)
Tartonraira All. 284 (3)
Thomasii Endl. 284 (3 β)
tomentosa Endl. = Tartonraira
THYMUS III 64 (802)
acicularis W. et K. = striatus
acinoides Ten. = Satur. — suaveolens
Acinos L. = Satur. Acinos
Acinos Raf. = Satur. alp. (α a)
albinervis Strobl = conspersus
alpester Briq. (*subcitr.*) 67 (4 ε a subf.)
alpester Tausch (Chamædr.) = prec.
alpinus Guss. = Satur. — nebrodensis
alpinus Kern. = Trachselianus
alpinus L. = Satur. alpina
amyclæus Ten. (*vulg.*) 65 (3 b)
angustifolius Pers. 66 (4 α a)
angustifolius γ Vis. = dalmaticus
athonicus Bernh. = Satur. — athonica
austriacus Bernh. = lanuginosus
benacensis H. Braun. A 174 (4 for.)
Bernardensis Briq. (*lanug.*) 67 (4 η a subf.)
bracteosus Vis. A 174 (4 for.)
brevicalyx Strobl 65 (2 β b)
Calamintha Scop. = Satur. Calam.
THYMUS III 64 (802)
canescens Guss. (Nepeta) = Satur. Nep. b. canesc.
capitatus Hoffgg. et Lk. 65 (1)
capitatus Wk. et Lk. (*vulg.*) 65 (3 c)
carniolicus Borb. 67 (4 ζ b), A 174
Chamædrys Fr. p. p. = subcitratus
Chamædrys Koch (Serp.) = ovatus, subcitratus
citriodorus Lk. = istriacus
citriodorus Schreb. 66 (4 γ b)
collinus M. B. A 174 (4 for.)
communis Bég. (*Serpyll.*) 66 (4 α), A 174
communis Kit. = Serpyllum
concolor Opiz A 174 (4 for.)
conspersus Celak. 65 (2 β)
corsicus Moris = Mentha Requieni
corsicus Pers. = Satur. corsica
cristatus Hampe = Satur. cristata
dalmaticus Freyn 67 (4 δ a)
Danaënii Briq. (*Serpyll.*) A 174 (4 for.)
effusus Host (non Kitt.) = longicaulis
empetroides Wimm. et Grab. (*Serp.*) 66 (4 α a subf.)
euganeus Bég. = seg.
euganeus Bég. (*Serpyll.*) A 174 (4 α for.)
filiformis Ait. = Satur. filif.
Frœhlichianus Opiz A 174 (4 for.)
glandulosus Req. = Satur. gland.
gracilis Bert. = dalmaticus
grandiflorus Scop. = Satur. grandifl.
graveolens M. B. = Satur. graveol.
Hausmannii H. Braun A 174 (4 for.)
Herba-Barona Lois. 68 (4 θ)
hirsutissimus Poir. = Satureja Thymbra
hirtus Raf. (non W.) = conspersus
humifusus Bernh. = præcox
hybridus DNtrs. (vulg.) = amyclæus
inodorus Desf. = Satureja — inodora
intermedius Posp. (*longicaul.*) 67 (4 δ b)
istriacus H. Braun 67 (4 ε b)
istriacus Posp. (montan.) = prec.
lanuginosus Mill. 67 (4 η), A 174
ligusticus Briq. (*subcitr.*) 67 (4 ε a subf.)
linearifolius Wimm. et Grab. (*angustifol.*) 66 (4 α a subf.)
Linnæanus Gr. et Godr. (Serpyll.) = silvicolus
longicaulis Presl = dalmaticus
Marifolius W. = Satur. fruticosa
Marinosci Presl = conspersus
THYMUS III 64 (802)
Marinosci Ten. 65 (2 α c)
Marschallianus Viv. = Herba-Bar.
Marschallianus W. A 174 (4 for.)
micranthus Brot. = Satur. micrantha
micranthus Guss. (Nepeta) = Satur. Nep. f. micr.
microphyllus Urv. = Satur. microph.
montanus Benth. (Serpyll.) = seg.
montan. W. et K. = ovatus
Montinii Bég. = seg.
Montinii Bég. (*lanuginos.*) A 174 (4 η for.)
Moscatella Pollini = Satur. — Moscat.
neapolitanus Kern. (*striatus*) 65 (2 α b)
neapolitan. Strobl = prec.
Nepeta Sm. = Satur. Nepeta
nitidus Guss. 66 (4 β)
nummularius Celak. (Serp.) = præcox
œnipontanus H. Braun A 174 (4 for.)
Ortmannianus Opiz 68 (4 η a subf.)
ovatus Mill. 67 (4 γ)
pachydermus Briq. 67 (4 ε c subf.)
pallens Opiz = subcitratus
pallescens Ten. = Satur. graveolens
pannonicus All. 68 (4 η b)
pannonicus All. p. p. = lanuginosus
parviflorus Req. (non Schultz) = Mentha Requieni
parvifolius Opiz 67 (4 ε c)
patavinus Jacq. = Calamintha patav.
Petteri Presl = longicaulis
Piperella All. = Satur. Piperella
polytrichus Kern. (*Serp.*) 67 (4 ζ), A 174, 215
polytrichus Kern. in Borb. = prec.
polytrichus Treffer = Trachselianus
præcox Opiz 66 (4 α c)
prælongus Briq. (ovatus) = citriodorus
reptabundus Briq. (*Serpyll.*) A 174 (4 for.)
rotundifolius Guss. = Satur. — nebrodensis
Serpyllum L. 66 (4), A 174, 215
silvester Schreb. = ovatus
silvicolus Briq. (*Trachsel.*) 66 (4 α b subf.)
silvicolus Wimm. et Grab. (angustifol.) = prec.
spinulosus Ten. = neapolitanus?
striatus Vahl 65 (2)
suaveolens Sm. = Satur. — suaveolens
subcitratus Schreb. 67 (4 ε)

Digitized by Google

THYMUS III 64 (802)
ticinensis Briq. (*Serpyll.*) A 174 (4 for.)
Trachselianus Auct. al. = euganeus
Trachselianus Opiz 66 (4 α b)
Tragoriganum L. = Satureja Thymbra
vallesiacus Briq. (*lanug.*) 68 (4 η a subf.)
venetus Bég. = seg.
venetus Bég. (*polytrichus*) A 174 (4 ζ for.)
verticillatus Wk. et Lk. (*vulg.*) 65 (3 d)
villosus Pers. = Satur. Acinos d. vill.?
virescens Guss. (Zygis) = conspersus
virgatus Ten. = Satureja congesta
vulgaris L. 66 (3), A 174
Zygis L. hb. (non L. sp.) = striatus
THYRSINE = Cytinus
Hypocistis Walp. = C. Hypoc.
THYSSELINUM = Peucedanum
palustre Hoffm. = P. palustre
grandiflorum Mœnch = Pleurosperm. austriacum
Plinii Spr. = P. — Plinii
sylvestre Hoffm. = P. palustre
TILIA II 270 (647)
alba Ait. 272 (5)
alba W. et K. = tomentosa
americana Duroi = alba
americana L. 271 (4)
argentea DC. = tomentosa
borealis Wahl. (europ.) = cordata
canadensis Michx. = americ. (α)
corallina Ait. = platyphylla
cordata Mill. 271 (3), A 160
cordato × americana 271 (4 ε ζ)
europæa L. p. p., Sm. = vulgaris
europæa β L. = platyphylla
flavescens A. Br. 271 (4 ζ)
floribunda A. Br. 271 (4 ε)
floribunda Rchb. = vulgaris
glabra Vent. = americana (α)
grandifolia Ehrh. = platyphylla
heterophylla Vent. = alba
intermedia DC. = vulgaris
intermedia Host = platyphylla
intermedia Ten. = cordata
latifolia Salisb. = americana
laxiflora Heutze = pubescens
laxiflora Michx. 271 (4 γ)
microphylla Vent. = cordata
mollis Spach = platyphylla
neglecta Spach = laxiflora
nigra Borkh. = americ. (α)
parvifolia Ehrh. = cordata
pauciflora Hayne = platyphylla
petiolaris DC. 272 (6 b)
platyphylla M. B. = cordata
platyphylla Scop. 271 (1)
pubescens Ait. 271 (4 δ)
rotundifolia Vent. = tomentosa
silvestris Desf. = cordata
TILIA II 270 (647)
tomentosa Mœnch 272 (6)
triflora Schrad. = platyphylla
truncata Spach 271 (4 β)
ulmifolia Scop. = cordata
vulgaris Hayne 271 (2)
TILLÆA I 558 (455)
aquatica Lam., Maratti (non L.) = Bulliarda Vaillantii
erecta DC. = Sedum cæspitosum
hexandra Lapierre = Elatine hexandra
muscosa L. 558
rubra L. = Sedum cæspitosum
Vaillantii W. = Bulliarda Vaill.
TIMBALIA = Cotoneaster
Pyracantha Clos = C. Pyrac.
TINÆA = Lamarckia
elegans Garzia = L. aurea
TINEA = Orchis
cylindracea Biv. = seg.
intacta Boiss. = O. intacta
TINGUARRA = Athamantha
sicula B. et H. = A. sicula
TINIARIA = Polygonum
alata Montand. = P. dumetorum
carinata Montand. = P. Convolvulus
Convolvulus Webb et Moq. = P. Conv.
dumetorum Opiz = P. dum.
TISSA = Spergularia
campestris Pax = S. camp.
TITHYMALUS = Euphorbia
acicularis Dulac = E. Cypariss.
acutifolius Lam. = E. Pithyusa
aleppicus Kl. et Garcke = E. alepp.
amygdaloides Hill = E. amyg.
angustifolius Gilib. = E. Cypariss.
Apios Hill = E. Apios
arboreus Lam. = E. dendroides
auriculatus Lam. = E. Peplis
biglandulosus Haw. = E. bigl.
biumbellatus Kl. et Garcke = E. biumb.
Cajogalus Mœnch = E. Gerardiana
carniolicus Raf. = E. carn.
Chamæsyce Mœnch = E. Cham.
Characias Hill = E. Char.
cinerescens Mœnch = E. segetalis
coralloides Raf. = E. corall.
cuneifolius Kl. et Garcke = E. cun.
Cupani Kl. et Garcke = E. Cup.
Cyparissias Scop., Lam. = E. Cyp.
dendroides Hill = E. dendr.
denticulatus Mœnch = E. spinosa
diffusus Lam. = E. spinosa
dulcis Scop. = E. dulcis
epithymoides Kl. et Garcke = E. epith.
Esula Hill = E. Esula
exiguus Lam. = E. exigua
falcatus Kl. et Garcke = E. falc.
TITHYMALUS = Euphorbia
fragiferus Kl. et Garcke = E. frag.
fruticosus Gilib. = E. palustris
fruticosus Kl. et Garcke = E. Bivonæ
Gayi Kl. et Garcke = E. Gayi
Gerardianus Steud = E. Gerard.
helioscopius Hill, Scop. = E. helosc.
hirsutus Lam. = E. pilosa
hybernus Hill = E. hyb.
lætus Haw. = E. dendroides
Lagascæ Kl. et Garcke = E. Lag.
Lathyris Hill, Scop. = E. Lath.
linifolius Lam. = E. Esula
literatus Raf. = E. lit.
maculatus Mœnch = E. mac.
maritimus Lam. = E. Paralias
Myrsinites Hill = E. Myrs.
nicæensis Kl. et Garcke = E. nicæensis
nummularis Lam. = E. Chamæsyce
palustris Hill = E. pal.
Paralias Hill = E. Par.
Paralias Scop. = E. Gerardiana
Peplis Scop. = E. Peplis
peploides Kl. et Garcke = E. peploides
Peplus Gærtn. = E. Peplus
pilosus Hill = E. pil.
pineus Kl. et Garcke = E. pinea
Pithyusa Scop. = E. Pith.
platyphyllus Hill, Scop. = E. plat.
portlandicus Hill = E. portl.
procerus Kl. et Garcke = E. pilosa
pterococcus Kl. et Garcke = E. pterococca
purpureus Lam. = E. Characias
rotundifolius Lam. = E. Peplus
rupestris Lam. = E. Gerardiana
sagittalis Hill = E. segetalis
saxatilis Kl. et Garcke = E. saxatilis
segetalis Lam. = E. seg.
Seguieri Scop. = E. nicæensis
semiperfoliatus Kl. et Garke = E. semiperfol.
serratus Gilib. = E. helioscopia
serratus Hill = E. serr.
silvaticus Hill, Scop. = E. amygdaloides
spinosus Raf. = E. spin.
strictus Kl. et Garcke = E. striota
taurinensis Kl. et Garcke = E. taur.
terracinus Kl. et Garcke = E. Terrac.
variabilis Kl. et Garcke = E. var.
venetus Kl. et Garcke = E. Wulfenii
virgatus Kl. et Garcke = E. virg.
verrucosus Scop. = E. verr.

Digitized by Google

TOFIELDIA I 176 (178)
allemanica Bluff et Fing. = calyculata
alpina Hpe. et Stern. = palustris
alpina Sm. = calyculata
borealis Whlnb. = palustris
calyculata Whlnb. 176 (1), A 44, 206
capitata Hpe. (palustris) = seg.
capitata Rchb. (*calyc.*) A 206 (1 β)
collina Schult. A 44, 206 (1 α)
glacialis Gaud. 176, A 44, 206 (1 β b)
ossifraga Nem. = Narthecium ossifragum
palustris DC., W. = calyculata
palustris Huds. 176 (2)
pygmæa Ambrosi (calycul.) = glacialis
racemosa Hpe. et Hornsch. = collina
ramosa Hpe. (*calyc.*) 176 (1 α b)
sparsiflora Sonder (calyc.) = collina
spicæformis Ambrosi (calyc.) = collina
TOLPIS III 390 (933)
altissima Pers. = virgata
ambigua Req. = virgata
barbata Biv., Guss. = umbellata
barbata Gærtn. 390 (1)
biaristata Lk. = sexaristata
Bivonæ Jord. et Fourr. = umbellata
concolor Jord. et Fourr. = umbellata
cretica Sieb. = virgata
discolor Jord. et Fourr. = barbata (α)
grandiflora Guss. = Gussonei
grandiflora Ten. 391 (2 β)
Gussonei Fiori (*virgata*) 391 (2 α b)
prolifera Mœnch = barbata
quadriaristata Biv. 391 (2 β b)
quinqueradiata C. Koch = umbellata
sexaristata Biv. 391 (2 α c)
staticefolia Sch. Bip. = Hierac. staticefolium
umbellata Bert. 390 (1 β)
virgata Bert. 390 (2)
TOMMASINIA = Peucedanum
verticillaris Bert. = P. vertic.
TORDYLIUM II 184 (578)
Anthriscus L. = Torilis Anthr.
apulum L. 184 (6)
apulum Rchb. = microspermum
asperum Gilib. = Torilis Anthriscus
concinnum Ten. = apulum
grande Salisb. = maxim.
grandiflorum Mœnch = apulum
intermedium Pass. = maxim.
humile Ten., Biv. (non Desf.) = apulum
lanatum Boiss. 184 (nota)
latifolium L. = Turgenia lat.
magnum Brot. = seg.
maximum L. 184 (1)
microspermum Ten. 184 (2 b)
TORDYLIUM II 184 (578)
nodiflorum Salisb. = seg.
nodosum L. = Torilis nod.
officinale L. 184 (2)
officinale Rchb. = apulum
peregrinum L. = Krubera peregrina
siifolium Scop. = Heracleum siifolium
verecundum Salisb. = Torilis Anthriscus
TORILIS II 193 (584)
anthriscoides DC. (helvetica) = seg.
anthriscoides Paol. (*arvens.*) 194 (1 α c)
Anthriscus Bernh. 194 (2)
Anthriscus Gærtn. = Anthrisc. vulgar.
arvensis Lk. 194 (1), A 153
bracteosa Bianca 194 (4 c)
chlorocarpa Spr. = neglecta
cretensis Clairv. = Athamanta cret.
divaricata Mœnch = arvensis
helvetica C. C. Gmel. = prec.
heterophylla Guss. 194 (1 β b), A 153
infesta Roth, Spr. = arvensis
lanuginosa Clairv. = Anthrisc. vulgar.
leptophylla Rchb. f. 194 (8)
longistyla Rchb. f. (infesta) = neglecta
macrocarpa Gærtn. = Physocaulis nodosus
neglecta Schult. 194 (1 α b)
nodosa Gærtn. 194 (4)
peduncularis Paol. (*nodosa*) 194 (4 b)
pedunculata Rouy et Cam. (nodosa) = prec.
purpurea Guss. 194 (1 β), A 153
radiata Mœnch = arvensis?
rubella Mœnch = Anthriscus
scandicina Adans. = Anthriscus vulgar.
stricta Wibel = Anthriscus
syriaca Boiss. et Blanche = neglecta
trilobata Viv. = Pimpinella peregrina
tuberculata DC. = prec.
tumida Mœnch = Physocaulis nodosus
TORMENTILLA = Potentilla
adstringens Lindem. = P. erecta
alpina Opiz = P. strictissima
alpina Schur (recta) = P. erecta c. minor
Anserina Stokes = P. Anser.
divergens Rchb. = P. diverg.
erecta L. = P. erecta
fruticosa Stokes = P. frut.
nodosa Schur = P. divergens
obovatifolia Stokes = P. Fragariastr.
officinalis Curt. = P. erecta
officinarum Crantz = prec.
recta Schur = P. erecta
reptans β Bert. = P. Salisii
reptans L. = P. procumbens
TORMENTILLA = Potentilla
reptans Stokes = P. reptans
sessilifolia Stokes = seg.
tuberosa Ren. = P. erecta
TORMINARIA = Pirus
Clusii Rœm. = P. torminalis
florentina Rœm. = P. tormin. × Malus
latifolia Dippel = P. Aria × tormin.
torminalis Dippel = P. tormin.
vulgaris Schur = prec.
TOURNEFORTIA = Heliotropium
heliotropioides Hook. = H. anchusæfolium
TOURNESOLIA A 161 (650)
angustifolia Fiori (*tinctor.*) A 161 (b)
tinctoria O. Kze. A 161
TOZZETTIA = Alopecurus
pratensis Savi = A. utriculatus
utriculata Savi = prec.
TOZZETTIA = Fritillaria
persica Parl. = F. persica
TOZZIA II 447 (764)
alpina L. 448
TRACHELIOPSIS = Campanula
albicans Buser = C. albicans
latifolia Opiz = C. latif.
petræa Buser = C. petræa
vulgaris Opiz = C. Trachelium
TRACHELIUM III 191 (851)
azureum Gouan = seg.
cæruleum L. 191
cærul. × lanceolat. Buser = seg.
halteratum Bianca 192 (β)
lanceolatum Guss. 192 (γ)
longifolium Bianca = prec.
TRACHYNIA = Brachypodium
distachya Lk. = B. distach.
rigida Lk. = B. asperum
subtilis DNtrs. = B. — monostachyum
subtilis Hort. = B. distachyum
TRACHYNOTIA = Spartina
stricta DC. = Sp. stricta
TRACHYPLEURUM = Bupleurum
subovatum Calestani = B. intermedium
tenuissimum Schur = B. tenuissimum
TRACHYPOGON = Andropogon
avenaceus Nees = Sorghum halepense
hirtus Nees = A. hirtus
TRAGACANTHA = Astragalus
aristata Stev. = A. sempervirens
genargentea Stev. = A. genarg.
massiliensis Mill. = A. massil.
sicula Stev. = A. sicul.
vera Medic. = A. Tragacantha
TRAGIUM = Pimpinella
Anisum Lk. = P. Anis.
apulum Heynh. = P. Tragium?
canescens Hoffm. = seg.
Columnæ Spr. = P. Tragium
glaucum J. et C. Presl = P. — glauca
Gussonei J. et C. Presl = P. Gussonei
peregrinum Spr. = P. peregr.

Digitized by Google

TRAGOPOGON III 407 (941)
aculeatus Mœnch = Urosperm. picroides
angustifolius Bell. = crocifolius
asper L. = Urosperm. asperum
australis Jord. 408 (3 β)
bicolor Mœnch = Urosperm. Dalechampii
brachyphyllus Boiss. (*porrif.*) 408 (3 γ)
brachyphyllus Nym. = prec.
calyculatus Jacq. = Scorzonera hirsuta
campester Bess. 408 (2 b)
capensis Jacq. = Urosperm. picroides
carinatus Gilib. = pratensis
crocifolius L. 409 (4), A 192
Cupani Guss. 403 (3 δ)
Dalechampii L. = Urosperm. Dalechampii
dubius Gr. et Godr. = campester
dubius Scop. 408 (2)
dubius Vill. = minor, campester?
elatus Salisb. = dubius
eriospermus Ten. 408 (3 ε)
floccosus N. Terr. (non W. et K.) = Samaritani
floccosus Tomm., Koch, Bert. etc. = Tommasinii
glaber Fiori (*Samaritani*) 409 (4 γ b)
graminifolius Goir. hb. (non DC.) = campester
hirsutus Gouan = Scorzonera hirsuta
hybridus L. = quid?
lætus Salisb. = Urosperm. Dalechampii
longipappus Peterm. = orientalis
macropogon C. A. Mey. = dubius
major Jacq. = dubius
micranthus Wimm. (praten.) = minor
minor Fr. = seg.
minor Fr. (*praten.*) 407 (1 β)
nebrodensis Guss. 409 (4 β), A 192
orientalis L. 408 (1 γ)
parviflorus Horn. = crocifolius
picroides L. = Urosperm. picr.
Pommaretii F. Schultz = minor
porrifolius L. 408 (3), A 192
pratensis L. 407 (1)
pratensis Ucria, Zeraph. = Cupani
pusillus N. Terr. (*porrifol.*) A 192 (3 for.)
revolutus Schweig. = orientalis
Samaritani Heldr. et Sart. 409 (4 γ)
sativus Gater. = porrifolius (α)
Shuttleworthii Godet = orientalis
sinuatus Avé-Lal. = australis?
sonchifolius Salisb. = Urosperm. picroides

TRAGOPOGON III 407 (941)
stenophyllus Boiss. (major) = campester
Tommasinii Sch. Bip. 408 (1 δ)
tortilis Mey., Koch (*praten.*) 407 (1 α b)
tortilis Pritz. = prec.
verticillatus Lam. = Urosperm. Dalechampii
TRAGOSELINUM = Pimpinella
Angelica Lam. = Ægopod. Podagr.
dissectum Mœnch = P. diss.
hircinum Mœnch = P. hirc.
luteum Pomel = P. lutea
magnum Mœnch = seg.
majus Lam. = P. major
minus Lam. = P. saxifraga
pumilum Lam. = Trinia glauca
saxifragum Mœnch = P. saxifr.
TRAGUS I 51 (54)
muricatus Mœnch = racem.
occidentalis Nees = racem.
racemosus Hall. 51
TRAPA II 185 (582)
Castanea Gilib. = seg.
levis Presl = seg.
natans L. 185, A 148
quadricornis Stokes = prec.
verbanensis DNtrs. 135 (β), A 148
TRASUS = Carex
TRAUNSTEINERA = Orchis
globosa Rchb. = O. globosa
humilis Goir. (globosa) = O. — humilis
TREMULA = Populus
vulgaris Opiz = P. tremula
TRETORRHIZA = Gentiana
Cruciata Delarb. = G. Cruc.
TRIADENIA = Hypericum
ægyptiaca Boiss. = H. ægypt.
microphylla Spach = prec.
thymifolia Spach = prec.
Webbii Spach = prec.
TRIBULUS II 253 (632)
albus Poir. = terrester
brevispinosus Rouy (*terrest.*) 253 (c)
grandiflorus Goir. (*terrest.*) A 159 (e)
Gussonei Tod. et Pirain. = terrester
hispidus Presl = terrester
inarimensis Guss. (*terrest.*) 253 (b)
longispinosus Rouy (terrest.) = orientalis
Murex Presl = terrester
muricatus Stokes = prec.
orientalis A. Kern. 253 (d)
parvispinus Presl = terrester
terrester L. 253, A 159
TRICHARIS = Dipcadi
serotina Salisb. = D. serot.
TRICHERA = Knautia
amplexicaulis Nym. = K. amplexicaulis
arvensis Schrad = K. arvens.
baldensis Borb. = K. magnifica
bidens Nym. = K. bidens
collina Nym. = K. purpurea
diodon Presl = K. bidens, cfr. A 177

TRICHERA = Knautia
dipsacifolia Nym. = K. dipsaciformis
calycina Presl = K. — calyc.
communis Celak. = K. arvensis
Fleischmanni Nym. = K. — rigidiuscula
foliosa Freyn (collina) = K. — foliosa
integrifolia R. et S. (1818), Nym. (1854) = K. longifol.
magnifica Nym. = K. magnif.
mollis Nym. = K. mollis Jord.
mutabilis Schrad. = K. integrifolia (α et β)
silvatica Schrad. = K. silvat.
subscaposa Boiss. et Reut. = K. calycina (ex Lojac.)
transalpina Borb. = K. transalpina
TRICHOCREPIS = Pterotheca
bifida Vis. = Pt. bif.
TRICHODIUM = Agrostis
alpestre Hpe. = seg.
alpinum Schrad. = A. rupestris
auratum Sieb. = A. — aurata
caninum Schrad. = canina
diffusum Lk = A. pallida
effusum Lk. = A. anemagrostoides
flavescens Schult. = A. — aurata
glaucinum R. et S. = A. vulgaris
hybridum R. et S. = A. hybrida
rubrum R. et S. = A. vulgaris
rubrum Schur = A. canina
rupestre Schrad. = A. alpina
rupestre Schur = A. rupestr.
setaceum R. et S. = A. set.
TRICHOLÆNA I 47 (48)
micrantha Schrad. = seg.
Teneriffæ Parl. 47
TRICHOLOPHUS = Polygala
monspeliacus Spach = P. monspeliaca
TRICHOMANES = Hymenophyllum
tunbridgensis L. = H. tunbridgense
TRICHONEMA = Romulea
Bulbocodium Ker-Gawl. = R. Bulboc.
Bulbocodium Sm. = R. Columnæ
collinum Salisb. = R. Bulboc.
Columnæ Rchb. = R. Column.
elongatum Ker-Gawl. = R. elongata
Linaresii Gr. et Godr. = R. Requienii
Linaresii Klatt = R. Linar.
minimum Ten. (1815) (Bulboc.) = R. Columnæ
minimum Ten. (1831) = prec.
parviflorum Vahl (Bulboc.) = R. Columnæ
purpurascens Sweet = R. purp.
ramiflorum Sweet = R. ramifl.

Digitized by Google

TRICHOPHORUM = Scirpus
alpinum Pers. = Eriophorum alpinum
atrichum Palla = S. alpinus
austriacum Palla = S. — austriacus
cæspitosum Schur, Hartm. = S. cæspitosus
TRICHOTHALAMUS = Potentilla
albus Fourr. = P. alba
caulescens Spr. = P. caul.
Clusianus Spr. = P. Clus.
nitidus Spr. = P. nitida
petiolulatus Fourr. = P. petiol.
valderia Spr. = P. vald.
TRIDACTYLITES = Saxifraga
annua Haw. = S. tridactyl.
petræa Haw. = S. adscend.
TRIENTALIS II 323 (682)
alsinæflora Gilib. = europæa
borealis Raf. = europæa
europæa L. 323
Reichelii Oppitz = europæa
TRIFOLIASTRUM = Trigonella
cæruleum Mœnch = T. cær.
TRIFOLIUM II 46 (491)
ætnense Guss. (*arvense*) 49 (4 δ b)
affine Lej. = medium
agrarium L. hb. p. p., Schreb., Bert, Rchb. etc. = aureum
agrarium L. Sp. et hb. p. p., Huds., Pollich = campestre
agrarium Poir., Mérat = patens
agrestinum Jord. 49 (4 α), A 139
alatum Biv. = physodes
alatum Gib. et Belli (*levigat.*) 60 (38 b)
albidum Ten., Stev. = maritim.
albiflorum Goir. (*pratense*) A 140 (28 α g)
albiflorum Hall. (*alpin*) 63 (50 c)
album Crantz = montan. et ochroleucum
album Lois. = Melilot. alba
alexandrinum L. 54 (nota)
alopecuroides Pers. = pannonic.
alpestre Crantz = medium
alpestre L. 57 (30), A 140
alpestre Pollich = medium
alpicolum Heg. = nivale
alpinum Hpe. (*prat.*) 56 (28 ε b)
alpinum L. 63 (50)
altissimum Lois. = Melilot. alt.
americanum Harz (*pratense*) A 140 (28 β')
ampulescens Gilib. = fragiferum
angulatum Guss. (non W. et K.) = macropodum
angulatum Ten. = nigrescens
angustifolium L. 53 (19), A 139
anomalum Bory et Chaub. = physodes
anomalum Schrank = repens
apulum All. = spumosum
arachnoideum Presl = Cherleri?
arenivagum Jord. = arvense
TRIFOLIUM II 46 (491)
argutum Russel = spumosum
aristatum W., Lk. = ligustic.
armenium W. = pannonic.
arrectisetum Brot. = ligustic.
arvense L. 49 (4), A 139
asperulum DNtrs. = squarrosum
Audigieri Fouc. (*phleoides*) A 139 (10 β)
aureum Pollich 65 (57)
aureum Thuill., Savi = patens
australe Freyn (prat.) = prat. c. maritim.
badium Schreb. 66 (58)
Balbisianum Ser. 63 (49 β b)
barbatum DC. = pannonic.
Biasolettianum Steud. et Hochst. 62 (47 b)
Biasolettii Auct. = prec.
bicolor Mœnch = hybridum
bicorne Forsk. = resupinat.
Bivonæ Guss. 62 (46)
Bocconei Savi 50 (6)
bœticum Boiss. 56 (28 δ b)
bœticum Lag. = obscurum
Bonannii Presl 59 (36 e)
Bourgæi Boiss. = lagopus
brachyanthum Rouy = parviflorum Bab.
brachycladum Gib. et Belli (*subterr.*) 48 (8 β)
bracteatum Schousb. 56 (28 δ)
Brittingeri Weitenw. 49 (4 β)
Broteri Lk. = ligusticum
Broteri Ten. (*suffocat.*) 60 (41 b)
brutium Ten. 65 (54)
Burnatii Briq. (*ochroleuc.*) A 139 (25 c)
Burnatii Fiori (*montan.*) 63 (49 α b)
Buxbaumii Savi = Savianum
cæruleum W. = Trigonella cærulea
cæspitosum Eichw. = elegans
cæspitosum Reyn., J. F. Gmel. = Thalii
calabricum Steud. = quid?
calycinum Steud. = Bivonæ
campestre Schreb. 65 (56), A 140
capilliforme Del. in Ten. = micranthum
catanense Buek = congestum.
cernuum Brot. 60 (39)
Cherleri L. 52 (14), A 139
chrysanthum Gaud. = patens
ciliatum Clarke = campestre
ciliosum Thuill. = diffusum
cinctum DC. 66 (nota)
cinctum Lojac. (*leucanth.*) 53 (21 b)
cinerescens Kit. = ochroleuc.
circumdatum Guss. (non Kze.) = calabricum
circumscissum Pers. = diffusum
Clausonis Pomel = physodes
Clusii Gr. et Godr. 58 (34 β)
clypeatum Lap. = maritim.
clypeatum L. 66 (nota)
coarctatum Rchb. = quid?
collinum Bast. = Bocconei
TRIFOLIUM II 46 (491)
collinum Gib. et Belli (prat.) = nivale
commutatum Led. = marit.
congestum Guss. 51 (13)
congestum Lk. = fragifer.
conicum Pers. in Savi = tenuiflor.
constantinopolitanum Ser. 66 (nota)
controversum Jan = dubium b. microphyllum
Cupani Tin. = physodes
cylindricum Rouy (*Boccon.*) 50 (6 b)
cylindricum Wallr. = tenuiflor.
dalmaticum Auct. it. = lucanicum
dalmaticum Vis. 66 (nota)
decipiens Horn. = spadiceum
decumbens F. Schultz = elegans
delicatulum Goir. (pratense) = microphyllum Desv.
Delilii Dalb. = filiforme
dentatum W. et K. = Melilot. dentata
depauperatum Negri (*incarnat.*) A 139 (17 e)
diffusum Ehrh. 56 (28 θ)
dipsaceum Thuill. 54 (22 γ)
distachyum Ten. (*alpestre*) 57 (30 b)
dubium Sibth. 64 (51 β), A 140
echinatum M. B. 54 (24), A 139
echin. × leucanthum = latinum
elatius Gib. et Belli (*incarn.*) 52 (17 d)
elegans Biv. = Bivonæ
elegans Savi 62 (45 β)
erectum Poir. = campestre
ericetorum Rchb. f. (*fragifer.*) 59 (36 c)
erinaceum M. B. = phleoides
expansum Ten. = medium
expansum W. et K. 56 (28 γ), A 140
expans. β Rchb. = nivale
filiforme L. 64 (51), A 140
fistulosum Gilib. = hybridum
flavescens Tin. 56 (28 η b)
flavicans Guss., Lojac. (prat.) = semipurpur.
flavicans Lk. = squarrosum.
flavicans Ser. in DC. (*prat.*) 56 (28 ε d)
flavum Presl = quid?
flexicaule Vill. = seg.
flexuosum Jacq = medium
folliculatum Lam. = spumos.
formosum Savi = hybridum
fragiferum L. 59 (36)
frigidum Schur = nivale
fuscum Desv. = aureum
gemellum Lap. (non Pourr.) = Bocconei
gemellum Savi = ligusticum
gemellum Ser. = phleoides
glabellum Presl 54 (23 b)
glabratum Guss. (*subterr.*) 48 (8 α b)

Digitized by Google

TRIFOLIUM II 46 (491)
glabrescens Fiori (*pallidum*) 56 (28 η c)
glabrum Biv. ex Strobl (*incarn.*) 52 (17 b)
glabrum N. Terr. (*echinat.*) 54 (24 b)
glareosum Schleich. 63 (47 β for.)
glomeratum L. 60 (40)
gracile Lojac. (nigresc.) = nigr. c roseum
gracile Rouy (*resupin.*) 58 (34 α c)
gracile Thuill. 49 (4 δ)
græcum Griseb. = speciosum
Gussoneanum Gib. et Belli (*mutabile*) 58 (32 γ d)
Gussonei Fiori (nigrescens) 61 = macropodum, cfr. A 140
Gussoni Tin. = speciosum
halicola Gib. et Belli (*fragifer.*) 59 (36 b)
heterophyllum Tratt., Lej. = nivale
hirsutum Ten. (non Thunb.) = hirtum
hirtum All. 52 (15)
hispidum Desf. 52 (15 c)
humile Goir. (*alpestre*) A 140 (30 d)
hybridum L. 62 (45)
hybridum Savi = nigrescens
hygrophylum Boiss. = Petrisavii
incanum Presl = tenuiflorum
incarnatum L. 52 (17), A 139
indicum Thunb., W. = Melil. indica
intermedium Guss. 53 (19 β), A 139
intermedium Lap. = hybrid.
intermedium Rouy (*nigresc.*) A 140 (43 α for.)
involucratum Lam. = Cherleri
irregulare Pourr. = marit.
isthmocarpum Brot. 61 (42)
isthmocarpum Guss. = Jaminianum
italicum W., Boiss. = Melil. italica
Jaminianum Boiss. 61 (42 β)
Kochianum Hayne = Melil. dentata
lagopinum Jord. = arvense
lagopinum St.-Lag. = Lagopus
Lagopus Gouan = arvense
Lagopus Pourr. 53 (18), A 214
Lagrangei Boiss. 65 (56 d)
laguroides Pourr. = hirtum
lancifolium Gib. et Belli (*mutabile*) 58 (32 γ c)
lappaceum L. 51 (12)
latinum Sebast. 55 (X)
lejocalycinum Boiss. et Sprun. 58 (32 γ b)
leucanthum M. B. 53 (21), A 139
levigatum Poir., Desf. 60 (38), A 140
ligusticum Balb. 51 (11)
litigiosum Desv., Presl = spadiceum
TRIFOLIUM II 46 (491)
littorale Jord. A 139 (4 α b)
Loiseleuri Rouy 53 (*nota*)
longepedunculatum Steud. = squarros.
longestipulatum Lois. = dipsaceum
longipes Gay (*subterr.*) 48 (3 γ)
longisetum Boiss. et Bal. 49 (4 γ)
lucanicum Gasp. 51 (9 β), A 139
lupulinum Savi = Medicago lupulina
luteo-purpur. Rouy (nivale) = semipurpur.
luteum Lam. = filiforme et campestre
macrocephalum Fiori (*repens*) 62 (47 α c)
macropodum Guss. A 140 (43 α b)
macropod. Steud. = Michelianum
macrorrhizum W. et K. = Melilot. macr.
majus Gib. et Belli (scabrum) = lucanicum
majus Koch (procumbens) = campestre (α)
majus Rouy (*squarros.*) 54 (22 β)
malacanthum Lk. = leucanth.
maritimum Huds. 54 (23), A 139
maritimum Marss. (*prat.*) 56 (28 α c)
marsicum Ten. 54 (22 δ)
Marsillyi Fouc. et Sim. (*subterr.*) A 139 (3 var.)
mauritanicum W. = Melil. maurit.
medium L., Huds. 57 (29), A 140
Melilotus L. = Melilot. spec. plur.
Melil.-cærulea L. = Trigonella cær.
Melil.-corniculata L. = Trigonella corn.
Melil.-indica γ L. = Melilot. sulcata
Melil.-indica δ L. = Melilot. indica
Melil.-italica L. = Melilot. ital.
Melil.-mauritanica Schousb. = Melilot. maur.
Melil.-officinalis α L. = Melilot. offic.
Melil.-offic. β L. = Melilot. alba
Melil.-offic. γ L. = Melilot. altissima
Melil.-ornithopodioides L. = ornith.
Melil.-segetalis Brot. = Melilot. seget.
Mel.-sicula Vitm. = Melil. messanensis
Meneghinianum Clem. 61 (43 β b)
messanense L. = Melilot. mess.
Michelianum Gaud. = hybrid.
Michelianum Savi 62 (44)
micranthum Viv. 64 (51 α b)
TRIFOLIUM II 46 (491)
microphyllum Desv. A 139 (28 α for.)
microphyllum Fiori (*dubium*) A 140 (51 β b)
microphyllum Goir. (*medium*) A 140 (29 c)
microphyllum Ser. (filiforme) = dubium b. microph.
Minæ Lojac. 51 (10 c)
minimum Gaud. (filiforme) = dubium b. microphyllum
minor Rouy (*nivale*) A 140 (28 ε e)
minus Gib. et Belli (*tomentos.*) 59 (35 b)
minus Gr. et Godr. (agrarium) = Schreberi
minus Guss. (repens) = Biasolettianum
minus Koch (procumbens) = Schreberi
minus Relh. = dubium
minus Rouy (squarros.) = dipsaceum
minutum Coss. = cernuum
modestum Boiss. 59 (36 d)
Mollineri Balb. 52 (17 a)
Mollineri Colla = nigresc. b. roseum
molybdocalyx Rchb. f. = Petrisavii
montanum L. 63 (49)
Monvernense Shuttlew. = Biasolettianum
moriferum Lojac. (*marit.*) 54 (23 c)
multistriatum Koch 58 (32 β)
mutabile Guss. = Gussoneanum
mutabile Portschl. 58 (32 γ)
nanum Ser. (*campestre*) 65 (56 b)
neglectum F. et M. = fragifer.
neglectum Noë = Biasolett.
nervosum Presl = lappaceum
nigrescens Viv. 61 (43), A 140
nivale Sieb. 56 (28 ε), A 140
noricum Wulf. 55 (27)
nummulariæfolium Perret 56 (28 α b)
obscurum Guss. = leucanthum
obscurum Savi 53 (20)
obvallatum Mœnch = Cherleri
ochroleucum Huds., L. 55 (25), A 139
officinale W. = Melilot. offic.
ornithopodioides Sm. 48 (1)
Ottonis Sprun. = prætutianum
ovatifolium Bory et Chaub. = physodes
oxypetasum Heldr. et Sart. = hirtum
pallescens DC. = nigrescens
pallescens Schreb. 63 (47 β)
pallidum W. et K. 56 (28 η), A 140
palustre W. et K. = Melilot. palustris
pannonicum Jacq. 55 (26)
pannonicum Vill. = nivale
panormitanum Presl = dipsaceum
parisiense DC. 65 (55 b)

Digitized by Google

TRIFOLIUM II 46 (491)
parviflorum Bab. (*prat.*) 56 (28 ζ)
parviflorum Ehrh. 60 (nota)
parviflorum Perreym. = Perreymondi
parvifolium Bunge = dubium
patens Schreb. 65 (55)
pedunculatum Ser. (*prat.*) 56 (28 α d)
pedunculosum Ser. (*medium*) 57 (29 b)
pensylvanicum W. = pratense (α)
perpusillum Ser. (arvense) = littorale
perpusillum Simk. = ornithopodioides
Perretii Colla = nummulariæfol.
Perreymondi Gren. et Godr. = glomeratum et Perreym.
Perreymondi Rouy (*cernuum*) 60 (39 b)
Petitpierreanum Hayne = Melilot. Petitp.
Petrisavii Clem. 61 (43 α d)
phlebocalyx Fenzl = Cherleri
phleoides Pourr. 51 (10), A 139
phyllanthum Ser. (*repens*) A 140 (47 for.)
physodes Eichw. = fragifer.
physodes Stev. 59 (37)
pictum M. B. = hirtum
pictum Roth 52 (15 b)
plicatum Presl = speciosum
pollinense N. Terr. (*ochroleuc.*) A 139 (25 d)
polyanthemum Ten. 61 (43 β)
prætutianum Guss. 55 (27 β)
pratense Fiori (*campestre*) A 140 (56 β)
pratense L. 56 (28), A 139
pratense Posp. (agrarium) = camp. β prat.
procerum Koch. = echinatum
procumbens L. hb. p. p., Sm., Bert., Rchb. etc. = campestre
procumbens L. Sp. et hb. p. p. = dubium
procumbens Lois. = patens
procumbens Schreb. = Schreberi
prostratum Bias. = Biasolettii
prostratum Jan 51 (10 b)
prutetianum Ser. = prætutianum
pseudo-procumbens C. C. Gmel. = Schreberi
pseudo-repens Gib. et Belli (*Thalii*) 63 (48 b)
purpurascens Roth = diffusum
purpureum Gilib. = pratense
purpureum Lois. = Loiseleuri
purpur.-majus Gilib. = alpestre
pusillum Bert. (repens.) = Biasolettianum
pygmæum Ser. (*patens*) 65 (55 c)
pygmæum Soy.-Will. (filiforme) = dubium b. microphyllum
TRIFOLIUM II 46 (491)
pyrenaicum Wk. et Lge. = semipurpur.
reclinatum W. et K. = echinatum
recurvum W. et K. = vesicul. (α)
reflexum Pourr. (non L.) = cernuum
repens L. 62 (47), A 140
resupinatum Less. = fragifer.
resupinatum L. 58 (34)
resupinat. Wk. = Bonannii
rigidum Savi = maritimum
robustum Rouy (*resupin.*) 58 (34 α b)
roseum Gib. et Belli (*nigresc.*) 61 (43 α c)
roseum-gracile Tin. (nigresc.) = prec.
roseum Presl 55 (25 b), A 139
Rouxii Gren. = Jaminianum
rubellum Jord. = gracile
rubellum Ser. (*alpestre*) 57 (30 c)
rubens L. 57 (31)
rubens β Bert. = rub. b. villosum
rubriflorum Car. et St.-Lag. (montan.) = Balbisianum
rupestre Ten. 63 (49 β)
sabuletorum Jord. = arvense
sativum Mill. 56 (28 β)
Savianum Guss. 48 (2 b)
saxatile All. 49 (5)
scabrum L. 50 (9), A 139
scabrum Pollich = striatum
Schreberi Jord. 65 (56 e)
Sebastiani Savi 64 (52), A 140
semiglabrum Brot. = Bocconei
semipurpureum Strobl (*prat.*) 56 (28 ε c)
serrulatum Lag. = cernuum
siculum Presl ex Steud. = quid?
silvaticum Gérard = Lagopus
spadiceum L. 66 (59)
spadiceum Thuill. = campestre
spadiceum Vill. = badium
speciosum W. 65 (53)
sphærocephalum Desf. 51 (14 b)
spicatum S. et S. = Melilot. neapolit.
spumosum L. 58 (33), A 140
squarrosum L. 54 (22)
squarrosum M. B. = ochrol. b. roseum
squarrosum Savi = squar. β majus
stellatum Huds. = marit.
stellatum L. 52 (16), A 139
stenodictyon Gib. et Belli (*vesicul.*) 58 (32 α b)
stenophyllum Belli (*alpin.*) 63 (50 b)
stipulaceum Lap. (non Thunb.) = marit.
stramineum Guss. ex Ten. = tenuifol.
stramineum Presl 52 (17 c)
strangulatum Huet, Lojac. = Jaminianum
strepens Crantz = aureum?
striatum L. 50 (8), A 139
TRIFOLIUM II 46 (491)
strictius Koch (arvense) = Brittingeri
strictum L. p. p., Schreb. = parviflor.
strictum L. p. p. et Auct. pl. = levigatum
suaveolens Auct. it. (non W.) = robustum
subterraneum L. 48 (3), A 139
subulatum Gilib. = montan.
suffocatum L. 60 (41)
sulcatum Viv. = Melil. sulc.
supinum Savi = echinatum
Tenoreanum Boiss. et Sprun. = tenuifol.
Tenoreanum Buek = montan.
tenuiflorum Ten. 50 (8 b), A 139
tenuifolium Ten. 50 (7)
Thalii Vill. 63 (48)
thionanthum Hausskn. = agrarium
thymiflorum Vill. = saxatile
Tinei Lojac. (scabrum) = lucanicum
tomentosum L. 59 (35), A 140
tumescens Gilib. = aureum
turgidum M. B. = vesicul. (α)
uniflorum L. 48 (2)
Vaillantii Lois. (non Poir.) = Michelianum
variabile Guss. ex Ten. = leucanth.
ventricosum Presl ex Steud. = quid?
vesiculosum Savi 57 (32)
villosissimum Ten. (praten.) = prætutianum
villosum Gilib. = arvense
villosum Hall. ex Ten. = prat. v. alpin.
villosum Presl = pallidum
villosum Vis. et Sacc. (*rubens*) 57 (31 b)
villosum Whlnb., Goir. (*pratense*) A 139 (28 α e)
viviparum Bolzon (*repens*) A 140 (47 α for.)
vulgare Gueld. = Melilot. alba
vulgare Hayne = Melilot. offic.
xanthinum Freyn 52 (16 b)
Xatardii DC. 53 (20 b)
TRIGLOCHIN I 162 (172)
andina Phil. = palustris
Ani Koch = maritima
atlantica W. = bulbosa
Barrelieri Lois. 163 (3) = bulbosa, cfr. A 42
bulbosa L. A 42 (3)
chilensis Meyen = palustris
fonticola Phil. = palustris
himalensis Forbes = palustris
juncea Gilib. = palustris
laxiflora Guss. 163 (4), A 42
maritima L. 162 (1), A 42
palustris Brot. = bulbosa
palustris Desf. = laxiflora
palustris L. 163 (2), A 42
palustr. β L. = bulbosa
patens Steud. ex R. et S. = bulbosa
Rœgneri C. Koch = maritima
salina Wallr. = maritima

Digitized by Google

TRIGONELLA II 45 (490)
Balansæ Boiss. et Reut. = Pesavium
cærulea Ser. in DC. 45 (1)
corniculat. β Bert. = elatior
corniculata L. 46 (6), A 139
divaricata Clairv. = monspel.
elatior S. et S. 46 (6 b)
esculenta W. = corniculata
Fœnum-græcum L. 45 (2)
Fœn.-græc. β L. = gladiata
gladiata Stev. 45 (3)
græca St.-Lag. = Fœn.-græc.
lilacina Boiss. 46 (nota)
litoralis Guss. = maritima
maritima Del. 46 (5)
maritima Tomm. = corniculat.
Melilotus Lk. = Mel. indica
monspeliaca L. 45 (4)
ornithopodioides DC. = Trifol. ornith.
Pes-avium Bert. 46 (nota), A 139
polycerata L. 46 (nota)
prostrata DC. = gladiata
purpurascens Lam. = Trifol. ornithopodioides
pusilla A. Terr. (*corniculat.*) 46 (6 c)
tuberculata Presl = gladiata
TRIMORPHÆA = Erigeron
acris S. F. Gray = E. acer
alpina S. F. Gray = E. alp.
glabrata Fourr. = E. glabr.
uniflora S. F. Gray = E. unifl.
vulgaris Casss. = E. acer
TRINIA II 156 (544)
calabra Fiori (*glauca*) A 151 (1 α for.)
calabra N. Terr. (vulgar.) = prec.
carniolica Kern. A 151 (2)
dioica Fourr. 156, A 151 (1 β)
elatior Gaud. = glauca
glaberrima Hoffm. = glauca
glauca Rchb., Dum. 156 (1), A 151
Jacquini DC. (vulgar.) = dioica
platycarpa Rouy et Cam. (glaberr.) = dioica
pumila A. Kern. 156 (1 b) = carniolica, cfr. A 151
pumila Rchb. = dioica
stenocarpa Rouy et Cam. (glaberr.) = glauca (a)
vulgaris DC. = glauca
TRINIELLA = Trinia
carniolica Calestani = T. carniolica
TRINIUSA = Bromus
Danthonia Steud. = B. macrostachys
flavescens Steud. = B. fasciculatus
TRIODIA I 78 (99)
alpina Roth = Danthonia provincialis
decumbens P. B. 78, A 20
intermedia Cald. (*decumb.*) 78 (b)
TRIONUM = Hibiscus
annuum Medic. = H. Trionum
diffusum Mœnch = prec.
TRIPHYLLOIDES = Trifolium
angustifolia Mœnch = T. angustifolium
comosa Mœnch = T. subterr.
nervosa Mœnch = T. alpestre
rigida Mœnch = T. lappaceum
rubens Mœnch = T. rub.
TRIPLACHNE I 61 (72)
nitens Lk. 62
TRIPLEUROSPERMUM = Matricaria
bienne Knäf = M. biennis
inodorum Sch. Bip. = M. inod.
TRIPLOCENTRON = Centaurea
apulum Cass. = seg.
melitense Cass. = C. melitensis
solstitiale Fourr. = C. solst.
TRIPODION = Anthyllis
lotoides Medic. = seg.
tetraphyllum Fourr. = A. tetraphylla
TRIPOLIUM = Aster
maritimum Léveillé = seg.
pannonicum Schur = A. pann.
vulgare Nees = A. Tripolium
TRIQUETRA = Astragalus
bœtica Medic. = A. bœticus
TRISETARIA = Trisetum
airoides Baumg. = T. subspic.
alpestris Baumg. = T. alpestre
brevifolia Baumg. = T. distichophyll.
flavescens Baumg. = T. flav.
pratensis Baumg. = Avena pratensis
pubescens Schur = Avena pubescens
sesquitertia Baumg. = Avena sesquit.
tenuis Baumg. = Ventenata dubia
TRISETUM I 69 (85)
agrostoides Steud. = myrianthum
airoides R. et S. = subspicatum
alpestre P. B. 70 (7 γ), A 18
alpinum Parl. (flaveso.) = purpurascens
alpinum R. et S. = Avena alpina
argenteum R. et S. 70 (5), A 18
aureum Ten. 71 (9), A 18
brevifolium R. et S. = distichophyll.
Burnoufii Req. in Parl. 70, A 18 (7 ε)
Cavanillesii Trin. 70 (8)
chloranthum Steud. = aureum
compressum Fuss = Avena compressa
condensatum Schult. = aureum
depauperatum Uechtr. (*flavesc.*) A 203 (7 α b)
distichophyllum P. B. 71 (4)
flavescens P. B. 70 (7), A 18, 203
Gaudinianum Boiss. = Cavanillesii
glaberrimum Ces. (*villosum*) 70 (3 b)
graciile Boiss. 70 (2)
Lœflingianum Presl = aureum
TRISETUM I 69 (85)
macilentum Trin. = Avellinia Michelii
melitense Steud. = aureum
micranthum R. et S. = parviflorum
Morisii Trin. = gracile
myrianthum C. A. Mey. 71 (12)
neglectum R. et S. = paniceum
Noëanum Boiss. = aureum
paniceum Pers. 71 (10), A 18
parviflorum Parl. (argent.) = Rotæ
parviflorum Pers. 71 (11)
phleoides Trin. = Kœleria phleoid.
pisanum Pers. (hispanic.) = paniceum
præcox Dum. = Aira præcox
pratense Presl = flavescens (α)
puberulum Ten. = Avellinia Michelii
pubescens Chiov. (neglectum) = seg.
pubescens Fiori (*paniceum*) A 18 (10 b)
pubescens R. et S. = Avena pubesc.
purpurascens Ces., Arc. (*flavesc.*) 70 (7 β)
pygmæum Goir. A 18 (?)
Rotæ Arc., Richter (*argent.*) 70 (oss.), A 18 (5 b)
spicatum Richter = subspicatum
splendens Presl A 18 (7 δ)
striatum Pers. = Ventenata dubia
subspicatum P. B. 69 (1)
tenue R. et S. = Ventenata dubia
vallesiacum Boiss. = Cavanillesii
villosum Schult. 70 (3)
TRISTYLEA = Saxifraga
florulenta Jord. et Fourr. = S. florul.
TRITICUM I 107 (127)
acutum DC. = Agrop. repenti × junceum
æstivum L. 107 (3)
affine Deth. = Agrop. repenti × junceum
alatum Peterm. = durum
amyleum Ser. = dicoccum
arenicolum Kern. = Agrop. Savignonei
aristatum Alef. (vulgare) = æstivum
aristatum Dœll (repens) = Agrop. — Leersianum
aristatum Sadl. (glaucum) = Agrop. glauc. d. arist.
aristatum Tausch (lolioides) = Nardurus — festucoides
arundinaceum Poule. = Agrop. repens c. majus
arvense Schreb. = Agrop. repens
asperum DC. = Brachyp. asper.
Aucheri Parl. = Ægilops speltoides
bœoticum Boiss. 102 (2 oss.)

Digitized by Google

TRITICUM I 107 (127)
Barrelieri Kth. = Brachyp. Barrel.
bicorne Forskal = Ægilops bicornis
biflorum Brign. = Agrop bifl.
biunciale Richter = Ægilops biunc.
biunciale Vill., All. = Nardurus — biunc.
brizoides Lam. = Catapodium sicul.
bromoides Wibel = Brachyp. pinnat.
cæspitosum DC. = Brachyp. ramosum
campestre Nym. = Agrop. camp.
caninum L. = Agrop. can.
caninum Nocc. et Balb., Guss. p. p. = can. b. majus
caudatum Gr. et Godr. = Ægilops caud.
caudatum Pers. = villosum
cereale Salisb., Asch. = Secale cereale
cereale Schrank = æstivum (α et β)
ciliatum DC. = Brachyp. distachyum
compactum Host 107 (β γ)
compositum L. 108 (β δ b)
cristatum Schreb. = Agrop. cristatum
cylindricum Ces. P. et G. = Ægilops cyl.
dicoccum Schrank 108 (β θ)
durum Desf. 108 (β ε)
Duvalii Loret = Agrop. rep. × junc.
elongatum Host = Agrop. elongatum
farctum Viv. = Agrop. junceum
farrum Bayle-Bar. = dicoccum
Festuca DC. = Nardurus — Festuca
festucoides Bert. = Nardurus — festucoides
firmum Seidl = Agrop. repens (α a)
fragile Ces. P. et G. = Ægilops frag.
genuense DC. = Brachyp. genuense
giganteum Roth = Agrop. elongatum
glaucum Desf. = Agrop. glauc.
glaucum Mœnch = polonicum
gracile Brot. = Brachyp. silvatic.
gracile DC. = Brachypod. — gracile
Halleri Viv. = Nardurus Halleri
hemipoa Ten. = Sclerochloa hemipoa
Herreræ Kœrnk. (*turgidum*) A 32 (β δ for.)
hibernum L. 107 (β β)
hirsutum Celak. (glaucum) = Agrop. Savignonei
hirsutum Horn. = Agrop. cristatum
hispanicum Reich. = Nardurus — hispanicum

TRITICUM I 107 (127)
hispanicum Viv. = Nardurus — festucoides
intermedium Host = Agrop. glaucum
junceum L. = Agrop. junc.
junc. × repens Marss. = Agrop. rep. × junc.
Lachenalii Gm. = Nardurus Halleri
lasiorrhachis Boiss. (monococcum) = bœoticum
latronum Godr. = Agrop. — latronum
laxum Fr. = Agrop. repenti × junceum
Leersianum Schreb. = Agrop. — Leers.
levissimum Hall. f. = polonicum
ligusticum Bert. = Ægilops — ligustica
litorale Host = Agrop. lit.
litoreum Brot. = Agrop. junceum
loliaceum Sm. = Catapodium loliaceum
lolioides Pers. = Nardurus Halleri
longearistatum Posp. (intermed.) = Agrop. — longear.
majus Asch. et Græbn. (canin.) = Agrop. can. b. majus?
majus Dœll (repens) = Agrop. repens c. majus
maritimum Wulf. = Sclerochloa mar.
maritimum L. = Sclerochloa rigida?
monococcum L. 107 (2)
muricatum Lk. = Agrop. cristatum
muticum Alef. (vulgare) = hibernum
Nardus DC. = Nardurus maritimus (a)
obtusatum Godr. = Ægilops — ligustica
ovatum Rasp., Gr. et Godr. = Ægilops ovata
panormitanum Bert. = Agrop. panorm.
petræum Vis. et Panc. = Agrop. panormitan.
phœnicoides DC = Brachyp. phœn.
pilosum Panc. (glaucum) = Agrop. Savignonei
pilosum Seen. = Agrop. elongatum?
pinnatum DC. = Brachyp. pinn.
Poa DC. = Nardurus Halleri
polonicum L. 108 (β ζ)
pubescens M. B. = monococcum?
pungens Pers. = Agrop. pung.
pycnanthum Godr. = Agrop. litorale
repens L. = Agrop. repens
repens × junceum Asch. et Græbn. = Agrop. rep. × junc.
Requieni Ces. P. et G. = vulgare × Ægilops ovata
rigidum Schrader = Agrop. glaucum et elongatum

TRITICUM I 107 (127)
Rottbolla DC. = Catapodium loliac.
sativum Lam. = æstivum (α-ε)
sativum × ovatum Asch. et Græbn. = vulg. × Ægil. ovata
Savignonei Nym. = Agrop. Savignonei
scirpeum Guss. = Agrop. scirp.
Secale Lk. = Secale cereale
sepium Lam. = Agrop. caninum
siculum R. et S. = durum
silvaticum Mœnch, DC. = Brachyp. silv.
silvaticum Salisb. = Elymus europæus
Spelta Host = dicoccum
Spelta L. 108 (β η)
speltoides Gren. = Ægilops spelt.
subtile F. M. et Avé-Lall. = Brachyp. — monostach.
subtriflorum Asch. et Græbn. (canin.) = Agrop. — subtrifl.
supinum Schrank = Æluropus litoralis
tenax Hack. (sativum) = æstivum (α-ε)
tenellum L. = Nardurus Halleri
tenellum Viv. = Nardurus maritimus (a)
tenuiculum Lois. = Nardurus — festucoides
teretiflorum Wibel = Brachyp. silvatic.
Tournefortii Steud. = Ægilops speltoides
triaristatum Gr. et Godr. = Ægilops triar.
trichophorum Lk. = Agrop. trich.
triunciale Rasp., Gr. et Godr. = Ægilops triunc.
truncatum Wallr. = Agrop. glaucum
turgidum L. 108 (β δ), A 32
uniaristatum Richter = Ægilops uniar.
unilaterale All. = Catapodium loliac.
unilaterale DC. = Nardurus unilat.
unilaterale L. = Nardurus unilat., Catapod. loliac.
unioloides Ait. = Catapodium siculum
ventricosum Ces. P. et G. = Ægilops ventr.
villosum Hack. (intermed.) = Agrop. Savignonei
villosum Host = durum
villosum M. B. 107 (1), A 32
villosum Sadl. (glaucum) = Agrop. Savignonei
violaceum Horn. (non Fr.) = Agrop. biflorum
virescens Asch. et Græbn. (biflor.) = biflorum
vulgare Dœll (repens) = Agrop. repens (α a)
vulgare Vill. = æstivum (α et β)

Digitized by Google

TRITICUM I 107 127
vulgare × *Ægil. ovata Fiori* 109, A 88
vulgari × ovatum Gr et Godr. = prec.
Zea Host = Spelta
TRIXAGO = Bartsia
apula Stev. = B. Trixago
atroviolacea Nym. = B. latif. (for.)
latifolia Rchb. = B. latifol.
maxima Webb et Berth. = B. Trixago
purpurea Stev. = B. latifol.
rhinanthina Lk. = B. Trixago
versicolor Griseb. = B. versic.
viscosa Rchb. = B. viscosa
TRIXAGO = Stachys
arvensis Hoffgg. et Lk. = S. arv.
colorata Presl = S — color.
cordifolia Mœnch = S. arvensis
punctata Gilib. = prec.
TROCHISCANTHES II 172 (4)
nodiflorus Koch 172
TROCHOCEPHALUS = Scabiosa
graminifolius Opiz = S. gram.
TROLLIUS I 516 (431)
altissimus Crantz 517 (c)
brachystylus Tausch (europ.) = altissim.
connivens Mœnch = europ.
europæus L. 517, A 107
germanicus Wend. = europ.
globosus Lam. = europ.
grandiflorus Bolzon (*europ.*) A 107 (d)
grandis Baumg. (europ.) = altissim.
humilior Koch (europ.) = seg.
humilior Pohl (connivens) = seg.
humilis Crantz 517 (b)
minimus Wend. = humilis
palustris Brandza = Caltha palustris
rotundiflorus Stokes = europ.
sphærious Salisb. = europ.
vulgaris Rœpert (europ.) = altissim.
TROMMSDORFIA = Hypochœris
maculata Bernh. = H. mac.
TRYPHANE = Alsine
Facchinii Rchb. = A. Facch.
Gerardi Rchb. = A. Ger.
grineensis Rchb. = A. grin.
obtusa Rchb. = Mœhringia — obtusa
recurva Rchb. = A. rec.
verna Rchb. = A. verna
TUBERARIA = Helianthemum
acuminata Gross. = H. Vivianii
annua Spach = H. guttatum
Cavanillesii Wk. et Lge. (variab.) = H. eriocaulon
eriocaulon Gross. (guttata) = H. eriocaulon
eriocaulon Wk. (variab.) = H. eriocaulon
guttata Fourr. = H. guttatum
inconspicua Wk. = H. inconsp.
lanata Wk. (vulgaris) = H. — lanatum
TUBERARIA = Helianthemum
Linnæi Wk. et Lge. (variab.) = H. eriocaulon
macropetala Wk. (variab. b. plant. α) = H. plantagineum
melastomatifolia Gross. = H. Tuberaria
melastomatifolia Spach (perenn.) = prec.
micropetala Wk. (variab. b. plant. β) = H. præcox
Milleri Wk. (variab.) = H. guttatum (α)
perennis Spach = H. Tuberaria
plantaginea Gross. (guttata) = H. plant.
plantaginea Wk. (variab.) = H. plant.
præcox Gross. = H. præcox
sicula Gross. (villosissima) = H. — siculum
trivialis Gross. (melastomatifol.) = H. — triviale
variabilis Wk. = H. guttatum
villosissima Gross. α sicula = H. — siculum
viscoso-puberula Wk. (variab.) = H. eriocaulon
Vivianii Gross. (acumin.) = H. Vivianii
vulgaris Wk. = H. Tuberaria
TUBILIUM = Pulicaria
siculum Choisy = P. sicula
TUBOCYTISUS = Cytisus
biflorus Fourr. = C. biflor.
elongatus Fourr. = C. elong.
supinus Fourr. = C. supin.
TULIPA I 179 (183)
acutiflora Poir. = Oculus-solis
agenensis Red. = Oculus-solis
apula Guss. A 45 (4 δ)
atro-guttata Lev. (neglecta) = neglecta
australis Lk. 179 (1 β), A 44
Baldaccii Mattei = spathulata?
Beccariana Bicchi = saxatilis
Bonarotiana Reb. = strangulata (for.)
Breyniana Ker-Gawl. = australis
caucasica Orsini (non Otto) = montana
Celsiana DC. in Red. = australis
Clusiana DC. 180 (8)
connivens Lev. 181 (6 α b)
Didieri Jord. 181 (6 β), A 45
Didieri Pass. = Passeriniana
etrusca Lev. 181 (6 β c)
Foxiana Reb. = præcox
fragrans Munby = australis
Fransoniana Parl. 181 (6 β b)
Gesneriana L. 181 (6), A 4
Gesneriana Reb. = connivens
Grisebachiana Bald. (non Pantocs.) = montana
Hawardeniana Bert. (scabriscapa) = neglecta
hexagonata Borb. = præcox (for.)
lurida Lev. 181 (6 β d)
luteo-guttata Lev. (connivens) = connivens (for.)
maculata Roth = australis
TULIPA I 179 (183)
maleolens Rchb. = Didieri
maleolens Reb. 180 (4 β b)
Martelliana Lev. 180 (×)
mixta Strangw. (scabriscarpa) = variopicta
montana Kunze (1846) (silvestr.) = montana Wk.
montana Lindl. 180 (4 oss.)
montana Wk. (1861) 179 (1 β b)
neglecta Reb. 180 (5 α b)
obtusa Richter (strangulata) = seg.
obtusata Lev. (connivens) = connivens (for.)
obtusata Lev. (strangulata) = strangulata (for.)
obtusiflora Borb. (præcox) = hexagonata
Oculus-solis Koch = Didieri
Oculus-solis St.-Am. 180 (4), A 44
Passeriniana Lev. 181 (×)
præcox Cav. = Clusiana
præcox Ten. 180 (4 γ), A 44
primulina Strangw. (scabriscapa) = neglecta
Raddii Reb. = præcox
Rebouliana Bert. (scabriscapa) = variopicta
rubro-alba Brot. = Clusiana
saxatilis Sieb. 179 (2)
scabriscapa Strangw., Bert. = strangulata
Schrenkii Reg. = T. Gesneriana
segusiana Perr. et Song. A 45 (6 β e)
serotina Reb. 181 (6 γ)
silvestris Boiss. = australis
silvestris L. 179 (1), A 44
Sommieri Lev. 180 (5 β)
spathulata Bert. 181 (6 α)
strangulata Reb. 180 (5)
Strangwaisiana Reb. = præcox
transtagana Brot. = australis
variopicta Reb. 180 (5 α c)
TUNICA I 373 (344)
aggregata Tanf. (saxifr.) = rigida
albiflora Goir. (*prolif.*) A 78 (3 α d)
albiflora M. Gortani (*saxifr.*) A 78 (2 α e)
arenaria Scop. = Dianthus Sternbergii
arenicola Nym. = saxifraga
armerioides Halacsy A 77 (1 γ)
barbata Scop. = Dianthus barbata
bicolor Jord. et Fourr. 374 (2 α d)
Carthusianorum Scop. = Dianthus Carth.
Caryophyllus Scop. = Dianthus Caryoph.
ciliata Dulac = saxifraga
compressa F. et M. 374 (2 α b)
cretica Ces. P. et G. = illyrica
cretica F. et M., Boiss. A 77 (1 ε)
diminuta Fiori (*prolifera*) 374 (3 α c)

Digitized by Google

TUNICA I 373 (344)
fasciculata Lanza (illyrica) = armerioides
flava Huter (*illyrica*) A 77 (1 α for.)
Gasparrinii Nic., Nym. 374 (3 α b)
glumacea Boiss. 374 (nota)
grandiflora Goir. (*saxifr.*) A 78 (2 α f)
illyrica F. et M. 374 (1), A 77
levicaulis Rouy et Fouc. (*velut.*) A 78 (3 β b)
levis Clav. (*prolifera*) 374 (3 α b)
muscoides Goir. (*saxifr.*) A 78 (2 α g)
Nanteuillii Gürke = seg.
Nanteuillii Rouy et Fouc (*prolif.*) A 78 (3 γ)
obcordata Boiss. (*glumacea*) 374 (nota)
ochroleuca F. et M., Boiss. A 77 (1 δ)
paniculata Lanza (*illyrica*) A 77 (1 β)
permixta A. Terr. (*saxifr.*) 374 (2 β)
Plumaria Scop. = Dianthus Plum.
prolifera Scop. 374 (3), A 78
pubescens Rouy et Fouc. (*Nanteullii*) A 78 (3 γ b)
quinquevulnera J. Gay (saxifr.) = bicolor
rigida Rchb., Boiss. 374 (2 α c)
saxifraga Scop. 374 (2), A 78
Sibthorpii Boiss. = armerioides
stricta Lanza (illyrica) = ochroleuca
uniflora Rouy et Fouc. (prolif.) = diminuta
uniflora Rouy et Fouc. (*velut.*) A 78 (3 β c)
velutina F. et M. 374 (3 β), A 78
TURBITH = Athamanta
annua Tausch = A. cretensis
Matthioli Tausch = A. Matth.
TURGENIA II 195 (586)
latifolia Hoffm. 195
TURRITA = Arabis
major Wallr. = A. Turrita
TURRITIS = Arabis
alpestris Schleich. = A. alpest.
alpina L. = A. hirsuta
alpina Prantl = A. pauciflora
arenosa Lap. = A. arenosa
arvensis R. Br. = Moricandia arvensis
auriculata Fourr. = A. auric.
bellidifolia All. = A bellidif.
Brassica Leers = A. pauciflora
cærulea All. = A. cærul.
cenisia Fourr. = A. cenis.
ciliata Hœpfn. = A. cil.
ciliata Reyn. = A. arcuata × bellidifol.
enneaphyllos Scop. = Dentaria enneaphyllos
Gerardi Bess. = A. Gerardi
glabra L. = A. glabra
hirsuta L. = A. hirs
Lœselii R. Br. = Sisymbr. Lœselii
TURRITIS = Arabis
mollissima Hœpfn. = A. saxatilis
muralis Fourr. = A. mur.
ochroleuca Lam. = A. Turrita
patula Ehrh., Lam. = A. auriculata
pauciflora Grimm = A. paucifl.
pendula Desf. = A. Turrita
perfoliata Neck. = A. glabra
purpurea Lam. = A. verna
Raji All. = A. Allionii
sagittata Bert. = A. sagitt.
serpyllifolia Fourr. = A. serpyll.
stricta All. = A. Allionii
stricta Host = A. glabra
verna Lam. = A. alpina
TUSSACIA = Spiranthes
æstivalis Desv. = Sp. æstiv.
autumnalis Desv. = Sp. autumnalis
repens Raf. = Goodyera rep.
secunda Raf. = prec.
TUSSILAGO III 208 (857)
alba L. = Petasites albus
alpina α L. = Homogyne alp.
alpina β L. = Homog. discolor
alpina Scop. = prec.
androgyna Gilib. = Petas. offic.
australis Guss. (*Farfara*) 208 (b)
Cacalia Scop. = Adenostyles alpina
discolor Jacq. = Homog. disc.
elongata Salisb. = Petas. offic.
Farfara L. 208, A 181
fœminea Ten. (alba) = Petas. albus-subfœm.
fœminea Ten. (Petas.) = Petas. offic.-subfœm.
fragrans Vill. = Petas. fragr.
frigida Vill. (non L.) = Petas. niveus
hermaphrodita Poir., Ten. (Pet.) = Petas. offic.-submasc.
hermaphrodita Ten. (alba) = Petas. albus-submasc.
hybrida L. = Petas. offic.-subfœm.
intermedia Hinterh., Hpe. = Petas. offic.-subfœm.
micrantha Goir. (*Farfara*) A 181 (c)
nivea Vill. = Petas. niv.
odorata Vill. ex DC. = Adenostyles alp.
paradoxa Retz., Hpe. = Petas. niveus-subfœm.
Petasites L. = Petas. offic.-submasc.
racemosa Tausch = Petas. rac.
radiata Gilib. = Farfara
ramosa Hpe. = Petas. albus-subfœm.
riparia Salisb. = Petas. offic.
ruderalis Salisb. = Farfara
rupestris Wall. = prec.
sebethia Ten. = Petas. — seb.
silvestris Scop., Jacq. = Homog. silv.
spuria Retz. = Petas. tomentosus
suaveolens Desf. = Petas. fragr.
TUSSILAGO III 208 (857)
tomentosa Ehrh. = Petas. tomentosus
vulgaris Lam. = Farfara
TYNUS = Viburnum
lauriformis J. S. Presl = V. Tinus
lucidus J. S. Presl = prec.
TYPHA I 144 (145)
ambigua Schur ex Rohrb. = elatior
ambigua Sond. (*latifolia*) 145, A 39 (4 α a)
angustifolia All. = minima
angustifolia Koch = Laxmannii
angustifolia L. 143 (3), A 39
angustif. β L. = minima
angustif. β Sond. = Sonderi
Balansæ Reut. in Rohrb. = Laxmannii
Bungeana Presl = minima
continua Fiori (angustifol.) 145 (3 c) = Sonderi, cfr. A 39
elata Bor. = elatior
elatior Bœnn. = media
elatior Bor. A 39 (4 α c)
elliptica C. C. Gmel. = minima
gracilis Godr. (latif.) = elatior
gracilis Schur = media
inæqualis Kronf. (*angustifol.*) A 39 (3 d)
intermedia Coss. (latif.) = elatior
intermedia Schur = ambigua
juncifolia Celak. = Laxmannii
juncifolia Montand. = minima
latifolia L. 145 (4), A 39
Laxmannii Led. et Auct. = minima
Laxmannii Lepech. A 39 (2)
lugdunensis Chabert = minima
media Barbieri in Rohrb. = Laxmannii
media Gmel. = angustifolia
media Mérat ex Rohrb. = elatior
media Rigo exs. = inæqualis
media Schleich. 145 (3 b)
minima Funk 145 (1)
minor Ambrosi (latif.) = angustif.
minor A. Br. ex Rohrb. (latif.) = Shuttleworthii
minor Curt. = angustifolia
minor Sm. = minima
minuta Schrenk in Rohrb. = Laxmannii
nana Avè-Lall. 144 (1 b)
pendula Fisch. = elatior
remotiuscula Schur A 39 (4 α b)
Shuttleworthii Borb. = angustif.
Shuttleworthii Koch et Sond. 145 (4 β)
Sonderi Kronf. (*angustifol.*) A 39 (3 c)
spathacea Borb. in Kronf. (angustif.) = angustif.
spathulæfolia Kronf. = elatior
stenophylla F. et M. 145 (2) = Laxmannii, cfr. A 39
transsilvanica Schur = Shuttleworthii

Digitized by Google

TYPHOIDES = Phalaris
arundinacea Mœnch = Ph. ar.
TYRIMNUS = Carduus
Cavillieri Briq. (leucographus) = C. — Cavill.
leucographus Cass. = C. leucographus

UDORA = Helodea
canadensis Nutt. = H. canad.
occidentalis Koch p. p. = prec.
verticillata Spr. p. p. = prec.
ULEX II 23 (485)
compositus Mœnch = europ.
europæus L. 23, A 186
floridus Salisb. = europ.
grandiflorus Pourr. = europ.
ligusticus DNtrs. (europ.) 23 (b), A 186
major Thore = europ.
vernalis Thore = europ.
ULINA = Inula
germanica Opiz = I. germ.
hirta Opiz = I. hirta
salicina Opiz = I. salic.
ULMARIA = Spiræa
Aruncus Hill = S. Aruncus
denudata Opiz = S. denud.
Filipendula Hill = S. Filip.
glauca Fourr. = S. glauca
obtusiloba Opiz = S. Ulmaria
palustris Mœnch = S. Ulmaria
pentapetala Gilib. = S. Ulmaria
Spiræa-Ulmaria Hill = S. Ulmaria
ULMUS I 274 (259)
acuta Dum. = pedunculata
alba W. et K. = campestris
americana L. 274 (nota)
angustifolia Mœnch = campestris
campestris L. 274 (2), A 61
carpinifolia Borkh. = campestris
cebennensis Audib. = montana
ciliata Ehrh. = pedunculata
corylacea Dum. = montana
corylifolia Bor. = montana
effusa W. = pedunculata
elliptica C. Koch = campestris
excelsa Borkh. = montana
expansa Rota = montana
foliacea Gilib. = campestris
forficata Presl = montana
germanica Hart. = campestris
glabra Huds. = montana
glabra Mill. 274 (2 c)
glutinosa W. = montana
hollandica Mill. = campestris
hollandica Pall. = montana
latifolia Mœnch = montana
levis Pall. = pedunculata
leucocarpa Schur = montana
leucosperma Schur = montana
major Bert. = campestris
major Sm. A 210 (3 b)
microphylla Goir. (campestr.) A 61 (1 d)
minor Mill. = campestris
montana With. 274 (3), A 210
nana Borkh. = campestris
nemoralis Boiss. = campestris
nemorosa Borkh. = campestris
ULMUS I 274 (259)
nitens Mœnch = glabra
nuda Ehrh. = montana
octandra Schk. = pedunculata
pedunculata Foug. 274 (1)
procera Salisb. = campestris
racemosa Borkh. = pedunculata
reticulata Dum. = pedunculata
sativa Mill. = campestris
scabra Gürke (an Mill.?) = montana
sparsa Dum. = campestris
stricta Lindl. = campestris
suberosa Mœnch 274 (2 b)
surculosa Stokes = campestris
tetrandra Schk. = campestris
tiliæfolia Host = campestris
tortuosa Host = campestris
urticæfolia Audib. = montana
vulgaris Pall. = campestris
ULOSPERMUM = Krubera
dichotomum Lk. = K. peregrina
siculum Lk. = Hippomarathrum sicul.
UMBILICUS = Cotyledon
horizontalis DC. = C. horiz.
pendulinus DC. = C. Umbilicus
simplex C. Koch = prec.
UNCINIA = Carex
europæa J. Gay = C. microglochin
microglochin Spr. = C. micr.
UNEDO = Arbutus
edulis Hoffgg. et Lk. = A. Unedo
UNIFOLIUM = Majanthemum
quadrifidum All. = M. bifolium
URACHNE = Milium
cærulescens Trin. = M. cærul.
comosa Trin. = M. Thomasii
frutescens Lk. = prec.
Linnæi Trin. = M. paradox.
multiflora Lk. = M. multifl.
paradoxa Lk. = M. paradox.
parviflora Trin. = M. multiflorum
Thomasii Steud. = M. Thomasii
trichotoma Trin. = Nasella trichotoma
virescens Trin. = M. — virescens
URGINEA I 188 (189)
fugax Steinh. 188 (2), A 47
insularis Richter (marit.) A 47 (1 c)
litoralis Richter (marit.) A 47 (1 d)
maritima Bak. 188 (1), A 47
Pancration Nym. A 47 (1 b)
Scilla Steinh. = maritima
undulata Steinh. 188 (3)
undulatifolia Batt. et Trab. = prec.
UROPETALUM = Dipcadi
serotinum Ker-Gawl. = D. serotinum
UROSPERMUM III 406 (939)
asperum DC. 406 (1 c)
calabrum N. Terr. (picr.) 406 (1 b)
Dalechampii F. W. Schm. 406 (2)
UROSPERMUM III 406 (939)
Dalechampii β DC., Bert. = integrifol.
glabrescens A. Terr. (picr.) 406 (1 d)
integrifolium Guss. (Dalech.) 406 (2 b)
litorale Fiori (picr.) 406 (1 e)
picroides F. W. Schm. 406 (1)
ruderale Sang. (picr.) = asperum
URTICA I 277 (266)
angustifolia Wedd. (atrovir.) A 61 (6 for.)
atlantica Blume = neglecta
atrovirens Req. 279 (6), A 61
azorica Hochst. = neglecta
balearica L. 278 (1 b)
caudata Vahl = membranacea
cordifolia Mœnch = pilulifera
dioica L. 278 (5), A 61
elegans Chenev. (dioica) A 61 (5 α e)
floribunda Wedd. (atrovir.) A 61 (6 for.)
glabrata Clem. 278 (5 α d)
glabrescens Sæl. (dioica) = glabrata
gracilis Ait. = dioica
grandidentata Moris = atrovirens
hispida DC. 278 (5 α c)
hispidula Cariot = hispida
horrida Wk. et Lge. (membran.) = neglecta
lusitanica Brot. = membranacea
major Kanitz = dioica
membranacea Poir. 278 (2)
minor Lam. = urens
monoica Gilib. = urens
nebrodensis Gasp. in Guss. = hispida
neglecta Guss. 278 (2 b)
ovalifolia Stokes = urens
pilulifera L. 278 (1)
Pittoni Blume = neglecta
pubescens Ledeb. 278 (5 α b)
quadristipulata Dulac = urens
rupestris Guss. 278 (4)
sicula Gasp. in Guss. 278 (5 β)
submitis Boiss. = pubescens
urens L. 278 (3), A 61
USTERIA = Scilla
disperma Medic. = S. patula
hyacinthiflora Medic. = S. nonscripta
secunda Medic. = prec.
UTRICULARIA III 88 (812)
dubia Rosellini 89 (nota)
intermedia Hayne 89 (2)
major Schmidel = neglecta
media Schum. = prec.
minor L. 89 (1), A 175
minor Thuill. = intermedia
neglecta Lehm. 89 (3 β)
vulgaris L. 89 (3)
UVA-URSI = Arctostaphylos
alpina S. F. Gray = A. alp.
buxifolia S. F. Gray = A. Uva-ursi
procumbens Mœnch = prec.

Digitized by Google

UVULARIA = Streptopus
amplexicaulis Mill. = seg.
amplexifolia L. = S. amplexif.
distorta Pers. = prec.
perfoliata Georgi (non L.) = prec.

VACCARIA = Saponaria
arvensis Lk. = S. Vaccaria
grandiflora Jaub. et Spach = S. grand.
inclusa Ledeb. = S. Vaccaria?
parviflora Mœnch = S. Vacc.
perfoliata Sweet = S. Vacc.
pyramidata Medic. = S. Vacc.
segetalis Garke = S. Vacc.
sessiliflora Steud. = seg.
sessilifolia Sweet = S. Vacc.
Vaccaria Host = S. Vacc.
vulgaris Huth = S. Vacc.
VACCINIUM II 304 (671)
angulosum Dulac = Myrtill.
buxifolium Gilib. = Vitis-Idæa
ciliatum Gilib. = uliginos.
gaultherioides Bigel. = prec.
leucocarpum Hausm. (*Myrtill.*) A 162 (8 b)
microcarpum Hook. f. = Oxycoccus quadripetal.
Myrtillus L. 305 (3), A 162
nemorosum Salisb. = Vitis-Idæa
Oxycoccos L. = Oxycocc. quadripetalus
palustre Salisb. = prec.
pubescens Wormsk. = uliginos.
punctatum Lam. = Vitis-Idæa
punctifolium Stokes = prec.
rubrum Dulac = prec.
rubrum Gilib. = uliginos.
sednense Pers. = prec.
uliginosum L. 305 (2)
Vitis-Idæa L. 304 (1)
VAILLANTIA III 117 (819)
aculeata Ten. = mural. et hispida
Aparine J. F. Gmel. = Galium tricorne
Aparine Lam. = Gal. Apar.
Aparine L. = Gal. Vaillantia
chersonensis W. = Gal. Cruciata
ciliata Sol. in Russ. = hispida
Cruciata L. = Gal. Cruc.
filiformis Lojac. = hirsuta
filiformis Ten. (non Ait.) = Gal. murale
glabra L. = Gal. vernum
granulata Roth = Gal. reflexum
hirsuta Gilib. = Gal. Cruciata
hirsuta Guss. (*mural.*) 117 (1 b)
hispida Georgi = Gal. Cruciata
hispida L. 117 (2)
intricata Lojac. A 176 (1 for.)
muralis L. 117 (1), A 176
pedemontana Bell. = Gal. pedemontanum
quadriflora Mœnch = muralis
rupestris Lam. = Gal. murale
saccharata C. C. Gmel. = Gal. Vaillantia
Scopolii Bess. = Gal. vernum
tricornis Roth = Gal. tricorne
VAILLANTIA III 117 (819)
spuria Pers. = Gal. tricorne
triflora Lam. = Gal. tricorne
verna G. Don = Gal. vern.
VALANTIA = Vaillantia
VALARUM = Sisymbrium officinale Schur = S. offic.
VALERIANA III 131 (828)
affinis Opiz = dioica
alpina Ten. (mont.) = cuspidata
altissima Horn. = exaltata
ambigua Gr. et Godr. (*mont.*) 133 (6 α c)
amœna Salisb. = tripteris
angustifolia Mill., All. = Centranth. angustifol.
angustifol. Tausch = tenuifol.
angustifolia Uecht. (*excelsa*) 132 (1 δ b)
annua S. F. Gray = Centranth. Calcitrapa
bulbosa Pall. = tuberosa
calabra Ten. (offic.) = tenuifolia
Calcitrapa L. = Centranth. Calcitrapa
celtica L. 134 (9)
celtica Vill. = saliunca
collina Wallr. = tenuifolia
compacta Opiz = dioica
coronata L. (Locusta) = Valerianella coron.
coronata Mill. = Valerianella discoidea
coronata Salisb., Moric = Valerianella coronata
Cornucopiæ L. = Fedia Corn.
cuspidata Bert. (*mont.*) 133 (6 β)
cuspidata DC. = prec.
dentata All. = Valerianella dentata
dioica Ces. P. et G. (Phu) = dioica
dioica L. 132 (5)
Dioscoridis S. et S. = italica
discoidea L. (Locusta) = Valerianella disc.
discoidea W. = prec.
echinata L. = Valerianella echinata
elongata L. 133 (7)
eriophylla Ledeb. (tuber.) = Phu
exaltata Baumg. = excelsa
exaltata Mikan 131 (1 γ)
excelsa Poir. 132 (1 δ)
florida Salisb. = Centranth. ruber
heterophylla Baumg. = tripteris
Hoppii Rchb. = tripteris
hortensis Lam. = Phu
incrassata Bory et Chaub. = Valerianella eriocarpa
intermedia Vahl 133 (5 β)
italica Lam. 134 (nota)
læta Salisb. = Phu
levigata Stokes = Phu
Locusta L. = Valerianella sp. plur.
Locusta Ucria = Fedia Cornuc.
VALERIANA III 131 (828)
major Ces. P. et G. (Phu) = Phu
major Pall. = officinalis
media Koch (offic.) = offic. (α)
minima Goir. (mont.) = minor Ten.
minor Goir. (*tripteris*) A 177 (5 α b)
minor Koch (offic.) = tenuifolia
minor Ten. (*mont.*) 133 (6 α b)
mixta L. = Valerianella dentata?
monandra Vill. = Centranthus angustifol.
monorrhiza Dufr. = tuberosa
montana L. 133 (6)
Morisonii M. et K. = Valerianella dentata
multiceps Wallr. = exaltata
officinalis L. 131 (1), A 177
olitoria W., All. = seg.
olitoria L. (Locusta α) = Valerianella olit.
orbiculata S. et S. = Centranthus orbic.
parviflora Avé-Lall. (mont.) = minor Ten.
Phu Lap. = montana
Phu L. 132 (4)
pinnata Gilib. = officinalis
polygama DC. (elongata) = simplicifol.
procurrens Wallr. = offic. (α)
pubescens Hausm. (*mont.*) 133 (6 α d)
pumila W. = Valerianella pumila
repens Host = officinalis
ringens Salisb. = Fedia Cornuc.
rubra α L. = Centranth. ruber
rubra β L. = Centr. angustif.
saliunca All. 134 (10)
sambucifolia Eichw. = exaltata
sambucifol. Mikan = excelsa
saxatilis L. 133 (8)
saxatilis Vill. = celtica
scrophulariæfolia Pourr. = montana
silifolia C. Koch = italica
silvatica Schmidt 132 (3 α b)
silvestris S. F. Gray = dioica
simplicifolia Kab. = seg.
simplicifolia Rchb. (*dioica*) 132 (β)
sisymbriifolia Urv. = italica
supina DC. = saliunca
supina L. 134 (11)
tenuifolia Vahl (*offic.*) 131 (β)
trinervis Viv. = Centranth. trinervis
tripteris L. 132 (5), A 177
tuberosa L. 132 (2)
tuberosa Sprun. = italica
vesicaria L. (Locusta) = Valerianella vesic.
vesicaria Mill. = prec.
VALERIANELLA III 135 (830)
Auricula DC. = rimosa
brachystephana Bert. 139 (13)
cærulea Eaton et Wright = olitoria

Digitized by Google

VALERIANELLA III 135 (880)
campanulata Biv. = eriocarpa
carinata Lois. 137 (4)
Cornucopiæ Lois. = Fedia Corn.
coronata DC. Fl. Franc. 140 (14)
coronata DC. Prodr. = discoidea
costata Betcke, DC. 137 (3)
cucullata Duf. = eriocarpa
dasycarpa Bég. (dentata) 138 (7 b)
dasycarpa Lk. = dentata
dentata All., Lois. = rimosa
dentata Gouan (Locusta) = echinata
dentata Pollich 138 (7), A 177
dichotoma Gilib. = olitoria
discoidea Lois. 140 (15)
echinata DC. 136 (1)
eriocarpa Desv. 139 (11), A 177
fallax Coss. et Dur. 140 (nota)
gibbosa DC. = costata
hamata DC., Bast. = coronata
hispidiuscula Mérat = dentata
incrassata Nym. = eriocarpa
lasiocarpa Rchb. (Morisonii) = dasycarpa
lasiocarpa Rchb. (olit.) 136 (2 b)
lasiocarpa Somm. (microcarpa) 138 (9 b)
lasiocephala Stev. = coronata
laticuspis Bert. 138 (6 β)
laxiflora Dufr. = rimosa
lejocarpa DC. (Morisonii) = lejosperma
lejocarpa Guss. (mixta) = microc. a. lejoc.
lejocarpa Koch (eriocarpa) 139 (11 b)
lejocarpa Krok (olit.) 136 (2 a)
lejocarpa Lojac. (microcarpa) A 177 (9 a)
lejocarpa Rchb. (dentata) = lejosperma
lejosperma Bég. (dentata) 138 (7 a)
lingulata Presl = dentata
Locusta Betcke = olitoria
membranacea Lois. = pumila (α)
microcarpa Lois. 138 (9), A 177
microcarpa Soy.-Will. = puberula
mixta DC. = microcarpa
mixta Dufr. = dentata
mixta Gib. et Pir. (microcarpa) = microcarpa
Morisonii DC. = dentata
muricata Stev. A 177 (10 for.)
olitoria Pollich 136 (2)
præcox Wk. = carinata
puberula DC. 138 (8)
puberula Rchb. = eriocarpa
pubescens Mérat = dentata
pulchella Fisch. = seg.
pumila DC. 137 (6)
quadrangularis Steud. = carinata
rhombicarpa Aiken = olitoria
rimosa Bast. 137 (5)

VALERIANELLA III 135 (880)
scorpioidea Lojac. (eriocarpa) A 177 (11 for.)
sicula Lk. = discoidea
sphærocarpa DC., Guss. = pumila (α)
striata Stev. = olitoria
tridentata Betcke, Krok = pumila (α)
tridentata Gasp. = laticuspis
truncata Betcke, DC. 139 (10), A 177
truncata Petter = eriocarpa
vesicaria Mœnch 139 (12)
VALLISNERIA I 159
bulbosa Poir. = Sagittaria sag. f. vallisneriifolia et Scirpus maritimus
Jacquini Savi = spiralis
Michelii Savi = spiralis
pusilla Barbieri A 40 (b)
spiralis L. 159
VANDELLIA = Lindernia
erecta Benth. = L. Pyxidaria
Pyxidaria Maxim. = L. Pyxidaria
VELARUM = Sisymbrium
officinale Rchb. = S. offic.
polyceratum Rchb. = S. polyc.
VELEZIA I 374 (845)
rigida L. 375, A 78
sessiliflora Williams (rigida) A 78 (b)
VELLA = Carrichtera
annua L. = C. annua
VENTENATA I 71 (86)
avenacea Kœl. = dubia
bromoides Kœl. = dubia
dubia Coss., F. Schultz 71, A 18
triflora F. Schultz = dubia
VERATRUM I 176 (179)
album L. 177 (1)
Lobelianum Bernh. 176 (1 b)
nigrum L. 177 (2), A 44
virescens Gaud. (album) = Lobelianum
viride Rœhl. = Lobelianum
viridiflorum M. et K. (album) = Lobelianum
VERBASCUM II 407 (749)
alatum Lam. = Thapsus
albiflorum Bég. (phœnic.) 416 (16 b)
albiflorum Bianca (sinuat.) 414 (13 c)
albiflorum Ces. (phlom.) 410 (4 α f)
albiflor. M. Gortani (austriac.) A 168 (15 β b)
albiflor. Murith (nigr.) 415 (14 α e)
album Mill., Mœnch 413 (10 d)
alopecuroides Biv. 417 (nota)
Alopecurus Thuill. 414 (14 α b)
alpinum Turra = Chaixi
angustifolium Ten. 412 (8)
angustius Schrank = Thapsus
annuum Mill. 417 (nota)
anomalum Ces. (phlom.) 410 (4 α c)
argenteum Ten. 417 (nota)
argyrostachyon Ten. 410 (4 γ b)

VERBASCUM II 407 (749)
auritum Franchet = nigr. × Thapsus
australe Franchet (Thapsus) 408 (1 α c)
australe Schrad. 410 (4 β)
austriacum Schott, Schrad. 416 (15 β), A 168
bicolle R. et S. = Thapsus
bicolor Bad. 414 (11 β)
Biebersteinii Bess. = Lychnit.
Blattaria L. 411 (6)
Blattar. × *sinuatum Freyn* 411
Blattarioides Lam. = virgatum
Bœrhaavei L. 413 (11), A 168
boreale Franchet (Thapsus) 408 (1 α a)
bracteatum J. et C. Presl = Lychnitis
bracteosum Posp. (Blattar.) 411 (6 α c)
Brauneanum Wirtg. = thapsif. × Lychnitis
calabricum Thom. et Rich. = angustifol.
calabrum N. Terr. (mont.) 409 (2 b)
canescens Jord. = Thapsus
Chaixi Vill. 415 (15), A 168
Chaixi × *lanatum Borb.* 417 (nota)
Chaixi × *Lychnitis Goir.* 417 (nota), A 168
Chaixi × *pulverulentum Kern.* 417 (nota)
Chaixi × *sinuatum Freyn* 416
Chaixi × *Thapsus Borb.* 416
cisalpinum Bir. = phœniceum
collinum Salisb. = phœniceum
collinum Schrad. 417 (nota)
commutatum Kern. = nigr. × phœnic.
commutatum Ten. 417 (nota)
condensatum Schrad. 410 (4 α e)
conocarpum Moris 414 (12), A 168
cordifolium Stokes = nigrum
crassifolium DC., Schl., Gaud. = montan.
cuspidatum Schrad. 409 (8 β)
decurrens Stokes = Thapsus
densiflorum Bert. 409 (8 β b)
dentatum Lap. = nigrum
denudatum Posp. (thapsiforme) 409 (8 α b)
elongatum Mœnch = Bœrhaavei
elongatum Strobl (Blattar.) 411 (6 α e)
elongatum W. = Thapsus
fallax Tod. exs. (Bœrhaavei) 413 (11 α b)
ferrugineum Andr. (non Mill.) = phœnic.
floccosum W. et K. = pulverul.
floccos. × nigrum Wirtg. = pulverul. × nigrum
floccos. × sinuatum Freyn = pulverul. × sinuat.
fluminense Kern. = Chaixi × pulverul.

Digitized by Google

VERBASCUM II 407 (749)
Freynianum Borb. = Chaixi × Thapsus
gallicum W. = Chaixi
garganicum Ten. 412 (8 β)
geminatum Freyn = Blattar. × sinuat.
giganteum Goir. (*nigrum*) A 168 (14 α g)
glabratum Ten. (*Lychnit.*) 418 (10 b)
glabriusculum Ten. (*sinuat.*) 414 (18 b)
glabrum Mill., Rchb. 411 (6 α d)
glabrum W. = virgatum
grandiflorum Mill. = phlomoides
grandiflorum Poir. = montan.
Gussonei Tin. 412 (9 β)
gymnostemon Rchb. (*Lychnit.*) 418 (10 e)
gymnostemon R. et S. (*nigrum*) 415 (14 α f)
hæmorrhoidale Ait. = pulverul.
heterophlomos Franch. = thapsif. × Lychnitis
heterophyllum Griseb. = garganic.
heterophyllum Moretti = pulverulent.
Humnickii Franch. = Thapso × thapsiforme
hybridum Brot. = pulverul. × sinuat.
ilvense Somm. (Bœrhaavei) = longebracteatum
intermedium Franchet (*Thapsus*) 408 (1 α b)
interruptum Zersi (*phlom.*) 410 (4 α d)
italicum Moric. = phlomoides
Kickxianum Dum. = thapsiforme
lanatum Gilib. = Thapsus
lanatum Schrad. 415 (14 γ)
lanceolatum Kit. = virgatum
laxiflorum Presl = pulverul.
leucanthemum Duf. = album
Linnæi Opiz, Pfund = Thapsus
longebracteatum Lor. et Bar. (*Bœrhaavei*) 418 (11 α c)
longifolium Ten. 410 (5)
luridum Salisb. = Blattaria
luteum Mill. = Bœrhaavei
Lychnitis L. 418 (10)
Lychn. × *montan. Chenev.* A 168
lyratum Lam. = Celsia cretica
lyratum Pourr. = nigrum
macranthum Hoffgg. et Lk. = phlomoides
macrurum Ten. = Thapso × thapsiforme?
magellense Ten. 417 (nota)
majale DC. = Bœrhaavei (α)
maximum Pasq. (*rotundifol.*) 414 (11 γ b)
messanense Tin. 417 (nota)
micranthum Moretti 418 (10 c)
micropus Caruel (Blattar.) = repandum et virgatum
mixtum Ram., Lois. = nigr. × Lychnitis
VERBASCUM II 407 (749)
Mœnchii Schultz = album
monspessulanum Pers. = Chaixi
montanum Schrad. 409 (2)
mont. × *Lychnitis Gib. et Pir.* 409
mont. × *Thapsus Chenev.* A 168
Myconi L. = Ramondia Myconi
nanum Ten. (*phlom.*) 410 (4 α g)
neglectum Guss. 408 (1 α d)
nemorosum Schrad. 410 (4 α b)
nigrum L. 414 (14), A 168
nigro × floccosum Dœll = nigro × pulverulent.
nigro × *Lychnitis Schiede* 415, A 168, 215
nigro × *phlomoides R. Kell.* A 168
nigro × phœniceum Schiede = phœn. × nigrum
nigro × *pulverulentum Bég.* 418
nigro × *thapsiforme Fr.* 415, A 168
nigro × *Thapsus Fr.* 415
nitidum Stokes = Blattaria
niveum Guss. = garganic.
niveum Ten. 412 (7)
obtusum Zersi (*nigrum*) 415 (14 α c)
officinarum Crantz = Thapsus
orchideum Host = nigrum
orientale All. = Celsia orient.
orientale Auct. it. (non M. B.) = austriacum
orient. Vis. (nigrum) = prec.
ovatum Schrad. = nigrum
pallidum Cald. (Blattar.) = glabrum
pallidum Nees = Thapsus
parisiense Thuill. 415 (14 α d)
parvoflore Gilib. = Lychnitis
phlomoides Gouan, All., S. et S. = Bœrhaavei
phlomoides L. 410 (4)
phlomoides Spr. = montan.
phlomoides Thuill. = pulverul.
phœniceum L. 416 (16), A 168
phœnic. × *nigrum F. W. Schultz* 417
pinnatifidum Zersi (*Blattar.*) 411 (6 α b)
plantagineum Moris 408 (1 β)
pulverulentum Salisb., M. B. = Lychnitis
pulverulentum Spr. = phlomoides
pulverulentum Vill. 412 (9)
pulverul. × *nigrum Bég.* 418
pulverul. × *orientale Gelmi* 412
pulverul. × *phlomoides Gelmi* 418
pulverul. × *sinuatum Bég.* 418, A 168
puniceum Schrad. = phœniceum
ramigerum Lk. = thapsiforme × Lychnit.
ramosissimum Poir. (non DC.) = Lychnit.
VERBASCUM II 407 (749)
ramosum Groves (*Thapso* × *thapsiforme*) 408 (b)
ramosum Lasch (*Thapsus*) 408 (1 α f)
repandum W. 411 (6 γ)
rhombifolium Stokes = Lychnitis
rotundifolium Guss. = fallax
rotundifolium Ten. 414 (11 γ)
rotundifol. β Bert. = fallax
rubiginosum Re (non Alior.) = nigrum
rubiginosum W. et K. = nigr. × phœnic.
rugulosum W. = phlomoides
samniticum Ten. 410 (4 β b)
saxatile Salisb. = phlomoides
scabrum Presl = sinuatum
Schiedeanum Koch = nigr. × Lychnit.
Schraderi G. F. W. Mey. = Thapsus
semialbum Chaub. = nigr. × Thapsus
semilanatum Borb. = Chaixi × lanat.
seminigrum Fr. = nigr. × Thapsus et nigr. × thapsiforme
siculum Strobl (rotundifol.) = fallax
siculum Tod. = repandum?
simplex Lasch (*Thapsus*) 408 (1 α e)
sinuatum L. 414 (13)
sinuat. × Blattaria Gr. et Godr. = Blatt. × sinuat.
sinuat. × *Bœrhaavei Ces.* 414
sinuat. × pulverulentum Noulet = pulver. × sinuat.
spectabile Salisb. (non M. B.) = Thapsus
spurium Koch = Thapso × Lychn.
thapsiforme Schrad. 409 (3)
thapsif. × *Lychnit. Schiede* 410
thapsoides Comolli = thapsiforme
thapsoides Vill., All. = phlomoides
thapsoides W. (non L.) = thapsiforme × Lychnit.
Thapsus L. 408 (1)
Thaps. × *Lychnitis M. et K.* 409
Thaps. × *nigrum Schiede* A 168
Thaps. × *thapsiforme Schrad.* 408
thyrsoideum Host 415 (14 β)
tomentosulum Freyn = Chaixi × sinuat.
tomentosum Lam. = phlomoides
Tommasinianum Freyn = Chaixi × lanat.
triste S. et S. = phœniceum
undulatum M. B., Friv. = sinuatum
urticæfolium Lam. = nigrum
ustulatum Celak. = nigr. × phœnic.

Digitized by Google

VERBASCUM II 407 (749)
villosum Bernh. = nigrum
viminale Guss. 410 (4 γ)
virens Host = austriacum
virescens Strobl (siculum) = fallax
virgatum Stokes in With. 411 (6 β)
viscidulum Pers. = prec.
Weldenii Braun ex Moretti = album
Wirtgeni Franch. = pulverul. × nigrum
VERBENA III 84 (808)
albiflora Strobl (offic.) 84 (1 d)
altissima Goir., 1904 (offic.) = montana
capitata Forsk. = Lippia nodiflora
citriodora Cav. = Lippia citr.
cuneata W. = Lippia nodifl.
erecta Bég. (supina) 85 (2 b)
fragrans Salisb. = Lippia citriodora
montana Goir. (offic.) 84 (1 c)
nodiflora L. = Lippia nod.
officinalis L. 85 (1)
procumbens Forsk. = supina
prostrata Gr. et Godr. (offic.) 84 (1 b)
radicans Mœnch = seg.
repens Bert. = Lippia rep.
sarmentosa W. = Lippia sarm.
spicata Gilib. = officinalis
spuria L. = officinalis
supina L. 85 (2)
supina b Guss. = erecta
triphylla L'Hér. = Lippia citriodora
VERBESINA = Eclipta
alba L. = E. alba
VERINEA = Asphodelus
fistulosa Pomel = A. fistul.
tenuifolia Pomel = A. tenuif.
VERONICA II 433 (759)
abrotanifolia Stokes = bipinnatifida?
acinifolia L. 440 (21)
acinifol. W. = præcox
acinifol. A Ten. = elatior Bég.
acinifol. B Ten. = pygmæa
acutiflora Lap. 436 (9 c)
acutifolia Gilib. = Anagallis
agrestis Gouan. = didyma
agrestis L. 442 (29)
albiflora Bolzon (persica) 442 (28 b)
albiflora F. Sacc. (Chamædr.) 435 (7 f)
Allionii F. W. Schm. = offic.
Allionii Vill. 436 (10)
alpestris Goir. (arvens.) = nana
alpina L. 440 (20)
alpina Ten. (Beccab.) 434 (8 c)
alpina Ten. (serpyll.) = tenella
alpina A Ten. = glabra Bèg.
alpina B Ten. = hirsuta Bég.
alternans Moris (Beccab.) 434 (8 d)
alternifolia Laj. 438 (15 α f)
amethystina W. = spuria
Anagallis L. 434 (4)
Anagall. × Beccabunga Neilr. = ovalis
VERONICA II 433 (759)
anagalloides Guss. 435 (5)
anagalloid. b. Guss. = pubescens
angustifolia Bernh. = austriaca
angustifol. S. F. Gray = scutellata
apennina Tausch 439 (nota)
aphylla L. 437 (13)
aquatica Bernh. (Anagall.) 434 (4 α c)
aquatica S. F. Gray = Anagallis
arbustulosa Hoffgg. = fruticulosa
arguta Moretti (non R. Br.) = spicata
arguta Schrad. = longifolia
arvensis L. 441 (24)
australis Schrad. = spicata
austriaca L. 435 (6 γ)
autumnalis Wk. et Lge. (didyma) 442 (29 β b)
azurea Lk. = longifolia
Barrelieri Schott 438 (15 α b)
Barrelieri Sch. Bip. = spicata
Bastardi Bor. = vestita
Beccabunga L. 434 (8), A 169
Bellardi All. 441 (24 α c)
bellidioides L. 440 (19), A 169
bibarbata Stokes = Chamædr.
bipinnatifida Koch (austriaca) 435 (6 γ c)
Bonarota L. 434 (2)
Bonar. × lutea Prohaska 434
borealis Læst., Rchb. 439 (18 β c)
Brachtii Opiz = longifolia
brachyphylla Schult. = spicata
brachysepala Sch. Bip. = Teucrium
brachystyla Rehm. = prec.
brevicaulis Tausch = prec.
brevifolia Lk. 438 (15 α g)
brevipedunculata Gilib. = arvensis
brevistyla Moris 440 (22), A 169
Buxbaumi Ten. = persica
calycida Fr. = agrestis
campestris Schmalh. (verna) = Dillenii
campestris Schmalh. = prec.
canescens Bast. (non Schrad.) = vestita
canescens Presl = prostrata
capitulata Poir. = spuria
carnea Vitm. = alpina
carnosula Lam. = peregrina
Chamædryfolia Bég. (Bonarota) 438 (2 b)
chamædryoides Bory et Chaub. 435 (7 e)
Chamædrys L. 436 (7)
chamæpithyoides Desf. = verna
chamæpithyoides Lam. = digitata
Chamæpitys Pers. (non Gris.) = verna
ciliata Schloss. et Vukot. = acinifolia
Clusii Schott, Host = spicata
collina Opiz = triphyllos
commutata Seidl = longifolia
VERONICA II 433 (759)
complicata Hoffm. = longifol.
confusa R. et S. = longifol.
coniosperma Wallr. = acinifol.
connata Raf. = scutellata
Crantzii Schult. = orchidea
crassifolia Kit. = prec.
crenulata Hoffm. = longifol.
cristata Bernh. = orchidea
cuneata Guss. 443 (31 γ)
cuneata Zersi (offic.) 436 (9 d)
Cymbalaria Bodard 442 (31)
Cymbal. γ Parl. = integrifol. Bég.
cymbalarifolia Schm. (non Vahl) = præstabilis
decipiens Nic. 443 (nota)
deflectens Krock. = Chamædr.
dentata Koch (austriaca) = austriaca (a)
dentata Schm. = austriaca
depauperata W. et K. = aphylla
didyma Ten. 442 (29 β), A 169
digitata Lam. = triphyllos
digitata Vahl 443 (nota)
Dillenii Crantz 28 (β)
divaricata Tausch = Chamædr.
elata Host = longifolia
elata R. et S. (Anagall.) 434 (4 α b)
elatior Bég. (acinifol.) 440 (21 a)
elatior Ehrh. = longifolia
elegans DC. = spuria
elongata Ten. (arvensis) 441 (24 α e)
fagicola G. Beck (Chamædr.) = nemorosa
filiformis DC. (non Sm.) = persica
fistulosa Krock. = longifol.
flexuosa Host et Moretti = prec.
florida Salisb. = Teucrium
florida Schm. = Chamædr.
fontana W. = serpyllifol.
fontinalis Salisb. = Beccabunga
frutescens Scop. = fruticulosa
fruticans Jacq. 438 (16 β), A 169
fruticosa Wulf. = seg.
fruticulosa L. 438 (16), A 169
galeopsifolia Gilib. = spicata
Gebhardiana Vest = alpina
geniculata Host = longifol.
glabra Bég. (alp.) 440 (20 a)
glabra Ehrh. = spuria
glabra Schrad. = longifolia
glabriuscula Freyn (Cymbal.) 442 (31 α c)
glandulifera Opiz = spicata
Gouani Moretti = Ponæ
grandifolia Vest = alpina
Guentheri Opiz = officin.
hederæfolia L. 442 (30), A 169
hederæfol. β L. = Cymbal.
herniarioides Pourr. = alpina
hirsuta Bég. (alp.) 440 (20 b)
hirsuta Hopk. = officin.
hirsuta Lucé = arvensis
hirsuta Vukot. = acinifolia
hirsutissima Opiz = Chamædr.
holocarpa Ces. P. et G. (aphylla) = nudicaulis
hortensis Opiz = Chamædr.

Digitized by Google

VERONICA II 433 (759)
hospita M. et K. = persica
Hostii Moretti = maritima
humifusa Dicks. = serpyllifol.
humilis Ten. (*arvensis*) 441 (24 α f)
hybrida L. = spicata
hybrida M. B. = orchidea
incarnata Stokes = longifol.
incisa Sol. in Ait. = spuria
integrifolia Bég. (*Cymbal.*) 442 (31 α b)
integrifolia Opiz = Teucrium
integrifolia Schrank 440 (20 c)
intermedia Sternb. = Chamædr.
intermedia N. Terr. = ovalis
Jacquinii Baumg., Schott = pinnatifida
laciniata Mœnch = austriaca
lamiifolia Hayne = Chamædr.
lanceolata Opiz = officin.
lancifolia Koch (spicata) = alternifolia
Lappago Schrank = hederæf.
latifolia Goir. (*offic.*) 436 (9 b)
latifolia Koch (*spicata*) 438 (15 α e)
latifolia L. hb. = Teucrium
latifolia L. Sp. = urticæfolia
levis Lam. = peregrina
limosa Lej. (*Beccab.*) A 169 (3 for.)
Linneana Vis. (agrestis) = agrestis (α)
lilacina Towns. = Townsendi
limosa Lej. = Beccabunga
longepedunculata Gilib. = agrestis
longifolia Crantz = spicata
longifolia L. 437 (14)
longifolio-repens Gilib. = Anagallis
longipes Jord. et Fourr. = Cymbalaria
longistyla Ball 437 (13 β)
longistyla Ces. P. et G. (verna) 440 (23 b) = Dillenii
lutea Wettst. 433 (1)
luteo × Bonarota Prohaska 438
lutetiana Schult. = Teucrium
luxurians Goir. (officin.) = spadana
major Bég. (*Teucrium*) 435 (6 α b)
major Presl = serpyllifol.
major Rchb. (*spicata*) 438 (15 α c)
major Schrad. (latifolia) = major Bég.
marilandica Murr. = peregrina
maritima L., Rchb. 437 (14 α c)
maxima Mill. = urticæfolia
media Lej. = spicata
media Schrad. 437 (14 α b)
menthæfolia Schott = spicata
micrantha Hoffgg. et Lk. = Chamædrys
microphylla Kit. = serpyllifol.
minor Bég. (*Teucrium*) 435 (6 α c)
minor Gr. et Godr. (offic.) = acutiflora

VERONICA II 433 (759)
minor Parl. (*panormit.*) 443 (31 β b)
minor Rchb. (*spicata*) 438 (15 α d)
minor Schrad. (latifolia) = minor Bég.
minor Vahl = Anagallis
mollis Zea = Chamædr.
mollissima Horn., Lk. = prec.
montana L. 437 (12)
montana N. Terr. (Beccab.) = alpina Ten.
montana N. Terr. (*hederæfol.*) 442 (30 b)
Muelleriana Vest = officin.
multifida Jacq. = austriaca
multifida L. = bipinnatifida?
nana Lam. (*arvensis*) 441 (24 α d)
neglecta Schm. = serpyllifolia
Neilreichii Celak. = ovalis
nemorosa W. et K. (*Chamædr.*) 435 (7 d)
Nenningii Opiz = longifolia
nitens Host 438 (15 β)
nitidula Rchb. = agrestis
normalis Gr. et Godr. (Teucr.) = minor Bég.
nudicaulis Lam. 437 (13 γ)
nummulariæfolia Thuill. = serpyllifol.
nummularioides Lec. et Lam. (serpyll.) = tenella
obscura Dum. = agrestis
ocymifolia Thuill. = præcox
officinalis L. 436 (9), A 169
officinarum Crantz = prec.
oppositifolia Gilib. = spicata
orchidea Crantz 438 (15 γ)
orientalis W. (non Mill.) = austriaca
Orsiniana Ten. = prostrata
ovalis Vis. (*Anagall.*) 434 (4 β)
Pacheri Prohaska = Bonarota × lutea
pallescens Gater. = peregrina
palmatiloba Miég = verna
palustris Salisb. = Anagallis
paniculata W. (non L.) = Teucrium
pannonica Mill. = orchidea
panormitana Tin. 443 (31 β)
parmularia Poit. et Turp. = villosa
pauciflora N. Terr. (Chamædr.) = nemorosa
pedunculata Vahl = Chamædrys
peregrina L. 441 (25), A 169
persica Poir. 442 (28)
peruviana W. = peregrina
petiolaris Lap. = longifolia
Pettersii Opiz = prec.
pilocarpa Lk. = bipinnatifida
pilosa Schm. (*an L.?*) 435 (7 b)
pinnatifida Koch (*austriaca*) 435 (6 γ b)
pinnatifida Lam. = verna
pinnatifida Pohl = pinnatifida
plicata Pohl = Chamædr.
polita Fr. = didyma
pollinensis N. Terr. (*serpyllifolia*) 439 (18 β b)

VERONICA II 433 (759)
polyanthos Thuill. 441 (24 α b)
polygonoides Lam. = verna
polymorpha W. = pinnatifida
polystachya F. Sacc., M. Gort. (*spicata*) 438 (15 α h)
Ponæ Gouan 439 (17)
præcox All. 441 (27), A 169
præstabilis G. Beck (*hederæf.*) A 169 (30 c)
prætutiana Moretti = offic.
pratensis Crantz = prostrata
procera W. et K. 435 (7 c)
procerior Presl = verna
prostrata L. 435 (6 β)
prostrata S. et S. = Teucrium (α)
pseudo-arvensis Tin. 441 (24 β)
Pseudo-chamædrys Jacq. = Teucrium (α)
pubescens Bég. (*anagalloid.*) 434 (5 b)
pubescens Benth. (Anagall.) = elata
pubescens Koch (scutellata) = villosa
pulchella Bast. = agrestis (α)
pulchella Salisb. = Chamædr.
pumila All. 440 (20 d)
pumila Goir. (arvensis) = nana
pusilla Benth. 434 (4 γ)
pusilla Bert. (triphyllos) = brevistyla
pusilla Goir. (*præcox*) A 169 (27 α b)
pygmæa Bég. (*acinifol.*) 440 (21 b)
pygmæa Schrank = alpina L.
pyrenaica All. = Allionii
quadrifolia Schk. = longifol.
quinquefida Gilib. = triphyllos
repens All. = Allionii
repens Boiss. = apennina
repens DC. 439 (18 γ)
repens Gilib. = officinalis
Revelieri Briq. (*verna*) A 215 (23 c)
Richardii Tin. (Anagall.) = pusilla
riparia Seidl. = longifolia
romana All. = verna
romana L. = peregrina
romana Schm. = arvensis
romana Scop. = præcox
rosiflora Evers (polita) = seg.
rosiflora Fiori (*didyma*) A 169 (27 β c)
rotundifolia Gilib. = Beccabunga
rotundifolia Lucé = serpyllif.
rotundifolia Schrank 440 (20 e)
rotundifolio-erecta Gilib. = Anagallis
ruderalis Vahl = serpyllifol.
Rudolphiana Hayne = Chamædr.
rupestris Salisb. = fruticulosa
satureiæfolia Poit. et Turp. = prostrata
saxatilis Scop., L. f. = fruticans
Schmidtii Pohl = Chamædr.
Schmidtii R. et S. = austriaca
Schreberi Baumg. = longifol.

Digitized by Google

VERONICA II 438 (759)
Schreberiana Rchb. = prec.
scutellata L. 436 (11)
segetalis Pers. = præcox
sempervirens Lam. = Ponæ
serpyllifolia Bourg. = apennina
serpyllifolia L. 439 (18)
setigera D. Don = officin.
spadana Lej. A 169 (9 f)
spicata L. 438 (15)
spicato-racemosa Gilib. = serpyllifol.
spuria Crantz, S. et S. = longifolia
spuria L. 437 (14 β)
squamosa J. et C. Presl 438 (15 α i)
stenophylla Rchb. (*fruticul.*) 438 (16 α b)
Sternbergiana Bernh. = nitens
subacaulis Lam. = aphylla
subbiscutata Crantz = montana
succulenta All. = Dillenii
tenella All. 439 (18 β)
tenella Jan = anagalloides
tenella Negri (*Beccab.*) 434 (3 b)
tenella Viv. = repens
tenerrima Schm. = ovalis
Tenoreana Vis. (agrestis) = didyma
tenuifolia M. B. = pinnatifida
tenuis Led. 434 (5 c)
ternifolia Opiz = seg.
Teucrium Brot. = Chamædr.
Teucrium L. 435 (6), A 169
Teucrium Pollich = urticæfol.
Teucrium Savi = prostrata
ticinensis Pollini = maritima
Tournefortii C. C. Gmel. (non Vill.) = persica
Tournefortii Schm. 436 (9 e)
Townsendi Dalla Torre = seg.
Townsendi Gremli (*bellidioid.*) A 169 (19 b)
trichocarpa Schult. = bipinnatifida
trifida Gilib. = verna
triloba Opiz = hederæfolia
triphyllos Gouan = verna
triphyllos L. 441 (26)
uliginosa Raf. = scutellata
urticæfolia Jacq., L. f. 436 (8)
Vaillantii Rchb. = spicata
verna L. 440 (23), A 215
vernalis Wk. et Lge. (*didyma*) 442 (29 β a)
versicolor Drej. = agrestis
verticillata Gilib. = longifol.
vestita Gr. et Godr. (*Teucrium*) A 169 (6 α d)
villosa Schum., Steud. 436 (11 b)
villosa Wormsk. = alpina
villosiuscula Krock. = serpyllifol.
viridis Presl = prostrata
viscida Waldst. = præcox
viscosa Gr. et Godr. (fruticul.) = fruticul. (α)
viscosa Kit. = præcox
vulgaris Koch (*longif.*) 437 (14 α a)

VERONICASTRUM = Veronica
alpinum Fourr. = V. alpina
dentatum Opiz = V. Teucrium
incisum Mœnch = V. spuria
laciniatum Mœnch = prec.
latifolium Opiz = V. latifol.
prostratum Opiz = V. prostrata
serpyllifolium Fourr. = V. serpyll.
VERONICELLA = Veronica
Chamædrys Fourr. = V. Cham.
urticæfolia Fourr. = V. urtic.
VESICARIA I 460 (896)
Barrelieri Parl. = græca
deltoidea Poir. = Aubrietia delt.
edentula Poir. = Alyssum edentulum
gemonensis Poir. = Alyssum petræum
græca Reut. 460 (β)
incana Desv. = Alyssum inc.
microcarpa Vis. = Alyssum petræum
sinuata Cav., Poir. = Alyssum sinuatum
utriculata Auct. it. pl. = græca
utriculata DC. 460
VIBO = Emex
spinosa Medic. = E. spin.
VIBORGIA = Cytisus
purpurea Mœnch = C. purpurea
supina Mœnch = C. supin.
VIBURNUM III 126 (825)
edule Raf. = Opulus
farinosum Stokes = Lantana
glandulosum Salisb. = Opulus
hirsutum Pasq. et Avell. (Tinus) = hirtum
hirtum Ait. 126 (1 a)
hiemale Salisb. = Tinus
Lantana L. 126 (2), A 176
laurifolium C. Koch = seg.
lauriforme Lam. = Tinus
lentum St.-Lag. = Lantana
lobatum Lam. = Opulus
lucidum Mill. 126 (1 c)
mespilifolia Murr (*Lantana*) A 176 (2 b)
opuloides Muhl. = seg.
Opulus L. 127 (3)
pallidum Salisb. = Lantana
roseum L. (*Opulus*) 126 (3 b)
roseum Steud. = prec.
sterilis DC. (Opulus) = roseum
Tinus L. 126 (1)
tomentosum Lam. = Lantana
virgatum Ait. 126 (1 b)
VICIA II 108 (517)
adriatica Freyn (*cassub.*) 116 (23 β)
ætnensis Fiori (*Cracca*) 117 (25 γ)
ætnensis Guss. (Candolleana) = prec.
agrigentina Lk. = leucantha
alba Guss. (*Pseudo-cracca*) 118 (27 η c)
alba Medic. = seg.?
alba Mœnch 111 (11 α b)
albicans Lowe = atropurp.
albiflora Freyn (*cordata*) 112 (11 θ c)

VICIA II 108 (517)
albiflora Goir. (*angustifol.*) A 144 (11 μ c)
albiflora Goir. (*dasycarpa*) A 144 (27 β d)
albiflora Rouy (*dumetorum*) 114 (17 b)
albiflora Rouy (sativa) = alba
alpina Verlot (*Cracca*) A 144 (25 α for.)
altissima Desf. 114 (16), A 144
ambigua Guss. 118 (27 γ)
amphicarpa Dorthes 112 (11 ξ)
amphicarpa Goir. (*lutea*) A 144 (8 α c)
amphicarpos Gouan = Lathyrus — heterocarpus
angulata Bout. = monantha
angulosa Gater. = bithynica
angustifolia Goir. (*bithynica*) A 144 (14 c)
angustifol. Koch (sepium) = montana)
angustifolia L., Reich. 112 (11 μ), A 144
angustifol. Mœnch = monantha
angustifol. Rouy (peregrina) = leptophylla
angustifol. Rouy (villosa) = Boissieri
anomala Bœnn. = sepium
apennina N. Terr. = dumetor.
aquitanica Clav. = atropurp.
argentea Lap. 115 (21)
articulata W. (non Horn.) = multifida
atropurpurea Desf. 117 (26), A 144
australis Ten. 117 (25 β b)
Barbazitæ Ten. et Guss. 111 (9 β)
benghalensis L. = atropurp.?
Biebersteiniana Koch (grandiflor.) = seg.
Biebersteinii Bess. A 144 (9 α c)
biflora C. A. Mey. (non Desf.) = monantha
biflora Webb et Berth. = atropurp.
biloba E. Petit (cordata) = cordata
bithynica L. 114 (14), A 144
Bivonæ Ser. in DC. = litoralis
Bivonæ Ten. = Rosani
Bivonea Raf. = leucantha
Bobartii E. Forst. = angustifolia
Boissieri Heldr. et Sart. 118 (27 α c)
Broteriana Ser. = atropurp.
cærulea Arc. (lutea) = rubida
cærulescens Strobl (Pseudocracca) = Ps.-cracca (a)
calcarata Desf. = monantha
calcarata Moris = triflora
campestris Schur = sativa
Candolleana Ten. = incana
canescens Guss. ex Lojac. (cassub.) = villosa Celak.
canescens Vis. (*cordata*) 112 (11 θ b)
cassubica L. 116 (23)
cinerea M. B. = monantha
communis Rouy = sativa

Digitized by Google

VICIA II 108 (517)
consentina Rchb. = Pseudo-cracca
consentina Spr. 117 (25 δ)
cordata Guss., Cald = linearis
cordata Wulf. 112 (11 θ), A 144
cordifolia Spr. = prec.
corsica Nym. 121 (33 β)
Cosentini Guss. 112)11 ε)
Cracca L. 116 (25), A 144
cuneata Gr. et Godr. = heterophylla
cuneata Guss. 112 (11 κ)
dasycarpa Ten. 118 (27 β), A 144
dentata Fisch. = dumetorum
desertorum Lk. = dumetor.
disperma DC. 121 (33), A 145
disperma Fiori (Lens) 122 (35 α b)
diversifolia Strobl (sativa) A 144 (11 var.)
dubia Rouy (disperma) 121 (33 β b)
dumetorum L. 114 (17)
dumetorum Thuill. = montana
elegans Guss. 117 (25 ζ)
elongata Guss. (dasycarpa) 118 (27 β c)
equina Pers. (Faba) A 144 (1 b)
equina Steud., Rchb. = prec.
eriocarpa Fiori (tetrasperma) 120 (31 α b)
eriocarpa Rouy (gemella) = prec.
eriocarpa Rouy (gracilis) 120 (31 γ d)
eriocarpa Strobl (Lenticula) = Lenticula (a)
Ervilia W. 121 (34)
ervoides Hampe = pubescens
esculenta Salisb. = Faba
exstipulata S. G. Gmel. = Lathyrus Aphaca
Faba L. 109 (2), A 144
Faba β L. = equina
fallax Loret (angustifol.) = angustifol.
Fischeri Steud. = dumetorum
flaccida Biv. = grandiflora?
fœtens Gilib. = silvatica
Fontanesiana Ten. = stabiana
Forsteri Jord. 112 (11 λ b)
frutescens Gilib. = cassubica
galloprovincialis Poir. = incana
gemella Crantz = tetrasperma (α)
Gerardi All., Vill. = incana
Gerardi Jacq. = multiflora
Giraudiasi Rouy = nemoralis
glabrata Guss. (lathyroid.) 113 (12 b)
glabrescens Heimerl = seg.
glabrescens Koch (villosa) = dasycarpa
glabriuscula Ser. (cassub.) = cassubica (α a)
glauca Presl 115 (20)
Godroni Rouy 118 (27 α)
gracilis Guss. (dasycarpa) 118 (27 β b)
gracilis Lois. 120 (31 γ)
grandiflora Scop. 111 (9)
VICIA II 108 (517)
Gussonii Ces., P. et G. (hirta) = rubida
Halleri Crantz = silvatica?
heterocarpa Goir. (lutea) = amphicarpa Goir.
heterophylla Presl 112 (11 ι), A 144
heterophylla Rchb. = intermedia
hirsuta S. F. Gray 120 (32), A 145
hirsutissima Cyr., Ten. 111 (8 β b)
hirta Balb. 111 (8 β)
hirta Ten. = hirsutissima
hirta β Guss. = rubida
hybrida Huds. = lutea
hybrida L. 110 (6), A 144
imbricata Gilib. 116 (25 α), A 144
incana Lam. = atropurpurea
incana Vill. 117 (25 β)
intermedia Strobl (narbon.) 109 (3 β b)
Kitaibeliana Koch (grandifl.) = sordida
Kitaibeliana Schur = prec.
Kitaibelii Rchb. 116 (25 α b)
læta Ces. = Barbazitæ
lathyroides All. = angustifol.
lathyroides L. 113 (12), A 144
latifolia Lge. (tenuifol.) = polyphylla
latifol. Mœnch = narbonens.
latifol. Rouy (peregrina) = megalosperma
latifol. Rouy (villosa) = Reuteriana
laxiflora Boiss. = elegans
laxiflora Brot. 120 (31 γ b)
lejocarpa Rouy (hirsuta) = Terronii
lejocarpa Rouy (pubescens) 120 (31 δ b)
lejocarpa Strobl (Lenticula) = uniflora
Lens Coss. et Germ. 121 (35)
Lenticula Arc. 122 (36)
lentoides Coss. et Germ. 122 (35 β)
leptocarpa Bianca A 144 (11 var.)
leptophylla Raf. 111 (10 b)
leucantha Biv. 120 (30), A 144
leucosperma Mœnch (111 α c)
linearis Lge. (sativa) 112 (11 δ)
linearis Peterm. (Cracca) = Kitaibelii
Linnæi Rouy = hybrida
litoralis E. Petit (cordata) = maculata
litoralis Salzm. 118 (27 ζ), A 144
longepedunculata Wk. et Lge. (gracilis) = laxiflora
longifolia Fiori (gracilis) 120 (31 γ c)
longisiliqua Cald. (cassub.) 116 (23 α d)
lugnanensis Schleich. = angustifolia
lutea L. 110 (8), A 144
VICIA II 108 (517)
luxurians Vis. (tenuifolia) = polyphylla?
macrocarpa Bég. (pubescens) A 144 (31 δ c)
macrocarpa Bert. = seg.
macrocarpa Moris (sativa) 112 (11 β)
maculata Presl 112 (11 η)
major Arc. (bithynica) 113 (14 b)
major Rouy (gracilis) = longifolia
Marschalii Arc. 122 (35 γ)
Martini Gren. = segetalis
megalosperma M. B. 111 (10 c)
melanocarpa Hussenot = segetalis
melanops S. et S. 110 (7), A 144
microphylla Urv. 118 (27 δ)
militans Crantz = cassubica
minima Gilib. = lathyroides
minor Bert. (maculata) = heterophylla
minor Goir. (Faba) = equina
minuta Mœnch = bithynica
monadelpha Roth = narbonensis
monantha Desf. = multifida
monantha Retz. 119 (28)
monanthos Viv. = peregrina
monosperma C. Koch = cassubica
montana Froel. 109 (4 b)
Morisiana Jord. = macrocarpa
multicaulis Wallr. = lathyroides
multifida Wallr. 119 (29)
multiflora Lam. = Cracca
multiflora Pollich 116 (23 γ)
multiflora Ten. (cassub.) = prec.
narbonensis L. 109 (3)
nebrodensis Huet = cuneata
nebrodensis Strobl (pubescens) A 145 (31 δ d)
nemoralis Fiori (tetrasperma) 120 (31 β)
nemoralis Pers. (sativa) 112 (11 γ)
nemoralis Steud. = prec.
nigra Dubois = angustifol.
nigricans Coss. et Germ. (non Hook.) = Marschalii
Nissoliana Thuill. (non L.) = striata
notata Gilib. = sativa
oboordata Rchb. = cordata
obovata Ser. (sativa) = sativa (α a)
ochroleuca Rouy (Pseudo-cracca) 118 (27 η b)
ochroleuca Gilib. = pisiformis
ochroleuca Strobl (hirta) = hirta (a)
ochroleuca Ten. 116 (24)
ochrosperma Rchb. (sativa) 112 (11 α d)
olbiensis Reut. et Shuttl. 113 (12 c)
onobrychioides L. 114 (15)
onusta Wallr. = tenuifolia
Oroboides Wulf. 109 (1)
pallidiflora Ser. (lutea) = hirta

Digitized by Google

VICIA II 108 (517)
pannonica Crantz, Jacq. 110 (5), A 144
parviflora Lap. = hirsuta
parviflora Lois. (non Cav., nec Michx.) = disperma
parviflora Rouy (*angustifol.*) A 144 (11 μ b)
patula Mœnch = dumetorum
pauciflora Levier 119 (28 β)
pauciflora Presl = Pseudo-cracca
peregrina L. 111 (10)
perennis DC. 117 (26 β)
pilisiensis Asch. et Jka. = sparsiflora
pimpinelloides Mauri 112 (11 ζ)
pisiformis L. 115 (18)
plumosa Martr.-Don. = villosa
polymorpha Godr. = angustifol.
polyphylla Desf. 117 (25 ε b)
polyphylla Jan = incana
polyphylla Rchb. = dasycarpa
polyphylla W. et K. = villosa
polysperma Ten. A 144 (16 b)
pratensis Wallr. = sepium?
Pseudo-cracca Bert. 118 (27 η)
Pseudo-cracca β Bert. = ambigua
Pseudo-cracca Mérat = dasycarpa
pseudo-sepium Nym. = quid?
pseudo-villosa Schur = dasycarpa
pubescens Lk. 120 (31 δ), A 144, 214
pubescens Ten. (*cassub.*) 116 (23 α b)
punctata Schleich. = onobrychioides
purpurascens DC. = striata
purpureo-cærulea Strobl (1887) (hirta) = rubida
Reuteriana Boiss. et Buhse 118 (27 α b)
Rosani Ten. 118 (27 ε), A 144
roseiflora Rouy (segetalis) = Forsteri
rotundifolia Gilib. = sepium
rubida Cald. (*hirta*) 111 (8 β c)
Salisii J. Gay = pubescens Lk.
Sallei Timb. 112 (11 ν), A 144
sativa L. 111 (11), A 144
Scopoliana Koch (grandifl.) = grandifl. (α a)
segetalis Thuill. 112 (11 λ)
Seguenzæ Huet 118 (X)
sepium L. 109 (4)
serratifolia Jacq. 109 (3 β)
sessiliflora Ser. (*bithynica*) A 144 (14 d)
sicula Guss. 118 (13)
silvatica L. 115 (19), A 144
sirinica Uechtrz. et Huter = argentea
sordida M. B. = Biebersteinii
sordida Salisb. = sepium
sordida W. et K. 111 (9 α b)
sparsiflora Ten. 115 (22)
spuria Raf. 110 (6 β)
stabiana Ten. 117 (25 γ b)
stenophylla Bianca A 144 (11 var.)

VICIA II 108 (517)
stenophylla Boiss. (tenuifol.) = elegans
striata M. B. 110 (5 β)
subuniflora Fiori (*pubescens*) A 214 (31 δ c)
syriaca Weinm. = monantha
Tenoreana Martr.-Don. = longifol.
tenuifolia Guss. (*elegans*) 117 (25 ζ b)
tenuifolia A. Kern. exs. = Kitaibelii
tenuifolia Roth 117 (25 ε), A 144
tenuifolia Seb. et Maur. = cassubica
Terronii Burn. (*hirsuta*) 121 (32 b)
Terronii Steud. = prec.
tetrasperma Mœnch 120 (31), A 144, 214
tetrasperma Moris = pubescens Lk.
thessala Sprun. = Barbazitæ
Timbali Loret = Sallei
torulosa Jord. A 144 (11 α for.)
trichocalyx Moris 117 (26 α b)
tricolor Seb. et Maur. = melanops
tridentata Gater. = lutea
triflora Ten. 119 (28 α b)
uncinata Rchb. = striata
unguiculata Clav. = villosa
uniflora Fiori (*Lenticula*) 122 (36 b)
varia Host = dasycarpa
variegata Gilib. (non W.) = dumetor.
versicolor Salisb. = Cracca
villosa Brot. = atropurp.
villosa Celak. (*cassub.*) 116 (23 α c)
villosa Roth 118 (27), A 144
violascens Rouy (hirta) = rubida
violacescens Fiori (*lutea*) A 144 (8 α b)
vulcanica Huet = litoralis
vulgaris Gr. et Godr. (*sativa*) 112 (11 α), A 144
vulgaris S. F. Gray = Faba
vulgaris Uspensky = sativa
VICILLA = Vicia
cassubica Schur = V. cassub.
pisiformis Schur = V. pisiform.
silvatica Schur = V. silv.
VICIOIDES = Vicia
hirsuta Mœnch = V. spuria
hybrida Mœnch = V. hybrida
lutea Mœnch = V. lutea
sepium Mœnch = V. sepium
silvatica Mœnch = V. silv.
striata Mœnch = V. striata
uncinata Mœnch = V. pannonica
VIGNA II 124 (520)
Catjang Walp. 124 (γ)
melanophthalma Fiori (*unguic.*) 124 (α b)
sinensis Endl. 124 (β)
unguiculata Walp. 124

VIGNANTHA = Carex
acuta Schur = C. acuta
Drejeri Schur = C. cæspitosa (α)
mucronata Schur = C. mucr.
stricta Schur = C. stricta
vulgaris Schur = C. Goodenowii
VIGNEA = Carex
acroandra Schur = C. repens
arenaria Rchb. = C. aren.
argyroglochin Rchb. = C. arg.
bicolor Rchb. = C. bicolor
brizoides Rchb. = C. briz.
cæspitosa Rchb. = C. cæsp.
canescens Rchb. = C. canesc.
capitata Rchb. = C. capit.
curvula Schur = C. curv.
Davalliana Rchb. = C. Davall.
dioica Rchb. = C. dioica
divisa Rchb. = C. divisa
divulsa Rchb. = C. divulsa
Drejeri Fuss = C. cæspitosa
fœtida Rchb. = C. fœt.
Gebhardi Rchb. = C. brunnescens
Grypos Rchb. = C. Grypos
heleonastes Rchb. = C. hel.
intermedia Rchb. = C. disticha
lagopina Rchb. = C. lag.
leporina Rchb. = C. lepor.
microstyla Rchb. = C. fœtido × brunnescens
mucronata Rchb. = C. mucr.
muricata Rchb. = C. muric.
nemorosa Rchb. = C. nemor.
paniculata Rchb. = C. panic.
paradoxa Rchb. = C. parad.
pseudo-brizoides Schur = C. brizoides
Pseudo-Schreberi Schur = C. brizoides
pulicaris Rchb. = C. pulic.
remota Rchb. = C. remota
repens Rchb. = C. repens
Schreberi Rchb. = C. præcox
stellulata Rchb. = C. echinata
stenophylla Rchb. = C. sten.
stricta Rchb. = C. stricta
teretiuscula Rchb. = C. diandra
tripartita Rchb. = C. curvula
vulpina Rchb. = C. vulp.
VIGOLINA = Galinsoga
Acmella Poir. = G. parviflora
VILFA = Agrostis
alba P. B. = A. alba
brachystachys Presl = Crypsis — brach.
coarctata P. B. = A. coarctata
compressa P. B. = A. vinealis
frondosa Presl = A. — Gusson.
glaucescens Presl = A. glaucesc.
maritima P. B. = A. marit.
pulchella Presl = A. elegans
pungens P. B. = Sporobolus pungens
stolonifera Presl = A. verticill.
vulgaris P. B. = A. vulgaris
VILLARIA = Berardia
subacaulis Guett. = B. lanuginosa
VILLARSIA = Limnanthemum
nymphoides Vent. = L. nymph.
peltata R. et S. = prec.

Digitized by Google

VINCA II 342 (700)
acutiflora Bert. = difformis
alba Venanzi (*minor*) 343 (3 f)
difformis Pourr. 343 (2)
ellipticifolia Stokes = minor
grandiflora Fiori (*difformis*) 343 (2 b)
grandiflora Salisb. = major
humilis Salisb. = minor
intermedia Tausch = minor
macrantha Goir. (*minor*) 343 (3 c)
major Brot. = difformis
major L. 343 (1), A 163
media Hoffgg. et Lk. = difformis
micrantha Goir. (*minor*) 343 (3 d)
minor L. 343 (3)
obliqua Huter P. et R. (*major*) A 163 (1 c)
ovatifolia Stokes = major
rosea Rodegher (*minor*) 343 (3 e)
serotina Fiori (*major*) 342 (1 b)
serotina Fiori (*minor*) 343 (3 b)
VINCETOXICUM = Cynanchum
album Asch. = C. Vincetoxic.
alpinum Schott = C. fuscatum
Burnati Briq. (officin.) = C. — Burnati
contiguum Gr. et Godr. = C. contig.
fuscatum Rchb. f. = C. fusc.
hirundinaria Medic. = C. Vincetoxic.
laxum C. Koch = C. laxum
medium Dcne. p. p. = C. fuscatum
nigrum Mœnch = C. nigrum
officinale Mœnch = C. Vincetox.
vulgare Bernh. = prec.
VIOLA I 401 (355)
abbreviata Presl (gracilis) = ætnensis Raf.
abortiva Jord. = adulterina
acaulis Gaud. p. p. (calcar.) = rotundifol.
adriatica Freyn 405 (3 λ f)
adulterina Godr. 404 (3 η), A 84
ætnensis Baroni (calcarata) = heterophylla
ætnensis DC. (calcar.) = seg.
ætnensis Guss. (gracilis) = seg.
ætnensis Raf., Strobl 407 (9 δ), A 85
ætnensis Tin. (*parvula*) 408 (10 γ b)
ætnensis Torn. = prec.
agrestis Jord. = arvensis
alba All. (odorata) = seg.
alba Bess. 405 (3 θ), A 84
alba Parl. (*arenaria*) A 211 (1 κ c)
alba Parl. (odorata) = incompta
alba Parl. (*Ruppii*) 402 (1 γ b)
alba Parl. (*silvatica*) A 84 (1 θ a′)
alba Vis. et Sacc. (hirta) = lactiflora
albo × austriaca Auct. = multicaulis
VIOLA I 401 (355)
albo × odorata Auct. = multicaulis
albiflora Posp. (*multicaulis*) 405 (3 ι c)
Allionii Pio = arenaria
alpestris Ging. (tricolor) = seg.
alpestris Jord. = saxatilis
alpicola Goir. (silvat.) = arenicola
alpina All. (non Jacq.) = valderia
alpina Huds. = canina
alpina Salisb. = calcarata
alpina Ten. = Eugeniæ
ambigua W. et K. 404 (3 γ)
apennina A. Terr. (calcar.) 407 (9 α e) = calcarata var. plur. cfr. A 85
apetala Gilib. = mirabilis
apetala F. W. Schm. 408 (1 θ c)
aprica Spr. = arenaria
arborescens L. 409 (nota), A 84 (10)
arenaria DC. 403 (1 κ), A 211
arenaria β Parl. = rupestris
arenaria Gillot (Riviniana) = arenicola
arenaria × mirabilis 408
arenicola Chabert A 84 (1 θ d)
arvensis Murr. 408 (10 α), A 86
arvensoides Strobl 408 (10 α b)
austriaca A. et J. Kern. 405 (3 λ d)
austriaco × hirta Auct. = Kerneri
Balbisii Re = arenaria
bella Gren. = saxatilis
bellioides DC. (tricolor) = parvula
Beraudii Bor. 405 (3 λ)
Beraudii Gremli = austriaca
Bertolonii Pio = heterophylla
Bertolonii Salis = corsica
bicolor Gilib. = tricolor
bicolor Guss. (tricolor) = arvensis
bicornis Goir. (*odorata*) A 85 (3 κ for.)
biflora L. 406 (6)
Bogenhardtiana Gremli = silvatica × mirabilis
brevifolia Freyn (austriaca) = sepincola
brevifolia Neilr. (canina) = ericetorum
cæspitosa A. Terr. (cenisia) = microphylla?
calabra Huet = canina (α)
calabra A. Terr. (*gracilis*) 408, A 86 (9 ζ e)
calaminaria Lej. = multicaulis
calcarata Guss. = nebrodensis
calcarata L. 407 (9), A 85, 211
calcarata β Bert. = Eugeniae
calcarata Milani = calc. v. pubescens
calcarata Ten. = Eugeniæ et lucana
calcarata Vill. = tricolor
calcarea Bab. (*hirta*) A 84 (3 α for.)
campestris M. B. = ambigua
VIOLA I 401 (355)
canescens Rap. (arvens.) = valesiaca
canina All., Bert. etc. = silvatica
canina L. 402 (1), A 84, 211
canina × stagnina Asch. = Ruppii
caniniformis C. Richter = Riviniana
cassinensis Strobl = quid?
Cavillieri W. Becker = lancifolia, cfr. A 86
cenisia Ard. = valderia
cenisia L. 406 (3), A 85
cenisia Moris = corsica
cenisia β Bert. = valderia
ciliata St.-Lag. (ambigua) = Thomasiana
cinerea Rouy et Fouc. (Kitaibeliana) = valesiaca
collina Bess. 404 (3 β), A 84
collino × hirta Val de Lievre = hybrida
Comollia Massara 406 (8 β), A 85
contempta Jord. A 87 (10 ε for.)
cordifolia Chevall. (pumila) = montana
cornuta L. 409 (nota), A 87
corsica Jord. ex Bor. = arvensis (?)
corsica Nym. 407 (9 ε)
cyanea Celak. = perennis
declinata Fiori (tricolor) 409 (10 η) = Dubyana, cfr. A 86
declinata Gaud., Parl. (non W. et K.) = Dubyana
decumbens Mœnch = calcarata
Dehnhardtii Ten. 404 (3 ζ)
Deseglisei Jord. = arvensis
Desetangsii Cam. et Har. = mirabil. × silvat.
Dubyana Burn. 409, A 86 (9 ι)
dumetorum Hausskn. (hirta) = hirta (α)
elatior Ard. = provincialis
elatior Fr. 403 (1 ζ)
elatior × canina Asch. = nemoralis
elegans Spach = lutea Huds.
elongata Huet A 86 (9 ζ f)
epipsila Ledeb. 405 (4 α b)
erecta Gilib. = elatior
ericetorum Corb. (Riviniana) = arenicola
ericetorum Rchb. (canina) (1824) = seg.
ericetorum Schrad. (1821) A 84 (1 α e)
esterelensis Chanay et Mill. = picta
Eugeniæ Parl. 407 (9 β), A 85
Favrati Gremli (*odorata*) A 85 (3 κ for.)
ferrariensis Campana = pumila
flavescens Jord. A 87 (10 ε for.)
flavicornis Sm. = sabulosa
flexuosa Moretti = persicifol.
foliosa Celak. 404 (3 ε d)
Foucaudi Savat. = Kitaibeliana
Foudrasi Jord. 404 (3 α d)
fraterna Heg. = seg.

Digitized by Google

VIOLA I 401 (855)
fraterna Rchb. (*hirta*) A 84 (8 α for.)
Ganderi Haussm. = Thomasiana
garganica Strobl = arvensis
garganica A. Terr. (*gracilis*) A 85 (9 ζ d)
gigantea Santi = heterophylla
glaberrima W. Becker (*scotophylla*) A 84 (8 θ b subfor.)
glabrata Salis. = sciaphila
glabrescens A. Terr. (*valderia*) A 85 (8 γ b)
glauca M. B. = arenaria
gracilescens Jord. A 86 (10 α for.)
gracilis Biv. = ætnensis
gracilis S. et S. 408 (9 ζ), A 85
gracilis Ten. p. p. = pseudogracilis
grandiflora Fiori (Eugeniæ) 407 (9 β e) = Eugeniæ for. plur., cfr. A 85
grandiflora Gr. et Godr. (arenaria) = rupestris
grandiflora Gr. et Godr. (silvat.) = Riviniana
grandiflora Guss. (calcar.) = Minæ
grandiflora Hayne (tricolor) = saxatilis
grandiflora Huds. = lutea (a)
grandiflora L. 407 (9 α d)
grandiflora Parl. (nebrod.) = Minæ
grandiflora Seb. et Maur. = Levieri
grandiflora Ten. = Levieri et subasica
grandiflora A. Terr. (Tenorii) = Eugeniæ for. plur., cfr. A 85
Guitteanæ Giraud. = lanceolata
gymnocarpa Janka 404 (8 δ b)
heterophylla Bert. p. p. 408, A 86 (9 η)
heterophylla β Bert. = Dubyana
heterophylla Comolli, Rota, Borb. = Dubyana
heterophylla Moris (cenisia) = corsica
heterophylla Ten. et Guss. = calc. v. pubescens
hirsuta Crantz, R. et S. A 84 (8 α for.)
hirta L. 404 (8), A 84
hirto × alba Gr. et Godr. = adulterina
hirto × odorata Auct. = permixta
hispidula Freyn (*odorata*) 405 (8 κ d)
Hornemanniana R. et S. = montana
hortensis DC. (*tricolor*) 408 (10 δ)
hortensis Schur = odorata
humilis Bert., Parl. (tricolor) = Kitaibeliana
hybrida Schur = permixta
hybrida Val de Lievre A 85 (×)
hybrida Wulf. = uliginosa
incompta Jord. 405 (8 κ c)
inodora Gilib. = palustris

VIOLA I 401 (855)
insularis Gr. et Godr. (p. 185) = corsica
insularis Gr. et Godr. (p. 178) 403 (1 ι)
insularis A. Terr. (gracilis) 408 (9 ζ e) = calcarata var. plur., cfr. A 86
interjecta Borb. = hybrida
intermedia A. Terr. (Tenorii) = Eugeniæ
italica Voigt. = odorata
Jordani Hanry = provincialis
Julia Bruegg = calcarata (α)
Kerneri Wiesb. 404 (8 ε c)
Kitaibeliana R. et S. 408 (10 β), A 86
Kochii Kirschl. = canina
Kuetzingiana Rouy et Fouc. = nemoralis
lactea Koch et Ziz, Fr. = pumila
lactea Rchb. = persicifol.
lactea Sm. 402 (1 β), A 84
lactea × silvestris Rchb. = montana
lactiflora Rchb. (*hirta*) 404 (8 α b)
lancea Poir. = pumila
lanceolata Martr.-Don. (*canina*) A 84 (1 α g)
lancifolia A. Terr. (*heterophyla*) A 86 (9 η b)
lancifolia Thore = lactea
latifolia Burn. (canina) = nemorum
lejocarpa Rouy et Fouc. (permixta) = foliosa
Levieri Parl. 407 (9 β c), A 85
lilacina Wiesb. (*multicaulis*) 405 (8 ι b)
litoralis Spr. = pumila
longifolia Neilr. (canina) = lucorum
longiviola Pourr. = arborescens
lucana Fiori (*gracilis*) A 85 (6 ζ c)
lucana A. Terr. (Tenorii) = prec.
lucorum Lange = seg.
lucorum Rchb (*canina*) 402 (1 α c)
Ludovicea Jan = Eugeniæ?
luganensis Call. (hirta) = sciaphila
lusitana Brot. = lactea
lutea Bert. p. p. = calc. v. pubescens
lutea Fiori (tricolor) = garganica et pubescens
lutea Guss. (calcar.) = nebrod. b. lutea
lutea Guss., Boiss., Parl. (*gracilis*) 407 (9 ζ b), A 86
lutea Huds., Sm. 409 (10 ζ), A 87
lutea Lam. = biflora
lutea Parl. (calcar.) = Zoysii
lutea Parl. (Eugeniæ) = pallidiflora
lutea Parl. (*nebrodensis*) 407 (9 γ b)
lutea Tin. (*ætnensis*) 407 (9 δ b)

VIOLA I 401 (855)
lutea Trautv. = saxatilis
macrantha Doell (silvestr.) = Riviniana
macrantha Fr. (canina) = montana
macrantha Fr. (silvat.) = Riviniana
macrantha Goir. (*odorata*) A 85 (8 κ for.)
macrantha Gr. et Godr. (*canina*) 402 (1 α d)
macrantha Huet = nebrod. b. lutea
madonia Presl ex Rchb. = nebrodens.
magellensis Porta et Rigo 406 (8 α b)
major Le-Grand (canina) = macrantha
martia Gilib. = odorata
Martii Schimp. et Spenn. = hirta
mediterranea Gr. et Godr. (tricolor) = Kitaibeliana
micrantha Presl p. p., Bert. = Kitaibeliana
microphylla Rolli hb. A 85 (9 β f)
microphylla A. Terr. (cenisia) = prec.
microsoma Briq. (silvestr.) = arenicola
Minæ Strobl 407 (9 γ c)
minima Bert. (tricolor) = parvula
minima Ging. (*nummular.*) 406 (7 b)
minima Rion = valesiaca
minor DC. (canina) = sabulosa
mirabilis L. 403 (2)
mirab. × Riviniana Uechtrz. A 84
mirab. × silvatica Rap. 403, A 84
mirab. × silvestris Bogenh. = prec.
mixta Sudre = sepincola
montana Celak. (tricolor) = saxatilis
montana DC., Parl. = elatior
montana L. A 84 (1 γ)
montana Rchb. = persicifolia
montana Rchb. (canina) = can. d. macrantha
mont. × Riviniana Burn. et Briq. = Weinhartii
monticola Jord. = saxatilis
multicaulis Arc. (lutea) = vallumbrosana
multicaulis Koch (*lutea*) 409 (10 ζ c)
multicaulis Jord. 405 (8 ι), A 84
multifida W. = pinnata
nana Sauzé et Maill. = Kitaibeliana
nebrodensis Presl 407 (9 γ), A 85, 211
neglecta M. B. = silvatica
neglecta F. W. Schm. = canina
nemausensis Jord. = Kitaibeliana
nemoralis Jord. = nemorum

Digitized by Google

VIOLA I 401 (855)
nemoralis Kuetz. 402 (1 ε b), A 84
nemorum Rouy et Fouc. 402 (1 α b)
nigricans Schur = scotophylla
nitens Host = uliginosa
nummularia Gr. et Godr. = nummulariæfol.
nummulariæfolia Comolli = Comollia
nummulariæfol. F. W. Schm. = canina
nummulariæfolia Vill. p. p., All. 406 (7)
nummulariæfolia Vill. p. p. = arenaria
obscura Schur = permixta
odorata Guss. (calcar.) = nebrodensis
odorata L. 405 (3 κ), A 85
odorata β L. = alba
odorata β Moric., Vis. = hirta
odorata b Guss. = incompta
œnipontana Murr = sepincola
officinalis Crantz = odorata
ovatifolia Ging. (cenisia) = cenisia (α)
pallida Salisb. = hirta
pallidiflora Huet 407 (9 β d)
palustris L. 405 (4)
parviflora Kit. (non L. f.) = Kitaibeliana
parvifolia A. Terr. (Tenorii) = microphylla?
parvula Opiz = calcarea
parvula Presl (tricolor) = parvula
parvula Ten. = Kitaibeliana
parvula Tin. 408 (10 γ), A 86
perennis Miegév. 405 (3 κ e)
permixta Jord. 404 (3 ε), A 84
persicifolia M. et K., Rchb. = elatior
persicifolia Roth 402 (1 ε), A 84
picta Fiori (alba) 404 (3 θ c)
picta Moggr. (hirta) = prec.
pinetorum Wiessb. (hirta) = hirta (α)
pinnata L. 405 (5)
pinnato × uliginosa Chiov. A 85
Pirotiæ Chiov. 405 (3 λ b)
pluricaulis Borb. = multicaulis
polychroma A. Kern. A 87 (10 ε oss.)
præcox Heuff. = adulterina
prætutiana A. Terr. (cenisia) = microphylla, cæspitosa et magellensis
pratensis Hausskn. (hirta) = calcarea
pratensis M. et K. = pumila
procumbens Gilib. = canina
provincialis Burn. (elatior) 402 (1 ζ b)
provincialis Kirschl. (persicifol.) = prec.
pseudo-gracilis Huter P. et R. exs. = gracilis
pseudo-gracilis Strobl 407 (9 γ d), A 85

VIOLA I 401 (855)
pseudo-mirabilis Coste = mirabil. × Riviniana
pubescens Fiori (calcarata) 408, A 86 (9 θ)
pubescens Freyn (Beraudii) 405 (3 λ e)
pubescens A. Terr. (Eugeniæ) 407 (9 β b)
pubescens A. Terr. (gracilis) 408 = calc. v. pubesc.
pulchella Salisb. = canina
pumila Chaix in Vill. 408 (1 η), A 84
pumila Coss. et Germ. (silvestr.) = arenicola
pumila Ging. in DC. = canina (α)
pungens Gr. et Godr. (alba) A 84 (3 θ for.)
pyrenaica Gren. (an DC.?) = sciaphila
Reichenbachiana Jord. 408 (1 θ a)
Reichenbachii Kirschl. = canina (α)
Riviniana Rchb. 408 (1 θ b)
Riviniano × stricta W. Becker = Weinharti
rosea Freyn (alba) 404 (3 θ d)
Rossii Chiov. = pinnato × uliginosa
rotundifolia Rouy et Fouc. (calcar.) 407 (9 α b)
rupestris Kirschl. (canina) = sabulosa
rupestris F. W. Schm. 408 (1 κ b)
Ruppii All. 402 (1 γ) = montana, cfr. A 84
Ruppii Pollini = Riviniana
Ruppii Presl = pumila
Ruppii × Riviniana Fiori = Weinharti
ruralis Jord. = arvensis
sabulosa Rchb. (canina) A 84 (1 α f)
Sagoti Jord. A 87 (10 ε for.)
sardoa A. Terr. (cenisia) = corsica
saxatilis F. W. Schm. 408 (10 ε), A 86
Schalmauseni Rouy et Fouc. = arenar. × mirabilis
Schleideniana Bogenh. = arenaria
Schultzii Bill. 402 (1 δ), A 84
sciaphila Koch 404 (3 δ)
scotophylla Jord. 404 (3 θ b), A 84
scotophyllo × odorata W. Becker = multicaulis
segetalis Jord. A 86 (10 α for.)
semivelutina Carion (tricolor) = variata
sepincola Jord. 404 (3 ε b)
silvatica Fr. 408 (1 θ), A 84
silvat. × mirabilis 408 = mirab. × silvat.
silvestris Lam. p. p., Koch = silvatica
silvestris B Ten. = Riviniana
spectabilis C. Richt. 405 (3 λ e)

VIOLA I 401 (855)
splendida W. Becker = calc. v. pubescens
spuria Celak. = mirabil. × silvat.
stagnina Kit. = persicifolia
Steveni Faucon. = seg.
Steveni Koch (odorata) = austriaca
stipularis Fr. (non Sw.) = elatior
stricta Fr. et Auct. pl. (non Horn.) = montana
suavis Béraud = Beraudii
suavis M. B. 405 (3 μ), A 85
suavis Rchb = austriaca
subasica Fiori (Eugeniæ) A 85 (9 β e)
subasica A. Terr. (Tenorii) = prec.
subcarnea Jord. 405 (3 κ b)
suberosa Desf. = arborescens
subhirta G. Beck = sepincola
sudetica W. 409 (10 ζ b)
tenerrima Wiesb. = subcarnea
Tenorii A. Terr. = Eugeniæ
Thomasiana Perr. et Song. 404 (3 γ b)
tolosana Timb. = Beraudii
tricolor L. 408 (10), A 86
turfosa G. Beck (silvestr.) = arenicola
turfosa Kirschl. (canina) = Ruppii
Uechtritziana Borb. = mirab. × Rivin.
uliginosa Bess., Schrad. 405 (4 β)
umbrosa Hpe. = collina
umbrosa Neilr. (hirta) = collina
umbrosa Saut. = sciaphila
unguiculata Rouy et Fouc. (lutea) 408 (10 ζ a)
uniflora Krock. (non L.) = biflora
valderia All. 406 (8 γ), A 85
valderia Rchb., Strobl = heterophylla
valesiaca Gremli (tricolor) = seg.
valesiaca Thom. A 86 (10 α for.)
vallombrosana Wittrock (alpestris) = prec.
vallumbrosana Fiori (saxatilis) A 86 (10 ε b)
variata Jord. A 86 (10 α for.)
variegata Bogenh. (hirta) 404 (3 α c)
variegata Jord A 86 (10 α for.)
versicolor Salisb. = tricolor
vinealis Bor. A 84 (3 θ for.)
violacea Huet (macrantha) = Minæ
violacea Parl. (alba) 404 (3 θ e), A 84
virescens Jord. 404 (3 θ a)
vulgaris Rupr. = silvestris
Weinharti W. Becker A 84
Zoysii Wulf. 407 (9 α c)
VIORNA = Clematis
integrifolia Spach = C. integr.

Digitized by Google

VIREA = Leontodon
autumnalis S. F. Gray = L. autumn.
hastilis Gærtn. = L. danubialis
hispida S. F. Gray = L. hisp.
incana S. F. Gray = L. incan.
pyrenaica S. F. Gray = L. pyrenaicus
VIRGA = Dipsacus
pilosa Hill = D. pilosus
VIRGILIA = Gaillardia
helioides L'Hér. = G. pulchella
VISCAGO = Silene
baccifera Vest = Cucubalus bacciferus
Behen Horn., Baumg = S. vulgaris
catholica Horn. = S. cath.
clavata Mœnch = S. italica
fusca Mœnch = S. catholica
glutinosa Baumg. = S. viscosa
italica Horn. = S. ital.
maritima Horn. = S. marit.
mollissima Horn. = S. pilosa
mollissima Mœnch = S. mollissima
nutans Fourr. = S. nut.
Otites Horn. = S. Otit.
paradoxa Fourr. = S. parad.
parviflora Horn. = S. parvifl.
pilosa Horn. = S. pilosa
polygama Stokes = S. Otites
viscosa Mœnch = S. visc.
vulgaris M. et K. = Lychnis Viscaria
VISCARIA = Lychnis
alba Hort. = seg.
albiflora Sweet = L. Visc. b. albiflora
alpina G. Don = L. alp.
aspera Hook. = L. aspera
cardinalis Hort. = L. Cœli-rosa
Cœli-rosa Fenzl = L. Cœli-rosa
corsica Fenzl = L. cors.
helvetica G. Don = L. alpina
læta Fenzl = L. læta
neglecta G. Don = L. Visc. b. albiflora
oculata Lindl. = L aspera
purpurea Wimm. = L. Viscaria
suecica Sweet = L. alpina
Viscaria Asch. et Græbn. = L. Visc.
viscosa Asch. = L. Viscaria
vulgaris Rœhl. = L. Viscaria
VISCUM I 287 (276)
albescens Wiesb. (laxum) = laxum
album L. 287, A 62
austriacum Wiesb. = laxum
caucasicum Steud. = Arceuthobium Oxycedri
dichotomum Gilib. = album
hyposphærospermum Kell. (album) = laxum
laxum Boiss. et Reut. 287 (β), A 62
microphyllum Casp. (album) = laxum
Oxycedri DC. = Arceuthobium Oxyc.
platyspermum Kell. (album) = album (α)
VISNAGA = Ammi.
daucoides Gærtn. = A. Visnaga
vera Raf. = prec.
VITALIANA = Douglasia
primulæflora Bert. = D. Vitaliana
VITEX III 84 (807)
Agnus Stokes = seg.
Agnus-Castus L. 84
albiflora Strobl (*Agnus-Cast.*) 84 (c)
laciniosa Ces. (*Agnus-Cast.*) 84 (b)
latifolia Mill. = Agnus-Cast.
lupinifolia Salisb = prec.
verticillata Lam. = prec.
VITICELLA = Clematis
deltoidea Mœnch = C. Viticella
VITIS II 217 (615)
æstivalis Michx. 218 (6)
hederacea Ehrh. = Parthenocissus quinquefolia
incisa Jacq. = riparia
Labrusca L. 218 (5)
Labrusca Scop. = vinifera
laciniosa L. 218 (1 β b)
odoratissima Donn = riparia
quinquefolia Lam. = Parthenocissus quinq.
riparia Michx. 218 (2)
rotundifolia Michx. 218 (8)
rupestris Scheele 218 (4)
sativa DC. (*vinifera*) 218 (1 β)
silvestris DC. (*vinifera*) 217 (1 α)
silvestris C. C. Gmel. = prec.
vinifera L. 217 (1)
vulpina Jacq. = æstivalis
vulpina L. p. p. = rotundifolia
VITIS-IDÆA = Vaccinium
Myrtillus Mœnch = V. Myrt.
punctata Mœnch = V. Vitis-Idæa
punctifolia S. F. Gray = prec.
VITTADINIA = Erigeron
triloba Hort. et Auct. pl. (non DC.) = E. mucronatus
VITTARIA = Notholæna
Ceterach Bernh. = N. Marantæ
VOGELIA = Neslea
paniculata Horn. = N. panic.
sagittata Medic. = N. panic.
VOGLERA = Genista
germanica Fourr. = G. germ.
hispanica Fourr. = G. hispan.
spinosa Gærtn. = G. germanica
VOLUTARELLA = Centaurea
Lippii Cass. = C. Lippii
VOLUTARIA = Centaurea
Lippii Cass. = C. Lippii
VOLVULUS = Convolvulus
sepium Medic. = C. sepium
VRŒDEA = Glaux
maritima Bub. = G. marit.
VULNERARIA = Anthyllis
albiflora Guss. (heterophylla) = A. Vuln. b. alba
Anthyllis Scop. = A. Vulner.
argentea Lam. = seg.
Barba-Jovis Lk. = A. Barba-Jovis
busambarensis Lojac. (heterophylla) = A. — macrophylla?
Dillenii Fourr. = A. — rubra
VULNERARIA = Anthyllis
flaviflora Guss. (heterophylla) = A. — bicolor Bert.
heterophylla Mœnch = A. Vulneraria
hirsutissima Guss. (heterophylla) = A. hispida
lagopodium Medic. = A. Vuln.
montana Scop. = A. mont.
nudiflora Lam. = Dorycnopsis Gerardi
parvula Lojac. (heterophylla) = A. tricolor
polyphylla Lk. = A. — polyph.
rubriflora Lk. = A. rubra
rustica Lam. = A. Vulner. b. alba
tetraphylla Mœnch = A. tetr.
vesicaria Lam. = prec.
VULPIA I 94 (116)
ætnensis Tin. 95 (6 b)
Alopecurus Lk. 95 (7)
ambigua Fiori (*dertonensis*) A 29 (5 β b)
attenuata Parl. 94 (2 β)
bromoides S. F. Gray, Dum. = dertenensis
Broteri Boiss. et Reut. 95, A 204 (5 β e)
ciliata Lk. 95 (6), A 29
ciliata Parl. (*geniculata*) A 29 (2 α b)
dertonensis Gola A 29, 204 (5 β)
elongata Fiori (*ciliata*) A 29 (6 c)
Gaudiniana Fiori (*ciliata*) A 29 (6 b)
geniculata Lk. 94 (2), A 29
hispidula DNtrs. 95 (8 b)
incrassata Parl. 94 (2 γ)
laxa Tin. (*sicula*) 94 (1 α b)
ligustica Lk. 95 (8), A 29
Linnæana Parl. = uniglumis
longearistata Wk. (sciuroid.) = Broteri
membranacea Lk. = uniglumis
Michelii Rchb. = Avellinia Michelii
microstachya Hack. (sciuroid.) = Broteri
myurus C. C. Gmel. 95 (5), A 29, 204
myurus Rchb. = ciliata
panormitana Parl. 95, A 204 (5 β c)
pseudo-myurus Rchb. = myurus (α)
pseudo-nardurus Fiori (*myurus*) A 29 (5 α b)
pseudo-nardur. Goir. (pseudo-myur.) = prec.
pubescens Bég. (sciuroides) = seg.
pubescens Fiori (*derton.*) A 204 (5 β d)
pubescens Fiori (*myurus*) A 204 (5 α b)
sciuroides C. C. Gmel. 95 (5 β) = dertonensis, cfr. A 29
setacea Parl. 94 (1 β)
sicula Lk. 94 (1)
tenuis Parl. 94 (2 δ)
uniglumis Dum., Rchb. 95 (4)

Digitized by Google

WAHLENBERGIA III 191 (850)
bracteosa A. Terr. (gramin.) = Hedræanth. graminifol. (α)?
dalmatica DC. f. = Hedræanth. dalm.
Elatines Lk. = Campan. Elat.
Erinus Lk. = Campan. Erinus
flaccida Presl = seg.
garganica G. Don = Campan. gargan.
graminifolia DC. f. = Hedræanth. gram.
hederacea Rchb. 191 (nota)
Kitaibelii DC. f. = Hedræanth. Kitaibelii
nutabunda DC. f. 191
tenuifolia DC. f. = Hedræanth. tenuif.
WALDSCHMIDIA = Limnanthemum
nymphoides Weber = L. nymph.
WALLROTHIA = Bunium
divaricata Presl = B. alpinum
tuberosa Spr. = prec.
WEINGÆRTNERIA = Corynephorus
articulata Asch. et Græbn. = C. artic.
canescens Bernh. = C. canesc.
fasciculata F. Schultz = C. — gracilis
gracilis Asch. et Græbn. = C. — gracilis
WEITENWEBERA = Campanula
Cervicaria Opiz = C. Cervic.
glomerata Opiz = C. glom.
WENDIA = Heracleum
alpina Schur = H. alpinum
austriaca Schur = H. austr.
siifolia Schur = H. siifol.
WIBELIA = Crepis
apargioides Rœhl. = Willemetia stipitata
chrondrilloides Hpe. et Hornsch. = C. chondr.
fœtida Sch. Bip. = C. fœt.
graveolens Gærtn. M. et S. = C. fœtida (α)
hieracioides Rœhl. = C. tectorum?
setosa Rœhl. = C. setosa
WIBORGIA = Galinsoga
Acmella Roth = seg.
parviflora H. B. et K. = G. parviflora
WIERZBICKIA = Alsine
incana Rchb. (laricifol.) = A. — incana
laricifolia Rchb. = A. liniflora
liniflora Fourr. = A. lin.
macrocarpa Rchb. = A. Kitaibelii
striata Rchb. = A. laricifolia
WIESTIA = Lactuca
virosa Sch. Bip. = L. virosa
WIGGERSIA = Vicia
lathyroides Gærtn. M. et S. = V. lathyr.
lutea Gærtn. M. et S. = V. lutea
minima Alef. = V. lathyroides
sepium Gærtn. M. et S. = V. sepium
WIGGERSIA = Vicia
silvatica Gærtn. M. et S. = V. silvatica
WILCKIA = Malcolmia
africana F. Muell. = M. afric.
maritima Scop. = M. marit.
WILHELMSIA = Kœleria
caucasica C. Koch = K. laxa
WILLEMETIA III 416 (945)
apargioides Cass. = stipitata
hieracioides Monn. = stipitata
prenanthoides Gr. et Godr. = Chondrilla prenanth.
stipitata O. Hoffm., Cass. 416
WILLEMETIA = Kochia
arenaria Mærkl. = K. aren.
hirsuta Moq. = K. hirs
lanata Mærkl. = K. hyssopifolia
WISTARIA = Kraunhia
chinensis DC. = K. floribunda
floribunda DC. = prec.
sinensis Sweet = prec.
WITHANIA = Physalis
somnifera Dun. = Ph. somn.
WOLFFIA I 151 (155)
arrhiza Wimm. 151
Delilei Kurz = arrhiza
Michelii Schleid. = prec.
Schleideni Miq. = prec.
WOODSIA I 7 (5)
alpina Gray A 2 (2 β)
arvonica Koch (hyperb.) = alpina
glabella R. Br. 7 (1), A 2
glandulosa Trevis. (glabella) A 2 (1 b)
Hausmanniana Milde = glabella
hyperborea R. Br. 7 = alpina
ilvensis R. Br. 7 (2), A 2
intermedia Fiori (alpina) A 2 (2 β b)
pulchella Bert. = glabella
rufidula Asch. (ilvensis) A 2 (2 α)
rufidula Koch (hyperb.) = ilvensis (α)
WOODWARDIA I 13 (11)
auriculata Blume = radicans
biserrata Presl = radicans
orientalis Sw. = radicans
prolifera Hook. et Arn. = radicans
radicans Sm. 13 (1), A 7
Stans Sw. = radicans
WULFENIA II 443 (760)
Ageria Sm. = Veronica lutea
Bonarota Sm. = Veron. Bonar.
carinthiaca Jacq. 443
chamædrifolia Host = Veron. chamædrifol.
lutea Host = Veron. lutea
WYLIA = Scandix
australis Hoffm. = S. austr.
grandiflora Hoffm. = S. grandiflora
radians Hoffm. = prec.

XANTHIUM III 304 (901)
ambrosioides Hook. et Arn. A 186
annuum Georgi = strumar.
canadense Mill. 305 (nota)
XANTHIUM III 304 (901)
chinense Mill. = strumar.
cordifolium Stokes = prec.
echinatum Balb. et Nocca (an Murr.?) = italicum
fuscescens Jord. et Fourr. 305 (2 b)
italicum Moretti 305 (3), A 186
italico × strumarium Fiori A 186
macrocarpum Auct. pl. = italicum
macrocarpum DC. 305 (nota)
macroc. × strumarium Goir. = italico × strum.
monoicum Gilib. = strumar.
Nigri Ces. 305 (3 β)
orientale Auct. = italicum
orientale L. 305 (nota)
pusillum Fiori (italicum) A 186 (3 α b)
pusillum Goir. (macrocarp.) = prec.
Revelieri Jord. et Fourr. = italicum?
riparium Lasche = italicum
saccharatum Wallr. = italicum
spinosum L. 304 (1)
strumarium L. 305 (2)
vulgare Lam. = prec.
XANTHOLINUM = Linum
campanulatum Rchb. = L. camp.
flavum Rchb. = L. flav.
nodiflorum Rchb. = L. nodifl.
XANTHOPHTALMUM = Chrysanthemum
segetum Sch. Bip. = Ch. seget.
XERALSINE = Alsine
fasciculata Fourr. = A. fasc.
mucronata Fourr. = A. mucr.
XERANTHEMUM III 313 (906)
annuum Auct. it. pl. = inapertum
annuum L. 314 (3)
annuum Scop., Nocc. et Balb. etc. = cylindrac.
annuum β L. = inapertum
cylindraceum S. et S. 313 (1)
cylindricum Spr. = prec.
erectum Presl = inapertum
fœtidum Mœnch = inapertum
frigidum Labill. = Helichrys. frig.
inapertum M.B., DC. = cylindr.
inapertum Mill., W. 314 (2)
incomptum Cass. = prec.
inodorum Mœnch = annuum
ornatum Cass. = prec.
radiatum Lam. = prec.
sesamoides J. Gay (non L.) = cylindrac.
XEROLOMA = Xeranthemum
fœtidum Cass. = X. cylindrac.
inapertum Fourr. = X. inap.
XEROLOPHUS = Thesium
alpinus Dulac = Th. alp.
pratensis Dulac = Th. prat.
trinervis Dulac = Th. intermedium
XEROTIUM = Filago
gallicum Bluff et Fing. = F. gallica

Digitized by Google

XEROTIUM = Filago
minimum Bluff et Fing. = F. minima
montanum Bluff et Fing. = prec.
XIPHION = Iris
acoroides Alef. = I. Ps.-Acorus
alatum Baker = I. planifolia
collinum N. Terr. = I. — collina
flexuosum Alef. = I. sibirica
fœtidissimum Parl. = I. fœt.
gramineum Schrank, Parl. = I. gram.
junceum Klatt = I. junc.
Pallasii Alef. = I. ensata
planifolium Mill. = I. planif.
Pseudo-Acorus Schrank, Parl. = I. Ps.-Acor.
sibiricum Schrank, Parl. = I. sibirica
Sisyrinchium Baker = I. Sisyr.
spurium Alef. = I. spuria
triflorum Alef. = I. ensata
verum Schrank = I. Xiphium
vulgare Mill. = I. Xiphium
XIPHOCOMA = Ranunculus
orientalis Stev. = R. orient.
XOLANTHA = Helianthemum
guttata Raf. = H. gutt.
racemosa Raf. = prec.
XYLOSTEON = Lonicera
alpigenum Fuss = L. alpig.
alpinum Dum.-Cours. = prec.
cæruleum Dum.-Cours. = L. cærulea
dumetorum Mœnch = L. Xyl.
nigrum Medic. = L. nigra
vulgare Rœhl. = L. Xylost.
XYRIDION = Iris
acoroideum Klatt = I. Ps.-Acorus
flexuosum Klatt = I. sibirica
fœtidissimum Klatt = I. fœt.
gramineum Klatt = I. gram.
Pseudo-Acorus Klatt = I. Ps.-Acorus
sibiricum Klatt = I. sibir.
spurium Fourr. = I. spuria

YOUNGIA = Crepis
Kochiana Led. = Cr. lapsanifolia
YUCCA
aloifolia L. A 49

ZACYNTHA III 425 (952)
glandulosa N. Terr. (*verr.*) 425 (b)
pendulaRæusch = seg.
verrucosa Gærtn. 425
ZAHLBRUCKNERA I 541 (447)
paradoxa Rchb. 541
ZANNICHELLIA I 155 (158)
brachystemon J. Gay = pedicellata
dentata W. = palustris (α)
digyna J. Gay = pedicellata
gibberosa Rchb. 156 (β b)
maritima Nolte = pedicellata
macrostemon J. Gay = palustris (α)
major Bœnn. 155 (α d)
marina Niels. = palustris (α)
minor Schur (pal.) = repens
palustris L. 155, A 40
pedicellata Buch.-Ham., Fr. = seg.
pedicellata Whlnb. (*pal.*) 156 (β), A 40
pedunculata Rchb. = major et pedicellata
peltata Bert. A 40 (α e)
polycarpa Nolte 155 (α b)
radicans Wallm. A 40 (β c)
repens Bœnn. 155 (α c)
repens Wallm. = radicans
reptans Fiori (pedicell.) 156 (β c) = radicans, cfr. A 40
stagnalis Rchb. (pedunc.) = major
stipitata Koch (palustris) = pedicellata
tenuis Reut. = repens
vaginalis Del. = Althenia filiformis
ZAPANIA = Lippia
citriodora Lam. = L. citriod.
nodiflora Lam. = L. nodifl.
repens Bert. = L. repens
ZEA I 43 (88)
Mays L. 43
præcox Pers. (*Mays*) 43 (β)
segetalis Salisb. = Mays
vulgaris Mill. = Mays
ZENOPOGON = Anthyllis
cytisoides Lk. = A. cytis.
Herrmanniæ Lk. = A. Herrm.
ZEOCRITON = Hordeum
commune P. B. = H. Zeocriton
distichum P. B. = H. distich.
maritimum P. B. = H. marit.
murinum P. B. = H. murin.
nodosum P. B. = H. bulbos.
pratense P. B. = H. secalin.
rigidum P. B. = H. marit.?
strictum P. B. = H. bulbosum
vulgare S. F. Gray = H. Zeocriton
ZERNA = Bromus
aspera Panz. = B. ramosus
bromoides Panz. = Vulpia dertonensis
distachyos Panz. = Brachypod. distach.
erecta Panz. = B. erectus
gigantea Panz. = Festuca gig.
macrostachys Panz. = B. macr.
ZERNA = Bromus
madritensis Panz. = B. madr.
Myuros Panz. = Vulpia Myurus
sterilis Panz = B. sterilis
tectorum Panz. = B. tector.
ZINNIA
elegans Jacq. 303 (nota)
ZIZYPHORA III 63 (800)
alpina Mill. = seg.
capitata L. 64
compacta Friv. = prec.
serpyllacea Ten. (non M. B.) = prec.
thymoides R. et S. = Thymus Serpyll.
ZIZYPHUS II 212 (611)
Lotus Lam. 212 (2)
officinarum Medic. = sativa
Paliurus W. = Paliurus Spina-Christi
sativa Gærtn. 212 (1)
silvestris Mill. = Lotus
Spina-Christi Georgi (non W.) = Paliurus Spina-Christi
vulgaris Lam. = sativa
ZIZZIA = Petrocallis
pyrenaica Roth = P. pyren.
ZOLLIKOFERIA = Launæa
apargioides Nees = Willemetia stipitata
chondrilloides DC. = L. resedifolia
hieracioides Nees = seg.
Peltidium Gaud. = Willemetia stipitata
resedifolia Coss. = L. resedif.
ZOOPHORA = Orchis
atropurpurea Bernh. = O. militaris
rubella Bernh. = prec.
ZOSTERA I 156 (161)
angustifolia Freyn (mar.) = Cymodocea nodosa
angustifolia Horn. (*mar.*) 156 (1 b)
marina Bert. = nana
marina L. 156 (1)
marina Vis. = Posidonia oceanica
mediterranea DC. = Cymodocea nodosa
minor Nolte = nana
nana Roth 157 (2)
nodosa Guss. = nana
nodosa Ucria = Cymodocea nodosa
Noltei Horn. = nana
oceanica L. = Posidonia ocean.
pumila Le Gall = nana
serrulata Bert. = marina
serrulata Targ.-Tozz. = Cymodocea nodosa
uninervis Rchb. = nana
ZYGOPHYLLUM II 253 (631)
Fabago L. 253

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE DEGLI AUTORI

e relative abbreviazioni

Adam. = Adamovic
Adams = Adams
Adans. = Adanson
Afzel. = Afzelius
Afzel. et Wadsb. = Afzelius et Wadsberg
Agardh = Agardh
Agass. = Agassis
Ahlq. = Ahlquist
Aiken = Aiken
Aikin = Aikin
Ait. = Aiton
Ait. et Vahl = Aiton et Vahl
Albert = Albert
Alef. = Alefeld
Alsch. = Alschinger
Alstr. = Alstrœmer
Ambr. = Ambrosi
Ambrosi = Ambrosi
Amann = Amann
Amman = Amman
Amo = Amo
Anders. = Anderson G.
Anderss. = Andersson
Andræ = Andræ
Andr. = Andrews
Andrz. = Andrzejowsky
Angstr. = Angstroem
Ant. = Antoine
Anzi = Anzi
Appel = Appel
Arc. = Arcangeli
Ardissone = Ardissone
Ard. = Arduino
Ardoino = Ardoino
Armit. = Armitage
Arnold = Arnold
Arn. = Walker-Arnott
Arrh., Arrhen. = Arrhenius
Arv. T. = Arvet-Touvet
Arv. T. et Belli = Arvet-Touvet et Belli
Arv. T. et Briq. = Arvet-Touvet et Briquet
Arv. T. et Chen. = Arvet-Touvet et Chenevard
Arv. T. et Gremli = Arvet-Touvet et Gremli
Arv. T. et Gaut. = Arvet-Touvet et Gautier
Asch. = Ascherson
Asch. et Græbn. = Ascherson et Græbner
Asch. et Jka. = Ascherson et Janka
Asch. et Magn. = Ascherson et Magnus
Asch. et Schweinf. = Ascherson et Schweinfurth
Aspegren = Aspegren
Asso = Asso
Aubry = Aubry
Aucher = Aucher
Auct. = Auctorum
Auct. it. = Auctorum italicorum
Auct. mult. = Auctorum multorum
Auct. pl. = Auctorum plurimum
Audib. = Audibet
Auersw. = Auerswald
Ausserd. = Ausserdorfer
Avè-Lall. = Avè-Lallement
Avetta et Casoni = Avetta et Casoni
Aznav. = Aznavour

Bab. = Babington
Babey = Babey
Bacc. = Baccarini
Backh. = Backhouse
Bad. = Badarò
Badarò = Badarò
Bænitz = Bænitz
Bær = Bær
Bagl. = Baglietto
Baguet = Baguet
Baill. = Baillon
Bak. = Baker
Baker = Baker
Balb. = Balbis
Balb. et Nocca = Balbis et Nocca
Bald. = Baldacci
Baldacci = Baldacci
Balfour = Balfour
Ball = Ball
Barb. = Barbey
Barbaz. = Barbazita
Barbazita = Barbazita
Barbey = Barbey
Barbieri = Barbieri
Barcelo = Barcelo
Barn. = Barnéoud
Barla = Barla
Baroni = Baroni Eugenio
Bart. = Barton
Bartal. = Bartalini
Barth = Barth
Bartl. = Bartling
Bartl. et Wendl. f. = Bartlin et Wendland Heinr. Ludw. (filius)
Bassi = Bassi
Bast. = Bastard vel Batard
Batt. = Battandier
Batt. et Trab. = Battandier et Trabut
Bauch = Bauch
Baudo = Baudo
Baumg. = Baumgarten
Bayl.-Bar. = Bayle-Barelle
Baxt. = Baxter
Boklr. = Bœckeler
Beaupré = Beaupré
Beauv., vide P. B.
Beauverd = Beauverd
Becc. = Beccari
Bech. = Bechaus
Bechst. = Bechstein
Beck, Beck G. = Gunther-Beck
Beck. et Lindeb. = Becker et Lindeberg
Becker = Becker Joh.
Becker W. = Becker Wilhelm
Beeby = Beeby
Bég. = Béguinot
Behm = Behm
Behrends. = Behrendsen
Beilschm. = Beilschmid
Bell. = Bellardi
Belli = Belli
Belli et Arv. T. = Belli et Arvet-Touvet
Belli et Hack. = Belli et Hackel
Bellck. = Bellynck
Bellynck = Bellynck
Benek. = Beneken
Benkö = Benkö
Benth. = Bentham
Benth. et Hook. f. = Bentham et Hook. J. D. (filius)
Béraud = Béraud
Berber = Berber
Bercht. = Berchtold
Bercht. et Opiz = Berchtold et Opiz

Digitized by Google

Bercht. et Presl = Berchtold et Presl
Béreng. = Bérenger
Bergam. = Bergamaschi
Berg., Berger. = Bergeret J. P.
Bermann = Bermann
Bern. = Bernard
Bern. et Gren. = Bernard et Grenier
Bernh. = Bernhardi
Bert. = Bertoloni Antonio
Bert. f. = Bertoloni Giuseppe (filius)
Bertero = Bertero
Berthiot = Berthiot
Besse et Zahn = Besse et Zahn
Bess. = Besser
Besser = Besser
Betcke = Betcke
Beurl. = Beurling
Beyer = Beyer R.
Bge. = Bunge
B. et H. = Bentham et Hooker f.
Bianca = Bianca
Bias, Biasol. = Biasoletto
Bicchi = Bicchi
Bicheno = Bicheno
Bickn. = Bicknell
Bicknell = Bicknell
Bicknell et Fiori = Bicknell et Fiori
Bigel. = Bigelow
Bill. = Billot
Bill. et Gren. = Billot et Grenier
Bir. = Biroli
Biroli = Biroli
Biria = Biria
Bisch. = Bischoff
Bischoff = Bischoff
Biv. = Bivona-Bernardi
Bizz. = Bizzozero
Blackw. = Blackwell
Bl. = Blume
Bl. et Fing. = Bluff et Fingerhut
Blocki = Blocki
Bluff = Bluff
Bluff et Fing. = Bluff et Fingerhut
Blum. = Blume
Blume = Blume
Blytt = Blytt
Bnge. = Bunge
Bodard = Bodard
Bœb. = Bœber
Bœber = Bœber
Bœck., Bœckel. = Bœckeler
Bœhm. = Bœhmer
Bœnn., Bönningh. = Bœninghausen
Bogenh. = Bogenhard
Bohatsch = Bohatsch
Boiss. = Boissier
Boiss. et Bal. = Boissier et Balansa
Boiss. et Bl. = Boissier et Blanche
Boiss. et Buhse = Boissier et Buhse
Boiss. et Heldr. = Boissier et Heldreich
Boiss. et Huet = Boissier et Huet du Pavillon
Boiss. et Orph. = Boissier et Orphanides
Boiss. et Reut. = Boissier et Reuter
Boiss. et Sprun. = Boissier et Spruner
Boissieu = Boissieu
Bolle = Bolle
Bolton = Bolton
Bolzon = Bolzon
Bolzon et De Bonis = Bolzon et De Bonis
Bonaf. = Bonafous
Bonap. = Bonaparte C. L. princ. di Canino e Musignano
Bonato = Bonato
Bonavia = Bonavia
Bones., err. pr. Bonj.
Bong. = Bongard
Bongard = Bongard
Bonj. = Bonjean
Bonjean = Bonjean
Bonn. et Layens = Bonnier et De Layens
Bonnet = Bonnet
Bonnet et Bar. = Bonnet et Baratte
Bonpl. = Bonpland
Boos J. = Boos Joseph
Booth = Booth
Bor. = Boreau
Borb. = Borbás
Borb. et Wettst. = Borbás et Wettstein
Bord. = Bordère
Borckh., Borkh. = Borkhausen
Born., Bornm. = Bornmüller
Born. = Bornet
Bornet = Bornet
Bory = Bory de St. Vincent
Bory et Chaub., Bory et Ch. = Bory et Chaubard
Borzì = Borzì
Bosc = Bosc
Bové = Bové
Bouch. = Boucher
Bouché = Bouché
Boulay et Luc. = Boulay et Lucand
Boullu = Boullu
Bourg. = Bourgeau
Bout. = Boutigny
Bout. et Bern. = Boutigny et Bernard
Bouvier = Bouvier
Br. A. = Braun Alexander
Br. F. = Braun Friedrich
Br. G. = Braun G.
Br. H. = Braun Heinrich
Br. R. = Brown Robert
Brand = Brand
Brandza = Brandza
Braüker = Braüker
Braun A. = Braun Alexander
Braun F. = Braun Friedrich
Braun G. = Braun G.
Braun H. = Braun Heinrich
Bray = Bray
Bréb. = De Brébisson
Brenn. = Brenner
Brenner M. = Brenner Magnus
Briganti = Briganti
Brign. = Brignoli di Brunnhoff
Briq. = Briquet
Britt., Britting. = Brittinger
Broch. et Neyr. = Brochon et Neyraut
Brocchi = Brocchi
Brogn., vide Brongn.
Bromf. = Bromfield
Brongn. = Brongniart
Brot. = Brotero
Brouss. = Broussonet
Bruce = Bruce
Brückn. = Brückner
Brügg., Bruegg. = Bruegger
Bruno = Bruno
Brynh N. = Brynh N.
Bub. = Bubani
Bubani = Bubani
Buch.-Ham. = Buchanan-Hamilton
Buchen. = Buchenau
Buching. = Buchinger
Buchoz = Buchoz
Budd. = Buddensieg
Buek = Buek
Bull. = Bulliard
Bunge = Bunge
Burch. = Burchell
Burgsdf. = Burgsdorff
Burkh. = Burkhardt
Burm. = Burmann Joh.
Burm. f. = Burmann Nikolaus (filius)
Burn. = Burnat
Burn. et Gr., Burn. et Gremli = Burnat et Gremli
Burnouf = Burnouf
Buser = Buser

Cafl. = Caflisch
Caill. = Caillaud
Caille = Caille
Cald. = Caldesi
Caldesi = Caldesi
Calestani = Calestani
Call. = Callier
Callier = Callier
Calmé = Calmé
Camb., Cambess. = Cambessèdes
Campana = Campana
Campd. = Campdera
Cam. G. = Camus G.
Camus, Camus G. = Camus G.
Cam. et Har. = Camus G. et Hariot
Cand., vide DC.
Canut = Canut
Car. et St.-Lag. = Cariot et Saint-Lager
Cariot = Cariot
Carmign. = Carmignani
Carr. = Carrier
Caruel = Caruel
Casp. = Caspary
Cast. = Castagne
Cass. = Cassini
Caudargy = Caudargy
Cav. = Cavanilles
Cavalier = Cavalier
Cavara = Cavara
Cavillier = Cavillier
Cavol. = Cavolini
Celak. = Celakovsky

Digitized by Google

Ces. = Cesati
Ces. et DNtrs. = Cesati et De Notaris
Ces. P. et G. = Cesati Passerini et Gibelli
Chab. = Chabert
Chabert = Chabert
Chaix = Chaix
Cham. = De Chamisso
Cham. et Sch. = De Chamisso et Schlechtendal
Chanay et Mill. = Chanay et Millière
Charpent. = Charpentier
Chast. = Chastaing
Chaten. = Chatenier
Chaub. = Chaubard
Chav. = Chavannes
Chaz. = Chazelles de Prizy
Chen., Chenev. = Chenevard
Chen. et Braun = Chenevard et Braun
Chenev. et Sch. = Chenevard et Schinz
Cheval. = Chevalier
Chev., Chevall. = Chevallier
Chiov. = Chiovenda
Chiov. et Rossi = Chiovenda et Rossi
Chod. = Chodat
Chod. et Hassl. = Chodat et Hassler
Choisy = Choisy
Christen. = Christener
Cicioni = Cicioni
Clairv. = Clairville
Clar. = Clarion
Clarion = Clarion
Clark., Clarke = Clarke Edw. Daniel
Clarke C. B. = Clarke C. B.
Clav. = Clavaud
Clem. = Clementi
Clos = Clos
Clowes = Clowes
Cocc. = Cocconi
Cocc. et Cug. = Cocconi et Cugini
Cogn. = Cogniaux
Coincy = De Coincy
Col. = Columna
Colden = Colden
Colem. = Coleman
Colla = Colla
Comell. = Comelli
Comes = Comes
Comm. Commerson
Comolli = Comolli
Conti = Conti
Cook = Cook
Coqueb. = Coquebert de Montbret
Corb. = Corbière
Cornaz = Cornaz
Cortesi F. = Cortesi Fabrizio
Cosent. = Cosentino
Coss. = Cosson
Coss. et Dur. = Cosson et Durieu
Coss. et Germ = Cosson et Germain
Coss. et Kral. = Cosson et Kralik
Costa = Costa
Coste = Coste
Coult. = Coulter
Cramer = Cramer
Crantz = Crantz
Crép. = Crépin
Cumino = Cumino
Curt. = Curtis
Cus. et Annsb. = Cusin et Annsbergue
Cuss. = Cusson
Cust. = Custor
Cyr. = Cyrillo
Czern. = Czerniajef
Czetz = Czetz

Dalib. = Dalibard
Dalla Torre = Dalla Torre
Dalla Torre et Sarnth. = Dalla Torre et Sarntheim
Danth. = Danthon
Darr. = Darracq
Daveau = Daveau
DC. = De Candolle A. Pyr.
DC. f. = De Candolle Alphonse (filius)
Done. = Decaisne
Deb., Debx. = Debeaux O.
Debeaux O. = Debeaux O.
De Bonis = De Bonis
De Bray = De Bray
De Bruyn = De Bruyn
Decaisn. = Decaisne
Decne., Decsne. = Decaisne
De Coincy = De Coincy
Degen = Degen
Deg. et Zahn = Degen et Zahn
De Ging., vide Ging.
Degl. = Degland
Del. = Raffeneau-Delile
Delacr. = De Lacroix
De la Harpe = De la Harpe
Delar. = De la Roche
De Laramb., vide Laramb.
Delarb. = Delarbre
Delarbre = Delarbre
De la Soie = De la Soie
Delast. = Delastre
De Lens = De Lens
Delicata = Grech-Delicata
Delle Chiaie = Delle Chiaie
Delort = Delort
Dem. = Dematra
De Not. = De Notaris
Dergano = Dergano
Dés. = Déséglise
Dés. et Dur. = Déséglise et Durieu
Dés. et Guill. = Déséglise et Guillon
Dés. et Oz = Déséglise et Ozanon
Desetangs = Desetangs
Desf. = Desfontaines
Desmaz. = Desmazieres
Des Moul. = Des Moulins
Desp. = Desportes
Desr. = Desrousseau
Desv. = Desvaux
Deth. = Detharding
De Toni E. = De Toni Ettore
De Vis., vide Vis.
Dick. = Dickson
Didr. = Didrichsen
Dierb. = Dierbach
Dietr. A. = Dietrich Albert
Dietr. D. = Dietrich Dav.
Dietr., Dietr. F. G. = Dietrich Friedr. Gottl.
Dill. = Dillenius
Dipp. = Dippel
Dippel = Dippel
DNtrs. = De Notaris
Dochn. = Dochnahl
Doell, Döll = Doell
Doell., Döllin. = Doelliner
Doerfl. = Doerfler
Domin = Domin
Don D. = Don David
Don G. = Don George
Donn = Donn
Dorner = Dorner
Dorth. = Dorthes
Dougl. = Douglas
Doumenj = Doumenj
Drapiez = Drapiez
Drege = Drege
Drej. = Drejer
Drejer = Drejer
Drude = Drude
Druce = Druce
Dryand. = Dryander
Dubois = Dubois
Duby = Duby
Duch. = Duchesne
Ducomm. = Ducommun
Ducr. = Ducros
Ducros = Ducros
Duf. = Dufour
Dufr. = Dufresne
Duham. = Duhamel
Duham. N. = Nouveau-Duhamel
Dulac = Dulac
Dum. = Du Mortier vel Dumortier
Dum.-Cours. = Dumont de Courset
Dun. = Dunal.
Dupuy = Dupuy
Dur. = Durieu de Maisonneuve
Durand = Durand
Durand et Schinz = Durand et Schinz
Durazz. = Durazzini
Duroi = Duroi vel Du Roi
D'Urv., vide Urvill.

Eaton = Eaton
Eaton et Wright = Eaton et Wright
Ecklon = Ecklon
Ekstr. = Ekström
Edgew. = Edgeworth
Ehrenb., Ehrbrg. = Ehrenberg
Ehrh. = Ehrhart
Eichenf. = Eichenfeld
Eichw. = Eichwald
Ell. = Elliot
Ellis = Ellis
Endl. = Endlicher
Engelm., Englm. = Engelmann
Engl. = Engler
Erb. critt. it = Erbario crittogamico italiano
Erndl = Erndl
Erndt = Erndt
Etling. = Etlinger
Evers = Evers

Digitized by Google

Fabre = Fabre
Facch. = Facchini
Falk = Falk
Farneti = Farneti
Fasano = Fasano
Fauché et Chaub. = Fauché et Chaubard
Faucon. = Fauconnet
Favr. = Favrat
Favrat et Schimp. f. = Favrat et Schimper filius
Favre = Favre
Faye = Faye
Fée = Fée
Fenzl = Fenzl
Ficin. = Ficinus
Fieb. = Fieber
Fing. = Fingerhut
Fiori = Fiori
Fiorini = Fiorini-Mazzanti
Fisch. = Fischer
Fisch.-Oost. = Fischer-Ooster
Fisch. et Mey. = Fischer et Meyer
Flatt = Flatt
Fleisch., Fleischm. = Fleischmann
Fleury = Fleury
Fliche = Fliche
Floder = Floder
Flœrke = Flœrke
Fluegge = Fluegge
F. et M. = Fischer et Meyer
F. M. et Avé-Lall. = Fischer Meyer et Avé-Lallement
F. M. et T. = Fischer Meyer et Trautvetter
Focke = Focke
Forb. = Forbes
Forest. = De Forestier
Form., Formán. = Formánek
Formánek = Formánek
Forsk. = Forskal
Forst. E. = Forster E.
Forst. = Forster
Forster = Forster
Fouc. = Foucault
Fouc. = Foucaud
Fouc. et Mand. = Foucaud et Mandon
Fouc. et Rotg. = Foucaud et Rotgés
Fouc. et Sim. = Foucaud et Simon
Foug. = Fougeroux
Fourn. = Fournier
Fourr. = Fourreau
Fr. = Fries
Franch. = Franchet
Franchet = Franchet
Frank = Frank
Fres., Fresen. = Fresenius
Freyer = Freyer
Freyn = Freyn
Freyn et Sint. = Freyn et Sintenis
Friedr. = Friedrichsthal
Fritsch = Fritsch
Fritze = Fritze
Friv. = Frivaldszky
Frœl., Fröl. = Frœlich
Funck = Funck vel Funk
Fusch. = Fuschius
Fuss = Fuss
Gærtn. = Gærtner
Gærtn. M. et S. = Gærtner Meyer et Scherbius
Gandog. = Gandoger
Gant. = Gantener
Garcke = Garcke
Gars. = Garsault
Garzia = Garzia
Gasp. = Gasparrini
Gat., Gater. = Gaterau
Gaud. = Gaudin
Gaudich. = Gaudichaud
Gaut. = Gautier
Gay C. = Gay Claude
Gay, Gay J. = Gay Jacq.
Gcke. = Garcke
Gdgr. = Gaudoger
Gelmi = Gelmi
Geners. = Genersich
Genev. = Genevier
Genn. = Gennari
Genty = Genty
Georgi = Georgi
Gerb. et Tar. = Gerbino et Taranto
Gerh. = Gerhard
Gérard = Gérard
Geuns = Geuns
Gib. = Gibelli
Gib. et Belli = Gibelli et Belli
Gib. et Pir. = Gibelli et Pirotta
Gilib. = Gilibert
Gill. = Gillies
Gill. et Coste = Gillot et Coste
Gillaboz = Gillaboz
Gillot = Gillot
Ging. = De Gingens-Lassaraz
Girard = De Girard
Giraud. = Giraudias
Giraudias = Giraudias
Girt. = Girtanner
Glaab = Glaab
Gled. = Gleditsch
Glox. = Gloxin
Glow. = Glowacki
Gmel., Gmel C. C. = Gmelin Carl Christ.
Gmel. J. F. = Gmelin Joh. Friedr.
Gmel. J. G. = Gmelin Joh. Georg.
Gmel S. G. = Gmelin Sam. Gottfr.
Goaty et Pons = Goaty et Pons
Gochn. = Gochnat
Godefr. = Godefroy
Godet = Godet
Godr. = Godron
Gœbl et Stein = Gœbl et Stein
Goir. = Goiran
Goir. et Del Fabbro = Goiran et Del Fabbro
Goir. et Ton. = Goiran et Tonini
Gola = Gola
Goldb. = Goldbach
Good. = Goodenough
Gorsk. = Gorski
Gört. = Görter
Görter = Görter
Gort. M. = Gortani Michele
Gortani M. = Gortani Michele
Gouan = Gouan
Goupil = Goupil
Grælls = Grælls
Graf = Graf
Grah. = Graham R.
Graham = Graham R.
Granier = Granier
Grantz. = Grantzow
Gras = Gras
Gray A. = Gray Asa
Gray S. F. = Gray Samuel Frederick
Grech-Del. = Grech-Delicata
Gremli = Gremli
Greene = Greene
Gren. = Grenier
Gren. et Call. = Grenier et Callay
Gr. et Godr. = Grenier et Godron
Gren. et Phil. = Grenier et Philippe
Griess. = Griesselich
Griff. = Griffith
Grimm = Grimm
Griseb. = Grisebach
Gris. et Schk. = Grisebach et Schenk
Gromow = Gromow
Grosse = Grosse
Gross. = Grosser
Groves = Groves
Gruf., Grufb. = Grufberg
Guatt. = Guatteri
Gueld., Güld. = Gueldenstadt
Guenth., Günth. = Guenther
Guenth. et Schm. = Guenther et Schummel
Guép. = Guépin
Guers. = Guersent
Guett. = Guettard
Gulia = Gulia
Gunn. = Gunner
Gunner = Gunner
Gürke = Gürke
Gusmus = Gusmus
Guss. = Gussone

Hab. = Haberle
Habl. = Hablitz
Hack. = Hackel
Hack. et Belli = Hackel et Belli
Hacq. = Hacquet
Hænke = Hænke
Hænsel. = Hænseler
Hagen = Hagen
Hagenb. = Hagenbach
Hal. = De Halácsy
Halácsy = De Halácsy
Halácsy et Br. = De Halácsy et Braun H.
Halin = Halin
Hallier = Hallier
Hall. = Haller Albert
Hall. f. = Haller Albert (filius)
Hall W. = Hall W.
Hall. et Whlf. = Hallier et Wohlfarth
Ham. A. = Hamilton Arthur
Hamm. = Hammar
Hammar = Hammar
Hampe = Hampe
Hance = Hance
Hanry = Hanry

Digitized by Google

Hariot = Hariot
Harms = Harms
Hart. = Hartig
Hartm. = Hartmann Carl
Hartm. P. E. = Hartmann Peter Emman.
Harv. = Harvey
Harz = Harz
Hasselq. = Hasselquist
Hassk. = Hasskarl
Hausskn. = Haussknecht
Hausskn. et Bornm. = Haussknecht et Bornmüller
Hayek = Hayek
Hayne = Hayne
Haw. = Haworth
Hazsl. = Hazslinszky
H. B. et K., H. B. et Kth. = Humboldt Bonpland et Kunth
Hedl. = Hedlund
Hedw. = Hedwig
Heer = Heer
Heg. = Hegetschweiler
Heg. et Heer = Hegetschweiler et Heer
Hegelm. = Hegelmaier
Heim. = Heimerl
Heldr. = Heldreich
Heldr. et Sart. = Heldreich et Sartori
Hell. = Heller
Henon = Henon
Herb. = Herbert
Herb. et Trev. = Herbert et Trevor-Alcock
Herbich = Herbich
Herd. = Herder
Hérit., vide L'Hérit.
Herm. = Hermann
Herrm. = Herrmann
Heuff. = Heuffel
Heuß. = Heußer
Heutze = Heutze
Heynh. = Heynhold
Hiern = Hiern
Hieron. = Hieronymus
Hilair., vide St.-Hil.
Hill = Hill
Hint., Hinterh. = Hinterhuber
Hladn. = Hladnik
Hochst. = Hochstetter
Hochst. et Steud. = Hochstetter et Steudel
Hœck, Höck = Hœck
Hœfft = Hœfft
Hœpfn. = Hœpfner
Hœss = Hœss
Hoffms. = Hoffmannsegg
Hoffgg. et Lk., Hoffmgg. et Lk. = Hoffmannsegg et Link
Hoffm., Hoffm. G. F. = Hoffmann Georg. Franc.
Hoffm. O. = Hoffmann O.
Hogg = Hogg
Hohen., Hohnck. = Hohenacker
Hol. = Holand
Holl et Heynh. = Holl et Heynhold
Holuby = Holuby
Hom. = Homann
Honck. = Honckeny
Hook., Hook. f. = Hooker Joseph Dalton (filius)
Hook. W. J. = Hooker William Jackson
Hook. et Arn. = Hooker W. J. et Walker-Arnott
Hook. et Walk. = Hooker W. J. et Walker-Arnott
Hopk. = Hopkirk
Horn. = Hornemann
Horng. = Hornung
Hornsch. = Hornschuch
Hornung = Hornung
Hort. = Hortulanorum
Hort. par. = Hortus parisiensis
Host = Host
Host et Moretti = Host et Moretti
Houst. = Houston
Houtt. = Houttuyn
Hpe. = Hoppe
Hpe. et Hornsch. = Hoppe et Hornschuch
Hpe. et Schl. = Hoppe et Schleicher
Huds. = Hudson
Huet = Huet du Pavillon A.
Huet et Hanry = Huet et Hanry
Huet E = Huet Edm.
Hüg. = Hügel
Hülsen = Hülsen
Humb. = Humbold
Humb. et Kth. = Humbold et Kunth
Husnot = Husnot
Hussen = Hussen
Hussenot = Hussenot
Huter = Huter
Hut. et Gand. = Huter et Gander
Huter P. et R. = Huter Porta et Rigo
Huth = Huth
Hy F. = Hy F.

Ilse = Ilse
Ingegn. = Ingegnatti
Inz. = Inzenga
Irm., Irmsch. = Irmisch

Jacks. = Jackson
Jacq. = Jacquin Nicol. Jos.
Jacq. f. = Jacquin Jos. Franc. (filius)
Jacqm. = Jacquemont
Jacques = Jacques
Jan = Jan
Janka = Janka
Jatta = Jatta
Jaub. = Jaubert
Jaub. et Spach = Jaubert et Spach
Jauvy = Jauvy
Jeanb. et Timb. = Jeanbernard et Timbal
Jessen = Jessen
Jirasek = Jirasek vel Jiraseck
Johnst. = Johnston
Jones = Jones
Jord. = Jordan
Jundz. = Jundzill
Jur. = Juratzka
Juratzka = Juratzka
Juss. = De Jussieu A. L.
Kab. = Kabath
Kabath = Kabath
Kalm = Kalm
Kalt. = Kaltenbach
Kan. = Kanitz
Kar. et Kir. = Karelin et Kirilow
Karst. = Karsten
Karsten = Karsten
Kaulf. = Kaulfuss
Kchy. = Kotschy
Kell. R. = Keller Robert
Kell. et Chen. = Keller et Chenevard
Ker-Gawl. = Ker-Gawler
Kellner = Kellner v. Köllenstein
Kern., Kern. A. = Kerner Anton
Kern. J. = Kerner Josef
Kern. et Huter = Kerner et Huter
Kiærskon = Kiærskon
Kindb. = Kindberg
Kirschl. = Kirschleger
Kit. = Kitaibel
Kitt. = Kittel
Kittel = Kittel
Klatt = Klatt
Klett = Klett
Kl. et Richt. = Klett et Richter
Klett et Richt. = Klett et Richter
Klinggr. = Klinggræff
Klotzsch = Klotzsch
Kl. et Garcke = Klotzsch et Garcke
Kluk = Kluk
Kmet = Kmet
Knáf = Knáf
Knapp = Knapp
Koch = Koch Wilhelm Daniel Joseph
Koch et Noë = Koch et Noë
Koch et Sond. = Koch et Sonder
Koch et Ziz = Koch W. et Ziz
Koch C. = Koch Carl
Koch C. et Fint. = Koch C. et Fintelmann
Kœhne = Kœhne
Kœl. = Kœler
Kœlr. = Kœlreuter
Kœn., Kön. = Kœnig
Kœnig = Kœnig
Kœrn., Kœrnk. = Kœrnicke
Kœrte = Kœrte
Kohts = Kohts
Kornh. = Kornhuber
Kostel., Kostlz. = Kosteletzky
Kotschy = Kotschy
Kral. = Kralik
Kram. = Kramer
Kras. = Krasan
Krasan = Krasan
Krause = Krause
Krock. = Krocker
Krok = Krok
Kronf. = Gronfeld
Kth. = Kunth
Kth. et Bouch. = Kunth et Bouché
Ktze. O. = Kuntze Otto
Kühl. = Kühlewein
Kuek., Kük. = Kuekenthal

Digitized by Google

Kuetz., Kütz. = Kuetzing
Kuhl = Kuhl
Kuhn = Kuhn
Kum. et S. = Kummer et Sendtner
Kurz = Kurz
Kze., Kunz. = Kunze
Kze. O., Ktze. O. = Kuntze Otto

L. = Linnæus Carol.
L. f. = Linnæus Carol. (filius)
Lab., Labill. = Labillardière
Lacaita = Lacaita
Lach., Lachen. = Lachenal
Læst. = Læstadius
Lag. = Lagasca
Lagger = Lagger
Lagg. et Delasoie = Lagger et De la Soie
Lagg. et Pug. = Lagger et Puget
Laharpe, La Harpe = De La Harpe
Lam. = De Lamarck
Lamb. = Lambert
Lamotte = Lamotte
Láng = Láng Adolph Franz
Lang. O. F. = Lang Otto Friedrich
Lange = Lange
Lanza = Lanza
Lap. = De la Peyrouse
Lapierre = Lapierre
Laramb. = De Larambergue
Larsson = Larsson
Lasch = Lasch
Lasche = Lasche
Laterr. = Laterrade
Latour. = Latourette
Lauche = Lauche
Lauth = Lauth
Laws. = Lawson
Laxm. = Laxmann
Lazaro = Lazaro
Lebel = Lebel
Le Bêle = Le Bêle
Lec. = Lecoq
Lec. et Lam., Lec. et Lmt. = Lecoq et Lamotte
Lecont. = Le Conte
Led., Ledeb. = Ledebourg
Lees = Lees
Leers = Leers
Lefèvre = Lefèvre
Leffl. = Leffler
Le Gall = Le Gall
Legr. = Le Grand A.
Legrand = Legrand Ed.
Le Grand. Le Grand A. = Le Grand A.
Lehm. = Lehmann Johann G. Ch.
Lehm. C. B. = Lehmann Carl B.
Lej. = Lejeune
Lej. et Court. = Lejeune et Courtois
Lej. et Mich. = Lejeune et Michel
Le Jolis = Le Jolis
Lemaire = Lemaire
Lém. = Léman
Lenticchia = Lenticchia
Leonh. = Leonhardi
Lep., Lepech. = Lepechin
Lepell. = Lepelletier
Lerch. = Lerchenfeld
Leresche = Leresche
Lesp. et Thév. = Lespinasse et Théveneau
Less. = Lessing
Lesson = Lesson
Lestib. = Lestiboudois
Léveillé = Léveillé
Lev. = Levier
Lev. et Somm. = Levier et Sommier
Levier = Levier
Leyb. = Leybold
Leyss. = Leysser
Leysser = Leysser
Lge. = Lange
L'Hérit., L'Hér. = L'Héritier de Brutelle
Libert = Libert
Liegel = Liegel
Lightf. = Lightfoot
Liljebl. = Liljeblad
Lindb. = Lindberg
Lindeb. = Lindeberg
Lindem. = Lindemann E. A.
Lindern = Lindern
Lindl. = Lindley
Lindl. et Paxt. = Lindley et Paxton
Lk. = Link
Lk. et Otto = Link et Otto
Lloyd = Lloyd
Lodd. = Loddige
Lœffl. = Lœffling
Lœhr = Lœhr
Lœnnr. = Lœnnroth
Lois. = Loiseleur Deslongchamps
Lojac. = Lojacono
Lond. = Londes
Longo B. = Longo Biagio
Loret = Loret
Lor. et B., Lor. et Barr. = Loret et Barrandon
Lorey = Lorey
Losc. = Loscos y Bernál
Losc. et Pard. = Loscos et Pardo
Loser = Loser
Loud. = Loudon
Lour. = Loureiro
Lowe = Lowe
Lucé = Lucé
Ludw. = Ludwig
Luescher = Luescher
Luerss. = Luerssen
Luiset = Luiset
Lumn. = Lumnitzer
Lund = Lund

Mab. = Mabille
Macchiati = Macchiati
Mac Mill. = Mac Millan
Mad. = Mader
Mærkl. = Mærklin
Magn. = Magnier
Maire R. = Maire R.
Malab. = Malabaila
Malinv. = Malinvaud
Maly = Maly
Man. = Clairv. (Man. Herb.)
Manceau = Manceau
Mandr. = Mandralisca
Manfeld = Manfeld
Maratti = Maratti
Marc. = Marcilly
Marcello L. = Marcello Leopoldo
March., Marches. = Marchesetti
Marg. et Reut. = Margot et Reuter
Mariz = Mariz
Marnock = Marnock
Marsh. = Marshall
Mars. = Marsigli
Mars., Marsil. = Marsili
Marss. = Marsson
Mart. = Martius Carl. Friedr. Phil.
Mart. H. = Martius Heinrich
Martelli = Martelli
Martr., Martr.-Don. = Martrin-Donos
Martyn = Martyn
Marz. = Marzari-Pencati
Masé = Masé
Masner et Opiz = Masner et Opiz
Massal. C. = Massalongo Caro
Mass. = Massara
Massara = Massara
Matt. = Mattuschka
Mattei = Mattei
Maur. = Mauri
Mauri = Mauri
Mayer = Mayer
Maxim. = Maximowicz
Mazzuc. = Mazzucato
M. B. = Marschall von Bieberstein
Mc Nab = Mc Nab W. R.
Medic. = Medicus
Meerb. = Meerburg
Meig. = Meigen
Meissn. = Meissner
Mentz. = Mentzel
Menyh. = Menyhárth
Mér. = Mérat
Mérat = Mérat
Merc. = Mercier
Merlet = Merlet
Mert. = Mertens
Metsch = Metsch
Metten. = Mettenius
Metzg. = Mettzger
Meurer = Meurer
Meyen = Meyen
Mey. = Meyer G. F. W.
Mey. C. A. = Meyer Carl Ant.
Mey. E. = Meyer Ernst Heinr. Friedr.
Mey. G. F. W. = Meyer Georg Friedr. Wilh.
Meyer, vide Mey.
Mich. = Micheli Marco
Michal. = Michalet
Michalet = Michalet
Michel. = Micheletti
Micheletti = Micheletti
Michx. = Michaux
Mieg = Mieg
Miég., Miégev. = Miégeville
Mielich. = Mielichofer
Mik. = Mikan
Milani = Milani

Digitized by Google

Milde = Milde
Mill. = Miller
Miq. = Miquel
Miquel = Miquel
Mirb. = Mirbel
Mitt. = Mitten
M. et K. = Mertens et Koch
Mœnch = Mœnch
Mœsl. = Mœsler
Moggr. = Moggridge
Molina = Molina
Moll = Moll
Monn. = Monnier
Montagn. = Montagne
Montand. = Montandon
Montb. = Montbret
Monti = Monti
Montini = Montini
Moore, Moore T. = Moore Thomas
Moq. = Moquin-Tandon
Moretti = Moretti
Moric. = Moricand
Moris = Moris
Mor. et DNtrs. = Moris et De Notaris
Moritzi = Moritzi
Morong = Morong
Morren = Morren
Moug. = Mougeot
Moutin = Moutin
Mozz. = Mozzetti
Muehl., Muehlenb., Mühlenb. = Muehlenberg
Muell., Muell. Fr., Müll. = Mueller Franc. A.
Muell. Ferd., Müll. Ferd. = Mueller Ferd.
Muell. O. F., Müll. O. F. = Mueller Otto Friedr.
Muell. P. J., Müll. P. J. = Mueller Philipp Jakob
Muench. = Muenchhausen
Muhl. = Mühlenberg
Munby = Munby
Murb. = Murbeck
Murb et Wettst. = Murbeck et Wettstein
Murbeck = Murbeck
Murith = Murith
Murr = Murr
Murr et Zahn = Murr et Zahn
Murr. = Murray
Mut. = Mutel
Mutel = Mutel

Nacc. = Naccari
Næg. = Nægeli
Naggi = Naggi
Nant. = De Nanteuil
Narducci = Narducci
Naud. = Naudin
Neck. = Necker
Nees = Nees von Esenbeck Christ.
Nees M. = Nees M.
Nees et Meyen = Nees et Meyen
Nees T. = Nees von Esenbeck Theod.
Negri = Negri
Neilr. = Neilreich
Nem. = Nemetz ?
Nestl. = Nestler
Neum. = Neumann
Neyg. = Neygenfind
Newm. = Newmann
Nic. = Nicotra
Nicotra = Nicotra
Niels. = Nielsen
Nitschke = Nitschke
Nobili = Nobili
Nocca = Nocca
Nocc. et Balb. = Nocca et Balbis
Noë = Noë vel Noé
Nœld. = Nœldeke
Nolte = Nolte
Nor. = Noronha
Norrlin = Norrlin
Noul. = Noulet
N. et P. = Nægeli et Peter
Nutt. = Nuttall
Nyl. = Nylander
Nym. = Nyman
Nym. et Kotschy = Nyman et Kotschy

Obrist = Obrist
Œd., Œder = Œder
Oken = Oken
Oliv. = Olivier
Opiz = Opiz
Opiz et Rupr. = Opiz et Ruprecht
Oppitz = Oppitz
Orph. = Orphanides
Ors. = Orsini
Orsini = Orsini
Ort., Orteg. = Ortega
Ortega = Ortega
Ortm. = Ortmann
Otth = Otth
Otto = Otto

Pach. = Pacher
Pacher = Pacher
Pacher et Jaborn. = Pacher et Jabornegg
Page = Page
Paglia = Paglia
Palanza = Palanza
Pall. = Pallas
Palla = Palla
Pamp. = Pampanini
Panc. = Pancic
Pancic = Pancic
Panizzi = Panizzi
Pantk. = Pantocsek
Panz. = Panzer
Paol. = Paoletti
Paol. et Card. = Paolucci et Cardinali
Paolucci = Paolucci
Parl. = Parlatore
Parn. = Parnell
Parol. = Parolini
Pasq. = Pasquale
Pasq. et Avell. = Pasquale et Avellino
Pass. = Passerini
Pat. Mey. et Elk. = Patze Meyer et Elkan
Patr. = Patrin
Pau = Pau
Pav. = Pavon
Payer = Payer
Payot = Payot
Pax = Pax
Paxt. = Paxton
P. B. = Palisot de Beauvois
Peete = Peete
Penzig = Penzig
Peola = Peola
Pér. = Pérard
Pérard = Pérard
Perona = Perona
Perpenti = Perpenti
Perr. = Perrier
Perr. et Song. = Perrier et Songeon
Perret = Perret
Perreym. = Perreymond
Pers. = Persoon
Personnat = Personnat
Pesn. = Pesneau
Pet. = Petagna
Petagna = Petagna
Peterm. = Petermann
Petit. E. = Petit E.
Petit F. = Petit Felix
Petrov. = Petrovic
Petter = Petter
Pfeiff. = Pfeiffer
Pfund = Pfund
Phil. = Philippi
Philippe = Philippe
Picard = Picard
Pichler = Pichler
Pieri = Pieri
Pierrat = Pierrat
Pill. et Mitt. = Piller et Mitterpacher
Pio = Pio
Pirè = Piré
Pirona = Pirona
Pirotta = Pirotta
Plan. = Planellas Giralt
Planch. = Planchon
Plusk. = Pluskal
Pntck. = Pantocsek
Podpera = Podpera
Pœch = Pœch
Pœpp. = Pœppig
Pœverl. = Pœverlein
Pohl = Pohl
Poir. = Poiret
Poit. = Poiteau
Poit. et Turp. = Poiteau et Turpin
Pok. = Pokorny
Polaki = Polaki
Pollich = Pollich
Pollini = Pollini
Pomel = Pomel
Pons E = Pons E.
Pons G. = Pons Giovanni
Pons = Pons
Pons et Coste = Pons et Coste
Ponzo = Ponzo
Porcius = Porcius
Porta = Porta
Porta et Rigo = Porta et Rigo
Portenschl., Portschl. = Portenschlag Ledermeyer
Posp. = Pospichal
Post = Post
Poulsen = Poulsen
Pourr. = Pourret
Pouz. = De Pouzolz
Prahl = Prahl
Prantl = Prantl
Preissl. = Preissler

Digitized by Google

Presl, Presl C. = Presl Carl Boriwog
Presl J. et C. = Presl Jan et Carl
Presl J. S. = Presl Joh. Swatopluk
Pritz. = Pritzel
Prohaska = Prohaska
Pucc. = Puccinelli
Puel = Puel
Pug. = Puget
Purk. = Purkyne
Pursh = Pursh

Quest. = Questier

Raab = Raab
Rabenh. = Rabenhorst
Radde = Radde
Raddi = Raddi
Radius = Radius
Ræusch. = Ræuschel
Raf. = Rafinesque-Schmaltz
Rafn = Rafn
Rain. = Rainier
Ram. = Ramond
Ramat. = Ramatuelle
Rap. = Rapin
Rasp. = Raspail
Rau = Rau
Raulin = Raulin
Rchb. = Reichenbach Heinrich
Rchb. f. = Reichenbach Heinrich Gustav (filius)
Re = Re Giov. Francesco
Reb. = Reboul
Rebent. = Rebentisch
Red. = Redouté
Rees = Rees
Reg. = Regel
Reg. et Kœrn. = Regel et Kœrnicke
Rehm. = Rehmann
Reich., Reichr. = Reichard
Rein. = Reiner
Reitt. et Abel = Reitter et Abel
Relh. = Relhan
Rén. = Rénault
Renauld = Renauld
Req. = Requien
Retz. = Retzius
Reuss, Reuss G. = Reuss Gustav
Reut. = Reuter
Reut. et Shuttl. = Reuter et Shuttleworth
Rev., Reverch. = Reverchon
Reyn. = Reynier
Rhode = Rhode
Ricci = Ricci
Rich. A. = Richard A.
Rich. = Richard C. L.
Rich. et Hochst. = Richard et Hochstetter
Richards. = Richardson
Richter = Richter Herm.
Richt., Richter, Richter K. = Richter K.
Richter J. = Richter J.
Richt. et Loret = Richter et Loret
Rigo = Rigo
Rikli = Rikli
Rion = Rion
Rip. = Ripart
Risso = Risso
Ritschl = Ritschl
Rittn. = Rittener
Riv. = Rivinus
Rob. = Robert
Rob. et Cass. = Robert et Cassini
Rob. et Cast. = Robillard et Castagne
Robs. = Robson
Roch. = Rochel
Rochel = Rochel
Rodegher = Rodegher
Rod. et Ven. = Rodegher et Venanzi
Rodr., Rodrig. = Rodriguez
Rœhl. = Rœhling
Rœm. = Rœmer Joh. Jakob
Rœm. M. J. = Rœmer M. J.
Rœper = Rœper
Rœpert = Rœpert
Rohde = Rohde
Rohrb. = Rohrbach
Rohrbach = Rohrbach
Roland. = Rolander
Rolli = Rolli
Rom. = Romano
Romagnoli = Romagnoli
Rosc. = Roscoe
Rosellini = Rosellini
Rosenstock = Rosenstock
Rossi = Rossi
Rossi et Chiov. = Rossi et Chiovenda
Ross = Ross Ermann
Ross = Ross Joh.
Rossm. = Rossmann
Rostk. = Rostkovius
Rostk. et Schm. = Rostkovius et Schmidt
Rota = Rota
Roth = Roth
Rottb. = Rottboell
Rottl. = Rottler
Roucell = Roucell
Rouss. = Roussel
Rouy = Rouy
Rouy et Cam. = Rouy et Camus E. G.
Rouy et Fouc. = Rouy et Foucaud
Roxb. = Roxburg
Royer = Royer
Royle = Royle
Roz. = Rozier
R. et S. = Rœmer et Schultes
Ruch., Ruching. = Ruchinger
Rudolph = Rudolph
Rudolphi = Rudolphi
Ruhmer = Ruhmer
Ruiz = Ruiz
Ruiz et Pav. = Ruiz et Pavon
Rupr., Rupr. F. C. = Ruprecht F. C.
Russ. = Russel
Russel = Russel
Ruthe R. = Ruthe R.
Rydberg = Rydberg
Rylands = Rylands

Sabine = Sabine
Sacc. = Saccardo Pier Andrea
Sacc. et Bizz. = Saccardo P. A. et Bizzozero.
Sacc. D. = Saccardo Domenico
Sacc. F. = Saccardo Francesco
Sadl. = Sadler
Sadler = Sadler
Sag. = Sageret
Sageret = Sageret
Sagorski = Sagorski
Sailer = Sailer
Salis, Sal.-Marschl. = Salis-Marschlin
Salisb. = Salisbury
Salle = Salle
Salles = Salles
Salm-Dyck = Salm-Dyck
Salzm. = Salzmann
Samp. = Sampaio
Sang. = Sanguinetti
Santi = Santi
Sarato = Sarato
Sard. = Sardagna
Sardagna = Sardagna
Sarnth. = Sarntheim
Sartorelli = Sartorolli
Sart. = Sartori
Sartori = Sartori
Sass = Sass
Saut. = Sauter
Sauvag. = Sauvages
Sauzé = Sauzé
Sauzé et Maill. = Sauzé et Maillard
Savat. = Savatier
Savi = Savi Gaetano
Savi f. = Savi Pietro (filius)
Savignone = Savignone
Schiw. = Schiwerek
Sch. Bip. = Schultz C. A. Bipontinus
Sch. M. = Schulze Max
Sch. et Reg. = Schmitz et Regel
Sch. et Spenn. = Schimper et Spenner
Schauer = Schauer
Scheele = Scheele
Schenk = Schenk
Scherb. = Scherbius
Scheutz = Scheutz
Schiede = Schiede
Schiff. = Schiffner
Schimp. = Schimper Wilh.
Schimp. C. = Schimper Carl
Schimp. et Spenn. = Schimper et Spenner
Schinz = Schinz
Schk. = Schkuhr
Schl., Schleich. = Schleicher
Schlecht. = Schlechtendal
Schl. et Cham. = Schlechtendal et De Chamisso
Schleid. = Schleiden
Schloss. = Schlosser
Schloss. et Vuk. = Schlosser et Vukotinovic
Schm., Schm. F. W. = Schmidt Franz Wilibald
Schm. et Reg. = Schmitz et Regel
Schmalh = Schmalhausen
Schmidel = Schmidel
Schmidely A. = Schmidely A.
Schneider C. K. = Schneider C. K.

Digitized by Google

Schnittsp. et Lehm. = Schnittspahn et Lehmann C. B.
Schinz = Schinz
Schnitzl. = Schnitzlein
Schnizl. = Schnizlein
Schœnh. = Schœnheit
Schœnheit = Schœnheit
Scholl. = Scholler
Scholtz = Scholtz
Schott = Schott
Schott Nym. et Kchy. = Schott Nyman et Kotschy
Schoub. = Schoubert
Schousb. = Schousboe
Schouw = Schouw
Schrad. = Schrader
Schrank = Schrank
Schrenk = Schrenk
Schreb. = Schreber
Schrœter = Schrœter
Schrœt. et Bett. = Schrœter et Bettelini
Schuebl. = Schuebler
Schult. = Schultes Jos. Aug.
Schult. f. = Schultes Jul. Herm. (filius)
Schultz, vide Schultz C. H. vel Schultz F.
Schultz Bip. = Schultz Carl Heinr. Bipontinus
Schultz C. H. = Schultz Carl Heinr.
Schultz F., F. G. vel F. W. = Schultz Friedr. Wilh.
Schulz, Schulz O. E. = Schulz O. E.
Schulze M. = Schulze Max
Schum. = Schumacher
Schur = Schur
Schw., Schweigg. = Schweigger
Schweigg. et Kœrte = Schweigger et Kœrte
Schweinf. = Schweinfurth
Schweinf. et Asch. = Schweinfurth et Ascherson
Schwerin = Schwerin
Scop. = Scopoli
S.-Dyck = Salm-Dyck
Seb., Sebast. = Sebastiani
Seb. et Maur., Seb. et M. = Sebastiani et Mauri
Seen. = Seenus
Seenus = Seenus
Seguier = Seguier
Seid. = Seidel
Seidl = Seidl
Sendtn. = Sendtner
Ser. = Seringe
Serres = Serres
Seub. = Seubert
Shuttlew. = Shuttleworth
Shuttl. et Huet = Shuttleworth et Huet
Sibth. = Sibthorp
Sieb. = Sieber
Sieboldt = Sieboldt
Sieb. et Zucc. = Sieboldt et Zuccarini
Siegfr. = Siegfried
Simkov. = Simkovics
Simonk., Simk. = Simonkai
Simonkai = Simonkai
Sims = Sims
Sism. = Simonde de Sismondi
Sm. = Smith Jam. Ed.
Sm. C. = Smith Christ.
Sm. G. E. = Smith Gerard. Ed.
Sob. = Sobolewsky
Sol., Soland. = Solander
Sole = Sole
Soleir. = Soleirol
Solla = Solla
Somm. = Sommier
Sond. = Sonder
Sonder = Sonder
Sorrent. = Sorrentino
Soy.-Will. = Soyer-Willemet
Soy.-Will. et Godr. = Soyer-Willemet et Godron
Spach = Spach
Spad. = Spadoni
Spenn. = Spenner
Spr. = Sprengel Curt.
Spr. f. = Sprengel Ant. (filius)
Spring = Spring
Sprun. = Spruner
S. et S. = Sibthorp et Smith
Ssow. = Ssowinski
St.-Am. = Saint-Amans
St.-Hil. = De Saint-Hilaire Jaume
St.-Hil. A. = Saint-Hilaire A.
St.-Lag. = Saint-Lager
Stapf = Stapf
Stebler = Stebler
Stebl. et Schr. = Stebler et Schroeter
Stebl. et Volk. = Stebler et Volkart
Stechm. = Stechmann
Stein = Stein
Steinh. = Steinheil
Steph. = Stephan
Stephan = Stephan
Sternb. = Sternberg
Sternb. et Hpe. = Sternberg et Hoppe
Sterneck = Sterneck
Steud. = Steudel
Steud. et Hochst. = Steudel et Hochstetter
Stev. = Steven
Stœrk = Stœrk
Stokes = Stokes
Stocks = Stocks
Strail = = Strail
Strangw. = Fox Strangways
Stremp. = Strempel
Stricker = Stricker
Strobl = Strobl
Sturm = Sturm
Suard = Suard
Sudre = Sudre
Sudw. = Sudworth
Suffr. = Suffren
Sünd. = Sündermann
Sut. = Suter
Suter = Suter
Sutt. = Sutton
Sw. = Swartz
Sweet = Sweet
Syme = Syme
Sz., vide Schultz

Tanf. = Tanfani
Tapp. = Tappeiner
Targ.-Tozz. = Targioni-Tozzetti
Taub. = Taubert
Tausch = Tausch
Tausch et Frœl. = Tausch et Frœlich
Tavel = Tavel
Tchihatch. = Tchihatcheff
Teesd. = Teesdal
Ten. = Tenore
Ten. et Guss. = Tenore et Gussone
Terr. N. = Terracciano Nicola
Terr. A. = Terracciano Achille (filius)
Texid. = Texidor
Thib. = Thibaud de Chanvallon
Thieb. = Thiebaud de Bernaud
Thielens = Thielens
Thom. = Thomas L.
Thomas = Thomas L.
Thom. et Rich. = Thomas L. et Richard
Thomas E. = Thomas Emanuele
Thor., Thore = Thore
Thory = Thory
Thou. = Petit-Thouars
Thouin = Thouin
Thüm. = Thümen
Thuill. = Thuillier
Thunb. = Thunberg
Thuret = Thuret
Thuret et Born. = Thuret et Bornet
Thwait. = Thwaites
Timm = Timm
Timb. = Timbal-Lagrave
Timb. et Març. = Timbal-Lagrave et Marçais
Tin. = Tineo
Tiss. = Tissière
Tod. = Todaro
Tod. et Pirain. = Todaro et Piraino
Tode = Tode
Tomm. = Tommasini
Torges = Torges
Torn., Tornab. = Tornabene
Torr. = Torrey
Torrey = Torrey
Towns. = Townsend
Trachsel = Trachsel
Tratt. = Trattinick
Traunf. = Traunfellner
Traunst. = Traunsteiner
Trautv. = Trautvetter
Treffer = Treffer
Treuinf. = Treuinfels
Trevir. = Treviranus
Trevis. = Trevisan
Trevisan = Trevisan
Trimen = Trimen
Trin. = Trinius
Turcz. = Turczaninow
Turn. = Turner
Turp. = Turpin
Turp. et Poit. = Turpin et Poiteau
Turra = Turra

Ucria = Ucria
Uechtr. = Uechtritz

Digitized by Google

Uechtritz = Uechtritz
Uechtrz. et Huter = Uechtritz et Huter
Ugolini = Ugolini
Ullep. = Ullepitsch
Ung. = Unger
Unger = Unger
Urb. = Urban
Urvill. = Dumont d' Urville
Uspensky = Uspensky
Usteri = Usteri
Utsch = Utsch

Vacc. A. = Vaccari Antonio
Vacc. L. = Vaccari Lino
Vahl = Vahl
Val de Lièvre = Val de Lièvre
Valbusa = Valbusa
Vallot = Vallot
Vand. = Vandelli
Van-Dueb. = Van-Dueben
Vanucci = Vanucci
Vatche = Vatche
Vauch. = Vaucher
Vayr. = Vayreda y Vila
Vayr. et Costa = Vayreda et Costa
Velen. = Velenovsky
Vell. = Vellozo
Venanzi = Venanzi
Venetz = Venetz
Vent. = Ventenat
Venzo = Venzo
Verl. = Verlot
Verlot = Verlot
Vest = Vest
V.-Houtte = Van-Houtte
Viborg = Viborg
Vierh. = Vierhapper
Vig. = Viguier
Vill. = Villars
Vilm. = Vilmorin
Vis. = De Visiani
Vis. et Panc. = De Visiani et Pancic
Vis. et Sacc. = De Visiani et Saccardo
Vitm. = Vitman
Viv. = Viviani
Vogel = Vogel
Voigt = Voigt
Volkart = Volkart
Voss = Voss
Vuk, Vukot. = Vukotinovic
Vulp. = Vulpius

W. = Willdenow
Wahlb. = Wahlberg
Wahlnb. = Wahlenberg
Waisb. A. = Waisbecker A.
Waitz = Waitz
Waldst. = Waldstein-Wartemberg
Walk.-Arn. = Walker-Arnott
Wall. = Wallich
Wallm. = Wallmann
Wallr. = Wallroth
Walp. = Walpers
Walsh = Walsh
Walt. = Walter
Wang. = Wangenheim
Warnst. = Warnstorf
Warnstorf = Warnstorf
Wartm. et Schl. = Wartmann et Schlatter
Wats. = Watson
Watson = Watson
W. et B. = Webb et Berthelot
Web. = Weber
Weber = Weber
Webb = Webb
Webb et Berth. = Webb et Berthelot
Webb et Moq. = Webb et Moquin-Tandon
Wedd. = Weddell
Wedel = Wedel
Weig. = Weigel
Weigel = Weigel
Weihe = Weihe
Weihe et Nees = Weihe et Nees
Weinm. = Weinmann
Weis = Weis
Weiss = Weiss
Weitenw. = Weitenweber
Weld. = Welden
Welw. = Welwitsch
Wend, Wender. = Wenderoth
Wendl. = Wendland Joh. Christ.
Wendl. f. = Wendland Heinr. Ludw. (filius)
Wenzig = Wenzig
Wesm. = Wesmæl
West = West
Wettst. = Wettstein
W. et Grab. = Wimmer et Grabowski
White = White
Whlnb. = Wahlenberg
Wib. = Wibel
Wich. = Wichura
Wichura = Wichura
Widm. = Widmer
Wiesn. = Wiesner
Wierzb. = Wierzbicki
Wiesb. = Wiesbaur
Wigg. = Wiggers
Wight = Wight
Wikstr. = Wikstrœm
Wilcz. = Wilczek
Will. F. N. = Williams F. N.
Willd. = Willdenow
Willem. = Soyer-Willemet
Williams = Williams
Wimm. = Wimmer
Wimm. et Grab. = Wimmer et Grabowski
Winch = Winch
Winterl = Winterl
Wirtg., Wirtg. F. = Wirtgen F.
Wirtgen = Wirtgen F.
Wirz. = Wirzén
Wirzén = Wirzén
With. = Withering
Wittrock = Wittrock
Wk. = Willkomm
Wk. et Lge. = Willkomm et Lange
W. et K. = Waldstein et Kitaibel
W. et N. = Weihe et Nees
Wohlf. = Wohlfarth
Wohlfarth = Wohlfarth
Wohll., Wohlleb. = Wohlleben
Wolf F. O. = Wolf F. O.
Wolff C. = Wolff Christian
Wolff, Wolff C. F. = Wolff Casp. Friedr.
Wolff J. F. = Wolff Johann Friedr.
Wolfg. = Wolfgang
Wolfn. = Wolfner
Wolosz. = Woloszczak
Wood = Wood W.
Woods, Woods J. = Woods Joseph
Woodv. = Woodville
Woodw. = Woodward
Wormsk. = Wormskiold
Wright = Wright
Wulf. = Wulfen
Wulf. et West = Wulfen et West
Wydl. = Wydler

Zahn = Zahn
Zahn et Besse = Zahn et Besse
Zahn et Chen. = Zahn et Chenevard
Zahlbr. = Zahlbruckner
Zalew. = Zalewski
Zanted. = Zantedeschi
Zapel = Zapel
Zauschn. = Zauschner
Zawadsk. = Zawadski
Zawadski = Zawadski
Zea = Zea
Zersi = Zersi
Zer., Zeraph. = Zerapha vel Zerafa
Zett. = Zetterstedt
Zeyh. = Zeyher
Zimm. = Zimmermann
Zimmeter = Zimmeter
Ziz = Ziz
Zodda = Zodda
Zois = Zois
Zoll., Zollik. = Zollikofer
Zucc. = Zuccarini
Zuccagni = Zuccagni
Zum. = Zumaglini
Zwierlein = Zwierlein

FINE DEL VOLUME QUARTO

Pubblicato in tre parti: la Iª coll' *Appendice* e coll' *Indice generale* da pag. 1 a 16 nel Marzo 1907, la IIª coll' *Indice generale* da pag. 17 a pag. 192 nel Marzo 1908, la IIIª coll' *Indice generale* da pag. 193 alla fine del Volume nel Settembre 1908.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

NB. — Il presente **Indice generale** serve anche per l'ordinamento degli erbari, mediante i numeri progressivi e le lettere greche e romane poste tra parentesi, dopo il numero della pagina, accanto a ciascun nome di genere, specie, varietà ecc. Questi numeri e queste lettere dovranno, a tale scopo, essere riportate sopra ciascun foglio o busta dell'erbario ed i numeri dei generi contenuti nei singoli pacchi saranno ripetuti all'esterno dei medesimi, per renderne più spedita la ricerca. Le entità possedute dovranno essere contrassegnate nell'Indice, a mano a mano che vengono inserite in erbario. In tal modo si avrà anche una comoda guida per scegliere i *desiderata* nelle liste di scambi di piante.

In vista di ciò e per comodità degli Istituti e Collezionisti, furono tirate un certo numero di copie separate, in carta più economica, che sono ora poste in vendita al prezzo di L. **5.50**.

Digitized by Google

AVVISO. — Della *Flora Analitica* non si cedono parti separate altro che in continuazione di abbonamento all'Opera intera. Si cercano per farne acquisto, il Vol. I° parte I^a della *Flora Analitica* ed i Fasc. I° e II° della *Flora Illustrata*.

PREZZO DELLA PRESENTE PARTE

Lire 4.80

Indirizzare le richieste ed i pagamenti al Prof. **Adriano Fiori, presso il R. Istituto Forestale, Vallombrosa** (prov. di Firenze).

Presso la Tipografia del Seminario di Padova trovasi già in corso di stampa la seguente pubblicazione:

P. A. SACCARDO. — **CRONOLOGIA DELLA FLORA ITALIANA, ossia Repertorio sistematico delle date e degli autori più antichi del rinvenimento delle Fanerogame indigene, naturalizzate e avventizie d'Italia e della introduzione di quelle esotiche più comunemente coltivate.**

Sarà un volume di circa 350 pagine, per formato, tipi e carta simile alla presente *Flora analitica*, di cui può riguardarsi come un complemento. Uscirà nel Gennaio 1909.

Per adesioni e schiarimenti dirigersi al Prof. **P. A. SACCARDO - Padova** *(Orto botanico)*.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

3 2044 102 802 451

U. HOLZER BINDER BOSTON, MASS.

Digitized by Google

Digitized by Google